


世醫得效方

十

内閣文庫	
番號	漢 15558
冊數	22 (10)
函號	41 2



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

世醫得效方卷第七

大方脉雜醫科

○瘡湯

肺道瘡 治氣逆與

小便數晝夜二十行

燭目就羸瘦咽乾口

食倍於常不為氣力

然在上焦心煩燥渴引飲無度

此甜者此疾多得之飲啖炙

吸吸少氣不能多語兩脉痿

牡蠣粉

苦參

蜜陀僧

知母

水銀以白蠟拈接根

一兩黃丹一兩與水

右為末男子用雌猪肚一箇女人用雄猪肚一箇入藥

在內以線縫定用繩縛在新磚上別用生括樓半斤切
碎同煮早晨至午時取藥出不用括樓根只爛研渣吐
和藥爲圓如梧子大每服三十粒食前米湯下日三
服十日可去病根

白濁丸

治心虛煩悶或
易暑熱內積愁煩酣飲過食皆
致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母一兩

川連一兩

苦參

玄參略

鏡胤粉一分

牡蠣煨一兩

朱砂另研

麥門冬去心

天花粉各半

金箔

銀箔二作片

白扁豆煮去皮

右爲末煉蜜入生括樓根汁少許圓如梧子大用金箔

諸爲末每服二十圓至三十圓先用括樓根汁下一服
次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙燥酒色少投發
發圓補

發圓補

茯苓酒浸

磁石煨碎

熟地黄洗

山茱萸去核

黃耆煨

澤瀉

鹿茸去毛切

遠志去心炒

石斛

覆盆

五味子去梗草蘇

破故紙炒

巴戟酒浸

兒絲子酒浸

龍骨

杜仲去皮剉姜汁拌

附子炮去皮臍一

生疔藥

治渴證通用

右爲末煉蜜圓梧子大每服伍拾圓空腹米飲下

生地黄

束如常洗

冬蜜一椀

人參半兩

白茯苓

去皮

右將地黄洗切研細以新水一椀調開同蜜煎至半次

入參苓末拌和磁器內收貯挑服

腫痛之證飲食入腹如流注便而注出落於溷僻溝

渠皆旋結如白脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用

涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或陽強

興感不交而泄其斃不久無治法姑錄一二方聊為備用

虛勞治消中多因外傷瘴熱內積憂思喜嘆注飲食及麵

致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便無度

生薑研汁 輕粉

右搜勻每服二分匕長流水調下齒浮是效以投附子

猪肚圓補

附子

皮法

檳榔各一兩

醋煮

當歸

知母

木香

川練子去核

秦艽去苗土

大黃

酒蒸

龍膽草

白芍藥

石故紙酒浸

枳殼各半兩

右為末分作叁分將一分入猪肚內縫定用蜜酒三升

童子小便五升同入注鉢內熬乾爛研細入一分末同

搜搗為圓梧桐子大每服五十圓溫酒米湯任下

良散

治消中消穀善飢

人參去芦

藿香葉去土

加北五味按柴胡去毛

右到散每服三分新水煎去滓不拘時候

治消中煩熱消殺小便數

入參去芦

交阻冬去心

黃耆去芦

一清粥飲下

治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能

白茯苓

白乾葛二兩木去白半兩

枳殼去穢

生乾地黄去土

黃連淨

牡蠣粉各一

蓮肉去心

瓜根各半

右為末煉蜜和搗三仙并圓如梧桐子大每服伍拾圓

因陰煎熱而生心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不
多肌膚漸漸如削或腿腫脚生瘦小宜降心火生腎水其
煩渴頓止

熟地黄

山茱萸

澤瀉

白茯苓

右為末煉蜜和搗梧桐子大五更初未言語時溫酒盪湯

下三五十圓午前及晚開空瓶吞服此方思其北五味

子最為得力服此不惟止渴亦免生癆瘵久服永除渴

疾氣血加壯

天竺心 寧心保神 治心虛志令人不忘清

三焦化痰 祛煩熱 治口燥者 養心氣

熟地黃 人參 白茯苓 遠志 去心

天門冬 去心 丹參 酸棗仁 去骨 甘草 炙

麥門冬 去心 百部 杜仲 薑汁 炒 茯神 去木

鹿茸 去毛 切 酒浸 麥門冬 去心 熟地黃 洗蒸

右為末 煉蜜圓 每一兩 作拾圓 盒箔 為衣 每服一圓 燈

心衰 湯化下 食後 臨臥 服 你 梧子 大圓 吞服 亦可

鹿茸 治失志 傷腎 皆虛 消渴 小便 無度

黃耆 去芦 雞卵 酥炒 從容 酒浸 山茱萸 去核

波紋 紙炒 川牛膝 酒浸 五味子 焙 白茯苓 去皮

地骨皮 各半兩 人參 三分 右為末 蜜圓 和 梧子 大 每服 三十圓 至 五十圓 米湯 下

集補圓 治 遺精 遺尿 遺精 遺尿 遺精 遺尿

鹿角膠 一二兩 沉香 半兩 不見火 澤瀉 洗塊 再

白茯苓 去皮 人參 去芦 宣木瓜 薏苡仁 炒

黃耆 炙 熟地黃 洗 再 從容 酒浸 鬼絲子 酒浸

五味子 石斛 炒 一當歸 去尾 酒浸 生鹿茸 粉

右為末 煉蜜圓 梧子 大 失砂 為衣 每服 五十圓 空心

寒傷送下

丹石毒公集治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱惟不能多服丹石其氣既盡石氣孤立唇口乾燥精液自洩小便赤黃大便乾實小便晝夜百十行痛當除熱補虛

白茯苓 宣連 白扁豆

人參 石膏 甘草節 寒水石

白朮 羌活 獨活 各等分

右為末每服貳分熱湯調服立效

石氣既脫藥氣陰發致煩渴引水飲食倍常陰氣常與

不交精出故中焦虛熱注於下焦三消之中最為難治

艾倉老 石膏各三兩 人參去芦 茯神去木

括攔根 磁石煨碎 知母去毛 乾葛

黃芩去心 甘草各二兩

右劉散每服用水二盞腰子一箇去脂膜黑豆一合煮至一盞半去腰子黑豆入藥四分煎至七分去滓食后服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

亦能補養

猪肚一按洽 黃連去芦 小麥炒 酪 天花粉

茯神去木各 麥門冬去心

右五味為末內猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛木曰小
杵可圓如梧桐子大每服七十圓米飲送下隨意服之
如不能圓入少煉蜜

聖藥湯 治腎渴解五石毒

嬰粟子 右煮稀粥入蜜飲之

聖藥 治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

春 黃芩四兩 大黃二兩 黃連四兩

夏 黃芩六兩 大黃二兩 黃連七兩

秋 黃芩六兩 大黃二兩 黃連三兩

冬 黃芩三兩 大黃四兩 黃連二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十圓服一月病愈

聖藥 治飲酒多發積為酷熱煎蒸五臟津液

枯燥血泣小便併多肌肉消鍊專嗜冷物寒漿
木瓜乾 烏梅打破不交藥炒 甘草

草果 去皮各半兩

右剉散每服四分水盞半生薑五片煎七分不拘時服

聖藥 治同上

枳椇子二兩 麝香一分

右為末麝糶圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯吞下

聖藥 治同上

烏梅肉 遠志 去心甘草 炙黃連 枳實 去殼
以薑汁拌炒各一兩

夏加黃連伍分春秋冬不用

右劉散每服四分永兩盞糯米根一握煎七分去滓不
拘時溫服若無糯米根白茅根亦可如無白茅根米稈
繩代之亦可

龍鳳圓 治同上

鹿茸酒浸冬去毛一兩 山藥 兔絲子酒浸冬

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前米飲下濃
煎人參湯亦可

蓮圓 治消渴小便滑如油類數者

黃連去須 瓜蒌連核各等分

右為末生地黃自然汁圓如梧子大每服五十圓食後
牛乳汗下點湯下一日二服忌冷水猪肉或研麥門冬

自然汁為圓熟水吞下

朱砂黃連圓 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

朱砂一兩 一宣連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓燈心棗湯吞下

酒家黃連圓 治腸熱解酒毒止渴厚腸胃方見下痢類

通治云云 治三消渴利神藥常服禁精止白濁延年
兔絲子酒浸通軟乘濕研 白茯苓去皮 乾蓮肉略三

五味子去核酒浸 秤七兩

右為末別研山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煮糊為
圓如梧子大每服五十圓天花粉北五味子煎湯下溫
酒益湯亦可脚膝無力木瓜湯下

清心飲 治心中蓄熱時常煩燥因而思慮勞力憂愁
 抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢遺瀝痛便赤
 如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受尅口舌
 乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下
 赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱藥性溫平不
 冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣
 黃耆去心 黃耆去心 石蓮肉去心 白茯苓去皮
 人參去芦 麥門冬去心 甘草 地骨皮去骨
 車前子去沙土
 右劉散每服三分麥門冬拾粒去心水一盞半煎取八
 分去滓水中以冷空腹服發熱加柴胡薄荷煎

白疾

蓮房 乾葛 枇杷葉去毛 甘草炙
 括樓根 綿黃耆去芦
 右劉散每服四分水一盞煎七分去滓溫服小便不利
 加赤茯苓

消渴病或飲多利少或不飲自利肌

唐瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利
 童根乘白皮即未多時裁者去 白茯苓去皮
 人參去芦 麥門冬去心 乾葛 乾山藥
 桂心去麋皮 甘草半兩
 右劉散水一盞半煎至七分去滓溫服

三消渴利神效

糯穀旋炒作爆

桑根白皮

厚者切

右每用秤一两許水一大椀煮取半椀渴則飲不拘時

天蛤散治渴飲水不止

文蛤即五倍子最能回津

右為末以水飲任調方寸匕不拘時服

羊乳圓治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚弱虛滿

而渴者

宣連去須不拘多少為末

生括樓根汁

生地黄取汁

羊乳無羊乳牛乳人乳亦得

右以三汁攪和為圓如梧子大每服三五十圓米飲下

一法濃煮八分飲下

益元散治消渴咽乾面赤煩燥方見中易傷寒傷暑類

人參去芦 主乾地黄洗 熟乾地黄洗 黃耆蜜炙

天門冬去心 麥門冬去心 枳殼去穢 石斛去根

枇杷葉去毛 澤瀉 甘草等分

右劉散每服三分水一盞煎至六分去滓食後臨卧温

服此方乃全用二黃圓甘露飲料生精補血潤燥止渴

佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則小腑清利肺

經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙

無踰此

治大渴

右深搥大括樓根削去麁皮寸切以水浸一日夜一易浸五日取出爛研細絞汁如作粉法乾之水服方寸匕日三四服入牛乳一合服尤好

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參去芦 遠志去骨以甘草水煮過 當歸去尾 熟地黃洗去土蒸 白茯苓去皮 黃耆去芦 北五味子去 甘草微炙各 天花粉一兩

右劉散每服三分水一盞半棗一枚煎食前服

補虛治渴止渴潤腸婦人血海冷白帶白淫白濁

黃蠟 雪白茯苓去皮 各四兩

右茯苓為末蠟和圓彈子大每服一圓不飢飽細嚼下棗湯亦可

治渴證小便澀數而澀兼有油濁用燈心枝

冬煎湯下方見心恙類

白浮石 蛤粉 蠟殼

右為末用鯽魚膽七箇調七分服不拘時候神效

治消渴骨蒸

宣連去鬚為末不以多少剉冬瓜肉研搥自然汁和成餅子陰乾再為末再用汁浸和如是七次即用冬瓜汁為圓如梧桐子大每服三四十圓以冬瓜汁煎大麥仁

湯送下尋常渴止一服

消渴湯 治消渴虛熱者其佳

乾淫萍

括樓根等分

右為末以人乳汁和圓每服二十圓空腹米飲下日三服三年病者三日可又白芷末水調服止

消渴

鈔丹二兩

附子一兩

乾葛

括樓根各三

右為末煉蜜圓每服十圓米飲下日三服渴則服之治日飲水至一石者春夏去附子

白木 治胃虛發渴

白木一兩

人參去芦

白茯苓

甘草各半兩

右為末每服一分水一盞半煎至七分服凡渴之後多有腫疾仍預服復元丹數服

參茸湯 治消渴

人參去芦

桂枝去皮

天花粉

甘草各一兩

綿黃耆益錫

白芍藥酪二

白茯苓去皮

北五味酪各一

右劉散每服四六分水盞半煎八分日進四服合滓煎

雞蘇圓 治病後虛熱發渴

古雞蘇圓以北五味煎湯吞下仍服安腎圓方見失血

餅圓 治消渴

蜜陀僧二兩列

川黃連細粉

右用蒸餅圓如梧子大每服五圓煎蜜空茄根湯下臨

卧服次日加至伍拾圓以後每日伍圓至三十圓止服藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必效若覺惡心但每日食乾物壓之旬日後自定奇其奇甚實空是出蚕蠶了空蠶殼

五圓治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草不以多少搗並花葉皆可思一名老翁鬚一名蜜岩花一名金銀花以洗淨用之右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許為末即以所浸酒為糊圓如梧子大每服五十圓至一百圓酒飲任下不拘時候此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸漏

治不渴而小便大利以牡蠣末取患人小便煎服

單方治渴

糯稻稈灰取中一尺燒淋汁飲或不燒便煎服亦妙生牛乳細呷或生蘿蔔搗取汁時飲少許

蠶絲湯治渴神效

煮蠶絲湯任意飲之頗效如非時以絲或綿煎湯服

煮蠶方治渴渴有蟲

苦棟根取新白皮一握切焙入麝少許水貳碗煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀如虵虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有虫耗其津液凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎炙糟藏鹹物及一切熱物百日以上不可鍼灸則瘡中生膿水或成癰疽膿水

不止則死

○漩濁

心濁濁思慮傷心便下赤濁

白茯苓去皮石蓮肉去心龍骨生用天門冬洗去心

遠志洗去心柏子仁別研紫石英煅

當歸酒浸酸棗仁去殼龍齒一兩乳香別研

右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服七十圓空心

溫酒棗湯任下

心煩心飲治心中客熱煩躁赤濁肥脂

石蓮肉 白茯苓各一益智仁 麥門冬

遠志水浸取肉 人參各半兩 石菖蒲

去葉前子 白木 澤瀉 甘草各二分

右劉散每服三分燈心二拾莖則服有熱加薄荷少許

健忘睡卧不寧憂恐危險一切心疾並皆治之

人參去芦 酸棗仁微炒 去皮各一兩

長砂研細 乳香一分 以乳鉢坐水盆中研

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓溫酒化下棗湯亦

可空心臨卧服

十四夜圓

補諸虛不足益血收斂氣治怔忡不寧精神

昏倦睡卧不安赤白濁甚

柏子仁研 遠志去心 酸棗仁去殼 紫石英煅

一兩

熟乾地黄洗川當歸洗淨去

茯苓去皮 人參去芦

肉桂不見火已

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓黃湯食後臨

臥吞服

桑葉散 治男婦人小便赤濁諸藥不效者

五苓散

辰砂妙香散

右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服一大錢

一日三服當頓愈

桑腫散 治小便數次如稠米泔色心神恍惚憔悴食減以女勞得之服此不終劑而愈乃主安神定心志

菖蒲鹽炒

龍骨

人參去芦

茯神去木

當歸去尾

鱉甲醋炙

右等分為末每服二分夜卧人參湯調服

護身散 治同上方見消渴類

遠志散 治小便赤濁如神

遠志去心用甘草煮半斤

茯苓去木

益智仁各二

右為末酒糊圓每服伍拾圓臨卧黃湯下

牛膝散 治水火不既濟心下怔忡夜多夢汗便赤身熱

牛膝酒浸

熟地黄洗蒸

茯苓酒浸各

鹿茸酒潤炙

附子炮去

五味子去枝

人參去芦

黃耆炙

遠志煮薑汁炒

白茯苓去木

山藥炒

當歸去芦尾 龍骨煨各一兩 兎絲子酒浸研成餅三兩

右為末浸桑酒煮糊圓如梧子大每服七十圓薑湯下

取湯 **以酒** **治元氣不固遺精夢泄**

大附子炮去皮 龍骨煨 肉苁蓉酒浸 牛膝酒浸

巴戟去心各一兩

右末煉蜜圓如梧子大每服三十圓薑酒益湯空心下

震無 **治腎經虛遺漏不止用二陳湯加白茯苓煎湯**

送下方見熾燭類

鎖精 **治小便白濁**

破故紙炒 青鹽各半兩 白茯苓 五倍子略二

右為末酒糊圓空心三十圓薑湯酒任意下

止嘔 **治氣鬱發衄無比袖方**

黃耆六分 赤茯苓 白芍藥各五分 當歸

生乾地黄 阿膠灸各五分

右為末煎黃耆湯調下為散煎亦可

歸脾 **治思慮過度心多健忘為脾不能統攝心以致**

妄行或吐血下血

白朮 茯苓 黃耆 酸棗仁炒去

龍眼肉略一人參 木香各半兩 甘草二分半

右劉散每服水一盞薑五片棗一枚煎不拘時候溫服

天 **治思慮過度心吐衄不一**

遠志去心 白芍藥 天門冬去心 藕節

麥門冬去心黃芩生薑 呵膠蚌粉炒沒藥

當歸去頭 三地黃醋煮 人參 甘草各半兩

右別散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時服

虛證 治飲食過度傷胃不化全嘔吐其色鮮

紅或心腹絞痛自汗各口渴者宜服之

人參 乾薑炮 白朮各一兩乾葛

右別散每服三錢水壹大盞煎不拘時候溫服去乾葛

加川芎治鼻衄埋中腕分利除陽安定血脈

服效 治暴吐血桂末貳錢水湯各半盞調溫其甚者只兩

當歸酒洗 鹿茸酒炙 黃耆酒炙 沉香鎊

北五味炒 遠志肉 酸棗仁炒 吳茱萸去核

茴香炒 破故紙炒 牡蠣煅 熟地黃蒸

人參去尾 龍骨煅 附子炮 巴戟略 一兩

右各四製如法為末酒糊丸每服五十粒至七十粒空

心溫酒益湯任下

小兒疳積 治腎氣虛積五勞七傷小腹痞急四肢酸疼

面色顴赤唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜夢驚寐精神

困倦喜怒無常泄瀉不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿

腳膝痠緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便

出血時有遺瀝並宜服之及服填骨髓續絕須清五臟去
萬病明視聽益顏色輕身延年助耳目

石蓮肉貳兩 兔絲子酒浸焙研
山藥二兩 柴錢半打

右為末山藥糊搜和為圓如梧子大每服五十圓空心
溫酒或鹽湯下如脚膝無力木心湯下晚食前再服

四子湯治小兒白濁

生料四君子湯 生料五積散

右和勻每服二錢燈心一握水一盞煎服勸見脾胃

服茶拾圓食前煎和湯下方見馬損風科通治類

脾瀉治木難在治示現無衰脾弱不禁瀉瀉瀉瀉腰痛
力疲

蒼朮一兩 白朮一兩 川烏皮酥 破故紙炒 白茯苓

右為末酒麩糊圓梧桐子大去砂為衣每服五十圓空
心縮砂煎湯下梗米湯亦下

七情四湯治小便渾濁去量煎吞方見
大寶圓治思慮傷心小便赤澀遺精白濁方見

通治還丸治心腎俱虛漏精白濁
山藥七 牛膝炒 夜合令 山藥更

船上茴香粉

一兩半

兜絲子

酒浸續斷

各一兩

右為未煉蜜圓如梧子六每服三十圓鹽湯下

分清飲 通心氣補偏精治小便餘瀝并赤白濁

益智

川草薺

石菖蒲黃芩大合烏藥

右等分剉散入鹽少許煎空心服

雙合圓 治赤白濁方見消渴類

固頭固真丸 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陰不固

滋有遺瀉小便經歲白濁或淡赤或如膏或如精世甚則

身軀拘倦骨節酸疼飲食不進面色萎黃寒粘肥瘦唇口

乾燥虛煩盜汗舉動乏力多服取效

白龍骨半斤 磁石煅 朱砂各一兩 磁石煅

紫梢花半兩 家韭子

兜絲子各半 鹿茸酒浸

白茯苓

川巴戟

官桂

肉蓯蓉酒浸

乘蠟酒浸 遠志酒浸

當歸去尾

蒼朮切酒炒 何首烏

川練子炒

桑寄生真者 沉香不見火 木香不見火 黃耆去芦

綿附子熟煎

右為未煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下

小溫金散 治心虛泛熱或觸冒暑熱漩下或赤或白或淋

漩下行時發煩 樽自汗

人參去芦

石蓮肉去心

川巴戟去心

益智仁去殼

黃耆去芦

草薺酒炒

麥門冬去心

赤茯苓去皮

甘草 各等分

右為散每服六錢水一盞半煎心二十空紅棗二枚煎食前溫服以補其和

子午圓 治心腎俱虛夢寐驚悸自汗所隨氣悲憂不樂消渴引飲流下赤白帶濁其四林無以眼以形容瘦悴耳鳴頭暈中滿法以

雄子去殼

蓮肉去心

狗脊

白龍骨

川巴戟去心破故紙炒

石菖蒲切六分

苦楮實去殼

夫散去皮白皮令去皮

文蛤

仲子去殼

白桂去殼

右為末酒蒸肉按茨壹斤二兩爛研為圓打桐子大朱

砂一兩半重細研為圓濃煎草薤湯空吞下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自有奇效

○游多

小兒圓 治小便夜多脚弱老人虛人多有此證令人卒死大能耗人精液頭昏

元絲子

酒蒸

家韭子去殼

麝香

炒

蛇床子去殼炒

右等分為末酒糊丸如梧子大每服五七十圓糖米飲

鹽湯任下

又方 治夜多小便

右取純糯米糲壹斤臨卧灸令軟熟炙之仍以溫酒下

不飲酒湯下多痰愈佳行坐良久待心間空便睡一夜
十餘行昔堂夜便止

又方

方用首香不以多少煨淨入少鹽炒為末如前亦糲米
糲糜或或用糲猪胞盛以糯米煮爛或入椒薑少許同
煮去糯米只用炮切片煎藥或更飲好酒半杯臨晚臨
卧各壹服亦妙

兜絲子圓治小便利或大便禁

兜絲子酒釀桑椹酒釀生礬煨粉肉苁蓉酒釀
芎子煨工天子酒釀雞肚脰酒釀鹿茸酒釀
方為末酒糊團七梧子大每服七圓食前鹽酒任下

一方加巴戟去心破故紙微炒赤石脂煨草薢各一兩

松皮圓治小便利數每服三十圓温酒臨湯下

草薢圓治小便利數日夜無時

方用川草薢洗不拘多少為末酒糊團如梧子大每服
七十圓空心食前鹽酒鹽湯任下

續命圓治將氣不足小便頻數

天合烏藥

益智仁各等分

方為末酒煮山藥末糊團如梧子大每服七十圓臨臥
鹽酒吞下

遺溺

家韭子圓治少長遺溺及男子虛弱陽氣虧小使白濁

夜夢遺精此藥補養元氣進食飲食

家韭子_兩 鹿茸_兩 茯苓_兩 牛膝_兩

熟地黃 當歸_{各二兩} 兒絲子_兩 巴戟_{去心各}

杜仲_炒 石斛_{去苗} 桂心 乾薑_{各一兩}

右為末酒糊圓梧桐子大每服五十圓加至百圓空心
食前盪湯溫酒下小兒遺尿者多因胞寒亦稟母傷
氣不足故也別作一棧小圓服

雞子金散 治溺床失禁

右以雞子脰壹具并腸淨洗燒為末男用雌女用雄者
研細每服方寸匕酒飲調服

又方 用猪胞洗淨鑊釜上炙香熟碎細溫酒下

白龍骨 治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨_{二兩} 訶子_{十五枚} 縮砂_{二兩}

右為末糯米粥圓梧桐子大每服五十圓空心盪酒下
治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦悴

食減以文然得之

桑螵蛸_燻 遠志_{去心} 菖蒲_蒸 龍骨

人參 茯苓 當歸 救急_{醋煮}

右各等分為末每服貳錢夜卧人參湯調下

治婦人產後傷動胞破終日不能小便但溺濕不

黃絲絹_{生者} 白牡_{升根皮未汗} 鱗_{白及未乾}
右用水壹椀煎至絹爛如錫空心頓服服時不得作聲

作声不效

遺精

治下焦虛冷精滑不固遺溼不斷

附子去及失五味子

龍骨各半兩桑螵蛸七個

右為末細糯米糊圓每服三十圓空心鹽酒吞下

治精洩不禁

禹餘糧

石中黃

赤石脂

紫石英

石燕子

五斤各二兩火煨通

右以白茯苓肆兩參二兩青鹽一兩同為末入無灰

酒約量多少打糊拌和眾藥為圓以朱砂為衣如小指

頭大每服三十圓至參圓溫酒或鹽湯下空心臨臥服

治脫精泄不禁

桑螵蛸上三兩

龍骨別研

白茯苓略一

右末糊圓如梧子大每服七十圓煎後冬鹽湯食前服

治夢中遺精每服一圓虛者溫酒調熱者麥

門冬去心濃煎湯調方見心恙類

治遺泄

益智仁二兩用鹽二

烏藥二兩

右為末用山藥壹兩為糊圓如梧子大每服五十圓空

心臨臥鹽湯下以朱砂為衣凡病精泄不禁自汗頭眩

虛極或寒或熱用補游之藥不效其狀浮軟而散蓋非

虛也亦非房室過度此無他因有所觀心有所慕意有

所樂慾想方與不遂所欲而致斯疾既以藥補且固不效將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參三錢當歸壹錢洗焙為末作參服糯米飲調下服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎叁錢人參壹錢焙為末作三服沸湯調服頭眩遂差精不禁者用白芍藥壹兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗二枚煎空心服即心安神定精固神悅

清心圓治經絡熱而夢泄心怔忡恍惚

六柏皮去粗皮

右為末入腦子壹錢同研煉蜜圓如梧子大每服十五圓至十九圓濃煎去心麥門冬湯下

猪苓圓治年壯氣盛情慾動中所願不得意淫於外致夢遺白濁

半夏一兩 猪苓三兩

右用半夏劉茹豆大用猪苓為末先將一半炒半夏黃色不令焦地上出火毒半日取半夏為末糊圓如梧子大候乾更用猪苓末炒微裂入不油沙瓶中養之每服四十圓空心溫酒盪湯送下如常服於中未間冷酒下

理脾圓治遺泄尋常只治心腎綠脾虛亦有此疾

厚朴去粗皮 薑

羊脛炭人參別研去粗皮

右為末水麩糊為圓如梧子大每服伯拾圓米湯下

○失血

風證治傷風汗下不解營干經絡隨氣薄
泄血出清血或清道閉流入胃管出清血遇寒止之色必
瘰癧者

桂心 白芍藥 甘草 川芎 桔梗根

右等分剉散每服四大錢水壹盞半薑叁片棗一枚煎服頭痛加石膏

胃腸治大小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉
注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度身熱
寒證治傷寒發熱解利不行血隨氣逆世謂

紅汗者

麻黃去節 升麻壹兩 黃芩 芍藥
甘草 石膏煨 茯苓各乙兩

右剉散每服肆大錢水壹盞薑生薑三片煎熟服微汗解

及鼻衄吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角乙兩 生地黃八兩 芍藥三兩 牡丹皮二兩

右剉散水煎狂者加大黃一二兩黃芩叁兩其久脈大來遲腹不滿自言滿為無熱不須加也

小兒明湯治同上 方見傷寒

暑證治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅滯發熱或胃

氣虛血滲入胃停留不散吐血壹貳升許治衄則必示花
煎湯調下屢用得效

枇杷葉散治同上方並見傷暑類

濕證除濕湯治胃兩者濕鬱于經絡血溢作衄或腫不和
濕者經絡流入胃吐血

茯苓 乾薑各二兩甘草多 白朮略乙

右劉散每服昇大錢水煎服頭疼加小管貳錢最止浴
室發衄

七情下傷胃氣散治氣逆嘔血衄血用側柏葉白茅花煎
湯下方見諸氣類

蘇合香散治因氣作衄或吐衄血濃煎白茅花湯化氣類

犀角湯治吐血自汗大效方見病各類

如法四物湯治咯血用毛頭白紙虛灰入麝香煎調二錢

服之好神方見婦人崩漏類四君子湯三分加一
熱證天黃散治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一合或坐

升許名曰肺疽
大煎視流 犀角湯 升麻 桑白皮炙

蒲黃炒 杏仁去皮尖枯梗法去一兩甘草半兩
右劉散每服四錢水壹盞坐生薑伍片煎不拘時溫服

犀角湯治同上方見前

苦根 黃苓 阿膠 犀角 側柏葉

治鼻衄終日不止心袖煩悶

生地黄各一两
甘草半两

右劉散每服四錢水壹盞生薑三斤煎不拘時溫服

治咳血

右用槐花不以多少為末每服或飯食后熱酒調服

勞淋氣淋止渴除驚涼上南解毒口臭喉腫口甜口苦

柴胡二兩剉碎木通以湯洗麥門冬去心

黃耆一两剉碎生乾地黄末後入膏

蒲黃二兩剉碎雞蘇一兩甘草二兩半入參二兩

木通剉碎

右除別研藥後入分寫未用好蜜二斤先煉一二沸然

後入生乾地黄末不佳手攪時時入柴胡木通以慢慢

熬成膏勿令焦同餘藥和為圓如蚕豆大每服二十圓

以去心麥門冬前湯食後服服血崩下血諸淋疾並

空心食前服

黃連去頭黃芩大黃各一两

石寫未煉蜜圓如梧子大每服四十圓熱水吞下

白朮二兩入參白茯苓各一兩黃耆各一兩

百合二兩前胡去葉

血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

治積熱生血咳血若因飲食過度有重傷胃

血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

白朮二兩入參白茯苓各一兩黃耆各一兩

百合二兩前胡去葉

血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

治積熱生血咳血若因飲食過度有重傷胃

血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

白朮二兩入參白茯苓各一兩黃耆各一兩

百合二兩前胡去葉

血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

治積熱生血咳血若因飲食過度有重傷胃

柴胡 各一分

右劉散每服參錢水壹盞生薑叁片棗一枚煎溫服

勞傷 雞蘇散 治勞傷肺經腫內有血咽喉不利

雞蘇葉 黃耆 生地黄洗 阿膠 熬粉炒

白茅根 碎 枯梗 麥門冬去心 蒲黃炒

貝母 去心 甘草 各二兩 桑白皮 半兩

右劉散每服四錢生薑三片水一盞半棗一枚煎溫服

蓮心散 治勞心吐血

右以蓮子心伍十箇糯米五十粒為末酒調服效

大回膠圓 治肺虛客熱咳嗽乾多唾涎沫或有鮮血并勞傷肺管吐血嘔血並宜服之

麥門冬 去心 乾山藥 熟乾地黄 五味子 各一兩

遠志 去心 丹參 貝母 炒 防風 各半兩

阿膠 炒 茯神 去心 柏子仁 百部根

杜仲 炒 杜仲 各半兩 茯苓 一兩 人參 一分

右為末煉蜜圓如彈子大水一盞煎六分服

傷損 傷命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損痰

血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蓮 用石炭煨火炒 二黃 黑牽牛 各二兩

右為末每服三錢熱酒調下或人行四五里再用熱酒

調牽牛末貳錢催之須臾轉下惡血塊或片血盡愈

石散 治一切金瘡打撲傷損犬咬傷並於傷處搽

傳或內損血入臟腑壅滯作血及婦人產後敗血不散

花蕊石研細上色硫黃研細

右和勻入藏瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熟透以磚盛用白炭壹秤頂上發火焙炭盡候冷取出再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便溫酒一二錢心取瘀血效

雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩燥疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈推陳致新折傷神效

六黃酒蒸杏仁去皮右研細用酒壹碗煎至六分搗去滓雞鳴時服次日取

下瘀血即愈若便覺氣絕取藥不及急摩開口以熱小便灌之

加味養血湯治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如耳萎

川芎 當歸 白芍藥 百合水浸

荆芥穗各小分

右對嚴每服四錢水一盃酒半盃同煎不拘時服

痰火壅遏治心氣虛耗不能藏血以致面色黃痿五心煩熱咳嗽吐血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓去皮人參去芦 前胡去芦 半夏 川芎各三分 陳皮 枳殼去穢 紫蘇

桔梗 去毒 甘草 乾葛 各半兩 當歸 三錢

白芍藥 二兩 熟地黃 一兩

右到散每服四錢生薑五片棗一枚煎食前服

通治 立效 治吐血

側柏葉焙乾如倉卒難乾新瓦焙為末每服三錢米飲調食後服一方柏葉加赤土拌勻煉蜜為餅子服

單方 治鼻衄不止或吐血

蘿蔔汁入鹽服一盃立效或蘿蔔汁煎汁滴入鼻中

鹿茸 治鼻衄不止

白麋骨 研各半兩 麝香 研

右和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥

於鼻中或以溫紙蘸藥於鼻內尤妙

黑神散 治大吐血及傷酒食飽低頭擗損吐血至多并血

妄行口鼻中俱出但聲未失無有不效

百草霜 村中燒草 絹

不拘多少羅細為末每服一錢糯米飲調下鼻衄搗一字皮破血出灸瘡出血搽上止并治舌忽然腫破乾搽

犀角 治實熱吐血

大黃 溫紙 川芎 黃連 黃芩 各分

右為末每服二錢食後并水調服

犀角 加粟白皮麥門冬煎蘇圓公腸熱胸中鬱熱

吐血兼治血淋吐血口臭 方見傷寒陽證類及見前

蘇子煎湯 治虛腫鼻血 方見諸氣類

聖方

川鬱金末并水調下亦治吐血 又菊葉煎湯通口服

又方血餘散用頭髮燒存性研米湯調下仍吹少許入

鼻中 曾服燒煉藥致鼻血者山梔子煎湯解之仍燒

山梔子存性為末入鼻 又方烏賊魚骨槲花末入

鼻 又方槐花半生半炒為末入鼻 又方成片中

白燒去穢為末入麝香少許入鼻或加油髮灰

又方大蘇煨香取三瓣切傅脚底鼻出有熱氣即去之

天門冬 治吐血咯血大能潤肺止咳
天門冬一兩 甘草 杏仁炒 貝母

茯苓 阿膠 各半兩

右為末煉蜜丸彈子大每一丸嚙津噙化日夜可十九

龍骨散 治鼻衄過多

右以龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九竅

出血皆可用一方用梔子如前法

白及散 治鼻衄嘔血咯血肺損或食飽負重得者服之愈

白及 不拘多少

右為末米飲調或用井水調一匕用紙花貼鼻竅中一

方用阿膠末調貼

黃耆蓮中湯 治汗出汚衣甚如坏染皆由大喜傷心喜則

氣散血隨氣行兼服如香散金銀器麥子麥門冬煎湯下

病名紅汗方見馬指心赤類

傳言汗治產婦大喜汗出活衣赤色及膏淋尿血
葎草不以多少

右搗取汁二升醋二合和空腹飲一盃或煮濃汁飲亦
治淋瀝尿血

側頭治內損吐血下血或因酒太過勞傷於內血氣妄
行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死服此即安

栢葉一兩半人參

荊芥穗各一兩

右為末每服三錢入飛羅麩二錢拌和新汲水調如稀
糊相似啜服立效又方用百草霜川白芷研為末每服
三錢濃米飲併服

清心治鼻衄不止

右以蒲黃血竭為末吹入鼻中

灸法虛勞吐血灸胃脘三百壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺膈膺年壯

吐血嘔逆灸天陵穴在掌後兩骨間是

口鼻出血不止灸腦衄灸上星穴五十壯入髮際一寸

衄不止灸足大指節橫理三毛中十壯刺者伯壯并治

陰卵腫

大便下血熱證酒熱黃連圓治酒毒積熱便下鮮紅或肛

門作熱方見消渴類

楊梅圓治五種腸風瀉血糞里有血名外痔糞後有血名

內痔大腸不收名脫肛穀道四面裂肉如豚各等痔頭上
有孔名瘻並皆治之

槐角去枝梗 地榆 八兩 當歸 八兩 黃芩 半斤

防風 八兩 枳殼去穢

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓不拘時米飲下

參敗毒散 治同上每服三錢生薑三片薄荷葉七皮葉

白皮七寸烏梅一個煎方見傷寒

防風散 治因食熱物過度風氣蓄盛銷鑠大腸膏脂以致

榮衛之血滲流而下此方独效

羌活 荆芥 防風 枳殼

姜蚕去絲 薄荷各等分

右劉散白水煎空心温服忌并喫熱物

黃連阿膠圓 治同上米飲下方見效嗽

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉 生地黄 當歸 厚朮 川芎各二兩

枳殼去穢 白 京芥穗 槐花炒 甘草各半兩

右劉散每服三分生薑三片烏梅一箇煎空心服一方

加防風烏梅各半兩效

虛證 腸風里散 大便鮮血暗腹痛裏急後重脫肛酒痢

荆芥燒 二兩 亂髮燒 槐花燒 槐角燒 各二兩

枳殼二兩 甘草二兩 蠟皮各一兩半

右將合燒藥同入瓷瓶內黃泥固濟燒存三分性出火

氣同甘草枳殼一兩搗為末每服二分白水煎空心服
溫酒調亦可

馬玉冊 治丈夫婦人久新腸風痔瘻着床頭癢不可忍者
服此不過三四次見效初得此疾發痒或夜敷道周回多
生硬核此是痔如破為瘻只下血是風皆因酒色氣風食
五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有虫若
不去根本其病不除此藥的效

刺蝟皮四兩 猪鬃蹄二十 牛角腿三兩 雷丸一兩
槐角一兩半 敗棕二兩 乱髮淨倍二兩
脂麻一兩 苦棟根皮一兩二分半

右剉碎入瓷罐內燒存性碾為末入麝香二分乳香五

分研令和勻用酒打麩糊為丸如梧子大每服八粒先
細嚼胡桃一枚空心晚食前溫酒吞日二服病甚日三
服切忌別藥不過三兩日可除根本

加味雙和湯 加側柏葉每服三皮炒過生薑三片棗一枚
烏梅一个煎空心服 方見虛損類治同上

卷柏散 治臟毒下血神效

卷柏生土石場上高四五寸根黃如絲
右等分為末每服二分米飲調下 以柏枝曝乾用 黃耆

聖金圓 治腸風下血瀉血

百藥煎二兩 兩生一兩 兩燒存性一兩 兩炒焦一兩
右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九粒空心米飲下

神册 治腸風痔漏

刺蝟皮一个 飲器中 炒焦黑為度

皂角刺鹿有 硫黃研

猪牙皂角去黑皮 蜜塗炙

白礬 枳殼炒

黃耆蜜炙 附子去皮 各半兩 白雞冠花子一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七丸至十九空心食前温酒下不飲米飲下又在漏痔服至三四日肉滿平安諸痔服之即自消外痔用藥十九同朱砂細研蜜調塗常服永除根本若服藥竟熱加白鷄冠花子一兩半或一兩更加三五丸服之臟腑自調

小三

香附子餅法破毛

天合烏藥一兩 甘草一分

右為末每服一錢空心鹽湯點服治同上

靈靈册 治臟腑虛損大腸不收久作腸風下血二藥夾用每服五十九煎不換金氣散加川芎空志

煎下方並見痢冷類

理中湯 治同上加木香妙方見霍亂類

香梅圓 治腸風臟毒下血

烏梅同法 香白芷不見 百藥煎各等分

右為末米糊丸梧桐子大每服七十九空心米飲下

斷紅圓 治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日漸羸瘦

側柏葉炒黃 川續斷酒浸 鹿茸去毛 附子炮

黃耆 阿膠蛤粉炒 當歸酒浸 白礬各一兩

右為末醋煮米糊丸梧子大每服七十九空心米飲下

冷熱不調 黃連散

香薷 扁豆 厚朴 姜製 黃連 去須

右到散用水煎服

香連圓 治冷熱不調下血 方見此鴻類

香散湯 熱加茯苓槐花冷加白茯苓丁香 方見傷人科 產類即佛手散

真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調便下膿血魚腦裏急 後重方見此鴻類

消風散 米飲調熱者吞酒蒸黃連丸冷者吞烏龍丸 方見 熱証通治及下痢類

通治 霍亂 治腸風下血百藥不效

以裏棗俗名鼻涕團取乾者為末米飲調立效

又方柏子十四枚搥破紗囊貯以好酒三五煎至八分服之初服反竟加多再服立止非飲酒而致斯疾以艾

葉煎湯服之神效勝於他藥

又方生猪臟一條切控乾以槐花炒乾為末填入臟內兩頭線縛了以好米醋於磁石器內慢火煮爛切片沙

鉢內研爛為丸梧桐子大每服二十九煎當歸酒下

又方荆芥穗納砂仁各等分為末糯米飲下

人法 第一十 推隨年壯

又法平立一杖子比膝平却向後脊骨當中灸七壯或年深於脊骨兩傍各一寸灸七壯余謂寸半則是即膈

自佳

小便出血酒蒸黃連圓白茅根燒煎湯放溫吞下方見下

方見散加辰砂一字燈心一握煎湯調下方見傷暑類

交調血湯治酒麪過度勞心後小便出血

半赤茯苓兩赤芍藥 川芎 半夏各半

前胡 柴胡 青皮 枳殼

此梗 桑白皮 白茅根 燈心

甘草各二分半

右劉散每服三錢半姜五片蜜一匙新水煎服

蜜生五白茅根一握

生薑七片

右用水同煎服神效

鹿角膠圓治勞室勞傷小便尿血

鹿角膠兩沒藥別研油頭髮灰各三分

右為末用白茅根汁打糊丸如梧桐子大每服五十九

益湯送下

鏡面草

右用自已頭髮一握洗淨燒灰溫酒調下一服立效

鏡面草取清汁入蜜少許同水調服效

淡豆豉療小遺出血條

淡豆豉一握煎湯服效

治小便出血

竹茹一大塊水煎服也

川牛膝一兩去芦水一椀煎至七椀頓服

生地黄取自然汁半升生薑自然汁半人相和服未
止再服

當歸川白芷為末每服一錢溫米飲下

脫肛

治大腸寒肛門脫出收用刀過多及小兒叫呼
久痢後皆使脫肛

五倍子

右為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用赤

石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺餘者
以兩床相接中空一尺以菴菴盛藥水滿架起去床平
令病者仰臥以其所脫浸在菴中換藥逐日如此浸縮
盡為度

木賊一味為末摻肛上

柳花

柳角

右等分炒香黃為末用羊血蘸藥入熱食之以酒送下
或以猪膏去皮蘸藥炙服

釣腸丸治同上 方見諸痔類

蠟皮一個 磁石煨碎 桂心各半兩

右為末每服二錢米飲空心調下治女人陰脫加鱈頭

一枚燒灰研入

木青膏治肛門脫出大人小兒乘皆治之

香附子一兩半 荆芥穗二兩

右為末每服三匙水一大椀煎熟淋洗

灸法病寒冷脫肛出灸脐中隨年壯

脫肛歷年不愈冬橫骨自壯又冬脊窮骨上七壯

諸痔

冷證錫腸圓治父新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血

括樓二個 蠟皮兩個 白礬煨

綠礬煨 胡桃仁十五個 白附子生用

生夏 天南星 雞冠花五兩 枳殼炒

附子去皮臍 訶子各二兩

右為末醋麪糊丸如梧子大每服二九空心臨卧温

酒下遠年不差者服十日見效久服除根

黑治同上 大見足白類

橘皮湯治氣痔

橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒

檳榔 木香 桃仁浸去皮 紫蘇葉生葉

香附子 甘草各二兩半

右劉散每服三分水一盃生薑三片紅棗二枚煎服

百藥煎研為末每服三分黃稀白粥攪勻服之立愈糊
丸米飲下亦可

黑圓 專治久年痔漏下血用之累驗

乾薑 百草霜略 木饅頭二兩烏梅

敗棕 柏葉 亂髮各五分

右各燒灰存性再入桂心三分白芷五分同為末醋糊
丸梧桐子大空心二十九丸米飲下

熟証 通利大小便取下黑物

川芎 白芷 生乾地黃 土芍藥

五靈脂 枳殼剉 阿膠炒 蓬莪不煨

茯苓 茯苓 大木通 生甘草各一分

實大黃 桃仁湯去皮

右劉散每服三分井水一椀生薑三片蜜三匙煎服以
利為度瘀血作痛通

白圓 治久年腸痔下血服藥不效者

寒水石 不以多少

煨紅研細水飛再入銀窩中煨紅用糯米糊丸梧桐
子大每服五六十圓陳米飲下只一服

黃連阿膠圓 解熱調血枳殼散送下方九細切及
婦人護胎類

槐花圓 治腸風痔瘡内生虫裏急下膿血止痒痛消腫聚

祛濕毒服之除根方見前

寶壽膏 專治酒痢

白乾葛

枳殼炒

半夏

茯苓

生乾地黄

杏仁 各半兩 黃芩

甘草

各一分

右對散每服三分黑豆百粒姜五片白梅一个煎服

寶壽膏 五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥

寶壽膏 方見后

黃連

枳殼 各等分

右為末麩糊丸如梧子大每服五十九粒空心米飲下

通治 治諸痔捷效

右用白礬信石各少許於新瓦上煨過為末再入朱砂

末少許以新汲井水調成膏用舊傘紙上藥隨瘡大小

貼之先用舊金園丹末以鵝翎刷於瘡四畔圍護恐傷

如肉凡一二藥貴管人肉理嬌脆薄少用之愚俗人肉理

麓厚稍多少許用之六抵上藥後多疾不可太過為妙

仍用大青根晚蚕沙煎水洗後再上藥兼服槐角圓皂

角丸臟腑結熱秘甚八正散加灯心枳殼薄荷葉煎再

用大黃茶莽草荆芥穗防風煎水洗效八正散方見續

又方 用川白芷煮白芍作線快手緊繫坐痔上微疼不妨其

痔自然乾癢而落七日後安

五灰膏 治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近日形似

雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之

蒼麥及七升荆柴

薊菜

山白竹

老杉枝

右以四件柴竹截作一尺許長以斧劈破成片各取一
束曬乾於火上燒過置壚內為炭防為風所化俟燒尽
却以水於鍋內煮出炭汁又用酒漏以布阜實其竅而
置蒼麥於酒漏內以所煮炭汁淋之然後取汁於窩
內慢火熬汁約取一小椀候公入石灰國丹調和成膏
以瓦瓶貯之上用石灰傳面不令走氣臨用却去石灰
以冷水調開令病者以水洗淨痔瘡仰卧搭起一足先
以濕紙於瘡四圍貼護却用收效必矣

專方

蠟皮方三指大

雄黃

熟艾如雞子大

為末用瓶一箇以灰實一半如燒香法安高桶內坐其上
莫令煙透煙從口中香出方好三度熏衣差勿犯風冷
藥方用槐花荆芥枳殼艾葉以水煎入白礬重洗

又方

黃連

黃芩

京芥

蛇床子各一

側柏葉四兩 槐條

鏡面草

蚶蜆草各一

右用新汲水煮熟傾盆內熏候通手却洗

重方

蓮子十四箇

草芽茶十四

乳香隨上二藥多少入

右三味同搗以帛裹煨透先以黃連湯洗患處然後以

藥生貼之

木敷膏

木敷膏子 百藥煎

右水分爲籠末每服一掬布裹煎湯以桶盛之蓋上完
一竅先以氣熏蒸後通手洗之

敷法 熊膽研細 傳痔極效

熊膽研細 腦子研細

右各少許用井花水調以鷄羽拂痔上

枯礬 治五痔痛痒

枯礬半斤 腦子一字

右並研爲末先用魚腥草濃煎汁放溫洗次用少許傳

痔上效

川山田

右用寒水石外消爲末以津潤手治點藥敷膏上立效

葱青

右用葱青刮去涎對酒入蜜調勻先以小敷之其湯熏
洗然後傳藥其冷也

耳環草

右耳環草一名地羅兒花三枚紙細切以酒煎之
又方 川山田自尾投盡處數除三鱗不用取第四第五第
六鱗橫三行燒存性爲夫用麝香少許煎茶一匙同調

空心服以澄下濃者傳痔其冷如冰永不痛無不效

治痔瘡腫脹作熱

右用蝸牛螺一箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器
內盛頓逼半日自化成水以少許點瘡上立愈

灸法 立量脊骨與臍處椎上灸七壯或至深更灸椎
骨兩傍各一寸灸如上數無不立效

又法治瘰癧疾大如胡瓜貫於腸頭熱如酒灰火發則僵
仆以柳枝濃煎湯洗後以艾炷灸其上三五壯若覺一
道熱氣入腸中大瀉鮮紅血穢惡一時全其痛楚瀉後
其疾如失

灸冷五痔便血灸脊上百壯

五痔便血屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

世醫得效方卷第七終

