


世醫得效方

十七

|      |         |
|------|---------|
| 内閣文庫 |         |
| 番號   | 漢 15558 |
| 冊數   | 22 (17) |
| 函號   | 41 2    |



大全婦人良方卷一

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

產科兼婦人雜病科

齊陰論

夫濟世之道莫先於醫論醫之難塔陰猶急何則婦人之  
病比之男子十倍難療或云七種八瘕九痛十二帶下共  
三十六病雖有名數莫詳證狀推原其理以作血病多因  
經脈失於將理產厚不善調護內作七情

勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳不序隨經而  
凝滯為癥為瘕流注痞塊惡痛害傷痼以致心志不一而止  
犯時微若秋毫感病重於山嶽是也故女子十四而天癸  
至天謂天真之氣降矣謂天癸水名故云天癸而衝任脈  
主之衝任者血之海也月水者經絡之餘也蓋婦人以血  
為本心主血肝行血榮衛四腑如環無端灌注百脉餘者  
為月候以時而行若水溢自流不自知覺故癥病不依而  
氣鬱充盛而有子矣其有求多不斷或過期不來或未期  
而先來參差不一而病生當其來時則一上日之前腰腹  
滿痛或頭疼作熱首節響急其來過此則發為虛熱  
自汗如少五心內熱遂為虛勞血少水涸燥氣乘肺則為

咳嗽宿寒留滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱  
則為癥瘕或風寒濕滯經血化為水流溢四肢謂之血分  
脾不能制血與水并浮脹肌內謂之虛腫或衝任氣虛內  
慾過度風邪冷熱之氣入於胞門穢濁與血兼下塗則多  
白熱則多赤冷熱不調赤白相半或為赤白帶下若衝任  
勞損經動傷脾原醫身計不能約制其血後然暴下故謂  
崩中漏下所下五色各應五臟五臟俱虛五色併下以致  
眩暈煩嘔嘔惡怔忡迷亂多忘發狂妄語小便不禁是皆  
血之為病也復有生於嬌貴之家感懣在念而氣逆于中  
故氣順一息不行血有一息不運則胃腹脹痛眩暈嘔噦  
倦之不自勝持飲食不為肌膚致成重患治瘵之際調氣

為上調經次之斯可為定法受孕之後切宜避忌胎殺所  
遊如經云刀指者形必傷泥犯者氣必塞打擊者色青黯  
繫縛者相拘攣其至母殞胎絕道海掌斷不可忽半產一證  
非如正產正於如果中栗熟其殼自開兩無所損若半產  
則比之糠所新栗碎其膚殼損其皮膜然後取得其實半  
產正類此以其胎軀傷損胎繫斷去而後胎墜下皆因月  
未滿是誤服藥餌忽寒邪熱毒所傷忽舉重打傷跌撲或  
犯禁忌或衝任脈虛漏下所致生死形候亦如正產察認  
大抵半產須加十倍調治或外證喘促痰壅恍惚昏迷不  
語惡露斷絕煩渴或交產候無復生至其有惡露通昏迷  
乍醒不喘促猶可治也復有市井之家村落之婦恣情妄

作偷生不止或多日女厭於養育往往以旦藥毒之驚見  
敗血不下衝心悶亂喘痰虛汗交作死者用記聞者可不  
為戒治之者須以解毒行血藥急救則十全二三矣違夫  
正產有娘六七月切忌恣情交合八月亦忌飲酒叫怒洗  
頭臨產必難產婦古以陣面健兒為奇可謂老矣臨產之  
初先脫尋常所穿衣以籠龜頭及龜口則易產不可喧鬧  
宜謹選一熟善坐婆及得力家人扶持無使揮霍致令產  
婦憂恐惟當食軟飯糜粥之類若腹中痛且令扶行或痛  
或止名曰弄痛不可便行試水手探聽產母坐卧切須熟  
忍或服催生符藥却不可曲腰眠睡如連腰引痛眼中如  
見火色此是兒轉蓋腎則繫於腰胞繫於腎貼於脊更忌

脈轉甚強如急珠者即其驗矣又須令人扶策徐徐而行  
若行步艱難即凭物立須與扶策各行直至腰腹相引陣  
痛頻頻又服催生藥勉強扶行痛陣轉甚難於行立認是  
產時將至然後坐草切勿太早恐子在腹中難於轉側及  
胞漿先破子道乾澀皆至難產務要產婦惜力若心中熱  
悶以蜜一匙新汲水調下若執熱未解以生雞子一箇打  
破吞服直待兒迫產門頭面端正然後令人抱腰其抱腰  
之人不得傾斜則兒順其理自然易產又有臥產者須待  
臥定背平著席躄不偃曲則兒不失其道必無難產之理  
時當盛暑宜居深幽淨室日色遠地開啓牖戶多貯清水  
以防血暈血悶血溢妄行血虛發熱之證如冬未春初天

色寒宜密閉產室室寒鏗隙內外生火常令暖氣如春  
仍下襲衣服不可去綿方免胎寒血結母致難產矣及至  
產訖先令飲童子小便一盞無使就睡且令閉目而坐頃  
之方可扶置於床宜仰臥立膝勿令伸足睡熟亦宜頻喚  
醒產室無俾風著其肌致生他疾况產下切不可得男  
為喜恐為紅汗之證得女為憂恐致敗血傷心之患惟當  
頻發艾醋等湯藥常燃醋煙以防紫悶遂進少白粥母  
令過飽其有破水之後經日而不產者又當隨證細辨身  
重熱熱作寒面黑舌青及舌上冷母死子活面赤舌青母  
活子死唇口俱青吐沫子母俱斃者皇之開救治不可不  
審且當預與病家言之若胎衣不下者停待稍久非惟產

母疲卷又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛  
必至危篤宜急斷臍帶以少物繫臍處臍墜之時尤宜用心  
除緊然後截斷不爾則胞上掩心而死須使其子血脉不  
潮入胞中則胞衣自為痿縮而下縱墜延數日亦不害人  
不治療多竟之惟欲產母心懷安素終自下矣未可輕信  
坐要安用手法因此而殞止產後中風口眼喎斜角弓反  
張六脉緊大自汗過多虛極生風唇青肉冷剛柔二症項  
背強硬手足拳急咬齒嚼舌血虛眩暈煩發悶絕氣冷口  
鼻鼻起出血不止虛熱變生名胃絕肺敗喉中氣急喘促  
不息煩渴殊甚惡露斷絕名孤陽絕陰五七日內強力下  
床或憂怒太過一月之內或傷於房事或亂行針灸以故

眼瞳口喎肌肉瞶搖腰脊強直語言不出類皆難治猶宜  
敬謹外此傷寒乃諸雜病與男子等當以理血藥為助臨  
治之際宜以意消息而加減之

護胎

婦人經脈不行已經三月欲驗有胎

川芎 兩半生用不見火

右為末空心濃煎艾湯調下方寸已覺腹內微動則胎

治外感風寒薄身壯熱眼重頭旋或洗項背或當  
風取涼致令頭昏痛增寒甚至心胃煩悶妊娠不可輕  
易投劑止宜用此以散表邪及治痧飲嗜煩於特嘔逆不  
食腹滿此藥至和而且平嘔加白木腹脹枳實虛煩竹葉

煩燥六渴麥門冬知母水停心下微吐逆衣衣頭痛川芎  
腹疼如白芍藥方見大古

治姓婦增壯熱頭痛身疼加川芎白芷生薑

葱白煎得微汗解方見大古

治姓婦傷暑頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛背項

拘急方見大古

柴胡四兩 甘草二兩 石膏八兩

石劉散每服三錢水一盞生姜五片煎不拘時候溫服

若氣虛體冷加人參二兩

九婦人晝眠不起倦於梳飾乾

聞飲氣但喜鹹酸止經候明矣氣血弱者

食怕 運脾

與安胎溫養令母臟氣平和陰陽全備免有損墮之患盛  
者安胎毋無疾耳溢胎保養之前恐非所宜此方兼治胎  
動不安腹痛漏下或胎奔刺心短氣大效漏胎下血不  
可用借燥熱藥

條參土產 嫩黃耆土產 楊芍藥 七川芎

熟地黃酒洗 川續斷土產 側柏葉切 阿膠熬炒

粉草 大當歸各五分

右劉散每服四錢水一盞半生姜三片金銀器各一件

瀉下不止加熟艾一握又加尿動口噤唇青下利不止

亦用熟艾一兩酒二盞煮至三盞去滓灌之即安

治姓娠或因失室驚觸勞力過度傷動胎胎或

食毒物致令子宮虛滑經血淋漓若不急治敗血凌心子  
母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生

當歸

川續斷 酒浸 川芎

香附子

茯神 去木

阿膠 對鮮物世

白朮 各一兩

人參

甘草 各

陳艾葉 一兩

烏梅 去核

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不火時溫服

治漏胎下血胎衝手足逆冷欲死

右用生艾汁二盞阿膠白蜜各二兩煎一盞半稍熱服  
之無生艾濃煎熟艾一方加竹茹一大塊同煎

治胎動出血產門痛黃連為末酒調壹錢日三服

急效方 治漏胎下血不止胎乾子母俱死

生薑黃汁一升好酒五盞煎五沸分三服或為末酒服

治胎孕不安

黃芩

白朮

縮砂

當歸 各等分

右劉散每服錢六二盞半煎溫服

治妊娠從高墜下或為重物所壓觸動胎氣頭

痛下血服此後覺胎動極熱胎已安矣

經砂 不拘多少

石於炭汁內炒令熟透却用皮取仁研為末每服二錢  
熱酒調服不飲煎之湯或米飲不拘時飲調服

治受胎一月或兩月嘔吐擇食綠中胎有



痰飲經水止後氣帶所作名曰惡阻

陳皮

白茯苓

兩各一

白朮

粉草二分

右劉散每服四錢生薑三片為每一首煎食前服

白朮散

紫蘇

厚朴

白茯苓 豬土 半夏

甘草二分

二劉散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚煎溫服客

熱煩渴口生瘡者加知母前胡腹冷下利加桂枝

中虛熱大小便秘加黃芩頭眩加細辛川芎

白朮散治妊娠飲食過難

木香見火二稜也

人參

白茯苓各五分

右為末麩糊圓棗豆大每服三十圓熟水下不拘時候

白朮散治妊娠氣不和飲食不美

白朮

紫蘇 各壹兩

白芷微炒

人參 各壹兩

訶子皮

青皮去仁

川芎各五分

甘草一分

右劉散每服三錢水壹盞生薑三片煎不拘時候

白朮散治惡阻奇效每服三十圓空心薑湯服大見大方

阻漏胎惡露時下或子臟挾疾久不成胎或受胎不能固

養痿癭不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮

麻仁去殼

當歸兩

乾薑

肉桂去皮

秦椒去山椒口者妙出汗

石斛去根

石膏研如粉

黃芩 糯米

貝母

甘草炙赤

大日黃卷各壹分

右為末煉蜜圓彈子大每一圓溫酒漿湯化下空心嘔下亦可方內用北黃芩麻仁性寒之藥人疑不服殊不知娠中有風風中有熱風熱既靜其胎必固黃芩能去子熱麻仁能去子風亦可服石參苓白朮散

**治妊娠** 方見大方科脾胃類

**治妊娠** 二三月胎動不安或會受此苦每遇有懷

至期預隨可預服此以養胎氣不爾胎隨其危甚於正產

杜仲去皮切

川續酒浸洗

右為末棗肉煮爛杵和為圓梧子大每服七十圓空心

米飲送下日二服

**歸經** 飲酒或食生魚羊雞麪毒物

致令百節酸疼大小腑秘澁面赤口苦心煩腹脹

芎藭

苧根

楊芍藥

麥門冬去心

當歸去蘆

白朮各一兩 糯米半合

甘草炙赤

右剉散每服二錢水一盞煎溫服不拘時服

**內補** 安胎扶虛助陰滋血

熟地黃酒拌

大當歸酒洗

右為末煉蜜圓梧子大每服二十五圓溫酒下與枳殼

散兼服若單服枳殼散恐有胎裏腹痛之疾二藥皆不

群隊為妙仍用平胃散蘇益湯調助脾進食

**竹茹湯** 治妊娠嘔頭痛寒熱往來五心煩悶四肢不和

人參 陳皮 去白 麥門冬 去心 各

甘草 五分半 厚朴 去心 茯苓 各

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不以時溫服

**竹茹湯** 治妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精

六月受少陰相火氣以養氣若母心驚膽寒多好煩悶名

子煩

防風 去心 黃芩 各二兩 麥門冬 去心 白茯苓 各

右劉散每服肆大錢水壹盞半竹葉十數皮煎溫服一

方去黃芩加入人參半兩

**知母圓** 治產難及日月未足而痛如欲產者

知母

右為末凍蜜圓如雞頭子每服一圓溫酒嚼下日三服

**滑胎易產** 治妊娠漏胎去血及臨產驚動大早

產時未至穢露先下致使胞胎乾燥臨產艱難並宜服之

榆白皮 葵根 瞿麥 各壹兩 大麻仁 去殼

木通 半兩 川牛膝 叁分去苗酒浸切焙

右劉散每服三錢水一盞半煎溫服

**知母圓** 治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓 黃芩 黃耆 各叁兩 知母

麥門冬 去心 甘草 各貳兩

右劉散每服三錢水一盞半桑白皮米寸煎成入竹瀝  
一合服不拘時候胎臟受熱最宜服之一方去黃耆知  
母加地骨皮犀角屑煨葛各三分

**安胎寬氣進食瘦胎** 為產設或居處失宜偶然頓  
仆胎痛漏胎下血兼服首歸湯枳殼散

大腹皮 紫蘇 枳殼去穢 桔梗去蘆  
粉草 縮砂 香附子 各等分

右劉散每服三錢水一盞半煎食前服

**冬葵子** 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫

冬葵子 三分 赤茯苓 三錢

右劉散每服三錢米飲調服不拘時候利則住服如不

通恐是轉胞加髮灰少許神效

**大腹皮** 治妊娠大小便赤澀浮腫

枳殼去穢 大腹皮 甘草 炙 赤茯苓 各  
右為末每服煎錢濃煎葱白湯調下不拘時候

**鯉魚湯** 治同上

當歸去蘆 白芍藥 各三錢 白茯苓 三錢 白朮 五錢

右劉散每服錢錢用鯉魚青尾不拘大小破洗鱗腸白  
水煮熟去魚每用魚汁壹盞半生薑米片搗皮少許煎  
至一盞空心服如胎水未盡再服

**治婦人病** 食飲如故煩熱不得卧而反倚息以胞  
系了矣不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以此藥

中有茯苓故也方塊大妨

**赤小豆湯**治妊娠手脚腫滿急

赤小豆 商陸乾各壹分

右劉散每一兩用水一椀煎七分盡取清汁服

**取身苦湯**治妊娠腰脚腫痛

茯苓 白朮各肆兩 乾薑 甘草

杏一湯洗去皮尖各叁兩

右劉散每服肆錢水壹盞半煎食前服

**安胎和氣散**治胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷疼小便數大便滑

訶子麩裹煨 白朮各一兩 陳皮 高良薑各

木香不見火 白芍藥 陳米炒 甘草各兩

右劉散每服肆錢水壹盞半生薑伍片煎不以時溫服

忌生冷

**紫蘇散**治胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸又

治胎產驚恐氣結連日不下

紫蘇連葉 川當歸叁分 人參 川芎

白芍藥 陳皮各半兩 甘草壹分 大腹皮半兩

右劉散每服叁分水壹盞半生薑四片葱七寸煎空服

**安胎散**治小便淋瀝名曰子淋或作轉胎治不愈者

麥門冬 通草 滑石各壹分 當歸去蘆

燈心 甘草各兩 人參 細辛洗各壹分

古為末每服叁錢煎麥門冬湯調不拘時服一方止用  
攪椰赤芍藥各等分水煎空心服屢效

**桑螵蛸散** 治妊娠小便不禁

桑螵蛸拾式箇

右為末每服貳錢空心食前米飲調下

**二白散** 治妊娠遺尿不知出

白微 白芍藥各等分

右為末每服貳錢食前酒調服

**當歸心散** 治妊娠腹中汚痛下痢心下急滿

白芍藥 當歸去麩酒洗 澤瀉  
川芎各一兩 白朮一兩半

右為末每服叁錢溫酒或米飲調空心食前服忌生冷

**家寶黃車圓** 治妊娠下痢赤白腸鳴後重穀道疼痛

乾薑炮 黃連去積 縮砂仁炒 苧麻

阿膠炒 白朮各壹兩 乳香別研 枳殼去穢面

右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵勻圓如梧子

大每服四十圓白痢乾薑湯下赤痢甘草湯赤白痢乾

薑甘草湯下不拘時服

**雞黃散** 治懷身下痢赤白絞刺疼痛

雞子壹箇烏者尤妙就頭作

黃丹壹錢入前雞子殼內打令黃勻以

右為末每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者

是女奇效

**五淋散** 治妊婦兩脚浮腫名曰脆脚因脾衰不能制

水血化為水所致每服三錢薑棗煎為末蘇湯調亦可

方見大方  
料脾胃類

**百合散** 治妊娠風癰相交咳嗽痰多心胸滿悶

百合 蒸 紫苑茸洗 貝母 去心 白芍藥

前胡 去芦 赤茯苓 各壹兩 桔梗 去芦 甘草 半兩

右劉散每服肆錢水壹盞半生薑五片煎不以時溫服

**羚羊角散** 治妊娠中風頭項強直筋脈攣急言語蹇澁痰

涎不消或發搐不省人事名曰子癇宜服

羚羊角 鎊 川獨活 去芦 酸棗仁 炒 五加皮 去木

薏苡仁 炒 防風 去芦 當歸 酒浸 川芎

茯神 去木 杏仁 去皮尖 木香 不見火 甘草 炙各二錢半

右劉散每服四錢水壹盞半生薑五片煎不拘時溫服

**人參養胃湯** 治妊娠作癯寒多不食 方見大方料傷寒陰證類未效畧加常山

**清脾湯** 治妊娠作癯熱多者

青皮 厚朴 薑汁炒 白朮 草果仁

柴胡 去芦 茯苓 半夏 湯洗 黃芩

甘草 人參 各等分 常山 一半

右劉散每服四錢生薑五片正地骨皮少許煎不拘時

溫服或加荻門冬去心貳拾粒 木效服勝金圓方見大方料痰癯類

**消風散** 治妊娠頭旋目暈視物不見腿項腫核若加涎癰

危在須臾急宜服之

石膏

甘菊花去枝

防風去芦

荆芥穗

川羌活去芦

羚羊角镑

川芎

大豆黃卷炒

當歸酒洗

白芷各壹兩甘草半兩

右劉散每服四錢水壹盞半入好茶半錢煎食後通口服有一姓婦患此服之病減七八獲安分號其眼帶吊起八物不辨後服四物湯加荆芥防風更服天門冬飲子但以此二藥相間服目漸稍明大忌酒麪煎炙燒燻鷄羊鵝鴨豆腐辛辣一切毒食并身勞及補滋藥如不然眼不復明矣蓋此證為懷身多君火悶衣著稠襪厚蓋伏熱在裏或服補藥因食熱物太過致令胎熱肝臟

壅極風衝入腦所致

天門冬去心

知母

羌蔚子各壹兩

防風去芦

五味子

茯苓

川羌活去芦

人參各壹兩

右劉散每服肆錢生姜叁片煎食後溫服

治傷寒熱病護胎方

乾浮萍

朴消別研

大黃微炒

蛤粉炒

藍根各壹分

右為末水調叁錢貼臍上安胎解煩極妙一法伏龍肝末水調塗臍下乾則換或用井中泥塗心下乾即換

聖胎散

治妊娠傷寒天熱悶亂燥渴傷胎臍



蚌粉半兩

嫩荳荷葉無乾壹兩

右為末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服研家  
園生葛汁服亦安

治妊娠咳嗽方

麥門冬去心紫苑去土

各壹分桔梗洗淨一分

杏仁炒

甘草炙

右判散每服三錢水三盞竹茹一魏鷄子大煎壹二盞

入蜜半匙去滓頓服

又方治如前

貝母去心劉麩炒令黃

右為末研砂糖拌和令勻圓如鷄頭大含化一圓神效

古參圓治妊娠小便難飲食如故

當歸去尾

貝母炒

苦參各參兩滑石半兩

右為末煉蜜圓如小豆大米飲下二十圓不拘時候

味圓治法見前方見大方  
料脚氣類

治妊娠大便秘方

防風式兩

甘草一兩

枳殼去穢炒

右為末每服壹錢沸湯點食前日二三服

治妊娠洞泄寒中方

厚朴

乾薑式味炒令  
同炒至乾

右為末糊圓梧桐子大米飲下二十圓食前服

八正散治妊娠心氣壅胎氣八箇月散墜手足浮腫急

痛不安難產

瞿麥

木通剉去皮滑石

大黃剉切

葛蓄一名地

車前子

山桅仁

甘草各等分

右劉散每服參錢水壹盞面壹盞撮同煎熱服

治妊娠失音不能言方

奇病論曰人有重身九月而瘳何也岐伯對曰胞之絡  
胎絕也何以言之胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎絡舌  
本不能言治之奈何曰無治也當十月復

產前軟勝方

甘草

生薑

烏梅各等分

右劉水壹大盞煎服便令腎骨軟產宮受氣痛不安行

大聖治胎氣悶或為喘呼心忪悸亂睡裏多驚

兩脇膨脹腹滿連臍急痛坐臥不安氣急逼迫胎驚者

白茯苓去皮

川芎各壹兩

麥門冬去心

黃耆去蘆

當歸去蘆

大香

條參

甘草各半兩

右劉散每服肆錢水壹盞羊生薑伍片煎溫服不拘時

候常服至分娩亦無恙安養胎氣甚佳

救生散安胎益氣易產令子緊小令母無病

人參

訶子去核

麥蘖炒

白朮炒

神麩炒

橘紅各等分

右劉散每服參錢水壹盞半煎空心服

瘦胎易產抑陽降氣兼治胎中一切惡疾

枳殼小厚突破者炒 粉草壹兩

右為末每服貳錢沸湯調空心日三服至七月方可服  
忌登高廁大便秘澁加防風體弱加大當歸去尾木香  
各等分胎肥壅溢動止艱難臨產難生加乳香髮灰效  
枳殼能逐水消脹滿逆氣若臨月多服則當產之時無  
脹滿逆氣產道順而易生誠有補於世也又治腸中諸  
疾下氣寬膈加炒去毛香附子壹兩為末薑湯調下冷  
氣攻刺脅肋疼痛葱白湯脾寒血氣成塊作痛熱酒調  
大小便不通白牽牛為末加入熱湯調服

**治在腹中胎方** 多年空屋下鼠穴中土壹塊令產母  
噙之即止一方川黃連濃煎汁母呷之

如抱一甕

茱萸 川烏去皮脂 秦光 柴胡

白僵蚕炒青 川巴戟生用 巴豆去殼 芫花醋煮各

右為末煉蜜圓梧桐子大每服柒粒蜜酒吞下惡物即  
時取下愈

轉文為男法

論曰陰施陽化所以有娠遇一陰所會多生女子但懷娠  
三月名曰始胎血脈不流象形而變是時男女未定故令  
於未滿三月間服藥方術轉令生男也其法以芥置妊婦  
床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此  
置窠下一窠盡出雄雞此雖未試亦不可不知凡受胎二

月逐物变化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明無疾蓋須十月之內常見好境界無近邪僻真良教也

月遊胎殺所直正月床二戶三門四竈五母身六會龜七確八則九門十尸十一爐十二床

日遊胎殺所直甲己日門乙庚確磨丙辛并竈丁壬厨解戊癸米倉子丑中堂寅卯辰酉竈巳午門未申竈下戌亥房

保產

收胎之法凡橫逆等證則當以手法爲活收生之人擇揀老成良善臨期須心平氣和施以妙手亦宜直言叮嚀詳盡

其意乃不可用燥性之疾恣其寵愚因而傷命如橫產謂兒先露手或背者治法當令產母安於仰臥收生之人徐徐先推兒下截令首上漸通手以中指摩其肩推上而正之漸引手攀其身令頭正候兒身正門路順却投催生藥安詳上草自然易產若逆產謂兒先露足者治法亦令產母仰臥分毫不得用力亦不得驚恐收生之人徐徐推其足就一邊直上候兒自順若良父不順又漸漸推兒頭就一邊令其順下待兒身轉順門路正當却用催生之藥即產又如偏產謂兒頭偏柱一傍雖逼近產門初非震正頂止露額角者治法亦令產母仰臥收生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向產門又有兒頭后骨

偏柱穀道者當以綿衣衣席令熱裹手足於穀道外傍徐  
徐推之漸漸近上然後上草至如礙產謂兒頭雖正產門  
而不能生下者或因兒轉胎帶攀掛其有致不能生者治  
法令產母仰臥收生之入輕手推兒近上徐徐通手引中  
指按兒兩肩理胎帶兒正即產又有坐產謂兒將欲生  
產母疲倦不能行立久坐椅着抵兒生路不能下生者治  
法當於高處懸吊羊巾或絹帛一條令產母手攀輕輕屈  
足良久兒即順生更有盤腸產者臨分娩產腸先出兒即  
隨產俗用冷水巽產母而其腸自收此法虛弱之人切不可  
可用恐驚怯成病或即脫絕權法以草麻子肆拾玖粒研  
爛塗腦頂自然收上如收上即以水洗去頂上草麻又有

以其腸為風吹乾不能收者以麝力水少許火上溫過  
以潤其腸煎好磁石湯一盃令產母服其腸自收矣

**補中湯**

養新血去瘀血補虛扶危治月未滿半產

乾薑

呵膠

芍藥

五味子

白朮

黃耆

當歸

赤芍藥

人參

木香

杜仲

甘草

右劉散每服錢水壹盞半前通口服不拘時候

治妊婦自四五月至七月因而築心氣疾欲

絕用此探之若不損則痛止子母俱安若胎已損即便後

當歸

芍藥

右劉散每服錢酒壹盞前令飲乾却入水壹盞再煎

三二沸温服如口噤者時時灌之如人行五七里再進  
一服不過三服便生也

**胎前** 最治難產因緣自有難易其如橫逆皆因坐草  
太早努力過多兒轉未速或已破水其血必乾若先露手  
為之橫或先露足為之逆養生方不妄言之間而命所係  
不可不知此藥之功也人多不服以為極賤之藥大緊產  
難或一日兩日未免水血先下如舟坐巖殊不知香白芷  
百草霜再固其血服之如魚得水决自轉生兼治月小不  
調崩中等疾

香白芷

百草霜各五分

右為末每服貳錢童子小便米醋各半呷許沸湯送下

六七分點服見功甚速再服即分娩矣或用蜀葵子四  
十九粒白滑石末參錢順流水煎湯調空心二服即入  
行五里即下

**胎前** 催生秘傳

蟬退 壹兩海  
有性

大蛇蛻 火燒存性  
性溫

滑石半兩  
葵子 壹兩  
微炒

右為末每服壹錢順流水微温煖調下不可使熱湯

**產後** 催生

雄黃 不夾  
石者

朱砂 各半

草麻 十個

大蛇蛻 壹尺

右為末漿水飯和圓彈子大臨產時先用椒湯淋洗臍  
下次安藥於臍內用蠟帛數重傳藥上以闊帛繫之須  
臍即生急取下藥一圓可用三遍

治產五七日不下垂死者及矮石女子交骨不閉者

右用川芎當歸各一兩自死乾龜殼一箇酥炙生男女者婦人頭髮一握燒存性共為散海服參錢水一盞半煎服屢効約人行五里生胎死胎俱下无自死龜殼用鑽龜廢殼亦可

治難產逐敗血即自生若橫逆則轉活于死腹中則胎軟膨寬即產祖宗秘傳千金不授用者敬之

王不留行 酸漿似胎 羌蔚子 白蔘去刺 五靈脂行血宜生用

右各等分為散每服參錢取利方水亮半 白花 大妙

應急之權生隨其便而用之

右用清油同蜜等分少許湯調頓服 蜀葵子炒為末 順流水溫煖調亦下死胎 好京墨新汲水濃磨服之 墨水暴見出立效 取筆頭二箇燒以藕節研自然汁 溫酒調下效

治姙娠欲產痛陣尚踈難產經三兩日不生胎死腹中或產母氣乏萎頓產道乾澀經痛破水後便閉

蒼朮或兩米附片洗加片黃色

小厚枳殼去穢切

白桔梗

薄陳皮去白 楊芍藥

川白芷

大川芎各壹兩

太當歸去尾

交趾桂去麩皮

半夏湯洗

粉草

麻黃去節

軍薑去皮

厚朴去麩皮 南木香不見 杏仁別破 白茯苓各五  
右為末每服或錢順流水溫煖調下若竟熱悶白蜜湯  
下或劉散入真米醋一合煎方內用楊芳藥肉桂能開  
通子宮其餘藥味皆助氣之盛閉竅自通麻黃內通陽  
氣陽氣盛則血行即產矣外却寒邪去積聚皆得其宜  
寒月用之其為的當臨暑之時恐難輕服但以五苓散  
用葵子灯心煎湯調下卻暑清魂滑胎易產胞漿先破  
則胎乾難產用白蜜清油侵以熱酒吞得所頻服若氣  
既潤即分娩矣

**通乳** 治產婦生理不順產育艱難並宜服之

二月兒胎前產後 通乳香研細

母子香末產後

麝香研細

右拌停以免腦髓圓如雞頭樣大陰乾用油紙密封貼  
每服一圓溫水下即產

**烏金** 治難產熱病胎死腹中或因頓仆或從高墜下或  
房室驚搖或臨產驚動太早觸犯禁忌產時未到經血先  
下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤  
舌青是其候面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又  
有難懷或一死一活其候猶難知須臨期觀變

熟地黃洗切焙

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芳藥

軍薑去皮

粉草各壹兩

小黑豆

百草霜無名





只用朴消末每服二錢童便好酒調下效驗如神  
備急固治妊婦熱而大便秘結實死胎皆不知人溫水下  
七圓即活方見大才

**胎動不安**治妊婦欲產時不肯伸舒行動多尋曲腰眠臥忍  
痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生須臾不救母  
子俱

石用烏蛇蛻二條蟬蛻二七箇血條一握並燒為灰分  
二服溫酒調併進二服仰臥霎時或用小絹針於兒臍  
心刺三七刺用鹽少許擦刺處即時順生母子俱活

**胎前** 胎前腰疼方可服之

延胡索

心藥

白礬

白芷

薑黃

當歸

桂心大等方

右為末臨產陣痛時燒鐵刀鐵刀令通赤淬酒和  
三錢服一二盃立產

**產後**

右用乳香研細以猪心血為圓梧桐子大朱砂為衣  
乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服一粒若  
大段難產以蓮葉心蒂七箇水二盞煎至一盞放溫化  
下一粒良久未下可再服之效驗如神無有不下者如  
胞漿先下惡水來多胎乾不得卧時須先与四物湯及  
通真固補養其血氣功見次更濃煎葱湯故冷令坐婆  
洗產戶須是款曲洗令氣上下通暢仍更用酥調滑石

未產產戶裏次服前催生藥則萬全矣如胎死不下者  
用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁一盞放溫化下  
藥一粒須臾下矣萬一未下亦可再服如胎下胞衣不  
下者服此亦便下若胎橫逆不順即先服神應丹散再  
服此藥復以催之合煎時要五月五日午時極妙或七  
月七日三月三日及初上辰日亦可

**產婦坐草時取路傍舊草馬一隻用鼻絡小耳繩燒灰  
溫酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者有  
驚自然理也似非切要之藥衛生秘驗**  
**如急欲臨產腰疼方可服之**

參 爲末 乳香各三錢 辰砂三錢

右同研臨產時急用雞子清一箇調藥末再用生薑白  
然汁調開冷服如橫生倒生即時端順子母平安

**產後胎前活子死胎末下胞破不生此方累效救人幾劫**

鬼曰不以多少黃色者去毛破爲末及細如粉不用羅  
以手指擦之每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通  
口服立生如神

**廢難產日久氣力乏不能生兼惡露出盡胞乾不產**

右用赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙了明阿膠  
一兩兩煎少時服五合未效再服不過三四服即產  
此古方用之極驗

方救產難經日不生

右用雲母粉半兩溫酒調服入口當產不順者即產

治橫逆產理不順手足先出或子死腹中

右以伏龍肝細研每服一錢酒調服兒頭戴出妙更用

蘇產母格中亦效或用兔絲子末車前子末酒調服一

方取其父名書其足上即順生

治死胎不下方其證指甲青舌青脹閉甚者口中極臭

以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞同煎至一盞却

投利消半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服盡其胎即

化血水而下方見大

治產難胞衣不出方兒死腹中欲絕半夏白飲之一

未酒服一錢若產難只一服橫生二服倒生三服兒死

四服或加代赭瞿麥各一兩為佳

治難產日月未至而痛如欲產者

右以知母二兩為末蜜圓雞頭大溫酒化一圓服

治難產胎衣不下及生產數日併死胎不下者效

右用草麻子一兩去殼雄黃二錢研細成膏塗母方脚

心縫下即速洗去不洗則腸出用此膏子塗頂上腸自

入如聖之妙

治產訖血流入胎衣中為血所脹不得下治之稍

緩脹滿腹中上衝心胃疼痛喘急服此以逐去衣中之血

血散脹消胎衣自下

附子半兩牡丹皮壹兩

乾漆壹兩分指奔

右為末醱醋壹升大黃末一兩同熬成膏和棗圓如梧子大温酒不拘時下五七回

**治產兒已出胞衣不下** 膈腹堅脹急痛甚及子死腹中不得出者

牛膝酒浸

瞿麥各壹兩滑石貳兩

赤小豆貳合

當歸酒浸

木通各壹兩

葵子壹兩貳錢半

右對散每服三錢水二盞煎不拘時服

**治胞衣不下及惡露不行服之神效**方見大方

**灸法** 治橫生逆產諸藥不效灸右腳小指大頭三壯艾炷

如小麥大下火立產

方產戒忌不可便飲酒及多以酒調藥服之酒散五臟四肢致成百病凡一切藥止用水煎為上一兩服後方可

產後

**實神散** 治產後惡露不盡或胎衣不下攻衝心腹胸膈病

滿或膈腹堅脹振痛及神昏血暈眼花口噤產後瘀血諸

疾又名烏金散

熟地黃生肌蒲黃

當歸

乾薑炮

桂心

芍藥

甘草半兩

黑豆半升炒

右為末每服貳錢酒半盞壹便半盞同煎調下或去酒

黃用綿附量虛實用

**黑龍丹** 治產後一切血瘀產難胎衣不下危急惡寒垂死

者作灌藥得下無不全活神驗不可一因驚厥血衝心  
痛頭痛欲死大效

當歸 一靈脂 川芎 良薑

熟地黃 各等分

右細別以沙合盛赤石脂泔洗紙筋鹽泥固濟炭火十  
斤煨令通赤去火候冷取開看成黑粉色取出細研却  
入後藥 百其霜 伍兩 硫黃 乳香 各半錢

花藥石 琥珀 各半錢

右細研與前藥再研和勻米醋煮麩細為圓如彈子大  
每服一圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小  
便入酒流出研細用其酒調下

治產後敗血衝心膈滿喘命在須臾宜服

真血竭 沒藥

右等分輕手研細頭節再研取盡為度每服或錢用酒  
便合酒半盞煎一沸溫調下續產下一服上末良久再  
服其惡血自循下行更不衝上免生諸疾

治產後血氣衝心不記人事

三靈子 生地黃 各等分

右同研入生薑七片酒水各半盞煎便少許煎五分服

效方 治產後血上心已死

右用真鬱金燒存性為末臘醋一合調灌之立活

治產前胸中宿有痰飲產後多致眩暈

半夏湯

白茯苓 去皮 陳皮 去白

白朮 各壹兩

丁香

縮砂 各五錢 粉草 叁錢

右到散海服肆錢生薑三片烏梅一箇煎食前溫服

治產後血暈悶絕狼狽若口噤挑開灌之必效

牡丹皮

大黃 蒸

芒硝 各壹兩

冬瓜子

桃仁 叁錢 粒去尖

右到散每服伍錢水三盞煎至一盞半入芒硝再煎分

二服欲產時先煎下以備緩急

治產後去血多眩暈頭刻害人多服取効心悶氣

絕紅花末酒調一七服未效併服方見前

又方松煙墨一錢火煨通紅罈滅火氣為末半七溫酒調

京黑亦可

又方舊罈器燒微煙逼面熏之却不可太甚恐虛怯人

又方韭菜切入藏瓶中以熟米醋燒紙密封瓶口勿令泄

氣以瓶嘴向產婦熏立醒

又方用半夏末少許吹入鼻中

加味五寶散治產後敗血不散陰陽相勝作為寒熱入米

醋半合煎或外感寒邪頭痛身疼發熱不退除木香面

香加生薑棗子煎方見后 產後傷寒多因血虛以下諸

方選用至於竹葉石膏湯小柴胡湯雖是傷寒退熱

之劑更宜審訂似難輕用恐致大枉

治產後乳厥不行身壯熱頭目昏痛大便滯

悉能治之涼膈散熱下乳

人參

白茯苓

甘草

苦梗炒

川芎

白芷

當歸

芍藥

右剉散每服二錢水一盞煎溫服如煩熱其大便秘者加大黃二錢半

消陰散治產後血虛發熱感冒熱漸身疼頭重心忪口乾  
方見石

五寶湯治產後下寒下熱通身溫壯心胃煩悶

知母

芍藥

黃芩

甘草

右剉散以水五升煮取半分三服或不用桂用生地黃

消陰湯治因產勞傷血氣蓋血屬陰氣偏陽血氣一傷陰陽不和以致下寒上熱

當歸

人參

芍藥

川芎

乾薑

甘草

右剉散每服肆錢水壹盞生薑三片煎熱服不拘時候

五寶散治產後煩渴潮熱把藥去白毛蜜塗麥門冬二十粒去心煎湯服

黃芩散治產後血虛自汗痰嗽寒熱口淡微吐服藥

劑不得者宜服

消陰散治產後傷風發熱面赤喘而頭痛

淡竹葉

人參

桂枝



吉授

甘草各五兩 葛根各五兩

右列散每服三錢生薑三片紅棗一枚煎溫服使汗出  
頭項痛用附子炮去皮煎別煮且大炒一錢同煎加  
半夏少許

陽白湯治產後傷風十數日不解頭微痛寒時時有熱  
汗下堅乾嘔汗出

桂枝

芍藥各兩

甘草各

黃芩各壹兩

右列散每服二錢水壹盞生薑三片棗子一枚煎不拍  
時微溫服自汗多加炮熟附子一枚渴者去桂加括樓  
兩半下痢去芍藥加乾姜一兩半心下悸去芍藥加  
茯苓二兩虛勞裏熱者正藥主之前時入少膠飴愈佳

若麻痺緊無汗發熱者勿與服

柴胡湯治產後惡露方下忽然斷絕晝日明了暮則

謬語寒熱往來智兒鬼狀此由熱入血室不即治之諸變不測

北柴胡去蘆

半夏湯洗

條參去蘆

黃芩各壹兩

粉草伍分

生乾地黃三兩

右列散每服錢六一盞半生薑三片紅棗一枚煎服  
未效再服四物湯加北柴胡有痰加半夏

補效白散治產後瘀血結滯發為潮熱心胸如火煩燥

口乾諸藥不效

大川烏去皮

南星

半夏

白附子各壹兩

羌活去蘆

黃芩各伍錢

右生用劉散每服三錢生薑五片水一盞半煎服效

**天親經散** 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯旁衛不

調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平所致

大豆炒去皮 茯神壹兩 真琥珀壹分

右為末濃煎烏豆紫蘇湯下喘急煩滿小便不利者亦效

**氣分** 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實炒去穢 白木叁兩

右劉散每服四錢水一盞半煎溫服腹中軟即當散也

**產後散** 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑叁兩 半夏湯洗 白麩

右用姜汁搜麩裹半夏為七餅子炙焦熟為末熱水調

錢小便利為效

**小調經散** 治產後因驚敗血上干怒下見鬼神言語顛

倒昏悶發狂煩燥卧起不安

沒藥別研 煨白石石 桂心 赤芍藥

當歸各二兩 細辛去葉 麝香一分

右為末每服半已加一龍腦少許生薑自然以溫酒少

許調勻服服後三藥亦效

**天聖散** 加朱砂酸棗仁湯下效方見左

**蘇合香圓** 童便調服即醒方見大方科中氣方

**乾地黃** 當歸湯調立效方見大十種心恙方

**天聖散** 治產後血虛肉埋不食散姜丹因遇風和搏之

則變瘥口噤不開背強而直如發痲狀搖頭馬鳴身反拗  
須臾十發氣息即絕宜速開口此藥灌之稍緩即汗出  
如兩手拭不及不可治宜加大烏細辛方風嫩黃耆見方  
**大豆豉湯**治產後百病或中風癱瘓汗強口禁直視煩狂  
獨活一升半 大豆半升 酒三升

右以酒先浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投  
酒中密封候冷夫豆每服一二合許得少汗則愈日數  
十服此湯能去風消血結在如娠者傷胎死腹中服此差  
**獨活寄生湯**治產後血虛生風手足抽掣筋脈攣急時發  
搖擗半身不遂或因勞役太早風邪乘間而入服之立愈  
有痰間服方見大方雜論  
**獨活寄生丸**及風科通治方

**治產後所下過多虛極生風唇青肉冷汗出目**  
**瞑命在須臾却不可正風藥亟投此**

乳香 五靈脂 太陰及精石  
陳皮 桑寄生 阿膠 卷柏各生  
右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再細研  
後入餘藥為末用生地黄汁圓梧子大溫酒或當歸酒  
下二十圓食前服

**治產後虛汗不止**

當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣煨為粉  
人參 粉草各等分小 炙甘草  
右劉散每服蘇錢水壹盞煎溫服不拘時候

破雞子

凡產後忽冒悶汗出不識人者身虛故也

破雞子參救吞之便醒若未醒可與童子小便一升

驗丈夫小便亦得切不得用病人者 又若久不識人

或時復發者此為有風因產血氣暴虛只行脈中故也

若產後去血多者又增此疾與雞子不醒者可急作竹

漚汁一服五合須臾不定再與五合頻與三五服差

七以散

治產後虛弱敗血停積上閉心竅舌強不語

人參

石菖蒲

生乾地黄 各一升

細辛一升

防風

朱砂 各半升

右為末每服壹錢薄苜湯調不以時服

八國散

治產後閉日不語白帶一錢熱水調服

愈風散

療產後中風口禁牙關緊急手足瘳瘳

舉鄉

古拜即荆芥也

右畧焙為末每服二大錢酒調一有神聖之功或用荆

芥加當歸前頭服甚則煎一盆濃湯坐病者其中先熏

右淋沃各荆芥湯角弓反張以豆淋酒下尤快

九加散

治產後中風

生薑 兩

生薑 兩

右交互以汁浸滓一升次日各炒黃漬盡為度乾為末

酒調服平口腹痛酒下三錢產後酒下不可缺女人榮衛

不通細脈不調腹痛如蟻氣多血少結聚為瘕及血風

口禁項強頭痛壯熱運明並皆治之用少酒尤速產后

血衄血悶紫心眼困欲亡者如上湯引服熨甚灌之立

**產後身痛**

產後身痛不能轉側手足不能動搖

當歸

黃耆

牛膝

肉桂

白朮各半兩

獨活二分

空劉散每服伍錢水伍盞煎瀝作二服或入磁白二箇

生薑三片 此證產后百節開張血脈流走遇氣弱則

經絡分肉之間血多留滯累月不散則骨節不利筋脈

急引故腰背不能轉側手足不能動搖身弱頭痛若以

傷寒治之則汗出而筋脈動搖手足厥冷變生他疾服

此可默除之

**如神**

加桃仁木瓜煎治產後餘血不盡流入腰脚疼痛

至甚即加味伍積也乃見仁

**五香連翹湯**

除大黃入竹瀝少許煎治惡露方行忽然斷

絕腰痛兩股如錐刀刺痛片膏或有堅赤腫處必為癰瘍

急服此散

乃見毒腫  
科通冷類

**戒聖湯**

治產後腹脹滿悶嘔吐不定

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮各壹分甘草壹錢

右劉散每服一劑用水一椀生薑焙乾半兩煎至半碗

分三服執服

產後嘔逆不止方

橘紅二兩

半夏麩

甘草各半兩藿香三兩

右劉散每服貳錢水壹盞生薑三片煎不拘時溫服

**五苓散** 渴而飲水者五苓散不飲水者理中圓虛

冷者加附子來復丹亦效方見大方雜傷暑

**白朮散** 治產後敗血作梗頭痛諸藥不效者

太附子壹枚醱醋壹稅用火肆面灸透蘇醋令盡去皮

臍川芎壹兩同為末每服二錢茶清調下虛人最效

**白芍散** 治產後虛熱頭痛方見大方

右用大川芎天白烏藥皮為末和鍾燒淬酒調下

**五苓散** 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服如傷風

痰喘却以尋常傷風藥治之

知母 貝母 白茯苓 人參 各半兩

桃仁 杏仁 並生去皮尖各壹分

右劉散每服三錢水一盞半煎不以時溫服如覺腹痛

併服之立有神效

**五苓散** 治產後血風感寒暑濕喘滿痰涎壅盛咳嗽坐

卧不寧

旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麩

荆芥穗 五味子 茯苓 甘草 各

麻 杏仁 各等分

右劉散每服四錢薑五片棗一枚煎食前溫服

**小續命散** 治產後血入於肺面黑發喘欲死各孤陽絕陰

人參 續斷 蘇木 各兩

右用水兩碗 煮取一大碗 去滓 調參末 隨時加減服

治產後瘀血暴絕 氣急喘促 方見前

治產後血乾 痞悶心煩 去地黃 加入人參 烏梅 方見

治產後惡露淋漓 不絕 心悶短氣 四肢乏弱 不思

飲食 頭目眩暈 五心煩熱 面黃肌瘦

牡蠣 川芎 熟地黃 白茯苓

龍骨 各壹兩 續斷 當歸 炒 艾葉 酒炒

人參 五味子 地榆 各半兩 升草 壹分

右劉散 每服二錢 生薑三片 棗一枚 煎食前溫服

治產後臍下痛 名兒枕痛 不可忍 此神藥也

延胡索 杜心 各半兩 當歸 壹兩

右為末 每服貳錢 熱酒調下 或用童便 溫煖調尤快

又方 二靈脂 漫火炒 為末 溫酒服 貳錢

治產後惡露不快 腰痛小便如刺 時作寒熱 頭痛

不思飲食 及瘀血月水不調 黃瘦 不思飲食 久有恙 治之

五靈脂 水淘去石 真蒲黃 末

右以好米醋 調五靈脂末 慢火熬成膏 子次以蒲黃末

搜和圓如櫻桃大 每服一圓水 與童便各半 蓋煎令化

溫服 少頃再一服 惡露即下 又有瘀血成塊 月信不利

者 並用酒磨下 及治心腹痛 欲死 百藥不效

羊肉湯 療產後產婦腹中痛 虛眩不能支持 兩脇當胎急

痛氣上衝前心相引痛治之如神

精羊角兩當歸

川芎各半兩生薑壹兩

右列散以水拾盞煎參壹盞掠去沫去滓分四服空心熱服一日來日再作兩日滓合為一日煎當一劑服

經閉之療產後血氣脇肋脹滿

當歸 枳殼 枳實 桂心

苦梗

檳榔

枳殼 枳實 桂心

青木香

柴胡各三錢

右列散水二分煎取八合空心分溫二服

大參黃散 治產後陰虛生肉熱煩悶不安

人參

當歸 生薑

麥門冬 炙甘草

桂心 各壹兩 為藥散

右列散每服四錢水二盞先將粳米一合淡竹葉二片煎至一盞去米稗入藥併煎三枚煎食前服地黃用生乾者虛甚則用熟者

補黃散 治產後虛煩必效

補黃散以多少紙上炒每一錢東流水調不拘時服

助地黃湯 治產後虛渴不止心氣羸弱眼昏頭眩飲食不

熟乾地黃 兩

人參 叁兩

麥門冬 祛心 括樓根 肆兩

甘草 半兩

右列散每服四錢水二盞糯米一撮生姜三片棗三枚

煎食前服

血渴 方見前



草藥歌 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

半夏湯洗 赤茯苓 草果去殼 甘草

川芎 陳皮 白芷各二分 青皮一分 白

良薑 紫蘇各二分 乾葛一分

右劉散每服三錢 生姜三片 棗二枚 水一盞 半煎當發  
口早連進三服 無不安者

生熟散 治產後瘧疾多寒者

肉豆寇 草果仁 厚朴生 去殼半夏

陳皮 甘草 大棗去核 生姜各等分

右劉散和勻 一半生 一半以濕紙裹煨 令香熟 去紙與  
生者和勻 每服伍錢 水二盞 煎食前 一服 食后 一服

石菖蒲 治產後虛羸喘乏 寒下熱如瘧 四肢痠痛 面亡

痿黃 多羸勞

猪腎去脂 葱白

粳米 當歸 為藥 各二兩

右劉散分作兩劑 用水三升 煮取一斗 搗分三服 或月  
人參無為藥

又參黃散 治產後羸勞 皆由在產內未滿 百日 躄中虛

損血氣 尚弱 失於將理 或勞動 作傷 致成羸勞 其狀 虛羸

乍起 乍臥 飲食不消 時有咳嗽 頭目昏痛 發歇無常 夜有

盜汗 寒熱如瘧 背膈拘急 沉重 在牀 服此大效

人參 桂心 桑寄生 當歸去尾

白茯苓 白芍藥 桃仁去皮尖 熟地黄洗蒸  
麥門冬去心 甘草各半兩 續斷各分 牛膝各分  
黃耆各兩

右為末每服先以猪脊一對去脂膜用水二大盞生薑三分  
半分棗三枚煎至一盞去猪腎姜棗入藥末二錢葱三  
寸烏梅一箇荆芥五穗煎空心晚食前溫服神妙

人參散治產後虛羸脾胃之弱四肢無力全不思飲食心  
腹脹滿

黃耆 人參 草果仁 厚朴  
附子各壹兩 白朮 當歸 白茯苓  
木香 川芎 桂心 甘草

陳皮去白 良薑 阿膠勸皮 各半兩

右劉散每服肆錢生薑參片棗壹枚煎不以時溫服

黃耆 白朮 木香 羚羊角屑  
人參 當歸去尾 桂心 白芍藥  
川芎 白茯苓各半兩 甘草壹分

右劉散每服參錢生薑參片紅棗貳枚煎不以時溫服  
小調經散 產後生理鬱熱喘急兼白皮杏仁煎湯調下  
丁香散治產後心煩咳逆不止

丁香 白豆蔻仁各半兩 伏龍肝壹兩  
右為末煎桃仁吳茱萸湯調下壹錢如人行五里再服

**石蓮散** 治咳逆嘔吐心怔目暈可思飲食

石蓮肉兩半 白茯苓壹兩 丁香半兩

左為末每服參錢米飲調不以時服

**固經圓** 治產後血崩不止或因死極酸鹹物過度

艾葉 赤石脂煨 補骨脂

木賊各半兩 附子壹兩

左為末陳米飲圓子吞食前溫酒下二十圓米飲亦可蓋此證亦輕病况產后有此是謂車傷心不止酸酸不節而致多因驚憂悲怒膈氣不平或產后服斷血藥太早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中此藥自難奏效不若大料煮膏煎湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之

為得小腹滿痛肝經已壞難治方大順散除毒仁

**五味五積散** 治產後肉食動傷腹痛至甚水穀不化洞

腸鳴除麻黃加高良薑熟附子薑烏梅紅棗煎方見各

**四君子湯** 治產後腹微疼泄瀉不止烏梅陳米煎湯調服

方見小方科通治類

**胎前散** 治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉分

過則愈雖洞泄不禁下青黑色物亦驗

大荆芥四五錢於盞內然火燒成灰不得犯油火入麝香少許研沸湯一二呷調下此藥雖微能愈大病勿忽

**黃連阿膠圓** 治產後熱證下痢全赤煩渴發熱小腑不利

每服三十圓陳米烏梅湯下方見小方科通治類

**理中湯** 治產後虛證下痢純白腹痛裏急外重手足冷加  
木香煨肉豆蔻每服三錢陳米益為梅煎空心服方見大方  
**育食養臟湯** 產後虛弱冷熱不調下痢赤白或有膿血裏  
急後重臍腹疔痛日夜無度宜服方用大方  
**何勝散** 治產後血暈下痢胃虛竭津液不足大便  
秘結

**阿膠** 鮮粉炒枳殼各等分  
右為末煉蜜桐子大別研滑石為衣溫水下二十  
圓半日未通再服又一方蜜允法見大方  
**又方** 用葱涎調好茶窠團復以茶吞下必通或用葱白十  
數莖濃煎點茶連葱嚼服神效不動真氣

**去乾地黃** 用生地黃加薑皮去穢煎服效  
治產後有二種疾醫官則多汗汗則大便秘難於  
用藥惟此方效方用大方

**木通** 治產後小便不通  
**枳實** 枳實  
**甘草** 各半曲  
**滑石**  
右劉散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時倍  
**灸法** 治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒緣未產之前  
內積冷氣遂致產時外胞運動不順用鹽於產婦臍中  
填可與臍平却用葱白氣未盡皮拾餘根作一束切作  
一指厚安鹽上用艾炷灸葱餅子大小以灸之覺

熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述

**藥湯**

治產後諸淋無問以熱膏石氣結惡主之

白茅根每斤 瞿麥穗

白茯苓各半 兩 葵子

人參各半 兩 黃芩

桃膠

滑石

甘草各半 兩 此方

石首魚頭中石拾箇

右對散每服斤大錢生去三片燈心二十莖煎溫服或為末木通煎湯調下二錢氣壅木通橘皮煎湯調下

**藥湯**

治產後小便數及遺尿

桑螵蛸每斤

鹿茸每斤

黃耆每斤

牡蠣每斤

人參每斤

厚朴每斤

石脂每斤

右為末空心粥飲調下二錢一方無厚朴石脂有上章

生姜不禁加龍骨

**藥散**

治產後大小便不利下血

車前子

黃芩

蒲黃

生地黃

牡蠣

芍藥每斤

右為末空心米飲服方寸匕忌葱蒜

**藥散**

治陰下脫

當歸

黃芩各壹兩

芍藥各壹兩

牡蠣每斤

蝟皮每斤

右為末每服二錢溫酒或米飲調下忌食高舉重

**藥散**

治產後勞陰脫

硫黃

烏賊魚骨各半兩

玉守子壹分

右為未摻患處

**天法** 蛇床子炒乘熱布裹熨患處下治產後陰痛

**天法** 治產後陰腫妨悶

桃仁去皮尖 枯礬末

五倍子格等分

右以末藥桃仁膏拌勻傅之

**磁更湯** 治產勞玉門開而不閉

硫黃

吳茱萸

皂莢三兩 醋煎 蛇床子

右剉散每服四大錢水一椀煎數沸去滓沈玉明日洗

**櫻枝散** 治產後子腸下出不能收者年深者皆治之

櫻枝取皮厚 葛壹厚

右用水伍升連根葱五莖浸煎一椀煎至三升去滓傾

在盆內乘熱熏候通手淋洗如冷傾入五升瓶內再煎

一沸依前用一服可作五度用洗了睡少時忌蓋藏魚

醬濕麩發風毒物及用心力勞勞等事

**又方** 枳殼去穢貳兩煎湯溫浸良久即入

**又方** 老鴉酸草壹握煎湯用草不閉孔終熏可收一半

稍溫下手洗並收入面安

**當歸** 治產後惡血不散發渴疼痛及惡露不快臍

腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸

赤芍藥

牡丹皮

延胡索炒各

桂心壹兩

右為末煉蜜圓梧桐子大溫酒米飲任下三五圓食前

服痛甚細嚼嚥下

**四神散** 治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如道尸及心腹絞痛下利

當歸

芍藥

川芎

乾薑各等分

右為末每服二錢溫酒調下

**當歸散** 治產後腰脚疼痛不可轉側身汗壯熱身躄強氣短

黃耆

芍藥各等分

右劉散每服四大錢水一盞半生薑五片煎食前溫服

**四順散** 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢躄氣短多汗多汗產直至百晷每日常服壯氣補虛調養臟氣

餘疾消穀嗜食兼治產後臟虛嘔吐下止

甘草

貳兩

人參

白朮

乾薑

各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫米飲下

**當歸散** 治產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸吸少氣

小腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至滿月每日二服令人丁壯強健

當歸

桂心

白芍藥

甘草

各等分

石劉散每服四大錢生薑三片棗子二枚水一盞半煎去滓入飴糖一塊再煎消服崩漏白濁如阿膠地黃

**續命散** 治產後百病百日内常服除邪血生新血令人有孕生子充實亦治男子六白諸疾

木香炮 茯苓 京墨 桃仁去皮尖

秦艽 甘草炙 人參 桔梗炒

石斛酒浸 蚕布紫 高麗木各取兩 當歸

桂心 乾薑炮 細辛 牡丹皮

川弓各兩半 川椒炒 山藥各三分 澤蘭

熟地黃 香附之略 芍藥炒 大豆卷炒

糯米壹升 右為末煉蜜圓每兩作六圓嚼細食前溫酒醋湯任下

**人參養血圓** 治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調

血脈宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅腰安神潤顏色  
通氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈

產出月羸瘦不復常者

又參 赤芍藥 川芎 菖蒲炒

當歸 熟地黃五兩 烏梅為三兩

右為末蜜搜杵數千下同如梧子大每服五十圓至一

百圓溫酒或米湯下食前服

**產後** 治產婦腹脹痛不可忍者宜早粘根為飲服愈

**捷法** 治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急口不能

言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證與中風相似

但其脈浮而軟十死一二生醫多不識若作中風治之必

死無疑用白扁豆二兩生為末新汲水調下即效

**內乳散** 治婦人產前產後一切血疾血崩虛寒腹痛



氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色  
腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血痰口吐青水頻產血衰顏色  
青黃勞傷劣弱月經不調下血漏胎血赤血運血液時發  
疼痛頭目眩暈燕血上心悶絕命宜服之  
手足逆冷並宜服之

藿香葉

丁香少

熟地黃

洗肉桂各壹兩半

甘草炙赤

山藥

當歸去蘆

白朮

白芷各捌兩

黃芩去蘆

乾薑炮

川芎

黃耆去蘆各

木香壹兩

陳皮去白

白芍藥拾兩

茴香壹兩半

右剉散每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團同煎

至七分空心食前熱服為末溫酒調下亦得如產後下  
血過多加蒲黃煎服惡露不快加當歸紅花煎服水瀉  
加肉豆蔻末煎服嘔吐加藿香生薑煎上熱下冷加荊  
芥煎但腹中虛冷血氣不和並宜服產後每日服一服  
則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

下乳

麥門冬不拘多少去心焙為末酒磨真犀角約

一錢同麥門冬末一錢溫酒調不過二服便下不以時候

痛留蓄邪毒或作癰腫服此自然內消乳汁通行

漏蘆貳兩半 蛇蛻炙 瓜萎焙 商陸火燒存性

右為末每服二錢溫酒調不以時服仍喫熱羹湯助之  
治乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少  
右一味研細每服抄二錢濃煎漏蘆湯調

母猪蹄其法治如前

通菴四

右以水一斗浸煮得四五升取汁飲不下更作服了用

梳頭木梳於乳上梳下効

治乳硬作痛

嫩桑葉在椀研細米飲調搗爛貼於病處此證四十已  
下可治五十已上不可治治之則絕不治則自得瘰癧其

大全婦人良方卷一

