

醫家必用

上

内閣文庫	
番號	漢 15580
冊數	3 (1)
函號	田 42- 10

書
子四十二
全八
三號

子 42-10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak



新刊醫家必用序

醫所以寄人之生也方書要焉秦漢以前
藥無兼味魏陰單方即古人治病遺意也
自仲景氏出乃製方術備藥品而銖兩監
制之義始詳後作如東垣如河間如丹溪
皆侈方論以惠天下而丹溪子又其最著
者也竊慨夫世醫徒執方書而卒以厲人
非方書之弊也抑天下不善用方書者之
過也余政暇每銳情醫術蒐獵諸方取其

約而核博而精肆而有紀峻而有制者錄之以是施治雖盧扁無餘巧矣信乎爲醫家所必用焉者也夫此特其緒餘焉而已矣若夫祖之內經以究其本充之藥性以極其趨審之寒熱以通其因參之運氣以達其變收群書之機括而歸之肺腑應用弗滯如良將將兵然斯可以會醫之全在間有不按古方以時消息此神於醫者也故曰醫者意也遂捐俸刻之

嘉靖辛丑春三月既望

賜進士中順大夫湖廣按察司副使前戶科左給事中洛陽孫應奎識

醫家必用序

夫人有身須血氣沛流無壅底湫滯而後
可以卻疾延齡辟穀長視其道雖曰固有
攸在也然厥庶民匪醫藥莫濟其厄匪方
書莫載其良是故書傳則藥備疾已而延
齡之道存矣東穀孫公曩給事殿中以直
諫忤時宰出爲丞今尋擢郎署藩臬而正
氣侃侃百鍊彌精爲天下大雅固將以其
道相

天子措四海蒼生於衽席而奚以方書爲哉
迺辛丑夏五俄焉以在蜀督木事誑誤被
逮至襄爰輯古良方百餘成帙遂壽諸梓
以傳嗟夫公之心仁民澤物何懇惻也古
人不獲爲賢相則願爲良醫以其活人均
此方寸耳是故陸忠宣於唐以諫顯其在
忠州閉門集古方書今公活人之心頃刻
弗置進而爲賢相與忠宣同爲第一流人
物矣則方書輯略未足而多雖然其亦有

感夫言路通塞有似夫人身之氣血而天
下又安將有待於良醫之用方也夫

賜進士湖廣守襄陽郡前刑科給事中甘節
張裕頓首書

重刊醫家必用序
醫家必用迺我

脉學大要附

大中丞東穀孫公集自潘臬梓諸楚襄者也
夫醫藥製摩庖犧息脉究始岐伯嗣若仲
景東垣丹溪諸書洊加詳著傳久鑿真浩
清寡要今之醫者執方而誤恒多是集也
竟窮標本默昭玄機極陰陽五行錯綜變
化之道參四時寒暑消息盈虛之理誠瑩
精研妙運神應所謂秘發先天功超國手

豈但可以方書視之哉昔公之在諫垣也
直聲震野藥石匡時霜風幾歷哀丹百鍊
茲撫畿浹旬疆陲經理脉絡條分殘喘是
調閭閻胥戴是以境內晏然窮荒釋警正
猶人之醫藥裨身元氣充完外邪迸伏是
集也固公蘊涵精發經濟之緒餘也豈但
可以方書視之哉佇遙佐綏八荒劑均四
海一舉此而措之焉耳古人以醫道喻治
道又以良相比良醫咸有以也

玘緣屬吏

請授一帙珍弗敢私迺鳩工翻編再梓於
孤竹之墟延布於東郊之廣僉曰至仁惟
公隨施咸濟公壽無疆福我畿氓庸何旣
耶

玘

拜首誓首再告於公曰願傳之四方

寔天下蒼生之賴也

嘉靖戊申元日之吉直隸永平府知府晉

陽張

玘

謹序

新刊醫家必用目錄

- | | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 十一 | 十神湯 | 十二 | 九味羌活湯 |
| 十三 | 天麻半夏湯 | 十四 | 藿香正氣散 |
| 十五 | 竹瀝達痰丸 | 十六 | 潤下丸 |
| 十七 | 二陳湯 | 十七 | 理中豁痰湯 |
| 十八 | 補陰丸 | 十八 | 當歸六黃湯 |
| 十九 | 補陰散 | 十九 | 人參固本丸 |
| 二十 | 十全大補湯 | 二十 | 四物湯 |
| 二十一 | 四君子湯 | 二十一 | 補中益氣湯 |

新刊醫家必用目錄

六神通解散 十八 參蘇飲

香蘇散 十九 經驗對金飲子

加減玄武湯 廿一 生料五積散

消風百解散 廿三 小柴胡湯

不換金正氣散 廿五 愈風飲

烏藥順氣散 廿七 八味順氣散

防風通聖散 廿九 搜風順氣丸

小續命湯 卅一 省風湯

平胃散 卅三 胃風湯

枳朮丸 卅五 養胃進食丸

大安丸 卅七 健脾丸

五苓散 卅九 當歸拈痛湯

十味香薷飲 卅一 理中湯

甘桔湯 卅三 驅邪湯

濟生清脾湯 卅五 寧胃散

燥濕湯 卅七 清金飲

人參飲 卅九 當歸飲

清暑益氣湯 五十一 半夏白朮天麻湯

五十三 清氣飲

五十四 參鬻飲

五十五 薑木散

五十六 安神丸

五十七 安胃散

五十八 滋腎丸

五十九 三才封髓丹

六十 補肝丸

六十一 清胃散

六十二 益元散

六十三 導赤散

六十四 瀉心湯

六十五 瀉黃散

六十六 清膈丸

六十七 瀉青丸

六十八 瀉白散

六十九 左金丸

七十 橘皮竹茹湯

七十一 大橘皮湯

七十二 助胃膏

七十三 赤茯苓湯

七十四 蘇子導痰降氣湯

七十五 黃耆建中湯

七十六 人參芍藥湯

七十七 加味越鞠丸

劉草密治虛弱患痢方

七十八 六神丸

七十九 調中益氣湯

八十 流氣飲子

八十一 調衛湯

八十二 犀角地黄湯

八十三 加味金花丸

八十四 中和丸

八十五 火鬱湯

全六 枳實消痞丸

八七 枳實導滯丸

全八 千金硝石丸

八九 柴前梅連散

全一 獨活寄生湯

全一 臟毒方

九十二 固腸丸

九十二 養脾丸

九十四 劉草窻治痛泄要方

九十四 滋脾丸

九十五 四時瀉痢脾泄方

九十六 麻黃湯

九十七 桂枝湯

九十八 六和湯

九十九 大柴胡湯

百 調胃承氣湯

百一 小承氣湯

百二 大承氣湯

百三 白朮湯

百四 升陽散火湯

百五 黃芩利膈丸

百六 升陽順氣湯

百七 參朮調中湯

百八 山精丸

百九 蒼朮丸

治患虛損身發潮熱夜盜汗方

百十 加減二陳湯

百十一 半夏湯

百十二 沖和靈寶飲

百十三 剪金丹

治諸痢并禁口痢方

百十四 又治痢方

百十五 柴平湯

百六 又方

百六 地仙散

頁一 又方

百六 秋石五精丸

百六 治心頭疼方

頁八 神效膏

百七 涼膈散

百九 鷄內金散

頁一 延年益壽不老丹

百七 黃耆湯

百六 治破傷風方

新刊醫家必用目錄終

新刊醫家必用

洛陽東穀山人孫應奎纂集

四君子湯

治脾胃不調不思飲食併泄瀉等證

人參 去蘆 五錢

白茯苓 去蘆 一兩

浙朮 一兩

甘草 三錢五分

右依此方加減在內各四錢生薑五片棗

一枚煎服或三錢重亦可加陳皮半夏名

六君子湯○有痰加陳皮半夏○吐瀉加

藿香黃耆白芷○脾胃虛弱加交桂當歸
黃耆○咳嗽加桑白皮五味子杏仁○心
煩不定加辰砂酸棗仁遠志○心熱加麥
門冬茯苓神蓮肉○小兒風疾加全蝎白附
子北細辛○發渴加木瓜乾葛烏梅○心
煩口渴加人參黃耆○胃冷加丁香附子
砂仁○脾困氣短加木香人參砂仁○腹
脹不思飲食加白芷薤白枳實砂仁○胸膈
喘急加枳實半夏枳殼○風壅邪熱加荊

芥黃芩薄荷○潮熱往來加前胡川芎○
盜汗不止加黃耆陳麥麩炒○小便不通
加澤瀉木通猪苓○大腑閉塞加檳榔大
黃○水瀉不止加木香訶子豈菴○遍身
疼痛加赤芍藥官桂○四肢惡寒有熱加
麻黃桂枝○氣痛加茴香玄胡索當歸○
氣塊加三稜莪朮茴香附子○腹疼加
軍薑赤芍藥官桂○小兒有疹已出未成
者加升麻乾葛○婦人難產加麝香白芷

百草霜

補中益氣湯

治飲食勞倦寒溫失節傷於脾胃喜怒憂
恐損耗元氣榮衛不調乃生寒熱皆脾胃
之氣不足此藥治之

黃耆

病甚勞役熱甚者一錢

甘草

已上各五分

人參

去蘆三分有嗽去之

已上三味除濕熱煩

熱之聖藥也

當歸身

三分酒焙乾

橘皮

不去白三分

升麻

三分

柴胡

三分

白朮

三分

右件藥_量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去粗食

遠稍熱服如傷之重者不過二服而愈若

病日久者以權立加減法治之○如腹中

痛者加白芍藥五分炙甘草三分○如惡寒冷

痛者加去皮中桂三分○如惡熱喜寒

而腹痛者於已加白芍藥二味中更加生

黃芩三分○如夏月腹痛而惡熱者亦然治

黃芩三分○如夏月腹痛而惡熱者亦然治

時熱也○如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中更少加桂○如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也加益智分三或加半夏分五生薑片三○如頭痛加蔓荊子分三如痛甚加川芎分三○如頂痛腦痛加藁本分五如苦痛者加細辛二分華陰者○諸頭痛者併用此四味足矣○如頭上有熱則此不能治別以清空膏主之○如臍下痛者加真熟地黃分五其痛立止如不已者乃大寒

也更加肉桂去皮三分內經所說少腹痛皆寒

證從復法相報中來也經云大勝必大復

從熱病中變而作也非傷寒厥陰之證也

仲景以抵當湯并丸主之乃血結下焦膀胱也○如胸中氣壅滯

加青皮分二如氣促少氣者去之○如身有

疼痛者濕若身重者亦濕加去桂五苓散

一如風濕相搏一身盡痛加羌活防風

藁本根已上各五分升麻蒼朮已上各一錢勿用五

苓所以然者為風藥已能勝濕故別作一

服與之如病去勿再服以諸風之藥損人元氣而益其病故也○如大便秘澀加當歸梢錢一閉澀不行者煎成正藥先用一口調玄明粉錢一得行則止此病不宜下下之恐變凶證也○如久病痰嗽者去人參初病者勿去之冬月或春寒或秋涼時各宜加不去根節麻黃分五○如春令大溫只加佛耳草分三款冬花分一○如夏月病嗽加五味子三十分麥門冬各等分如舌上白滑胎

者是胸中有寒勿用之○如夏月不嗽亦加人參分三并五味子麥門冬各等分救肺受火邪也○如病人能食而心下痞加黃連分三○如不能食心下痞勿加黃連○如脇下痛或脇下急縮俱加柴胡則三分甚則五分

十全大補湯

治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥

溫補常服生血壯脾胃

人參去盧

肉桂去粗皮

熟地黃酒焙

白芍藥

川芎

茯苓

去皮

當歸

黃耆

白朮

甘草

炙各一分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食遠服

四物湯

治婦人胎前產後血氣不足四肢怠惰乏力少氣榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱赤白帶下脚膝疼痛頭目昏眩經候不行咳

嗽心煩腹中疼痛下虛冷之并皆治之

當歸

去蘆

川芎

各二兩

地黃

洗酒

白芍藥

各二兩五錢

右依方法加減○經脉不行加好紅花蘇

木○血氣痛五心熱加天台烏藥官桂○

冷氣痛四肢加良薑玄胡索軍薑腹中氣

塊加木香如鷄子大三稜莪朮○乍寒乍

熱加人參茯苓青皮○妊婦動胎加艾葉

香附子紫蘇葉○血痢加阿膠厚朴艾葉

○口乾煩渴加麥門冬乾葛烏梅○小便
秘澀加澤瀉木通○大便秘結加桃仁大
黃○脇肋脹滿加枳實半夏○大渴煩燥
加知母人參石膏○潮熱加黃芩桔梗下
血過多加絲黃耆白朮茯苓甘草○無子
息加附子肉苁蓉○五心煩熱加黃芩柴
胡地骨皮百合○虛煩不睡加淡竹葉石
膏人參○心氣不足恍惚加遠志棗仁辰
砂別研○有死胎加交桂麝香白芷○赤

白帶下加蘘本牡丹皮川續斷○或月前
月後加川牛膝澤蘭葉鍾乳粉○嗽痰加
桑白皮杏仁麻黃○頭眩加羌活細辛○
不思飲食加砂仁白荳蔻蓮肉○面色痿
黃加陳皮香附子軍薑

補陰散

治陰虛火動盜汗發熱咳嗽唾血身熱脉
數肌肉消瘦等證

川芎

錢一

熟地黃

錢一

白芍藥一分炒三錢

當歸一分炒三錢

黃柏七分蜜水灸

知母一錢水拌炒

生地黄五分酒洗

甘草五分灸

天門冬一錢去心及皮

白朮一錢二分

陳皮七分

乾薑三分炒紫色

生薑三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜苓瓜萋仁各七分

五味子十粒○若痰盛加萋製半夏貝母瓜

萋仁各一錢○若盜汗多加牡礪酸棗仁各七

分浮小麥撮一○若潮熱盛加桑白皮沙參

地骨皮各七分○若夢遺精滑加牡礪龍骨

山茱萸各七分○若赤白濁加白茯苓一錢黃

連三分炒○若兼衄血咳血出於肺也加桑

白皮一錢黃芩山梔各五分炒○若兼嗽血痰血

出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜萋仁各七

分○若兼嘔吐血出於胃也加山梔黃連

乾葛蒲黃各一錢炒韭汁半銀盞薑汁少許○

若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏

葉一炒各錢○若先見血證或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者涼血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血來多必有瘀於胸膈者不先消化之則止之涼之不應也葛可久十藥神書方可次第檢用方內唯獨參湯止可用於大吐血後昏倦脈微細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬三五錢若如前所云陰虛火動潮熱盜汗咳嗽脈數者不可用也說見本草集要人參

條下○此病屬火大便多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀澹則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神麩麥芽甘草等藥俟胃氣復然後用前本病藥○收攻保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

六
人參固本丸

補益榮衛絕勝他藥其妙合在製法熟地黃天門冬性緩味粘多滯泥于所經生地

黃麥門冬性疾味輕每不候於兩佐人參
主元氣任引而後入三焦予感異人之授
願表出之

熟地黃

天門冬

去心生薑自然汁
浸二日酒浸一日

生地黃

麥門冬

去心酒浸一日米泔
水浸二日以上各二

兩

右總用石磨磨如泥漿杏仁湯七開漉淨
渣又磨淨盡如澄小粉之法撇去上面水
取藥粉酒或重湯煮乾研為細末加入參

末一兩煉蜜和丸清晨淡鹽湯下
補陰丸

治陰虛火動勞瘵等疾

黃蘗

去皮酒拌
炒褐色

知母

去毛皮酒
拌炒忌鉄

敗龜板

酥炙透
各三兩

熟地黃

酒拌蒸忌
鉄五兩

瓊陽

酥炙
乾

枸杞子

各三
兩

五味子

兩一

白芍藥

酒炒

天門冬

去心各
二兩

乾薑

炒紫色三錢寒
月加至五錢

右為極細末煉淨蜜和入猪脊髓三條和

藥末杵極勻丸如梧桐子大每服八九十

丸空心淡鹽湯送下寒月可用溫酒○若

有夢遺精滑病者加牡礪童便白木各一

山茱萸去核椿根白皮炒各七錢○若有赤白濁

病者加白木白茯苓各一兩半山梔仁黃蓮各

錢各五○若脚軟弱無力者加牛膝酒洗二兩虎

脛骨酥灸透一兩防己酒洗木瓜各五錢○若有疝

氣病者加蒼朮鹽水炒一兩五錢黃連生薑汁炒山梔

仁炒各六錢川芎一兩吳茱萸炒青皮去穢各五錢○

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白木三兩陳皮

一兩乾薑炒加至七錢○若眼目昏暗者加當歸

酒洗川芎菊花各一兩柴胡黃連酒炒烏犀角各五錢

蔓荊子防風各三錢○若兼氣虛之人加

人參黃耆蜜灸各二兩○若左尺既虛右尺亦

微命門火衰陽事不舉加黑附子小便浸炮去皮

須慎用之肉桂去皮各七錢沉香五錢

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也

當歸

黃連

黃栢

生地黃

黃芩

熟地黃

等分

黃耆加倍

右剉每服五錢水煎小兒減半

二陳湯

治諸痰飲

橘紅一兩

半夏湯泡五錢

白茯苓四錢

甘草二錢

生薑

右方總治一身之痰如要下行加引下藥

上行加引上藥○濕痰多軟如身體倦怠
 之類加蒼白朮○寒痰痞塞胸中倍加半
 夏甚者加麻黃細辛烏頭之類○痰厥頭
 疼亦倍半夏○風痰加南星枳殼白附子
 天麻僵蠶猪牙皂角之類氣虛者更加竹
 瀝氣實加荊瀝俱用薑汁○熱痰加黃芩
 黃連痰因火盛逆上降火為先加白朮黃
 芩軟石膏黃連之類眩暈嘈雜者火動其
 痰也亦加山梔子黃連黃芩○血虛有痰

者加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝薑汁○帶血者再加黃芩白芍藥桑白皮○血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑菜自然汁飲三五銀盞必胸中煩噪不寧後愈○氣虛有痰者加人參白朮○脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍藥神麩麥芽兼用升痰提起○內傷挾痰加人參黃耆白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤妙○食積痰加神麩麥芽山查炒黃連

枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用補藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣○老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米連翹之類五倍子佐他藥大治頑痰宜丸藥○喉中有物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加醃藥軟堅之類宜瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝薑汁煉蜜丸噙服之○脉瀦者卒難開必費調理氣實

痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣
滯者難治○痰在膈上必用吐法瀉之不
去膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在
經絡間非吐不可吐中就發散之義凡
用吐藥宜升提其氣便吐如防風川芎桔
梗芽茶生薑薑汁之類或瓜蒂散凡吐用
布緊勒肚於不通風處行之○痰在腸胃
間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之
類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生

而多○痰在脇下非白芥子不能達○痰
在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可及在四肢
非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以
薑汁膈間有痰或顛狂或健忘或風痰
俱用竹瀝與荊瀝同功氣虛少食用竹瀝
氣實能食用荊瀝○凡人身上中下有塊
是痰也問其平日好食何物吐下後方用
藥○凡人頭面頸頰身中有結核不痛不
紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

○滾痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰
急驚風痰盛者最為要藥常宜合備但須
量人虛實而用之

理中豁痰湯

治膈上胃中痰最妙

白朮一錢五分

陳皮八分

白茯苓一錢

甘草五分

人參一錢

半夏一錢

洗七次
薑汁製

白芍藥一錢五分

瓜蒌仁一錢

黃芩七分

香附子七分

鹽水炒

枳實五分

桔梗七分

黃連七分

天門冬八分

大麥芽八分

右水煎入生薑汁三是淡竹瀝三分溫服
寒月覺胃中冷易泄加炒乾薑二分

竹瀝達痰丸

此藥能運痰如神不損元氣其痰從大便
後出丹溪云痰在四肢非竹瀝不能達此
也

半夏 二兩 湯泡七次 仍用生薑汁浸透 曬乾切片 新瓦上 微火炒熟 用之

陳皮 二兩 去白 白木 二兩 小 火炒過

人參 一兩 五錢 白茯苓 二兩 甘草 一兩 五錢 炙

大黃 二兩 酒浸透 蒸熟 曬乾 用 黃芩 二兩 酒炒

沉香 五錢 正者 真 礞石 一兩 兩 搗碎 用焰硝 一兩 拌勻 放入 銷銀鍋

內上蓋瓦片 用鹽泥固濟 曬乾 用炭火煨過 如黃金色 為佳

右為細末 用竹瀝一大碗 半 又用生薑自

然汁三鍾 合勻 再曬乾 如此 凡五次 仍以

竹瀝和丸 食遠服

