

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十七上

下

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣張同履

欽定四庫全書

赤水元珠卷二十七上

明 孫一奎 撰

痘疹心印
附引

生生子曰余考痘之為症上古軒岐秦越人淳于公輩
皆未之論列也自東漢建武中南陽征虜染流中國
時謂之虜瘡醫者以蜜煎升麻數數拭之然則痘蓋
肇於東漢也已顧柰何張仲景華元化王叔和皇甫

謚褚澄孫真人王冰許學士諸名公亦未之置喙至
宋錢仲陽而下陳文中李東垣王好古朱彥脩乃始
言之迨劉昉之幼幼新書王賓湖之幼科類萃徐用
宣之袖珍寇衡之全幼心鑑湯衡之嬰童寶鑑高武
痘疹正宗汪石山痘疹理辨魏直博愛心鑑李言聞
痘疹証治痘疹要訣聞人規胡大卿八十一論李寶
痘疹淵源翁仲仁金鏡錄萬菊軒痘疹心要俞東臯
痘疹卮言皆特以痘疹為言者不下數十家各相發

明似無遺漏宜乎今之嬰童可無虞矣何邇年來痘疹一臨殤輒相踵十不保五曷故哉屈數前書不為不多吐心露膽不為不悉豈多岐而亡羊耶抑其術猶有未臻者耶嗟嗟書不盡言言不盡意明者當心得之已古謂用藥如用兵岳武穆云陣而後戰兵法之常運用之妙存乎一心書安能使人人必克勝哉矧今之業專門者以痘為秘術為禁方固不道其道心其心各師其見各顯其法而不思融洽衆理以契

所歸故乃宗張喙李是甲非乙殆派紛而不會其源
曷能齊其治哉余燭斯弊每為痛心故節錄各家成
法叅以鄙意會而同之名曰痘疹心印庶好生君子
得以窺其竅妙云爾

原痘

萬菊軒曰上古之時未聞瘡痘之瘡素難之文鮮有及
者豈其人淳龐朴野積精全神虛邪苛毒莫之能害
歟或云自建武擊虜遂染其毒流布中國謂之虜瘡

或曰聖瘡言其變化莫測也或曰天瘡言為天行疫
癘也或曰百歲瘡言人自少至老必作一番也或曰
跣豈瘡言其形之相似也故患此者如蛇蛻皮如龍
蛻骨死生存於呼吸之間夫上古所無而季世有之
抑時世異耶抑人自失之耶余思其繇天地之氣春
夏生養之紀也其物熙熙秋冬殺戮之紀也其物黯
黯時逮末世已非秦和之景不可謂非時世之異然
人日習偽不知持滿御神之道七損八益之數務快

其心以散其真不可謂非人自失之也有論穢毒者
有論淫火者有論時行正病者靡有定論將謂穢毒
淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相似
而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病耶
何以自少至老但作一次厥後再無傳染也蓋父母
於子一體而分精血之毒已畜於陽施陰化之始固
不待誕生之頃曠其血而後有是毒也况男子惜其
氣以養其精女子調其氣以養其血苟失所養即貽

他日之患子之受於父母者雖殊其為毒則一也豈有男子淫火起於氣為陽毒而易治女子淫火起於血為陰毒而難治之理耶至於天行正病亦有其時但觀夫年之所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或暴而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉

孫季子朋來曰淫火即胎毒也天行即疫癘致痘之由

端不外是二者蓋淫火肇於有生之初伏而不發必俟天行煨煉一番然後洩之雖百歲不免焉殆亦有生之後一劫也設非淫火胎毒安得一生只發一次哉矧人之出疹出痘正如蠶之蛻殼一眠二眠三眠也若謂純是胎毒不假天行何臨作之年郡縣村鎮沿鄉接境莫不皆然即卵生如雞鴨胎生如猪犬且皆不免又槩可見至於生者死者實由所感天行之輕重非干所稟之厚薄也觀今之童稚體盛神壯宜

其稟氣之厚亦多死者形羸色瘁豈非所稟之薄且
多生者迹此驗之死生輕重乃臨時所感天行之輕
重也為父母者慎加保惜以膺天和不可純委於命
而尤天也特筆此以告

萬菊軒曰昔人謂在胞中饑則食母之血渴則飲母之
血余獨謂其不然蓋兒始受氣之時一月胚二月胎
不過一點精血凝結中涵生意也至三月以後其形
漸成在胞之中譬諸禽鳥之雛在卵殼中渾渾然薰

蒸滋養惟所受太和之氣漸自生長日月既足乃破其胎卵而出矣何以能飲食耶必謂有所飲食則胚胎之初形象未具何飲何食耶且血者渣滓之物有入必有出十月之前所飲所食之血又從何道出耶若生下口含惡血乃母臨蓐之時血穢流溢入兒口中未必便是先在腹中所食之血也但云兒在胞中滋養形體長育變化培植根蒂者則在母之血液也或有問曰兒在胞中饑則食母之血渴則飲母之血萬

菊軒以為必無此事驗今之初產之孩口有穢血少
頃就有黑糞從便而下是其徵也安可遽謂必無之
耶孫季子明來對曰以物理格之似無此事也兒之
胞胎在腹猶瓜菓然瓜菓賴藤樹滋灌汁從蒂入日
漸肥大成熟兒在胞胎混混沌沌懵然無知焉有饑
餓蓋藉母之湮從胞蒂而灌入臍中十月充足胞分
而出口中之穢間或有之實分娩時胞中之餘穢惡
露也大便秘糞如瓜菓中之汁水耳此必有之物殆

平時灌滲積於其中出懷之後各自立極陽升陰降
陽升者啼聲上出也陰降者大便下行也此必然之
勢亦必然之理也出懷之後始有出有入在腹胞中
安有出入之徑竇者乎格物者自能辯之毋致疑也

痘不宜毒物酵發

生生子曰痘本火毒尤因天行故發熱之初看其熱盛
便知毒重即宜解散使表裏疏通俾熱毒有門路出
也全在頭着工夫胡大卿曰小熱宜解毒大熱宜利

小便觀此可見前人慎重之意不輕易用大寒大毒之劑動其大便恐傷冲和壞脾胃也緣痘全藉脾胃尤賴冲和始能灌漿結靨所謂冲和者即胃中坤元之氣人賴之以養臟府而灌溉周身者也近觀西吳治痘罔用頭着工夫動輒便以鰕魚桑虫雞冠血虺蛇等毒物謂之醇痘習俗為常不思痘本火毒毒固宜發但當先門路未清小毒蘊成大毒茲又以毒攻毒不啻火熾添油則脾胃冲和若燎毛矣故毒發之

後痘粒粗大膿何得滿或潰而爛或噦而嘔或發癰
毒或成外剝或致泄瀉種種之禍變難悉舉豈知門路
疏通則痘縱不起發不過補助氣血而或以大成散
佐之自能行漿灌膿蓋痘粒小則漿易滿亦無變症
是曲突徙薪之法也舍此不為而徼彼焦頭爛額之
功殆亦危矣戒之戒之

戒用天靈蓋

生生子曰醫本仁術夫仁者無大無小無貴無賤無見

無隱無處不然故啓蟄不殺方長不折皆所以體天地而愛物存仁也醫之治痘逆者不治險者宜治前人方法林林種種何莫非藥何物非劑何適非宜顧乃取人之骸骨而煅煉之嗟嗟其忍心亦劇矣乎不思痘之無膿者由氣虛而血不充也補氣以氣補血以味合取其氣味之純厚者以補之則得矣如人乳紫河車鹿角膠之類皆氣純味厚者庶可以補氣血而資精神彼遺久死骸迨氣血竭絕枯朽之物猶稿

木死灰已且不能延生而又能資他人乎此必無之
理也且痘古稱天花貴清潔而厭腥臭其不可用一
也膿少由於血虛喜潤而惡燥茲犯煅煉枯燥其不
可用二也况律有禁條以無可取效之物而戕人之
遺體犯律之禁傷天之和噫操殺術也焉得仁

或曰有用之而痘立發者何謂也生生子對曰余非
謂此物不能發特慨其發之後燥毒交扇烈若燎原
正如燈卮油盡而又益之以燈心立見焦枯良可悼

夫

腎無痘辯

生生子曰諸書皆言四臟俱有痘獨腎無痘故發熱之初單顯四臟之症驗耳之冷則知腎無痘也余謂此皆臆度之言非見道之語也緣痘稟於有生之初父母之淫火伏於子之命門為天行癘氣感觸而發觀銅人圖命門穴在兩腎俞之中與臍相對秦越人謂兩腎中間動氣者五臟六府之本十二經脈之根呼

吸之門三焦之原臟府從此而生故人之所以得不死者賴此動氣以為生生不息之根有是動則生無是動則呼吸絕而物化矣夫以耳之冷熱驗痘出之輕重則可若以耳之冷而遽謂腎之無痘則不可腎既曰無痘何前人又有變黑歸腎之說由其有出斯有歸也詳古人用四牙散一方亦可見矣蓋牙者骨之餘腎之標是亦以腎補腎之意惟腎之元氣充足則其痘始能盡出且又能制伏其火而使其氣血相

依故化膿結痂而愈也腎虛則不能化漿而使之盡
出結痂則色變黑馴至焦枯而告殂矣故曰歸腎者
猶言痘本出於腎而仍還於腎也是為辯

首尾不可汗下辯

萬菊軒曰今之治痘者悉云首尾不可汗下聽者和之
曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊
不知治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得
解而已如其氣血和暢營衛流通表裏無邪其出則

盡其發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也設使外感風寒約束皮膚腠理痘出不快此當汗之令陰陽和營衛通而痘易出毒得解散可也苟不汗之則毒無從得出留伏於內未免閉門留寇之禍矣如大熱不退煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻塞此毒留於腸胃之間與穀氣併宜急下之使臟腑疏通陳莖滌去可也苟不下之則藏毒畜毒煎熬於中寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹守病機各司

其屬有者求之無者求之必先五勝疏其血氣令其條達而致和平此之謂也

審証

孫季子朋來曰治痘先須審証痘固胎毒必假天行令氣或內傷飲食激而發也發熱之初預當明其輕重蓋熱輕毒輕熱重毒重也設熱既重便宜察其表裏外感內傷內傷為裏夫痘全藉脾土以為依歸脾為倉廩五臟皆仰給於脾外主肌肉行漿灌膿結痂皆

在肌肉脾既受傷則內熱蘊悶或腹疼嘔惡急宜消
之重者下之使裏無壅遏則熱自退神自清也內傷
不急治六七日後痘既外出腹中虛矣內傷之物因
而瀉痢則不能灌膿而成內陷外感風邪即宜清解
若頭項痛腰脊強便知為太陽經表症若鼻乾不得
眠口渴便知為陽明經太陽以防風羌活寒月麻黃
桂枝陽明升麻葛根之類古人云必使一晝一夜汗
出熱退為佳蓋腠理疏通則痘易出易壯遲則熱燒

地盤腠理緻密熱無從出出必稠密或蘊成癍由解散不清縱然發出日後灌漿必咳嗽聲啞嗆喉外刺可不謹之於始哉觀乎古人呼為痘瘡以其形圓而肖荳也荳喜土鬆滋潤則易出易成熟初出最嫌土燥成熟尤怕濕淫燥則難出濕則潰爛故治痘亦如之若熱盛毒重神昏足冷者即於前解散內消之中大加解毒故曰六日以前解毒為主六日以後補託為主過六日則大事已定救無及矣是以貴在審証

勿失時也 右審症

總驗部位

內經曰諸瘡皆屬心火心之華在面痘瘡之候但以面之部位占之思過半矣痘本火毒火性上炎諸陽皆上聚於面吉凶善惡尤易見也額屬心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角部位先見紅點先作漿先結痂者此惡候也蓋心為君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危死殆速矣左臉屬肝木右

臉屬肺金如兩臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊
其肉腫硬者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄相
離故不治也頰屬腎承漿橫抵兩頤先見紅點先發
先痴者吉此位雖屬腎然三陰三陽之脉皆聚於此
陰陽和故無虞也鼻雖為肺竅而準頭則屬脾土若
準頭先出先痴者凶蓋四臟皆稟受於脾毒發於脾
則四臟皆失所資殆土敗則四臟皆相隨而敗故延
綿日久而後斃也腎之竅在耳又心之用亦在身心

者少陰君火也而少陽相火之脉行乎耳之前後凡在耳輪前後先見紅點者凶蓋君相二火互發燔灼之勢難以撲滅惟口唇四圍先出先起先痂者大吉緣陽明之脉俠口環唇胃與大腸主之無物不受殆猶海也乃多血多氣之經故曰大吉也

驗面

發熱之時面色明瑩者吉赤若塗胭脂者凶此邪氣拂鬱於陽明胃與大腸也陽明經上循於面熱盛故赤

也宜清涼解毒稍通利之面垢慘黯者凶面垢者少
陽候見也邪熱拂於少陽甚則面微壅宜表裏雙解
蓋少陽從中治也

驗耳

腎通竅於耳故耳以候腎也腎臟屬北方天一所生之
水受氣之初先生兩腎如苙子離泥兩邊分開之瓣
也痘疹發熱耳獨涼者瘡疹屬火外邪不干於腎故
也如耳熱是邪干於腎毒不發越則反有歸腎之變

凡觀痘瘡先看耳後有紅縷者蓋少陽三焦之脈從
臚中上出缺盆繫耳後直上出耳角紅者火色也此
瘡疹之火發從少陽故色先見於其經也凡痘自耳
先出未及成漿耳輪先靨者此漸萌歸腎之勢多凶

驗目

目者心之使也神所寓焉發熱之初觀其兩目神倦不
欲開者痘也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心
故候見於目也目赤者熱甚也心惡熱急解之經云

肝開竅於目瘡疹發熱目連劓者肝有風也風入於
目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劓
也目直視者肝有熱也熱入於目牽其筋脉兩眦俱
緊不能轉盼故目直也得心熱則搖者風火相搏也
痘疹發搖此其常候但瀉心肝二經之火搖止則吉
不止則凶五臟精華皆上注於目痘瘡之毒發於五
臟毒之甚者目必受之故前人註有護眼之法良有
深意凡兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無痘宜服

瀉肝火之藥蓋眼中之毒常在收靨不齊之後方有
如痘入目成膚翳者切不可用點藥恐損睛破腫成
廢人矣痘瘡收後目不開者肝熱則目澁不敢開明
暗昏然心熱見明則合見暗則開謂之羞明此有餘
熱在心肝也如瘡未成膿腫消目開者瘡已過期收
靨不齊目閉不開者瘡壞欲變目上竄者心絕也直
視不轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞑者
氣脫也血芻瞳子者火勝水竭昏死候也

驗鼻

鼻為肺之竅痘疹發熱之初噴嚏者火邪上干於肺外
應於鼻而痒則嚏鼻乾黑燥者火刑於金金體本燥
得火反甚急宜清金瀉火以解其毒鼻衄者血得熱
而妄行故衄出於鼻急以涼血瀉火以解其毒鼻流
清涕者疹也疹發於心心肺相連以火煉金熱極而
反化為水也痘出之後鼻塞不通者熱也痘已成漿
收靨之時鼻塞不得息者此鼻內有瘡膿涕粘結可

用金銀小管子以通之如痘未成漿鼻端先乾者凶
內經云臟真高於肺以行營衛陰陽也邪火刑肺肺
敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻營衛不
行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死矣凡瘡變壞鼻
中血出者鼻孔開張喘急者肺絕之候皆死症也

驗唇口

脾之竅開於口其華在唇四白發熱之初口中和唇色
紅潤者吉如口燥唇裂其毒必甚急解之痘出稠密

唇口痘子相粘諸痘未發此處先已戴漿諸痘未收
此處先已焦黑者凶面痘腫灌唇上痘裂成塊乾澀
者重如痘出太密口中氣臭者臟腑敗壞故臭出於
口也痘欲變壞唇上縮者脾絕也唇下自呷者魚口
也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治

驗手足

四肢者諸陽之本痘出欲踈其發欲透其靨欲齊如應
出不出應發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達

四肢也發熱手尋衣領亂捻物者肝熱也手搯眉目
鼻口者肺熱也手足搐搦者心肝風火相搏也各隨
其臟而瀉之足涼者此常候也足冷手亦冷者脾臟
虛也四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃能
至也脾虛不能為胃行其津液故冷耳宜溫之痘已
出手足多水泡者此肝勝脾衰為鬼賊宜急治之不
久便生痺癩也如遍身皆發手足不透是空殼者此
脾胃虛弱津液耗竭營衛凝澁故其毒亦鬱而不發

也不能食者死能食者必發癰疽痘勢太甚手足冷者不治痘未成漿手足皮脫者必死痘已正靨惟足不収者足為純陰無陽相濟所以収遲如痘始成漿他處未収手足心先靨者其後必生怪疾也痘靨之後手足關節腫痛者必發癘也痘痒手足搔亂者凶

夾斑

斑者血之餘有色點而無頭粒隨出隨沒者也丹則成片赤如雲頭而突皆血太過而氣不及營衛失護致

血任三焦浮遊之火散漫於皮膚之間耳宜以輕劑散其火邪兼活血解毒之藥治之並用玄參升麻湯加石膏黃芩荆芥芍藥芍歸或升麻湯加紫草蟬退多磨犀角汁化下烏金丸又或結痂之後而發者餘熱煎熬肉分其斑必爛宜解毒湯加歸芍黃芩石膏甚則大連翹飲爛處以生肌散敷之無不瘳矣至若青黑紫斑乃毒氣不能發泄之故死生一反掌間耳急與四順清涼飲利之其斑既退即以四君子湯加

黃耆薑棗煎服如不止再加肉果須要預煎候之俟
斑退血附即服庶可免其內陷也大抵斑在發熱放
標起脹時多用表散在灌膿收靨時多用解利遍身
通紅者治同

發斑有二陽毒發斑者壯熱渴躁兩目如火脉洪有力
其色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下之早故
熱乘虛入胃一則下之晚故胃熱不得泄皆內外挾
熱而發斑也當服玄參升麻白虎等湯陰症發斑者

身無大熱手足指甲俱青脉沉細而急其色微紅或
暗晦此無根失守之火聚於胃薰於肺傳於皮膚而
為斑也若妄投以涼劑則誤矣當與升麻鳖甲湯調
中温胃而斑自退

夾疹 疹即麻也

痘毒出於陰疹毒出於陽陰主血故痘有形而灌膿結
痂陽主氣故疹有色而不膿痂此皆有生初之淫火
伏於命門之間本非尋常並發者惟痘出之時或天

行所激觸動其毒故並出耳此亦不順之症也故急宜清散先服升麻葛根湯如不解則犀角地黃湯內既清涼則疹亦隨之而解矣

錢氏云痘疹只出一樣者善凡痘已見形其間碎密若瘡子者此夾疹也由火毒薰灼於中故使疹挾出於外也急宜解毒使疹消散痘得單成可也宜荆防解毒湯主之若服後而疹不退者凶之兆也夾斑治同膚疹者熱毒之氣發越而然也暴出之時點如麻狀但

色鮮赤成片耳用敗毒散毒當隨散越數日而痘出色
痘反稀疎

劉宗厚云癰疹多屬脾隱隱然在皮膚間而名之也發
則多痒或麻木不仁者是兼痰兼濕之殊也色紅者
兼火化也用解毒防風湯若內傷外感而發者用調
中湯

夾沙

亦麻類粒頭瑣碎吳地呼為沙
子其狀如夏月膚腠之痱子

沙之形如粟一般尖員而硬中含清水夾痘而出者亦

熱毒之所發也用四苓散加防風黃芩分利陰陽而
痧自退矣

夾疥瘡

痘夾疥瘡而出則血氣為瘡所奪痘多不能起發成漿
須連服內托散庶無坐陷之患也

乾枯黑陷紫陷

朋來曰凡黑如烏羽者生以其熱雖熾而血尚活治以涼血解毒可

愈也黑如焦煤者死無生氣也故不治

痘色初見深紅者必變紫紫必變黑紫黑必至於乾枯

皆血熱乾滯而氣不能運行一定之理固如此也治
須以涼血清熱為主者其微甚或利大便或利小便
或為解散頂雖平陷不可以氣虛而例用參芪補劑
益補氣則熱愈甚而血愈涸也宜以絲瓜化毒湯加
當歸紅花連翹牛蒡更以麻黃解毒湯發散其毒或
以紫草湯化下小靈丹或燈心湯化下大靈丹有黑
疔者針挑破去其毒血兼用扶脾實土之藥古方有
燒人屎者有用四聖散者有用人牙散獨聖散者有

用雞冠血酒漿灌之者有用胡荽酒塗其遍身并衣服薰之者有用壁間蟥蛛如荳大者研爛入雄黃每歲一釐同研勻酒調服者有用黃連犀角清心火者已上皆可擇用如宣風散百祥丸牛李膏內有大戟與牽牛峻利之藥元氣盛尚可虧損况痘後之兒尤當慎之

黑陷二種因氣虛而毒不能盡出者酒炒黃耆紫草人參黑陷甚者亦用燒人屎

白陷灰陷

朋來曰察其乳食少進二便清利者為寒法從溫補

痘色白者必變為灰慘灰慘者必變為平伏倒塌此雖氣虛而血不華色血亦虛也故當氣血兼補使血活氣行則白色可變為紅庶或可救若單用補氣之藥則氣燥血虛必致發痒抓破灰慘平伏倒塌為不治之症矣治宜補中益氣湯合四物湯有內熱者加解毒藥白陷抓破皮薄乾燥而極痒者皆由失於補血以致氣虛則燥然也

內潰

心鑑曰內潰者胃爛也蓋因風寒所中腠理固密陰陽二分壅塞不通其毒內攻而臟腑之間毒火炮熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也識者於痘未出之時或有風寒阻隔氣粗熱甚身必戰動肚腹急痛謹防此患以敗毒散或升麻葛根湯逐散寒邪開泄腠理縱毒外出必無是症

痒塌

痘瘡痒塌令人總歸之氣血虛寒殊不知亦有氣盛血熱而然者須從形色及他症辯之如痘色淡白精神虛怯小便利大便頻至夜痒甚者此脾氣弱而氣血均虛也參芪內托散及四君子湯加黃芪肉果官桂白芷蟬退主之甚則陳氏木香散佐之如瘡色紅紫煩躁大小便不利渴欲飲湯水甚至抓破血流者此氣虛血熱毒盛血行氣分血味醎醎螫皮肉而痒也四物湯加參耆連翹蟬退白芷甘草及三味消毒

飲加紫草連翹主之血流者敗草散蕎麥麵炒黃土
摻之 又遍身痒甚抓破者不問前後皆服蟬花散
外以乳香或敗荷葉茵陳燒煙薰之 若穢氣衝觸
作痒抓破者宜服內托散外以辟穢散薰之然發痒
精神清爽自知其誤欲人拊摸者吉若悶亂不寧者
搖頭扭項手足舞亂言不聽禁不止者凶也

羣玉曰痘疹發痒如能食而大便堅結者此邪氣內實
正氣外虛也加味四聖解毒湯治之外用升麻蒼朮

麻黃槐柳桑皮煎熱拭之 如泄瀉者此正氣內虛

邪氣外實調元托裏治之外用山茵陳白艾二味為

末燃火薰之如用上二法而痒即止者吉痒不止而

反甚者凶也

心書曰痘瘡作痒者火邪傳於肌膚之間不能即出或

血方流行而為風寒外束故鬱滯而作痒與傷寒汗

不出而作痒相同法以荊芥穗束之以紙而刺痒痘

之項以散鬱邪其痒即止驗之如神內服消風火化

毒湯以解之 以上痒症痘家之惡候茲錄各家治法驗甚者以備緩急參用

目睛露白

人之一身必元氣固則精血為之凝聚而瞻視有常也若元氣虛損則衛氣受虧是以督脉縮促致睛上吊而露白也若謂之風則謬矣遇此候別無他証者可以保元湯加陳黃米主之無魂失志不省人事者不治雖無他証而或見於七日之前則毒尚未解而氣

血已離必不可治之症也

聲啞

心之氣舉擊於肺而為音肺清則音清肺熱則音啞此必氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也須分順逆為治如七日之後失音者乃內痘先熟而先靨則咽喉漸寬毒氣漸消聲音自亮為順症也若七日之前失音者此毒氣薰蒸失於調解致肺竅不通閉塞管籥毒無從洩內痘糜爛舌齟成坑咽門腐壞馴至呼吸俱

廢為不治之症矣或有內本無痘因食辛熱之物或多服熱藥所致者急用甘桔湯射干牛蒡湯加玄參連翹犀角治之或能言聲不清者此火乘於肺也瀉白散加天花粉桔梗石膏片苓茯苓麥冬山梔治之或感風寒閉塞而聲不清者參蘇飲加桑白皮杏仁石膏主之如法治之而效者吉否則凶

水噎

喉之竅若管籥然痘之初出細小不覺及肌表之痘成

欽定四庫全書

赤水元珠
卷二十七上

漿則內痘亦成漿而其毒壅於會厭然是乃飲食所進之處故飲湯水不易進納則溢入氣喉而發噎也若穀食有渣自能咽之從食喉而下非如水溢以犯氣道矣七日後見者不藥而愈何也外痘靨而內自痊矣若七日前見則為逆症由熱毒壅塞不能發於肌表故耳治用甘桔湯合解毒湯加牛蒡玄參荆芥麥冬若預以甘桔湯清其氣道安致有此患哉

驚搐 附癩癇

心者神之舍也痘毒本熱熱氣擊動心神肝不能制故神不安而發驚搐治宜瀉肝利小便蓋瀉肝則風去利小便則熱除風熱既退則痘出而驚自愈矣故痘未出而見此症者則升麻湯合消毒飲主之或紫草膏或蟬酥丸不可竟投涼劑蓋心一涼則氣血隨斂毒無從出也痘既見而有此症由熱毒之未解耳四苓散合消毒飲或紫苓湯或導赤散若風火相搏喉中痰鳴目睛上視面赤引飲喜居冷處者紫苓湯或抱龍丸若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搐必面黃潮熱大便秘臭泄不調或吐利腹痛宜紫霜丸下之大便秘者四順飲痘後毒當盡解而又發驚則心氣已絕神無所依必不可治 發癩癇者粉紅丸治之

欽定四庫全書

赤水元珠
卷二十七上

痘後手足麻木無汗者參附湯若手足難動常出汗者芪附湯 卒然驚仆不省人事者用皂角為末吹入鼻中即甦古謂先痘後驚者不治痘正發而有此症

能不為之可悼哉

又痘未出毒氣內逼目上竄驚叫如驚風者乃痘欲出之候也若誤認為驚而治之則毒氣內蓄邪熱不洩而反危矣

煩躁

心經有熱則煩躁蓋痘毒之熱擊動心火脾少津液不能濟之此所以發為煩躁不寧悶亂狂言等症也治當觀其虛實何如痰實壯熱者梔子仁湯或解毒湯

或辰砂益元散二便秘則通利之虛煩而渴者保元湯加麥冬五味或麥門冬湯夏月暑甚煩渴而痘出不快宜辰砂五苓散靨後發熱煩渴麥門冬飲子此症似輕而重苟服藥而久不愈則心脾二經皆為熱毒所傷矣煩則必渴渴則必瀉瀉則必咬牙寒戰而痒塌之患立至也慎之慎之

秋傳曰痘瘡以安靜為貴但有煩躁者必毒氣壅併表裏不寧宜審諦之如搔爬不停者痘痒也不寧者裏

熱也呻吟者痛也非折肱之妙手安能識其病而起其症哉

發渴

渴者胃中熱也胃中津液為熱所耗故渴而飲水也始終固有用白虎湯加天花粉乾葛甘草然有汗加人參或辰砂六一散小水不利者四苓散氣虛保元湯加麥冬五味至於陰虛火動而發渴者固為難治之症理辯則謂六味地黃丸加桂心五味子乃治虛渴

之聖藥也不可不知

痘疹心書曰毒氣萃於陽明此時多發熱渴熱淫於內而外不得宣通故發渴也宜神功散服後猶渴者宜紅花子一味煎湯飲之如無子即用紅花湯加牛蒡子服之此藥神妙能散胃口之瘀血故也切不可用荔枝黑棗椒薑等湯以助陽經之熱

噯氣

熱毒鬱於胃中欲發而不得發故噯氣治用半夏生薑

湯加陳皮黃芩或四苓散加陳皮竹茹以利之

不食

痘瘡始終以脾胃為主若飲食如常者此臟腑充實脾胃完固不消服藥若不喜飲食者必須辯別而治之如泄瀉痘色灰白而不食者此脾胃虛而元氣弱也宜四君子湯或人參養胃湯七珍散治之如大便秘瘡掀腫不食者此毒盛而血熱也宜四物湯加解毒藥熱甚者加薑炒芩連便秘者下之萬氏云痘瘡不

怕稠密只要能食

汗多

汗乃心之液由熱氣內蒸腠理開泄故液隨氣而出也
自汗盜汗俱能虛人未漿之時恐不能灌既灌恐不
能屬既屬恐血脫陽虛變為他症最宜調理自汗宜
保元湯加桂枝白芍浮小麥以斂之有熱加酒芩盜
汗宜當歸六黃湯或當歸湯丹溪曰自汗不妨蓋濕
熱薰蒸而然也此特為汗少出者言身若汗大出身

冷惡寒寧不早為之治乎此宜異功散救之寒不已者死 汗綴如珠者死 汗而昏沉者死 汗而煩渴者死不可不察

諸失血

夫血熱則妄行蓋熱毒之氣淫佚無歸則血亦隨之而走泄也始終用犀角地黃湯加芩連梔子白芍但血之妄行或吐或下或從陽瘡痘毒而出者悉皆不治何謂也吐便者有傷於內也瀉膿血如死肝豈汁者

胃爛也從瘡毒而出者內分空虛而元氣為之走泄也鼻衄者生蓋血隨毒行傳注督脉斬關而出不犯其內故耳至於女人失血不止尤當急治嘗有一男子口鼻出血數碗以韭菜汁半碗頓服而愈

陰囊發腫

痘症陰囊腫痛如瓠瓜者乃膀胱熱甚毒氣流於小腸而然也急宜清利退火滑石木通車前牛膝梔子瞿麥燈心甘草水煎服或紫草飲子小便不利者加木

通外以石燕子醋磨濃汁敷之

痘後浮腫

痘靨之後失於調理或傷飲食或感風濕致傷脾土濕勝而為腫也傷於食以健脾加山查麥芽平胃之類虛者加人參俱以淡滲之劑佐之傷風濕者平胃散加防風羌活汗之水腫者以五皮飲消之一方用蘿蔔子殼蒲蘆煎湯洗之立消又法柏樹葉桑樹葉煎湯洗亦消

驗動靜

凡痘以靜為貴內有不和則動凡靜屬陰而動屬陽痘之為症陰陽俱病但息欲其勻語欲其少寐欲其安寤欲其寧觸其瘡則吟拂其欲則鳴飲食二便如時此平人之候是謂靜而吉也如呻者身有苦也自語者神不清也喘粗者內熱也腸鳴者泄也坐卧不寧者心煩也啼叫不止者痛也搖頭者風也指欲搔者痒也燕物難者咽痛也咬牙者心肝熱也若悶亂躁

擾譖妄昏眩如見鬼狀搖頭扭項手舞足擲目睛上
視寒戰咬牙語音不出皆為死候如病向靜忽然擾
動者異也須細察之痘色變而無他候者辰氣觸之
也痘色不變又無他症此必有因但俟自定其有目
瞑息微四肢僵直口噤痘壞昏睡不省者此真氣將
脫魂魄欲離之兆又不可作靜看也

稀痘仙方

牛黃錢

錢

蟾酥

分

辰砂

分

絲瓜蒂

近蒂取

五寸

燒存性

五錢
為末

每一歲服一分沙糖湯調下

兔紅丸 服此可免出痘

辰砂 甘草 六安茶 各等分臙八日午時取生
兔子血為丸梧桐子大逢三六九與兒食之

鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸穢用鹽醋爛煮與兒食之
痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對他言知但只
可自設法取用不可用他人取討者恐防毒藥死的

慎之或只用砂仁白水煮不用椒葱蒜韭并油煎等
辛辣熱物若未食葷兒與食尤妙此屢試屢驗者

四脫丹

蟬退

蛇退

鳳凰退

即哺出
雞子壳

神仙退

即父母
爪甲

右各等分焙為末每服一錢煉蜜為丸菴豆大每
年除夜服服三年永不出痘

玄兔丹

玄參

酒洗
五兩

兔絲子

水淘淨酒煮
研爛為末

右二味俱不犯鉄器為末黑沙糖為丸彈子大每日與兒服三丸沙糖湯下

葫蘆花湯

八月採葫蘆花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兒或不出痘縱出亦稀少

苦楝子湯

苦楝子不拘多少煎湯浴兒或痘瘡不出出亦稀少

三花丹 將出之時用之能稀少

梅花 桃花 梨花 取已開未開盛開者陰乾為

末等分取兔腦為丸雄黃為衣用赤小豆菴荳黑

大荳三荳湯下

六味稀痘飲 將發痘預服之

山查 紫草 牛蒡子 各一錢
防風 荆芥 各一錢
甘

草分五 薑三片水煎服

輕斑散 治痘未見點時服之

絲瓜 近蒂三寸連皮
子燒存性為末 硃砂分五
二味和勻沙糖調下

痘出必稀多者少少者無

稀痘如神散

絲瓜 升麻 芍藥 山查 黑豆 赤豈

酒炒

犀角用磨 各等分每服三錢水煎服不拘時看大

小加減

預服萬靈丹 初發熱一服即輕百發百中

升麻 三者 葛根 甘草 分 紫草茸 兩 蟬退 殭蠶 洗

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

連翹 白附子 山荳根 全蝎 雄黃

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

炒各三錢

麝香

錢一錢好
酒煮化

蟾酥

一錢好
酒煮化

右十二味和拌為丸皂角子大每服一九紫草湯

下

發熱有數種

生生子曰凡痘疹發熱與傷寒傷風傷食驚風等相似
先當辨明傷寒之熱手足稍微冷無汗惡寒面色青
慘不舒左額有青紋傷風熱手足稍微濕自汗惡
風面赤而光二者皆太陽症俱頭項痛腰脊強傷

食熱目胞腫右額有青紋身熱而額腹最甚夜熱晝
涼面色黃或吐利腹痛 驚風熱面色青紅額正中
有青紋手心有汗時發驚悸 痘子之熱必顯四臟
之症耳熱冷中指冷尻冷面燥腮赤呵欠頓悶乍涼
乍熱多睡咳嗽噴嚏驚悸吐利 夫發熱者瘡疹常
候也但熱微毒微熱甚毒甚微者勿藥甚者必宜及
早清解原痘無逆險只在發熱之初調治之早觀其
熱重神昏即以清解之劑投之或發表或攻裏法在

不避必使一晝一夜表裏通和熱退為佳蓋毒解則
熱始退熱退痘出自然稀疎明朗若不早為疎通表
裏則毒無出路雖小毒釀成大毒迨及出齊則順逆
險已定順者幸而無虞逆者無所措手矣古無順逆
險之名稱順逆險者自魏桂岩始也

初發熱三朝証治活法

凡發熱疑似之間宜投人參敗毒散一劑發之是與不
是一發便見萬菊軒曰大抵痘疹只宜發盡勿使留

伏於中

凡用發表之劑務察天時不可固執只宜平和之說極
為誤事設遇冬寒及春行冬令之候腠理緻密血氣
凝澁痘必出遲遲則蘊熱熱不得汗毒莫能洩必多
壅遏之變急宜辛熱之劑發之桂枝葛根湯或五積
散去乾薑

如天時熱則腠理疎豁氣血淖澤防其發洩太急恐
罹潰爛之變必以辛涼之劑解之宜升麻葛根湯雙解

散之類 如春秋天時溫和 不寒不熱 只以人參敗
毒散最佳

保嬰丹 熱甚者用之 捷效 或就於前解散藥化下一
丸 能令重者輕輕者少 以其極能解毒也

初發熱時 飲食二便如常 精神清爽 痘必稀少 不須藥
初發熱時 渾身壯熱 焮焮然 不渴 清便自調 此邪鬱在
肌膚之間 宜輕揚之劑 發之 升麻葛根湯 甚者羌活

湯

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便赤大便秘煩
悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表通裏雙解散
主之

初發熱時表不甚熱煩躁不安口渴小便赤澀熱在裏
用紫草膏保嬰丹辰砂六一散犀角山豈根之類清
解之甚者三黃丸微利之

初發熱時腹中痛者此痘毒與穀氣相併急以麥芽山
查紫蘇枳實砂仁陳皮溫而消之若腹脹硬痛大便

秘者備急丸下之

初發熱時咳嗽鼻流清涕參蘇飲主之

初發熱大便秘結急宜潤之恐熱毒內蓄宜紫草飲必
使大便通利為好

初發熱嘔吐者要明外感內傷 外感者二陳加柴胡

藿香生薑枳殼和而解之 內傷者二陳加藿香砂

仁麥芽山查枳實蘇梗白芷消之 胃弱而吐者六

君子湯有毒氣上衝大吐不止者辰砂六一散甚者

加石膏蘆根湯亦佳

初發熱作瀉腹中不痛原無內傷者此痘內動與外邪搏激所致不必治瀉但以輕揚之劑升發之痘出而瀉自止

初發熱自汗自吐自瀉者乃毒從上中下而出皆為吉兆但只在三日內裏不可多日恐元氣虛脫也

瀉有冷熱熱瀉者口渴小水少而身大熱四苓散加木通若乾嘔加薑炒黃連或六一散 冷瀉口不渴小

水清重者理中湯輕者參苓白朮散久瀉者荳蔻丸
初發熱二三日間有驚搐者導赤散羌活湯辰砂散
大便秘者三黃丸微利之 小便赤澀者導赤散
渴甚者葛根解毒湯 腹中痛者桂枝大黃湯 腰
痛者人參敗毒散 自利者黃芩湯 吐利者黃芩
加半夏湯 如脾胃素弱自利清白者理中湯丸或
四君子湯荳蔻丸合而服之

凡發熱及初見標時須問咽喉疼否但有微疼急清解

之甘桔湯加牛蒡子 大抵痘要解咽喉為急務不
早防以致失聲乾嘔水穀不入搶喉噴吐治無及矣
管氏曰發熱之初痘之吉凶皆兆於此故急宜表汗使
臟腑胎毒及感不正之氣盡從汗散則痘出自然稀
少蓋熱甚毒甚熱微毒微不必治妄汗則表氣一虛
痘不能起發反為害也盛者汗之要在身熱盡退為
佳其有一切雜症皆由毒氣欲出不能故身一表散
則毒氣盡洩諸症自退矣或有當解者解之當下者

下之切不可執一也胡氏曰表熱壅盛非微汗則表不解裏熱壅盛非微利則裏不解正此之謂耳失此不治則毒氣漸盛而逆症隨見世人多忽於此及見逆症而後治之將何及哉

大抵治痘之訣妙在三法曰發表曰和中曰解毒知此三者於發熱見標之際預為之地則多可少重可輕自無以後變症故發表最先蓋痘疹只要發得毒盡不使留伏於內凡發表必兼解毒非發表之外另行

解毒也痘既已出不渴不熱表裏無邪不須服藥如
痘多毒盛裏實能食可單用解毒如裏氣不和或吐
或利於和中法內畧兼解毒若毒輕痘少惟裏不和
胃氣虛者只用和中則不必解毒也每發表須辛甘
清陽之劑羌活防風升麻白芷桂枝之類和中須甘
溫之品如人參當歸甘草芍藥之儔蓋中不足甘以
補之解毒須苦寒之輩如牛蒡連翹葛根芩連梔栢
紫草之類蓋毒者火也凡用苦寒之劑必要酒炒可

以活血達表且不犯胃氣切宜識之

痘宜依期施治貴通變

翁仲仁曰夫痘由中以達外用藥因期而變通以其尚未見標必發熱三日然後見標出齊三日而後起脹蒸發三日而後灌膿漿滿三日而後收靨發熱之初耳尻中指俱冷耳後起紅絲呵欠噴嚏眼目困倦兩顴之間有花紋見者預知其為痘也發熱三日當托裏解表使其易出亦有氣弱而不能出者當微補其

氣氣和則出快初不可用芫苢膝理密而難出也四
五六日以清涼解毒為主清涼則無血熱燥毒之患
解毒則無壅滯黑陷之害七八九日以貫膿為主治
法當溫補氣血氣血流行而成漿自易也十與十一
二日以收斂為主大和氣血補脾利水則自然結廕
此特語其常也蓋常者可必而變者不可必當隨候
參詳安可執藥以應無窮之變哉言見紅點之時如
痘輕少不可過表在後恐成斑爛或乾紅紫色急宜

疏利不然在後必成黑陷四五日之內痘出至足心
為齊苟未盡出於解毒之中宜兼發散若專於寒涼
則痘遲滯不出七八日之間毒未盡解於溫補之中
又兼解毒若偏於燥劑則毒盛不能化漿也十一二
日之間漿未滿足必大補氣血畧兼解餘毒不然恐
有癰毒溫疤之患此變通之妙要在隨時制宜也

人參敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 桔梗

白茯苓

人參各等分

甘草減半

生薑三片水煎服

一方加薄荷少許

參蘇飲

人參

三分紫蘇葉

桔梗

乾葛

前胡

各四分

陳皮

茯苓

各五分

枳殼

三分半夏

二分木香

一分半

生

三片水

煎服

升麻葛根湯

葛根

升麻

白芍藥

甘草

各等分

水煎服

雙解散 即防風通聖散益元散二方也

防風 川芎 當歸 白芍藥 薄荷葉 大黃

連翹 各五分 石膏 桔梗 黃芩 各八分 白朮 桂枝

荊芥穗 各二分 滑石 二錢半 甘草 一錢 生薑三片水煎服

桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草 各一錢

生薑三片淡豉一錢水煎服

保嬰丹

紫草茸

酒洗忌
鉄四兩

纏苴藤

燒存性
四兩

荆芥穗

防風 升

麻 大力子

炒各
二兩

天竺黃

一錢
雄黃一錢

二分如无真者
二分代之

牛

黃

一錢
半

辰砂

用麻黃荔枝殼
紫草煮過再飛

蟾酥

自取真正者
一錢二分

赤小

苴

萊苴

黑苴

各四十
粒炒香

甘草梢

去皮
二兩

加紫草三兩

水熬成膏半碗沙糖半碗煎藥俱淨末和為丸

圓眼核大辰砂飛過為衣未出之先濃煎甘草湯

每服一丸大兒加一丸凡遇發熱之時生薑葱白

湯化下厚蓋表汗乃解毒之神藥

心要羌活湯

羌活 川芎 防風 山梔子 龍膽草 當歸各

分 甘草減半 薄荷葉三片 淡竹葉五片 水煎服

紫草膏 治紅紫黑陷熱毒

紫草茸 白附子 麻黃去節 甘草各五錢 全蝎八枚炒

右為細末用蜂蜜一兩酒半盞先入紫草煎熬成膏旋入各藥丸如皂角子大每服一丸仍用紫草

湯化下 如治驚搐用金銀箔為衣薄荷湯下

六一散

桂府滑石

飛淨六兩甘草

去皮一兩

每用一錢燈心薄荷

湯下

內加制辰砂三錢名辰砂六一散

治狂

言妄語驚搐用防風荆芥薄荷天麻煎湯候冷調下
本方加鬱金名牛黃六一治痘後瘡癩癰毒
及天行瘟疫冷水調下多服大效

退火丹

治痘初出標大熱不退或稠密成片者神效

六一散一料加雄黃

飛過三錢

纏莖藤燒存性一錢外用

紫草木通蟬退地骨皮紅花大力子羌活片苓燈
心煎湯候冷調下極能解毒稀痘

四苓散

白朮 赤茯苓 澤瀉 猪苓

右為細末每服一錢

三黃丸

黃芩錢五黃連

大黃各二錢半

為細末雪水搗丸棗莖

大辰砂為衣每服五七十丸燈心湯下

備急丸

木香

二錢半

大黃

黑土頭末

各五錢

為細末神麩糊

丸菴荳大每服五七丸山查湯下

甘桔湯

甘草

二錢桔梗一錢

水煎服

三荳湯

赤小荳

黑荳

菴荳各一升

甘草三兩

三荳用水淘

淨用水八升入甘草同煮荳熟為度逐日空心面

東任意食豈飲汁服七日永不出

代天宣化丸 即韓氏五瘟丹也

甘草

甲巳年
君土

黃芩

乙庚年
君金

黃栢

丙辛年
君水

山梔

丁壬年
君木

黃連

戊癸年
君火

連翹

佐

山豈根

佐

牛蒡子

佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥加一倍
臣減半佐又減半共為末冬至日修合取雪水煮
升麻汁打麵糊為丸辰砂為衣竹葉湯下

五積散

白芷

川芎

各三分

桔梗

半一分

芍藥

茯苓

炙甘草

當歸

桂枝

半夏

各五分

當歸

桂枝

半夏

各二分

陳皮

枳殼

麻黃

各五分

蒼朮

分 蒼朮

錢一分 厚朴

四分

右除桂枳殼二味為粗末外十二味為末慢火炒

令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半生薑三

片煎一盞溫服

辰砂散

辰砂錢一絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性為末蜜水調

服多者可少少者全無絲瓜解痘最妙 紫草甘
草湯調服尤佳

連翹湯 總解諸毒散風清熱痘後一切發熱癰毒赤腫

連翹 防風 瞿麥 荆芥穗 木通 車前子

當歸 柴胡 赤芍 滑石 蟬退 黃芩 山梔

子 甘草各五分 紫草五分 水煎服

連翹升麻湯

連翹錢一 升麻 葛根 桔梗 甘草各七分 木通分八 牛

茅子錢

白芍藥

分五薄荷葉許

淡竹葉燈心水煎服

消毒飲

治咽喉腫痛上膈熱盛

一方加升麻

牛蒡子

炒二錢

荆芥

錢一甘草

防風

各五分

水煎服

翁仲仁十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤毛焦

色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡臥

不寧小便赤澁此熱盛也並皆治之

歸尾

生地

紅花

丹皮

赤芍

桔梗

木通

大腹皮

連翹

川芎

此方治血熱痘疹以涼

血活血為主佐以桔梗川芎有開提發散之功引
以大腹皮木通有疏利熱毒之效誠以連翹丹皮
有解毒之良用此以治血熱痘疹則能內外分消
熱毒雖盛庶幾解散表裏自然和平矣古人用黃
連解毒湯恐驟用寒涼不惟水伏熱毒及出不快
抑且熱毒為其所抑則鬱於臟腑或肚痛腹脹內
潰而死者有之豈若此方用之為穩當若不得已
而用黃連芩柏亦須酒炒一以製其寒涼之性二

以助其上行之勢借連栢以解毒耳

加減法

身熱壯盛加葛根
毒盛綿密加荆芥鼠
渴加天花粉竹
粘子葉滑石

小便血加犀角
大便秘加犀角
或桃仁
吐血乾嘔加黃連
犀角

發紅斑加犀角
黃芩黃
小便赤加山
小便短澁加猪苓
澤瀉

小便秘加滑石
大便秘加枳殼
嘔加橘
泄瀉加猪苓澤
瀉防風

大便秘喘加枳殼
前胡
煩躁加麥門冬
煩渴狂亂譫語加
天花粉

知母門
冬石膏
嘔吐加猪苓澤瀉
咽喉痛加甘草鼠
粘荆芥

以上並用燈心十四根水煎服

羌活散鬱湯 專治實熱擁盛鬱遏不得達表氣粗喘
滿腹脹煩躁狂言謔語睡卧不寧大小便秘毛豎面
浮眼張若怒並有神效并為風寒外搏出不快者同
治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮 川

芎 連翹 甘草 紫草 大腹皮 鼠粘子

右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所抑或
肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不
得引毒達表循竅而出則熱毒擁遏於內為腹脹為
喘急為秘結為狂煩為驚搐為失血皮燥毛直面急
眼脹睡卧不寧驚啼多哭此熱毒擁遏之症辨認不
差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱
毒不擁而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散
解毒之長桔梗有開提勻氣之能荆芥連翹鼠粘善

解鬱熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟腑
紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消
用此以治熱擁之症效大而功用極妙若驟用寒涼
如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越逗遛
經絡為疽為癰者有之冰伏硬閉者有之至於人參
黃芪白朮茯苓溫補之劑誤用則其擁盛禍不旋踵
他如丁香桂木香薑附之類以熱攻熱殺人立至尤宜
戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依

後法而加減之

加減法 初發熱壯熱腮赤面赤毛焦皮燥咳嗽喘急

加升煩渴加天花粉腹脹喘急鼻塞面赤若怒毛直

加麻便秘加當歸甚則加大黃嘔吐加猪苓澤瀉陳皮禁用生

丁香半夏木香洞瀉加升禁用白朮茯苓喘嗽惡風加蘇

桑皮失血加犀角地搐加青發斑加黃連黃鼻衄加黃

犀角小便赤澀加滑石山梔地黃芍藥驚悸加木通不思食加山

傷食加神麴山煩紅赤色加生地紅花丹

查麥芽

皮白芷防風

見標二三日間出不快利加大力子山查蟬
退名透肌散

皮急肉緊身壯熱甚加葛根前胡

見標三日之內並依本方加減及三日後痘瘡出
齊血包已成而前症悉平不得復用此方恐發散
太過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從
血熱痘症法而裁治之

太乙保和湯

又名紫草透肌湯

專治血熱痘症服十神解毒

湯後熱症悉去內外和平見點三日之後不易長大

粗肥者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易
痂易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參 紅花

生地 甘草 糯米

五十粒

右用燈心七根薑一片水一鍾煎至六分溫服

便澁腹脹加大腹繁紅不潤加當歸出不快者加粘鼠

子陷塌加黃痛加白芷不勻加防風水泡加白朮嗽加五味

子麥冬渴加冬門痒加白朮

芍藥

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急前胡
枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散 專治擁熱痘症服羌活散鬱湯後擁症
悉開氣血和平見點三四日後不肥大者不成漿者
用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿
而易結膿窠也加減以保和湯同論漿足之後另有
保嬰百補湯在後 按此即太乙保和湯去生地紅
花加蟬退鼠粘陳皮水一鍾加燈心十四根棗二枚

煎六分溫服

血熱痘症禁忌

血熱痘症熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖稠密亦能消散而易出易化漿也所謂輕其表而涼其內十神解毒湯蓋得安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者清之實者平之其此

方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之症悉具辯症不差並只以本方處治之切不得用參芪白朮茯苓補氣之藥於熱症未漿之前如誤而用之是謂實其實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變症百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾薑木香藿香訶子肉果如誤而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽疼狂亂失血便秘無所不

至矣至於龍骨枯礬澁滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而反閉其門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之及至血包已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又宜易方另行別議

三仁膏 治痘疹大便堅實不宜下者服此潤通

火麻仁炒去殼 松子去殼去皮七錢 桃仁去皮炒

右研爛加芝麻一合微炒研細入蜜水研極爛以帛濾去殼同前三仁蜜湯調下看大小用之

見標三日証治活法

發熱三日後退涼見標飲食二便如常形色淡紅疎朗
抹過碍手者上吉不須藥

發熱一日便出者凶乃表虛毒盛也急用羌活散加紫

草牛蒡蝉退煎調紫草膏或保嬰丹若治之早十救

二三 若服後熱盛不退宜羌活散調退火丹若無保嬰

丹用纏莖藤灰加辰砂看大小一歲
三釐十歲三分逐歲增加代之矣

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭痘見紫色者

死

標色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一線紅三五日即長如菜莖大此痘決不能灌漿久後成一色清水擦破而死不可因其好看妄與下藥

標出全不起頂如湯泡燈火燒者一樣十日後痒癩而死

標出時一片紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮者死
黑斑如痣狀肌肉成塊黑者立時死

凡見標疎少則毒輕不必妄治密則毒盛但要磊落大小分明不相粘連成片可用前藥進之或托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使其易發易靨 如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防痒癩黑陷之變更察外症可治則治不可治則勿治

凡痘子初出最要唇口潤澤其毒則輕如唇焦裂舌燥有芒為毒火熾盛表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯

加大力子 標後身熱未退清地退火湯

凡見標先要頭面稀疎磊落頸項胸前稀少其毒則輕
如面上一片模糊未發壅腫蒙頭纏項胸前布密此
毒盛也慎勿治之

凡頭面未見標而手足先出他處未起而手足先起他
處未収而手足先収者此陽火太旺宜早解毒抑陽
扶陰之劑四物湯合黃連解毒湯主之 如他處俱
起而手足起遲他處俱収而手足不収者此脾胃虛

弱不能行其氣血達於手足宜補脾胃十全大補湯
桂枝芍藥湯

凡初見標之時磊磊落落似稀疎之狀其後漸加日多
一日此毒伏於裏裏氣虛弱不能使之即出須大補
而兼解毒庶可十救二三也十宣散加無價散

石谷程氏曰凡發熱見標密無毫縫空地稠若蠶種者
急用三元秘方救之每一歲兒用茜根芫荽子各三
錢荔枝四枚若不起加葡萄一錢半好酒一鍾煎至

五分候冷每用半盞攪熟水半盞時時慢慢喂之一日服盡次日再用水煎如前慢慢喂之但服此藥之後不可雜食他物以傷胃氣小者只許食乳大者只吃粥若口渴即以此藥水飲之一以止渴又能清熱解毒切忌油膩煎炒恐滯腸作瀉瀉則誤矣或十歲二十歲藥從一歲加起依數增加作一劑服之如年多劑大不能盡煎可分作二三確煎之按前藥用酒煎者活血也後用水者清熱也熱盛必作渴代茶

飲之足可解毒蓋前症不可補補則助毒又不得不
補不補則不起發宜當解毒解毒又作瀉不解毒又
攻內茲用三味代之既能解毒又可溫脾活血誠為
千金良劑

凡痘發熱一二日便出或一齊擁出密如蠶種紅紫無
縫急宜服之此時切忌保元恐溫補助毒以其血未
活而漿不能化故用此三元解之俟其色淡血活熱
勢已退然後進補庶為萬全

凡皮肉間纍纍然紅點稠密急用纏荳藤加製過辰砂末連進二三服或薄荷湯調退火丹仍以牛蒡為末敷顛門上以散熱毒非惟能使痘疎又且免使侵眼又方生地黃牛蒡子搗成膏貼面頰額角能退痘毒

一已出未出之時口鼻出血此血熱錯經妄行不可妄投熱劑宜用生犀薄酒磨服如鼻血不止胎髮灰吹入鼻中即止口鼻既血又大小便下血恐胃為

熱毒所傷腐壞而然不可不知

一出與地皮相平無興起之意乃是紅斑急用涼血解毒
毒羌活散加酒炒芍藥紅花紫草蝉退木通占米連
進二三劑退之夾疹同此治治之遲則紅變黑黑則
逆而難治

大凡用紫草必用占米以制其冷性俾不損胃無洩瀉
之患惟大熱大便燥者不必占米

大凡用當歸活血須以芍藥收之免辛散助熱

一標出他處未見獨出數粒於山根之上為毒盛氣虛
犯上或發三五粒一塊者皆不吉之兆也急宜涼血
解毒以防危急若腮頰地角之間疎疎朗朗淡紅潤
澤三四次出者為氣正道尊上吉症也

一出皮膚乾燥枯澁必難起壯用溪中白色石子數枚
燒紅以井水淬之使薰蒸痘上或置被下薰之頃刻
潤澤痘即起發又能解穢

一色淡不紅活者血虛也以四物湯加減服之但地黃

大能滯血不可輕用不得已須薑汁炒過

人乳補血甚捷加酒少許佐之且血非氣不行又加四物於保元之中為陽生陰長之義

一痘正出好飲水者此乃脾胃虛弱津液枯涸故也如恣飲則必傷脾洩瀉及發泡難靨之患保元湯加麥冬五味子止之

一痘未起壯而頭面先腫者乃陰虛陽盛大下四物湯加人乳好酒服之以補陰與陽齊然陽易補陰難補

宜急急勿遲否則誤事

一出即變黑者此為惡候如有起興急用託裏解毒之劑少用保元大加紫草紅花服之外用四聖散點之然早能涼血解毒必無此患亦多因脾胃虛弱血熱所致凡紅變白白變黃者生紅變紫紫變黑者死

一痘全藉氣勻血活腠理疎通則出快而稀疏亦無餘症倘遇寒凍及勞役瘦弱之人血凝氣滯出則不快蓄於皮膚之間肌肉之上進退兩難日久變成黑紫

禍不旋踵凡有此候當按令急與和劑

如羌活散之類

以疎

利之其毒氣隨痘而出庶無變症保合太和之兆也

如頭面出不快此太陽經當用荊芥甘草羌活防

風天麻湯

如胃腹出不快此少陽經當用升麻紫

草木通紫蘇羌活湯

如四肢出不快當用芍藥紫

蘇葛根甘草葱白連鬚羌活湯各加生薑連進二服

痘即出快

賊痘

凡賊痘與好痘一般但挽先起壯皮嫩嬌軟內係淡膿
當用保元湯加占米煎服亦能回漿

一出其色掀赤抹過皮軟不得指此係賊痘過三日變
成水泡甚至紫泡黑泡者危症也若未成紫黑宜少
進保元大加紫草蟬退紅花解之或燈草木通湯調
六一散利去心經蘊熱而紅紫自退如已成水泡白
泡或灰白色則保元中大下四苓利之此千金妙法
也不然則遍身抓破黑爛而死

起壯三日証治活法

凡四五日来起壯活動一線紅暈而有根窠此為上古
蓋有根窠方見氣勻血活血活則毒化成漿收功結
痂全藉此也若無根窠必是氣凝血滯按法速治
凡起壯肥滿乳食如常不必服藥

一四五日来起壯肥大中有一小孔自頂直下至脚不
黑不白與痘色相並此名蛙痘由表虛腠疎而然若
不早治大洩元氣不能起發灌膿急用保元湯大加

占米川芎肉桂提起內膿以實其孔庶為佳兆三二劑後孔自塞滿若孔色黑乃疔也以疔法治之

一頂陷色白皮薄光洞者氣虛也

火照內外光明者是

大進保元

倍加酒炒黃芪肉桂川芎丁香人乳酒漿和服

一根窠淡枯澁不澤血虛也宜保元加酒炒紅花川芎當歸芍藥加山查以消參芪之滯再加木香一二分調氣氣調而血自活矣

四五日痘色不宜紅紫乃熱毒不化若血熱仍當涼血

解毒兼氣虛者保元加紫草木通紅花生地之類解之

一地紅血散乃血不附氣保元加當歸大加白芍藥以收斂之蓋芍藥味酸用之為君使血得以附氣且又能活血化漿此最上一乘之法切記切記

一洩瀉按寒熱急治至此再不宜瀉

若起壯遲緩根脚不紅活者以無價散一歲看大小用

之好酒調服或保元加人乳好酒丁香占米山查血

虛者加當歸鹿角膠

一黑陷及痘疔外用四聖散以油胭脂調點之內以涼
血解毒如紫草紅花木通茜根少加保元進之其疔
自退疔退看其虛實仍以保元補之

一煩躁者內必有熱可用木通以引其火下行或以六
一散燈心湯調俟冷服之 謔語者加三製辰砂夏
月井泉水服

如飲食不進看痘色何如未可輕投藥劑蓋其間有毒

氣未盡者宜山查紅花子紫草等藥清而解之如
脾胃虛弱痘色淡白宜保元加山查扁荳神麩 嘔
吐加藿香

一倒痘頭面上未出從足底起逆而上之縱起壯灌
膿回至心窩下則毒攻入內大叫一聲昏迷而死雖
疎快亦不免死乃逆症也候其出齊至頭面遂早丟
去下身不治只將保元大加川芎以升提之漸漸使
其自上而下起壯灌膿自上而下收斂結痂如常痘

一般此鮮有知其妙者宜謹誌之 此逆痘若治之
早以黃連解毒湯一帖以護其心可十全三五遲則
百無二三矣

翁仲仁曰三日四日痘當出齊點至足心勢方安定猶
有陸續不出之狀或隱隱於皮膚之內不見不起者
古名不快若非風寒鬱遏之因必有氣虛不振之過
是以四日已前痘毒方出身表宜涼四日已後毒出
已定身宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠

理開通其毒易以成漿故至此而身不微熱雖未必
至於冰伏而痘瘡斷乎不長四五日來血色已成候
當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具
行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日
依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如燈內含是水頂
尖而根脚不紅行漿勿實是以毒熱盛而未解則為
紫為黑壅而不起則為陷為癩滯而不榮則為乾為
枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有肉先

腫脹而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不進故身不熱而痘不起已成水硬之形赤色若還不變溫之可興氣血弱而不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌為壅為滯烈藥雖然可發透肌尤是良方澹洩惟於溫補瀉甚佐以升提凡起壯時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫如瓜之狀者死起壯時腰腹或疼或止遍身紫點如蚊

蚤咬全不起發者死 起壯時痘伏陷不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死略能飲食用消膨藥治之 起壯時遍身黑陷悶亂不寧神昏氣潰者死 起壯時根窠紫色乾燥不活全然不起發者死

頂陷不起須看年壽上痘起則不必憂如年壽上不起急與升天散一二服

痘半起忽然平陷而色白者急與內托散或補中益氣湯

痘色紅鮮反乾燥而不充肥者此火盛而血不足也宜
退火涼血輕清之劑四物快斑湯主之

痘充肥而帶濕者此脾中有濕而氣不足也宜瀉濕補
氣兼風藥治之蓋風能勝濕也四君快斑湯主之

一痘不起發不拘五陷用獨聖散或胡荽酒 若黑陷
腹脹用豬尾膏

一痘乾尅不起者外用水楊湯洗之內服補中益氣湯
一起脹時手足見而復隱起而復塌者死此根本已摧

枝葉先萎之象也

凡假壯之痘

其中有數粒起壯者是也

至十二三日決不能回漿結

靨內攻而死矣

白痘者可急進保元加川芎丁香

生占米提氣灌膿而愈此內托法也

內托散即保元加川芎便是

必千金內托散

正壯之時痘雖起發而皮膚不碍手按之水

漿就出內色不暗是也

灌膿三朝症治活法

灌膿時根窠紅潤肥滿如黃蠟色飲食二便如常者上

吉不須服藥

灌膿時皮白而薄純是清水與水泡相似者三四日後
遍身抓破而死

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者
死若二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

灌膿時二便閉目合聲啞腹中脹滿肌肉黑者死

一頂陷無膿為逆

火照之內外光洞手按之軟陷者無膿也火照之內暗不光洞按之如鼓

者有膿也急用保元加歸芍肉桂木香占米煎成人乳

好酒溫服

有一等肥白痘其色白不作膿俗名木痘以其人原有痰也用二陳四物湯合而服之一消一補仍將小麥粉作麵調與食之立時膿起紅活但不可妄投人參占米而助胃中痰火恐防口疳

寒戰咬牙乃陰盛陽虛也大用保元加川芎肉桂丁香主之甚者加鹿茸

痘灌膿痛不止者氣滯也少用保元加山查木香以行

滯氣如膿血已滿可大用四苓以利之而痛自止

凡濯膿三朝之內身涼痘灰白色或不進飲食寒氣逆上嘔吐或腹脹或瀉清水手足厥冷無陽症也急用二神加入保元連進數服溫而補之

痒塌不止者血盛也少用保元大加何首烏牛蒡子蟬退芍藥木香紅花若將靨時微痒者不必治有

氣血虛而痒者十全大補湯加何首烏虛甚者加鹿角膠

一發白泡如彈子大者用棗針挑破去水以滑石末敷之仍服保元加白朮留皮茯苓以利皮膚之水如前後發紫泡是毒盛溢於皮膚之上必死

夫膿者血之化也有血方有膿無血則無膿痘至灌膿大勢已定故此時必有膿為主有膿則生無膿則死痘至七日若頂陷不能灌膿者必由先失調治故也急看根窠血聚別無雜症速宜大補氣血以充其頂頂滿膿足猶可回生若頂陷而色灰白此氣血俱

離無能為矣

一頂陷無膿服內托藥而暫起不久又陷者膿未充足故也宜內托散倍加參芪當歸煎和人乳占米好酒服 若色灰白欲成倒塌皮薄易破者用淫羊補漿湯保元湯加芎歸升麻人乳好酒

一痘色紅紫漿不滿足欲成乾枯黑陷者當歸活血散合解毒湯加升麻石膏乾葛

一遍身灌膿忽然一日變白變紅變紫者不可不察白

者為虛宜內托散 變紅紫為熱宜當歸活血散合
解毒湯

一痘起壯灌膿俱好至八日大便忽秘常欲去而不能
去急用歸尾枳殼芝蔴各三錢紫草生地黃芩各一
錢煎服即通若失治至靨時忽然發熱而死 翁仲
仁三仁膏尤妙

一頂平脚潤漿不滿足十全大補湯加木香乾薑

一遍身無皮膿水流沾衣席不能轉動者用秘傳茶葉

方或敗草散內服內托散去桂加荆芥穗

一痘發痒滿面抓去而面上瘡痕隱然點點有起發之勢此猶可治急以托裏發毒止痒之藥用內托散加
蟬退立驗

一痘抓破而出血者此陽瘡出血也宜當歸涼血湯主之

一灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治

二便不通目閉聲啞腹中脹滿肌肉黎黑者不治

一瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不治

一痘未起頂但脚漸濶至七八日乾枯瘡皮皺起誤認
結痂收靨者多不可救急與補血解毒之劑庶可回
生

一灌膿時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰先有焦枯黑靨
者此名倒陷不治

收靨三朝証治活法

凡收靨自上而下者順自下而上者逆

痘至收靨大勢已定亦有膿不滿足似靨而非真靨者
此時極宜明辯若七日之間面目腫雖覺退痘雖似
乾而痂薄如紙或有內症未除此痘極險時也失治
則凶變立至急以補血涼解之劑庶或轉移

一痘至十日血盡毒解其膿漸乾如蒼蠅色或如葡萄
色從口鼻兩傍或面部收起至胃腹而下然後頷上
與脚背一齊結靨逐漸剝落內症全無身漸輕快飲
食二便如常者吉或手足心或手指尖或陰上先收

者俱吉

一人中者任督二脉交會之衢也凡痘自初出至収靨俱要在此部位先見者佳謂陰陽和暢也

一痘収靨自人中平分上下髮際以上陽中之陽也謂之孤陽足膝以下陰中之陰也謂之孤陰孤陽寡陰所以痘瘡之収至此二處每遲留而後靨也不必施治

一鼻梁上痘先焦者任是凶逆亦不死

一痘當靨而流漿不已者因表散太過則斑爛流水或飲水多則漂蕩流水俱服保元湯加防風白芷白朮或除濕湯外以敗草散敷之

一當靨不靨而膿充足服回漿散或象牙散

一痘有靨至頭或至腰而下身數日不靨者此乃熱毒太盛不能收靨故也治當有熱則清之若小便不利者四苓散加苓連滑石木通大便秘結者當歸解毒湯利之

一痘當靨不靨忽然變動灰白頂陷吐瀉腹脹寒戰咬
牙者急與內助丹 若痒塌氣促足冷者加附子有
水泡者大加白朮行去惡水而膿自乾矣

一血盡漿足溫潤不斂者內虛也保元加苓朮以助收
斂結痂或六君子湯

一當靨不靨發熱譫語目閉口喘手足大亂小水不利
者此熱毒乘於肺經無陰氣以收之然也急用清金
導赤飲主之

一漿未稠濃頂未飽滿面腫忽退目閉忽開瘡脚散潤
色白皮皺乾燥似靨非靨此因津液枯竭血氣虛少
內証未除之故此症之極險者也急用四君子加麥
門冬牛蒡子荆芥連翹桔梗救之若誤認作結痂無
事致成危殆悲哉

一膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者此倒靨也係
中氣不足急用保元湯加當歸牛蒡連翹薄荷桂木香
治之其頭面瘡已破者復加腫灌手足遍身原無瘡

處又復出一層謂之補空若治之頭面不腫空處不補不旋踵而告變矣

一叔鑿時忽泄膿血痂皮者此亦倒鑿之症乃脾強腎弱為順利盡自愈不必施治如利下水穀不分者此腎強脾弱也急用陳氏木香散送下荳蔻丸

一痘因冬月嚴寒被寒氣鬱遏而不能鑿者以桂枝解毒湯治之

一痘因夏月炎暑熱氣薰蒸而不能鑿者甘露解毒湯

微利之

一遍身俱収惟頭與足不収者此陰陽不和故也以四物湯去地黃加牛膝升麻牛蒡紅花荆芥之類

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者小柴胡湯合回漿散或天水散或猪尾膏外以黃連輕粉為末柏油調敷或用猪胆汁研芒硝如膏塗之 古人用猪尾膏獲效神速者蓋以熱毒蘊併於心經致熱毒內外灌注而不結痂用此方者以血歸心引龍腦以涼

之而行營衛况營衛得香則行遇臭則止也

一収靨時有臭氣帶腥者佳全無氣息尚有餘毒未發也若臭氣如爛肉不可近雖似結痂未可為真急以清熱活血緩則無濟

一瘡欲収而唇口乾紫連結渣滓頰紅者將成肺癰也宜解毒湯麥冬知母百合甚則大連翹飲

一凡痘係危症氣血本虛多服補劑而漸有膿色將収靨雖有熱者只可於補劑中加涼藥可也若謂將靨

而去補劑竟與涼藥更加下利藥欲令速靨是速其斃也蓋虛者復虛毒反內攻而死此必然之理又已然之驗也

逆症不治 痘當靨遍身未見青膿黃色之漿而口唇上下痘先黃熟者毒氣內攻於脾也不治

一痘收靨時不喫飲食口唇常如食物而動不止者不治

落痂症及靨後餘症

一痘瘡收後痂厚落遲離肉不粘者吉

一痂落疤帶紅色而不凹凸更無他症飲食二便如常者吉

一自食痘痂者雖有他症不死

一痘已結痂而不焦落者餘熱為害也大連翹飲去紫草加地骨皮

一痘痂至半月或一月不落或發痒者此因表發太過致肌肉不密無力收斂故也宜人參固肌湯

一痲不落反見昏迷沉睡不省人事者此脾胃大虛也
宜人參清神湯

一痲雖乾好但半邊掀起半邊粘著不能脫落者此過
用辛熱之藥熱留肌表也宜升麻葛根湯加防風荆
芥蟬退連翹以去肌表之熱即落矣

一痲紅紫者乃血熱毒盛也當涼血解毒

一痲白者血不足也不治雖過四十日還死此因漿水
淡故痲白急用保元湯合四物湯加白朮陳皮紅花

老米

一痲後身熱不退或寒熱往來用小柴胡湯虛則補中
益氣湯俱加黃芩

一痲後唇乾口渴熱甚不解者大連翹飲主之

一痲後虛煩不眠者竹葉石膏湯 煩渴譫語者辰砂
益元散

一痲後口噤殭直腹痛遶臍冷汗如雨痛定汗止而脈
弦緊者因疔受風寒也宜散風養血用鈎藤湯加紅

花木香川芎芍藥當歸甘草白朮青皮官桂生薑

一痂落肌肉尚嫩出見風早遂成癩癬有膿汁出者燒
牛糞灰敷之 痂不落搨掐抓搔致成痘風瘡者宜
消毒飲加苦參當歸外用金華散或乳香韶粉散
遺毒生瘡不已者活血當歸湯宜灸風池曲池三里
則永不發

一痂後遍身青紫瘰癧口喎痰響者由氣血虛弱而受
不正之氣也用蟬退一錢薑汁薄荷汁入酒一盞調

服得汗即愈

一痲後手足忽然拘攣不能屈伸轉動者由血少不能養筋或因風寒濕三氣使之然耳不可輕用發散反耗其血只補脾養血則瘳當歸桂枝湯治之

一痲後赤火丹毒惡候也從頭上起者過心即死從足下起者過心腎即死內服玄參化毒湯

一痲後牙齦生瘡時時出血謂之牙宣呼吸息謂之息露此走馬疔也由熱在陽明急用蠶退散敷之如

唇腫面浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不入者死

一痂後發癰者皮膚間隱隱起成疙瘩此由毒氣未得發盡藏於皮膚或發痒搔之而成者或因受風風火相持而成者此吉兆也欲發出無使停留以變他疾如發太甚不已者內服防風葛根湯外用蜆子水洗之如無用六一散拂拭之

一痂後兩目不開惡見明者謂之羞明惟向暗處敢開也涼肝明目散主之 若暗中亦不敢開者此即防

目中有瘡以望月沙散治之

赤水元珠卷二十七上