

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

傷寒總病論卷三

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣程 瑛

謄錄監生臣陳太初

欽定四庫全書

傷寒總病論卷三

宋 龐安時 撰

結胃證

病發於陽而反下之熱入內作結胃其病心下堅滿按之如石鞭而痛項強如柔瘕狀其脉寸口浮關上尺中皆沈或沈緊名曰結胃也下之則和宜大陷胃湯

今作
煮散

前
之

大黃

一兩半

芒硝

一兩八錢半

甘遂末

一字

異末先以水一升半煎大黃半升絞去大黃滓下硝末更煮一二沸內甘遂末和勻溫分二服一服快利止後服如作者散即先以水一盞煎大黃末四錢匕至八分下硝末二錢匕候化勻下甘遂末半錢匕沸勻溫服之移時未利再煎一服快利為度

臧結如結胃狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上脈小細沈緊名曰臧結舌上白苔生者難治臧結無陽證

不往來寒熱其人反靜舌上苔滑不可攻也

結胃證其脉尺寸浮大者不可下下之則死

結胃證悉具煩躁甚者死

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲胃內拒痛胃中空虛宿熱動胃短氣煩躁心下懊懷陽氣內陷心下固鞅則為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗餘處無汗齊頸而還小便不利

身必發黃也

結胃無大熱者此為水結在胃脇也但頭微汗出者宜
大陷胃湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌燥而渴日
晡則少有潮熱從心下至小腹滿而痛不可近者宜大
陷胃湯

虛弱家不耐大陷胃湯即以大陷胃丸下之

結胃者項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胃丸

大黃

四兩

葶藶子

一兩半

朴硝

一兩八錢

杏仁

二合

杵二味內杏仁朴硝合研如脂丸如彈子大抄甘遂末一錢白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下不下更服

小結胃正在心下按之則痛脉浮滑者宜小陷胃湯

半夏

六錢半

黃連

一分

枳實

一枚用四錢

呔咀水三升煮枳實至二升下諸藥煮取一升去滓溫服一盞食頃再服一日盡劑微解下黃涎即愈

太陽病下之脉促者不結胃此為欲解也脉浮者必結
胃脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛
未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱而利脉浮滑者
必下血

寒實結胃無熱證者與三物白散方

小陷胃者非也

桔梗

三分

巴豆

一分

貝母

三分

細末內巴豆研勻白飲調下一錢羸人減之病在馬
上必吐在馬下必利未利噉熱粥投之利過不止飲

冷粥止之

龐曰近世治結胃多行針頭丸用硫黃陽起石者若病熱毒甚者必死唯治冷結寒實耳

心下痞證

病發於陰而反下之為痞

發熱惡寒為陽誤下則為結胃無熱惡寒為發於陰誤下

則為痞氣

傷寒下之後若發熱汗出者為欲解若心下滿而鞭痛者此為結胃也但滿而不痛此為痞氣宜半夏瀉心湯

甘草

黃芩

乾薑

人參

各一兩半

黃連

半兩

大棗

六枚半

夏

一兩一分

哎咀水六升煮取三升去滓再煎一升半溫溫飲一

盞日三夜二

設下後津液入裏胃虛上逆寒結在心下故宜辛甘發散半夏下氣苦能去濕

兼通心氣又甘草力大故乾薑黃連不能相惡也

心下痞按之濡其脉關上浮者宜大黃黃連瀉心湯

大黃

一兩

黃連

黃芩

各半兩

哎咀以鰕眼沸湯一升漬之須臾絞去滓溫溫分四

服得利止後服

寒濕迫心氣不行欲作熱也

心下痞悶而復惡寒汗出者大黃黃連瀉心湯內加附

子主之

附子

一枚炮去皮尖四破以水三合煎一合去附子以附子汁內湯中和勻服之

與瀉心湯而痞不解其人渴而口乾燥小便不利者五

苓散主之

方在可水證中

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下

有水氣腹中雷鳴下利宜生薑瀉心湯

生薑

二兩

人參

甘草

黃芩

各一兩半

半夏

一兩一分

大棗

六枚

黃連

乾薑

各半兩

咬咀水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫作四

服

胃中不和為少陽水氣所制故用二薑之辛味

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

甘草

二兩

黃芩

乾薑

人參

各半兩

半夏

一分

大棗

六枚

黃連半兩

哎咀水五升煎至三升去滓再煎取一升半溫作四

服

胃虛故加甘味

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解不可攻痞當先

解表表解乃可攻痞攻痞宜大黃黃連瀉心湯

前加附子是汗

出多而惡寒表汗解而裏結未除故也此證是發後無汗惡寒故先須解表也

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭吐嘔下利者大柴胡湯

主之

汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故以大柴胡湯下之

病人脇下素有痞連臍傍引小腹入陰筋者此為藏結死

陽毒證

初得病一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒其病腰背痛煩悶不安狂言欲走或見鬼或下利其脉浮大而數面赤發斑如錦紋咽喉痛吐下膿血五日可治七日不可治升麻湯主之不可作煮散

升麻 當歸

甘草

各二分

雄黃

研一分

桂枝

一分

鼈甲

半兩

蜀椒分半

哎咀水二升煎一升去滓温服一盞食頃再服温覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳

陽毒宜葛根龍膽湯

方在雜發汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四支厥冷其脉沈

細而緊仲景云陰毒之候如被杖喉咽痛五六日可治
七日不可治甘草湯主之

不可作
煮散

甘草

鼈甲

升麻

當歸

桂枝

各二分

蜀椒

一分雄

黃

一個

哎咀水三升煎取一升去滓溫溫每飲一盞食頃再
服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之

治陰毒反陰丹

硫黃

五兩
研末

太陰玄精石

味鹹者
研末

硝石

研末各
二兩

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下
硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用蓋子合
定令三斤炭火燒令得所勿以烟出多急取出以瓦
盆合定地下四面灰擁勿令烟出直候冷取細研蒸
餅心丸豌豆大艾湯下十五丸病重加至二三十丸
此法甚驗喘促吐逆者入口便安服此藥三五服覺
不退便於臍下一寸半灸之須是大炷百壯未愈可
至二百壯若手足極冷小便澀小腹鞭疔痛囊縮即

須更於臍下四寸如前灸之乃與當歸四逆并反陰丹頻頻與服內外通遂方可解若稍緩即死矣當歸四逆乃加吳茱萸生薑者是慎勿與尋常利小便藥此是陰毒氣結在小腹所致也有見小便不通用炒鹽及裏熱藥熨臍下欲望小便通利其冷氣在小腹之間被熱物所熨無處通出即奔上衝心其死速矣

又治陰毒硫黃丸

硫黃

二兩

水銀

一兩

同研入銚洒少醋慢火炒欲似烟出再出火洒醋如此三四遍地上放冷研之蒸餅丸梧桐子大每服二十三十丸艾湯吞下日三服食前

陰毒脉沈微欲絕四支逆冷大躁而渴不止附子飲子

附子

一枚半兩以上者
炮去皮尖四破

以水九升煎至三升去附子入瓶油單緊封沈井底候極冷取飲之仍下硫黃丸甚妙

陰毒之為病因汗下藥性冷所變多在四五日也或素來陽氣虛冷始得病便成陰毒或始因傷風傷冷物便成陰毒其病六日內可治過六日不可治

狐惑證

狐惑之為狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面乍黑乍白上部則聲啞甘草瀉心湯主之

方在痞證中

蝕於下部則咽乾蝕於肛門者燒雄黃

薰之

雄黃一味
燒薰下部

病者脉數則熱微煩默默但欲卧汗出

初得之三四日目赤如鳩眼七八日則兩目四眚周皆黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

赤小豆

一升浸生
芽曝乾

當歸

一兩

細末漿水調下二錢日三服

百合證

龐曰百合病者百脉一宗悉致其病意欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行或有美食時

或惡聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則增劇吐利者如有神崇者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺頭不痛浙然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或二十日或一月微見者隨證治之

治汗後百合病百合知母湯

百合十枚知母半

一兩

百合先洗漬一宿當白沫出去其漬水別以清泉水
一升半煮百合取一升去滓又別以泉水一升煮知
母取半升去滓同百合湯煎至一升溫分三服

治下後百合病滑石代赭湯

百合

十枚滑石

一兩半

代赭

半兩

先以水漬百合一宿當白沫出則去其水更以泉水
一升半煮取一升去滓別以泉水一升煮滑石代赭
取半升去滓合和重煎至一升分溫三四服

治吐後百合病百合雞子湯

百合十枚雞子黃十枚

十枚

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水一升煮取一升去滓下雞子黃攪勻分溫三服

治不經吐下發汗百合病形如初者百合地黄湯

百合十枚地黄汁半升

半升

先以百合水漬一宿有白沫出去其水更以泉水一升半煮取一升去滓內地黃汁再煮取一升二合溫

温分三服中病勿更服

治百合病一月不解變成渴者百合湯洗之

百合

一升如煎洗先漬一宿當白沫出去其水

更以水一斗煎數沸洗周身慎風仍食白湯餅但勿與鹽豉也煮餅是切麵條湯煮水淘過熱湯漬食之渴不差栝樓牡蠣散主之

栝樓

無黃脉者牡蠣粉等分

細末水調方寸匕日三服

治百合病變發熱百合滑石散

百合

一兩

滑石

三兩

細末清飲調方寸匕日三服當微利熱則除已利勿服之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆

症濕暍證

傷寒所至太陽病瘧濕暍此三種宜應別論以為傷寒相似故此見之

瘧證

太陽病發熱無汗反不惡寒名曰剛瘧

太陽病微熱汗出不惡寒名曰柔瘧

病原云惡寒

其證身熱足寒頭強項急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張者瘧病

太陽病發汗太過因致瘧

素問曰太陽所至為寢汗瘧又云肺熱移於腎傳為柔瘧

始太陽中風發熱而故迫肺金金投子而避對故移熱於胃水水為火迫則上升復凌心位水入火鄉而為即若汗太多因而熱寐汗反為冷濕之氣復著太陽經故發瘧也

瘧病卧不著席小兒腰背去席二指大人側掌為難治瘧病脉弦直上下行

仲景云太陽病證其身體几几然脉反沈遲者為欲作

瘧宜桂枝加栝樓湯

栝樓不主中風強項几几其意治肺熱令不能移於腎也桂枝湯內

當加栝樓四兩

瘧病不宜大發汗及針灸宜小汗之

柔痊宜桂枝加葛根湯

桂枝湯內加
葛根四兩

剛痊宜葛根麻黃湯

方在解
表證中

剛柔痊加減葛根麻黃湯

葛根

麻黃

生薑

各一兩

防風

芍藥

白朮

人

參

芍藥

黃芩

防已

桂枝

甘草

各半兩

附子

一個

哎咀水六升先煮麻黃葛根數沸去上沫內諸藥煮
取二升去滓飲服一盞食頃再服日四五夜二三柔

瘥自汗者去麻黃加葛根成一兩半

剛瘥曾滿口噤卧不著席脚攣急其人必斷齒宜大承

氣湯下之

方在可
下門中

濕證

太陽病關節疼痛而煩脉沈緩濕痺之候其人小便不

利大便反快只當利其小便宜五苓散

方在水
證中

濕家之為病一身疼發熱身如熏黃仍治風濕脉浮身

汗出惡風宜黃耆湯

黃耆

二兩半

防已

二兩

甘草

一兩

白朮

生薑

各一兩半

棗

十六個

以咀水四升煎至二升去滓溫飲一盞食久再服喘者加麻黃一兩胃中不和者加芍藥一兩半氣上衝者加桂枝一兩半下有陳寒者加細辛一兩服後當如蟲行皮中從腰下如水坐厚被上又以一被繞腰以下令微汗出

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胃滿小便不利舌上如胎者此丹田有熱胃上有寒

渴欲得水而不能飲口燥故也

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止汗出已解身復痛何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞細末

瓜蒂含水畜少許鼻中則愈

濕家身煩痛可與麻黃湯內加白朮二兩

麻黃湯在可汗證中

病者一身盡疼發熱日晡則劇者此名風濕此病因傷於汗出當風或久傷於冷所致也可與杏仁薏苡湯

麻黃

一兩半

杏仁

四十枚

薏苡仁

甘草

兩半

咬咀以水二升先煮麻黃一二十沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫二三服

傷寒八九日風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不渴

脉浮虛而澀者宜桂枝附子湯此治大便自利小便不利者

桂枝

二兩

附子

二枚

生薑

半兩

大棗

十二枚

甘草

一兩

咬咀以水三升煮取一升去滓分溫四服若大便堅小便自利者去桂枝加白朮二兩煎如前法初一二服身如痺半日許服之都盡其人如冒狀勿怪此乃朮附并走皮膚逐水氣未得除故使之耳

風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則極汗出短

氣小便不利惡風不欲去被或有微腫者甘草附子湯
主之

附子

二枚

白朮

二兩

桂枝

三兩

甘草

二兩

咬咀水三升煮取一升去滓分溫三服身腫者加防
已二兩悸氣小便不利加茯苓一兩半溢水成四升
煎一升三合

喝證

太陽中熱者喝是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎湯

加人參主之

方在厥陰證中

太陽中暍者身熱疼重而脈微此夏月傷冷水水行皮中所致也瓜蒂湯主之

瓜蒂

二十枚

水半升煮取二合半去滓溫服

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦而細孔而遲小便已洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則反熱甚下之則淋

甚宜大小橘皮湯

大橘皮湯在不可汗證中

小橘皮湯

主手足冷嘔噦

橘皮

二兩

生薑

四兩

哎咀水三升煮取一升半去滓作四服稍熱呷之

發汗吐下後雜病證

病人脉微而濇此乃醫所病大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其體所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五

月之時陽氣在表胃氣虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中躁熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲澀故知亡血也

此皆

可治陽微惡寒四逆陰弱發熱為內熱病宜苦酒艾之類

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝湯主之

茯苓

四兩

桂枝

二兩

甘草

一兩

大棗

八個

咬咀以甘爛水五升先煮茯苓減一升內下諸藥煮取一升半溫溫作三服

作甘爛水法

取水二斛置大盆中以楊柏板擊水上有珠子五六千個相逐取用之

發汗或下後痞滿或成寒寔結胃氣塞不通宜檳榔散

檳榔

二個一
生一煨

細末酒三盞煎二盞四分作兩服溫飲之兼治虻厥

心腹刺痛南海本草治膀胱氣佳

龐曰因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脉
促而按之濡者合當汗而解脉促而按之實者死若脉
浮手足微厥面垢脣青昏憤而喘者陰陽未和尚阻升
降宜服順陰陽五味子湯

麻黃

半兩

人參

五味子

麥門冬

杏仁

橘皮

生薑

各一分

棗

七枚

哎咀水二升煮七合去滓通口服一盞未差再作二

三服手足厥甚者厚衣護其厥

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無

表證脉沈微身無大熱者宜乾薑附子湯

不可作
煮散

乾薑

一兩

附子

一枚

生

咬咀水一升半煎至半升時飲一小盞食久再服

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脉沈緊

發汗則動經身為振振搖者宜茯苓白朮湯

茯苓

二兩

桂枝

半

一兩

白朮

各一兩

甘草

各一兩

呔咀水三升煎至一升半去滓分溫四服

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛倒心中懊
懣香豉梔子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑梔子
香豉湯

肥梔子

二十
枚

香豉

兩合
綿裹

水二升煎梔子至一升三合下豉取七合半去滓每
進一盞得吐止後服

梔子甘草湯前湯內加甘草一兩同梔子煮後下豉如

前法加水半升

梔子生薑湯前方內加生薑二兩半同梔子煮後下豉
同前法加水一升

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲解也

屬梔子香豉湯主之

用前方

下後腹煩滿起卧不安者梔子厚朴湯主之

梔子

大者
八個

厚朴

二兩

枳實

二枚

哎咀水二升煮一升去滓溫飲一盞

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之

肥梔子

八個 乾薑一兩

以水一升七合煮取八合去滓分溫三服

凡用梔子湯得效即止後服病人舊有微澹不可與之
發汗若下之而煩熱胃中窒寒者梔子湯主之

傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利
渴而不嘔但頭汗出往來寒熱煩者此表未解柴胡桂
枝乾薑湯主之

桂枝

黃芩

各一兩半

柴胡

四兩

栝樓根

二兩

乾薑

甘草

牡蠣

各一兩

呔咀水六升煎至三升去滓再煎一升半溫溫時飲

一盞食頃再服

傷寒發汗若吐下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復花

代赭湯主之

旋復花

甘草

各一兩半

人參

一兩

生薑

二兩半

代赭

末半兩

棗

三枚半夏一兩半

呔咀水五升煎三升去滓再煎取一升半溫分四服
傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時
惡風大渴舌上乾燥而煩飲水至數升者白虎加人參

主之

方在厥陰證中

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語身重不可
轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之

柴胡

二兩

龍骨

黃芩

生薑

鉛丹

人參

桂枝

茯苓

牡蠣

各三分

半夏

一合 大黃

一兩 棗

六個

呔咀水六升煎取三升下大黃切如棊子塊更煎取
二升去滓溫飲一盞

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心已復以他藥
下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利
在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散

利小便

五苓散方在
可水證中

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧

各八兩

水四升煮取二升去滓溫飲一盞

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝

甘草

各二兩

白朮

人參

乾薑

各一兩半

呔咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去

滓溫分三服

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之

厚朴

四兩

甘草

一兩

生薑

四兩

半夏

一兩

人參

半兩

以水五升煮取一升半去滓溫分三服

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯

黃芩

梔子

各一兩半

石膏

乾葛

各二兩

豉

半兩葱白

寸切半斤

以水四升煮取一升半溫溫作三四服始得病便

如前證亦可服治夏月傷暑毒殊驗

傷寒發汗後或未發汗頭痛如破宜葱白湯

連鬚葱白

寸切半斤

生薑

二兩

水二升煮一升去滓溫溫作二三服

服前湯頭痛未解宜葛根葱白湯

葛根

一兩

芍藥

芎藭

知母

各半兩

葱白

一握寸切

生薑

一兩

呔咀水二升半煮取一升去滓溫溫分減服

傷寒頭痛立效荊芥散

天南星

草烏頭

肉白者生用

荊芥穗

各半兩

石膏

一兩

細末每服二錢半陳茶一錢薑汁半呬薄荷三葉水
兩盞煎至八分溫溫相次三服

傷寒嘔吐不止惡寒脈細或浮遲宜理中丸兼治霍亂

吐利及傷寒後發熱水停喜唾者

人參 乾薑

甘草

白朮

各一兩

細末蜜丸雞子黃大每服一丸百沸湯一盞化令細煎三五沸溫服之霍亂臍上築者不宜朮可作湯去朮加桂一兩半水三升煎取八合稍熱服之吐甚去朮加生薑一兩半作湯煎如前法飲熱粥一椀微溫覆之勿發揭衣被有寒腹滿痛或四肢拘急或下利轉筋加生附子二枚作湯服之

治傷寒嘔吐欲死生薑半夏湯

半夏

一兩半

生薑

一兩

水三升半煮一升去滓溫溫分四服

治嘔吐發熱脈滑數或洪者茅根湯

茅根

半升

麥門冬

二合半

半夏

一兩

人參

半兩

茯苓

半兩

生薑

二兩

哎咀水五升煎一升半去滓溫溫分減服

霍亂頭痛發熱身疼多飲水者宜五苓散

方在水證中

傷寒發熱自利脈浮大數及鼻衄或嘔者宜黃芩芍藥

湯

黃芩

半一兩

芍藥

甘草

各一兩

呔咀水五升煮取一升半去滓分四服嘔者加半夏一兩一分生薑一兩半煎服

治傷寒熱痢或兼腹痛黃連當歸丸

黃連

當歸

各三兩

乾薑

赤石脂

各一兩

細末蜜丸梧桐子大米飲吞下二三十丸日三夜二服

傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之
薤白梔子湯

豉

半升
綿裹

薤白

一握

肥梔子

大者
七個

水三升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升去滓下
豉煮一升半溫溫分減服必解下惡積

傷寒汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不
得卧此藥解熱毒除酷熱不必飲酒劇者療五日中神
效黃連黃蘗湯

黃連

一兩半

黃芩

黃蘗

各一兩

肥梔子

十二個

呔咀水三升煎一升二合去滓温温分減服未差更

作

傷寒四日而大下熱利時作白通諸藥多不得止四順湯熱白通湯苦温除熱止利莫若黃連熟艾湯

黃連

黃蘗

各一兩半

龍骨

一兩

熟艾

兩雞子大

呔咀水四升煮一升二合去滓分減温服

龐曰凡冷利皆宜四逆冷利臍下必寒水穀黃白色或

青黑也熱利臍下必熱利黃赤色也天行熱毒下利赤
白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長
四五寸黑頭銳尾宜麝香丸

麝香

錢一

附子

雄黃

丹砂

乾薑

巴豆

各二錢

搗下篩訖煉蜜和丸小豆大米飲下二丸未知增之

此方本無巴豆是古方脫去服之不效今增巴豆試之甚驗

傷寒後咳噫肉豆蔻湯

肉豆蔻

一個

石蓮肉

炒

茴香

各一分

丁香

半

生薑

人參

各二
分 枇杷葉 五片拭
去毛炙

哎咀水三升煎至一升半分四服空心煖飲之

龐曰傷寒汗後咳噫不止是陰陽氣升降欲作汗升之
不上降之不下故胃氣上逆而咳噫無休止者宜良薑

方

橘皮 良薑 桂枝 當歸 各一分 麻黃 半兩 檳榔 三個 杏

仁 二十個 甘草 一分 生薑 一分 大棗 十個

哎咀水二升半煎至一升去滓下檳榔末又煎三沸

去滓通口服一盞未已再一劑

時行頭痛心如醉狀面愛向黑處不欲見人此為壞熱不散速行大青湯與服不爾狂走趕人 大青湯

大青葉 秦艽 吳藍 升麻 薺芫 栝樓根

各二

分 甘菊 一分 石膏 三分 竹瀝 二分 朴硝 三分

呔咀分二貼每服一貼水二升半煎至一升二合去滓下竹瀝朴硝分溫四服肉色黃加茵陳六分面似火加梔子十四枚加水成三升煮取一升半溫飲一

蓋

七八日熱盛不解苦葶藶湯

苦酒

一升半

苦葶藶

一合生艾汁

半升

同煎至七合作二服此療內熱病有牛黃一刀圭尤良阮河南曰今諸療疾多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有必欲求之轉以失時而苦參青柏葶藶子艾之屬所在盡有之除熱解毒最勝向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次

也便以青箱苦參艾苦酒療之但少促其間耳無不

解者

苦酒即
米醋也

龐曰辛甜薑桂人參之屬是發散寒氣之藥其病未傳
成內熱者為調治之大要藥也決不可慮其酸苦之藥
正治內熱病急要之藥也設當行辛甘而用酸苦設當
行酸苦而用辛甘是昧於陰陽之用如此醫殺之耳其
辛甘酸苦自是調治通行之要藥若論苦則忌甘論甘
則忌苦雖有屢中誠為粗工矣

傷寒發黃者先用瓜蒂末內鼻中口含水搐鼻中去黃
水用五苓茵陳散最良

時行一切不知身上疼痛不寒亦不熱沈沈似有所思
順事多語此藏正傳熱麻仁龍膽丸服此藥不死

大麻仁

大黃

各一兩

柴胡

黃芩

白鮮皮

秦朮

赤芍藥

龍膽草

各二分

黃連

一分

梔子

二十個

細末蜜丸如梧桐子大食後煎淡竹葉湯下二十九
日與三服以大利為度十日小差一月平復

地黄湯療傷寒及溫病應發汗而不與發汗五內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內熱瘀血面黃大便黑者此方主之消化瘀血甚良

生濕地黄

四兩

牡丹皮

芍藥

犀角屑

無以升麻代各半兩

咬咀水二升煮取一升去滓溫溫飲一盞喜忘如狂者加地黄黃芩各三分加水一升脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩也

鼻衄或吐血下血黃芩湯

黃芩

四兩

哎咀水三升煮一升半溫飲一盞兼治婦人漏下血
不止黃蘗更佳

吐血百治不差此方療十差十大黃散

地黃汁

半升

生大黃末

一方寸匕

煎地黃汁三沸下大黃末調勻空腹服之每溫飲一
小盞日三服血即止

熱病毒氣入眼赤痛生翳不見光明者大黃梔子湯

生大黃

一兩

升麻

半兩

瞿麥

甘草

各一分

梔子

七個

咬咀水二升煎至一升去滓溫作四服以利為度難

利者煎藥畢下朴硝二分和服先煮諸藥至一升半

乃下大黃大黃先以水漬和水下之則折熱易利

治毒病入眼忽生赤翳或白或腫膚起或赤痛不得視

光熱入心肝或眼浮腫如吹汁出生膜覆珠子或內障

不見物良由病後不慎酒麵炙煨五辛所致宜服此頻

利之秦皮大黃湯

秦皮 柴胡 常山 黃芩 升麻 芍藥 白欬

枳實

甘草

各半兩

大黃

三分

以咀水三升煮二升下大黃再煎一升半去滓食後
溫飲一盞熱盛者加焰硝半兩湯成後下化勻服未
差更作可至五七劑

又方滴眼湯

斑豆瘡
不宜用

秦皮

升麻

黃連

各半兩

細剉水二升煎至一升綿包筋頭搵湯滴入眼中頻

頻用之

下部蠹瘡雄黃散

雄黃 青箱子

苦參

黃連

各三分

桃仁

一分

為散以艾汁和丸棗核大綿包內下部篇蓄汁更佳
冬月無艾濃煎艾汁和為丸更以米飲調下二錢溫
飲之日二服

治蠹瘡青黛丸

青黛

丁香

黃連

等分

細末甘淀和丸棗核大口中有瘡含之咽汁若下部
有瘡綿裹內下部日含化五六十九差

牽馬丸治天行四五日下部生瘡醫所不能治此方主
之

附子

一分

藜蘆

桂枝

巴豆

各半兩去
皮心炒黑

二丸未知加三丸熱在馬上不下飲熱湯半升投吐
之下部蜜自差神良

天行口瘡黃蘗升麻湯

黃蘗 升麻

甘草

生各半兩

哎咀水一升半煮半升入地黃汁一合煎半升分二

服細呷之

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升

冬用根皮

水三升煮半升溫溫漬之去涎喉咽有瘡者噉汁少

許為佳

又方黃蘗飲子

黃蘗薄切小片蜜漬一宿嚼藥汁漬瘡

又方五倍子散

五倍子炒為末傅之涎出吐去以差為度

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎

生射干

猪脂

各半斤

合煎令射干色微焦去滓取一棗大綿裹含稍稍嚙之

治喉咽痛塞礪砂散

研砂 殭蠶 牙硝 白礬 甘草 雄黃

各一分

一礪

砂半草烏頭尖

四分

細末米飲調一錢細細呷之

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾

人參

半兩

甘草

一兩

無灰酒

一升

不艸皂角

四十條

水三斗浸皂角一宿淨鐺內煎令水減半次下人參

甘草細切又同煎三分耗二布絞去滓下酒更入釜

煤一小半攪煎如餲稀入甕合內埋地中一宿若用

時取一丸如雞頭大盞中以溫酒一呷化之先以水漱口以鵝毛點藥入喉中掃之有惡涎或自出或下腹可兩三度引藥方歇良久令吐候惡物出盡了令喫少許水浸烝餅及軟飯粥壓之次含甘草一寸嚥汁忌炙烤胡餅猪肉淹藏等物如木舌難下藥以匙按舌用藥掃喉中

九般名

急喉閉 纏喉風 結喉 爛喉 重舌 木舌

遁蟲 蚰蛄 飛系入喉

元祐五年自春至夏秋蘄黃二郡人患急喉閉十死八九速者半日一日而死黃州潘推官昌言親族中亦死數口後得黑龍膏救活者數十人

龐曰急切亦不候合此膏用古方以意處之但得不蚰皂角一兩條槌碎水三升半浸少時揉汁去滓下甘草一分人參一分同煎作稀膏勿令太稠乃下後藥

霜梅上白鹽

硃砂

焰硝

各等分

三味生研用前膏斟酌和勻可以掃得為度每以鵝毛搵少許如前法掃喉中甚效其將息次第亦如前法此膏得力尤速若日久膏乾以甘草水化之病差後曾喉外生瘡勿疑無鹽梅以白鹽代

天行手足腫疼痛皮脫者濃煎虎杖汁漬之

天行後毒氣手足腫痛欲脫必作癰膿升麻大黃湯

升麻

木通

白斂

各三分

黃芩

芍藥

各一兩

甘草

半兩

大黃

一兩半

呔咀水三升煮二升半下大黃煮一升半温温飲一
盞利下為度

傷寒勞復證

病新差後氣血津液衰耗慎勿為諸勞動事凡言語思
慮勞神梳沐澡瀨勞力則生熱而復病如初也又新差
後精髓枯燥切不可為房事犯房事勞復必死魏督郵
顧子獻病差後華歆囑之慎勿為勞事餘勞尚可女勞
即死此是女勞復非陰陽易也素問云病熱而有所遺

者是新差後腸胃尚弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

天行勞復頭痛四肢疼葱豉湯

葱白

豉

半升

水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之和勻分再服未差更作

天行勞復作熱且至晚則腰背痛頭項強重葛根薑豉湯

芍藥

生薑

各一兩半

豉

葱白

各二合半

葛根

二兩

咬咀水三升煎二升下豉煎一升半去滓溫飲一盞

大病差後勞復枳實梔子湯

枳實

一分梔子

十二個

香豉

半升

漿水三升煮枳實梔子至二升下豉煮一升半去滓

溫飲一盞溫覆微汗食復者加大黃碁子大七枚同

煎服之愈

療傷寒已差勞復如初脉浮無汗者桂枝梔子湯

自汗者去

麻黃

梔子

十二個

豉

半升

桂枝

麻黃

各一兩

呔咀水三升煎至二升下豉取一升半去滓溫飲一

盞溫覆取小汗差

療傷寒勞復如初自汗出者脉浮滑煩躁甚宜此方梔

子石膏香豉湯

梔子

十六個

石膏

四兩

香豉

一兩綿裹

水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓

溫飲一盞

一法湯成入雄鼠
矢二七枚末良

病未平復後勞動致熱氣攻胃手足拘急搐搦如中風

狀瓜蒌湯

瓜蒌根

四兩無
黃脉者

淡竹茹

半斤

水三升煮一升二合去滓日二三服溫與之

婦人病未平復因夫所動小腹裏中急痛腰膝疼四肢
不任舉動無熱證者附子黃耆湯

白朮 當歸 桂枝 附子 甘草 芍藥 人參

各半
兩 黃耆 三分 生薑 一兩半

咬咀水四升煮至一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

男子房勞成復病鼠屎湯

薤根 一升 鼠屎

二十一個為末矢頭
尖硬者是即壯鼠也

水三升半煮薤根至一升半去滓下鼠屎末再煎三沸溫飲一盞相次三服衣覆必有黏汗為效未汗再作一劑兼治陰陽易神驗

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沈重恍惚失措脉促而絕不可治或有吐涎不止或有譫妄煩亂者皆不可治

天行差後勞復發熱嘔吐食不下蘆根湯

蘆根

半升

生薑

二兩

橘皮

枇杷葉

各一兩

一

哎咀水三升煮一升半去滓溫飲一盞大效心煩躁加石膏二兩加水一升煮二升

陰陽易證

陰陽易病者陰陽相感動其毒氣著人如換易也男子
病新差女子與之交女子得病名曰陽易女子病新差
男子與之交男子得病名曰陰易若二男二女則不相
易然女犯男得病鮮有死者男犯女得病救稍緩則十
無一人得生者若女犯男男自發勞復則女不病男犯
女女自發勞復則男得病亦輕富貴之家雖知其事後
生輕於自恣犯之多致不救田野之人蒙蒙昧昧只知
傷寒能死人因此病死者十有三四矣皆不知其所犯

之由深可傷也。男子女人陰陽易病，其狀身體疼痛熱，
上衝胃，頭重不能舉，眼内生眵，四肢拘急，小腹絞痛，手
足拳則暴死，其亦有不即死者。若小腹裏急熱，上衝胃，
頭重不欲舉，百節解離，經脈緩弱，血氣虛，骨髓竭，使吸
吸氣力轉少者，牀不得動，起止仰人，引歲月死，宜此方。
足甲襪灰散。

傷寒總病論卷三

欽定四庫全書

子部

傷寒總病論卷四

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勳

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣程瑛

謄錄監生臣陳太初

欽定四庫全書

傷寒總病論卷四

暑病論

宋 龐安時 撰

龐曰冬傷於寒夏至後至三伏中變為暑病其重溫也
有如傷寒依三陰三陽傳見五藏熱證者各隨證治
之
暑病表證

暑病代桂枝并葛根證

桂枝

芍藥

知母

生薑

各一兩半

甘草

一兩

黃芩

半兩

葛根

二兩

棗

十六枚

以咀水六升煮取三升通口服一盞相次取汗

暑病代麻黃證

桂枝

杏仁

知母

各一兩

麻黃

三兩

甘草

黃芩

各一兩

煎如前法

暑病代青龍湯証

麻黃

二兩

石膏

三兩

知母

桂枝

甘草

各一兩

杏仁

三十枚

生薑

一兩半

棗

十六个

如前煎服

暑病代葛根麻黃證

葛根

二兩

麻黃

一兩半

桂枝

甘草

知母

黃芩

芍

藥

各一兩

生薑

一兩半

棗

十六个

如前煎服

暑病三日外至七日不歇內熱令人更相染大青消毒

湯

大青

芒硝

各二兩

山梔子

一兩

石膏

四兩

升濕地黃

半升

以熱除為度
吐咀水七升煮取三升去滓下芒硝化之溫服一盞

以熱除為度

暑病通用白虎一如傷寒與暍證用之

方在厥陰證中

暑病通用麥奴丸

方在雜汗證中

暑病若吐下後別見形一如傷寒門治之

暑病噦逆發斑瘡痘壞一如溫病門治之

已上四條
先生所論

預防熱病急黃賊風葛粉散

葛粉

二升

生乾地黄

一升

香豉

半升

細末食後服方寸匕牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯任
性調下日三服有病者日五服

素問載五種暑病

肝熱病者先左頰赤肺熱病者先右頰赤心熱病者顏

先赤

也顏額

腎熱病者頤先赤

也頤頰

脾熱病者鼻先赤

上主

中
央病雖未發見赤色刺之名曰治未病

肝熱病者先小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚
脅滿痛手足躁不安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛
死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脉引衝頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶喜嘔
頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手
少陰太陽

脾熱病者先頭重煩痛心煩顏青欲嘔身熱熱爭則腰

痛不可俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則
甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者洗淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭
則喘咳痛起走胃膺背不得太息頭痛不任汗出而惡
寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出
血如豆大立已

腎熱病者先腰痛疝瘦舌渴數飲水身熱熱爭則項痛
員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少

陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

龐曰五種熱病肝腎二藏有逆證心脾肺三藏亡逆證凡五種熱病二三日逢尅未為逆忌在五六日也

時行寒疫論

病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶

輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月
陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相似
但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法鍼用雀
文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而愈不解
者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病困藜蘆丸
不吐者服赤小豆芡蒂散吐之已解視病尚未了者
復一法鍼之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯
下之愈無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦

如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日
時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五
日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛入胃
然要當復下之不得下多致胃爛發斑微者赤斑出五
死一生劇者黑斑出九死一生人有強弱相倍也病者
過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無
熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法
在可水五苓散證中

此巢氏載治時行寒疫之法焉溫
病暑病相似但治有殊者據溫病

無摩膏火灸又有冬溫瘡痘更有四時藏腑陰陽毒又
夏至後有五種熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也
時行寒疫治法

初得時行赤色頭痛項強煎治賊風走瘥寒痺趙泉黃
膏

大黃 附子 細辛 川椒 乾薑 桂枝 各一
兩

豆 五十
粒

咬咀苦酒漬一宿以臘月猪膏一斤煎調火三上三
下去滓收之傷寒赤色熱酒調服梧桐子大一枚又

以火摩身數百遍兼治賊風最良風走肌膚追風所
在摩之神效千金不傳

崔文行解散時氣不和傷寒發熱

桔梗

炒

細辛

各四兩

白朮

八兩

烏頭

炮一斤

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知為度
若時氣不和旦服一錢五銖匕辟惡欲省病一服了
去此時行寒疫通用之無病者預服以辟寒為佳皆

酒調下

藜蘆散辟溫疫傷寒

藜蘆

躑躅

乾薑

各四分

牡丹皮

阜角

各五分

細辛

附子

各三分

桂枝

朱砂

各一分

末之絳囊帶一方寸匕男左女右臂上着之覺有病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗日再當取一汗耳

赤小豆瓜蒂散在厥陰證中

雞子湯治熱盛狂語欲走

生雞子

七枚

芒硝

一兩

井華水一大升同攪千遍去沫頻服之快利為度

猪苓散即傷寒門五苓散也在可水證中

已上五方載巢氏治時行

寒疫合用之方

龐曰摩膏火灸可行於西北二方餘處難施莫若初服解散赤散之類如轉發熱而表不解乃行後四方為佳天行壯熱煩悶無汗者麻黃葛根湯

麻黃

五兩

葛根

四兩

麤末每服五錢水二盞梔子二个蔥白五十豉一撮
煎八分去滓沫溫溫相次四五服取汗止後服

天行一二日麻黃湯

自汗者去麻黃
加葛根二兩

麻黃

二兩石膏

一兩半

貝齒

五个無
亦得

升麻

甘草

芍藥

各一
兩杏仁

四十
个

麤末每服五錢水二盞煎八分溫服取汗止後服

葛根解肌湯汗後表不解宜服此

自汗者
去麻黃

葛根

四兩麻黃

芍藥

大青

甘草

黃芩

桂枝

各二
石膏
兩三

煎如前法

詔書發汗白薇散治時氣二三日不解

白薇二分杏仁三分貝母三分麻黃七分

細末酒調下方寸匕相次二三服溫覆汗出愈湯調亦得

聖散子方
此方蕪子瞻尚書所傳有序文

昔嘗覽千金方三建散於病無所不治而孫思邈特為

著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不拘常制至理開感智不能知今予所得聖散子殆此類也歟自古論病唯傷寒至危急表裏虛實日數證候應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲食漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者心額微汗正爾無恙藥性小熱而陽毒發狂之類入口即覺清涼此殆不可以

常理詰也時疫流行平旦輒煮一盞不問老少良賤各
飲一大盞則時氣不入其門平居無病能空腹一服則
飲食快美百疾不生真濟世衛家之寶也其方不知所
從來而故人巢君穀世寶之以治此疾百不失一二予
既得之謫居黃州連歲大疫所全活至不可數巢君初
甚惜此方指江水為盟約不傳人予竊隘之乃以傳蘄
水人龐君安常龐以醫聞於世又善著書故以授之且
使巢君之名與此方同不朽也其用藥如左

肉苳蔻十木猪苓 石菖蒲 茯苓 高良薑 獨

活 柴胡 吳茱萸 附子炮 麻黃 厚朴薑炙 藁

本 芍藥 枳殼麩炒 白朮 澤瀉 藿香 吳朮蜀

謂蒼朮之白者為白朮蓋茅末也而謂今之白朮為吳朮 防風 細辛 半夏各

兩薑 甘草一 汁制兩

剉焙作煮散每服七銖水一盞半煎至八分去滓熱

服餘滓兩服合為一服重煎皆空心服

治時氣傷寒頭痛身熱腰背強引頸及中風口噤治瘧

不絕婦人產中風寒經氣腹大華佗赤散方

丹砂

分二

蜀椒

蜀漆

乾薑

細辛

黃芩

防已

桂枝

茯苓

人參

沙參

桔梗

女萎

烏

頭常山

分各三

雄黃

吳茱萸

分各五

麻黃

代赭

分各十

分

除細辛丹砂乾薑雄黃桂外皆熬治作散酒服方寸

七日二耐藥者二七覆令汗出治瘧先發一時服藥

二七半以意消息之

烏頭赤散治天行疫氣病

烏頭

六分

阜角

雄黃

細辛

桔梗

大黃

各一兩

細末清酒或井花水服一_刀圭日二不知稍增以知為度除時氣不和一日進一服牛馬六畜中天行瘴疫亦以方寸匕人始得病一日時服一_刀圭取兩豆許內鼻孔中

斑痘瘡論

龐曰天行豌豆瘡自漢魏以前經方家不載或云建武

中南陽征虜所得仍呼為虜瘡其後名鑿雖載發斑候是發汗吐下後熱毒不散表虛裏實熱氣燥於外故身體發斑又說豌豆瘡表虛裏實一如發斑之理別云熱毒內盛攻於臟腑餘氣流於肌肉遂於皮膚毛孔中結成此瘡既是裏實熱毒內盛則未發及欲發瘡斑未見皆宜下之也瘡已差則再下之此病有二種一則發斑俗謂之麻子其毒稍輕二則豌豆其毒最重多是冬溫所變凡覺冬間有非節之暖瘡毒未發即如法下之

次第服預防之藥則毒氣內消不復作矣有不因冬暖
四時自行者亦如法下之古方雖有治法而不詳備疑
當時毒熱未甚鮮有死者耶近世此疾歲歲未嘗無也
甚者夭枉十有五六雖則毒氣內壞不治因鑿為咎又
大半矣若身疼壯熱頭痛不與小汗何由衰散大腑久
秘毒攻腰脇或心腹脹滿不與微利何由病去故當消
息汗下然則寒藥固不當行溫藥反增熱毒若熱勢大
盛脈候決數涼性之藥不阻表裏氣亦可通用若寒氣

阻礙脉候浮遲則溫性之藥不阻表裏氣者可蕪冰釋
云不可汗下寒熱之藥只可紫草一味者乃滯隅之流
祇是遭逢輕疾以自差為功若值重病則拱手待斃矣
世有權貴自信不任人拘忌冷熱汗下病或不救則責
鑿謬誤斯又可為傷歎夫調瑟者必當移柱故用古方
附以愚見為斑痘方以小兒多染此患故專用小湯劑
大人可倍用之

溫病發斑治法

小兒證附

冬月觸冒寒毒者至春始發病病初至表或已發汗吐
下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天氣溫暖
人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不
得泄至夏遇熱其春寒已解冬溫毒始發出於肌膚斑
爛隱疹如錦文也

治溫毒發斑大疫難救兼治豌豆瘡不出地黃膏

濕地黃

四兩好豉半升

以豬膏一斤和勻露一宿煎五七沸令三分去一絞

去滓下雄黃末一錢，麝香末半錢，攪勻稍稍盡飲之，毒從皮中出則愈。小兒斟酌服。

冬溫未即發病，至春被積寒所折，不得發，至夏得熱，其春寒解，冬溫毒始發於肌中，斑爛隱疹如錦紋而效，悶嘔吐清水，宜服黃芩麻黃湯。

葛根 橘皮 杏仁生 麻黃 知母 黃芩 甘草

各半
兩

吹咀水二升，煮八合，去滓，溫溫分減服之，嘔吐先定。

便宜消息不嘔者去橘皮

肺腑臟熱暴發氣斑

不可作
煮散

香豉石膏湯

香豉

二合

葱鬚

一兩

石膏

二兩

梔子

三分

生薑

二兩

大青

升麻

芒硝

各三分

吹咀水三升煮取一升三合去滓下芒硝溫溫分減服

溫病發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難

救黑奴丸主之

方在雜
汗證中

冬溫至夏發斑欬而心悶嘔清汁眼赤口瘡下部亦生瘡或自下利黃連湯

黃連

一兩

橘皮

杏仁

炒

枳實

麻黃

葛根

厚朴

甘草

各一分

吐咀水三升煮一升二合去滓溫溫分減服下利先止別當消息小兒斟酌

天行發斑瘡須臾徧身皆戴白漿此惡毒云永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜蒜蘆啖之則止鮮

羊血入口即定初患急食之作菜下飯亦得小兒時行

瘡痘恐相傳染先服漏蘆湯下之本治熱毒癰疽赤白

諸丹熱毒瘡癰

以下皆是
小兒湯劑

漏蘆葉

無以山
子代之

連翹

白欬

甘草

芒硝

各一
分

升麻

枳實

麻黃

黃芩

各一
分半

大黃

四
分

吹咀水二升煮一升半下大黃煮一升去滓下芒硝

分減服以利為度大人服可倍作

大黃水浸少
時和水下

龐白凡覺冬溫至春夏必發斑痘小兒輩須服漏蘆湯

下之得下後逐日空心飲甘草汁三歲以上一盞兒小減之直候腹疼乃止未疼可飲至十日則永不發或下後飲羊血一盞則不發

治時行畹豆瘡樺皮飲子

樺皮二兩細切水一升煮至半升去滓飲汁分減服
龐曰初得病便驚狂不眠渾身熱汗出問之身不增寒亦不惡風其脉如數以漏蘆湯下之不甚數者以大承氣湯下之非但瘡痘傷寒亦然

治豆瘡毒氣不出煩悶熱毒氣攻腰或腹脇痛不可忍
大便不通五香湯主之

麝香

分半

木香

丁香

沈香

乳香

各一分

芍藥

枳

實射干

連翹

黃芩

麻黃

升麻

甘草

各半

兩

大黃

一兩

關

四錢水一盞竹瀝半盞煎八分去滓下朴

硝一錢匕和服以利為度

天行熱氣生瘡疱身痛壯熱水解散

麻黃

一兩

黃芩

桂枝

甘草

各半

兩

細末煖水調下二錢匕小兒一錢覆令小汗熱氣在表已發汗未解或吐下後熱毒不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦紋或不因汗下始得病一二日便發皆由溫疫熱毒氣使然也甚則發豌豆瘡其色白或赤發於皮膚頭作漿戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根隱隱在肌肉裏其毒則重十死一生甚者五內七竅皆有瘡形如豌豆故

以名焉脉洪數者是其候也

天行熱毒未解欲生豌豆發熱疼痛宜服解肌出汗葛

根石膏湯

葛根 麻黃

各一兩

石膏

二兩

黃芩

芍藥

桂枝

甘草

各半兩

麤末每服四錢水一盞半煎八分溫服取小汗

自汗者去麻黃

斑豆始有白疱忽搗入腹漸作紫黑色無膿日夜叫煩

亂者鬱金散

鬱金一枚

甘草一分水半梔子乾去甘草片切焙乾為細末

真腦子

炒半錢

同研每一錢匕以生猪血五七滴新汲水調下不過
二服甚者毒氣從手足心出如癱狀乃差此是五死
一生候也

此患小便澀有血者中壞也瘡黑厭無膿十死不治斑
煩喘小便不利鼈甲湯

燈心

一把鼈甲

二兩

水一升半煎六合去滓溫分作二服

斑痘定煩喘淡竹瀝飲子

淡竹瀝

煖飲之煩喘自汗瘡不作黑厭可治

定煩喘麻黃甘草湯

麻黃 杏仁 桑白皮 甘草

各一分

吹咀水一升煎四合放溫分減服若脉數有熱以竹瀝代水一半煎之嗽或喉痛加射干一分

斑痘瘡出不快紅花湯

紅花子

一合
搥碎

水半升煎百沸去滓分減服之

斑痘服涼藥太過致嗽手足冷脉遲甘草乾薑湯

乾薑

半兩

甘草

一兩

咬咀水一升半煎六合分作二服

常行瘡痘紫草湯最良患其服之太少不能中病但多

槌切好紫草

以湯沃之用物合定候溫去滓分減服每紫草半升用湯一升為準也

斑痘已出不可正爾發表更增斑爛以表虛故也

豌豆瘡欲出甘草湯

甘草

四兩

細剉水二升煎一升去滓分減溫服覺腹中微利即

止

油飲子 飲清油一升即不生

豌豆斑瘡不快表裏不解煩喘大便秘氣攻腹滿犀角

升麻湯

麻黃

一分半

木香

犀角

升麻

芍藥

甘草

杏

仁 枳實

雄黃

各一分

大黃

半兩

麝香

一錢

吹咀水二升煎一升半下大黃再煎一升去滓下雄
麝末沸勻分作三服以大便通為度

瘡已出定方

芒硝 猪膽

和研勻塗之勿動痂落無癩仍卧黃土末上良

天行瘡痘預服此則不發三豆飲子

赤小豆

黑豆

菘豆

各一升

甘草

一兩

淨淘水八升煮熟逐日空心任性食豆飲汁七日永

不發

瘡痘發斑下利赤黃或膿血遍身發熱梔子薤豉湯

好豉

半升

薤白

二兩

肥梔子

十六枚

水二升半煮梔子薤白將爛下豉再煮十數沸去滓
分減服解下惡物差

傷寒總病論卷四