

四庫全書

子部

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十二

五疳論

小兒疳病諸論叢雜唯五疳之說為當其証候外則傳
變不同內則悉屬五藏一曰肝疳其候搖頭揉目白膜
遮睛遍身多汗喜覆面而卧眼中澁痒色澤青黃髮監
頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多日漸羸瘦二曰心
疳其候渾身壯熱頰赤面黃心胃萬腕煩躁滿悶口舌生

瘡盜汗多驚下痢膿血神彩衰耗三曰脾疳其候腹大
如鼓上多筋脉喘促氣羸心腹壅脹多啼咳逆水穀不
消唇口乾燥好食泥土情意不樂憎明好暗痢多酸臭
肌肉內消形枯力劣甚則大肉陷下四曰肺疳其候咳
嗽氣逆皮毛焦落咽喉不利操鼻咬甲口鼻生瘡腹內
氣脹乳食不進大腸不調泄利不常憎寒體慄糞中米
出洞下白泔五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒斷
生瘡耳焦腦熱手足逆冷吐逆滑泄下部生鬣脫肛不

收夜啼饒哭漸成困重甚則高骨乃敗小兒疳疾乃與大人勞瘵相似故亦名疳勞大人勞者因腎藏虛損精髓衰枯小兒疳者因脾藏虛損津液消亡病久相傳至五藏皆損也大人勞疾骨削而氣耗小兒疳疾腹鼓而神羸以其病之始也其藏之傳受不同故也至於傳久五藏皆損則一也故五損者經言一損於皮毛皮聚毛落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌肉脾也三損於血脉血脉虛少不能榮於藏府心也四損於筋筋

緩不能自收持肝也五損於骨骨痿不能起於牀腎也
病極則大肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒疳疾多
是轉下所壞小兒藏府嫩軟易虛易實一切於諸病悞
行轉下致脾胃虛弱津液內耗皆能成疳且如潮熱日
中時發者是脾藏虛心藏實日中乃心用事之時而內發其熱法
當先補其肝母肝乃心之母也肝實而後瀉心得母氣則平
而潮熱乃愈醫見潮熱妄謂其實便以大黃牙硝等冷
藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如

癖病發作寒熱飲水脇下有形而硬痛法當用藥漸消磨之醫見有癖便以巴豆礪砂輩駛藥下之下既多而津液耗則漸成疖也又如傷寒五六日之後有下証因以冷藥下之太過致脾胃虛而津液耗即便引飲不止而熱生如此則熱氣內耗於津液肌肉外消而羸瘦他邪相干証變百端亦因成疖也又如吐瀉病久津液耗亡亦能成疖也又如小兒食肥甘物多因傷為積則蘊痢發熱津液內耗亦能作疖故甘即疖也聖濟經云肥

甘之過積為疔黃乃謂是矣故諸病皆能成疔也甘疔之候眼濇多困或生白膜唇口淡白身色黃黑食泥土生米喜卧冷地疥癬頭瘡洞泄青白黃沫下痢膿血腹滿喘咳耳鼻生瘡髮稀作穗頭大項細肚大青筋脚手垂躄瘦瘠飲水筋痿骨重形劣疔羸皆其証也本因脾虛津耗久則傳變而成傳緩者則為慢疔傳緊者則為急疔又當辨認冷熱肥瘦其肥熱疔者乃因食肥甘積聚生熱而作故多病於初也錢乙治用黃連丸其瘦冷

疳者乃因轉下瀉痢生冷而作故多病於久也錢乙用
木香丸通治冷熱疳者錢乙用如聖丸凡治小兒之病
必量虛實冷熱不可妄行轉下恐變生疳也若病初之
脾虛津少發渴欲飲者當生胃中津液煎錢乙白朮散
與服惟多則漸好其錢乙諸方本集載之

又有一証其候腹中有塊身體羸瘦毛髮焦稀腹大氣
喘冷痢脫肛喫食愛吐俗曰無辜寶鑑云按玄中記有
無辜之禽一名姑護一名鈞星鬼但喜夜飛人有暴露

小兒衣袂袖包其禽飛立在上令兒患此疾也予性好尋閱異書十餘年間竟不知玄中記之所出又此禽既云夜飛必有形狀世間亦莫之曾見是必巫覡假以鬼名而偽言者也今詳其証而對其病實乃疳疾之候耳特為破其邪說以祛惑亂矣

治五藏疳方

地黃丸治肝疳拘急疳氣入眼隱澁或生白膜暈瞖赤脉等疾

熟地黄

八錢

山茱萸

取肉四錢

乾山藥

四錢
澤瀉 三錢

牡丹皮

去心三錢

白茯苓

去黑皮三錢

右為細末煉蜜和丸桐子大三歲下兒一二丸上者
三四丸溫水化下空心

熊膽天麻丸治肝疳羸瘦搖頭搽目百脉拘急

熊膽

天麻

羌活

去蘆

蟬殼

去土

使君子

去殼

胡黃連

各一兩

盧會

乾蟾

塗酥炙黃各半兩

右為細末粳米飯和丸黍米大每服十九煎荊芥湯

下量大小與無時

奪命丹治心疝體熱驚搐煩渴髮稀肚大泄瀉羸瘦

朱砂 麝香 牛黃 腦子 盧會 沒藥

硼砂

熊膽

麒麟

兩 蝎半

粉霜

錢一

使君子

十箇 去殼

青黛

錢三

右為末滴水和丸豌豆大每服一粒薄荷水化下日
三兒大二三九

朱黃丹治心疝挾驚發熱煩渴盜汗羸瘦

朱砂

一分 研
水飛

天竺黃

半兩 研

乾全蝎

二十一箇
微炒去毒

天漿子

十四箇去
殼微炒

人參

去蘆
一兩

胡黃連

一兩
青黛 研

龍腦

一錢
研

右為末拌勻煉蜜和丸黍米大每服十粒人參湯下

無時

黃聖丸治脾瘕發黃身腫

黃土

一兩
末

陳皮

去白
一兩

木香

一分

巴豆

二十箇去皮
膜出油盡

右為末飯和圓粟米大每服三二丸煎黑豆汁送下

無時

木香煎治脾疴因不知飢飽積滯內停腹大脚細下痢

無度

南木香

一兩
剉

肉苳蔻

一兩
麩去麩

乾蟾

二箇
酥炙

胡黃連

一兩
剉

使君子

去殼
一兩

五靈脂

一兩

巴豆

七箇
去心膜紙裏

出油
盡

麝香

一分
研

右為末細勻滴水和劑入石臼杵一二百下圓如黍米大每服一二九至五七九量大小與溫生姜湯下

乳食後一歲下者一九二歲上者三九以意加之

肉苳菘丹治脾疳如前

肉苳菘

一兩麵裹煨

使君子

去殼一兩

青皮

去穰一兩炒黃

牽牛子

一分炒黃四味為末

盧會

一分研

麝香

半錢研

右研勻細糯米飯和丸黍米大每服十圓生姜湯下

食後

香連散治脾疳泄瀉腹大脚細漸成瘦弱及諸脾胃不

和氣不調順並能治之

木香一分黃連

去鬚半兩炒

訶子

煨去核取皮一分

肉苳菴

三箇麩裹煨去麩

甘草

一分炙

右為細末每服一字或半錢米飲湯調下乳食前

麝香丹治肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣

胡黃連

兩半夏

半兩湯洗七次

紫蘇子

一分微炒

五味子

一分

乾蟾

一箇酥炙焦已上先為末

麝香

一分研

盧會

一分研

朱砂

一分研

右為末細勻棗肉和丸黍米大每服五七粒米飲下

無時

靈砂丹治肺疳因咳嗽羸瘦皮枯毛落

人參

去蘆
半兩

甜葶藶

一分
炒

五靈脂

一分

胡黃連

一分
四味為末

辰砂

半兩
研

麝香

一分
研

盧會

一分
研

杏仁

去皮尖麩
炒黃一分

右為末拌勻粳米飯和圓黍米大每服十九人參湯

下無時

石綠散治腎疳耳上生瘡及治肥疳頭瘡鼻爛浸久不

差

石綠 白芷

各等分

右為末先以生甘草水洗瘡拭乾傅藥一日愈

蛙鷄灰散治腎疔成膿腸虛蟲蝕下部肛盡腸等

右以長脚蛙青背一枚鷄骨一分同燒為灰細研為

末吹入下部中令深入數用大効

桃白散治如前

桃根白皮一兩黃蘗一兩黃連去鬚一兩蛇蛻燒灰

乾蝸牛燒灰青州棗五十箇去核燒灰

右為細末入定粉一分麝香末一錢同研勻每服一

字至半錢粥飲調下乳食前量輕重加減用藥

如聖丹治如前

乾蟾

七箇
燒灰

蟬殼

去土盡
半兩

蚘蛇膽

一分

大棗

一分去核
燒灰已上

先為末

黃丹

一分

定粉

一分

麝香

一錢

右同拌研勻細用好醋看乾濕拌勻白杵一二百下成膏丸黍米大每服五七粒米飲下量大小加減又

化三二粒調塗患處若蟲出乃愈

烏金膏治腎疔入經灌注陰囊黃亮色腫

通草

一分 燒

黃皮

一分 燒

大黃

一分 燒 各存性

右同研為末每用一錢以獾猪膽調成膏於陰腫處
徧塗之如未退更煎蛇床子湯洗之再調塗必効

二肝丸治疳痢不止

龍膽草

去蘆 一兩

漏蘆

去蘆 一兩

菖蒲

一兩 九節者

胡黃連

半兩

地榆

半兩 已上 先為末

鷄肝

一兩 剉

猪肝

一兩 剉

右將藥末入二肝內裹定以水二盞入鹽少許煮至
肝熟於石臼中杵一二百下成膏丸黍米大每服十

粒麝香湯下食前

金靈散治腎疝時久骨沉力弱項細頭重致天柱骨倒不能擎舉擡頭

右以白殭蠶不拘多少揀直者去絲嘴炒焦為末每服半錢或一字一錢薄荷酒調下日三須臾用生力散塗之

生力散

右以鼈子三箇單麻子三十箇各去殼取肉同研細

每用一錢許津唾調攤紙上先緊抱定兒措項上令熱貼之

治疳瀉痢方

赤石脂散治疳瀉不止

赤石脂

川芎

各等分

右為細末量大小多寡米飲調下乳食前

二聖丸治瀉久不愈羸瘦成疳宜常服之

川黃連

去

黃栢

去麤皮各一兩

右為細末將藥入猪膽內湯煮熟取出丸菜豆大每服二三十丸米飲下無時

竹茹丸治疳氣泄瀉煩渴其効如神

好黃連

去鬚土一兩剉作塊子一一相倍

吳茱萸

揀去枝梗一兩

右二味以蜜相和拌勻炒赤黃色去茱萸只用黃連為末薄糊和丸蘿蔔子大每服十九煎竹茹米飲送下無時

六神丹治疳氣羸瘦臧府怯弱泄瀉虛滑乳食減少引

飲無度心腹脹滿

丁香 木香 肉苳蔻

各半兩並
麪裹煨用

訶子

半兩煨
去核稱

使君子

去殼
半兩

盧會

一兩
細研

右為細末棗肉和丸麻子大每服五七丸溫米飲下

乳食前服此藥於夏秋間應小兒泄瀉色白或瀉多服藥不差者但與之便定

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連

去鬚
土

白蕪荑

去扇取仁
炒各二兩

使君子

去殼
一兩

麝香

半錢
研

乾蟾

三箇剉
酒熬膏

右為細末入蟾膏和丸麻子大二三歲以下者兒五
七九以上者十九一十五丸人參湯下食前

木香散治疳瀉腹脹

木香 青皮

去穰各
一兩

陳粟米

一合 巴豆

三十粒
同米炒至巴

豆黑色去巴

豆留米用

草豈寇

二箇一箇生用
一箇麩裏煨熟

蜣螂

二箇去
頭足翅

糯米炒
焦去米

右為細末每服一字或半錢米飲調下食前

硫黃丸治疳瀉色白如米泔

巴豆

十四箇去皮
膜出油盡

硫黃末

一錢

青黛

一錢
匕末

蕪荑

去皮一
錢匕末

右拌研勻細水浸蒸餅和丸菘豆大米泔水送下三

丸食前

金粟丹治疳瘦泄瀉腹大好食泥土

母丁香

龍膽草

去蘆

厚朴

去麤皮
生薑製

朱砂

研

青黛

研各
一兩

夜明砂

微炒

蟾殼

去土
盡

訶子肉

微炒

右為細末和蜜一半麵糊一半相和丸黍米大每服
十粒米飲下無時

橘香丸治疳積黃瘦盜汗腹脹泄瀉宿滯不化氣促發
喘

陳皮 木香 各一兩 姜黃 切片 草薹 薏仁 白朮 剉炒

牽牛子 炒各半兩

右為細末滴水和丸麻子大每服十九葱白米飲下

食前

木香芥粒丸治如前

陳粟米

二合

巴豆

半兩去皮膜同米炒至米焦去巴豆用米

陳皮

半兩

檳榔

一兩研細

人參

去蘆一分

木香

一分

右為細末飯和丸芥子大每用看虛實大小加減三五丸木湯下不拘時

麝香丸治脾熱生疳泄瀉氣弱不食

川苦練

取肉一兩用童子小便浸一宿焙乾

巴豆

半兩去皮膜同苦練慢火炒至微紫

色去巴豆不用

盧會

檳榔

蕪荑

去扇各半兩

沒石子

一分

麝香少許

右為細末猪膽汁浸蒸餅和丸黃米大每服十九米
飲下食後

吳婆散治疳瀉不止不計度數漸成羸瘦飲食減少衆

藥不効

桃根白皮

一分

黃栢

蜜炙一分

蕪荑

去皮一分

黃連

去鬚一分微炒

没石子

一錢半

厚朴

去麤皮姜製一錢

木香

一錢

丁香

一錢

棟根白皮

半

檳榔

一錢

右為末三歲以下兒每用半錢以上至六七歲者一錢煎紫蘇木瓜米飲調下食前日三屢驗此藥性小溫暴熱瀉者不可服一方無沒石子丁香檳榔三味水蓼丹治疳氣羸瘦血痢

蛇蛻

一兩

牛黃

一分研末別

鷄頭殼

一兩二味燒存性

胡黃連

半兩

水蓼

半兩焙

硃砂

半兩研

盧會

一分研

粉霜

一分研

右拌勻細軟飯和丸黍米大每服五七粒麝香湯下

無時

龍骨湯治疳氣瘦弱下痢白膿久而不差

龍骨

半兩

訶梨勒皮

半兩 焙炮

赤石脂

半兩

石榴皮

一分 炒黃

木香

一分

使君子仁

一分

右為細末每服一字或半錢麝香湯調下無時

丁香散治如前

丁香

二箇

黃連

一寸

大棗

一箇

去核

右以棗裹二藥麻纏火上燒存性研為細末米飲調

下無時

菟蔚粥治如前

右以菟蔚葉

即益母草也

煮粥食之或取汁飲亦妙

薔薇汁治如前

右以生薔薇根洗淨細切煎濃汁稍稍飲之

勝金丸治如前及加腹脹

右以鷄子一枚打一眼子如豆大入去皮巴豆一粒
膩粉一錢在內以五十重紙裹於飯甑內蒸三次取
鷄子肉同藥研更入麝香少許細勻添少糊丸如黍

米大食後臨卧温湯下二三九量大小與服一方用
鷄子一枚打破和膩粉炒乾為散米飲調一字或半
錢服

薤糯餅治如前

右以薤白一握生杵如泥同蜜和糯米粉研作餅炙
熟與喫不過二三次差

檇白棊子治如前

右以檇根白皮擣細碎麵拌和切作小顆棊子日燉

少時又拌麵一次凡三過為度水煮熟加鹽醋頓服
量大小與困重者服之差

檇根米泔汁治如前

右以檇根白皮煮濃汁半鷄子殼和粟米泔半鷄子
殼同灌下部再作即差其驗如神

木香使君丹治疴氣羸瘠雖能食不生肌肉時時泄利
無休

使君子

去殼二兩炒

木香

一兩

丁香

一兩

厚朴

去麤皮生薑製一兩

沒石子

一兩

胡黃連

一兩

肉苳菴

麵裹煨去麵一兩

已上先為末

盧會

一分

麝香

一分

右為末同勻以粟米飯和丸黍米大每服十粒煎陳
橘皮湯下無時乳食前

君子丸治疴勞發熱擗眉咬甲髮踈腹脹不思乳食羸
瘦虛滑下痢無度愛食泥土

厚朴

去麤皮
姜製

甘草

炙

青黛

訶子

炒去核取皮用
各半兩一方一

兩半生

陳皮

一分

白蘆莢

去扇

使君子

去殼一兩
麵裹煨熟

右為末煉蜜和丸鷄頭子大三歲下兒半丸上者一
丸乳汁或米飲化下若夾驚熱瀉用之極妙

青黛散治諸疔瀉痢毛焦羸瘦

右以青黛研為細散水調服之量大小與

歌曰

孩兒雜病變成疔 不問強羸女與男

或侶積傷食不進 漸成柴瘦困耿耿

體熱口乾頻飲水 皮毛枯槁四支攤

腹大時時更下痢

青黃白赤一般般

眼瀼面黃鼻爛赤

口氣增寒卧不安

忽然瀉下如泔淀

又似膿膠涕作團

肛頭凸出饒噉唯

不忭哺乳淚潛潛

腹中有病須醫療

何須祈禱賽神盤

此方便是青黛散

孩兒服餌立安痊

赤虎丸治疳積瀉痢

朱砂

研別

胡黃連

川黃連

去

盧會

膩粉

各一錢

硫黃

別研
二錢

肉苳菹

麵裹煨一
箇去麩

巴豆

二十四箇去皮
用麩炒至麩黑

去麩用巴

豆別研

麝香

少許

右為末研勻細麵糊和丸如蘿蔔子大甘草湯下一
歲兒一九以意加減

漏蘆煮肝散治疔氣肚脹冷熱不調瀉痢無度

右以漏蘆一兩為末每服一錢匕猪肝一兩鹽少許
水煮熟空心頓服大治無辜疔

君子散治五疔小便白濁瀉痢無度

右以使君子仁為末米飲調服食前

厚脾丸治疴勞虛冷白痢泄瀉手足逆冷

厚朴

去麤皮姜製半兩

肉苳菴

一箇麩裏煨去麩

龍骨

半兩煨

訶子肉

煨去核用半兩

右為細末糊丸菜豆大米飲下十九無時

蝦蟇丸治諸疴疴瀉

盧會

研

黃連

去鬚

穀精草

桂心

朱砂

研各一錢

縮紗仁

二錢

熊膽

半錢溫水浸磨

麝香

半錢研

右除研藥外細剉用一大蝦蟇去了肚腸入剉藥在
內以線縫合先用好醋浸少時次慢火炙酒醋又炙
至焦黑放冷杵研為末入研藥拌勻取獾猪膽汁和
丸菴豆大每服五七丸米飲下量大小加減此乃知
信州王紹祖方

治諸疔蟲動方

肥兒丸治諸疔久患藏府胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不
能行髮豎作穗肌體發熱精神衰弱

黃連

去鬚

神麩

炒各一兩

使君子仁

肉苳菹

麵裹煨去麩

麥蘖

炒各半兩

木香

二錢

檳榔

二箇不見火

右為細末麩糊和丸蘿蔔子大每服二三十九熟水下食空服

下食空服

盧會丸治五疳羸瘦蟲咬腹痛肚大青筋一切疳疾

盧會 木香

胡黃連

各一分

乾蟾

一箇酒浸炙焦

檳榔

二錢炮

青黛

二錢 青皮

去穢稱一分切碎入去皮巴豆十箇炒令焦去巴豆只用青皮

使君子仁

三十箇

蕪荑

一錢用仁

麝香

一字

右為細末用猪膽汁和丸黍米大每服十九米飲下
無時

又方

盧會 木香 胡黃連 川黃連 去鬚 青皮 去穰

白蕪荑

取仁

雷元

鶴虱

微炒各半兩

麝香

一錢研

右為細末粟米飯和丸菴豆大米飲下一二十九無

時

又方

盧會

半錢

赤石脂

一錢

使君子

七箇
去殼

雷元

一錢

姜黃

一錢

川練子

去核
一錢

檳榔

一錢

巴豆

七箇
去皮
膜出油盡

右為細末獷猪膽汁糊丸黍米大一歲兒二三丸以
上者三四丸量大小與之冷木香湯下無時

麝香黃連丸治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連

白蘘莢

去扇各
一兩半

宣連

去蘘
半兩

辰砂

一分
研

麝香

一字
研

木香

半兩

右為細末糊丸菴豆大米飲下五七丸三歲上者十

九無時

榆仁丸治疳熱瘦悴蟲作腹痛

榆仁

去皮

黃連

去鬚各一兩

右為細末用猪膽七箇取汁在椀中和藥安甑上蒸九次每日一次候數足研麝香半錢入之以白湯浸蒸餅和劑九菴豆大每服五七丸至一二十九米飲下無時

雄黃丹治五疳羸瘦多生蟲動

乾蟾酥炙

焦

胡黃連

白蕪荑

去扇

川黃連

去鬚

乾漆

半兩炒烟
盡先為末

雄黃

半兩研
水飛

麝香

一錢
研

右為末拌勻猪膽汁和丸黍米大每服十粒新汲水

下無時

乾漆散治疳疾虻動腹肚疼痛

乾漆

一錢炒
烟盡

使君子

十四箇
去壳

白蕪荑

六十片
去扇

棟樹東邊皮

日曬去粗皮
取白皮一分

右為細末每二三歲兒半錢下者一字沙糖熟水調

下無時

使君子散治如前

使君子仁

一錢
炒

黑牽牛

炒過為
末二錢

輕粉

二錢
匕

右為末每用半錢於五更初踈米飲調下無時

三根散治疴疾虺作腹痛啼叫不止每至月初間即甚

狀如神崇

貫虫根

去土

棠梨根

取皮用

酸石榴根

各一兩

栗刺

故綿

乾漆

各半兩

右六味並燒存性為細末每服一錢水八分盞煎至四分去滓溫服無時

猪肚丹治疳瘦盜汗少力大便有蟲曾經大効

川黃連

去鬚

胡黃連

木香

各一兩

羌活

去蘆

盧會

肉苳菹

去麩裏煨

白蕪荑

去扇

鼈甲

酥炙焦去裙襴各半兩

右為細末用猪肚一箇先刷令淨以好白芷二兩內肚中蒸極軟熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出同肚入臼杵二三百下成膏丸黍米大每服

十粒米飲下量大小加減無時

綠礬丸治疳疾有蟲愛食泥土

右以綠礬為末猪膽汁和丸菘豆大每服五七丸米飲下無時

又方治如前

右以市合人聚時買市中羊肉半斤用繩繫之頓地上令人把繩頭拖至家水洗淨炒炙依科與兒食之未能食者煮至汁與飲一方肉一斤繩繫曳數里勿

洗灸與食

除毒丹治疔虻不差傳染兄弟姊妹

鬼臼

一兩
去毛

苦參

半兩
剉

青箱子

半兩

龍膽草

去蘆
半兩

硫黃

一分

緋絹

一分

乾蟾

一分

白礬

一分

右件藥剉拌一處並燒存性為末煉蜜和丸麻子大
每服十粒磨沉香湯下無時

治小兒疔虻

右以鷓鴣糞乾為末灸猪肉蘸與之啖竒妙糞多在

水山石之上紫色如花就上刮取之

治小兒疳濕痛痒下部生蠶蟲蝕瘡

以没石子為末吹下部中 又以地榆煮汁洗之日

二 又以鐵衣著下部中

治小兒疳濕生蠶蝕痛

以地篇蓄一把水二升煮至半升空腹服半合大小
以意加減

治小兒疳熱伏結腸中下赤黃汁沫及如魚腦雜血肛

中瘡坐蟻生蟲痛痒

黃連

去鬚

藥皮

炒

苦參 鬼臼

獨活

去蘆

橘皮

芍藥

阿膠

各半兩剉蛤粉炒去蛤粉

右為末以藍汁入少熟蜜和丸小豆大每服五七丸
米飲下無時冬時無新藍取汁用子一合舂為末入

藥內蜜丸

治小兒疳濕生蟻蝕下部痒痛

胡粉

雄黃

各一分水研飛

右同研細每用少許傳下部中

治小兒疳痢不差久成濕蠱

右以艾葉半兩水一升煮取半兩量兒大小以意加減與服

治諸疳雜証方

五疳保童丸治五藏諸疳一切並主

青黛研 雄黃研 麝香研 盧會研 熊膽研 胡黃連

黃連去鬚 龍膽去蘆 苦楝皮取皮 蝦蟇灰 蝸牛微炒

白鱠魚

炙焦黃無即
炒白燕蕒代

夜明沙

微炒

五倍子

青皮

去白

天漿子

微炒各
一分

蟾頭

一枚炙
令黃

右為細末糯米飯和丸麻子大每一歲兒十九溫米

飲下日三服無時

龍香散治五疳瘦悴多啼嗽唯口瘡髮穗

白朮

一分
石膽半錢
研

龍齒

一錢
陳皮

末一錢

麝香

半字
研

右為細末每服半錢米飲調下二歲下者服一字無

時

聖功散治五疳

苦楝根皮

生子東引者
米泔浸一宿

鶴虱

各等分

右二味為末拌勻每服半錢熟水調下連進二服無

時

使君子丸治諸疳和脾胃

使君子仁

一兩

川芎

一分生

厚朴

去粗皮生薑汁
塗灸用一分

陳皮

一分去
白稱

右為細末煉蜜和丸皂子大三歲已上一粒已下半

粒陳米飲化下無時

三香青蟾丸治久疳積熱面青口乾咬甲搵眉愛鹽食
土咳嗽肚大青筋紫瘦疔羸

母丁香

三箇

麝香

半字

青黛

一分

蟾

一隻

去腸肚
灸令焦黃

右為細末煮漿水飯和圓粟米大溫水送下三九無
時

盧會丸治五疳不長肌肉食減日漸黃瘦

盧會

蕪荑

去皮

青黛

檳榔

黃連

一分

去鬚各

胡黃連

半兩

蟬殼

二十一箇去土

猪膽

二箇

麝香

少許

右除猪膽外為細末却用猪膽和丸麻子大每服五

七丸飯飲下無時

橘連丸治疴氣脾胃不和飲食不化日漸羸瘦

陳皮

一兩

黃連

去鬚一兩半

米泔浸一宿

右為細末別研麝香末半錢拌勻用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候至臨熟各以針微劄破以熟為度取出入粟米飯和丸菴豆大每服一二十九米飲下

無時

熊膽丸治諸疔羸瘦

熊膽

使君子仁

各等分

右研細放入磁器中蒸熔宿蒸餅就丸麻子大米飲
送下二十九無時

蝸牛殼治一切諸疔

右以蝸牛殼七箇洗去塵土燉乾內酥蜜於殼中磁
器盛之紙封糊蓋於蒸飯下饋時頓饋中蒸至飯熟

取出細研漸漸令服一日至盡

香蟾丹治諸疔肌瘦肚大筋多髮稀脚細

乾蟾

五箇水浸去骨用瓦藏瓶一箇頂上取一窠入蟾肉在內鹽泥固濟通留窠子木炭火燒

至烟息存性取出放地上

胡黃連

二兩 蛇蛻

一兩 燒灰

地龍

去土半兩

天竺黃

一分

朱砂

半兩

麝香

一分

右為末勻細糯米飯和丸黍米大每服十粒米飲下

無時

夜明沙丹治五疔腹脹目瀯多睡

夜明沙

一兩
微炒

胡黃連

半兩

龍膽草

去蘆
半兩

苦棟根皮

半兩

乾蟾

五箇燒存性已
上五味先為末

青黛

麝香

盧會

各一分
研細

右研勻細粳米飯和丸黍米大每服十粒米飲下無

時

紫霜丸治諸疔發熱肚大脚細髮穗面黃宿滯不消或
作寒熱腹內疼經年瘦弱及中惡等病

代赭石

火煨米醋淬不拘遍數以手
搥得碎為度半兩研細水飛

牛黃

二錢
研

朱砂

一分
研

麝香

一錢
研

鼈甲

一分
醋炙

巴豆

一分去皮心
膜出油盡

枳殼

去穰麩炒二錢

當歸

去蘆并土二錢炙

甘草

三分炙

木香

一分

生犀末

二錢

大黃

三分

右為細末煉蜜和丸黃米大每服三五丸米飲下無時

如聖丸治五疳羸瘦面黃腹急盜汗體熱乳食不消

白蘆莖

微炒去皮二兩

黃連

去鬚

神麴

炒

麥蘖

微炒各一兩淨

右為細末猪膽汁煮糊和丸黍米大每服一二十九米飲下量大小虛實加減一方有陳皮木香各半兩

又名益兒丸

鼈甲黃連丸治諸疳羸瘦發熱盜汗寒熱肚大脚細不

肯進乳食氣粗促急脾胃不調等証

鼈甲

童子小便米醋各半盞慢火上煎炙至盡色焦黃

黃連

用巴豆七箇去皮膜用水

一盞同煮水盡去巴豆不用只使黃連

白朮

人參

去蘆茯苓

甘草

炙

川練子

肉

使君子

仁

木香

草荳蔻

炮去皮

柴胡

去蘆

陳皮

去白

草龍膽

各半兩

右為細末豬膽汁和丸菜豆大每服一二十九米

飲下如有潮熱體熱不解烏梅湯下

熊膽丸治一切諸疔羸瘦

熊膽 盧會 胡黃連

各半兩

牛黃

一分研

麝香

一分研

蟾酥

少許研入麪
煮糊和劑

右勻細末入蟾酥糊和丸菴豆大每服五七丸麝香

湯下

金瓜丸治疔熱黃瘦作熱發渴久服解熱進食肥肌

黃連

去鬚

黃蘗

甘草

炙

青皮

去穰各
等分

右為細末獺猪膽汁和勻却入膽中線繫定於銀石器內以漿水煮五七沸取出風裏懸一宿於膽內出藥入鉢再入麝香少許同研爛勻丸菴豆大三歲下五七丸上者十數丸空心米飲湯下日三服無時

肥肌丸治五疳黃瘦久不美食手與脚俱浮腫煩渴飲水常服退熱肥肌殺蟲去疳此衛小兒之寶也

川練子

去核取肉二兩

川芎

二兩橘皮

揀淨四兩

龍膽

去蘆二兩

巴豆

十四箇去皮同橘皮龍膽炒至焦去巴豆不用

右為細末麵糊和丸麻子大朱砂為衣每服十九十
五丸米飲下腹脹橘皮湯下無時

香蟾丸治諸疔

大蟾

一隻去腸肚好醋
浸三日焙焦乾

蕪荑

去皮

黃連

去鬚
一分

甘草

一分
炙

夜明沙

半合用粳米百粒
同炒至焦黃去米

使君子

去壳
一分

麝香

一字
研

右為細末豬膽汁和丸蘿蔔子大每服五七丸米飲

下無時

又方名同治同

乾蟾

三箇酥炙焦黃

五靈脂

去沙石二兩

蟬殼

去土半兩

雄黃

半兩研飛

訶子肉

半兩

母丁香

半兩

胡黃連

一兩

黃連

去鬚一兩

使君子仁

一兩

青黛

一分

右為細末麵糊和丸棗豆大湯下二三十丸無時

又方名同治同

鼈甲

去裙襴醋炙黃

蝦蟇

炙黃

訶子

炮取肉

木香

各一兩

盧會

研

鐵粉

研

雄黃

研飛

胡黃連

各半兩

麝香

二分研

右都如粉細勻糊丸粟米大每服一十九米飲下病
大羸瘦者不過五七服愈曾經効驗

牛黃煎治諸疳食傷氣脹體瘦壯熱髮穗多困疔羸齒

爛鼻瘡瀉痢丁奚潮熱等疾

大蟾

一隻去皮骨肚腸灸焦為末用無灰酒一盞漬猪膽一箇取汁同熬成膏

胡黃連

訶子

炮取肉

使君子仁

蟬殼

去土

沒石子

盧會

蕪荑

去扇

熊膽

夜明沙

朱砂

水飛

雄黃

水飛各一分

木香

肉苳菘

麵裹煨去麵

二味春夏用

半分秋
冬一分

牛黃

一錢
別研

麝香

一錢
別研

腦子

半錢
別研

右為末入蟾膏和丸麻子大米飲下五七丸驚疳金
銀薄荷湯下乾疳腹脹桃仁茴香湯下疳蚘東引石
榴苦棟根湯下五歲上者十九此藥尤治疳痢若挾
熱者不可服

黃連丸治疳氣眼濇多困手足發熱脾胃虛弱髮黃作
穗漸漸羸瘦不思乳食

胡黃連

使君子肉

白蘼蕒

去扇各
一分

巴豆

十四箇去皮
膜出油盡

右為末猪膽汁和丸麻子大每服三五丸米飲下空

心日二服

盧會九治五疳面黃肌瘦腹脹髮穗目濇口臭斷爛鼻
瘡咬甲擗眉愛喫泥土瀉痢無度寒熱往來

乾蟾

大皂角

二味等分同燒存性為
末每一兩用下項藥

青黛

一分
研

盧會

一錢
研

麝香

一錢
研

朱砂

一錢
水飛研

右為末和勻浸蒸餅和丸麻子大每三歲下兒一十

丸上者以意加至二十九溫水飲送下無時

龍膽丸治諸疳發熱

龍膽草

去蘆

黃連

去蘆

使君子肉

青皮

去穰各

等分

右為細末豬膽汁和丸蘿蔔子大每服一二十九熟
水下無時

粉糖丸治疳愛食泥土

右以膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大米飲下一
丸良久取下泥土立差

龍粉丸治疳渴飲水

龍膽草

去蘆

定粉

微炒

烏梅肉

焙稱

黃連

去鬚各

半兩

右為細末煉蜜和丸麻子大米飲下一二十九

香葛散治如前

藿香

去土

乾葛

甘草

炙各一兩

白梅肉

半兩炒

右同為細末煎浮萍草湯調下半錢量大小與服無時

熊膽丸治疳瘦肚腫煩渴喫水

熊膽

雄黃

佛頂青

各半兩入麝香少許同研

肉桂

末

人參

各一錢末

右為末同勻糯米粥和丸菴豆大每服五七丸米飲

下無時此方大妙

推水散治疳渴衆藥不効

天仙子

不或多或少新瓦上焙乾四月間採又名水仙子乃蝴蝶也

乾姜

一兩炮

烏梅肉

一兩焙稱

湯瓶籛

半兩

甘草

一分

右為細末每服半錢或一字煎水索頭湯放冷調下

無時良久推水不要飲是効

覆蠶丸治諸疳瀉痢驚風等疾久不痊差及斷乳後羸

瘦漸困不能治者回死神妙

覆蠶

一箇以線串其頭陰乾只取向後有糞處細研覆蠶是第二次出者蠶

辰砂

三錢研水飛

麝香

三字研

萹撥

三錢半

雄黃

三錢半研水飛

胡黃連

三錢半

右為末以新蒸粟米飯一塊泥裹煨之取中心軟者

和藥丸菴豆大每服五七丸麝香湯送下

鷄肉煎丸治十歲已上疳勞壯熱形瘦骨熱漸成勞瘵者

宣連

去鬚土
二兩

柴胡

去蘆
一兩

蕪荑

去扇
半兩

川鶴虱

半兩

知母

一兩

秦朮

去蘆并土
淨一兩

黃芩

一兩

使君子肉

一兩

右為細末以黃嶋鷄一隻重一觔許者籠之專以大麻子飼五日殺之去毛令淨於臀間開一孔去腸肚淨洗拭乾入藥末在鷄腹內以線縫合用一小甌先於甌底鋪黑豆厚三寸頓鷄在中四傍又以黑豆圍

塞上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚衙後放溫冷取
鷄出腹中藥別頓將鷄擘剔去筋骨頭翅以淨肉研
和藥得所如乾入少酒糊丸如麻子大及菘豆大兩
等每服一二十九以意量大小加減空心臨卧煎麥
門冬熟水下如疔勞骨熱發蒸年十五已上溫酒下
忌猪肉

蝎骨丹治一切諸疔羸瘦下痢証候全備又如有邪此
乃疔毒傳深俗呼無辜者此乃疔毒也

乾蝸虎

雄者一箇微炙

蝸牛殼

一分細研

蘭香根

一分 龍花

雄黃

一分研水飛

麝香

一分研

龍腦

半分研

右為末入研拌勻米醋煮麵糊和九黍米大每服十粒煎芝麻湯下乳食後量大小輕重加減無時

香甲湯治如前能祛毒辟邪

漏蘆

去蘆一兩

沉香

半兩剉

牛蒡子

半兩微炒

安息香

半兩

訶梨勒皮

半兩微炒

鼈甲

塗酥炙焦黃去裙襴半兩

乳香

半兩研細

右為末勻細每服一錢水八分入人參少許同煎至

四分去滓溫服量大小加減無時

大麝香丹治諸疔積癰羸瘦肚大青筋頭重頂細腹中
有積毛焦氣急俗呼為丁呼為無辜此皆疔証也

麝香

半兩
研

朱砂

半兩
研
水飛

粉霜

半兩
研

五靈脂

揀淨
一兩

肉苳蔻

麵裹煨
一兩

乾蟾

一兩

夜明沙

半兩

白礬

枯半
兩

地龍

去土一
分炒

乾蜣螂

七箇去翅
足炙黃焦

右為細末入研拌勻煉蜜和丸黍米大每服五七粒

溫水下無時

問命散一切諸疔可分輕重逆順

瓜蒂

半兩

細辛

去苗一分

乾地龍

去土一分炒

白礬灰

一分

藜蘆

去蘆一分

右為細末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有蟲出即愈

治小兒腦疔鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦

以鯽魚膽汁滴鼻中連三五日効

治小兒腹疔

以蜘蛛燒熟噉之

治小兒疳熱煩渴乾瘦

以蝸牛三四十箇放一淨盤中以物蓋之令行即有
涎似銀泥同膩粉和搗便丸如黍米大溫水送下三
丸無時

治小兒疳渴飲冷水不休

麝香 人中白

各一分

右同為末蒸餅和丸麻子大一二歲服二九煎皂子

湯送下空心服

還肌散治小兒疳瀉及洞瀉穀不化

肉苳菘

一箇 訶子

二箇

去核 沒石子

一箇三味各用大麥麵裹慢火煨焦黃香

熟勿令有烟出 木香

半皂子大

右為細末每服半錢米飲調下如人行五里久更進一服神驗仍調服須用陳米飲也

又方治如前

黃連

去鬚一兩

木香

半兩

蕪荑

去扇一分

檳榔

一箇

右為末猪膽汁和九菘豆大每服十九米飲下無時
作三等九量大小與服治疔痢日夜無度

治疔瀉

以赤石脂研如麵粥飲調半錢服立差一方以川芎
等分同為末服妙

盧會九治小兒諸疔

盧會

檳榔

蕪荑

炒取仁

胡黃連

川苦棟

和核剉片炒

使君子仁

雷元

浸刮去皮各一分

橘皮

半兩洗淨

巴豆

四十九箇去皮膜同橘皮炒至巴豆焦色
只留二箇半餘者巴豆不用全用橘皮

右為細末獷猪膽汁煮糊和丸麻子大朱砂麝香細末為衣每服十九十五丸如頭面浮腫木瓜湯下若瀉而發渴陳米飲下更量大小加減

又方名同治同

盧會黃連

去鬚

川棟子

和核對

蕪荑

去扇各三分

天竺黃

一錢半

麝香

少許研

右為細末以猪膽汁和飯研爛和劑於甌上蒸兩次

九菘豆大以朱砂為衣每服五七丸至十九丸熱水下

無時

鼈血煎丸治小兒諸疳

吳茱萸 胡黃連

剉碎用鼈血浸一宿同吳茱萸炒令乾焦去茱萸不用

白蘘蕪仁 柴胡

去蘘各等分

右為細末用獾猪膽汁浸蒸餅和九菘豆大每服十丸熟水下無時

捉疳丸治小兒一切諸疳

蛆退先用米泔浸三日以杖子攪擊漉出又以泔水浸三日五日攪擊淘漉如前次入清水浸淘二日至無穢氣淨時於日中燉乾男子患用黃連女兒患用黃蘗與蛆退等分為末每藥末半兩入麝香半錢同研勻以獾豬膽汁和丸黍米大每服三四九量大小加減空心陳米飲送下神効屢驗一方六月取糞坑中蛆水淘淨入竹筒盛封口至乾時為末每服一二錢入麝香米飲調下甚妙

消疳丸治小兒諸般腹脹四肢腫滿氣上喘促小便不

利

木香

檳榔

各二兩

青皮

去穰

姜黃

蘿蔔子

炒

牽牛子

各取七錢半

右為末糊丸黍米大每服二三十丸食後姜湯送下

無時

治小兒一切疳疾

以棘針瓜蒂等分為末每用取黍米許吹鼻中日二

次用

治小兒諸疳

以黃連不拘多少同烏梅煮至黃連透時只用黃連
為末別以烏梅肉和丸如麻子大每服二十九溫水
下無時量大小加減

熊膽麝香丸治小兒一切疳疾心腹虛脹愛食泥土四
支壯熱

熊膽

一錢
研

麝香

半錢
研

壁宮

一枚去頭足尾
麪裏煨熟研

黃連

去鬚取末一錢

右同研極細以蟾酥和九黍米大每服五丸米湯送下
下量大小加減無時

香蟾散治小兒食疳羸瘦不進乳食

乾蟾

一枚塗酥炙微黃

蛻螂

一分去翅足微炒

麥蘖

一分微炒

神麴

一分微炒

右同為細末每服半錢粥飲調下無時

又方治同前

朱砂

一錢
研
水飛

麝香

半錢
研

端午日蟾眉脂

右將蟾眉脂和二味丸麻子大空心米飲下一丸如
腦疳以乳汁調內鼻中無時

治妳疳水瀉

以川椒一分去目并閉口者為末酥調少許傅腦上
日三次

治疳痢垂死

以益母草煮食之取足即差甚佳取汁飲之亦治痔

妙以地榆煮汁和飴糖食之

以樗白皮和倉朮米葱白甘草香豉同煎飲服

治小兒疳渴飲水無度

以大鮎魚一頭先燒一地坑令紅投魚坑中便以蛤粉專令一人摻在魚上須臾取出用蘆刀刮下粉入麝香少許拌勻和丸蘿蔔子大每服五丸桶繩根煎湯送下一方云冷水旋丸服

五疳丸治小兒一切諸疳

川棟子 川芎

等分


右為細末以漿水煮猪膽取汁和丸麻子大每服一
二十九溫水送下日三四服

治小兒疳氣不可療者

以綠礬火煨通赤釀醋淬之如此三次細研為末棗
肉和丸棗豆大每服五七丸溫水下無時日二三服
桃柳湯一切諸疳服諸藥後皆可用此法也

右以桃柳枝各一握並剉用水兩大椀煎數沸通手

浴兒甚佳浴畢用一青衣蓋之疖蟲自出為驗



小兒衛生總微論方卷十二

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十三

四

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯永

謄錄監生臣姜士安

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十三

諸蟲論

經言人臟腑中有九虫內二虫偏能發動為病人臟腑實強則不能為害若臟腑虛弱則隨虫所動而生焉故經亦別立三虫之名一曰蛭虫又曰長虫居胃脘之間動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛若虫貫心者即死二曰蟻虫居洞腸之間多則發動為痔瘻蜜蝕

瘡疥痂癩三曰寸白虫居腸胃之間動則損人精氣令腰脚痛弱更有一虫形若細絲或如馬尾故俗呼謂之馬尾虫此虫不拘九虫之數或云飲食中誤嚥油髮所變亦居胃中動則令兒腹中攪刺發痛不可忍受小兒虫動者多病於諸病之生皆由臟腑虛弱故也患疳勞吐瀉者尤甚錢乙論小兒虫動之證面眇白心腹痛唯是口不吐沫及無清水出也故乙又言心腹痛而吐者虫痛也心腹痛而不吐水者冷痛也但吐水不心腹痛者胃冷

也又虫痛亦與驚癇証畧畧相似但目不邪手不搐也
以此別之則無悞矣乙治虫痛者用安虫散然世人用
治虫之藥多於臨卧服之並無日分故多不驗唯於每
月初四五日間在五更時服之至日午前虫盡下矣後
以平調藥一兩服和之不可多也凡虫在人腹中每月
上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下是以中下旬服藥
則不入虫口所以不驗也亦如牛馬生子上旬生者行
在母前中旬生者並母而行下旬生者行在母後又如

猶之食鼠上旬則食前段中旬則食中段下旬則食下
段此物理之自然莫不知也然虫痛極者雖不貫心亦
能斃人昔錢乙治辛氏女五歲病虫痛他醫以巴搽礪
砂之屬藥治之不効至五日外多哭而俛仰睡卧不安
自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無
光而慢唇白吐沫至六日膏高而卧轉不安召乙至詳
而視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大
困若更加瀉則為逆矣至次日見辛曰夜來三更而瀉

乙於馮盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸乙曰此子
肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃
冷則虫動今日青此肝乘於脾又更加瀉知其氣極虛
也而藥丸隨糞下即脾胃已絕兼形病不相應故知死
病後五日昏篤七日而死

錢乙用方
本集載之

學者當此以為法

爾今除疢勞虫動者已具於疢疾門之下外諸虫之方

叙而具後

使君子治虻咬心腹疼痛

右以使君子火煨熟去殼與食以殼煎湯送下

紅桃散治虬咬心腹痛發歇有時

風化石灰

一兩燒赤
細研為末

硃砂

一錢細研
為末水飛

右拌勻細用飯飲一大盞入艾三五葉煎二三沸
看其多少調一字或半錢與服但須少用多則難
喫

龍膽湯治虬虫攻心其痛如刺吐出清水

右以草龍膽一兩剉碎水二盞煮取一盞去滓隔宿

不食至五更頓服量大小與

三角散治如前

右於七月七日採蒺藜子不以多少陰乾為散每服
半錢或一錢匕飲服日三量大小加減無時

木香桃仁丹治虻攻心痛不可忍

木香

一兩 桃仁

湯浸去皮去尖并雙仁者麩炒香熟

一兩 檳榔

鶴虱

一兩

黑狗脊

一兩

苦楝根白皮

半兩

右為細末獺猪膽汁和丸黍米大每服十粒射香湯

下無時

奪命丹主治如前病至危困者

狼牙草

一两

篇蓄

一两

苦參

一两

雷元

半两

薏苡仁

半两

鶴虱

半两

右為細末糯米和丸黍米大每服十粒生地黃汁下

無時

乳香丸治虫動心腹疼痛

乳香末

青皮

去穢炒黃為末各一分

槐花

半合炒末

風化石灰

研細

半兩

右為末勻細每服半錢槐花湯調下無時

乾漆散治如前

乾漆

炒煙盡
一錢

使君子仁

二七
箇

蕪荑

去扇六
十片

棟根白

皮

取東邊
者一錢

右為細末每服一字沙糖熱水調下二三歲半錢四

五歲一錢無時

棟皮汁治如前

右取棟根皮削去外蒼皮不用只用白者以煮濃汁
量大小與服

抵聖散治如前痛不可忍者

苦棟根白皮

二兩

白蕪荑

去扇
半兩

右為末每服一錢水一小盞煎取半盞放冷待發時
服量大小加減無時

勝丸子治如前

龍腦

研

蘆薈

研

射香

各一分

牛黃

半字
研

胡黃連

半錢
末

右為末同研勻熊膽和九菴豆大每服三五丸生米
汁水化服無時

又方

以檳榔生為末用東引石榴根煮湯調下量大小與
服或半錢一錢治寸白虫神効上旬空心食前服之
治小兒虯虫動作

以棟實一枚煮濃汁內孔中亦治虯虫以槐子杵爛
內孔中亦治虯虫

治小兒寸白虫

以桃葉杵爛絞汁服之

雷元散治小兒三虫

雷元

川芎

等錢

右為細末每服一錢飲調之日二服無時

胡粉牛黃丸治小兒蚘虫動腹內時時疼痛

胡粉

三錢

牛黃

一錢

射香

一錢

右同研為末用獾猪膽一枚取汁浸蒸餅和丸菜豆

大五歲兒溫水下七丸以意加減無時

又方治如前

以葶藶子一分生為末水三合煎取一合一日服盡
以薏苡根煮汁作糜食之甚香而効

治螻虫肉齧心腹疼痛

以鶴虱為細末用肥猪肉汁調服五歲兒服二合虫
出便止更以意加減

治螻虫及虫攻蝕下部痒痛

金匱要略卷十三
以篇蓄一把水二升煮熟五歲兒空腹服三二合乳

食前

治蟻虫攻蝕下部

以胡粉雄黃各一分同研為末每以少許傅下部

補胃膏治如前痛甚不可忍啼哭不止

良姜

一兩
微炮

肉桂

去粗皮
一兩

肉苳菹

麴裏煨
半兩

乾漆

炒烟
盡半

兩
烏梅肉

半兩
炒乾

右為細末煉蜜和丸鷄頭子大每服一二粒米飲化

下無時

香雷散治如前

雷元 鶴虱 苦棟根皮 白蕪荑

去扇各半兩

右為細末每服一字或半錢用生猪肉煮淡湯調下

無時

化虫丸治虫咬腹中攪刺疼痛

蕪荑

去扇一分

檳榔

二錢

川鶴虱

一分

右為細末豬膽汁和丸麻子大每三歲五九五七歲

十九陳米飲下無時

川棟丸治胃寒虫動心腹疼痛及上中二處焦因虛而

虫動

乾漆

三分杵碎
炒烟出盡

雄黃

一分研
水飛

巴豆霜

一錢

右為細末糊丸黍米大每服五七丸量大小加減取

東引石榴根煎湯下痛甚者煎苦楝根湯或煎蕪荑

湯下

蕪荑散治上中二焦虛及胃寒虫動心腹刺痛危惡証

候與驚癇相似

白蕪荑

揀淨乾漆炒烟盡等分

右為末每服一字或半錢米飲調發時服兒大者一錢無時

五靈脂散治虫動攻心痛欲絕

五靈脂

去沙石末二錢

白礬

枯半錢

右拌勻每服一錢或半錢水八分煎至減半溫服當

吐虫出

綠礬丸治腹中有虫愛食生物

右以綠礬不拘多少為細末猪膽汁和丸菘豆大每服五七丸米飲下無時

蜂窠蛹子治腹有諸虫口中吐出

右以蜂窠中蛹子與食之

檳榔散治寸白蟯虵諸虫

檳榔一箇木香一錢

右同為末每用一錢煎棟根白皮湯調下如棟根赤

者不堪用即害人須在月初四五日間至五更頭先
嚼肉脯一小片只嚥其汁少頃服藥至日午前虫下
勿登廁但用盆子或在淨地上庶見取下虫多少也
一服永絕根本且食粥一二日不須服補藥忌生冷
硬物五七日佳

碧金散治寸白虯蟻諸虫隨時大便糞下

苦楝根皮

一兩微炒對

鶴虱

半兩揀淨

檳榔

半兩

猪牙皂角

三錢

燒

使君子仁

半兩以上先末

青黛

半兩研

射香

一分研

右拌勻細每服一字淡猪肉湯調下無時

化虫丹治數歲上食肥甘物多而虫動

鶴虱

一兩
揀淨

檳榔

一兩
兩

苦楝根皮

一兩以
上先木

胡粉

半兩
研

白礬

半兩
研

右為細末拌勻麵糊和丸黍米大每服十粒溫漿水
入生油一兩點攪勻送下無時

黑金散治虫煩擾亂服之煩已得睡為驗

乾漆

一兩
兩

肉桂

半兩
兩

草葶藶仁

一分
分

石榴根

一分
分

雄黃

一分
研

右都於一瓦器中燒存性研為極細末每服一字或半錢研射香少許煎粟米飲調下

黃金散專治吐利後虫動

乾漆

一兩炒
烟盡

白蕪荑

去扇
半兩

肉荳蔻

麩裏煨去麩半
兩以上先為末

雄黃

三分研
水飛

右研拌勻細每服半錢煎葱白湯入生油一二點同

調下須調令勻熟即得如藥冷再上火溫服不拘時

候

胡粉丹治蟻虫發動甚者成痔漏癰疥

大棗

五十箇蒸熟
取肉去皮核

水銀

半兩二味同
研勻細成膏

胡粉

一兩
研

雄黃

半兩研
水飛

右同人棗膏研勻丸黍米大每服十粒煎苦楝根湯

送下無時

蝟皮散治蟻虫耗損氣血已成痔者

蝟皮

一兩
燒灰

螫甲

一兩酥炙
黃去裙襖

蛇蛻皮

一兩
燒灰

露蜂房

半兩
微炙

右為細末入射香末一錢拌勻每服半錢米飲調下

無時

櫻櫚散治如前

櫻櫚

一兩
燒灰

荊芥穗

一兩

側柏

一兩
炙黃

牛膝

去蘆
半兩

枳殼

去

麩炒黃
半兩

黃耆

半兩

右為細末每服半錢米飲調下乳食前

神蟾穀精丹治諸病有虫下如絲或如馬尾甚者便至危殆

乾蟾

三枚
五月五日
取者酥炙黃

穀精草

三兩
入一瓶內
鹽泥
固濟慢火煨通赤

胡黃連

半兩

皂角

三寸燒灰

瓜蒂

半兩

母丁香

半兩

先為末

粉霜

一分

蘆薈

一分

射香

一分

右同拌勻以豬膽汁和丸黍米大每服十粒溫米飲

下無時

食氣積癖論

小兒積聚癖癥者其證不同積聚乃氣之所為癖癥乃
食飲所作經言積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏
陽浮而動氣之所積名曰積乃五藏所生其發有常

處其痛不離其部氣之所聚名曰聚乃六腑所成其發無
根本其痛無常處是以積聚皆氣之所為也癖癥者其始
因脾胃虛冷乳食不化而成傷不早治停滯留結乃成癖
癥癖者邪癖也所居在脇下癥者正証也所居在腹中皆
有形或長或短或塊或片其狀不一皆堅硬作痛其因乳
得者名曰乳癖癥俗云孀癖者是也其因食得者名曰食
癖癥其因水漿得者名曰水癖癥若因按之或因轉動時
自有聲響此乃水癖癥也是以癖癥皆食飲所作也故小

兒常當節適乳哺調順寒溫若少失保衛則病從生矣如或乳哺不時寒溫失宜則脾胃不和氣不調順其候口頻撮面眇白無精光口中氣冷不思乳食便當以藥和之若不即治則成胃冷其候乳食不化或但吐水急當用藥溫之又與治則脾胃浸以成虛其候面眇白色弱腹痛口吐痰沫白綠急當用藥溫補若下痢者更與調養其中又不與治脾胃既已虛冷飲食先已不化哺乳再稍失宜即便成傷也其候身體壯熟口中氣溫面黃腹脹目無精光

或白睛多喜睡四肢垂蹶畏食肚熱大便酸臭或為吐
瀉水穀不消須宜穩藥剋化不可便行駛藥取轉小兒
氣實脾胃壯者患之有漸若氣怯脾胃弱者但稍失調
養便成傷也昔錢乙治黃承務子十歲因傷食而瀉他
醫與止之十餘日便青白乳不消身涼加噁氣昏睡以
謂困篤而召乙乙先與益黃散補肺散三日而身溫不
噁氣後以白餅子微下之復與益脾散而痢止得安或
問何以其然乙曰此本脾虛傷食而作痢初不與下之

留連十餘日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾腑病退身溫不哽氣是也然後下其所傷又問既有所傷何不先下而後補乙曰糞青白為虛冷若先下之必大虛也故先實而後下則不虛矣後更與補之乃安此乃治所傷也若傷重而不與急治則停滯留結而為癥瘕其候與食傷相侶而加更困重及一向不食但微飲少乳或渴而飲水時作寒熱亦與潮熱相似昔錢乙治曹宣德子三歲病面黃時發寒熱不食

而微飲乳及飲水不止衆醫以為潮熱用退熱藥不愈
又用止渴藥反吐請乙至乙曰此乃癖也與白餅子下
之後補脾乃以消積丸磨之果愈或問何以故乙曰不
食但飲水者食伏於胃腕內不能消致令發渴服止渴
藥吐者藥衝於脾氣逆不得下故也下之乃愈又錢乙
論小兒癖癥由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不
止或喘而嗽與潮熱相似不早治之必成疳勞以其有
癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多則

蕩條腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀脉沉細益不能食遂漸羸瘦而成疳也錢乙所用之方本集載之及脾胃虛冷米穀不化下痢者已具于前瀉門之下外用諸方叙後

半兩丸治五積六聚

巴豆

去皮大戟剉碎各半兩

右二味同入鈹內油炒焦黃為細末糊丸麻子大每服三九量虛實大小加減與服臨臥米飲下乳食前

三稜汁治諸氣積氣聚氣癖

右以京三稜取汁作羹粥米麩任為與乳母食之每日取棗大與兒喫大者漸加之又治十歲以下至百日兒無辜疳癪疰癖神妙大効功不可述

三稜煎丸治氣積氣聚氣塊疰癖水氣奔豚腎餘五疳五噎及一切諸般氣滯凝結

京三稜

炮

蓬莪茂

炮各四兩洗淨

元花

一兩去枝梗

右將上二味入磁瓶內以米醋五升浸滿封閉瓶口

用炭火攢煮之度量微乾時取出以餘醋炒元花至醋盡藥乾為度同上二味剉焙乾為末醋煮糊丸菘豆大每服三五丸生姜鹽湯下乳食前更量大小加減

姜橘丸治乳哺失宜脾胃不和

右以好陳橘皮不拘多少極陳者尤妙洗淨去白焙乾為細末每五兩入生姜末三兩和勻煉蜜丸麻子大每服三四丸米飲下無時更量大小加減與服

調中散治乳哺冷熱失宜脾胃不和

木香

一两

人參

去蘆
一两

青皮

去穢
一两

丁香

半

白朮

半

白茯苓

半

大腹皮

半

甘草

半

炙

右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片煎至五

分去滓服無時

益胃丹治如前

當歸

去蘆
洗焙

木香

白朮

沉香

各半
兩

白芍藥

剉

人參

去蘆
剉

蓬莪茂

炮

宿沙仁

各一
分

右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒射香湯送下
無時

柗木汁治胃冷正氣

右以柗木皮煎汁服之

益兒丸治胃冷氣不和食不消化亦治疳氣

神麴

炒黃

白蕪荑

去扇炒各一兩

宣連

去鬚二兩

陳皮

木香

各半兩

右為細末豬膽汁和藥末成劑再入膽內繫口定以
漿水煮數取汁和丸菉豆大每服一二十九米飲下

腹脹木瓜湯下無時一方有沒石子蘆薈各半兩

益脾散治脾胃虛冷腹痛不利全不入食

陳皮

一兩

青皮

去穰半兩

訶子肉

半兩

甘草

半兩

丁香

二錢

乾山藥

三兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗一箇同煎至五分去滓溫服無時

消食丸治傷飽乳食不化壯熱腹脹疼痛

木香

半兩

枳殼

去穰炒黃

當歸

去鬚土

代赭石

火煨醋淬

紅米不計

遍數以手撚
得碎為度

硃砂

研水飛
各半兩

巴豆

一分
取霜

右為細末糊丸黍米大一歲兒一九溫水下乳食前服

大麥麵治乳食過飽煩悶腹脹但欲睡

右以大麥生麵水調服一錢如無麥蘖亦得如無只用白麵炒微香調服一錢小兒食不知飢飽但燒鼠二枚為末服之

香橘丸治宿食不消痰滯

木香

陳橘皮

各半
兩

牽牛子

炒黃取
末一分

白朮

一分

草豆蔻仁

一分
麩裏煨

薑黃

一分

右為細末滴水 and 丸黍米大每服十粒葱白湯下大

小便秘澀不通乳食前服之

惺惺丸治宿食不化心腹脹滿身熱不思乳食

青皮

溫湯浸軟去穰
焙乾稱一兩

胡黃連

一兩

蓬莪茂

一兩
炮

巴豆

霜半
錢

右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸乳汁下大

者白湯下量大小加減乳食前

小沉麝煎丸治宿滯不化滿悶身熱

烏梅

一箇連核去仁

巴豆

二箇去殼并心膜

丁香

三箇

胡椒

四箇

右為末醋糊為丸芥子大每服三四丸飲下臨卧

消乳丹治傷乳凝滯能磨積化疳大妙

蝦蟇

十箇燒灰

木香

一兩

蓬茂

一兩半炮

青皮

去穰一兩

青黛

一兩

肉豆蔻

麵裹煨去一兩

膩粉

二錢續隨子

一分炒

麝香

許炒

右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁下無

時

蝎稍丸治乳食所傷涎痰壅滯諸般積聚急驚食癩

黑鉛

二錢以水銀
二錢結沙

輕粉

二錢

粉霜

二錢

天南星

一分

木香

四錢

白丁香

四錢炒

青黛

二錢

全蝎

二錢去毒

乳香

一錢

巴豆

一霜

錢半

滑石

二錢

麝香

半錢

腦子

半錢

右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁或米

飲下治驚風搐搦者更入天麻白附子各二錢此藥與

千金紫丸同然効更妙

大真珠丸治如前

滑石末

三錢

輕粉

三錢

半夏麴末

二錢

天南星末

二錢

全蝎

七箇

巴豆

十四箇去皮膜出油取霜

麝香

少許

右為細末蒸餅和丸菜豆大一歲兒一九葱湯送下

乳食前

小真珠丸治宿食凝滯不消乳癖積聚大小便秘溢腹

脹氣痞取磨虛中之積

木香

白丁香

直者

丁香

各半錢

滑石末

二錢

巴豆

十四箇去

皮膜水浸一宿研細爛

輕粉

半錢留少許為衣

右細勻以濕紙裹陳米飯燒取中間軟者和丸麻子
大一歲兒一丸炮皂子湯放溫送下挾風熱秘澀難
動者先服涼藥一服乳癖者虛實加減丸數隔日臨
卧更服

葱湯丸治諸般積癖腹脹顛腫

天南星末

二錢

白附子末

二錢

滑石末

二錢

全蝎

七筒輕粉

二錢

硃砂

一錢半研

巴豆

十四筒去皮心

膜出油盡取霜

右為末麵糊和丸黍米大每服三五丸葱湯送下臨卧

水晶丹治一切積癖及百物所傷

天南星

錢一

滑石

錢一

水銀粉

錢半

蕪荑仁

去扇半

巴豆

四十

箇去皮膜取
盡油留霜

右為細末爛飯和丸菴豆大每服二三丸其湯泡生葱湯送下服時須令空心不可與乳食放稍飢臨卧服痢過忌生冷粘膩硬食果子等物以藥補之

北亭丸治一切積癖黃度吐食

北亭

一錢
匕末

硃砂

一錢
匕末

膩粉

一錢

牙硝

一錢

巴豆

二十一箇
取霜

右同勻細末用蒸餅劑裹藥煨熟去焦硬者取中心軟處近藥潤者用藥和劑如硬滴入水得所丸菜豆大每一歲兒一九荊芥湯下乳食前

消堅丸取積癖下交嬾隔實消食乳癖

礪砂

一錢
末

水銀沙子

一兩
子大

明膠

五錢
末

巴豆霜

一錢

輕粉

一錢

細墨

少許

右同為細末麵糊和九麻子大一歲兒一九倒流水

下食後

神妙丸取虛中積滯化痰涎乳癖

白丁香

半錢

硃砂

一錢水飛

定粉

半兩

粉霜

一錢半

輕粉

一錢

麝香

少許

右為末粟米飯和九黍米大捻作餅子火炙紫色粟米飲下一餅乳食前

妙香丸取虛中積及治發寒熱心腹脹滿疼痛

辰砂

一兩
水飛

牛黃

龍腦

麝香

各一分

金箔

十四片

粉霜

膩粉

各一分

蠟

二兩

巴豆

一百二十粒

去皮

膜出油盡為霜

右於餽子內先鎔化蠟入巴豆霜拌勻及入諸藥攪

勻和劑量大小虛實旋丸麻子大每丸米飲下要藥

勢緊者捻藥匾若兒大或疾重者加之皆用針刺藥

餅作孔以行藥力如取積癖丸菴豆大治吐逆下膏

中虛煩積滯尤妙

靈砂丹取虛中積滯及治臟腑虛滑久經取轉裏急後

重久積惡痢或暴瀉不止神效無比

通明辰沙

顆塊有墻
壁者一分

通明礪砂

一錢各
研細

右拌研細用蠟半兩先於盞內鎔化成汁以去皮全者巴豆二十一粒入內煎至紫色漉巴豆出研細與上二味拌勻將蠟用三分中取一分再鎔成汁頃藥於內急攪令勻下火凝冷刮出成劑磁合貯之如用取即絕手三九菘豆大濃煎甘草湯放冷送下臨臥時服久積病大者藥隨病共下小可病輕者不動便

安治暴瀉惡痢濃煎艾湯先呷三五口候冷下藥治
水瀉者冷水下兒大稍增丸數

蒜貼膏治乳癖

石燕子 煨 半夏 各等分

右為末用蒜一頭杵爛攤在舊緋絹帛子上比兒患
處大小煎作麝子摻藥上貼患處候病兒口鼻中蒜
氣時揭去綿子作効更不得喫藥

神應散治如前

硫黃

粟子大
一塊

鵬砂

皂子大
一塊

訶子

一箇
去核

蜜陀僧

皂子大
一塊

右為細末每服半錢乳汁調下服了時就有癖處卧

少時當取下黑物効

丁香餅子治如前

大丁香

二錢

蜜陀僧

二錢
研

木香

一錢
半

硫黃

一錢
半

白丁香

一錢揀直
兩頭尖者

礪砂

半錢
研

甘草

一錢
半炙

麝香

少許

右為細末湯浸蒸餅丸菜豆大捻作餅子每服二餅

乳香生薑湯下乳食前

軟銀丸治如前

水銀

一錢用鉛一錢結沙

續隨子

四十九箇去殼

白丁香末

一錢

膩粉

一錢一分

鷹糞白

末一錢一分

巴豆

十四箇去皮膜出油盡

右為細末棗肉和丸菜豆大一歲兒一丸溫水下乳

食前

丁香散治如前

黑丁香

七箇

蜜陀僧

硫黃

白丁香

各一分

肉豆蔻

一箇

麴裏煨

去麴

右為細末每服半錢溫水飲調下乳食前

白丁香散治如前

白丁香

十四箇
直者

石燕子

一箇火煨瘦
者乃是雄

硫黃

一箇皂
子大

膩粉

十箇

蜜陀僧

半兩

黑丁香

二十
一箇

右為細末每料分作十服用麵絲湯調下或者煮麵湯亦得服了取下如蝦蟇胎之類惡物是効

三稜散治妳癖結實服藥不差

京三稜

一兩炮
剉碎

鱖魚甲

一兩酥炙
去裙襴

赤茯苓

去黑皮
一兩

白朮

半兩

木香

半兩

枳殼

麩炒去

穰半兩

兩

右為細末每服一錢水一盞入生薑五片煎至五分

去滓溫服時時與也

聖餅子治乳癖疔瘦

粉霜

一錢

硃砂

一錢

膩粉

五箇

石燕子

一箇

火煨

玄胡索

三箇

去皮

巴豆霜

一錢

右為細末入生麵一大錢拌勻滴水和劑分十二處

捻作餅子用刀上燂熟每服一餅煎皂子湯下

鼠肉汁粥治諸癥

右以鼠肉煮汁作粥與食

聖効丹治癥結癖積久不差

當歸

去蘆土

木香

一兩

桂心

一兩

甘遂

一兩 慢火煨黃色

硃砂

一兩 研

京三稜

半兩 炮

鱉甲

半兩 塗酥炙黃焦去裙襖

麩仁

一分

湯浸去皮研

麝香

一分 研

巴豆

二十一箇 去皮心膜 絹袋盛好酒煮一宿 研

右為末拌勻細研用黃蠟六兩慢火鎔化入藥攪勻

成膏丸黍米大一歲兒一粒二三歲者二粒四五歲

者三粒六七歲者五粒温米飲下乳食前

大腹湯治癥癖腹脹小便不利

大腹皮

一兩
剉炒

檳榔

半兩
兩

枳殼

麩炒去
穰半兩

人參

去蘆
半兩

知母

半兩
陳皮

半兩湯
去白秤

甘遂

一分慢火
煨令黃

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓放温

服無時

治幼小胎中宿熱乳母飲食麤惡及多辛苦乳汁不起
兒乳哺宿滯不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢萎蹙

服之充悅

芍藥

二兩

大黃

人參

去蘆各一兩

柴胡

去蘆二兩

鱉甲

酥炙

去裙襪

茯苓

各一兩半

甘草

半兩

乾薑

半兩有熟者去乾薑用枳實炒

右為末煉蜜和丸大豆大一歲已下兒服一九上者

二丸乳服

牛黃鱉甲丸治幼小癰實壯熱食不消中惡忤氣

牛黃

半兩

鱉甲

酥炙去裙襪

麥麩

炒

柴胡

去蘆

枳實

炒

煨

芎藭

各一兩

厚朴

去皮姜製

茯苓

不見火

桂心

不見火

芍藥

乾薑

各半
兩炮

右為末煉蜜為丸如小豆大以意量大小與服日二

服無時

丁香散治小兒爛癖一服取効不動臟腑不損胃氣

舶上硫黃

一棗
大塊

丁香

二十
一箇

蜜陀僧

一棗
大

右研細量大小臨卧以荊芥湯調下來日下黑物乃
病故也永不再發

治小兒乳癖脇下結塊不消

膩粉一分雄雀糞一分

錢頭尖者是

微炒兩

右同研勻細去皮棗肉和丸粟米大新汲水下一丸
取下惡物是効更量大小虛實用之

治小兒閃胸成癖腹大痞滿

以鶴雀脚骨及嘴煮汁服之亦可燒灰存性研為末
飲服

治小兒積癖髮黃羸瘦及生瘰癧

以生林檎杵爛醋和傳上若癖移則就傳之以苦瓠

未破者煮令熟解開熨之亦入熱湯在內熨之

治小兒乳癖

橘皮

揀淨

青皮

去穢

牽牛

各一分三味並為末

右用蒜一顆每瓣入巴豆一粒煨熟去巴豆研如泥和藥末豌豆大硃砂為衣每服一丸細嚼酒送下一方用蒜去青皮同巴豆研爛和丸臨卧冷茶清下一丸更量大小加減乳食前

小兒衛生總論方卷十三