

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷二

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勛

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣石鴻燾

謄錄監生臣張 濤

欽定四庫全書

子部五

類證普濟本事方

醫家類

提要

臣等謹案類證普濟本事方十卷宋許叔微撰叔微字知可或曰揚州人或曰毘陵人惟曾敏行獨醒雜志作真州人二人同時當不誤也登紹興二年張九成榜進士第六人醫家謂之許學士宋代詞臣率以學士為通稱

不知所歷何官也是書載經驗諸方兼記醫
案故以本事為名朱國禎湧幢小品載叔微
嘗獲鄉薦春闈不利而歸舟次平望夢白衣
人勸學醫遂得虛扁之妙凡有病者診後與
藥不取其直晚歲取平生已試之方併記其
事實以為本事方取本事詩之例以名之云
云即指此書然考獨醒雜志叔微雖有夢見
神人事而學醫則在其前不知國禎此語何

本也叔微診治之術最為精詣其所論廣絡
原野以冀一獲之說尤救弊之篤論其書屬
詞簡雅不諧於俗故明以來不甚傳布此本
從宋槧鈔出其中凡九字皆作圓猶是漢張
機傷寒論金匱要畧舊例也國禎又記叔微
所著尚有擬傷寒歌三卷凡百篇又有治法
八十一篇及仲景脉法三十六圖翼傷寒論
二篇辨類五卷今皆未見傳本疑已散佚云

乾隆四十四年六月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

類證普濟本事方卷一

宋 許叔微 撰

治中風肝胆筋骨諸風

治肝經因虛內受風邪卧則魂散而不守狀若驚悸

真珠圓

真珠母

三分研
細同碾

當歸

酸棗仁

熟地黄

各一
兩半

人參

伏神

柏子仁

各一
兩

犀角

沉香

龍齒

各半
錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大辰砂為衣每服四五
十九金銀薄荷湯下日午夜卧服

獨活湯

獨活

黑者

羌活

人參

防風

前胡

華陰細辛

五味子

沙參

白茯苓

半夏

酸棗仁

甘草

各一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半生姜三片烏梅半
箇同煎至七分去滓不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則
魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通夕無寐更
數醫而不效予為診之親詢曰醫作何病治董曰衆皆
以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因
虛邪氣襲之肝藏魂者也游魂為變平人肝不受邪卧
則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧
則魂揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此
未之聞雖未服藥已覺沉疴去體矣願求藥法予曰公

且持此說與衆醫言所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方書無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類故也龍齒虎睛今人例以鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各有類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂游而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍

齒萬物有成理而不識亦在夫人達之而已

治中風雖能言口不喎斜而手足躄曳脉虛浮而數風
中腑也蓋風中脉則口眼喎斜風中腑則肢體廢風中
臟則性命危凡風中腑宜汗而解

星附散

天南星

薄切
汁浸

白茯苓

汁浸

川烏

汁浸

人參

不浸
白附子
汁浸

白僵蚕

浸汁
沒藥

黑附子

半夏

薄切
以上各
等分

右為細末每服二錢水酒各一盞同煎至八分去滓

熱服二三服汗出差項在桐廬有人患此證三投此藥得汗手足能舉

治體虛有風外受虛濕身如在空中

二生散

生附子

生天南星

各等分

右二味以咀每服四大錢水一盞半生薑十片慢火

煎至八分去滓服戊子年予在新安有此疾張醫博

子發授此方三服愈

治中風忽然昏若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上
鬲氣閉不通宜急救

稀涎散

猪牙皂角

四挺肥寔不
蛀者去黑皮

晉礬

光明者
一兩

右細末研勻輕者半錢重者三匙七溫水調灌下不
大嘔吐但微微冷涎出一二升使得醒次緩而調治
不可便大服亦恐過傷人孫兆方

治中風同前證

勝金圓

生薄荷

半兩

猪牙皂角

二兩搥碎水一升二味一處搗引汁漫火熬成膏

瓜蒂末

一兩

藜蘆末

一兩

朱砂

半兩研

右將硃末一分與二味研勻用膏子搜和丸如龍眼
大以餘硃為衣溫酒化一丸甚者二丸以吐為度得
吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金
虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣
閉不行湯藥不能入命在須臾執以無吐法可乎但

不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢耳予常用此三方
每每有驗

治一切風

拒風丹

川芎

四兩防風

一兩半

天麻

一兩

甘草

一兩

細辛

三錢半

畢撥

半兩

右細末煉蜜和杵每服作三十九丸每將一粒細嚼荆
芥湯或溫酒下尋常些小傷風頭痛鼻塞項強筋急

皆可服予家常合老幼所須之藥

世言中氣者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰
憂愁不豫氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞
牙關緊急若概作中風候用藥非止不相當多致殺
人元祐庚午母氏親遭此禍至今飲恨母氏平時食
素氣血羸弱因先子捐館憂惱忽一日氣厥牙噤涎
湖有一里鑿便作中風以大通丸三粒下之大下數
行一夕而去予常痛恨每見此證急化蘇合香丸四

五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱而調治之無不
愈者經云無故而瘖脉不至不治自己謂氣暴逆也
氣服則已審如是雖不服藥亦可 范子默記崇寧
中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共
灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地倉百會
肩隅曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而
用之無不立効

元符中一宗人得疾踰年不差謁鑿於王思和繹思

和具脉状云病因驚恐肝臟為邪邪來乘陽明之經
即胃是也邪盛不畏勝我者又來乘肺肺緣久病氣
弱全無聽受其肝凌侮其病時復頭眩瘕瘕搖掣心
胞伏涎久之則害脾氣要當平肝氣使歸經則脾不
受尅脾為中州上主四肢一體之事脾氣正則土生
金金旺則肺安矣今疾欲作時覺氣上衝者是肝侮
肺肺不受侮故有此上衝肝勝則復受金尅故搖掣
也以熱藥治之則風愈甚以冷藥治之則氣已虛肺

屬金金為清化便覺臟腑不調今中和溫藥抑肝補
脾漸可安愈今心忪非心忪也胃之大絡名曰建里
絡胸膈及兩乳間虛而有疾則動須臾時發一陣熱
者是其候也服下三方一月而愈思和名鑿寓儀真
時人少知者後至都下聲名籍甚為鑿官政和中度
為黃冠終藥珠侍晨

續斷湯

續斷 杜仲 細辛 白茯苓 牛膝 肉桂

防風

白芍藥

各一兩

甘草

當歸

人參

川芎

秦朮

川獨活

熟地黄

各三兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎
至七分空心食前稍熱服

暑預圓

薯預

人參

沙參

遠志

防風

真珠母

紫石英

研水飛

茯苓

虎骨

各一兩

虎睛

一對二味須真者

龍齒

華陰細辛

石菖蒲

五味子

丹參

右為細末煉蜜為丸梧子大每服三十九至五十九
金銀薄荷湯下食後臨卧服

獨活散

川獨活 白朮 白茯苓 葳蕤 秦艽

栝子仁 甘草各一兩 犀角 川椒 熟地黄

枳實 白芷 官桂各半兩 人參一分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎
至七分不拘時服

治風在肝脾語蹇脚弱大便多秘

地黄酒

熟地黄

四兩

附子

茵芋

羌活

防風

芎藭

各一

兩

石斛

二兩

丹參

二兩半

牛蒡根

二兩半

牛膝

杜仲

桂枝

各兩半

大麻子

一升

右細剉入絹袋盛寬貯之用無灰酒一斗九升封漬

七日逐日空心食前飲一盞常曠勿令吐

治中風內虛脚弱語蹇

防風湯

石斛

一兩半

乾地黄

杜仲

丹參

各一分

防風

川芎

麥門冬

桂心

川獨活

各一兩

右為粗末每服五錢水一大盞半棗二枚同煎八分去滓溫服
治中風入脾肝經年四肢不遂舌強語蹇

竹瀝湯

葳靈仙

附子

桔梗

防風

蔓荊子

枳殼

川芎

當歸

各等分

右為粗末每服四錢水一盞竹瀝半盞薑三片同煎
至八分去滓溫服日三四忌茗

治久風邪入肝脾二經言語不轉

防已湯

漢防已

防風

桂心

附子

各半兩

葳靈仙

三分

麻黃半兩

右為粗末每服四錢水一盞引子半盞煎至七分去
滓溫服日三四引子用竹瀝荆瀝地黃汁各一盞生

薑汁半盞和勻用之以上四方龐先生傳審而用之
良驗

治筋急項強不可轉仄

木瓜煎

宣州木瓜

二個取
蓋去穰

沒藥

二兩
研

乳香

一分
研

右二味入木瓜內蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四
次研爛成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黃汁
半盞無灰上醞二盞和之用八分一盞煖熱化膏有

人患此病自午後發黃昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡各有筋惟足少陽之筋自足至頂大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予授此方三服而愈同官飲丞張德操常言其內子昔患筋攣脚不得屈伸者踰年動則令人持抱求鑿於泗水楊吉老云此筋病宜服下

三方服一年而愈

治筋極養血

地黃圓

熟地黃

錢一 頑荆

分一

山茱萸

分五

黑狗脊

炙

地膚子

白朮

乾漆

蟻螬

乾炒

天雄

車前子

各三錢

葶藶

山羊

澤瀉

牛膝

各一兩

右細末煉蜜和杵如梧子大每服五十九溫酒下空心夜卧服

治筋痺肢節束痛

欽定四庫全書

醫

類證普濟本草方

十一

羚羊角湯

秋服之

羚羊角

桂皮

附子

獨活

各一兩
三錢半

白芍藥

防風

炙

芍藥

各一兩

右為粗末每服三大錢水一盞半生薑三片同煎至
八分取清汁日服二三服

治寒冷濕痺留於筋脉攣縮不得轉仄

烏頭湯

冬服之

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦朮

附子

官桂

白芍藥

各七分

乾薑

白茯苓

防風

當歸

各一兩

川獨活

一兩三錢半

右為粗末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分
去滓空心食前服

凡中風用續命排風風引竹瀝諸湯及神經丹茵芋
酒之類更加以灸無不愈者然此疾積習之久非一
日所能攻皆大劑久而取効唐書載王太后中風喑
默不語醫者蒸黃芪數斛以薰之得差蓋此類也今

人服三五蓋求效責鑿也速矣孟子曰七年之病三年之艾久而後知耳

治一切癱瘓風

鉄彈圓

乳香

沒藥

各一兩

川烏

半兩

五靈脂

四兩

右先將乳香沒藥於陰涼處當風細研更用研了麝香一錢將下二味為細末然後同前二味再碾再研滴水為丸如彈子大磁合收每服一九薄荷酒磨下

日用三服

黑神圓

草烏頭

不去皮生

五靈脂

各等分

右為末六月六日滴水為丸如彈子大四十歲以下分六服病甚一九分二服薄荷酒磨下覺微麻為度

治風客陽經邪傷膝理背脊強直口眼喎斜體熱惡寒疾厥頭痛肉腠筋惕辛額鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目眩暈如在車船常服解五邪傷寒辟霧露瘴氣爽忠神志諸風不生

定風餅子

天麻 川烏 南星 半夏 川薑 川芎

甘草

白茯苓

等分
並生

右細末生薑汁為丸如龍眼大作餅子硃砂為衣每
服一餅細嚼熱生薑湯下不拘時候熙豐間王丞相
常服預防風痰神驗

治胆虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶
茯神散

茯神^一 遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地黃

甘菊花

各三分

枳殼

治胆虛不得眠四肢無力

驚甲圓

鼈甲

人參

黃芪

酸棗仁

牛膝

羌活

五味子

各等分

右為細末煉蜜杵丸如梧子大每服三四十丸酒下

治胆虛目暗喉痛唾數眼目眩冒五色所障夢見被人

訟恐懼面色變青

補胆防風湯

防風

錢一人參

分六

細辛

分五

芎藭

甘草

茯神

獨活

前胡

各八分

右為粗末每服四大錢水一盞半棗二枚煎至八分
去滓食前服

治胆虛常多畏恐不能獨卧如人捕狀頭目不利
人參散

人參 枳殼 五味子 桂心 分各三 栝子仁

熟地黃 各一 山茱萸 甘菊花 茯神 枸杞子

各三分

右為細末每服二錢溫酒調服

治肝厥狀如癰疾不醒嘔吐醒後頭虛暈發熱方

麻黃 鈎藤 取皮 石膏 乾葛 半夏麩 柴胡

甘草 枳殼 甘菊 各等分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同

煎至八分去渣溫服

類證普濟本事方卷一

欽定四庫全書

類證普濟本事方卷二

宋 許叔微 撰

治心小腸脾胃病

治因驚言語顛錯不能服溫藥宜

遠志圓

硃砂

半兩入麝少許同研

金箔

五片

遠志

南星

白附子

白茯苓

酸棗仁

人參

各半兩

右為細末煉蜜丸如梧子大硃為衣每服三十九薄

荷湯下食後臨卧服

茯神散

茯神 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 桔梗

白茯苓 遠志 人參

各等分

右為細末每服二錢水一盞燈心棗同煎至七分不
拘時服 宋明遠教授母七十四歲因戎馬驚疾如
上證服此二方得力

寧志膏

人參一 酸棗仁一 辰砂半 乳香一

右為細末煉蜜和杵丸如彈子大每服一丸薄荷湯

化下 予族弟婦緣兵火失心製此方與之服二十

丸愈親舊多傳去服之皆驗

治驚憂積氣心受風和發則牙關急緊涎潮昏塞醒則

精神若痴

驚氣圓

附子 南木香 白僵蚕 花蛇 橘紅 天麻

麻黃

各半兩

乾蝎

一分

紫蘓子

一兩

天南星

洗淨切薄

一夕用

硃砂

一分留少許為衣

右為末入研腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下溫酒亦可

此予家秘方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刃得釋神失如痴予與一丸服訖而寐及覺病已去矣二東提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃山沃巡檢彥其妻狂厥者踰年

更十餘鑿而不驗予授此方去附子加鉄粉亦不終劑而愈鉄粉非但化涎鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪太盛鉄粉能制伏之素問云陽厥狂怒治以鉄烙飲金尅木之意也此亦前人未嘗論及安神鎮心治驚悸消風痰止頭眩

辰砂遠志圓

石菖蒲 遠志 人參 川芎 山芋 鉄粉

天麻 半夏麴 南星 白附子 各一

劉散子大 麴炒黃 兩生

細辛

辰砂

各半
兩

右為細末生薑五兩取汁入水煮和丸如菘豆大別
以硃為衣乾之每服二十粒夜卧生薑湯下小兒減
半服

茯苓圓

辰砂

石菖蒲

人參

遠志

茯神

白茯苓

真鉄粉

半夏麴

南星

牛胆製
各等分

右為細末生薑四兩取汁和水煮糊凡如梧子大別

用硃為衣乾之每服十粒加至二十粒夜卧生薑湯
下上二方鑿官都君子常用以療心疾良驗

治心驚熱小便澁及治五淋

火府丹

生地黄

二兩

木通

黃芩

各一兩

右為細末煉蜜杵丸梧子大每服三十九丸木通煎湯
下此藥治淋澁臍下滿痛

壬戌年一卒病渴日飲斗水不食者三月心中煩悶

時已十月予謂必心經有伏熱與此藥數服五十粒
溫水下越二日不覺來謝云當日一服渴止又次日
三服飲食如故此本治淋用以治渴信知用藥要在
變通也

開胃養氣進飲食

七珍散

人參 白朮

黃芪

蜜水
津灸

甘草

粟米

微炒

白茯苓

各一
兩

右為細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七分如故

不思飲食加白扁豆一兩蒸用名八珍散

予製此方溫平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後
用此以調脾胃日三四服十日外飲食倍常

治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛

麩朮圓

神麩十兩

微炒白朮

五兩

土炒乾薑

官桂

川椒

吳茱萸

各二兩

右為細末薄糊丸如梧子大每服三五十九生薑湯
下食前稍空服有飲加半夏麩二兩癸亥中予作數

劑自服飲食倍進

和氣調中進飲食

白朮湯

白朮 厚朴 桂心 桔梗 乾薑 人參

當歸 茯苓 甘草

各等分

右為粗末每服四錢水盞半棗二枚煎八分去滓不
拘時服龐老方

治腰腎虛弱全不飲食

二神圓

破故紙

四兩
炒

肉苳菘

二兩
生

右為細末用大肥棗四十九枚生姜四兩切片同煮棗爛去姜取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵丸如梧子大每服三十丸鹽湯下有人全不進食服補脾藥皆不效予授此方服之頃然能食此病不可全作脾虛蓋腎氣怯弱真元衰劣自是不能消化飲食譬如鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不熟

其何能化黃魯直嘗記服兔絲子淨淘酒浸曝乾日炒數匙以酒下十日外飲噉如湯沃雪亦此理也

溫脾散

舶上茴香炒 青皮 陳艾 縮砂仁 桔梗 香

白芷 厚朴各一兩 木香 白朮 香附子各半兩 甘

草一兩 紅豆半 良姜 麥芽 乾葛各三分

右為粗末每服一錢水一盞棗一枚煎七分食前服

治肺腎兩經病

肺之積名曰息賁在右脇下大如杯令人洒淅寒熱喘嗽發癰疽

棗膏圓

葶蘆

陳橘皮

桔梗

各等分

右先以下二味為末入葶蘆研勻煮肥棗肉和丸如梧子大每服五七丸飲下予常患停飲久積肺經食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

平肺氣補虛消飲

五味子圓

五味子

二兩

桂心

大杏仁

青皮

細辛

人參

檳榔

煨各一兩

乾姜

炮

附子

各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十丸或酒或湯下空心食前日三服

定喘急肺積

葶蘆圓

苦葶蘆

二兩一錢

當歸

肉桂

白蒺藜

乾姜

川烏頭

吳茱萸 鱉甲 大杏仁 白茯苓 人參各半兩 檳榔一兩

右為細末煮棗肉和杵丸如梧子大每服二三十丸

姜棗湯下日三四服不拘時

治多年肺氣喘急

紫金丹

信砒飛半錢 豆豉畧潤少成膏

右用膏子和砒同杵極勻丸如麻子大每服十五丸小兒
量大小與之並用蠟茶臨卧以知為度有一親戚婦人患

十年而壘者皆不效忽有一道人貨此藥漫贖一服是減
半數服頓愈遂多金丐得此方予屢用以救人特為神異
治肺虛實不調鼻塞多涕咽中有涎而喘項強筋急或痛

細辛湯

細辛

半夏麩

茯苓

桔梗

各四錢

桂枝

三錢

甘草

二錢

右為粗末每服四錢水二盞生姜四片蜜半匙同煎
至七分溫服日三服

治肺癰吐膿血作臭氣胸乳皆痛

升麻湯

川升麻 桔梗 薏苡仁 地榆 子芩 牡丹

皮 芍藥

各半 甘草 三分

右剉粗末每服一兩水一升半煎五合去滓日三服

治肺喘久不息責

五靈圓

五靈脂

二兩半

木香

半兩

葶藶

一分

馬兜鈴

一分

去殼炒

右為細末棗肉和丸如梧子大每服二十九丸姜湯下日三服

脾惡濕腎惡燥如硫黃附子鐘乳鉛丹之類皆剛劑
人用之以助陽補接真氣則可若云補腎則正腎所
惡者古人製方益腎皆滋潤之藥故仲景八味丸本
謂之腎氣丸以地黃為主又補腎強陽之類皆正補
腎經也近世盛行香茸丸可補腎經亦有數方其後
蔡太師所服香茸丸

鹿茸

熟地黃

各二兩

附子

茯苓

破故紙

當歸

各一兩

沉香

半兩

射香

一錢

右為末入麝研勻煉蜜杵丸梧子大每服三五十九
空心鹽湯下

又方

鹿茸二兩沉香 人參 白芍藥 熟地黄 生地

黃 茯苓 牛膝 澤瀉 大附子 當歸各一兩

麝香一錢

右為細末酒糊丸如梧子大每服五十九鹽酒鹽湯

下

又方

熟地黄

五兩

兎絲子

四兩 別末

鹿茸

三兩

附子

二兩

沉香

一兩

右為細末入麝半錢煉蜜杵丸如梧子大每服三十

丸至五十九丸鹽酒鹽湯下

治腎氣上攻項背不能轉移

椒附散

大附子

一枚六錢以上者
炮去皮臍末之

右每末二大錢好川椒二十粒用白麪填滿水一盞

半生姜七片同煎至七分去椒入鹽通口空心服
一親患項筋痛連及背髀不可轉服諸風藥皆不效
予嘗憶千金羸有腎氣攻背予強證與之兩服頓差
自後與人皆有驗蓋腎氣腰自夾脊上至曹谿穴然
後入泥丸宮曹谿一穴非精於搬運者不能透今逆
行至此不得通用椒以引歸經則安矣蕭氣上達椒
下達詩言椒聊且貽我握椒皆此意矣

治腎經虛腰不能轉仄

麋茸圓

麋茸

一兩如無以鹿茸代之

曳絲子

取末一兩

舶上茴香

半兩

右為末以羊腎一對法酒煮爛去膜研如泥和丸如
梧子大陰乾如腎膏少入酒糊佐之每服三五丸
溫酒鹽湯下

戊戌年八月淮南大水城下浸灌者連月予忽臟腑
不調腹中如水吼數日調治得愈自此腰痛不可屈
折雖頰面亦相妨服徧藥不效如是凡三月予後思

之此必水氣陰腎腎經感此而得乃灸腎愈三七壯
服此藥差

治腎虛或時脚腫兼治脾圓

地黄圓

熟地黄

二兩半

肉蓯蓉

白茯苓

澤瀉

各三兩

桂枝

附子

各半兩

五味子

黃芪

一兩獨莖者

右為細末煉蜜杵丸如梧子大每服四五十九空心

酒下食前再服

治腎虛足膝無力

青鹽圓

茴香

三兩 兔絲子

末四兩

乾山藥

二兩

青鹽

一兩

右將兔絲洗淘無灰酒浸日中煎七日冬天近火煨之晒乾別末將餘藥末和勻酒糊丸如梧子大每服三五十九鹽酒鹽湯下予頃常服數年力壯食加有一婦人足躄曳因服此藥履地如故

補益虛勞方

治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充悅肌膚進美飲食

五味子圓

五味子 川巴戟 肉蓯蓉 人參 熟地黃

覆盆子 白朮 兔絲子 益智仁 炒 骨碎補 洗去

毛 牡礪 以上各等分

右為細末煉蜜杵丸如梧子大焙乾每服三十九空心食前米飲下日二三服此藥補氣止汗

平補五腑虛羸六府怯弱充肌膚進飲食

人參圓

人參 山茅 白朮 白茯苓 石斛 黃芪
取頭

末 五味子 各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心食前
飲下久服不熱尤宜少年

補血益氣治虛勞少力

雙和散

黃芪 熟地黃 當歸 川芎 各一兩 白芍藥 二兩

官桂

甘草

各三分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片肥棗一枚煎至八分去滓服于製此方止是建中四物二方而已每傷寒瘧疾中暑大病之後虛勞氣乏者以此調治皆驗不熱不冷溫而有補

黑錫圓

此丹陽慈濟貞方

黑鉛

硫黃

各三兩

舶上茴香

附子

胡盧巴

破故紙

川練肉

肉豆蔻

各一兩

巴戟

木香

沉香

各半
兩

右將沙子研細餘藥末研勻入碾自朝至暮以黑光
色為度酒糊丸如梧子大陰乾布袋內探令光瑩如
丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷夜夢
鬼交覺來盜汗面無精光肌體燥澀耳內虛鳴腰疼
痛心氣虛精神不寧飲食無味日漸瘦悴膀胱久冷
夜多小便婦人月事愆期血海久冷惡路不止赤白
帶下及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢厥冷不

省人事急用棗湯吞下一二百丸即便回陽命無不活但是一切冷疾益酒益湯空心吞下三四十丸婦人艾醋湯下此藥大能調治榮衛升降陰陽安和五臟洒陳六腑補損益虛回陽返陰功驗神聖

治虛勞羸瘦乏力不食倦怠多驚畏

石斛散

石斛錢四 牛膝 柏子仁 五味子 遠志

木香 杏仁 肉蓯蓉 陳橘皮 訶子

人參 熟地黃

各三錢

白茯苓

柴胡

炒

甘草

二錢神

曲

麥芽

各六錢

乾姜

一錢半

右為細末每服二錢米飲調下食前日三服

治虛損補精髓壯筋骨益心智安魂魄令人悅懌駐顏
輕身延年益壽閉固天癸

八仙丹

伏火硃砂

真磁石

赤石脂

代赭石

石中

黃禹餘糧

五味並用醋淬

乳香

沒藥

各一兩

右為細末研勻極細糯米濃飲丸如梧子大或如豆大每服一
粒空心鹽湯下有人年幾七旬夢漏羸弱氣惛惛然虛損得
此方服之忽然強壯精氣固閉飲食如故予常製此自服良驗

治頭痛頭暈方

治風眩頭暈

川芎散

山茱萸一兩 山藥 甘菊花 人參 茯神 小川芎 各半兩

右細末每服二錢酒調下不拘時候日三服不可悞

用野菊龐先生方

治肝厥頭暈清頭目

鈎藤散

鈎藤 陳皮 半夏 麥門冬 茯苓 茯神

人參 甘菊花 防風 各半兩 甘草 一分 石膏 一兩

右為粗末每服四錢水一盞半生薑七片煎八分去滓溫服
治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脉舉
之則弦按之石堅宜玉真圓

玉真圓

硫黃

二兩

石膏

煨通赤研

半夏

湯洗各一兩

硝石

一分半

右為細末研勻生薑汁糊丸如梧子大陰乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元穴百壯

良方中黃九子亦佳素問云頭痛顛疾下虛攻實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招搖目暝耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者

如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故
肝虛頭暈腎厥顛痛不同如此治肝厥鈎藤散在前
治氣虛頭疼

大附子一枚剉去心全蝎二個入在內以所剉附
子末同鍾乳粉一分麩少許水和裏炮熟都碾為
末以焦黃為度葱茶調下一錢或半錢甚效

又方

大川芎

二個剉
作四片

大附子

一個和皮
生為末

右以水和附子末如麩劑裹芎作四處如附子末必
入少麩裹畢以針穿數孔用真腦麝薰有穴處內香
再捻合穴子如未覺內有香即再薰一炷細羅灰用
銚子內熟灰炮熟末之每服半錢葱茶調下不拘時
候右泗鑿楊吉老二方神良

又方

好川芎半兩為末每服二錢腦茶清調下甚捷曾有
婦人產後頭痛一服愈

治氣虛頭暈

白芷圓

白芷

石斛

乾薑

各兩半

細辛

五味子

厚朴

肉桂

防風

茯苓

甘草

陳皮

各一兩

白朮

一分

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九清米飲下
不饑不飽服鄉人邵致遠年八十有三有此疾得此
方數服即愈揚吉老傳

治風寒客於頭中偏痛無時疼時牽引兩目遂致失明

白附子散

白附子

一兩 麻黃 不去節

川芎

南星

各半兩

全蠍

五個

硃砂

麝香

各一分

右為細末酒調一匙服之去枕少時此方見必用方
庚寅年一族人患頭痛不可忍一服即差

治一切頭旋本因體氣弱風邪乘於陽經上注於頭面
遂入於腦亦因痰水在於胸膈之上犯大寒使陽氣不
行痰水結聚上衝於頭目令頭旋

羚羊角散

羚羊角

茯神各一兩

芎藭

防風

半夏

湯洗

白芷

甘草各半兩

枳殼

附子

各一分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑半分漫火煎至七分去滓不拘時溫服

治虛風頭旋吐涎不已

養正丹

黑鉛

水銀

硫黃

硃砂

各一兩

右用建盞一隻火上鎔化成汁次下水銀用柳枝條打勻取下放少時下二味末打勻令冷取下研為粉用米飲丸或用棗肉丸如梧子大每服三十九鹽湯下此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

治一切中風頭疼

黑龍圓

天南星

洗

川烏

各半 勦黑豆蒸三次

石膏

半勦

麻黃

乾薄荷

四藻本

白芷

各二兩

京墨

一兩半

右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一丸薄荷茶湯嚼

下



類證普濟本事方卷二

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷

三

詳校官文醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈔

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣張 濤

欽定四庫全書

類證普濟本事方卷三

宋 許叔微 撰

風寒濕痺白虎癰節走注諸病

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脉緩急

續斷圓

川續斷 草薢 當歸切微炒 附子 防風 天麻

各一兩
乳香半兩 沒藥半兩 川芎三分

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸或酒或飲

下空心食前服

治榮衛澁少寒濕從之痺滯關節不利而痛者

增損續斷圓

川續斷 薏苡仁 牡丹皮 桂心 山芋 白

茯苓 黃芪 山茱萸 石斛 麥門冬 各一兩 乾

地黃 三兩 人參 兩 防風 二兩 白朮 炮 鹿角膠 各七錢

右為細末煉蜜丸梧子大每服三四丸溫酒下空

心食前服

治風寒濕痺麻木不仁粥法

川烏

生為末

右用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用漫火熬
熟稀薄不要稠下姜汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空
心啜之溫為佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米
作一中碗服

此粥大治手足四肢不遂痛重不能舉者有此證預
服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也脾主四

肢風邪客於肝則溼脾脾為肝尅故疾在末較氣引
風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予
常製此方以授人服者良驗

治濕傷腎腎不養肝肝自生風遂成風濕流注四肢筋
骨或入左肩髀肌肉疼痛入左指中

薏苡仁散

薏苡仁

一當歸
兩

小川芎

乾姜

甘草

官桂

防風

茵芋

人參

羌活

白朮

麻黃

獨活

各半
兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

治五種痺腿步臂間發作不定此脾胃虛衛氣不溫分
肉為風寒濕所著

芎附散

小川芎

附子

黃芪

白朮

防風

熟地黃

當歸

桂心

柴胡

甘草

各等
分

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同



煎七分去滓食前日三服常服不生壅熱煎消積冷
治白虎癰節諸風疼痛游走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇
及一切手足不測疼痛

麝香圓

川烏

大八角者
三個生用

全蝎

二十一
個生

黑豆

三十一
粒生用

地龍

半
兩

生

右為細末入麝半分同研勻糯米糊為丸如菜豆大每服
七丸甚者十九夜卧令高空温酒下微出冷汗一身便差

予得此方凡是癰節及不測疼痛一二服便差在歛
州日有一貴家婦人徧身走注疼痛至夜則發如蟲
嚙其肌多作鬼邪治子曰此正癰節病也三服愈
癰節宜發汗

麻黃散

麻黃一兩羌活一兩黃芩三分細辛真華陰者黃芪

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服接
續三四服有汗慎風

治癰節腫滿疼痛

茵芋圓

茵芋 硃砂

薏苡仁

各一分

牽牛子

一兩半

郁李仁

半兩

右為細末煉蜜杵丸如梧子大輕粉滾為衣每服十至十五至三十丸五更初溫水下到晚未利可二三服快利為度白粥將息

治風熱或癰節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝
遇暑熱或大便閉即作

牛蒡子散

牛蒡子

三兩

新豆豉

炒

羌活

各一兩

生地黄

二兩

黃芪

一兩半

右為細末湯調二錢空心食前日三服此病多胸膈生痰久則赤腫附著肢節久久不退遂成厲風此孫真人所預戒也宜早治之

治厲風手指攣曲節間疼不可忍漸至斷落

單麻圓

草麻

去殼

黃連

剉如豆
各二兩

右以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後
用草麻子一粒擘破面東以浸藥水吞下平旦服漸
加至四五粒微利不妨水少更添忌動風物累用得
效神良

栢葉丸

栢葉

麻黃

山梔子

枳殼

羌活

羊肝石

白蒺藜

升麻

子芩

防風

牛蒡子

荆

芥 芫薊子

大黃

各半
兩

苦參

一
兩 烏蛇

一條

右為細末每服二錢溫水調下日七八服龐老方

治風毒瘡如大風疾

綠靈散

用桑葉洗熟蒸日乾為末水調二錢日服四五丸

治走疰癱節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

越痛圃

草烏頭

三兩半
去皮尖

熟地黃

南星

半夏麩

白僵

蚕

烏藥

各半兩
並日乾

右為細末酒糊丸如梧子大日乾每服五七粒空心
夜卧温酒下如跌撲痛用姜汁和酒研十數粒搽之
如卒中倒地姜汁茶清研五六丸灌下立醒大智禪
師方

治宿患風癰遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻痺
烏頭圓

草烏頭一觔入竹籬子內以水浸用瓦子於籬內就

水中瀧洗如打菱角法直候瀧洗去大皮及尖腔起
令乾用麻油四兩鹽四兩入銚內炒令深黃色傾出
油只留鹽並烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈
破心內如米一點白恰好也如白多再炒趁熱杵羅
為末用醋糊丸如梧子大乾之每服三十九空心晚
食前溫酒下真州資福文雅白老元祐間有此疾服
此數年肌體黑點頓除脚力強健視聽不衰有一宗
人遍身紫點風身如墨服踰年體悅澤教予服之亦

得一年許諸風瘡疹瘍皆除然性差熱雖制去毒要
之五七日作烏頭粥啜之為佳法用預章集中者

治風痰停飲痰癖嗽

治停痰宿飲

化痰圓

半夏

湯洗三次別末

人參

白茯苓

白朮

桔梗

切作小片

薑汁浸各一兩

枳實

香附子

前胡

甘草

各半兩

右為細末用半夏薑汁煮糊丸如梧子薑湯下三四十九

治中腕風痰涎飲眩暈嘔吐酸水頭疼惡心

三生圓

半夏

二兩

南星

白附子

各一兩

右並生為末滴水丸如梧子大以生麵滾衣陰乾每服十九至二十九薑湯下

治心腹中腕痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花湯

旋覆花 細辛 橘皮 桂心 人參 甘草

桔梗 白芍藥 半夏

各半兩 茯苓

三分

右為粗末每服四錢水盞半薑七片煎八分去滓溫服
治心下停飲冷痰頭目瞑眩睡卧口多涎

栝榔丸

栝榔

三分

丁香

半夏

一兩

細辛

乾薑

人參

各半兩

右為細末薑汁煮糊丸如梧子薑湯下二三十丸日三服

治酒癖停飲吐酸水

乾薑丸

聖惠方

乾薑

葛根

枳殼

橘紅

前胡

各半兩

白朮

半夏麴

山萸肉

甘草

各一分

右為細末煉蜜丸如梧子每服三十丸用飲下

治積聚停飲痰水生蟲久則成反胃及變為胃癰其說
在靈樞及巢氏病源

芫花圓

芫花

醋製乾稱一兩

乾漆

狼牙根

桔梗

炒黃藜盧炒
枳

榔

各半兩

巴豆

十粒去殼炒微黑

右為細末醋糊丸如赤豆大每服二三丸加至五六丸食前姜湯下

此方常服化痰消堅殺蟲予患飲癖三十年暮年多嘈雜痰飲來潮即吐有時急飲半杯即止蓋合此證也因讀巢氏病源論酒癥云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常思酒不得酒即吐多睡不復能食是高

中有蟲使然名為酒癩此藥治之要之須禁酒即易
治不禁無益也予生平有二疾一則臟腑下血二則
馮中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時
夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜
以後稍困乏必飲兩三杯既卧就枕又向左邊側腦
氣壯盛時殊不覺三五年後覺酒從左邊下漉漉有
聲脇痛飲食殊減十數日必嘔吐數升酸水暑月止
是右邊身有汗褻褻常潤左邊病處燥無汗遍訪名

鑿及海上方服之少有驗間或中病止得月餘復作其補則如天雄附子礬石其利則如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予復揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不盈科不行水盈科而行也清者可行濁者依前停留蓋下無路以決之也是以積之六七日必吐而去稍寬數日復作也脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以填科則此疾自去矣於是悉屏諸藥一味服蒼朮三月而疾除自此一向服數年不吐不

嘔胸膈寬飲啖如故暑月汗周身而體涼飲亦當中
下前此飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字
皆蒼朮之力也其法蒼朮一觔去皮切末之用生麻
油半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚爛煮去皮核
研以麻汁勻研成稀膏搜和入白熟杵丸如梧子大
乾之每日空腹用溫湯吞下五十丸加至一百丸二
百丸忌桃李鵲鴿初服時必膈微燥且以茅朮製之
覺燥其進山梔散一服久之不燥矣予服半年以後

止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力亦自然不燥也山梔散用山梔子一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時或運動亦消息之法

治肺氣風寒作嗽

紫蘇散

紫蘇 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻黃

甘草 各等分

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分溫服

利隔去涎思食止嗽

訶子湯

訶子

煨去核

青皮

麥冬

各半兩

栝榔

四個

半夏

三分

甘草

右為粗末每服四錢水二盞薑七片煎七分溫日三服

治諸嗽久不差

貝母湯

貝母

一兩去心薑製半日焙

黃芩

生用

乾薑

生各一兩

陳皮

五味子

各一

兩桑白皮

半夏

柴胡

桂心

各半兩

木香

甘草

各一分

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎
之生姜七片同煎至七分去滓熱服 黃師文云戊
申冬有蔣姓者其妻積年嗽製此方授之一服差以
此治諸嗽即皆愈

積聚凝滯五噎噎氣

大抵治積或以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈如
硃砂水銀治肉積神麩麥芽治酒積水蛭蟲蟲治血積
木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黃膩粉治涎積

礫石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取效嗣宗所謂譬猶獵不知兔廣絡原野冀一人獲之術亦踈矣湏是認得分明是何積聚然後增減用藥不爾又有所損嗣宗自謂不著書在臨時變通也

治五種積氣及五噎胸膈不快停痰宿飲

纏金丹

丁香 木香 沉香 檳榔 官桂 胡椒 硃

砂 研 白丁香 各一分
肉豆蔻 飛礫 各一分
馬兜鈴 炒

南星

五靈脂

瓜蒌根

半夏

各半兩

硃砂

三分留半

為衣

右為細末入二味研藥和勻生姜汁煮糊丸如梧子大每服三丸生薑湯下或乾嚼蘿蔔下

治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣

枳殼散

枳殼

白朮

各半兩

香附子

一兩 檳榔

三錢

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候麗

老方

治伏積注氣發則喘悶

訶子圓

訶子 白茯苓 桃仁 枳殼 桂心 檳榔

鱉甲 桔梗 白芍藥 川芎 川烏 人參

橘紅 各等分

右細末煉蜜杵丸如梧子大酒下二十九丸熟水亦得

治一切積聚有飲心痛

石砂圓

硃砂

荆三稜

別末

乾薑

香白芷

巴豆

去油各半兩

大黃

別末

乾漆

各一兩

木香

青皮

胡椒

各一分

檳榔

肉苳蔻

各一個

右為細末，釀醋二升煎巴豆五七沸後下三稜大黃末同煎五十沸入硃砂同煎成稀膏稠希得所便入諸藥和勻杵丸如菘豆年深氣塊薑湯下四五丸食積熟水下白痢乾薑湯下赤痢甘草湯血痢當歸湯葱酒亦得

治男子婦人患食勞氣勞徧身黃腫欲變成水及久患
瘰癧小腸膀胱面目悉黃

紫金丹

胆礬三兩黃蠟一兩青州棗五十個

右於磁合內用頭醋五升先下礬棗漫火熬半日以
來取出棗去皮核次下蠟一處更煮半日如膏入好
蠟茶末二兩同和凡如梧子大每服三十九茶酒任
下如久患漏風痔漏陳茶飲下

宋室趙彥才下血面如鵝不進食蓋酒疾也授此方服終劑而血止面色鮮潤食亦倍常新安有一兵士亦如是與三百九作十服亦愈

治沉積

感應圓

丁香

木香

各半兩

乾薑

一兩

百草霜

二兩研

肉苳菘

二十個

豆七十粒取霜

杏仁

一百四十粒

煮酒臈

四兩麻油

一兩秋冬增半兩臈減半兩

右以二香薑菘為細末并三味研極勻煉油蠟和成

劑油紙裹旋圓如菘豆大熟水下五十九此藥近年
盛行於世有數方惟此真高子家得之於王景長用
之的有效

治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶背驚引疼心腹膨脹
脇刺痛飲食不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦
少力短氣煩悶常服順氣寬中消痞癖積聚散驚憂恚
氣宜服

枳殼散

枳殼 荆三稜 橘皮 益智仁 蓬莪朮 檳榔 肉桂 各一兩

乾薑 厚朴 甘草 青皮 肉苳蔻 木香 各半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分熱服鹽點亦得不拘時服

治氣食憂勞思慮五噎

高氣圓

半夏 桔梗

各二兩

肉桂

枳殼

各一兩半

右細末薑汁和丸如梧子薑湯下三十九食後臨卧服

治胸膈悶塞作噎

薰高圓

麥門冬

甘草

各半兩

人參

桂心

細辛

川椒

遠志

去心炒

附子

乾薑

各一錢

右細末蜜丸如雞豆大綿裹一丸含化食後日夜三服

膀胱疝氣小腸精漏

治膀胱疝氣外腎腫脹痛不可忍

念珠圓

乳香

硃砂

各三錢飛

黃蠟

一兩

右乳香研細與硃砂同研勻鎔臈和丸作一百單八粒以綿穿之露一夕蛤粉為衣旋取一九用乳香湯吞下頃年有人貨疝氣藥肩擔人我二字以為招目貨日數千有一國鑿多金得之用之良驗

硃砂圓

木香

沉香

巴豆肉

金者各一兩

青皮

二兩不去皮

銅青

半兩

硃砂

一分

研

右上一香青皮三味細剉同巴豆漫火炒令紫色為
度去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和丸如梧子大
每服七丸至十丸鹽湯吞下二三服空心食前服

治膀胱腫硬牽引疼痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

金鈴圓

金鈴子肉五兩小茴香

炒

馬蘭花

炒

兔絲子

海蛤

破故紙

海帶

各三兩

木香

丁香

各一兩

右細末糊丸如梧子大每服二三十丸溫酒鹽湯下

空心食前服

治小便秘難小腸脹不急治殺人

右用葱白三觔細剉炒令熟以帕子裏分作兩處更替熨臍下即通

治膀胱氣痛

茴香散

茴香 金鈴子肉 蓬莪朮 荆三稜

各一兩

甘草

半兩
炙

右細末每服二錢熱酒調下強幼安云每發痛甚連

日只二三服立定

頃在徽城日歛尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍鑿者以剛劑與之愈疼甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶予因候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通為之奈何宋尉尚持四神丹數粒云鑿者謂痛不止更服此予曰若服此定斃後無悔渠懇求治予適有五苓散一兩許分三服易其名用連鬚葱一莖尚香一撮鹽一錢水一盞半煎八分令接續三服中夜下小便如黑汁者

一二升臍下寬得睡翌日診之脉已平矣續用礪砂丸與之數日差大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂此也

治遺精夢漏關鎖不固

金鎖丹

亦名茴香圓

舶上茴香

胡蘆巴

破故紙

白龍骨

各一兩

木

香

一兩半

胡桃肉

三七個研

羊石子

三對切開鹽半兩擦炙熟研如膏

右五味為末下二味同研成膏和酒浸蒸餅杵熟丸
如梧子大每服三五十九空心溫湯下

治經絡熱夢漏心忪恍惚鬲熱

清心圓

右好黃蘗皮為細末用生腦子一錢同研勻煉蜜丸
梧子大每服十九至十五丸濃煎麥冬湯下大智禪
師方夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

猪苓圓

右用半夏一兩破如豆大用木猪苓四兩先將一半炒半夏黃色不令焦地上出火毒半日取半夏為末糊丸如梧子大候乾更用前猪苓末二兩炒微裂同用不泄沙瓶養之空心温酒鹽湯下三四十丸常服於申未間冷酒下

此藥治夢遺有數種下部虛憊精不禁者宜服茴香丸年壯氣盛又節淫慾經絡壅滯者宜服清心丸有情慾動中經所謂所願不得名曰白淫餌良方茯苓

散正似瓶中煎湯氣盛而溢者如瓶中沸湯而溢慾
動心邪者如瓶之傾側而出虛慾不禁者如瓶中有
罅而漏不可一槩用藥也又有一說經曰腎氣閉即
精泄素問云腎者作強之官伎巧出焉又曰腎氣藏
精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或斂或散皆主
於腎今也腎氣閉則一身之精氣無所管攝故妄行
而出不時也猪苓圓一方正為此設此古方也今盛
行於時而人多莫測其用藥之意蓋半夏有利性而

猪苓導水蓋導腎氣使通之意也予藥囊中常貯此藥緩急以與人三五服皆隨手而驗林監丞庇民亦數服而愈

類證普濟本事方卷三

欽定四庫全書

類證普濟本事方卷四

宋

許叔微 撰

反胃嘔吐

治反胃

附子散

附子一枚極大者放於磚上四面著火漸漸逼熱淬入
薑汁中再用火逼再淬約盡薑汁半碗焙乾末之
每服二錢水一盞粟米少許同煎七分不過三服

鯽魚散

大鯽魚一個去腸留膽納綠礬末填滿縫口以炭
火炙令黃色乾為末每服一錢米飲調下日三服
定嘔吐利高

枇杷散

枇杷葉

去毛人參

各一錢

茯苓

半兩茅根

二兩

半夏

一錢

右細剉每服四錢水盞半薑七片漫火煎七分去滓

入栝榔末半錢和勻服

食後多吐欲作反胃

白朮散

澤瀉 白朮 茯苓 各等分

右為細末每服一錫湯調溫服

治胃熱嘔吐

竹茹湯

乾葛 三兩 甘草 三錢 半夏 三錢 薑汁 半盞 漿水 一併煮耗半

右每服五錢水二盞薑三片竹茹一團大棗一枚煎一盞溫服

有熱者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下鑿者皆進丁香藿香滑石等藥下嘔即吐予曰此正汗後餘熱留胃腕孫兆竹茹湯政相當耳急治藥與之即時愈良方槐花散亦相類治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不效者一丸治一人

青金丹

硫黃

一兩

水銀

八錢

以二味銚內炒柳木不住攪勻柳枝蘸冷醋頻洒候如

鐵色法如青金塊方成刮下研如粉留小半為散餘以
粽子尖三個約半盞研稀稠得所成膏和丸如雞豆硃
砂為衣每服一九丁香湯磨熱服如服散子丁香湯調
下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨下日二三服
治嘔吐不止

香靈圓

丁香

好辰砂

研各六錢

五靈脂

四錢

右香脂先細末後入砂再研勻狗胆或猪胆為丸如

欽定四庫全書

雜錄通濟本草方
卷四

三

雞豆大每服一丸生薑橘皮湯磨下

臟腑瀉滑及諸痢

治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效

訶子圓

訶子皮 川皮 肉豆蔻 龍骨 木香 赤石脂 附子

各等分

右細末糊丸如梧子大每服四十九丸米飲下

治脾胃中風濕臟腑泄滑

鞠藭丸

芎藭

神曲

白朮

附子

各等分

右細末糊丸如梧子每服三五丸米飲下芎藭能除濕
予嘗加朮附製方治脾濕而泄者萬中亦治飧泄素問曰
春傷於風夏必飧泄飧泄者食穀不化蓋春木旺時肝
生風邪淫於脾經至夏餘冷當風故多飧泄此藥尤宜
磨積止泄痢治心腹冷痛

陳麩丸

陳麩

一兩半

乾薑

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

甘草

各半兩

右末煉蜜丸梧子大每服三四十丸或酒或淡醋湯
空心食前日二服發時不拘時增數

治冷氣下瀉

木香圓

木香半兩川烏一兩
生

右細末醋糊丸如梧子大陳醋湯下三五十九

治痼冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥
不效宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也

溫脾湯

厚朴 乾姜 甘草 桂心 附子生各二兩 大黃

生四錢切研湯一盞漬半日搗去滓煎湯時和汁下

右細判水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去滓澄去脚不要晚十分三服溫溫自夜至曉令盡不
慢食前更以乾姜九佐之

乾姜圓

乾姜

巴豆

去心炒黃研

大黃

人參

各一兩

右除巴豆餘為末同研煉蜜丸如梧子大服前湯時
用湯吞下一丸米飲亦可

有人因憂愁中傷食結積在腸胃故發吐利自後至
暑月稍傷則發暴下數日不已玉函云下利至兩年
月日不期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤
佳如難取可佐以乾姜丸後服

白朮散

白朮 木香 附子 人參

各等分

右細末每二錢水一盞薑三片棗一枚煎六分溫服
治積痢

靈砂丹

硃砂一分并
研極細

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同放於銀石器內重

湯煮一伏時候巴豆紫色為度去二七粒止將一七粒

與前來二味再同研極勻再溶蠟置藥每旋丸菴豆大
每服三九至五九水瀉薑湯下白痢艾湯赤白烏梅湯

服時須極空腹服畢一時不可吃食臨卧无佳次食
淡粥一日瘧疾乳香湯下面東服不發日晚間服

此藥不動氣服之瀉者止痢者斷疼者愈有積者內化
亦不動臟腑大凡痢有沉積者不先去積雖得暫安後
必為害記陳侍郎涇仲庚成秋過儀真求診初不覺其
有疾及診視則肝脉沉弦附骨取則牢子曰病在左脇
有血積必發痛陳曰誠如是前此守九江被召冒暑涉
長江暨抵行朝血痢已數日矣急欲登對鑿者以剛劑

燥之雖得止數日臍下一塊大如杯不旬日如碗大發
則不可忍故急請公視以歸為之奈何予曰積痢不
可強止非抵當丸不可渠疑而不服次年竟以此終
治隔年痢不止

木香散

木香

用黃連半兩對各炒

甘草

炙一兩

櫻粟殼

剉同薑汁半兩炒

右細末入麝少許研勻陳米飲下二錢佛智和尚傳
云在閩人嘗合以濟人治血痢尤奇

治腎泄

五味子散

五味子

二兩

吳茱萸

半細粒
綠色者

右二味用炒香熟為度細末每服二錢陳米飲下頃
年有一親識每五更初欲曉時必唐痢一次如是數
月有人云此名腎泄腎感陰氣而然得此方服而愈

虛熱風壅喉閉清利頭目

治虛煩上盛脾腑有熱咽喉生瘡

利鬲散

雞蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗 人參 牛蒡

子隔紙炒 甘草各一兩

右細末每服一錢沸湯調服如咽痛口瘡甚者加薑蚕一兩

治風盛鬲壅鼻塞涕熱氣攻眼下淚多眇齒間緊急偏頭疼

川芎散

川芎 柴胡各一兩 半夏 麩 甘草炙 甘菊 細辛

人參 前胡 防風各半兩

右粗末每服四錢水一盞薑四片薄荷五葉煎七分溫服
治頭痛面赤煩悶咽乾上高風痰頭目暈昏百節疼痛
背項拘急

芎辛丸

川芎 防風

僵蚕

獨活

各一兩

桔梗

三兩

天麻

四兩 細

辛 白附子

羌活

甘草

各半兩

薄荷

荆芥

各一兩

右細末煉蜜丸如梧子大食後每服一九茶酒吞下

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上

通隔丸

黃連

茯苓

人參

各三分

硃砂

一分

真腦子

許少

右細末研勻煉蜜丸如梧子熟水下三五九日二三服

治心經有熱

門冬丸

麥門冬

一兩

川黃連

半兩

右細末煉蜜丸如梧子食後熟水下二三十丸

治心熱

千金地黄丸

川黃連

四兩粗末

生地黃

半觔研取汁連滓二味拌勻日乾

右細末煉蜜丸如梧子每服三十九食後麥冬湯下
治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩熱頭目昏痛夜多盜
汗此藥補和真氣解勞倦婦人血熱虛勞骨蒸並皆治
人參散

人參 白朮 白茯苓 柴胡 半夏麴 當歸

赤芍藥 乾葛 甘草

各一兩 子苓 半兩

右為細末每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎八分
不拘時候帶熱服但是有勞熱証皆可服熱退即止
大抵透肌解熱干葛第一柴胡次之所以升麻葛根
湯為解肌之冠也

調榮衛順三焦治風壅消痰涎退煩熱

清氣散

前胡 柴胡 川芎 枳殼 白朮 青皮 羌
活 獨活 甘草 茯苓 人參 各等分

右為末每服二錢水一盞荆芥一穗煎七分服此方敗
毒散中去桔梗加白朮青皮增損亦有理用之良驗

治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時疾中暈伏暑
柴胡散

柴胡四兩甘草一兩

右為末每服二錢水一盞煎八分食後熱服此藥冬月
可以潤心肺止咳嗽除壅熱春夏可以禦傷寒時氣解
暑毒居常不可缺不論長幼皆可服倉卒可以便得

治骨蒸肌熱解一切虛煩躁生津液

地仙散

地骨皮

洗

防風

各一兩

甘草

一分

右為末每服二錢水一盞生姜三片竹葉七片煎至七分服信效方增人參半兩雞蘇一兩甘草添一分

腫漏水氣蠱脹

治腹中有濕熱氣自下作腫如新卧起之狀兩足跟微腫病在腎腎少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣急

咳嗽喘息有音每就卧則右脇有氣上衝肩掖與缺盆相牽引不快少思飲食

葶藶圓

甜葶藶

半兩

郁李仁

湯去皮熬紫色秤三分
二味別研如膏令極勻

白朮

半兩

牽牛子

半兩一分
熟用

桑白皮

赤茯苓

漢防己

羌活

陳橘皮

澤瀉

以上各三分

右細末與上二味同研煉蜜和入臼內治之凡如梧子大初服十丸空心晚食前日二服生姜橘皮湯下

不知加至二三十圓以知為度

治脾元虛浮腫

定脾散

大附子一個草果

乾薑各二兩

甘草一個大腹皮六個木

瓜一個
穰切片去

右於砂器水煮劈開乾薑心內不白為度不得全令
水乾恐近底焦取出剉焙為末每空心日午用沸湯

點服

欽定四庫全書

輿證普濟本草方
卷四

十一

治水氣

羌活散

羌活

蘿蔔子

各等分

右同炒香熟去蘿蔔子不用末之溫酒調下二錢一日一服二日二服三日三服取效嘉興簿張昌方

治四肢腫滿

大棗湯

白朮三兩呔咀每服半兩水一盞半大棗三枚拍破

同煎九分去渣溫服日三四服不拘時候

治腫滿小便不利

茯苓散

郁李仁

四錢

檳榔

二個

赤茯苓

白朮

甘遂

切片

各一錢

炒

橘皮

一錢半

右細末每服一錢薑棗湯下

又方

厚朴

半兩

牽牛子

二兩

炒取

末二兩

取

右細末每服二錢薑棗湯調下

治游風攻頭面或四肢作腫塊

知母湯

知母一兩 麻黃 黃芪 甘草 羌活 白朮 枳

殼各半兩

右粗末每服四錢水一盞半牛蒡子一百粒研碎煎至七分溫日三四服覺冷不用牛蒡子

有一達官其母年七十中風拘攣平日止是附子之

類扶養一日面浮腫手背亦腫尋常有一國鑿供藥
診之是水病欲下大戟牽牛以導之其家大驚憂惶
召予議之予曰素問種面腫曰風足脛腫曰水此服
附子太過正虛風生熟之證咽必噎塞高中不利誠
然予乃進升麻牛蒡九參湯繼以知母湯三日便愈
常見一鑿書中論水蟲三病臍腹四肢悉腫者為水
但腹脹四肢不甚腫者為蟲有中表一婦人患蠱病
予謂不可下當寔脾不然之卒後入棺木腹與棺蓋

平治蠱宜石中黃丸

腎臟風及足膝腰腿脚氣等疾

治腎臟風攻注脚膝方

連枝甘遂

一兩

木鱉子

二個一雌

一雄去殼

右為末豬腰子二個批開藥末一錢摻勻濕紙裹
數重漫火煨熟放溫五更初細吞米飲下

積水多則利多少則少也宜軟飯將息若患一脚切
看左右如左脚用左邊腰子右用右邊者藥未止一

錢壬子年在毘陵有姓馬人鬻酒久不見因詢其親云宿患腎臟風今一足發腫如瓠自腰以下鉅細通為一律痛不可忍卧欲轉側則兩人挾持方動或者欲以鉞刀決之予曰未可予有藥各當以贈如上法服之辰巳間下膿如水精者數升即時痛止腫退一月後尚拄拐而行予再以赤烏散令捺貼其膝方愈後十年過毘陵率其子列拜以謝云向脚疾至今不復作雖積年腎藏風并已失去今健步自若矣

治腎藏風上攻下疰生瘡并癰

烏頭圓

川烏

二兩

天麻

地龍

去上秤

白附子

各半兩

甘附子

一兩

二味以黑豆半升煮透去皮臍切碎日乾

右為細末酒糊丸如梧子大每服二三十丸空心食

前鹽湯下

去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎骨酒

虎脛骨真者 萆薢 仙靈脾 薏苡仁 牛膝 熟

地黃各二兩

右細判絹袋盛浸酒二斗飲子一盞入一盞可得百

日婦人去牛膝

治腰脚疼痛攣急不得屈伸及腿膝冷麻虎骨酒

虎骨一具及脛骨二莖用酥搽炙黃搥碎同無灰酒
三斗密封七日空心晚食温之隨意飲

治脚氣

栝榔湯

栝榔末

三錢

生薑

三片

紫蘇

七葉

陳橘

三枚

右以水一大盞煎七分去滓熱服

少府監韓正彥暴得疾手足不舉諸醫以為風針灸臂腿不知痛孫兆作脚氣與此藥乃愈

益氣補血肝元祛風溫壯脚膝

地黄圓

熟地黄

一兩

牛膝

各三

石斛

分

肉蓯蓉

各三

茵芋

各三

附

子 薏苡仁 桂心 防風 川芎 五味子 各

半

兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒吞下空
心食前服

治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下
經行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中益精涼
血堅強筋骨益智輕身耐老

思仙續斷圓

欽定四庫全書

思仙木

五兩即杜仲也

五加皮

防風

薏苡仁

羌活

川續斷

牛膝

各三兩

萆薢

四兩

生地黄

五兩

右細末好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半觔去皮
子以鹽酒煮木瓜成膏和杵丸如梧子大每服三四
十九空心食前溫酒鹽湯下膏子少益以酒糊
治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

續骨丹

天麻

明淨大者酒浸一日

白附子

牛膝

木鱉子

各半兩

烏

頭炮一分 川羌活

地龍去上 的乳

真沒藥各二錢

硃砂錢一

右生天南星末一兩無灰酒煮糊丸如雞豆大硃為衣薄荷湯磨一九食前服

治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則痛

茵芋圓

茵芋炒 郁李仁一兩 牽牛子三兩生取末一兩半

右細末煉蜜丸如梧子大每服二十九五更薑棗湯

下未知加至三十九日三次為度白粥補

治腰脚走注疼痛此是脚氣

薏苡仁圓

薏苡仁 茵芋 白芍藥 牛膝 川芎 丹參

防風 獨活 各半兩 熟地黄 側子 一個 桂心 橘

紅各一兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十九酒下食前
日三服木瓜湯下亦可

今人謂之脚氣者黃帝所謂浞風温脾也千金云頑弱名浞風疼痛為温痺大抵此疾不可以三五便效須久服得力唐張文仲云風有一百二十四種氣有八十種惟脚氣頭風上氣嘗須服藥不絕自餘則隨其發動臨時消息但有風氣之人春末夏初及秋暮得通泄則不因劇所謂泄通者如麻黃牽牛郁李仁之類是已不必苦駛利藥也

治腎虛腰痛

鹿茸丸


鹿茸不拘多少切作片子酥炙黃末之酒糊丸如梧子大空心食前鹽湯下三五十九

治腿腰痛氣滯

藥碁子

牽牛不拘多少用新瓦入火焙得通紅便以牽牛頓在瓦上自然一半生一半熟不得撥動細研取末一兩入硫黃一分同研勻分三分每用白麩一匙水和

捍開切作碁子五更初以水一盞煮熟連湯温送下
住即已未住隔日再作予嘗有此疾每發一服即止
痛病源曰腿腰痛者或墮傷腰是以痛



類證普濟本事方卷四