

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十一

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈺

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣姚培雯

欽定四庫全書

證治準繩卷九十一

明 王肯堂 撰

幼科

脾臟門

瀉痢兼證

渴巢氏病源小兒利兼渴候此是水穀利津液枯竭臟腑虛燥則引飲若小便快者利斷渴則止若小便澀水

不行於小腸滲入腸胃渴亦不止利亦不斷凡如此者皆身體浮腫脾氣弱不能尅水故也亦必眼痛生障小兒上焦本熱今又利下焦虛上焦熱氣轉盛熱氣熏肝故也 茅先生以為食傷脾胃所致先用醒脾散勻氣散調一日後下調中飲

三方俱不乳食

夾乳香散

瀉

龍涎膏

渴

調理即愈 千金單搗冬瓜汁飲之

千金治少小壯熱渴引飲下痢龍骨湯 龍骨 甘草

灸 大黃 赤石脂 石膏 桂心 寒水石 蘇

蘇根各二兩

右八味治下篩以酒水各五合煮散合二沸去滓量

兒大小服之

外臺麥門冬湯 療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

去心

甘草

炙各四分

枳實

炙

黃芩

人參

各三分

龍

骨

六分

右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服

外臺欒皮飲子

療小兒渴痢

梁州欒皮

十二分

蘇蘇

茯苓

各八分

人參

六分 粟米

二分

右五味切以水三升煮取一升二合去滓分服量大小與之

外臺劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食方 訶梨勒

皮

六分

桑葉

十分  
炙末

右二味切以水一升煮取五合去滓分服之亦治大人

子母祕錄小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方

右炙楮葉令香黃以飲漿半升浸楮葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使煖細細服渴停

聖惠黃耆散 治小兒痢渴心胸煩悶不欲飲食 黃

耆 劉麥門冬

焙去心

黃芩

各三分

烏梅肉

三枚

龍骨

一兩

白朮

黃連

微炒去鬚各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

黃芩散

治小兒痢渴不止

黃芩

訶梨勒

煨用 樗

株皮

各半

蘇藪根

黃連

去

當歸

對微炒

烏梅肉

一分  
微炒

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五

分去滓不計時候量兒大小分減溫服

當歸散

治小兒痢渴腹內疼痛不止

當歸

對微

黃

連

微炒

黃耆

對各三分

乾薑

炮裂

甘草

炙微赤對各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五



分去滓不計時候量兒大小分減溫服

龍骨散

治小兒痢渴體熱煩悶

白龍骨

一兩

胡黃連

半兩

茯苓神

人參

去芦頭

茅根

剉

麥門冬

去心焙

各三分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

藍葉散

治小兒痢渴煩熱不止

藍葉

二分

赤茯苓

一分

赤石脂

一兩

黃連

微炒去鬚

冬瓜仁

酸石榴皮

剉碎微炒各半

兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入蜜半茶匙更煎三兩沸不計時候量大小分減服之

地榆散 治小兒痢渴或下五色惡物心神煩熱不止

地榆 白茯苓

黃礬

微炙判  
各一兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

欖皮散 治小兒痢渴不止 欖株皮一兩 菘菘根 白

茯苓

各三分

人參

半兩去芦頭

右件藥搗細羅為散不計時候以粟米飲調下半錢量兒大小以意加減

甘草散

治小兒痢渴不止

甘草

炙微赤剉

烏梅肉

微炒各一

兩

訶梨勒

二枚煨用皮

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

黃芩丸

治小兒痢渴不止壯熱腹痛

黃芩

蘇蘇

根

黃連

去鬚  
微炒

當歸

剉微炒  
各三分

臭樗株皮

炙微  
黃剉

訶梨

勒

煨用皮  
各半兩

烏梅肉

五枚  
微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菘豆大每服以粥飲  
下七九日三四服量兒大小分減服之

太醫局人參散

調中和氣止嘔逆除煩渴治昏困多

睡乳食減少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後躁渴

不解

人參

去芦  
頭

白茯苓

去皮各  
一兩

木香

甘草

炙  
剉

藿香葉

各一兩

乾葛

劉二兩

右件為末每服一錢水一中盞煎七分去滓放溫服

不計時候

嬰孺子芩湯

治小兒大熱痢兼渴增寒 子芩 枳

殼炒黃檗

各四分

石膏

十二分

竹葉

切一升

檉皮

十人參

七分

右以水五升煮一升六合七歲兒為三服四五歲兒為四服以次量與之服

蘇蘇湯 治小兒有熱不調渴痢 蘇蘇 知母 茯苓

苓 各八分 甘草 黃蘗 各四分 人參 六分 黃芩 檉皮 各十分

分

右以水五升煮一升半五六歲兒為三服

冬瓜湯 治小兒渴不止痢不住 冬瓜 切八合 蘇蘇 二十

分 茯苓 知母 各八分 麥門冬 五分 粟米 二合半

右水五升煮一升四合新布絞去滓量兒與之

張渙建胃散 治泄瀉身熱煩渴 厚朴 去麁皮生薑汁製炙香熟

川黃連 肉豆蔻各一兩 縮砂仁 乾薑炮 白朮炮

木香

各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑粟米少許煎至五分去滓溫服

碧香丹 治小兒吐利後大渴不止不得眠睡甚則成

疳 天竺黃 龍骨 不灰木燒赤放冷 赤石脂各一兩為末

鐵粉 定粉 鉛白霜 細蛤粉各一兩

並細研

右件通拌勻入麝香半兩同研勻滴水和丸如雞頭

大每服一粒至兩粒用炮螺兒兩箇研細沸湯浸水  
沉極冷化下大渴即與服神驗

寶鑑竹茹丸

治小兒渴瀉

黃連

一兩好者剉作塊  
子一一相似茱萸

一兩二味相和滴蜜炒  
令黃赤色去了茱萸

右件為末薄糊為丸如蘿蔔子大每服十九竹茹煎  
飯飲吞下

人參白扁豆散 治脾胃不和不思飲食吐瀉渴水及

小兒虛熱煩躁

人參

白扁豆

去皮  
炒熟

白朮

茯苓



各一  
兩 罌粟子 甘草 山藥  
各半

右為末每用二錢水一中盞入薑二片棗半箇同煎  
至七分通口服如腹疼痛加紫蘇煎小兒虛熱加薄  
荷同煎

吉氏家傳治五痢喫湯不徹肚脹不食方 訶子皮

桑白皮 各六錢

右水二升煎三合服之立差

吉氏六神丸 治疳瀉渴飲無度 木香 丁香 豆

菴

以麩裹此三味入慢火煨候麩熟為度

史君子

去殼

訶子

去核各半兩

蘆

薈

一兩

右件為末棗肉丸如棗豆大每服三五丸米飲吞下

腹痛聖惠黃連散 治小兒久赤白痢不止腹痛羸弱

不欲飲食

黃連

一兩去鬚微炒

厚朴

去麁皮塗生薑汁炙令香熟

乾薑

炮裂剉

木香

艾葉

微炒

龍骨

各半兩

當歸

剉微炒

黃牛角

鯁

燒灰各三分

烏梅肉

一分微炒

右件細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減服之

黃檗丸

治小兒久白痢腹脹疔痛

黃檗

對微炙

當歸

對微炒  
各一兩

右件藥羅為末煨大蒜和丸如菘豆大每服以粥飲  
下七九日三四服量兒大小加減服之

木香散

治小兒久赤白痢腹脇疼痛 木香 訶梨

勒煨用皮

臭樗株皮微炙

木賊

黃連

去鬚微炒  
各半兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小以意加減

肉豆蔻散 治小兒久赤白痢腹內疔痛全不思食漸

至困羸

肉豆蔻

三枚  
去殼

青橘皮

湯浸去  
白瓢焙

黃牛角鯁

炙令

微焦

當歸

地榆

厚朴

去麤皮塗生薑  
汁炙令香熟

黃連

去鬚  
微炒

各半  
兩

乾薑

一分炮  
裂對

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小臨時加減

龍骨丸

治小兒久赤白痢不止腹痛

白龍骨

黃

連

去鬚  
微炒

黃蘗

微炙  
對

木香

訶梨勒

煨用皮  
各一分

胡粉

三錢

炒微  
黃

白礬

燒令  
汁盡

乾薑

炮裂  
對

當歸

對微炒  
各半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如菴豆大每服以粥飲

下五丸日三四服量兒大小臨時加減

錢氏小香連丸

見前

張渙順胃丹 治瀉利蟲煩腹痛 高良薑 乾漆

肉桂

各一兩

白木

炮肉豆蔻仁

各半兩

右件搗羅為細末白麩糊和丸如黍米大每服十粒

粟米飲下量兒大小加減

建中丹 治泄注不止腹痛多啼 胡椒 蓬莪茂

肉豆蔻

各半兩

全蠍一分

右件為細末白麩糊和丸如黍米大每服十粒米飲下

九籥衛生固氣丸 療小兒脾胃虛怯泄瀉腹痛 用

絕大肉豆蔻一枚劈破填滴乳香一塊用酵麩裹慢火內煨候麩熟為度去麩不用將肉豆蔻乳香同為

細末麩糊和丸如菘豆大每服二十九丸食前米飲

下

張氏聖餅子 治小兒久痢腹痛脫肛下血 神麩

兩

膩粉

七錢

右件二味拌合令勻後以雞子清調拌上件藥稀稠得所捏作餅子如錢大小於火上炙令黃熟每服一餅於早晨空心同油餅喫之後進飲少許

吉氏紫霜丸 治小兒久積胸高羸瘦赤白痢疾肚腹

痛甚

丁頭代赭石

半兩火煨五遍醋淬五遍

杏仁

取霜

乳香

朱砂

木香

各一錢

宣黃連

一分去頭

輕粉

半錢

麝香

許少肉

豆蔻

二箇麩裹炮

巴豆

十粒取霜

右為細末稀麩糊為丸如梧桐子大每服七丸至十

五丸紫蘇飯飲吞下

羸瘦巢氏云小兒腸胃虛弱受風冷

聖惠作挾疴氣

則下利

斷後脾胃尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

外臺劉氏療小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服



之方 橘皮 生薑 各三分

右二味切以牛乳半升煎取四合去滓分温服之

聖惠桔梗丸 治小兒久利不斷肌體羸瘦食不消

桔梗

去芦頭

神麴

微炒各一兩

麥蘖

烏梅肉

微炒

厚朴

去麩

皮塗生薑汁炙令香熟

白朮

人參

去芦頭

赤石脂

黃芩

龍骨

桂心

甘草

炙微赤剉各半兩

黃連

一兩半去鬚微炒

黃

雌雞骨

一具淨洗去肉酒浸一宿炙令黃

右件藥搗羅為末煉蜜丸如菜豆大每服以粥飲下

五九日三服量兒大小加減服之

雄黃散 治小兒久痢不差羸瘦壯熱毛髮乾焦不能

飲食 雄黃 蘆薈 青黛 朱砂 熊膽 麝香

各細研 龍膽 去芦頭 黃連 去鬚微炙 黃檗 微炙剉 當歸 剉微炒 白

芷 細辛 甘草 炙微赤剉 蚱蟬 七枚去足 乾蝦 一兩 麻

塗酥炙  
令黃色

右件藥搗細羅為散入研了藥更研令勻每服以井華水調下半錢日三四服量兒大小以意加減

雞子粥 治小兒下痢不止瘦弱 雞子一枚糯米一合

右煮粥臨熟破雞子相和攪勻空腹入少醋食之

張渙龍骨湯 治小兒痢久成疳漸漸黃瘦 龍骨

訶梨勒皮炮 赤石脂各半 酸石榴皮炒 木香 史

君子仁各一分

右件搗羅為細末每服半字至一錢點麝香湯調下

浮腫惠濟論小兒痢瘥後遍身腫候歌 冷痢日久失

醫治遍身浮腫却如吹脉洪是氣化為水沉實還因積

有之順氣腫消為上法氣平兩日定多尿莫交食飽還  
憂滯此疾元因積損脾

惠濟論塌氣散

懷香

白牽牛

甘草

各炒

木香

各一

錢

右為末每服半錢紫蘇湯下

止渴聖効散

治小兒因吐利氣虛津液減耗生疳煩

渴飲水不休面腫脚浮腹大頭細水便利白全不喫

食乾葛

白芷

各二兩一兩炒  
黃一兩生用

細墨

二兩一兩炙  
煨過一兩生

用黃丹二兩一兩炒紫  
色一兩生用

右同為細末每服半錢倒流水調下

### 腹痛

楊夫腹痛者多因邪正交攻與臟氣相擊而作也挾熱而痛者必面色赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷而痛者必面色或白或青手足冷者見之冷甚而變證則面黯唇口俱黑爪甲皆青矣熱證四順清涼飲裏熱加

青皮枳殼冷證七氣湯加辣桂調蘇合香丸若邪正交

攻冷熱不調桔梗枳殼湯加青皮陳皮木香當歸為妙

若內吊等證則釣藤散

夜啼

其餘則芍藥甘草湯為要

藥也實痛有熱者大柴胡湯

傷寒

主之心腹痛甚有實

熱者大承氣湯

傷寒

下之腹痛桂枝加芍藥痛甚桂枝

加大黃

二方並見痘疹

薛小兒腹痛口中氣冷不思飲食脾

土虛寒也用調中丸

不乳食

主之口中氣溫大便酸臭積

痛也用下積丸治之面赤壯熱或手足並熱實熱也用

瀉黃散

脾

瀉之面黃微熱或手足並溫虛熱也用異功

散吐瀉補之若作渴飲湯胃氣虛熱也用白朮散渴若

痛連兩脇肝木乘脾也用四君子湯吐瀉加柴胡芍藥

若腹痛重墜脾氣下陷也用補中益氣湯虛熱加升麻

若手足指冷或吃逆泄瀉寒水侮土也用六君炮薑肉

桂不効急加附子若服尅滯之藥致腹作痛按之不痛

脾氣復傷也用五味異功散中脘痛者屬脾少腹痛者

屬腎按之痛者為積滯不痛者為裏虛積滯者消之虛

者補之 婁氏分曲腰乾哭無淚者為盤腸內釣痛

面眊白不思食為胃冷痛 面赤唇焦便黃為熱痛

面黃白大便醋臭為積痛 口淡而沫自出為蟲痛

曾氏又有臟寒痛鎖肚痛癥瘕痛瘧痛痺痛吊腎痛偏

墜痛寒疝痛 各有治法今臚列於後 寒痛茅先生

歌云面青面白猶自可黑色如青瓜一同此是腹心生

冷痛須將溫藥裏頭攻 錢氏云胃虛冷面眊白色腹

痛不思食當補益脾益黃散主之若不下利者調中丸

主之

益黃散治下利而痛也  
調中丸治不利而痛也



會氏臟寒痛議附胎寒論後

益黃散

脾

調中丸

白朮

人參

甘草

炒各半兩

乾薑

炮四錢

右為細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸食

前溫水下

海藏云仲景理中例也

當歸散

凡小兒夜啼者藏寒而腹痛面青手冷不吐

乳是也宜此方服之効

當歸

去芦頭

白芍藥

人參

各一錢

甘草

炙五分

桔梗

陳皮

各一錢

右吹咀煎五分時時少服愈

七氣湯 治七氣所傷痰涎結聚心腹亦痛不能飲食

半夏

製焙  
伍兩

人參

辣桂

去皮各  
一兩

甘草

半兩

右剉細每服三錢水一大盞薑五片棗一枚煎食前服

指迷七氣湯 治七情相于陰陽不升降氣道壅滯攻

衝作疼 青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 辣桂 益

智仁

各一兩

香附子

一兩半

甘草

加半夏

製各七錢半

右剉細每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎至七分  
不拘時服

張渙寬中湯 治心腹疼痛不可忍者 高良薑 木

香

各半兩

丁香

青橘皮

炒黃

桔梗

甘草

各一分

右件搗羅為細末每服半錢溫酒調下

蓬莪朮

蓬莪朮

炮製乘熱剉碎

當歸

洗焙乾各一兩

木香

人參

去芦頭

桂心

各半兩

黑牽牛

炒微黃一分

右件搗羅為末細白麩糊和丸如黍米大每服十粒

煎生薑湯下量兒大小加減

溫胃丹

治腹痛啼哭不止

人參

去芦頭

白朮

炮各一兩

五

味子

當歸

洗焙乾

高良薑

各半兩

木香

一兩

右件搗為細末白麩糊和丸如黍米大每服十粒米

飲下

橘香散

青橘皮

炒

吳茱萸

木香

當歸

洗焙乾各一兩

乾

薑

炮丁香

各半兩

右件搗羅為末每服一錢水八分一盞入生薑二片

煎五分去滓放溫熱服食前

曾氏懷香湯 和脾胃進飲食理腹痛散邪氣 懷香

炒良薑

剉碎用東壁土炒各一兩半

蒼木

米泔水浸一宿去麩皮瀝乾剉片炒至微

黃色 甘草

炙一兩

右剉焙為末每服一錢燒鹽湯空心調下

熱痛錢氏云熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤

黃與三黃丸

裏熱

人參湯下

嬰孺治小兒腹痛天糾不能哺乳茯苓丸方 茯苓

黃連

各一兩

右為末用蜜為丸如大豆大飲下量加

積痛錢積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅

下之後和胃用白朮散

消積丸白餅子方見  
癖白朮散方見消渴

會積

痛腹中陰陰而痛面黃不食兒大者口吐酸餒氣先治積滯後調脾胃其痛自止仍辨虛實和解治法見後癖

積條中

湯氏三稜散 治積氣肚痛 砂仁 甘草 益智炒去

殼

三稜

蓬朮

青皮

炒各等分

右為末白湯點下

丹溪云食積腹痛必用紫蘇萊菔子之類 初虞世治小兒好喫粽成肚痛用黃連白酒藥等分為丸服

蟲痛蟲痛面眊白心腹痛口中沫及清水出發痛有時田氏云蟲痛啼哭俛仰坐卧不安自按心腹時時大呌面無正色或青或黃唇白又目無精色口吐涎沫此

為蟲痛 錢氏云積痛食痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證用藥蟲與癩相似小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搖也安蟲散主之 曾氏云虻蟲動痛口吐清水涎沫或吐出蟲痛不堪忍其疾因食疳肥童腥太早而得故胃寒蟲動作痛其蟲吐來或生或死兒小者此痛苦甚亦致危難先以理中湯吐瀉加烏梅水煎服使胃煖不逆次蘆薈丸疳使君子丸化蟲飲主之有兒大者



面眇白而間黃色肉食倍進肌體消瘦腹中時復作痛  
此有血鼈虻蟲雜乎其間以二聖丸下之 又有胃受  
極寒極熱亦令蟲動或微痛或不痛遽然吐出法當安  
蟲為上若以治蟲反傷胃氣固不可也因寒而動者用  
理中湯加烏梅水煎服因熱而動者用咬咀五苓散亦  
加烏梅水薑煎投 辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴  
豆乾漆硃砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡  
卧不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或

黑目無光而慢唇白吐沫至六日胸高而卧轉不安召  
錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰  
此病大困苦更加瀉則為逆矣至次日辛見錢曰夜來  
三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有丸藥  
錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以  
然錢曰脾虛胃冷則蟲動而今反目青此肝乘脾又更  
加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下即脾胃已脫兼形  
病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

錢氏安蟲散

治小兒蟲痛

胡粉

炒黃

鶴虱

炒黃

川棟

子

去皮核

白礬

枯二錢半

右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

治蟲動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生用窰老

一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒調良久取

下蟲立愈驗

窰老恐窰中煨過泥物也

又方用乾漆一兩搗碎炒令煙盡出用新汲水入生麻

油空心調下

錢氏安蟲丸 治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛 乾

漆

炒烟盡  
二分

雄黃

一分  
分巴豆霜

錢一

右為細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引石  
榴根煎湯下或苦楝根或蕪荑湯下五七丸至二三  
十丸發時服

蕪荑散 主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上  
鼻頭唇口一時黑色脉法當沉弱而弦今反脉大是  
蟲證也 白蕪荑 乾漆

炒各  
等分

右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

使君子丸

治腹內諸蟲作痛口吐清水

使君肉

薄切

屋瓦焙乾

檳榔

酸石榴根皮

東方者佳淨洗剉焙

大黃

半生半炮各七

半錢

右除檳榔剉曬不過火餘三味再焙同檳榔為末沙糖水煮麩糊丸麻仁大每服三十九至五十九淡豬肉汁空心下或雞肉汁亦好

化蟲飲 消化蟲毒在腹作痛 檳榔 酸石榴根皮

淨洗焙乾  
各一兩

紅丹

煨過

雷丸

貫衆

如雞頭者佳

使君子肉

薄切焙各  
二錢半

甘草

炙

枳殼

去瓤麩炒微黃

大黃

各五錢

右為細末用清油煎雞子一枚如春餅樣候冷抄藥末一錢於上攤勻空心捲而食之兒小者用糯米粉水煮糊丸粟穀大每服十五粒至三十丸以淡豬肉汁空心下雞肉汁亦可

二聖丸 治腹內諸蟲及消穀逐水下氣去風 檳榔

一巴豆十五粒去殼膜  
兩心大好者存油

右檳榔剉曬為末巴豆碎切在乳鉢內極細杵仍入檳榔末同再杵勻麩糊丸菜豆大每服七十九至九十九丸用溫茶清五更初空心止一投藥見蟲下盡進以稀粥自安

鎖肚痛會一月後嬰孩忽乳不下咽肚硬如石赤如朱撮口而哭面青唇黑手足口氣俱冷是也始因斷臍帶不緊為風冷所乘證亦危急以白芍藥湯症烏梅散一

字金

臍風

投之日久則難愈更參考臍風證內議論

烏梅散

治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾

烏梅

去核

玄胡索

粉草

半生半炙  
各五錢

乳香

沒藥

釣藤

各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心溫服

盤腸內釣痛湯小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑  
肢冷為盤腸內釣凡有此證急煎葱湯淋洗其腹揉之  
葱熨臍腹間良入尿自痛中出其痛立止續次服藥



乳香

沒藥

各少許透  
明者細研

右件木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末此藥只一服效

薛小兒盤腸氣者痛則曲腰乾啼額上有汗皆由肝經風邪所搏也肝腎居下故痛則曲腰乾啼者風燥其液故無淚也額上有汗者風木助心火也口閉足冷者脾氣不營也下利青糞者肝木乘脾也皆由產下澡洗受風冷所致當服釣藤膏之類若乳母及兒受寒邪者用

沉香湯之類若兒額間有汗口閉脚冷乃虛寒也用當

歸散

見前

或沉香降氣湯之類若面赤唇焦小便不通

小腹脹痛者乃小腸熱也用人參湯送下三黃丸

裏熱

若因乳母飲食停滯者用保和丸

宿食

懷抱氣鬱者加

味歸脾湯

驚悸

怒動肝火者加味道遙散

虛熱

子母俱

服竝佳

錢氏釣藤膏

治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內

釣

乳香

研

沒藥

研

木香

薑黃

各四

木鼈子仁

十二

一箇

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬朮

半兩  
阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾為細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

蒜乳丸

治冷證腹痛夜啼

大蒜

一棵慢火煨香熟研爛

乳香

另研  
五分

右研為丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

異香散 治小兒諸般疳證角弓反張胸高臍凸

用透明沒藥一味為末薑湯調下

癥瘕痛曾癥瘕痛乃積久所致由榮衛俱虛外則感受風寒內則過傷乳食停滯既久不能尅化故邪併於陰為癥陰則專靜凝而不移邪併於陽為瘕假物象形動而不息若久而不治亦成脾疳積或兩脇間有塊如石

按之則痛不按則輕或面黃肌瘦肚硬而脹及有青筋

晝涼夜熱蒸潮無時乳食減少愛吃泥土或大便釀瀉

痛則身冷如水法當調脾養胃用醒脾散慢驚參苓白

朮散不乳食磨積理疳用化癖丸癖三稜散宿食木香莪

朮丸宿食治釀瀉沒石子丸瀉沉香檳榔丸癖積然此

積滯之疾非七劑可療必須次第調理則日久自然平

復

疝痛曾始則腹內一小腸塊其硬如臂從腰纏轉或左

或右良久痛甚則見於皮下不妨乳食其證先因有疾  
表解未盡遽爾下之大過氣虛寒搏鬱結而成法宜益  
氣理虛用參苓曰未散不乳食沉香檳榔丸癖木香莪朮  
丸宿食為治或間投白芍藥湯症加入參茯苓水薑煎  
服

癖痛治法詳癖門

按癥瘕瘵癖四證大同小異治法

亦無大分別似不必瑣瑣作名亦可也 吊腎偏墜痛

證治在陰腫門

寒疝痛證治在疝門

補虛芍藥甘草湯 治出疹肚疼腹滿小便不通 芍

藥

一兩二錢  
甘草

右剉散白水煎服

聖惠人參散 治小兒卒吐下腹痛不止 人參去頭

當歸

剉微炒各半兩

甘草

炙微赤剉

乾薑

炮裂剉

黃耆

剉各一分

細辛

分一

右件搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分

去滓稍熱服量兒大小以意加減頻服

錢乙附方和中散 和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思

食

人參

去芦

白茯苓

白朮

甘草

劉

乾葛

劉

黃耆

白扁豆

炒

藿香葉

各等分

右為細末每服三錢水一盞乾棗二箇去核薑五片

煎至八分食前溫服

外治莊氏家傳小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如有實硬處即是腹痛治之方研生薑取汁煖令



溫調麩成糊塗紙上貼臍心立定

腹脹

錢腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用

紫霜丸白餅子

此言未下而喘者為實故可下若誤下而喘者為虛氣附肺不可下也紫霜丸

白餅子二方見癖

不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上

附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚即目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮豆蔻大溫

散藥治之何以然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以  
溫散藥治之使上下分消其氣則愈矣若氣虛已出附  
肺而行即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒  
易為虛實脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱  
當識此勿誤也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛  
不能勝腎隨肺氣上行於四肢而目腫若水狀腎氣漫  
浮於肺即大喘也此當用塌氣丸病愈後面未紅者虛  
衰未復故也

此下後喘故宜塌氣丸  
若未下而喘宜下之

治腹脹者譬如

行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之必可獲寇若出林

不可急攻攻則必有失當以意漸收之即順也寇未出林謂虛

氣未出而不喘不目胞腮腫故可用丁香木香大溫散藥上下分消其氣而愈也寇已出林謂虛氣已出為喘

為目腮腫須用塌氣丸漸消之治小兒虛腹脹先用塌氣丸不愈腹

中有食積結糞小便黃時微喘脉伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而後有積所治宜先補脾然後下

之後又補脾即愈也不可補肺恐生虛喘

潔古腹脹虛實凡久病吐瀉之後虛則其脉微細肺

主目胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷

先用塌氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之

類用諸溫樂養真氣

異功散和中丸四君子湯三方並見吐瀉

實則脉洪實

不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘急悶亂更有

痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅子大黃丸

解毒丸下之兼須詳認大小便如都不通先利小便後

利大便

白餅子方見癖解毒丸方見喉痺大黃丸方見傷寒

雲岐云小兒熱結

於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉青丸

薛東垣云寒脹多熱脹少皆主於脾胃虛者宜用六君子湯若喘而氣短者脾肺氣虛也用異功散補之若服尅伐之類而喘脹益甚者脾肺之氣復傷也用前湯加半夏升麻若既下而不喘則邪氣去而肺氣寧也不必用藥或病久小便不利或四肢浮腫者脾肺之氣虛不能通調水道也用金匱加減腎氣丸主之或手足逆冷睡而露睛脾胃虛寒也用六君子加炮薑手足不冷睡而露睛脾胃虛弱也用六君子湯若面色青木尅土也

用六君木香柴胡更當調治乳母節其飲食恐藥餌過  
劑復傷胃氣故也 一小兒腹脹面赤痰喘大便秘壯  
熱飲冷此形病俱實用紫霜丸一服諸證益甚面色頓  
白飲湯不絕餘以為邪氣退而真氣復傷故面白而喜  
湯用白朮散大劑煎湯令恣飲良久而睡翼日頓安  
一小兒傷食腹脹胸滿有痰余治以異功散而痊後復  
傷食腹脹兼痛或用藥下之痛脹益甚而加氣喘此脾  
胃傷而致肺虛也用六君子加桔梗調補而痊 一小

兒腹脹惡食發熱惡心證類外感余曰此飲食停滯也  
用保和丸一服諸證頓退惟腹脹用異功散而痊 一  
小兒傷食腹脹服尅伐之劑小便澀滯又服五苓散之  
類飲食漸減小便不通四肢頓腫余朝用金櫃腎氣丸  
去附子夕用補中益氣湯而安 一小兒腹脹大便青  
白腹左一塊面色痿黃齒齲赤爛食少滯頤余用異功  
散調補中氣為主佐以大蕪荑湯清疳治熱月餘諸證  
稍愈仍服異功散及蚶蟆丸外貼阿魏膏兩月塊消左

脇微痛用四君子湯丸味蘆薈丸而愈

百問云有痞脹氣脹癥積脹鎖肚脹脘膈脹食膨脹虻  
脹虛冷積脹其痞氣積脹宜先與保童兼塌氣以去之  
其痞癖氣脹癥積脹宜三稜以消痞其鎖肚脹宜與珍  
珠天麻丸以通之其上膈中脘食傷膨脹宜三稜塌氣  
大棗連丸以消磨之其虻脹宜下蟲丸以化之其虛冷  
積脹宜沉香煎以溫之以上諸證宜調和胃氣消磨通  
利腫脹必然平復矣如有執者必以葶藶牽牛等輩以



治之推氣丸劑亦可用 按百問分證雖詳而偏於攻  
下若無錢張活法薛氏補法以主之鮮不殺人慎之

塌氣丸

胡椒

一兩  
兩半

右為末糊丸如粟米大每服五七丸至一二十九丸陳  
米飲下無時 一方有木香一錢

錢氏潔古所用塌氣丸乃此二味不可誤用後有牽  
牛者慎之

本事調中丸 治小兒久傷脾胃腹脹 乾薑 橘紅

白朮 茯苓 木香 砂仁 官桂 良薑  
各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

聖惠治小兒脾虛腹脹不能乳食訶梨勒丸 訶梨勒

煨用皮厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟 陳橘皮 湯浸去白焙各半兩 乾薑

炮裂甘草 炙微赤剉 木香 白朮 人參 去芦頭各一分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲  
下五九日三四服量兒大小加減服之

張氏溫脾散 治脾胃虧損腹脇虛脹乳食不進困倦

無力 訶子肉 人參各七錢 白朮 木香 桔梗

茯苓 藿香 陳皮 黃耆各五錢 甘草炙二錢半

右每服二三錢薑棗水煎

沉香煎 治脾氣冷積 乳香 沉香 丁香 杏仁

炒百草霜 木香各一錢 肉豆蔻一箇 巴豆十四粒  
出油如

霜

右為末酒煮蠟和丸菜豆大每服三五丸淡生薑湯

送下應患肚痛不止服之效常服以通為度

三因肥兒丸 治小兒病多因缺乳喫食太早所致或

因久患藏府胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行髮墜

發熱無精神 黃連 神麴各一兩 麥芽炒半兩 木香二錢

檳榔三箇不見火 使君子 肉豆蔻麴裏煨各半兩

右為末糊為丸如桐子大每服三二十九量兒加減

熟水吞下

六神丸 治如前證 丁香 木香 肉豆蔻用麴裏煨各五

錢訶子

煨去核  
半兩

使君子

蘆薈

研各  
一兩

右為末以棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸温

米飲下食前

治小兒疳病或腹大

胡黃連

二錢去  
果積

阿魏

一兩半  
去肉積

神

麩

二錢去  
食積

黃連

二錢去  
熱積

麝香

四粒  
通竅

右為末每服十二粒白朮湯下

褐丸子

治疳腫脹

蘿蔔子

一兩  
微炒

陳皮

青皮

檳

榔

五靈脂

蓬朮

煨

黑牽牛

取淨末半  
生半炒

赤茯苓

各半  
兩 木香 二錢  
半

右為末麩糊丸菜豆大每服十五丸紫蘇葉或白湯

下

五疳保童丸 治五種疳疾 五倍子生 青黛 夜明

砂布裹洗 苦楝根皮 蘆薈 熊膽研入 黃連去毛 龍胆

草生用 乾蟾酥炙去皮骨 麝香研入 蕪荑取仁 蟬退去土各等分

右末用粟米糊為丸麻子大一歲兒二十九飯飲下

二三服

幼科有丁奚哺露無辜等名其證腹大頸小黃瘦皆疳  
脹之異名也輕則為此重則為彼耳今仍舊別立門於

疳後

楊氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘體腫面浮

陳米

合一

炒黃青皮

去穰巴豆二十一  
粒炒黃色去巴豆

甘草

炙各半兩

黑牽牛

二錢半半

炒生半

肉豆蔻

二箇煨香

右末半錢米飲調下加檳榔一箇

塌氣丸

治小兒疳氣腹脹喘急并面浮腫

丁香

胡椒

炒各五錢

蘿蔔子

炒

白牽牛

各七錢半

右為末麩糊丸小豆大三歲三十九米湯下

塌氣散

治小兒腹脹氣粗并疳疾相攻面目浮腫

木香

一錢

青皮

半兩

巴豆

三十粒同炒豆黃色去巴豆

右為末三歲半錢米湯下食前連進即效

分氣飲

治小兒腫脹作喘氣短而急

桔梗

赤茯苓

苓

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

炒

半夏

麩

真蘇子

微炒

紫蘇

甘草

各二錢

草果仁

一錢



右剉散每服一錢半薑棗煎服

三稜煎丸 治嬰孩食傷生冷甜膩毒熱等物脾胃積

滯久不尅化令兒肚熱脚冷痞癖寒熱及療癥瘕中

腕不和膨脹上膈氣壅心腹不得宣通所以作疾此

藥溫良但是諸積滯食不化並宜與服 京三稜成塊

煮蓬朮並炮各半兩 芫花二錢半醋浸炒 鼈甲去裙米醋炙焦半兩 淡豆

豉二錢 巴豆二十一粒去殼 川當歸半兩 杏仁去皮尖二錢半炒令赤

右前四味一處以米醋一碗煮令乾仍用炒起更細

劉煨為末次入當歸末杏仁巴豆淡豆豉和勻水煮  
麩糊為丸麻子大每服二十九薑湯下大小加減服  
之

三稜丸 治小兒停積腹脇脹滿乾噦惡心全不入食

三稜煨木香 神麩炒陳皮去白半夏薑汁製丁香

官桂各半兩

右為末麩糊丸如黃米大二十九乳食後溫生薑湯

下

阿魏丸 治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏

醋浸一宿  
研如泥

黃連

炒  
連翹各半

花碱

研如粉  
三錢

查肉

一兩  
皂角水浸  
一宿一兩

右為末炒神麩糊丸如葡萄子大每服二十九空心米  
飲下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麩山查

肉食多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏

一兩

黃連

酒煮  
六兩

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣

不足加人參

小阿魏丸

山查肉

三兩

石碱

三錢

半夏

一兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

真珠天麻丸

治急驚風請量用之以通為度此方仍

治吊腸鎖肚撮口至妙丸如麻子大初生患者三日

三丸五日五丸七日七丸加青黛名青黛丸 天南

星炮

天麻

白附子

炮各二錢半

膩粉

半錢

巴霜

一字

蕪荑

炒全蝎

滑石

各一錢半

右為末者細麩糊丸如麻子大每服一歲五丸二歲  
十九大小加減薄荷湯點茶清送下

大棗連丸 治小兒飲食過度胸膈膨脹上下氣不宣

通鬱滯迷悶情思少樂大則作喘飲食不化作渴煩

躁坐卧不任肢體倦怠腹脇疼痛蓬朮 京三稜

各二錢 乾薑 炮 青皮 陳皮 去白 木香 丁香 各三錢

巴豆 二十一粒去膜心出油 綠細小棗 莫二錢

右為末醋糊丸麻子大每服七丸至十九大者加服

生薑棗子湯下

下蟲丸

治蛔疝諸蟲

苦楝根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

桃仁

浸去皮焙

蕪荑

焙

雞心檳榔

各一錢

鶴虱

炒

輕粉

各半錢

乾蝦蟆

炙焦三錢

史君子

伍十箇煨取肉用

右為末飛醋糊丸麻子大每服二十九丸天明清肉汁

下內加當歸川連各二錢半治脊疝兼疝勞

遇仙丹

治諸蟲取諸積

牽牛

三斤

大腹子

二斤

錫灰

炙乾

為末

大黃

四兩

雷丸

四兩

青木香

鶴虱

乾漆

各二兩

皂

角四  
條

右後四味煎水用粟米煮粥初用牽牛末次用大腹  
末三用錫灰四用大黃五用雷丸六用青木香和劑  
丸如梧桐子大每服五七丸用薑湯熟水送下

此藥專治男子婦人積蟲氣塊五勞七傷赤白痢疾  
便血注下皮黃水腫十般氣十一般惡虫又進飲食  
除病悅顏色不與他藥相反四季可服細末三四錢  
量大小加減服時不喫晚飯三更用茶清下次早桶

子內蟲積及粒米盡方可洗面溫粥補之傷寒孕婦不可服

東垣治脹不犯上下二焦用素問中滿者寫之於內之法實者分氣消積虛者升陽滋血治者當師其意而活用之勝前所用排擊諸方遠矣

中滿分消丸

黃連

枳實

厚朴

各五錢

乾薑

薑黃

豬苓

砂仁

澤瀉

茯苓

各三分

陳皮

白朮

各一分

半夏

四分黃芩

一兩二錢

甘草

一分



右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九溫酒送下

消痞丸 快利之劑 黃連兩半 枳實 黃芩 甘草

人參

錢各三

厚朴

錢七分

乾薑

錢四分

橘皮

錢一分

薑黃

錢五分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九隨乳下

丹腹脹 蘿蔔子 蘇梗 乾葛 陳皮各等分 甘草減半

如食減加白朮煎服

升陽滋血湯 二月間一小兒未滿百日病腹脹不大

便二日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血

利大便

蝎梢

分二

神麩

分三

厚朴

當歸

錢各一

桃仁

十箇

升麻

分三

右作一服水一盞煎至半盞去查食前服

麻黃升麻湯

治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四

月小兒服之神効

麻黃

分二

桂枝

杏仁

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

麩末

菴活

白茯苓

升

麻根

蒼朮

澤瀉

豬苓

陳皮

黃檗

各一分

柴胡根 白朮 青皮 黃連

各五分

右㕮咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服

### 水腫

演山腫脹二證此由虛中有積久患失治日漸傳變證候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本後正其標斯無恙矣 錢腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若加喘者重也何以然腎水勝

而尅退脾土反勝心火心又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍侵於肺故令大喘此皆難治

曾氏治法 原腫病之由標本之疾腎主元氣天一之水生焉肺主沖化地四之金屬焉腎為本而肺為標皆至陰以積水其為病也腎者胃之關鍵關鍵不利樞機不轉水乃不行滲於脉絡皮膚而為浮腫當推究內外

所因而為施治兒大者憑脉以明虛實古方有十種論  
證短氣不得卧為心水兩脇緊痛為肝水大便鴨溇為  
肺水四肢苦重為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為  
膽水乍虛乍實為大腸水腹急肢瘦為膀胱水小便閉  
澀為胃水小腹急滿為小腸水然脉浮為風為虛沉伏  
為水病沉則脉絡虛伏則小便難即為正水脾脉虛大  
多作脾腫因循不治乃成水腫蓋脾屬土喜燥而惡濕  
常感濕氣濕喜傷脾血化為水土敗不能制水則停蓄

不行留滯皮膚故作浮腫初得病時見眼胞早晨浮突

至午後稍消以菴活散

赤白痢

疎解次醒脾散

慢驚

主之及

間投南星腹皮散其脾冷困則燥以草果縮砂之類然  
此證夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如  
春水泛溢兼肝木旺而脾土受尅不能受水所以難療  
進退不常須徐徐調理取效 若脾熱而困又以熱藥  
燥之雖火能生土亦可勝水奈何燥之太過土不敵火  
則熱愈甚而不食發熱煩渴醫者又進之以燥劑由此

而面目轉浮致脾敗而手足背皆腫蓋手足背與臍凸  
即脾之外候有未經發表遽用下藥以瀉之則一瀉而  
腫消乃曰得瀉之力殊不知脾愈瀉而愈虛不逾旬月  
其腫如初此世人只知瀉腫為最而不求其十補勿一  
瀉之論法當隨四時用藥解表通利小便春以七寶散  
傷寒加麻黃桂枝赤茯苓水薑蔥煎服夏以五苓散  
加麻黃車前子薏苡仁秋以清肺飲嗽加羌活細辛商  
陸冬以沖和飲傷寒加白朮生川烏赤小豆已上三藥

並用水薑蔥煎次投滋潤救脾導水湯劑滲泄之乃為良法更以香陸胃苓丸赤蒼飲頓服自然獲安蓋內經

云開鬼門

發汗

潔淨府

利小便

平治權衡以平為期此之

謂也 有初中便覺痰嗽氣喘小水不通正屬肺腎所

主先服解表散

咳嗽

次以三白散為治餘證輕者投商陸

丸故經曰其高者因而越之即湧吐之義也下者引而竭之即滲泄之義也凡得此病非一朝一夕之故不可以孟浪之藥求其速効以致虛脫如愈後再感外風滿



面虛浮用排風湯

驚癰  
鶴膝

和解仍服前救脾湯劑免致反

復飲食之忌惟鹽醬齏鮓濕麩皆味鹹能溢水者併其  
他生冷毒物亦宜戒之重則半載輕則三月須脾胃平  
復腫消氣實然後於飲食中旋以燒鹽少投則其疾自  
不再作故劉氏曰治腫非易補養尤難所忌者切須詳  
審有經久不消者下濬川丸即效

南星腹皮散 主腫疾欲愈未愈之間脾胃虛慢氣促

痰喘腹脹胸滿飲減精神困小便不利面色痿黃

南星製一兩 大腹皮淨洗焙乾 生薑皮 陳皮去白 桑白皮

劉炒甘草 扁豆炒去殼各半兩 青皮去白五錢

右碎每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

香陸胃苓丸 治腫疾日久不愈此藥大能實脾導水

多服取効 丁香去梗 商陸 赤小豆 陳皮去白 甘草

炙各二兩 蒼朮米泔水浸一宿去粗皮濾乾劉片炒微黃色 澤瀉去粗皮各二兩半

赤茯苓去皮 白朮各一兩半 肉桂去粗皮一兩 厚朴去粗皮用生薑汁炙

令香熟 豬苓去皮

右除丁香肉桂不過火餘藥剉焙同二味為末用麩  
微炒水浸透煮糊丸菜豆大每服三十九丸至五十九  
或七十七丸空心溫湯下兒小者丸作粟穀大吞服  
之粒數引子並如前法

赤蒼飲 主脾胃因虛受濕面貌浮黃或遍身作腫飲  
食減少氣不升降小便赤色肚膨脹咳嗽有痰及腫  
嘗服神効加草果仁炮過水薑棗煎投 赤茯苓

蒼朮

去粗皮米泔水浸一宿濾

枳殼

製一兩

藿香

和根

半夏

湯煮透  
剉焙乾

淨香附

紫蘇

和

厚朴

去粗皮薑  
汁炙香熟

陳

皮

去白各  
七錢半

甘草

炙一兩  
二錢

右剉每服二錢水一盞生薑二片煎七分無時溫服

三白散 解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便利皆

因膀胱蘊熱風濕相乘

白牽牛

半生半  
炒杵碎

桑白皮

剉炒

白朮

木通

去皮  
節

陳皮

去

甘草

各半  
兩

右碎每服二錢水一盞煎七分無時服

商陸丸 治水腫小便不通勿拘遠近 商陸

一兩  
淨黃

連半  
兩

右焙為末薑汁煮麩糊丸菜豆大每服三十九至五  
十九丸用溫紫蘇熟水空心下或溫葱湯

濬川丸 治水腫及單腹滿脹氣促食減遍身面浮

大戟 芫花醋炒沉香 檀香 南木香 檳榔

蓬莪朮 大腹皮洗焙 桑白皮剉炒各半兩 黑白牽牛

晒研取生末一兩 巴豆去殼膜心存油三十五粒

右除牽牛末巴豆外前九味內有沉香檀香木香檳

榔不過火餘五味焙乾同沉香等為末就加牽牛末和勻巴豆碎切在乳鉢內極細杵入前藥末同再杵勻水煮麩糊丸麻仁大每服十七丸濃煎葱湯候溫五更初空心下去水未盡停一日減用十三丸次減作九九再減至七丸湯使下法如前證退即止仍投南星腹皮散如單腹腫甚能飲食氣壯者加甘遂末同丸取效仍忌有甘草藥餌相反

演山翁治法

受濕腫

脚手面  
目虛浮

食毒氣腫

腹肚腎  
壅脹急

傷寒虛氣入腹腫 瀉痢虛氣入腹腫 此四種所患  
病不相同皆由虛得之受濕謂脾胃受濕冷久不尅化  
氣浮四肢頭面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停  
留胃腕致虛入腹作腫傷寒由下之太早乘虛入腹作  
腫瀉痢之久脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補  
臟充實方可去腫先服四味理中無減半乾薑加白朮  
桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實作喘加淡豆豉瀉痢虛  
腫服正氣調胃胃氣既壯以救生丹利之其腫即退再

調補臟腑用觀音散即平復矣

氣虛腫

亦名氣蠱

血虛腫

亦名血蠱

榮衛俱虛腫

亦名氣血蠱

小兒所患腫脹一門最為要急前人少有究竟然腫脹之作皆由榮衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正相亂所以致受四大浮盛腹肚脹滿多由食毒得之飲食得之癥傷得之飢飽得之積久不化故成斯病病由虛得或則妄亂通下因虛致虛根不得去疾加已盛是謂壞證危候智者怯而為辭庸者暴以攻



擊二醫不同誠屬難治智者商之良者審之疑者塌之  
疑其病盛不可利只與塌其氣明者調之正崇衛也先調榮衛之順次服分  
氣飲子以散其滯斯病去矣

榮衛飲子 調補嬰孩氣血俱虛榮衛不順四肢頭面  
手足俱浮腫以至喘急者並宜服之 川當歸 熟

乾地黄淨洗人參 白茯苓 川芎 白朮 甘草

炙白芍藥 枳殼炒別製 黃耆蜜炙 陳皮

右件等分咬咀每服二錢七水一小盞煎至半盞去

津通口不拘時候

議曰榮者血溫流行於脉衛者氣順調和於絡是故榮行脉中衛行脉外陰陽相安循環無止自幼至長不離呼吸無少滯礙其脉方調其氣乃順呼吸之間脉不應息氣有違滯流注經絡隱伏臟腑百病皆由茲始此方最良雖兒幼小並可與服以壯其根使血榮氣衛順且和矣腑寒臟虛溫且壯矣盈虧自然而平怯弱自然而正陰陽調均氣脉充實何病之有

分氣飲子 調理小兒腫脹作喘氣短促急坐卧不任

四體浮腫飲食嘔逆神困喜睡 五味子 桔梗

白茯苓 甘草炙 陳橘皮 桑白皮 草果去殼 大

腹皮 白朮 枳殼去穰切炒 川當歸 紫蘇 蘇子

半夏麩

右等分吹咀每服二大錢七水一小盞生薑二小片  
棗子半箇煎至半盞去滓通口不拘時候兼入味理  
中丸煎服 以上宜用救生丹通利

議曰清濁無混邪正不干上焦得之清涼下部受之  
溫煖氣滯則少升降血虛則多流注雖是乳子呼吸  
一息其脉之至徐徐應指不違其數者亦同大人流  
行但隨小大受之短淺而已若也留滯其脉遲數即  
太過不及而病生焉善療治者鬱則分之逆則順之  
停則利之滯則降之調理之法先宜順氣大抵嬰孩  
順氣即易治此方分氣與分水穀之分者不同明者  
察之

大効神功救生丹 治小兒氣虛喘息四肢浮腫肚腹

脹急衝滿脇肋乍熱乍寒或瀉或秘皆由久停虛積

榮衛不順宜用推去其惡毒之氣 雄黃另研朱砂各一

分 巴豆二十一 乾薑二錢

粒去殼

右件用米醋一盞以巴薑就煮令乾去薑不用將巴  
出油和雄朱研勻雪糕搜丸如麻子大每一歲三丸  
並用酒浸赤芍藥以少許送下

薛氏治法 經曰至陰者腎水也少陰者冬脉也其本

在腎其末在肺皆積水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故肘腫腹大上為喘呼不得卧者標本俱病也丹溪云惟腎虛不能行水脾虛不能制水胃與脾合又胃為水穀之海因虛而不能傳化腎水泛濫反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫也其狀目胞上下微起肢體重着喘咳怔忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也古方有十種論證又

有濕氣毒氣傷寒後瀉痢後氣血虛者之五種及疝氣  
癥積鎖肚胸膈作膨蛔氣虛冷積者之七脹亦當詳之  
其受濕氣者由脾胃之氣敦阜四肢頭面皆腫也食毒  
者脾傷積毒停留於胃也傷寒下早者邪氣乘虛而入  
也瀉痢後者脾氣虛也皆宜先調胃氣次可治腫其患  
七脹皆由血氣不足臟腑怯弱表裏俱虛邪正相亂以  
致四肢浮腫腹肚膨滿亦當先調榮衛分別陰陽治法  
宜補中行濕利小便凡有熱者水氣在表也可汗之身

無熱者水氣在裏也宜下之腰已上腫宜利小便腰已下腫宜發汗此仲景之法也若遍身腫煩渴小便赤澀大便祕結此屬陽水遍身腫不渴大便溇泄小便清利此屬陰水陽水兼陽證者脉必浮數陰水兼陰證者脉必沉遲氣若陷下宜用二陳加升提之藥如腹脹少加木香調之若朝寬暮急屬陰虛朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸朝急暮寬屬陽虛朝用六君子湯夕用加減腎氣丸朝暮皆急陰陽俱虛也用八珍湯主之真



陽虛者朝用八味地黄丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉呼吸氣冷者此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不治惟調補脾土多有生者

金匱加減腎氣丸

熟地黄

八兩

乾山藥

山茱萸

各四兩

澤瀉 白茯苓

牡丹皮

各三兩

肉桂

附子

炮車

前子 炒牛膝

酒微炒各一兩

右各另為末米糊丸小豆大每服三四十九空心食

前白湯下

附雜方

丹白文舉兒五歲身面皆腫尿多 山梔炒 桑皮炒 各一錢

黃芩二錢半

白朮

蘇梗各一錢半

右以咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

湯退腫散氣方 赤小豆 陳皮 蘿蔔子 甘草炙 各

半 兩 木香炮七分


右為粗末薑棗煎服大小加減

又方 白朮炒 木香炮 甘草炙 茴香炒 青皮  
各半兩 巴豆三十粒

去膜同青皮炒  
去巴豆不用

右為末米飲調下

又方 用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶  
子為末大小加減米飲調下



證治準繩卷九十一

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十二

詳校官太醫院醫士臣趙止池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣姚培敦

欽定四庫全書

證治準繩卷九十二

明 王肯堂 撰

幼科

脾臟門

疳

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲

之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調將惟務姑息舐犢寵愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮啜漸成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋蟲痛瀉痢而諸疳之症作矣 錢諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假

今日中發潮熱是心虛熱也肝為心母法宜先補肝母  
肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱自愈醫見潮  
熱妄謂其實乃以太黃牙硝輩諸冷藥利之利既多而  
不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病發作寒熱飲  
水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反以巴豆礪  
砂輩駛藥下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗  
損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下  
之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱也



熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端亦成疔病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疔也 小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疔以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即蕩滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脉沉細益不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疔矣 楊兒童二十歲以下其病為疔二十歲以上其

病為癆疳與癆皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生或三兩晷後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹醋以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而

作也有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷厥太過渴引水漿變而生熱熱氣未散復於他邪得之者又有病瘵寒熱脇下痛硬或者不能漸與消磨遽以礪巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎疢之為候頭皮光急毛髮焦稀顛縮鼻乾口噤唇白兩眼昏爛揉鼻擣眉脊聳體黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴瘵結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥

土而欲飲水者皆其候也

肝疔亦名風疔亦名筋疔 錢肝疔白膜遮睛筋疔瀉

血而瘦 湯肝疔眼白青睛澀癢 聖惠搖頭揉目流

汗遍身合面而卧面色青黃髮竦頭焦筋青腦熱渾身

瘡癬腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦 曾氏

目生眵糞髮際左臉多青或白睛微黃瀉痢夾水或如

苔色

心疔亦名驚疔 錢氏面黃夾赤身壯熱 湯氏口內

生瘡 聖惠渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胸膈煩滿  
鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或  
乃虛驚 楊氏小便赤澀五心皆熱 曾氏齧牙舒舌  
愛飲冷水喜伏眠於地

脾疳亦名食疳 錢氏面黃腹大食泥土 湯氏脾疳  
食不消冒疳多吐 聖惠腹多筋脈喘促氣粗乳食不  
多心腹脹滿多啼效逆面色痿黃骨立毛焦形枯力劣  
胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾情意不悅愛暗憎明腸

胃不和利多酸臭 曾氏愛食冷物引飲無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或釀瀉肌瘦目慢晝涼夜熱不思乳食 錢氏又云肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種異端今略舉之目澀或生白膜唇赤身乾黃或黑喜卧冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也 按此言脾疳證候多與餘疳相濫蓋疳為脾經本病固應兼之

肺疔亦名氣疔 錢氏氣喘口鼻生瘡 聖惠咳嗽氣  
逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻齧甲壯熱憎寒  
唇邊赤癢腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄利糞  
中米出皮上粟生 曾氏鼻下赤爛手足枯細口有腥  
氣右腮眈白

腎疔亦名急疔亦名骨疔 錢氏腎疔極瘦身有瘡疥  
骨疔喜卧冷地 湯氏齒爪黑 聖惠肌骨消瘦齒齮  
生瘡寒熱時作口鼻乾燥腦熱如火脚冷如水吐逆既

增乳食減少瀉利頻併下部開張肛門不收疔瘡癢痛  
曾氏兩耳内生瘡脚如鶴膝頭縫不合或未能行牙  
齒生遲其縫臭爛傳作走馬疔之類 楊五臟疔傷大抵  
然爾析而論之曰五疔出蟲曰蛔疔曰脊疔曰腦疔曰  
乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔痢曰疔腫脹曰疔癆曰無辜  
疔曰丁奚曰哺露證狀非一可不舉宏撮要而條析之  
乎五疔出蟲者疔傷之源雖起於乳舖不調然臟腑停  
積已久莫不化而為蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出



於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔

疝者失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲

皺眉多啼嘔吐清沫腹中乍痛肚腹青筋唇口紫黑腸

頭齒癢是也

蛔雖食蟲蟲不可動從口鼻出者難治

脊疝者蟲蝕脊膺身

熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒

或十指皆瘡頻齧爪甲是也腦疝者胎中素挾風熱生

下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗

遍身多汗顛腫顛高是也

臨產多愁亦然易損兒眼

乾疝者瘦悴少

血舌乾多啼其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝  
身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其  
病在肺搭口癡眠胃腕乾渴其病在脾總為五乾疳是  
也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麵炙  
搏使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴  
止是爾疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糞  
粕是爾勿用熱藥止之疳痢者挾授風寒暑濕或冷熱不調或  
停積宿滯水穀不聚頻下惡物是爾疳腫脹者虛中有

積其毒與氣交并故令腹肚緊脹由是脾胃復受濕故令

頭面脚手虛浮是爾

法當磨積調氣

疔勞者潮熱往來五心煩

熱手足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾

或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可活

無辜疔者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不痛其

間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑

以致肢體瘡瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾

鍼刺

破膏藥貼

或澣濯兒衣露於簷下為雌鳥落羽所污兒着此

衣蟲入皮毛亦致無辜之疾兒衣已晒須微火烘之其  
若手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胸陷  
或生穀癥是為丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐蟲煩  
渴嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水  
穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷使  
柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種  
類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎疳內虛  
不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸加驅疳等

劑仍與貼項強筋若不識證謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之

莊氏家傳小兒二十四候 第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳 第二候脚細肚高胸前骨生愛喫泥土酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳 第三

候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疔乃因喫著承熱物  
或病妳所損心肺加之欬嗽更以服涼冷藥過多便上  
熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭 第四候皮虛皺面無顏  
色身上燥癢心煩 第五候毛髮稀疎鼻生瘡是肺疔  
第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疔 第七候牙變黃  
赤不定是腎疔 第八候頭髮焦乾鼻下瘡生是肺疔  
第九候咬指甲毛髮作穗四肢沉重是心疔 第十  
候肚上筋生齒蟲蝕是骨槽疔 第十一候吐逆腹脹

是胃疔又名妳疔 第十二候齒斷臭爛面無顏色心  
不思食是脾疔又名口疔 第十三候愛合面卧多睡  
如醉腹脹氣急蓋是因曾喫生肉如此腹內有蟲是心  
脾疔 第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是  
肝肺疔 第十五候脚細肚高并肚上有青脈是脾疔  
第十六候非時生瘡愛喫冷水是熱疔 第十七候  
皮膚上生粟子糞中米出是脾冷疔 第十八候氣滿  
腹脹及口乾是心胃疔 第十九候愛餐生米麩炭甑

凡足脾胃疔 第二十候揉鼻指眼及咬指甲愛飲水  
是肝渴疔 第二十一候多寒熱愛卧不起是骨熱疔  
第二十二候愛飲水眼目不開是肝疔 第二十三  
候肌體或熱或冷發渴無時是急疔 第二十四候齒  
斷黑唇懶開則赤是心疔積熱

聖惠凡小兒疔在內眼澀腹脹痢色無常或如泔淀日  
漸羸瘦此候可療若鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡生痂  
痛癢漸漸流引遶於兩耳時時目赤頭髮稀疎腦皮光



緊頭大項細肌體羸瘦亦可治也若唇口被蝕齒斷作  
五色或盡峭黑舌下有白瘡上齧有竅子口中時有臭氣  
齒斷漸染欲爛亦可治也若下部開張有時赤爛癢不  
可忍下痢無常亦可治也若疳蝕脊脊十指皆癢自咬  
指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時腹脹有時下痢若急治  
之無不差也

聖惠凡小兒肝藏疳若目睛帶青脈左脇下硬多吐涎  
沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心藏疳若愛驚啼

常好飲水便食辛味耳邊有脈舌上有黑靨者不可治也脾藏疔若肚大唇無血色人中平滿下痢無度水穀不消好喫泥土皮枯骨露不可治也肺藏疔若欬逆氣促多瀉白沫身上有斑生如粟米大色若黑者不可治也腎藏疔若愛食酸鹹飲水無度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩竦骨枯不可治也又五疔有五絕候一襯著脚中指底不覺疼二抱着手足垂躄無力三病未退遍身不煖四藏府瀉青涎及沫不止五項筋舒展無力

如此之候皆不可治也凡醫用藥切作審詳也

潔疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒  
易為虛實致令胃虛而亡津液內發虛熱外消肌肉一  
臟虛則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常漸加瘦  
瘠久不痊可是腸胃有風積法當宣風散瘧發熱導之後  
各依本臟補其母

錢諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱  
則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青

白漸瘦弱此冷證也史君子丸主之疳在外鼻下臭爛  
自揉鼻頭上有瘡不着痂漸遠耳生瘡治鼻瘡爛蘭香  
散諸瘡白粉散主之 肝疳當補肝地黄丸主之 心  
疳當補心安神丸主之 脾疳當補脾益黃散主之  
腎疳當補腎地黄丸主之 筋疳當補肝地黄丸主之  
肺疳當補脾肺益黃散主之 骨疳當補腎地黄丸  
主之 大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳  
久病者為瘦冷疳冷者木香丸熱者胡黃連丸冷熱之

疔尤宜如聖丸

疔瀉

故小兒之藏府柔弱不可痛擊天下

必亡津液而成疔凡有可下量大小虛實而下之則不  
至為疔也初病津液少者當生胃中津液白朮散主之  
惟多則妙 楊熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此  
其要也熱疔病多在外鼻下赤爛頭瘡濕癢五心煩熱  
掀衣氣粗渴引冷水煩躁卧地吐熱脚冷潮熱往來皆  
熱疔也冷疔病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱  
目腫面鰲又一證躁渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑

泄無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之  
冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者  
虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故  
錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷  
服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱領乎上  
醫處此消積和胃滋血調氣隨順餌藥以扶之淡泊飲  
食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未  
保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積而虛

謂之疝極諸有積者無不肚熱脚冷須酌量虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積朕乎虛則先與利導纔得一泄急以和胃之劑為之扶虛然取積雖當疎利如白苳菴蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦不可無脇間癖痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘噉錢氏有癖為潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而觀發作不同療治不一又可無權度於此哉 曾大抵疝之為病皆因

過餐飲食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳

變然脾家病宜蘆薈丸沉香檳榔丸積或水晶丹積烏

犀丸積更察虛實療之有蟲者投使君子丸腹痛化蟲

飲腹痛如心腹痛吐清水蟲自下多投二聖丸腹痛諸

疳證皆宜用局方五疳保童丸或萬應丸常服化積治

疳仍各投本臟調理之劑寧心用茯神湯驚悸調肝用

耆歸湯調脾用參苓白朮散不乳補肺用補肺散咳嗽



補腎用調元散庶各得其宜則前證不致再作 演山  
積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下  
其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒所患疳證泄瀉無  
時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟腑轉動有限所  
以不成風候雖瀉不風亦轉他證作渴虛熱煩躁下痢  
腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛用補虛是知疳之為  
疾不可更利動臟腑發作之初名曰疳氣腹大脹急名  
曰疳虛瀉痢頻併名曰疳積五心虛煩名曰疳熱毛焦

髮穗肚大青筋好喫異物名曰疳極

受病傳臟已極

熱發往來

形體枯槁面無神采無血色名曰疳勞手足細小項長  
骨露尻鬻無肉肚脹臍突名曰疳食加嘔噦頭骨分  
開作渴引飲蟲從口出名曰哺露此皆疳候又因多食  
生冷甘粘肥膩積滯中脘不化久亦成疳治疳之法量  
候輕重理其臟腑和其中脘順其三焦使胃氣溫而納  
食益脾元壯以消化則臟腑自然調貼令氣脈與血脈  
相參壯筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安

愈有以藥攻之五臟疎却腸胃下去積毒取出蟲子雖  
曰醫療即非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛  
則疳羸虛則脹滿何更利下若更轉動腸胃致虛由虛  
成疳疳虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣 薛疳者  
乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒為五疳在大人為  
五勞總以調補胃氣為主

後列諸方其證候龐雜不能名為何等疳者即於通治  
諸疳方內檢之若證候的與五疳等條下證候對者即

檢本疳方分寒熱虛實擇而用之常須識此勿令誤也  
肝疳楊氏云肝疳者由乳食不調肝藏受熱所致也若  
乳母寒溫不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪氣  
未散遽以乳兒多成風疳肝者眼之候上膈伏熱痰涎  
壅滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛眶痛癢揉擦昏  
暗雀盲甚至經月合眼亦名疳眼外證搖頭揉目白膜  
遮睛眼青淚多頭焦髮墜筋青腦熱甲癢筋攣燥渴汗  
多下痢瘡癬是也 錢氏以地黃丸主之 腎 楊氏以

天麻丸生熟地黃湯主之 曾氏調肝用耆歸湯

天麻丸 治肝疳風疳疔眼

青黛 川黃連 天麻 五靈脂 夜明沙微炒 川

芎 蘆薈各二錢 龍膽草 防風 蟬蛻去足各一錢半 全

蝎二枚焙 麝香少許 乾蟾頭炙焦三錢 研為末猪膽汁浸

糕丸麻子大每服十丸薄荷湯下

生熟地黃湯 治疳眼閉合不開內有朦霧

生地黃 熟地黃各半兩 川芎 赤茯苓 枳殼炒

杏仁 水浸去皮 川黃連 半夏麩 天麻 地骨皮

甘草 炙 當歸 各二錢半

右剉散每服二錢生薑三片黑豆十五粒水煎溫服

耆歸湯 治小兒稟賦素弱豆瘡出不快者及肝虛目

視不明

黃耆 蜜水塗炙一兩 當歸 酒洗焙乾 白芍藥 川芎 各半兩 甘草

三錢炙

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

張渙熊膽天麻丸

治風疴羸瘦搖頭揉目百脈拘急

天麻

羌活

真熊膽

蟬殼

使君子

去殼

胡黃

連

各一兩

蘆薈

乾蟾

酥炙黃各半兩

已上搗羅為細末

粳米飯和如黍米大每服十粒煎荊芥湯下量兒大

小加減

烏蟾丹

烏蛇

酒浸去皮骨炙令黃

乾蟾

酥炙黃

蛇蛻皮

燒灰各一兩

胡黃連

半兩已上搗羅為細末

真蘆薈

麝香

熊膽

各二錢半並細研

右件同拌勻以粟米飯和如黍米大每服十粒煎薄  
荷湯下乳前

莊氏家傳治小兒風疳順肝氣進飲食蘆薈丸

蘆薈

一錢別研秤或  
尺以皂角水磨

草龍膽

一兩淨洗  
剉焙乾秤

右件藥一處搗羅為末用不虵皂角三錠以水二升  
接汁用生絹濾去滓入銀器內慢火熬成膏入前二  
味藥調和得所丸如菘豆大每服三丸至五丸薄荷

湯下



漢東王先生家寶治小兒風疳氣攻項下生核子皂角膏方

皂角

大者一莖  
燒存性

糯米

一合炒  
黑色

草烏頭

二錢  
生

黃皮

一錢

炒黑  
色

右為末每用不拘多少以井華水調貼如未安須用  
水精丹取後用調氣觀音人參散等藥補仍再貼兼  
與疳藥相間服

神妙觀音散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉久不進食

白扁豆微炒石蓮肉心炒去人參焙各一分茯苓一錢半甘草

炙香白芷 綿黃耆搥碎用密水拌炙木香炒各一錢神麩二錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用

水一藥注或半銀盞棗子半片煎十數沸服

人參散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉

人參 茯苓 蓮肉去心炒各一分黃耆半兩搥蜜水拌炙甘草

二錢 炙

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢以

水一藥注或半銀盞入棗子半片煎十數沸服

莊氏第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疳方

肉豆蔻

蟾灰

全者各一介

桔梗

炮

茯苓

煨

大黃

煨各一兩

龍腦

麝香

各一錢

研為末軟飯丸如麻子大粟

米飲下三丸只可兩服

治小兒手足動眼目不開有時語笑或即嗔怒兼多驚

手指甲青狀形似死妄稱天釣通神丸

茯苓

龍齒

各煨半兩

鈎丹

胡黃連

各一分

銀箔

五片麝

香錢一釣藤一兩

煨

研為末煉蜜丸麻子大每十九

米飲下

莊氏第二十  
二候用此方

第三風疖小兒手足拘攣眼目不閉有時自笑或嗔怒  
驚叫手爪甲青狀似鬼形已似天癩須服金箔茯苓  
散

金箔

伍片

茯苓

牛膝

胡黃連

各一兩

龍骨一分木香

麝香

各一錢

右件為末每服一字米飲下日二服忌油膩

心疳楊氏云由乳食不調心臟受熱所致也蓋血氣未足乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疎通故心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱臉唇紅口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴齧齒虛驚是也

錢氏安神丸主之 薛氏用安神丸以治心異功散

以補脾 楊氏以茯苓丸錢氏安神丸主之 曾氏寧

心用茯神湯

朱砂安神丸 治心疳怔忡心中痞悶

朱砂四錢 黃連 生地黃各半 生甘草二錢 蘭香葉

二錢 銅青 輕粉各五分 研為末乾敷上

茯苓丸 治心疳驚疳 茯苓神 蘆薈 琥珀 黃連

淨 赤茯苓各三錢 釣藤皮 遠志肉薑製 蝦蟆灰各二錢

石菖蒲一錢 麝香少許

右為末粟米糊丸麻子大每服十九丸薄荷湯下

茯苓神湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生

下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神

去皮木根一兩

人參

去蘆

當歸

去蘆尾酒洗各半兩

甘草

炙二錢

右吹咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有微熱

煩躁入麥門冬去心同煎

張渙參黃丹 治驚疳挾熱夜卧驚悸

乾蝎

二十一  
個微炒

天漿子

一十四個  
乾者微炒

人參

胡黃連

各一

兩

天竺黃

半兩研已上  
為細末次入

青黛

朱硃

各一兩

龍腦

一錢

並細研

上藥一處拌勻煉蜜和如黍米大每服十

粒人參湯下量兒大小加減

天竺黃丹

天竺黃

一兩  
細研

晚蠶蛾

微炒

白殭蠶

微炒

川黃連

各半兩  
已上搗

羅為  
末次用

朱砂

青黛

麝香

各一分  
並細研

上藥拌勻

粳米飯和丸黍米大每服七粒至十粒煎人參湯下  
量兒大小加減

仙人水鑑治小兒驚疳朱砂丸 五歲至十五歲並宜

服之

硃炒

參錢  
研

青黛

一兩  
研

黃連

鬱金

為末

夜明砂

用炒  
焦黑



各半  
麝香

熊膽

用冷水一鷄子多  
浸一宿各一錢

同研細如

粉次入浸熊膽水和為丸如菘豆大空心臨卧金銀薄荷湯下三丸至五丸切忌生冷油膩神效

萬全方真珠散 治小兒心疳體熱黃瘦

真珠

末

麥門冬

去心各半兩

天竺黃

金銀箔

各研五十片臨

和加入諸藥末內

牛黃

麝香

各細研

胡黃連

甘草

炙 羚羊

羊角

屑

川大黃

炒

當歸

微炒

朱砂

雄黃

茯神

犀角

屑各一分

右搗羅為散每服以茵陳湯調半錢量兒大小服之  
朱氏治小兒肚大項細即是驚疳方

釣藤

甘草

各二分

人參

菴蕪

各一分

右件為末以水一茶椀入藥二錢煎水六合去滓重  
煎溫服

治五疳下痢心藏熱方

蘆薈

半兩研

輕粉

青黛

香墨

飛羅麩

各一錢

史

君子

一個

蝸牛

五個炒焦

和肉細研

麝香

半錢

同為末

研細滴

水為丸芥子大生地黃汁化下一丸至二丸薄荷湯

亦得

莊氏第九  
候用此方

麝香丸

治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連

各半  
兩

木香

蟬蛻

去頭足洗  
淨各一錢

瓜

芾

龍腦

麝香

牛黃

各一錢並  
各細研

用猪膽為

丸如桐子及菴豆大驚疳或秘或瀉清米飲送下小

兒五七粒至一二十粒眼疳猪肝湯下疳渴燂猪湯

下猪肉湯亦得驚風發搐眼上竄薄荷湯下一丸更

水研一丸滴鼻中牙疳 口瘡研貼蟲痛苦棟根湯  
或白蕪蕒湯送下百日內小兒大小便不通水研封  
臍中有蟲候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫  
水化下一大丸慢驚勿服

睡驚丸 治小兒一切驚疳食積風癇之證

史君子 五十個燒 香墨 葉大一塊 金銀箔 各七片 膩粉 二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內  
研次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子

大陰乾每服一丸薄荷湯磨下一歲已下半丸一名  
青金丹極效

治小兒因喫着患熱病妳次腹痛并及驚風毒妳便乃

下痢吐逆又名妳疳

桃仁去皮尖炒

胡黃連各半兩

沉香

硃砂

別研各一分

金箔

五片

研為末軟飯丸麻子大

米飲下五丸妳汁下亦得

菲氏第十一  
候用此方

治小兒胃疳及進食方

胡黃連

蘆薈

各一分

肉豆蔻

一個

檳榔

乾蟾

炙各半個

夜明砂

半分炒

硃砂

麝香

各半錢

研為末煉蜜丸

菘豆大一歲一丸米飲及乳汁下亦得如是疳盛次

加二丸至三丸取下蟲屎為驗五日服一

治小兒心藏積熱生疳桃花丸

寒水石

一兩用炭火燒熟研如麩細

朱砂

半錢細研合和如桃花色

研為

末水浸蒸餅丸如粟米大冷水下三五丸服旬日自

然安妙

莊氏第二十  
四候用此方

脾疳楊氏云由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母恣

食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致吐或乳多眠  
久則變為乳癖腹脇結塊亦為疔疳外證面黃身熱肚  
大脚弱吐逆中滿乏力叫啼水穀不消泄下酸臭合面  
困睡減食喫泥是也 錢氏益黃散主之 楊氏以靈  
脂丸同益黃散主之 薛氏用四味肥兒丸以治疳五  
味異功散以生土 曾氏調脾用參苓白朮散

不乳食

益黃散見脾

四味肥兒丸

治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止或

食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙根腐爛發熱瘦怯  
遍身生瘡又治小便澄白腹大青筋一切疳證黃

連炒

燕薹

神麩

麥芽

炒各  
等分

右為末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滾湯  
送下

靈脂丸

治脾疳食疳

白豆蔻仁

麥蘖

炒

五靈脂

縮砂仁

蓬朮

煨

青皮

去穢

橘紅

史君子

焙

蝦蟇

炙焦各  
二錢

研為末



米糊丸麻子大每服十九米湯下

神效換肌丸 治脾疳肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭大

腹急

川黃連

炒

鱉甲

酒炙

肉豆蔻

煨

使君子

麵裹煨

神麩

炒

麥芽

炒各半兩

訶子肉

二錢半

麝香

五分

研為末糊丸芥

子大米湯下

張渙木香煎 治食疳不知饑飽積滯內停腹大脚細

下痢無度

南木香

判

肉豆蔻

去殼各一兩

乾蟾

二個酥炙

胡黃連

使

君子

去殼

五靈脂

各一兩已上搗羅為細末次用

巴豆

七個去皮心膜紙裏出油

細研麝香

一分

右件同拌勻滴水於石臼中搗一二百下和如黍米

大每服二粒至三粒溫生薑湯下乳食後看兒大小

加減

檳榔丹

能食不生肌肉宜常服

檳榔

麩裹炮麩乾為度

木香

胡黃連

各一兩

代赭石

一分研已

上各搗羅為細末次用

香墨

燒存性細研

麝香

研細各一分

已上通

拌勻糯米飯和如黍米大每服十粒煎橘皮湯下食後量兒大小加減

肉豆蔻丹 肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻

去殼

使君子

去殼

青橘皮

炒黃各一兩

牽牛子

炒黃一分

已上搗羅為細末次入

蘆薈

一分研

麝香

一分研

已上一處拌

勻用糯米飯如黍米大每服十粒生薑湯下食後量

兒大小加減

聖惠木香丸 治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻瘡

乾瘦時有體熱 木香 胡黃連 蟾頭灸令焦黃 麝香

蘆薈 青黛 雄黃各細研 香墨 熊膽各一分 使

君子半兩 已上藥搗羅為末鍊密和丸如菉豆大

每服以粥飲下五丸量兒大小以意加減

訶梨勒丸 治小兒食疳水穀不消心腹脹滿好喫泥

土肌體瘦弱 訶梨勒皮三分 肉豆蔻一枚去壳 青黛 麝

香 蘆薈 朱砂各細研 熊膽研入各一分 已上藥搗

羅為末都研令勻用酒煮粳米飯和丸如黍米大每服以粥飲下三丸日二服量兒大小增減服之

桃花散 治小兒食疳腹脹

桃花

一分 乾蟾塗酥炙

肉豆蔻

去壳

青黛

細研

赤芍藥

紫筍茶

各半兩

右件藥搗細羅為散每服以溫粥飲調下半錢看兒

大小臨時加減

孔氏家傳治小兒脾疳方

胡黃連 史君子 五味子 檳榔各一錢 南木香

錢半

右為末粟飯丸如菘豆大飯內與五七丸日三服

大胡黃連丸

錢氏

治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米

不思飲食多睡吼哇藏府或瀉或秘肌膚黃瘦毛焦

髮黃飲水五心煩熱能殺蟲進飲食兼治瘡癬常服

不瀉痢

唯泥如切  
欲嘔聲

胡黃連

黃連

苦棟子

各一兩

白蕪荑

去扇半兩  
秋初三錢

乾蟾頭

燒存性  
研一分

麝香

另研  
一錢

青黛

另研  
錢半

蘆薈

另研  
一分

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每一丸如胡

桃大入巴豆仁一枚置其中用油單紙一重裹之同

米一升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麩糊丸

如麻子大與十九或十五丸清米飲下食後臨卧日

三服

大蕪萸湯又名梔子茯苓湯

治黃疸土色

為熱  
為濕

當小

便不利

今反利者知黃色  
為躁胃經中大熱

髮黃脫落

知膀胱腎俱受  
土邪乃濕熱之

証 鼻下斷作瘡者土逆行營氣伏火也能乳者胃中有熱故也喜食土

者

胃氣不足

面色黑者

為寒為痺

大便青

屬寒

褐色血黑色

熱蓄血中

間黃色

腸胃有食

治法當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔

黃連

麻黃

羌活

柴胡

茯苓

各三分

黃檗

甘草

炙各二分

大黃

白朮

各五分

防風

一分當

歸

四分

右件判如麻豆大作一服水一盞半煎至一盞去渣

稍熱服食前



治小兒脾胃面黃多睡手足浮腫方

桑白皮

焙

漢防己

焙

人參

茯苓

胡黃連

炮

麝

香

各一分

右為末煉蜜丸如麻子大用米飲下五丸一日二服

莊氏第十

候用此方

莊氏第二候脚細肚高胸前骨生愛喫泥土酸醎日久

通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾胃宜服

虎睛

一對 焙

牛黃

朱砂

麝香

各一分

桔梗

半兩 煨

右為末煉蜜丸生薑湯下三丸至五丸

治小兒脾疳瀉血吐大氣喘方

丁香 白朮 龍腦 乾蝎 胡黃連 夜明砂

炒各一分

右為末軟飯丸米粒大蕪荑湯下

治小兒通身黃瘦大小便結澀脾所召也 漢防已炒

甘草炙各一分 桑白皮 木通 木香各半兩 檳榔一個 胡

黃連一分 研為末每服一錢水七分盞生薑少許

煎至五六分溫二服

莊氏第十五  
候用此方

治小兒疳氣進飲食黃耆散 黃耆 五味子 厚朴

薑汁

白朮

蒼朮

芍藥

甘草

炙

陳橘皮

乾

薑

乾蝎

當歸

各一兩

木瓜

二兩

研為末每服半

錢米飲調下

丹小兒喫泥 石膏 黃芩 陳皮 茯苓 甘草

白朮

右為散煎服

經治小兒契泥及臌土 臌粉一分用沙糖搜丸如麻

子大空心米飲下一丸瀉出土瘥

臌如掌切脹也

莊氏第十九候愛餐生米麵炭甄瓦是胃脾疳蘆薈丸

治小兒驚風五疳

蘆薈

胡黃連

牛黃

天竺黃

草

龍膽

茯苓

各半兩

龍腦

麝香

人參

川大黃

雄黃

各一分

生犀

屑二分

右為末煉蜜丸菜豆大每服三丸薄荷湯下溫酒亦

得化下無妨

小兒脾疳常喫泥土日久通身通黃醫人不識或呼為

陰黃宜服虎睛丸

虎睛

個一

牛黃

錢二

桔梗

麝香

胡黃連

各一錢

右件為末煉蜜為丸麻子大每服三丸食前米飲下

日二服

肺疳楊氏云由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺所通其氣不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脈故鼻下兩傍赤癢瘡濕名為鼻疳其瘡不痛汁所流

處隨即生瘡亦名疔蟲外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚  
粟生鼻瘡流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹毛焦泄痢頻  
併是也 錢氏主補脾生肺以益黃散主之 楊氏以

清肺飲化蠱丸錢氏阿膠散主之 薛氏用清肺飲以

治肺益氣湯以生金 曾氏用補肺散

地黃清肺飲 治肺熱疔蟲咳嗽氣逆多啼壯熱惡寒

桑白皮 炒半兩 紫蘊 北前胡 防風 赤茯苓

黃芩 當歸 天門冬 去心 連翹 桔梗 生地黃

甘草

炙各二錢半

右剉散每服二錢井水煎食後服次用化蠱丸

化蠱丸

蕪荑 蘆薈 青黛 川芎 白芷稍 胡黃連

川黃連

蝦蟇灰

各等分

右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九食後  
臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗俟  
前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃

連蘆薈等分雄黃少許細末入鼻斂瘡

補肺散 治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠

一兩半  
對炒

白茯苓

馬兜鈴

去老梗

糯米

各半兩

杏

仁

二十一粒湯  
泡去皮尖

甘草

四錢  
炙

剉碎每服二錢水一

盞煎七分無時溫服

張渙麝香丹 治小兒肺疳皮毛枯燥欬嗽上氣

胡黃連

一半夏  
兩

半兩湯  
洗七遍

紫蘆子

微炒

五味子

一枚塗  
酥炙微

黃已上搗羅  
為細末次用

麝香

細研

蘆薈

細研

朱砂

細研各  
一分

上件



一處拌勻以棗肉和如黍米大每服五粒至七粒米  
飲下量兒大小加減

靈砂丹 因嗽成疳最宜服之

人參半兩甜葶藶研五靈脂 胡黃連各一分已上搗羅為

細末辰砂半兩麝香細研蘆薈細研杏仁麩炒去皮  
次用

右件一處拌勻以粳米飯和如黍米大每服十粒煎  
人參湯下量兒大小加減

五靈脂丹 久嗽恐成疳常服尤佳

五靈脂

半兩

蟾頭

一枚塗黃

酥

蟬殼

微炒

款冬花

各半兩已上搗

羅為細末次用

青黛

細研

雄黃

細研各一分

已上藥一處拌勻

糯米飯和如黍米大每服十粒煎人參湯下不拘時

候量兒大小加減

萬全方治小兒肺疳不欲乳食時復腹痛胡黃連丸

胡黃連

當歸

焙微炒

訶梨勒皮

木香

各半兩

青橘

皮

湯浸去白穰焙

紫蘇子

杏仁

湯浸去皮尖麩炒微黃各一分

麝香

一錢

入研

已上搗羅為末用粟米飯和丸菴豆大每服

三丸以粥飲下量兒大小加減

張國材肺疳方

真珠

七十粒

辰砂

半錢

人參

甘草

各二錢

麝香

半字

輕粉

五錢

白附子

一個

上藥先將人參甘草剉碎炒熟

白附子炮碾末次研入真珠辰砂麝香輕粉勻畢每

服半錢或一字用金銀薄荷煎湯調服日進一服食

後只三服其肺疳立愈

莊氏第三候鼻下赤爛愛揉眼魚血痢是肺疳乃因喫

着乘熱物或病妳所損心肺加之咳嗽更以服涼冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭 龍腦

朱砂

各一分

鈞藤

玄參

各一兩

胡黃連

炮半兩

麝香

一錢

右為末煉蜜丸如黃米大米飲下三丸至五丸

治小兒頭項細心腹脹滿皮膚乾皺毛髮焦黃鼻下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸羸瘦 大蟾

一個去四足劈開腹

去肚腸入胡黃連一兩和在內線縫合以濕紙三重裏用泥固濟四面令乾微火出陰氣更用炭三斤燒令通赤即焦候冷

淨去泥土細研如粉

麝香

熊膽

蘆薈

各半兩

右一處細研如泥麩糊丸如麻子大米飲下三丸  
汁亦得三歲以上加丸

理小兒五疳八痢腹脹羸瘦頭髮焦乾口鼻生瘡 黃

連 白蕪荑

與黃連  
同炒焦

夜明砂

用水淘五次  
焙各一兩

研為

末續猪膽汁和丸如菜豆大三丸至五丸不計時候  
麥門冬熟水下如久患疳氣服藥無效或腹脹氣促

不能飲食米飲下取出疳蟲即瘥

莊氏第八  
候用此方

腎疳楊氏云由乳哺不調臟腑伏熱所致也凡甘味入

於脾而動蟲蟲動則侵食臟腑遂使孩提心下擾悶若  
上蝕齒斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛  
爛濕癢生瘡療治不蚤精髓消耗難以有瘰蟲者蠹也  
目為濕蠹多因疳傷久痢腸胃受濕得之狀如狐惑傷  
寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎腎主虛纔受熱  
邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息  
次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血迸出名  
曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活

齒不復生外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚  
痛口臭乾渴齒斷生瘡爪黑面黧身多瘡疥是也 錢  
氏地黃丸主之 仍當於生脈散中多加黃耆以補肺

曾氏用調元散

調元散 主稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大  
如腫致語遲行遲手足如分同神色昏慢齒生遲服  
之效

乾山藥

去黑皮  
五錢

人參

去  
蘆

白茯苓

去  
皮

茯神

去  
根

白朮

白芍藥

熟地黄

酒洗

當歸

酒洗

黃耆

蜜水炙

各二錢半

川芎

甘草

炙各三錢

石膏

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時  
溫服如嬰孩幼嫩與乳母同服

九味地黃丸

治腎疝

熟地黄

四錢五分

赤茯苓

山茱

萸肉

川棟子

當歸

川芎

牡丹皮

山藥

史君子肉

各二錢

右為末蜜丸桐子大每服八十九丸空心溫酒下



張渙熊膽散 治急疔蟲傷臟腑上蝕口齒生瘡赤爛

世呼為走馬疔 葭宍子炒令微黑 蝦蟆灰 白礬各半兩

生硫黃一分已上搗羅為細末次用 熊膽半兩 麝香 雄黃

蘆薈各一分並細研

右件藥一處拌勻為細末每服一字煎荊芥湯調下  
如有瘡處宜薄傅之如鼻癢即取少許逐日吹鼻中  
日三兩上

熊膽膏 截急疔病

真熊膽

半兩研

蚶蛇膽

為末

蘆薈

研

牛黃

研一分

龍腦

麝香

各一錢並研細

右件藥都細研以井華水一小盞攪和勻以磁器盛重湯慢火熬成膏每服一豆大薄荷湯化下魚塗患處

立聖膏

治急疔侵蝕

人乳汁

半合

黃礬

一大

栗

白礬

一大

棗

石膽

一大

豆

右件藥都研細以綿裹內乳汁中浸經一宿看汁有

味慢火熬成膏每用少許塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處先以三稜鍼刺破除去血然後即塗此藥

二金散

治急疔毒盛

砒霜

一分

麝香

半兩

右件藥先將砒霜去紙上炒過後入麝香同研令細每用一字以鷄羽掠在瘡上日使三兩度隨時展去藥無令噉津

治小兒腎疔并疔氣偏墜寒熱方

沒藥

炮

甘草

各二分

硫黃

木香

炮

胡黃連

各一分

右為末用蒸棗肉丸如麻子大茯苓湯下二丸可兩

服

莊氏第七  
候用此方

通治五疳方五疳保童丸

治小兒乳食不擇冷熱好

食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳 青黛 苦棟根

皮 夜明砂

五倍子

蘆薈

黃連

龍膽草

白蕪荑

乾蟾

各一分

麝香

少許 蟬蛻

去嘴爪  
一分

猪膽

大者

五個拌  
諸藥焙

已上粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒

三丸不拘時米飲下日三服忌猪肉

大蘆薈丸 治疔殺蟲和胃止瀉

胡黃連 黃連 白蘆薈去扇 蘆薈 木香 青皮

白雷丸

破開紅者不用 鶴蟲微炒各半兩

麝香二錢另研

研為末

粟米飯丸 菜豆大每服二十九丸米飲下愚按前方肝

脾疔積食積發熱目生雲翳或疔熱頸項結核或耳

内生瘡肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹膨脹或

牙齦蝕落頰顙腐爛或陰囊玉莖生瘡或脇胸小腹

作痛並効內青皮以龍膽草代之麝香不用尤効

蘆薈丸

曾氏

主五疳八痢蛇蟲臟腑虛弱身體瘦悴頭髮

焦疎腹青筋小便白濁渴水無度洞泄不時穀食難  
化遍身瘡疥神色乾燥此藥大能養胃壯氣止痢除

蟲長肌

南木香

丁香

各二錢半

訶子

去核取肉

肉豆蔻

各半

兩史君子肉

蘆薈

各四錢

棗子肉

壹兩薄切用瓦

盛慢火焙乾

右除史君子肉薄切於乳鉢肉極細杵仍將前南木  
香等四味濕麪裏煨至香熟取出地上候冷去麪剉

焙同棗肉蘆薈為細末再入乳鉢同史君子肉杵勻  
煉蜜丸作麻仁大每服三十九至五十五丸溫米湯  
送須是空心服之兒小米湯化服

萬應丸 治諸疔證胃口有熱飲食不進頭髮作穗面  
色痿黃

五倍子

去內  
蟲屑

胡黃連

青皮

去  
白

陳皮

去  
白

黃蘗

神

麩

麥芽

淨洗  
焙乾

三稜

炮  
對

莪朮

炮  
對

燕蕒

檳榔

龍

膽草

川棟子肉

史君子

各一  
兩

一

上除檳榔不

過火麥芽二味外餘十二味剉碎炒令微焦色候冷  
同前檳榔麥芽研為細末水煮麩糊丸麻仁大每服  
三十丸至五十丸或七十丸溫米清湯無時送下或  
空心兒小者丸粟穀大粒數下法同前

博濟方至聖青金丹 治小兒一十五種風疾五般疳

氣變蒸寒熱便痢棗花糞脚細肚脹肚上青筋頭髮  
稀疎多喫泥土擗眉毛咬指甲四肢羸瘦疳虵咬心  
瀉痢頻併饒驚多噉疳蝕口鼻赤白瘡疳眼雀目悉



皆能治

青黛

上好者二分  
研良方三分

雄黃

二分研細  
良方二兩龍腦少許研  
局方一

字

朱砂

一分研良  
方一錢

膩粉

一分良  
方一錢

胡黃連

二分良  
方二兩熊

膽

一分用溫水化  
入藥良方一錢

白附子

二枚良方一錢  
局方二錢蘆薈一分  
研良

方一錢

麝香

半分  
研

蟾酥

一皂子大  
局方一字

鉛霜

少許良方  
同局方一字

水銀

一皂子大局方一錢  
同膩粉研不見星

已上一十三味細研

杵羅為末後再都入乳鉢內細研令勻用豬膽一  
枚取汁熬過浸蒸餅少許為丸如黃米大曝乾於瓷

器內收密封或要旋取每服二丸各依湯使如小兒  
患驚風天吊戴上眼睛手足搐搦狀候多端但取藥  
一丸用溫水化破滴入鼻中令嚏噴三五遍後眼睛  
自然放下搐搦亦定更用薄荷湯下二丸小兒久患  
五疳四肢瘦小肚高擗眉喫土咬指甲髮稀疎肚上  
青筋粥飲下二丸小兒變蒸寒熱薄荷湯下二丸化  
破服小兒久患瀉痢米飲下二丸小兒久患疳虺咬  
心苦棟子煎湯下二丸小兒患鼻下赤爛口齒疳蟲

并口瘡等用兒孩子妳汁研二丸塗在患處小兒患  
疳眼雀目用白羊子腹一枚以竹刀批開內藥二丸  
在肝內以麻縷纏定用淘米泔水內煮令熟空腹喫  
仍令乳母常忌毒魚大蒜鷄鴨猪肉等此藥若小兒  
常隔兩三日喫一服永無百病不染橫天之疾凡有  
患俱與服必有功效

靈苑紅丸子 治五疳肥孩兒

郁李仁

一百粒用溫水浸去皮尖

坯子臙脂

一分麝香半錢別研

右先研郁李仁細爛次入臘脂麝香同研用粳米生  
瘡出血肛門不收毛髮焦黃但是疔疾神效

乾蝦蟇

五箇  
燒灰

胡黃連

宣連

鶴蝮

肉豆蔻

苦揀根白皮

雷丸

蘆薈

蕪荑

雄黃

一分  
飛過

右為末麵糊為丸菴豆大雄黃為衣每服十五丸飯

飲下

張氏香蟾丸 治五疔殺蟲消肚膨止痛住瀉痢生肌

膚

乾蝦蟇

酥炙  
黃色

大黃連

洗去  
鬚

蕪荑仁

蘆薈

右件等分為末猪膽麵糊為丸如桐子大每用四十粒用飯飲吞下不拘時一日二服至三服忌生冷宿

食毒物

莊氏五疔丸

熊膽

蕪荑

去皮各  
一錢

麝香

一字

胡黃連

別杵為  
末一分

大乾

蟾

用上截去膊剉碎入在餅內鹽泥固濟以炭火燒通赤取出停一夜取藥研為細末秤一分

右件先將蕪荑研極細次入麝香次入胡黃連蟾研

末令勻傾出却研熊膽以沸湯鎔化再入前四藥飯  
為丸如麻子大每服三丸至五丸一日三服用薄荷  
湯下量兒大小臨時加減丸數

譚氏蝦蟇丸

治五疳羸瘦毛髮稀疏揉鼻咬甲好食

泥土腹大頸細痢如泔淀乳食不消小便白濁

綠礬

半斤  
為末  
棗一升半  
去核

先用米醋五升并礬煮棗

熟後入黃連肆兩訶子去核二兩使君子二兩夜明  
砂二兩乾蝦蟇四個燒灰存性同搗碎入前藥內攪

勻直到乾焦為度再杵羅為末棗肉丸如黍米大三  
四歲每服三十丸米飲下乳食前

張渙夜明丹 治五疳腹脹目澀多睡

夜明砂

一兩  
微炒

胡黃連

草龍膽

苦棟根

各半  
兩乾

蝦蟇

五個燒存性並  
為細末後用

蘆薈

青黛

麝香

各細  
一分研

右件一處拌勻粳米飯和丸如黍米大每服十粒米  
飲下不拘時候量兒大小加減

劉氏金蟬丸 治小兒五疳羸瘦合面卧地筋青腦熱

吐瀉無度，渾身壯熱，口舌生瘡，痢下膿血，心腹脹滿，喘促氣急，乳食全少，多啼嘔逆，飲食不化，或時增寒，多涕，效嗽鼻下赤爛，十指皆癢，蝕於唇齒，味更研令勻，糊為丸，如菘豆大，每服三四歲十九丸，四五歲十五丸，米飲下食前服。

王氏保童丸 治五疳，消化宿滯，進食長肌，肥孩兒。

胡黃連 草龍膽 末炒紫色 各半兩 史君子 木香 蘆

薈

細研各一錢

大麥蘖

半兩 巴豆三七個 去皮 心同麥蘖炒令蘖紫色 去巴豆 不用以



藥為末

川苦棟

一分炒  
紫色

右為細末同研令細用醋糊為丸如菘豆大每服十粒至十五粒米飲下不計時候此藥大治小兒疳腹脹

吳氏黃耆飲子

治小兒五疳或傷脾腹脹髮黃時時

壯熱頭上虛汗日漸黃瘦或泄瀉

綿黃耆一人參

陳皮

微炒不  
去白

白茯苓

白檳榔

極大者

甘草

炙各  
半兩

肉

豆蔻

一箇  
小者

剉為麤末每服三錢水一大盞慢火

煎至七分濾去滓時時與服溫喫

趙氏家傳治小兒五疳退黃榮肌膚解積熱壓驚消飲

進食

史君子

二十個

胡黃連

兩半

五靈脂

蟾頭

灸令焦麝各一分

香

半錢研

蘆薈

熊膽

各研二錢

研為末燒粟米飯為

丸菴豆大每服二十九米飲下

治小兒五疳面色黃瘦身體壯熱喫乳食不能消化眼

目澀痛及胸膈痰涎愛食酸鹹常多瀉痢

胡黃連

母丁香

黃連

微炒  
去毛

蘆薈

熊膽

研各  
半兩

麝香

一分  
細研

蟾頭

一枚  
塗酥  
炙焦黃

右為末用牛膽和丸菘豆大如患心藏疔煎蕪蕘甘

草湯下三丸食疔瀉血或赤白痢新汲水下三丸吐

逆不止及水瀉生薑湯下眼疔羊子肝血與酒和看

多少微煎下三丸

莊氏第四  
候用此方

脂連丸

治五疔潮熱腹脹髮焦

胡黃連

半兩

五靈脂

一兩

研為末豬膽汁丸麻子

大米飲下

冷熱疔疔之新者為熱疔面黃臉赤骨熱盜汗鼻乾口  
臭唇焦煩渴心躁驚悸情意不樂若疔之久者為冷疔  
目腫腹脹便利不定瀉糞肥膩或似油珠煩渴黃瘦熱  
疔病多在外冷疔病多在內又有冷熱二證交互非新  
非久不內外因者

治冷疔木香丸

木香

青黛

另研

檳榔

肉豆蔻

去皮各一

分  
麝香

另研一錢半

續隨子

一兩炒  
蝦蟆

三個先用晒乾燒存性

繩繫

右末蜜丸如菉豆大每服三五丸至一二十丸薄荷湯下食前 湯氏云小兒冷疳多渴好卧冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸瘦其候難明有若熱症但大便滑泄百藥不效是也因女子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈自後凡有此證無不獲驗

治熱疳胡黃連丸

胡黃連

黃連

各半兩

硃砂

一分

右上二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡

漿於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆蒼麝香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九米飲下食後一方加蝦蟇半兩不燒

治冷熱疖如聖丸

方見疖瀉

無辜疖巢氏兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂至死者謂之無辜言天上有鳥名無辜晝伏夜遊洗濯小兒衣席露之經宿此鳥即飛從上過而取此衣與小兒著并席與小兒卧便令兒生此病 聖惠小

兒無辜腦後有核如彈丸捏之反下轉是也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去當損其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長大大則筋結定定即蟲隨血氣流散所有停留子母相生侵食臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮立手足細弱從茲夭折也夫小兒無辜疳痢者大腹泄痢膿血毛髮皮膚枯槁肌體日漸瘦羸腸胃既虛痢無時節故名無辜疳痢也漢東王先生云小兒無辜

疾者古云天上有一鳥名無辜因晒小兒衣服失取過  
夜遇此鳥過尿之令兒啼叫諸病所生日漸黃瘦者非  
也此蓋是八邪所傷得之其八邪者饑飽勞役風驚暑  
積謂之八邪久則令人日漸黃瘦喫食不長肌肉夜間  
多哭身上或發微微壯熱多渴喫食不知饑飽或生瘡  
癬是也 朱氏八片錦歌孩子無辜氣多因母作為若  
人能慎護安得見疳羸驚薄成風疾暄寒作氣痿須交  
除病乳莫更著重衣喫食無令早能言不怕避論中八



不許胸起力頻微頭皮光哲哲毛髮薄離離肝壅浸雙  
眼脾黃入四肢渾身生癩疹遍體是瘡痍瀉痢無休歇  
增寒少定時綉毬全不顧竹馬豈能騎白暈眸中現清  
涎口畔垂鬪牙須咬甲舉手要擣眉夜夜餐瓜果朝朝  
食土泥胃傷腸肚脹肺盛喘何疑飲食無休歇眈眠似  
醉迷

肥兒丸 治小兒腦後項邊有物如彈子按之轉動軟  
而不痛名無辜疔久服神效

胡黃連

神麩

炒

麥蘖

各五錢

檳榔

三錢

木香

二錢

肉豆

菴

麩裏煨

史君子肉

各二錢半

研為細末蒸餅丸如黍

米大用米飲食遠服

聖惠鼈甲散

治小兒無辜疔項細肚大毛髮乾立作

穗

鼈甲

三分塗醋炙黃去裙襴

檳榔

三類

沉香

漏蘆

牛蒡

子

微炒

史君子

赤芍藥

訶梨勒皮

甘草

炙微赤對

各半兩

已上搗羅為散每服一錢以水一小盞煎

至五分去渣不計時候量兒大小分減溫服

張煥蝟虎丹 截疔去毒

乾蝟虎

雄者微炙一枚

蝟牛殼

蘭香根

澱花

各一分已上搗

羅為細末次入

雄黃

水磨者細研

麝香

細研各一分

龍腦

半分細研

右通拌勻煎米醋打白麵糊和如黍米大每服十粒煎脂麻湯下乳食後

香甲湯 截疔辟邪

漏蘆

一兩 沈香

剉

牛蒡子

微炒

訶梨勒皮

微炮

安息香

鼈甲

塗酥炙黃去裙襖

乳香

研各半兩

右搗羅為細末同乳香拌勻每服一錢水八分入人參少許煎四分去滓放溫服量兒大小加減

張渙無辜疳痢玉粉散 定痢截疳 胡粉一兩 白龍骨

水磨雄黃

各研微炒

楮木根白皮

漏蘆

白馬夜眠

洗淨焙乾各半兩

已上搗羅為細末都拌勻每服一字

至半錢以雞卵清調下乳食前

二肝丹 治無辜疳痢不止

地膽草

菖蒲

一寸九節者

漏蘆

各一兩

胡黃連

地榆

各半兩已上搗薄切雞肝猪肝同入鹽少許用諸藥煮肝熟各一兩

右件同於石臼中搗一二百下成膏和丸如黍米大

每服十粒麝香湯下食前量兒大小加減

梅肉散 治無辜疔渴利不止眼出障翳身體浮腫

烏梅肉乾炒 乾綿黃耆 乾葛各一兩 川黃連 蘇蘇根

乾薑炮 甘草炙各半兩 已上搗羅為細末每服一錢

水一盞煎至六分去滓放溫時時與服

藍葉湯 治無辜疔血痢不斷 藍葉一地龍 人參

去蘆頭

烏梅肉

冬瓜仁

黃連

赤茯苓

蝸牛

殼

微炒各半兩

已上搗羅為細末每服一錢水一小

蓋煎至六分去滓溫服乳食前

天靈丹

治無辜疔痢久不差

天靈蓋

一個乾蟾一兩燒反

胡黃連

菘蓂子

水淘去浮者炒令黑

色各半兩

砒霜

一分同天靈蓋濕紙三五重裹膠泥固濟於大炭火上燒冷通赤取出候冷已

上都搗細為細末次入

麝香

一分

右件都拌勻軟飯和丸如黍米大每服五粒乳汁下

量兒大小加減服之

溫藏湯 治小兒無辜疳痢久不止手足逆冷

肉豆蔻

去壳

乾薑

炮各一兩

龍骨

當歸

厚朴

去粗皮塗生薑

汁炙令香熟各半兩

附子

一枚重半兩炮去皮臍

茅香

半分對

已上搗

羅為細末每服一錢水八分一盞入生薑三片煎至五分去滓溫服乳食前

朴附丹 治無辜疳痢赤白相雜

厚朴

塗生薑汁炙令香熟

梨勒皮

麩裏炮各一兩

附子

一枚炮去皮臍

龍骨

烏梅肉

赤

石脂

各半  
兩

右件搗羅為細末鍊蜜和丸如黍米大每服十粒米

飲下乳食前

人中白散 治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化肚腹脹痛

人中白

一分

麝香

半

蝦蟇

塗酥  
炙焦

蘆薈

各半  
兩

右件藥細研為散每日空心及晚後用熟水調下半錢服後當下惡物量兒大小加減服之



硃砂丸 治小兒一切無辜疳黃瘦腹痛或痢有蟲冷

之與熱悉主之

硃砂

一分細研一方用三分

菖蒲

漏蘆

各一

兩雄黃

一分細研一方用三分

乾蟾

一枚酥炙令黃

麝香

一兩細研一方用一

分萬全方亦用一分

右件藥搗羅為細末都研令勻用粟米飯和丸如麻子大每服以粥飲化下二丸空心午後各一服隨兒大小以意加減

决明子丸 治小兒冷熱無辜疳或時驚熱或時夜啼

大便青黃白汁頭熱身熱頭髮作穗四肢黃瘦不多食  
物

用馬蹄決明子二兩搗羅為末鍊密和丸如麻子大  
每於食後以熟水下二丸更量兒大小加減服之

漏蘆散 治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調用  
漏蘆一兩搗細羅為散每以猪肝一兩散子一錢鹽  
少許斟酌以水煎熟空心頓服粥飲下

漏蘆丸 治小兒無辜疳痢羸弱不欲飲食及腹內蟲

動作多吐清水

漏蘆

二兩 豬肝 乾

楮株根白皮

一兩 對各

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵丸如彈子大  
每服以溫水研一丸不計時候量兒大小分減服之  
聖惠又方用地膽子一兩搗細羅為末每服一錢以猪  
肝一兩入鹽少許煮熟無時量兒大小分減食之

治小兒無辜疳痢不止方

右用沒石子二枚炒令赤黑色搗細羅為散以麩半  
匙和作餅子焙熟却研為末不計時候以粥飲調下

半錢量兒大小加減服之

外臺備急治小兒無辜疳痢方

當歸 龍骨 黃連 人參 沒石子 甘草

各

一兩

右六味搗散蜜丸服三丸日再以差為度大小增減量之

外臺救急療小兒瘦頭乾無辜魚痢方

右用馬齒莧搗絞汁服三合以差止

子母秘錄治小兒無辜痢赤白魚成疳方

右用胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

傳驗治一歲至兩歲小兒無辜病方

右用夜明砂熬搗為散任意拌飯并喫食與喫三歲

號乾無辜

證治準繩卷九十二