

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十三

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣姚培敦

欽定四庫全書

證治準繩卷九十三

明 王肯堂 撰

幼科

脾臟門

五疳

五疳出蟲方聖惠五疳久而不瘥則腹內有蟲肌體黃瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退其蟲狀如絲髮

或如馬尾多出於腹背及頭頂上若蟲色黃白及赤者可治青色者不可療也

顛顛經朱砂丸 治孩子疳痢辨蟲顏色定吉凶

朱砂

半石連大

阿魏

如朱砂大

蝙蝠血

三兩滴

眉酥

少許

先細

和少許口脂調用桃柳枝煎湯浴兒後看兒大小以菘豆大填兒臍中後用紙可臍中貼之用青衣蓋兒看蟲出來黃色輕青黑色重

聖惠乾蟾丸 治小兒五疳及驚風出蟲定生死

乾蟾

一枚五月蛇蛻皮一條穀精草二兩花前藥同五日者良火煨入罐子內以鹽

泥固濟晒乾燒令通赤放冷研細

胡黃連

瓜蒂

母丁香

三味同為

末

牛黃

龍腦

朱砂

雄黃

蘆薈

天竹黃

麝香

各一分

青黛

半兩

右件藥都入乳鉢內研令極細用獾猪膽汁煎麩糊和丸如菉豆大一二歲兒以溫米泔半合化下五丸服藥後以桃柳湯浴兒着青衣蓋疔蟲當出衣上及眉毛鬚邊如細麩片子或如糝面塵毒黑色者難治

黃白色易治仍宜粥飲下二九日三服甚者半月內
差

麝香丸 治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻多瘡有蟲

麝香 蘆薈 粉霜 朱砂 各一分
蟾酥 豆許 皂莢

三寸 燒灰 蛇蛻皮 五寸 燒灰 蝙蝠 三個 取血 拌入藥末

右件藥都細研以油鎔蠟和丸如小豆大先以桃柳
湯洗兒後用藥一九塗於臍中上以醋麩封之良久
即蟲出黃白赤者易治黑者難療

蘆薈丸

治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣麤頻揉鼻眼

宜服此出蟲

蘆薈

牛黃

蟬殼

各一分

膩粉

粉

霜

硫黃

麝香

各一錢

田父

一枚燒烟似絕便住

青黛

半兩

豆

十粒去皮心膜油

蛇蛻皮

一條燒灰

右為極細末令勻以粳米飯丸如菘豆大每服以溫

水下二丸良久煎桃柳水浴兒後以青衣蓋遍身當

有蟲出白黃色者可治青黑者難治

出蟲丸 治小兒五疳久不差羸瘦極甚

朱砂 麝香 牛黃 蝸牛子炒 夜明砂炒 熊膽

各一分 蟾酥半錢 上件藥都細研以麩糊和丸如菜

豆大每服以溫水下三丸更別以水研一丸滴向鼻中得嚏五七聲良久當有蟲隨汗出立效

乾蟾丸 治小兒五疳出蟲

乾蟾一枚 燒灰 天靈蓋兩 麝香半 蟬殼去足 鼈甲酥

黃焦去裙 已上藥為細末每用燒飯和丸如菜

豆大二歲已下以蛤粉湯下一丸三歲以上至五歲

二丸服藥後續以桃柳湯浴兒後用青衣蓋之當有
蟲子出赤白者輕黑者重

熊膽丸 治小兒五疳出蟲

熊膽 朱砂 麝香 蚺蛇膽 蠅娘 炒 瓜蒂

各半

兩

右件藥為極細末入研了藥令勻用豬膽汁和丸
如菘豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸以青
衣蓋當有蟲出也

定命散 治五疳有蟲

乾蝦蟇

一枚
燒灰

蛇蛻皮

炒

蟬蛻

各一分

右件為極細末入麝香末半錢研勻但是一切疳至午時後以煖水調下半錢一三歲即服一字後煎桃柳湯放溫浴兒了便用青衣蓋當有蟲出即效

青黛丸

治五疳體熱乾瘦髮立鼻癢有蟲不欲飲乳

青黛

蘆薈

人中白

各半兩

豬牙皂角

蟬殼

各半

兩麝香

一分

胡黃連

二分

蟾涎

人乳汁

各少許

右件為末五月五日午時修合以粽子肉棗肉及蟾
涎乳汁丸如黍米大以桃柳湯浴兒後以米飲下三
丸後着青衣裏兒看身上有蟲出青黑者不堪白黃
赤者易差

錢乙胡黃連麝香丸 治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連

白蕪荑

各一兩半

麝香

錢一

黃連

木香

各半兩

辰砂

一分

右末麪糊丸如棗豆大米飲下五七丸至三五歲可

十五丸無時

錢乙榆仁丸 治疔熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁

黃連

各一兩

右為末用豬膽七枚破取汁與藥同和入碗內甑上蒸九日每日一次候日數足入研麝香半錢湯浸蒸餅和丸菘豆大每服五七丸至一二十九丸米飲下

蛔疳小兒食乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹青筋唇口紫

黑搖頭齒癢是也 玉訣歌惡哭痰青蛔齧心涎生積

冷痛難任每餐甜物并時果致得蟲生病轉深 先用

史君子散蘆薈丸取蛔後溫脾胃

史君子散 治小兒疳蛔

史君子

十箇瓦上炒為末

甘草

膽汁浸一夕

白蕪荑

各一分

苦楝

子

五個炮去核

研為末每服一錢水煎服

蘆薈丸

治小兒疳蛔

蘆薈

安息香

胡黃連

枳殼

麩炒各一錢

史君子

三七 蕪荑 一分 定粉 一錢 麝香 少許

右末豬膽糊丸如菉豆大五七丸米飲吞下

張渙三根散 治蛔疝蟲動啼叫不止每至月初間尤

甚狀如神祟

貫衆根 棠梨根 醋石榴根 各一兩 栗刺 故綿

乾漆 各半兩

右件藥六味並燒灰存性搗羅為細末每服一錢用水八分煎四分去滓放溫服不拘時候

除毒丹 此方治蛔疳不差傳染兄弟姊妹

鬼臼

一兩
去毛

苦參

剉

青箱子

草龍膽

各半
兩

硫黃

緋絹

乾蝦蟇

白礬

各一
分

右件藥並燒灰存性搗羅為細末煉蜜和如麻子大
每服十粒磨沉香湯下量兒大小加減

豬肚丹 治小兒疳瘦盜汗多倦少力大便有蟲曾經

大効

川黃連

揀
淨

胡黃連

木香

各一
兩

菴活

蘆薈

肉

豆蔻 鼈甲

酥炙去
裙襴

白蕪荑

各半
兩

右件搗羅為細末用豬肚一個洗刮令淨先以好香白芷貳兩內肚中蒸極熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出同豬肚搗二三百下成膏丸如黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減穀精丹 治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至天

傷

穀精草

三兩入餅子內鹽泥固濟
用慢火煨通赤為度取出

乾蟾

三枚五月
五日取者

用酥
炙黃

皂莢

三十
燒灰

胡黃連

瓜蒂

母丁香

各半
兩
已上
搗

羅為
末火
入

粉霜

蘆薈

麝香

各一
分
並
細
研

右件都拌勻用猪膽汁和如黍米大每服十粒米泔

放溫下量兒大小加減

桃柳湯 服諸藥後用此法助之

桃枝

二
兩

柳枝

二
兩

右件並剉碎以水兩大碗煎數沸通手浴兒甚佳浴
兒畢用一青衣服蓋之疳蟲自出為驗

小兒合地面無顏色啼聲乍高狀似心痛往往口乾發
動有時醫人不識妄呼見祟不知小兒曾喫生肉肉
化為蟲此方大效苦楝丸

苦楝根

鶴蝨

朱砂

各一兩

檳榔

三個

麝香

一錢

右末麩糊丸如小豆大每服三丸白湯下日三服忌
毒物

下蟲丸

治疳蛔諸蟲

新白苦楝根皮

酒浸焙

綠包貫衆

木香

桃仁

浸去

焙皮 蕪荑 焙

鷄心檳榔 各二錢

鶴蝨 炒一錢

輕粉 五分 乾

蝦蟇

炙焦 三錢

史君子

五十取 肉垵

右為末麩糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉汁

下內加當歸川連各二錢五分

脊疔蟲食脊膂身熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頰齧爪甲是也

聖惠金蟾散 治小兒脊疔頭大項細四肢黃瘦肚大

胸高毛髮乾立

蟾

一枚大者塗酥灸令焦黃

夜明砂

微炒

桃白皮

樗根白皮

地榆

黃檗

各剉

訶梨勒

皮煨用

百合

白蕪荑

微炒

人參

去蘆頭

川大黃

剉碎微炒

黃連

去鬚各三分

胡粉

三錢

丁香

三七粒 檳榔

一分

右件藥搗細羅為散每服用粥飲調下半錢日三服

地骨皮丸

治小兒脊疔漸黃瘦以手指擊之背如

鼓響脊骨高是也此因妳熱所致

地骨皮

紫參

黃耆

剉

川大黃

剉碎微炒

郁李仁

湯浸

去皮尖微
炒各半兩

龍膽去蘆頭

子芩

枳殼麩炒微黃去瓢

木香

豬苓

去黑皮

海蛤

細研各一分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如棗豆大每服以溫水
研下五丸日三服量兒大小加減服之常得微利為

効

殺疳丸 治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲

沒石子

瓜蒂

鶴蝨

並細研各半兩

蟾頭

炙令焦黃

蘆薈

青黛

並細研各半兩

麝香

細研

膩粉

研入各一分

右件藥搗羅為末以糯米飯和丸如黍米大每服以
粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減

蘆薈丸 治小兒脊疔腹內有蟲上攻背脊脊骨漸高

肌體羸瘦

蘆薈 青黛 朱砂 麝香各細研 熊膽入研 胡黃連

去鬚貫衆 地龍微炒 黃連去鬚 蟬殼微炒 雷丸各半兩 蝦

麻一枚塗酥炙令焦黃

右件藥搗羅為末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服

以粥飲下五丸日三服量小兒大小增減服之

青黛丸

治小兒脊疔四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎

時時煩渴脊骨如鋸

青黛

朱硃

各細研

夜明砂

微炒

定粉

各一分

蟾酥

入研

熊

膽

細研

羶羊角

屑

犀角

屑

各半分

黃連

半兩

麝香

一錢

細研

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如菜豆大每一歲以

粥飲下二丸

第五脊疔十指爪甲癢痛頭髮焦乾肚腹虛明脊骨如

鋸時時下利狀如青淀或膿或血硃砂丸

天靈蓋

灸一個

柴胡

白朮

麝香

各一錢

檳榔

一個

右件棗肉為丸如麻子大每服三丸米飲棗湯下

朱氏治小兒脊疔瀉血不止方

定粉

好醋

頭髮

少許
剪碎

右件為團搏襯火煨通赤細研米飲下半錢

莊氏治小兒久下血不止謂之厯脊疔方

用穿山甲米醋浸炙為末每服一錢米飲調下食空

服

腦疴胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅
瘡腦熱如火髮結如穗徧身多汗顛腫顛高是也仙人
水鑑小兒三歲已下多睡卧合面在地者便是腦中疴
氣宜服此方

黃葵花

菊花

釜下墨

硝石

栢葉

各等分

右為散吹入鼻中永不合面卧地也吹鼻中有惡物
似泥泄數條即便是腦中疴氣此是殺人之本

小兒腦疳乳母宜服此方

栢葉 松葉 黃葵花 鼓子花 鼈甲 虎骨

檳榔 大黃

各二兩

右並生為末與醋三升煎膏丸如菘豆大每日空心飲下三丸効

藥性論治小兒腦疳方

右研蘆薈不以多少為細末每用少許吹鼻中殺腦疳鼻中癢

聖惠牛黃丸 治小兒腦疳身熱髮枯

牛黃

蘆薈

各細研

熊膽

入研

胡黃連

木香

犀角

屑各一分

龍腦

麝香

各細研

蟾酥

入各半分

青黛

細研

半兩

右件藥搗羅為末都研令勻以麩糊和丸如黃米大
每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加減

龍腦丸 治小兒腦疳羸瘦煩熱

龍腦

麝香

雄黃

各一分

胡黃連

末

牛黃

朱砂

熊膽

蘆薈

乾蝦蟆

灰各一分

右件藥都研令如粉以水化熊膽和丸如麻子大如硬更入糯米飯同丸每服用薄荷溫湯下三服日三服量兒大小以意加減

吹鼻龍腦散 治小兒腦疔鼻塞頭痛眼目昏眩羞明

怕日

龍腦

麝香

各細研少許

蝸牛殼

炒令黃

蝦蟇

灰瓜蒂

黃連

去鬚細辛

各一分

右件藥搗羅細為散入瓷合內貯之每取少許吹於

鼻中每日兩上用之

治小兒合面卧地多睡或氣急面黃哭聲高叫或心痛
口乾蓋是因曾喫生肉如此腹內有蟲方

鶴蟲

二分

茯苓

一兩煨

木香

一分

苦棟根

三兩

檜株根

半兩

右先將二味根用水一斗煎成膏然後將三味為末
搜和成丸黍粒大每服三五丸米飲下

莊氏第十三
候用此方

第七腦疔鼻下赤爛身心煩躁鼻内生瘡頭髮自落日
夜痛無休歇狀似鬼形安息丸

安息香 丁香 胡黃連 麝香 雄黃各一錢 肉

豆蔻 金銀箔各五片

右末煉蜜丸如麻子大每服三丸米湯下

龍膽丸 治腦疔腦熱瘡

龍膽草 升麻 苦楝根皮焙 赤茯苓 防風

蘆薈 油髮灰各二錢 青黛乾 黃連淨各三錢

右為末紈豬膽汁浸糕糊丸麻子大薄荷湯下仍以

蘆薈末入鼻

乾疳身體壯熱或時增寒舌澀口乾睡多盜汗皮膚枯
燥髮立毛焦乳食雖多肌肉消瘦四肢無力好睡昏昏
日往月來轉加疔瘁是其候也 瘦瘁少血舌乾多啼
其病在心目不轉睛雖啼無淚其病在肝身熱尿乾手
足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭癥
眠胸腕乾渴其病在脾

仙人水鑑獨治乾疳方

天靈蓋

生鼈甲

波斯青黛

黃鹽

已上各一分陶隱居

云北海黃鹽草粒瓮
以作魚鮮及鹹菹

右並同研令細日服一字空心熟水下若是濕疔不
治乾疔治之不過三服神效

聖惠天竺黃散 治小兒乾疔心臟煩熱眼目赤澀皮

膚乾燥夜多盜汗羸瘦不能乳食

天竺黃兩半 牛黃 雄黃 朱砂 蘆薈 麝香各細

研 蟾頭灸令焦黃 胡黃連 犀角屑 木香 甘草灸微赤剉

鈎藤各一分 龍腦一分 錢研細

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以溫水調半錢
日三服量兒大小以意加減

治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安方

牛黃 雄黃 蘆薈 青黛各細研 丁香 黃連去鬚

熊膽研入 蛇蛻皮灰 天竺黃 天漿子微炒 犀角屑各一分

胡黃連半錢 蟾酥半錢 麝香一錢

右件藥搗羅為末更研令勻以煉蜜和丸如菽豆大
每服以粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

青黛丸 治小兒乾疔肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒熱

昏昏多睡

青黛

三分
細研

牛黃

蘆薈

朱砂

麝香

雄黃

各
細

研

胡黃連

蛇蛻皮

反

龍膽

去
頭

蟬殼

微炒
一分

蟾

一枚
塗酥
炙焦黃

右件藥搗羅為末都研令勻用麩糊和丸如黍米大
每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時增減

牛黃丸 治小兒乾疔煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦

牛黃

半錢
細研

雄黃

細研

黃連

去鬚

蘆薈

天竺黃

各一

龍

腦

麝香

各一錢
細研

甘草

半分炙
設赤剉

右件藥搗羅為末都研令勻用糯米飯和丸如菉豆

大每一歲以粥飲下一丸

胡黃連丸 治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立腦乾肌

體柴瘦

胡黃連

末半
兩

朱砂

波斯青黛

蘆薈

各三

麝香

一分 蛇蛻皮

一條
燒灰

蟾酥

一大
仁

右件藥都研為末用豬膽一枚取法酒一盞和藥末都於銚子內熬如膏丸如菘豆大五歲至七歲以粥飲下五丸日三服三歲已下三丸

青黛散 治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無效者

青黛 朱砂 蘆薈 地龍 夜明砂 各微炒 乾蝦

麻 反 熊膽 各一分 麝香 二分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥飲調下更

用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為效也

牛黃丸 治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠卧

牛黃

研細

朱砂

飛過

研水

子芩

犀角

屑各

半兩麝香

一分

研細

右件藥搗羅為末都研令勻以糯米飯和丸如麻子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之

按乾疳既是五藏之涸則當以人參白朮散加減八味丸之類補而濡之若專恃已上諸丸藥恐無瘡理

內疳聖惠云小兒乳食不消心腹虛脹眼目澀癢體熱
 皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲食肛腸日月彌
 深痢轉不止故號內疳 錢氏云疳在內則目腫腹脹
 利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜使君子丸

史君子丸 治藏府滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳

食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴 去麤皮薑汁塗炙半兩 史君子 去殼一兩麪裹煨 陳皮 去白一分 甘

草 炙剉半兩 訶子 半兩半生半煨去核 青黛 半兩是魚驚及帶熟渴者宜此方如只藏

府不調不
用青黛

右為細末煉蜜和丸如小鷄頭大每服一丸米飲化
下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元方
無青黛

東垣厚腸丸 治小兒失乳以食飼之不能剋化或生
腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮 半夏 蒼朮 人參 麥蘖 枳殼

麴末 青皮 厚朴

各五分

各二分

各三分

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九丸溫湯送下

忌飽食

張渙金粟丹 治腹大疝瘦好喫泥土泄利不調

乾蟾

五枚酥灸焦黃

川黃連

夏用二兩冬用一兩

母丁香

厚朴

汁

製

草龍膽

各一兩

夜明砂

微炒

蟬蛻

洗

訶子皮

微炮

各半兩已

上搗羅為細末次用

好朱砂

研細水飛

青黛

研各一兩

好麝香

半兩研

右件一處拌勻用煉蜜一半白麩糊一半和如黍米

大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

本事芎朴丸 治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芎藭

厚朴

各一兩

白朮

半兩

右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一丸米飲化下
三歲已下半丸

小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知饑飽累効

神麴

炒

麥芽

炒

三稜

青皮

香附

山查

厚

朴

甘草

藿香

枳實

地黃

砂仁

黃連

棗子

各等分

右為末白湯調下量兒大小加減

聖惠木香丸 治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌膚

羸瘦下痢無常

木香

蟬殼

微炒

去足

麝香

細研

黃連

去鬚

黃丹

微炒

熊膽

入研

夜明砂

微炒

乾蟾

塗酥

灸各一分

赤石脂

半兩

肉豆蔻

去殼

冠

一類

田父

半兩灸
今微黃

右件藥搗羅為末用水浸蒸餅丸如麻子大每服以
溫粥飲下二丸量兒大小以意加減

蘆薈丸 治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻癢皮膚乾燥

下痢不常

蘆薈

雄黃

各細研

沒石子

蟬殼

微炒去足

蛇蛻皮

灰

丁香

熊膽

各細研一分

麝香

細研 蟾酥

各研一分

黃連

兩半

去鬚

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黃米粒大每服以粥飲下三九日三服別研一丸吹入鼻中量兒大小以意加減聖惠又收治疳痢

麝香散 治小兒內疳下痢不止肌體消瘦諸治未差

麝香

蘆薈

各細研

蛇蛻皮

灰

夜明砂

微炒

蝸牛殼

黃連

去鬚微炒

沒石子

各一分

黃丹

定粉

各微炒一兩

訶梨

勒

半兩煨用皮

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥飲調下半錢早辰午後各一服看兒大小加減服之

胡粉丸 治小兒內疳下痢不止昏沉多睡

胡粉

微炒

青黛

細研各半兩

黃連

末一兩微炒

麝香

一錢

右件藥同研令細以豬膽一枚取汁和丸如黃米粒
大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

譚氏殊聖寶命丹 治內疳

皂角

一兩炙令焦黑色
去皮為末三分

巴豆

二七個去心膜細研
新瓦上出油了用之

雄雀兒糞二錢

右細末以粟米飯丸菜豆大空心溫水下三丸

外疳錢氏云疳在外則鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不
着痂漸透耳生瘡今分走馬疳口齒疳鼻疳眼疳臚列

諸方如左

走馬疔走馬疔疔蝕之極也乃五藏蒸熱上攻甚即徧沿作崩沙候牙邊肉腫爛口內氣臭身微有潮熱喫食不得齒縫出鮮血常動搖似欲脫肉爛自漏落治之先以淡淡鹹湯洗口內即下紫金散摻之一二三次搯殺牙邊肉內蟲如大段甚則下秋霜散摻之然後將朱砂膏牛黃膏天竺黃散夾調理

此茅先
生法

或以天竺黃散夾

地黃膏亦好

此惠
眼法

如此調理即安如調理不退先落齒

一兩三個即死不治相次面光發顙漏見骨而殂形
證論先與退脾肺風熱宜喫檳榔散五七服後用此藥
貼斷上以大棗一個砒少許去棗核入砒在內燒灰存
性臨卧時貼斷上數次効 曾凡得此候多因氣虛受
寒及有宿滯留而不去積溫成熟虛熱之氣上蒸或食
甘酸鹹膩之物而脾雖喜甘積滯日久溫熱上蒸於口
致齒焦黑爛間出清血血聚成膿膿臭成蟲侵食口齒
甚致顙頰穿破乳食不便面色光浮氣喘熱作名走馬

疔治之之法先去積食用當歸散合三稜散水薑棗煎服次投蘆薈丸玉露飲及以溫鹽水灌漱或軟鷄翎蘸鹽水拂洗略拭乾仍以燒鹽散內金散蜜陀僧散傳之若經久不愈者傳於唇之上下乃成崩沙證或穴發滿顯齒落骨露飲食減少氣促痰鳴必致危矣

紫金散

茅先生名
黑松散

治小兒走馬疔

黃丹 蛇床子

炒令黑

地龍

炒令黑
各半兩

青礬

一分
煨過

右末每服一字搯牙斷上一日三次搯

秋霜散 治小兒崩砂

好砒

半兩

白礬

四分

右用水三分一盞先煎水令蟹眼沸來便下砒煨水
乾為度即下白礬末同煨乾為末取出入好麝香少
許好坯子少許同拌合為末每使一字用鵝毛點拂
牙斷上一日三四迴拂即愈

惠眼秋霜散 治崩沙齒斷欲落

粉霜

砒霜

白礬

各一錢

右為末用北艾一大團裹定上件藥末以石灰溲艾
上後用椀盛發火燒盡細研以手捻少許揩齒上用
鹽湯漱口燒時以蓋子蓋定恐走了藥氣

乳香丸 治走馬牙疳如神

乳香 輕粉

砒

研各五分

麝香

少許

右先將乳香研細入輕粉麝砒共再研勻用薄紙一
韭葉闊去藥內按過揉紙少許丸如黃米大臨卧將
藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

錢乙龍骨散 治疔口瘡走馬疔

砒霜

蟾酥

各一
字

粉霜

半錢

龍骨

一錢

定粉

半錢

龍腦

半
字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研
每用少許傅之

右方皆犯砒非極不用

仙人水鑑治小兒走馬疔蟲透損骨者方

右用天南星一枚當心剉作竅子安好雄黃一塊在

內用大麥麩煨候雄黃鎔作汁以盞子合定出火毒
一宿去麩研為末入好麝香少許掃在瘡上驗

集驗方治小兒走馬疳

右用蠶退紙不計多少燒成灰存性入麝香少許貼
患處佳

茅先生小兒崩砂方

鷄內金 蘆薈 白礬
火煨乳香 地龍 麝香

右各少許為末候小兒睡着以藥末摻牙齦上

定命散 治小兒走馬疳

白礬

綠礬

各等分炒
一大錢

右同研勻用大麥麩五錢萹蔥一寸研爛將麩同搜和軟硬得所為餅子將研勻者藥裹在中心用文武火燒存性於地坑內出火毒一宿又研如粉入松霜二錢同研令細每服一剗耳許揩牙上一二遍

蟾灰散 治小兒走馬疳

乾蝦蟆

一個大者
燒存性

五倍子

各一錢

麝香

少許

右同研蜜水調塗齒根上未止更用之

聖散子 治小兒走馬疳

膽礬

龍膽草

各一兩

右同於瓦瓶中煨烟盡略存性貼瘡上

生金散 治小兒走馬疳

天南星

一個重一兩者 綠礬

一兩

右先安排南星在乾地上用礬與南星同處四面以

灰火燒烟盡為度取出後研如粉入當門子一粒先

含漿水洗貼之

劉氏家傳李琬麝香散 治小兒走馬急疳口臭牙齒

損爛及攻蝕唇鼻顙頰累治未效者可用此方

麝香

一錢
真者

黃礬

一兩去
皮杵末

青黛

半兩上
好者

雄黃

一分
飛研

右件件研極細如有患者先以綿纏筋擦却齒上蝕
損死肌以軟帛拭去惡血量瘡大小乾摻日三五次
用之或血盛併多不定者加定粉半兩同研用如前

法

黑神散

龍膽草

剉

青膽礬

右等分用甘鍋子一個先入膽礬在內次入龍膽草
用鹽黃泥固濟留一眼子週迴用炭火燒至眼子上
烟斷為度放冷取出研細入麝香少許如有患人看
瘡內大小乾擦貼之立効牙疼乾擦牙根有鮮血出
并腫爛牙擦之即愈

孔氏無比散 治小兒走馬疳

麝香

一分
別研

真蟾酥

綠礬

各半
分

膽礬

沒藥

各二
分

右四味一同用大甌一口鑿中心作竅穴子勿令透地便安四味藥在穴中週迴用紅著炭三斤燒過取出同麝香再研勻如有患者以鷄翎微濕沾藥末掃於小兒齒上立效

王氏手集治小兒走馬疳口鼻生瘡牙斷腫爛諸藥不能治者

槲葉

十片
乾者

麝香

少許

右以蘆薈為末水調塗葉上灸乾又塗又灸凡塗灸數遍為末瘡濕乾摻

安師傳走馬疳藥方

此疳齒中不住血出多

右用蠶退紙燒灰止血時間令住若用地骨皮中嫩處為末貼之便永止

曾氏燒鹽散 治走馬疳牙根肉潰爛黑臭

椽斗子

不拘多少

右每用大者兩個入鹽滿殼蓋作一合或五六個至

十數個安在火內和鹽燒透取出地上以瓦盆蓋定
存性候冷入麝香少許乳鉢內極細杵勻每以半錢
塗搽患處常收用小瓦盒盛貯勿使紙裏蓋能作潤
內金散 治牙根肉臭爛黑色有蟲作痛

鷄內金

即鷄脾內麩皮陰乾一兩

白芷

銅青

各半兩

麝香

一字

右前三味剉曬或焙為末仍以麝香乳鉢內同杵勻
每用一字或半錢乾擦患處先用溫鹽水灌漱後傳

藥

蜜陀僧散 治走馬疳齒焦黑爛

蜜陀僧

一兩輕粉

五十貼

麝香

一字

右件為細末同輕粉麝香乳鉢內杵勻每用半錢擦患處

走馬牙疳神効方

乾薑白礬棗子燒焦存性為末傳患處 尿桶中白
焙乾為末入冰片少許搯牙立効

右自水鑑方以下不犯砒為要

治走馬牙疳用溺桶中白垢火煨過每一錢入銅綠三分麝香一分半傳之立愈

紅鉛散 治走馬疳

綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒灑拌勻再入鍋如此數遍色紅斫作細末入麝香少許先以溫漿水洗漱淨用脂蘸藥有疳處貼之

演山蘭香散 治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂出

血齒落者

輕粉

一錢重

蘭香子

一錢末

蜜陀僧

半兩醋滓為末

右研如粉傅齒及齦上立効

議曰嬰孩受病證候多端良由氣鬱三焦疔分五藏
內有腎經常虛得疔名之曰急以走馬為喻治療頗
難此等一證初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩
砂感則齦爛名曰潰槽又感血出名曰宣露重則齒
自脫落名曰腐根其根既腐何由理之今將秘方具

述於後

傳齒立效散

鴨嘴膽礬

一錢匙上
煨紅研

麝香

少許

右研勻每以少許傳牙齒齦上又一方用蟾酥一字
加麝和勻傳之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後
飲食之間深恐有傷於榮衛而作衆疾其或氣傷於
毒血傷於熱熱毒攻之虛藏所受何藏為虛蓋小兒

腎之一藏常主虛不可令受熱毒攻及腎藏傷乎筋
骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐徐而
作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證
以前件立効散及麝酥膏傳之切忌與食熱毒之物
此疔不同常證乃係無辜有作醫宜深究保全為上
若用常方難擬愈活

獨活飲子 治腎疔臭息候

天麻 木香 獨活 防風 麝香

少許為細末研和入

右各二錢重為末每服一錢七小者半錢麥門冬熟水調下

三黃散 治腎疝崩砂候

牛黃 大黃 生地黃 木香 青黛

右等分為末每服一錢七熟水調服

人參散 治腎潰槽候

肉豆蔻炮 胡黃連 人參 杏仁炒 甘草炙

右件各等分為末每服一錢七小者只半錢温熟水

調服

檳榔散 治腎疝宣露候

木香 檳榔 人參 黃連 甘草

炙

右等分為末每服一錢小者半錢熱水調服

黃耆散 治腎疝腐根候

黃耆 察 牛黃 人參 天麻 全蠍 炒 杏仁 炒 白

炙

茯苓 川當歸 生地黃 洗 熟乾地黃 洗

洗

右等分為末每服一錢小者半錢七煎天門冬熱水

調服

麥門冬
亦得

地骨皮散

治腎疳齲齩牙齒肉爛腐臭鮮血常出

生乾地黄

兩半

真地骨皮

細辛

各一分

五倍子

炒令
焦二

錢重

右件為細末每用少許傅之頻與功效喫不妨

議曰本經所載疳證有五謂五藏所受故得其名今
述腎疳一藏有五證候者最為要急不可同常此疾
共陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號不誣初

發之時孩兒口臭上千胃口氣息臭鬱漸進損筋斷
内生瘡或腫或爛其齒焦黑又進從牙槽內發作瘡
疤破潰膿爛又進熱逼筋脈時時血出其熱注久牙
斷腐壞槽寬齒脫六七歲孩落盡不復更生豈可治
療今以妙方宜速與傳變而理不待疾作而後藥也

茅先生硃砂膏

治小兒驚積驚熱

硃砂

兩半鵬砂

馬牙硝

各三錢

真珠末

一錢

玄胡粉

二錢

並別
研

龍腦

麝香

各一字

右件各為末於一處拌和合用好單角起不久其藥
自成膏如小兒諸般驚用藥一黃豆大常用金銀薄
荷湯少許化開下如遍身潮熱用甘草煎湯下狂躁
惡叫用生地龍自然汁化下一臘及一月日內小兒
不通下藥可用藥使乳調塗在妳上令牙兒喫妳吮
下

茅先生牛黃膏 治小兒膈熱及諸熱鎮心解毒

川鬱金

半兩用皂角三寸巴豆七粒水
一碗銚內煮乾不用皂角巴豆

馬牙硝

甘草

灸各半兩

朱砂

錢一

鵬砂

寒水石

各一分

龍腦

麝香

二味隨意入

右件為末鍊蜜為膏芡實大每服一丸麥門冬熱水

化下

天竺黃散

治小兒諸熱

天竺黃

川鬱金

用昆筒水煎乾

茯苓

去皮

麥門冬

各半兩

蟬

蛻

去足

全蠍

去土十個

白僵蠶

各十個

甘草

一兩

朱砂

一分

龍腦

麝香

隨意所入

右件各淨洗研羅為末每服半錢一錢用蜜熟水調下

三解牛黃散 治小兒潮熱實熱

白僵蠶 全蠍去土 防風 白附子 川黃芩

桔梗 川大黃 甘草炙 白茯苓 人參 川鬱

金用皂角水煮熟

右前件各等分為末各淨洗細研每服半錢一錢用薄荷蜜熟水調下

惠眼地黄膏

天竺黃散

一名金
朱散子

二方並見初生門重舌條

形證論檳榔散

檳榔

大黃

蒸

青皮

各二錢
五分

黑牽牛

一錢

木香

少許
炒

為細末薄荷蜜水調下一錢

當歸散

潮熱

三稜散

宿食

蘆薈丸

本門通
治條

玉露飲

積食

口齒疳聖惠云其候唇口癢痛牙齒峭黑舌上生瘡腦

中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒熏蒸口多臭氣 按
此即走馬疳之輕而慢者聖惠形容似太過治法宜清
胃散甘露飲內服外用五倍子炒綠礬燒人中白等分
入冰片少許搯牙或加檳榔末殺蟲亦得

譚氏殊聖治小兒大人牙疳諸惡瘡方

黃丹飛過乳香 白礬飛 柸子 臙脂各一錢 輕粉 麝

香少許

右件為細末看瘡大小臨時用藥先用漿水洗瘡淨

上藥乾摻

聚寶方黃礬散 治大人小兒齒斷宣露骨槽風小兒

急疔斷肉爛惡腫痛

黃礬

一兩研入甘
鍋燒通赤

生乾地黄

梧桐律

川升麻

各半

乾蝦蟆頭

二枚
炙焦

右五味為末每用半錢乾貼良久吐津甘草水漱口

一兩服立効一方用熟乾地黄及蟾頭燒灰

劉氏家傳方治小兒口中疔瘡皆下部有蟲燒大麻子

烟熏之

莊氏家傳治小兒牙疳壞爛方

百藥煎 坯子臘脂

右各等分為細末羅過貼患處

吳氏家傳青霞散 治小兒口齒疳

蝦蟇

一個
燒灰

甘草

炙

青黛

各一分

右研為細末更入真麝少許或兒滿口有瘡臭爛落
下牙齒者以鷄翎掃上立効凡用先以鹽湯漱口了

乾拭用

安師傳治小兒口齒并喉齩疔瘡如白膜者

用輕粉黃丹等分乳汁和塗瘡上即時如殼退下

治小兒疔蝕動唇齒及瘡生方

蟾頭

一個大者燒灰

麝香半錢

右研勻如粉摻於瘡上立

効

治小兒唇口及齒根宣露牙斷生瘡臭爛方

葶蘆

炒

胡黃連

各二錢

黃丹半兩

右為末每半錢於牙斷上貼之不得嚥津莊氏第十
一候用此

秘方治牙疳腐爛及下疳瘡

海巴

白者二個
赤者一個

銀硃

輕粉

各五分

海螵蛸

一分

真珠

二分
龍骨二分

右為細末用冷茶漱淨將藥敷上

鼻疳聖惠夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食不調上焦壅滯令疳蟲上蝕於鼻也其候鼻中赤癢壯熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦咳嗽上氣下痢無常鼻下連唇生瘡赤爛故曰鼻疳也

治小兒鼻下赤爛心煩躁鼻中生瘡漸漸轉多及身上
焦躁日夜疼痛急治之方

訶子

二個

豆蔻

三個

黃連

六分

防風

半兩

朱砂

一分

右為末飯丸麻子大每服荊芥湯下三丸

湯氏五福化毒丹 治鼻清膈涼血

玄參

桔梗

去蘆各一兩

赤茯苓

人參

馬牙硝

青黛

甘草

各一分

麝香

五分

一方有龍腦

五分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜丸

如芡實大金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疹餘毒磨生
犀角水下上焦熱壅口齒鮮血宣露臭氣用生地黃
汁化下食後

澤瀉散 治小兒肺積鼻内生瘡及鼻下赤爛

川澤瀉 川鬱金 生 甘草 炙 山梔子仁 炒各一分

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢甘
草湯調下一日二服宜再用青金散傳之

自製枇杷葉散 治鼻疳赤爛

枇杷葉

去毛陰乾一兩

山梔子

半兩

百部

檳榔

各二錢半

右為細末每服三錢兒小者二錢更小一錢白湯調

下

田氏治法先用甘草白礬湯洗淨後摻蘆薈黃連黃檗

末日三傳

一方用米汁洗黃連末傳日三四次亦佳

青金散

銅青

白礬

生各一錢

右為末每用少許傳鼻下

錢乙蘭香散

蘭香葉

菜名燒
灰二錢

銅青

半錢輕粉

二字

右為細末令勻看瘡大小乾貼之

張渙石膽散

治鼻疳病疳蝨上蝕於鼻赤癢及連唇

生瘡赤爛

石膽

一兩

地龍

一分
洗淨

頭髮

燒
灰

菘荇子

生用各
半兩

右件搗羅為細末入麝香一錢同研勻每服一字貼

於瘡上

吉氏家傳治鼻下赤爛疔方

青黛

一錢

麝香

少許

熊膽

末半錢

右末睡時貼少許在

鼻下

朱氏家傳治小兒鼻下濕癢疔瘡方

右用大棗一枚去核以白礬一塊內棗中文武火煨存性細研塗瘡如瘡乾以麻油調塗

聖惠治小兒鼻疔癢吹鼻蟬殼散

蟬殼

微炒

青黛

細研

蛇蛻皮

灰

滑石

麝香

細研

各等分

右件藥搗細羅為散都研令勻每用菘豆大吹入鼻
中日三用之疳蟲盡出

錢氏白粉散 治諸瘡

烏賊魚骨末

三七

白芨末

七二

輕粉

七一

右末先用清

漿水洗拭過貼之

眼疳龍木論治小兒疳眼外障此眼初患時皆因腦頭
上有瘡或因經日多時瀉痢潛衝疼痛淚出難開隔間
伏熱氣肝風入眼初患此疳時癢澀揉眉咬甲致令翳

生赤腫疼痛淚出難開臉硬白睛遮瞞怕日合面卧不喜擡頭此疾不宜燒灸頭面恐損眼也切忌點藥宜服殺疔散退翳丸 聖惠論夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疔氣肌體瘦羸而臟腑挾於風熱壅滯不得宣通因其乳食過多胸膈痰結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢或赤爛生瘡或生障翳漸漸遮睛久而不差損於眼目故號眼疔也 玉訣云此患先與涼膈後瀉肝次淋洗之即無悞也又云此患小兒肝熱宜瀉

肝散麩仁膏涼膈退熱又云小兒疳眼雀目斑瘡入眼者先與利膈退熱涼心經後與疳藥也

龍木論殺疳散

防風 龍腦 牡蠣 白芷 細辛 五味子

枝

各二

右為末每服一錢食後粥飲調下

退翳丸

黑參 防風 細辛 石決明 車前子

各一兩

各半兩

桔梗

黃芩

各一兩半

右為末鍊蜜為丸梧桐子大

空心茶下十九丸

玉訣瀉肝散

木賊

威靈仙

紫參

家菊花

菴活

蟬蛻

去足

大黃

生

甘草

炙

石決明

各等分

腦子

少許

研為末

每用藥二錢豬膽一枚批開去膜摻藥在內線纏

米汁煮熟嚼下

蕤仁膏

麩仁

四十九粒
去皮出油

腦子

許少

右研成膏用燈心點少許

靈苑羶羊角丸

治肝肺壅熱眼生努肉赤脉澀痛及

赤眼障翳睛疼癢痛羞明及小兒風疳燥陽眼神妙

羶羊角

屑晒乾
脆為末

甘草

生白何首烏

瓦松

以紗絹
內洗去

土各
一兩

生地黃

洗

鬱金

炮過用地上去
火氣各二兩

右件六味並細剉爆乾搗羅為細末鍊蜜為丸如梧

桐大每服十五丸用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下食後

臨卧服小兒丸如菉豆大每服七丸至十丸

譚氏殊聖退雲散 治小兒疳眼啞喑饒啼不住

草決明

土瓜根

大黃

玄參

各半兩

甘草

炙宣

連

矜矜石

井泉石是研各一分

右細為散每服一錢水一盞同煎至七分五度與喫

張渙井泉石散

治眼疳邪熱攻於眼目漸生翳障致

損睛腫

井泉石

一晚蠶沙

夜明砂

各微炒

石決明

甘菊

花

黃連

去鬚各半兩

右件搗羅為細末每服一錢

用米泔一盞入生豬肝少許煎五分肝爛為度放溫
時時服乳食後

胡氏家傳豬膽黃連丸 治小兒疳瘦大治肝疳作眼
疾白膜遮睛諸藥不痊者

胡黃連

雄黃

細研

夜明砂

細研各
等分

豬膽

數個

麝香

少許

不入
膽煮

右為末以豬膽汁調藥稀稠得所却入元膽皮內以
線緊繫口米泔水煮五七沸取出放冷先以麝香於

乳鉢內研細却入藥一處同研

不用膽皮只取出藥

候細用軟

飯為丸如大麻子大每服十九大者加至十五丸米飲吞下如疝氣盛須用陳米飲下

治小兒肝藏風熱眼中不見物及有汗方

石決明

乳香

各一分

龍膽

二分

大黃

半兩

右為末每服兩錢用薄荷溫水調下

莊氏第十六候用此方

疝濕巢氏云疝濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間蟲動侵蝕五藏使人心煩懊悶其上蝕者則口鼻齒斷

生瘡其下蝕者則肛門傷爛皆難治或因久利或因臟
熱嗜眠或好食甘美之物並令蟲動致生此病也 聖
惠夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵蝕藏
府此猶是蠱也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其府
藏之味而歸之脾與胃為表裏俱象土其味甘而甘味
柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動蟲動則侵蝕成疳也但蟲
因甘而動故名之為疳也若蟲蝕下部則肛門生瘡爛
開急者數日便死宜速療之 夫小兒乳食不節冷熱

相乖傷於藏府致疳氣也若脾胃虛弱則乳哺不消大腸虛寒遂變泄痢因其久痢不止腸胃俱虛為水濕所乘腹內蟲動侵蝕下部故名疳痢濕蟲也

千金除熱結腸丸 斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠱生蟲

黃連 檠皮 苦參 鬼白 獨活 橘皮 芍

藥 阿膠 各半兩 右八味末之以藍汁及蜜丸如

小豆日服五丸至十丸

冬無藍汁可用藍子壺合春蜜和丸

薑蜜湯

千金

治濕蟲

生薑汁

五合

白蜜

三合

黃連

三兩

三味以水二升別煮

黃連取一升去渣內薑蜜更煎取一升二合五歲兒
平旦空腹服四合日二

杏仁湯

千金

治蟲

杏仁

五十枚

苦酒

二升

鹽

一合

三味和煮取五合頓服

之小兒以意量服

治蟲蝕下部方

胡粉 雄黃 上二味各等分末著穀道中亦治

小兒

張渙桃白皮散 治腸胃俱虛腹內蟲動侵食下部疳

痢濕蠱

桃木白皮

黃檗

蜜炙對

黃連

去鬚炒

蛇蛻皮

半兩燒灰

乾蝸牛

一分燒灰

青州棗

五十枚去核燒灰

已上同搗羅為細

末入定粉麝香各一分同研勻每服一字粥飲調下

乳食前

如聖丹

乾蟾

七枚
燒灰

蟬殼

半兩

蚺蛇膽

大棗

去核燒灰各一分已上搗羅為

細末
火用

黃丹

定粉

麝香

並細研
各一分

上同拌勻用

好醋一大盞都搥一二百下成膏如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散 治小兒一切濕瘡癬疔

黃檗

黃連

各半兩並
為細末

黃丹

一兩
火飛

輕粉

一錢
麝香

研別

同研勻先以溫水洗後貼之

化蟲丸

治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛

唇口紫黑腸頭濕蟲

蕪荑

蘆薈

青黛乾

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰

各等分


為末豬膽汁浸糕糊丸

麻子大每服一二十丸食後臨卧杏仁煎湯下其鼻

常用熊膽煎湯筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛

當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈雄黃為末入鼻瘡

斂



證治準繩卷九十三

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十四

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勸

總校官進士臣朱 鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣姚培敦

欽定四庫全書

證治準繩卷九十四

明 王肯堂 撰

幼科

脾臟門

疔瘡

疔瘡聖惠大小兒疔瘡生於面鼻上不癢不痛常有汁
出汗所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風

濕搏於血氣所以不癢不痛故名疔瘡也 錢乙論疔

在外鼻下赤爛目揉鼻頭上有瘡不著痂漸遠耳生瘡

治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散

二方並見鼻疔條

主之

張渙四珍丹 治諸疔羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾

一枚去四足擘開腹入胡黃連半兩在腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面

固濟用木炭火燒令通赤為度故冷去泥搗為細末

蘆薈

半兩

麝香

一分

件都拌勻再研令細以白麪糊和如黍米大每服五

粒至七粒粥飲下量兒大小加減

熊膽膏 治疔瘡不差

熊膽

蚰蛇膽

蘆薈

各半兩

黃礬

一分瓜州者良已上搗羅為細

未次用

麝香

牛黃

各一分

龍腦

一錢並細研

上細研勻

以井華水三合攪勻盛銀器中重煮成膏每用少許

塗患處

治小兒一切疔毒有瘡方

苦揀皮

伍斤判

七姑葉

半兩判

甘草

白礬

各二兩

蔥白

十莖

粗搗令勻用水五升煮五七沸旋旋添洗瘡

處如久患只兩服立効

譚氏殊聖治小兒疳肥瘡多生頭上浸淫久不差及耳瘡等悉皆治之

石綠

白芷

各等分

以生甘草水洗瘡傅藥自愈

通治一切疳方銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則治積蟲則治蟲不出集聖丸一方加減用之屢試屢

驗

集聖丸

蘆薈

五靈脂

夜明砂

炒

砂仁

橘紅

木香

莢朮

煨

史君子肉

各三錢

川連

川芎

乾蟾

灸各三錢

當歸

青皮

各一錢半

因於虛者加人參二錢白朮三錢去莢朮青皮 因

於熱者加龍膽草三錢去砂仁莢朮 因於吐瀉下

痢者加白朮二錢肉果煨訶肉各一錢五分去青皮

莢朮 因於積痛者加煨三稜川棟子肉小懷香各

二錢去當歸川芎 因於瘧者加鼈甲醋炙三錢

因於蟲者加白燕萆一錢五分川棟子肉二錢去當
歸川芎 因於渴者加入參白朮各二錢去莢朮砂
仁 右為細末用雄猪膽汁二個和麩糊為丸看大
小服米飲送下 此方乃十全丹去檳榔白豆仁加
黃連夜明砂砂仁不熱不寒補不致滯消不致耗至
穩至妥

疳積散 治魁乳病乳夾乳夾食大病之後飲食失調

平居飲食過飽傷脾致成疝積面黃腹大小便色如
米泔大便瀉黃酸臭頭皮乾枯毛髮焦穗甚至目澁
羞明睛生雲翳形體骨立夜熱晝涼丁奚哺露等証
並用主之

厚朴

厚而紫色有油者佳去麤皮切片
生薑自然汁炒熟為末淨一兩廣陳皮去

為末

八錢粉甘草

去皮淨
為末

真蘆薈

淨末各
七錢

蕪荑

真孔林
大而多

白衣者佳去白
衣殼淨末五錢

青黛

取顏料舖中淨碎如佛
頭青色者研淨末三錢

百草

霜

乃山莊人家鍋底
墨也淨末二錢

旋復花

淨末一
錢半

研勻和成

劑用 每一歲用藥一分用燈心湯早上空腹時調服 服後病即愈當再用肥兒丸調理如脾氣未實用啓脾丸或大健脾丸 如疳氣未盡用陳皮一兩廣木香三錢白茯苓五錢加好平胃散三錢陳米粥湯調服

疳眼方 用生鷄肝一具

不拘大小雄雌

二三歲者只用半

具外去衣內去筋膜研細如麩入疳積散若干調極勻加好熟白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心通口服

用甜麴酒少加熟白酒亦佳 服至眼開翳散方止

疳瀉痢紅白積滯用散子加黃連薑汁土炒肉果用濃燈

心湯稍加熱蜜少許調服 食積成疳砂仁湯調服

集驗方治小兒疳氣不能療神効丹

綠礬

用火煨通赤取出用醋淬過復煨如此三次

上研末用棗肉和丸

如菴豆大下日進二三服

元和紀用經麝香丸 主小兒疳瘦面黃髮穗骨立減

食肌熱驚癇疳蟲

麝香

研

蘆薈

研

胡黃連

末

右等分研勻滴水丸黃

米大一歲二九三歲五九至七九人參湯下日三服無
比竒効一方胡黃連四分餘二物各二分療疔痢温
瘧無比尤驗一名聖丸疔藥百數無如此者小兒癩
癩驚風五疔三蟲服之立見功效虻蟲作疾枯痺久
痢不住熱藥調護最難得法唯此若神經以四味飲
黑散紫圓至聖散五加皮治不能行蜀脂飲并此麝
香圓七方謂之育嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖

至寶方專為一書者此是也

靈苑千金丸 治小兒一切疳久服令兒肥狀無疾

川棟子肉

川芎

各等分

研為末豬膽汁和杵為

丸如麻子大量兒大小加減丸數每以飯飲吞下日
二服常服三丸至五丸張氏家傳丸如菜豆大分五
色用朱砂青黛白定粉光黑蜜陀僧名為五色丸非
時進米飲下孔氏家傳治疳熱下蟲方同用臘月乾
豬膽膏為丸如乾湯化動丸菜豆大十九十五丸肉

湯下疳蟲如髮便看即見稍避即化

太醫局蘆薈丸 治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭

髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往來目
澁口臭齒齲爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進乳食

乾蝦蟇

大皂角

以上二味等分同燒存性
為末每末一兩入後藥

青黛

二錢 蘆薈

研 麝香

研 朱砂

飛研各
一錢

同研勻湯浸

蒸餅為丸如麻子大三歲兒服二十丸不計時候溫
米飲下量兒大小加減

錢氏膽礬丸 治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬

真者一錢
為窠末

綠礬

真者
二兩

大棗

十四個
去核

好醋

一升

上四物同熬令棗爛和後藥

史君子

二兩
去殼

枳實

三兩
去穢炒

黃連

訶梨勒

去核各
一兩並

為窠末

巴豆

二七枚
皮破之

已上五物同炒令黑約三分

乾入後藥

夜明砂

一兩

蝦蟇灰

存五分
性一兩

苦楝根皮

末半
兩

已上三

物再同炒候乾同前四物杵羅為末却同前膏和入

白中杵干下如未成更旋入熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠即入溫水可圓即圓如菜豆大每服二十丸米飲溫水下不拘時

西京丁左藏蝦蟆丸 肥孩兒常服得効

乾蝦蟆

大者一枚泔浸三宿去腸肚頭瓜淨洗酥炙令黃香

陳皮

去白二錢半

胡

黃連

一兩鬱金

蕪荑仁

各半兩

為末於陶器內用

積豬汁和令稀稠得於飯上蒸熟為度取出半日丸如菜豆大常服五七丸陳米飲下

張氏神麩散 治小兒諸般疳

神麩

陳橘皮

不去白

大黃

紙裏炮熟

芍藥

各一分半

桔梗

川芎

厚朴

薑汁製

枳殼

去穰炒

白茯苓

各二分半

人參

一錢

半

甘草

炙五錢

為細末每服一錢入薑一片如茶

法煎服無時

治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡水穀不

化方

蝦蟆灰

存性

白礬

烏賊魚骨

炙

密陀僧

各二錢半

麝香

一錢二分半

右為末煉丸如菘豆大溫水下三丸聖惠方同但麝

香用半兩

莊氏第五
候用此方

治小兒一切疳方

莊氏第十四
候用此方

蟾頭

一箇
灸

膩粉

豆豉

蕪荑

黃連

各二
錢半

為

末軟粟米飯為丸麻子大早晚米飲下三丸

又方

莊氏第十七
候用此方及香連丸

蘆薈

胡黃連

朱砂

青黛

麝香

各二
錢半

蟾酥

許少

為末飯為丸如芥子大每服空心臨卧温熟

水下五七丸

洪州張道人傳治小兒一十二種疔肝疔急疔風疔肉
疔脊疔口疔腦疔食疔蛔疔脾疔腎疔心疔定生死
有此候者取得蟲青者死黃者可治須服定命丹

木香 夜明砂

麝香

各一分

蟬蛻

三分

胡黃連

二錢

箔 銀箔

各五片

研為末米飯丸如麻子大空心

米飲下三丸日三服忌醃醋酸油膩

第一肝疳小兒雖飲乳漸喜食肉尤愛酸鹹只服定命丹次服此藥

肉豆蔻

三個

枳殼

炒七錢半

茯苓

胡黃連

各半兩

大黃

甘草

丁香

麝香

各二錢

為末

每服一匙米飲

下日兩服久者五服効

演山史君檳榔丸

治小兒食肉太早傷及脾胃水穀

不分積滯不化疾作疳痢等候並宜服之

肉苳蔻

一個

生檳榔

一個

宣連

胡黃連

陳皮

青

皮

川棟肉

炒

蕪荑

皮炒去

神麩

麥蘖

並炒

木香

夜明砂

淘淨炒

蘆薈

川芎

各一錢

麝

一字

研細末積

豬膽汁薄荷為丸如麻子大每服三五丸溫飯飲

下

議曰積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒所患疳證泄瀉無時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟腑轉動有限所以不成風候雖瀉不風亦轉它證作渴

虛熱煩躁下痢腫滿喘急皆疢候虛證古云疢虛用
補虛是知疢之為疾不可更利動臟腑發作之初名
曰疢氣腹大脹急名曰疢虛瀉痢頻併名曰疢積五
心虛煩名曰虛熱毛焦髮穗肚大青筋好喫異物名
曰疢極受病傳臟已極熱發往來形體枯槁面無神采無血
色名曰疢勞手足細小項長骨露尻臀無肉肚脹臍
突名曰丁夷食加嘔噦頭骨分開作渴引飲蟲從口
出名曰哺露此皆疢候又因多食生冷甘肥粘膩積

滯中脘不化久亦成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中脘順其三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟腑自然調貼令氣脉與血脉相參則筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若以藥攻之五臟疎却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰醫療即非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則疳羸虛則脹滿何可利下若更轉動腸胃致虛由虛成疳疳虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣

胡黃連丸 治嬰兒一切疳候及一切虛痢他藥無功

此藥極效

胡黃連 蘆薈 草黃連 肉豆蔻 此 桂心 人

參 朱砂 史君子 去殼 木香 鈎藤 龍齒 白

茯苓 以上各一錢 麝香 一字

右件各生用為細末取豬膽二枚裂汁和末令勻
却入袋內盛之用線紮足湯煮半日取出切破袋子
加葭蓉子 二錢 黃丹 一錢 二味另研如粉入前藥和勻搗

五百杵丸如菘豆大但是疳與痢用粥飲下五七丸
子幼者三丸不吃粥飲乳頭令吮能治一十二種痢
及無辜者功效非常

議曰疳之疾危發由於漸痢之後逆傳自於延

延久為逆

初見其輕言之曰常後知其重告之無門是以痢疳
皆由積毒嬌恣口腹因虛以致虛因害而傷害醫工
見有此等自是憂疑病家欲得便甦豈無性急更遷
取活展轉逾深或疳極而腹下痢或熱盛而加作渴

或煩躁四體虛浮或飲食一時嘔吐常方不能安愈
快劑恐越傷和並宜服此

肥肌丸 治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常服

殺蟲消疳開胃進食

黃連

去

川棟肉

炒

川芎

各半兩

陳皮

香附子

各二錢半

酒煮
砂乾

木香

二錢

研為末水煮熟細麵糊為丸如麻子

大每服三五丸溫飯飲下

議曰驚疳積痢各分證候用藥今有小兒患疳虛困

又作痢疾二候相加最為惡重疴痢並行臟腑虛之
之極熱毒差重皆係積之久滯雖曰係積無積可療
乃虛受之然謂其虛補之不及所見其證不得良方
以何對治雖獲其方不審其候亦難療也良由脉與
病同藥與證對醫工運巧扶而起之必得安樂胡黃
連丸無以加矣肥肌良方亦佐勝焉

疴熱漢東王先生論小兒發熱形瘦多渴喫食不長肌
肉者謂之疴熱 湯氏云疴熱當服進食丸

方見 磨積

仍間服化蟲丸後服鼈甲散退熱次服肥兒丸

疳瘦

湯氏鼈甲散 治疳勞骨熱

鼈甲

致助者湯浸用重便塗灸

黃芪

察灸

白芍藥

各一兩

生熟地黃

地骨皮 當歸

人參

去蘆各半兩

剉碎每服二錢

水半盞煎服

化蟲丸 治疳熱

白蕪荑 黃連

神麩

麥芽

各炒等分

末糊丸如

黍米大空心米飲下豬膽尤佳

豬肚丸

治骨蒸疔勞肌體黃瘦

木香

半兩

黃連

生地黄

鼈甲

九肋者湯浸用童便塗炙

銀柴

胡

去蘆

青皮

各一兩

為末豬肚一枚入藥於內以線

纏之於沙罐內懸胎煮熟取出細研豬肚為丸如麻子大米飲送下量大小加減不拘時服

龍膽丸

三因

治疔病發熱

龍胆草

黃連

史君子肉

青皮

各等分

為末

豬膽汁和丸如桐子大每服三十臨卧熟水下量兒加減

世烏犀丸

治小兒疳熱腹内生蟲肚大手足疲弱丁

奚廷羸

此方治疳熱如神

黑牽牛

二兩

史君子

肉七錢半

青皮

二兩

雷丸

二錢半

苦楝皮

一方不用楝皮
蘆薈二錢半

鶴蟲

各半兩

同入鍋內炒焦為末

麵糊丸黍米大三歲兒三十丸米飲下食前

二丁丸

治乳癖食癖疳熱

白丁香

半兩

丁香

蜜陀僧

各一兩

韶粉

一錢

硫黃

三錢

右為細末糊丸如小豆大三歲兒十九日晡時米飲

下飲乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃
鶯屎一錢尤妙

譚氏殊聖金瓜丸 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服

令肥

黃連

黃檗

甘草

微

青皮

各等分

為末入麝香

少許用豬膽一枚入藥膽內線紮定入石器中漿
水煮五七沸取出風吊一宿丸如菉豆大每服五七
丸米飲下量兒加減玉訣方同外以朱砂為衣仍治

脾疳博濟方同劉氏家傳方亦同云或添胡黃連若
早晨服史君子丸晚服金瓜丸永無疾消食長肌肉
莊氏家傳方同仍加夜明砂一味等分趙氏方亦同
名涼疳藥長沙朱司理以為有神效

蘆薈丸 治小兒驚熱疳不思食

蘆薈

熊膽

朱砂

各二錢半

青黛

七錢半

訶梨勒

煨取肉三

錢一麝香

右為末糯米飯為丸如麻子大空心隨歲數與之用

沙糖水嚥下五七丸

茅先生柴胡散 治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡 知母 貝母 去心 茯苓 茯神 乾葛 甘

草 各等分

右為末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同煎

六分去滓服

六物黃芩湯 治少小腹大短氣熱有進退食不安穀

為之不化

黃芩 大青 甘草炙 麥門冬去心 石膏碎各半兩 桂皮

錢三

右每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

莊氏青黛丸 治疔熱

青黛

研一兩

胡黃連

宣連

天竺黃

研各半兩

朱砂

飛水

二錢半

麝香

研一錢

肉豆蔻

二個

牛黃

半錢研

乾蟾

一枚端午日取

者酒浸洗去腸肚塗酥炙黃

右件除研藥外為末再同研勻菜豆粉煮糊丸如芥

子大每服空心夜後熱水下三丸恐菜豆粉難和圓
菜豆麵作糊亦得

王氏史君子散 治疔熱 右用史君子不以多曝乾為

末空心米飲下大者一錢小者半錢取蟲出為度

猪肚黃連丸直指治疔熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹或

渴

用雄猪肚淨洗一具宣連淨五兩剉細末和潤納肚中線縫

放五升粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗干杵丸

小桐子大每服二十九米飲下仍服調血清心之劑

佐之

凡兒病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此

柴胡飲

治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味

渴多身腹胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡

去蘆淨洗

人參

去蘆

當歸

酒洗

黃芩

赤芍藥

甘

草

炙各一兩

大黃

生用

桔梗

去蘆對炒

北五味子

去梗

半夏

湯煮透去

滑各半兩

右剉每服二錢水一盞烏梅一亞薑二片煎七分無

時溫服

疳勞即疳熱而骨蒸魚諸咳嗽盜汗等證是也湯氏鼈
甲散豬肚丸皆對證之藥

乾地黃煎

顧頤

治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦心

脈乾

生地黃汁

伍兩酥

生薑汁

蜜

各一兩

鹿角膠

半兩

右先以地黃汁入鍋內慢火煎手不住攪約五六沸

下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎後如

稀湯即住火每食後兩度共與一匙頭忌諸毒物

王先生鷄肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形瘦

宣連

去鬚
二兩

銀柴胡

去蘆
洗淨

秦朮

去土
淨

知母

史君子

肉子苓

各一兩

蕪荑

去衣

川鶴虱

各半兩

為末以黃雌雞

一隻重一斤許籠之專以大麻子飼之至五日後宰

去毛令淨於臀後開孔去腸肚淨洗拭乾入前藥

末於鷄腹內以線縫之取小甌先以黑豆鋪甌底

厚三寸安鷄在甌中四傍以黑豆圍裹上亦以黑

豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取鷄去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得所如乾入酒麵糊為丸如麻子大及小菘豆大每服十丸十五二十丸以意加減空心臨卧麥門冬熟水吞下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下忌豬肉

張氏三和飲子 治三焦膈塞五藏澀滯氣逆痰涎米食後惡涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美飲食面色浮黃指甲青黑小兒疳勞吐乳及大人小兒久

病乍安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫團人參

三兩半
洗判

甘草

一兩半
炙判

綿黃芪

五兩
酒浸
一宿
淨洗

判

右件三味同入木臼內用木杵搗為麤散每服三大錢生薑三片水二盞棗三枚同煎八分去滓服不拘

時候

犀角散 治小兒骨熱解毒

銀州柴胡 川大黃 甘草 炙 川芎 茯苓 芍

藥 麵葛 桑白皮 地骨皮 山梔子仁 黃

芩 貝母 各半兩 為末每一大錢水一盞入青蒿

一枝小麥十粒煎七分溫溫服之大段有患更入麻

黃連翹二味與前藥等分為末煎服之效 莊氏第二十一候用

此方

鼈血煎 治疔勞

蕪荑 柴胡 川芎 各一兩 人參 半兩 史君子 二十一枚去殼

胡黃連 宣黃連 各七錢 用鼈血一盞吳茱萸一

兩和二黃連淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二連
入餘藥末粟米粉糊丸麻子大食前熱水下

黃連丸 治疔勞

黃連

半兩淨積
膽汁浸晒

石蓮子

瓜蒌根

杏仁

湯浸去
皮焙

烏梅肉

各二
錢

右為末牛膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下
疔渴聖惠天竺黃散 治小兒疔多渴體熱煩躁少得

睡卧

天竺黃

細研

黃連

去頑

馬牙硝

梔子仁

葛根

剉各半兩

牛黃

細研

甘草

炙微赤剉

款冬花

紫苑

洗去苗土

犀角

屑土

瓜根

各二錢半

上藥搗細羅為散都研令勻不計時

候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭

二枚塗酥炙焦黃

蝸牛殼

微炒

胡黃連

菰蘆根

各半

兩

右件藥搗細羅為散每服以竹葉湯調下半錢不計

時候量兒大小臨時加減服之

五膽丸

聖惠

治小兒渴疳

豬膽

牛膽

狗膽

鯽魚膽

蝟膽

已上各一枚

以上四膽汁並入牛膽內在竈北後懸候稍乾可丸
即丸如黍米大每服以新汲水下貳丸以飲水足為度
空心午後各一服更量兒大小加減

胡黃連散 治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連

犀角

屑各二錢半

牛地黃汁 合羊子肝

一具研取

汁麝香半錢
細研

青香丸

張氏

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣 胡黃連

青黛

朱砂

鶴虱

各等分

研為末攪猪膽汁和

丸菘豆大每服三丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

猪胞

一個大者

甘草

一兩寸斷劈破入胞內

右以水一斗煮至三升去甘草將胞焙乾末之每服

二錢或三錢熟水調下大人亦可服

莊氏治小兒疳渴方

右用蛤粉取生大鮎魚一尾以

粉塗頂上刮下涎入粉同研丸鷄頭大每服一丸更用活小鮎魚一尾水半盞浸涎水一藥注子化下一

丸立止便與和氣散

方見

一二服補之

又方

治瘡渴不止

井泉石

又名石甘遂

太陰玄精石

馬牙硝

上各等分為末入生硫黃少許每服半

錢以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛

胡黃連

甘草

炙

黑參

麥門

冬

去心各等分

右件為末每服一錢水半盞薑一片煎四分服

治小兒疳渴常服五疳不生方

乾蝦蟆

二枚長流水內刮去肚腸

以法酒三升瓶內煮令爛去骨研如粉

黃連

淨四兩別為末

硃砂

一錢麝香

一錢

上先將蝦蟆膏與黃連末同研後更與麝

香硃砂等研勻作丸如菜豆大每服十丸陳米飲下

如患疳用黃蠟茶清下如難丸入些少酒麵糊不妨

治小兒一切疳熱渴方

蚶蝦蟆

大者兩枚

蝸牛蟲

半升用井水淘

洗淨為度然後用新瓦罐子一具入二物在內用鹽泥固濟了不得透風更進火燒令通赤候冷取

出二物不用罐子

大黃

黃連

各半兩

麝香

二錢半

研為末

麵糊丸如芥子大每服三丸至五丸米飲下

莊氏第十六候

用此方

治小兒疳渴方

人參

乾葛

黃芩

柴胡

甘草

炮各二錢半

研為末每服一錢水一盞煎五分去滓

候冷分為五服每喫藥時更點鉛白霜寒水石共研

一字服之方治疳

莊氏第二十候先用此止渴

疳嗽惠眼防已丸

治疳嗽不止

漢防已

牽牛子

馬兜鈴

炒

甜葶藶

別研各等分

研為末煮棗肉為丸

如菘豆大每服十丸煎糯米飲下與溫肺散相間服

溫肺散

菴藶根

半兩

甘草

炙二錢半

研為末每服一錢蜂

蜜熟水調下

小兒肺疳多是吃着熱米食及病疔傷損心肺便生喘

嗽愚醫不辨冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺昏沉宜

服杏仁散

杏仁

十四粒

甘草

款冬花

各二錢

麝香

胡黃連

各一錢

半夏

湯泡九次半兩

研為末每服一字棗

湯調下日進二服

疳積芽其候面帶青黃色身瘦肚膨脹頭髮立身熱肚中微痛此因疳盛而傳為此候治之先用勻氣散醒脾

散

二方並見
不乳食

調理二日後下青金丹

癍

取下疳積再下

勻氣醒脾散補常服保童丸

疳一切

即瘥

玉訣云疳氣

腹脹潮熱先與調胃氣後與取虛積藥次服疳藥

錢乙牛黃丸

治小兒疳積

雄黃

研水
飛

天竺黃

各二錢

牽牛

末一錢

上同研勻麵糊為丸粟米大每服三

丸至五丸食後薄荷湯下魚治疳消積常服尤佳大者加丸數

張渙褐丸子 治小兒疳氣腹脹如鼓及妳癍食癍

蘿蔔子

一兩半炒

黑牽牛

一兩炒

胡椒

二錢半

木香

莪茂

濕紙裏煨切作片子各半兩

研為細末麵糊為丸黍米大每

服二十九煎仙人骨湯下

換骨丹

陳粟米

一合

陳橘皮

剉

青皮

剉

黑牽牛

各半兩

巴

豆

去殼二錢半

右件一處同炒令焦黃色揀去巴豆不用却入木香
半兩為細末麵糊為丸黍米大每服十九橘皮湯下
莊氏參苓散 治小兒因積成疳久致脾胃虛弱不思
飲食

人參

茯苓

川芎

各一兩

甘草

芍藥

黃芪

各半

兩青皮

去白二錢半

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

香甲丸

治小兒積疳朝熱盜汗羸瘦煩渴手足心熱

服之皆効輕骨長肌 蔡夢祥家壽翁苦黃瘦不食
多汗喜叫哭服之效

木香

二錢半

鼈甲

去裙襖醋炙

檳榔

史君子肉

柴胡

去蘆黃連

去鬚各半兩

研為末豬膽汁和丸菘豆大

每服二十九日中臨卧米飲下久發潮熱多汗無力
者服之即效

趙氏青蒿丸 療小兒久積疳氣日漸羸瘦面黃頭髮

作穗好食土咬指甲捻鼻魚治骨蒸勞熱及取疳蟲

退諸藏積熱小兒常服編身香為效 白檳榔一枚 白

蕪荑

四十箇

黃連

去鬚十

夜明砂

淘淨二錢半已上為末

太陰

玄精石

麝香

小葱子

炒 朱砂

各半錢

蘆薈

天

空黃

青黛

各一錢

先將後七味同研細與前四

味一處再研勻令極細取青蒿自然汁慢火熬濃仍

用豬豬膽一枚取汁同搜藥丸如粟米大每服五丸

至七丸並用米飲下醎醋湯亦得取疔蟲煎醋石榴

湯下二十服取盡蟲

袁氏治五疔傷積方

蕪荑

黃連

各一兩

神麩

半兩

史君

子

連殼十個

鶴虱

少許

末之豬膽調麵糊為丸菜豆

大每服十九丸米飲下

青金膏

治疔積

青黛

朱砂

蘆薈

蟾酥

一錢麝

香

錢半 蜈蚣

一枚 蛇皮

項後四寸

右為末水化酥丸如粟米大每服兩丸倒流水送下
又水化壹丸注於鼻中須臾眉上白蟲出便安青難

治

豆蔻散 治疔積或冷利腹大脚小身熱面無顏色

肉豆蔻

兩

胡黃連

錢一

史君子

四枚

青黛

棟根

燕

夷

厚朴

薑汁

甘草

各

麝香

少許

夜明沙

一錢

半

別研

半

右末每服一錢或半錢蜜水或粥飲調下

知母散 治諸般疔積肚脹無時瀉痢或時壯熱狀如

瘡疾大效

知母

青皮

去白

焙

柴胡

各二

錢

二

甘草

紫參

各三

錢

訶子

煨

熟用

肉三

枚

右為細末每服一錢水五分煎至三分溫服有熱則

退有痢則除有結則通

正傳經驗檳榔丸 治小兒疳病積氣成塊腹大有蟲

等證其効如神

檳榔 一兩 三稜

煨去毛 切醋炒

蓬莪茂 醋炒青

皮

去穰 炒黃色

陳皮

去白

雷丸

乾漆

炒烟 盡

麥蘖麩

炒

神麩

炒黃色

山查肉

各半 兩

鶴虱

略炒

木香

不見 火

甘草

炙

胡黃連

各三 錢

蕪荑

水洗淨 二錢半

良薑

陳壁土 炒二錢

砂仁

一錢

右為細末醋糊為丸如棗豆大每服三五十九空心

淡薑湯下

疳瀉茅先用青金丹

癖

取下疳積後用勻氣散

不乳食

香

連散乳香散

瀉

調理瀉止服常服保童丸

一切疳

石壁經云疳瀉因不慎飲食或食交乳致然腹中有片

子或如鷄子又如三二指大所以作瀉糞出如糟毛髮

硬面無光或青黃色目多反視當分水穀乃須溫和藥

和氣即愈若藥熱則作腫而死 婁瀉而多食為蟲疳

宜殺蟲藥 瀉而少食為冷疳宜溫藥

仙人水鑑粉霜丸 治小兒疳一切瀉方 粉霜 白

丁香

各一錢

巴豆

二枚不出油

研為末爛飯為丸如小

菘豆大每服并華水下二丸

錢乙二聖丸

治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦成

疳宜常服此方

川黃連

去鬚

黃檗

去麤皮各一兩

研為細

末將藥末入猪膽內湯煮熟如菘豆大每服二三十丸米飲下量兒大小加減頻服無時

劉氏胡黃連飲子 治小兒疳熱作瀉無時飲食進退

面黃體黑日漸瘦悴 胡黃連 黃藥子 人參

甘草

炙

白朮

微炒

秦艽

柴胡

各等分

上七味用淨

咬咀每服二錢水一盞嫩桃柳枝各七寸烏梅少

許同煎八分去滓澄清分作兩分早食後少空一服

臨卧再服以小便深赤為驗候小便清佳藥便生肌

膚能進飲食大抵小兒羸瘦並宜服此十五以下皆

可服

莊氏黃連丸

治疳瀉疳痢

黃連

剉淨洗乾
碾為末

大蕪荑

仁

乳鉢研細
各等分

右二末一處和勻糯粟米相和煮稀粥為丸小菘豆
大量兒大小三歲七丸至十九三歲以上十五丸至
二十丸空心陳米飲下日進三服

錢乙如聖丸

治冷熱疴瀉

胡黃連

白蕪荑

去扇炒

川黃連

各二兩

史君子

一兩去殼秤

麝香

別研半錢

乾蝦蟇

五枚

剉酒
熱膏

將前藥為末用膏丸麻子大每服人參湯

下二三歲者五七丸以上者十丸至十五丸無時

博濟方胡黃連丸

治小兒疴疾瀉痢

胡黃連 丁

香

蜜陀僧

各半
兩

肉豆蔻

一個檳榔

一枝紅雪

一兩訶子

二枚以一枚
煨一枚用生

以上七味同研細入麝香二錢半

和勻次入棗豆末少許同水和為丸如麻子大兒三歲
以下一丸三歲以上五丸孩子腦鼻痒及赤爛黃連
湯下脾虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下肝疳眼
澁生瘡甘草湯下骨疳冷地卧愛食土紫蘓茶湯下
常服米飲下肺疳上氣急喘橘皮湯下筋疳瀉血鹽
湯下疳蟲及瀉無定生薑湯下

香薷丸

治疴瀉

黃連

炒三錢

肉豆蔻

木香

訶子

肉

煨

砂仁

茯苓

各一錢

為末飯為丸麻子大米

飲下

錢氏木香丸

治時時下痢唇口青白

木香

青黛

另研

檳榔

肉豆蔻

去皮各二錢

半

麝香

另研一錢半

續隨子

一兩

半

炒蝦蟆

三個先用

曬乾燒存性

繩繫

右為末蜜丸如菘豆大每服三五丸至一二十丸薄

荷湯下食前

沒石子丸

錢氏

治泄瀉白濁及疝痢滑兒腹痛者 木

香

黃連

各二錢半

沒石子

一個

荳蔻仁

二個

訶子肉

三個

右為細末飯和丸麻子大米飲下食前量兒大小加

減

聚寶方黃龍丸

定小兒疳冷瀉

朱砂

研一錢

龍腦

半字

研

硫黃

一兩

雄黃

二錢半

先用甘鍋子一隻盛雄黃

在內用盞一隻盛水半盞坐在鍋子上炭火燒甘鍋

其藥飛在盞底上刮下與朱砂硫黃同研入腦子糯

米粥丸如黃米大每服三丸食前椒湯下

吉氏蘆薈丸 治疝瀉不止不思飲食腹脹 丁香

肉豆蔻

去皮

木香

剉各半兩

上三味用麵裹慢火中煨

熟為度取出去麵入蘆薈

一兩

史君子肉

半兩

同為細末

稀糊為丸如黍米大每服十丸至二十九丸米飲下

湯氏治休息痢及疝瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不

妨便利不止用鷄子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大

以鷄子和炒空心喫盡百醫百效無不獲安

本事方治小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足瘡

止甚佳

錢氏大蘆薈丸

本門
通治

胡連麝香丸

榆仁丸

並見本
門出蟲

良方吳婆散 治小兒疳瀉不止日夜不計遍數漸漸

羸瘦

桃根白皮

黃檗

蜜炙

蕪荑

去皮

黃連

微炒已上
各二錢半

厚朴

薑汁
炙

木香

檳榔

丁香

各一錢

沒石子

一錢半

棟根

白根

一錢二
分半

研為末每服一字三歲以上半錢

五六歲一錢用紫蘓木瓜米飲調下乳食前一日三服予家小兒曾有患瀉百餘日瘦餘皮骨萬方不差有監兵鍾離君見之曰何不服吳婆散立可差也乃求方合與兩三服便效又孫男亦疳瀉勢甚危困兩服遂定若病深者服一兩日間決差此藥若是疳瀉無不驗者藥性小溫暴熱瀉者或不相當

丹溪治一富家子年十四歲面黃善啖易飢非肉不飽泄瀉一月來求治脉之兩手皆大怪不甚瘦倦以為濕

熱當脾胃困而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳蟲作痢也取大便秘視之果虵蟲所為適往他處有一小兒醫在側教其用治蟲藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治蟲而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服

之半月而止禁其勿食肉物三年當自愈

斗門經治小兒疳瀉方 宜用赤石脂杵羅為末極細

如麵以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更

妙

莊氏家傳治疳瀉久不差方 赤石脂 綠礬 石灰

各二兩
硫黃半兩

右研勻入罐子內燒令焰碧去火放冷取研每服一
字或半錢煎小黃米飲放冷調下食前服

又方 史君子

炮

五倍子

瓦上炒黃

沒石子

各等分

研為末

每服半錢陳米飲調下

疳痢宮氣方解小兒疳熱疳痢殺蟲用青黛不以多少

水研服

外臺治疳痢曉夜無度者取樗根濃汁及粟米泔各一
鷄子殼許以竹筒吹入下部再度瘥

治疳痢大孔開利不止以黃連末入麝香少許和勻以
竹筒吹入

圖經治疳痢以地榆單煮汁如飴糖與服便已

孟詵療小兒疳痢方 上用樗木根取白皮一握倉粳

米五十粒葱白一握甘草二寸炙鼓二合以水一升

煮取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮切用皆

同

聖惠治小兒疳痢不止下部痒青黛散 青黛 蟾灰

胡粉微炒 黃連去鬚 微炒 麝香細研各 二錢半 赤石脂半兩 訶梨勒

皮一兩 微煨 上件藥搗羅為散每服以乳汁調下半

錢日三四服量兒大小加減

殺疳丸 治疳痢不止 雄黃 麝香 牛黃 蘆薈

朱砂

各細研

龍骨

燒令赤色

蜜陀僧

燒紅細研

胡黃連

各二錢半

青

黛

半兩細研

金箔

十片細研

肉豆蔻

二枚去殼

蟾酥

一錢二分半熱水化如泥

右件藥搗羅為末入研藥及蟾酥研令勻湯浸蒸餅和丸如黃米大每以溫水下三丸煎黃連苦參湯洗身上用青衣蓋出蟲便瘥

白龍骨丸 治疳痢不止 白龍骨 白石脂 鷄屎

礬

燒令汁盡

黃連

去鬚微炒

胡粉

微炒

白茯苓

阿膠

搗碎炒令黃燥

各半兩

同搗羅為末煉蜜和圓如麻子大每服以

粥飲下五丸日三四服量兒大小加減

肉豆蔻丸

治小兒疳痢不喫乳食四肢瘦弱

肉豆

蔻

去殼一枚

木香

半兩

人參

去蘆頭

訶子肉

煨

朱砂

麝香

並細研各二錢半

同搗羅為末都研令勻用軟飯和丸

如麻子大每服以米飲化下三丸日三四服量兒加

減

聖惠黃連散

治小兒疳痢久不差肌肉消瘦面黃髮

焦啼叫不常

胡黃連

末

白礬

燒令
汁盡

白龍骨

末各
半兩

胡粉

微炒
錢半

二

右件藥同細研為散一歲兒每服以米飲調下一字

二歲服半錢隨兒大小量病輕重加減

蕪荑丸

治小兒久疳痢不瘥

蕪荑

半兩
末

羊子肝

一具

右先以羊肝切作片子以蕪荑末摻在肝內線纏合
米泔中煮令熟擣爛糯米飯和丸如麻子大每以粥

飲下伍丸早晨晚後各一服量兒加減

莊氏第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜服八香丸方

胡黃連

一錢

麝

各半

牛黃

一錢

蘆薈

一錢

蟾

酥

五捻子作塊者亦得

白花蛇

半兩酒浸去骨

蝎

稍半

研為細

末豬膽丸如黃米大每服五丸米飲下如患甚仍

用生米泔調作散半錢服日三服

治小兒腸鳴瀉痢口鼻乾常有鮮血日夜疼方 白朮

炮 硫黃

各二錢半

枳殼

炒

胡黃連

當歸

各半兩

研為

末每服半錢熟水調下

張道人第二急疔小兒疔痢下赤色膿血下部脫肛雖

有精神命在須臾但服此沉香丸方 沉香 人參

蝮

胡黃連

乳香

各一分

龍骨

甘草

各三分

研

末棗肉為丸如麻子大每服三丸米飲下日二服久

患七服效

木香丸

治疔痢

黃連

淨三錢

木香

紫厚朴

薑製

夜明

砂

隔紙炒各二錢

訶子肉

炒一錢

右為末飯丸麻子大乾

艾生薑煎湯食前下

疳痢腹痛白朮散 治小兒疳痢腹脹疔痛日夜三十

行

白朮

一兩
微炒

當歸

地榆

並剉
微炒

木香

赤芍藥

甘草

炙半
兩

已上藥搗麤羅為散每服一錢以水

一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減

胡黃連丸

治小兒疳痢腹痛不止

胡黃連

半兩

沒藥

木香

各二
錢半

已上藥搗羅為末糯米飯和丸如棗

豆大每服粥飲下五丸日三四服量兒大小加減

疔腫脹

治小兒五疔八疔及髮焦黃肚脹手足瘦細

肚上筋脉起指眼鼻涕垂至口咬指甲或下部生瘡

及大小便不通宜此療之

蘆薈

夜明砂

炒蛇蛻

灰

黃牛角屑

各一分

蟾酥

少許

研為末更入麝香少

許煉蜜丸如菘豆大每服三丸用米飲下服藥間仍

用桃柳葉湯浴兒了將青皂衣蓋之更用藥一丸至

二丸安兒臍中便着醋麵糊與青皂帛貼之候蟲出為度

如無蟲但汗出為妙服藥三日後宜減一丸

治小兒疳氣腹腫有似水氣方
肉豆蔻一個木香炮麝

香

朱砂

各一分

胡黃連

半兩

研為末飯丸麻子

大米飲下三五丸

莊氏第十八候用此方

吉氏家傳治疳肚如鼓方
蜜陀僧 風化灰各一錢 黃

丹

半錢

研為末以豬肉炙一片用藥半錢醮上與

喫如不會喫乳母嚼與

御苑勻氣散 治脾肺氣逆喘咳面浮胸膈痞悶小便

不利

桑白皮

二兩淨陳皮

一兩

桔梗

炒

甘草

炙

赤茯苓

兩

藿香

兩半

本通

兩四

薑水煎服

疔後天柱倒詳腎部天柱倒條

疔氣入陰漢東王先生家寶治小兒疔氣灌入陰黃亮

色烏金膏

通草

黃皮

大黃

各二錢半燒

各藥燒

存性為末每用一錢豬膽調成膏於陰上塗如未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

虛羸

母氣不足則羸瘦肉極 巢氏論小兒羸瘦不生肌膚
皆為脾胃不和不能飲食故血氣衰弱不能榮於肌膚
也挾熱者即溫壯身熱肌肉微黃其挾冷者即時時下
利唇口青白 小兒經諸大病或驚癇或傷寒或溫壯
而服藥或吐利發汗病差之後氣血尚虛脾胃猶弱不
能傳化穀氣以榮身體故虛羸也 錢氏虛羸冷者木
香丸主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連
丸主之冬月不可服如有證少服之

虛羸與疳同治也
木香丸胡黃連丸

見瘡條

薛氏云更當審其形色辨其聲音察其見證如面赤多啼心之虛羸也面青目劓肝之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而藥之又寒熱二證不可不辨若腹痛瀉痢清白不渴喜熱此屬寒證雖在夏月宜木香丸身熱煩躁瀉利焦黃作渴喜冷此屬熱證雖在冬月宜胡黃連丸皆捨時從證之治法也 錢氏論用藥

識證云鄭人齊郎中者家好收藥散施人其子忽藏熱
齊自取青金膏三服併一服而餌之服畢至三更瀉五
行其子因睡齊言子睡多亦驚又與青金膏一服又瀉
二行加口乾而身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏
其妻曰用藥十餘行未安莫生病否召錢氏曰已成虛
羸先煎白朮散時時服之後用木瓜丸十三日愈
白朮散見

渴木瓜丸見汗

薛氏治小兒十三歲面赤驚悸發熱形體羸

瘦不時面白噯氣下氣時常停食服保和丸及清熱等

藥余曰面赤驚悸心神怯也面白噯氣心火虛也大便下氣脾氣虛也此皆稟心火虛不能生脾土之危證前藥在所當禁者不信又服枳朮丸鎮驚等藥而諸證益甚大便頻數小腹重墜脫肛痰涎飲食日少余先用六君子湯為主佐以補心丸月餘飲食少進痰涎少止又用補中益氣湯送四神而愈畢姻後病復作墜時至仲冬面白或鰲色手足冷喜食胡椒薑物腹中不熱脈浮按之微細兩尺微甚乃用八味丸元氣復而形氣漸充

年至二十苦畏風寒面目赤色發熱吐痰唇舌赤裂食
椒薑之物唇口即破痰熱愈甚腹中却不熱診其脈或
如無或欲絕此寒氣逼陽於外內真寒而外假熱也仍
用八味丸而諸證頓愈 一小兒八歲面常青色或時
色赤日間目劓夜睡咬牙二年餘矣服清肝降火之藥
益甚形氣日羸求治於余曰肝主五色入心則赤自入
則青蓋肝屬木而生風故肝氣為陽為火肝血為陰為
水此稟肝腎精血不足虛火內動陰血益虛虛而生風

風自火出故變面赤目劄等證耳非外風也遂用地黃丸以滋腎水生肝木兩月日劄咬牙悉止又三月許諸證尋愈而元氣亦充矣凡肝經之證若肝木實熱生風而自病或肺金實熱而尅木者宜用清肝降火之劑以瀉其邪氣若肝經風熱而目直等證用柴胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸證用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水則愈 一 小兒脾氣虛弱飲食停滯發熱作渴服瀉黃散不時下

痢余先用保和丸二服而愈但不食惡心面青手冷又用六君柴胡升麻四劑面色痿黃食進手溫惟形體羸甚倦怠發熱小腹重墜肛門脫出用補中益氣湯加半夏肉豆蔻二劑而安凡脾胃之證若發熱作渴飲食喜冷或泄瀉色黃睡不露睛者屬形病俱實宜用瀉黃散疎導之若發熱口乾惡冷或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯寒水侮土者益黃散肝木尅脾者六君加柴胡若目

睛微動潮熱抽搐吐瀉不食宜用祕旨保脾湯凡小兒諸病先當調補脾胃使根本堅固則諸病自退非藥所能盡祛也 一小兒五歲形氣虛羸睡中咬牙夜間遺尿日間頻數余以為稟腎氣不足用補中益氣湯加補骨脂地黃丸加鹿茸以補脾胃而痊畢姻後小便頻數作渴發熱日晡益甚恪服黃檗知母等藥以滋陰降火後患腎痿卧床年許余因考績北上仍用前藥喜其慎疾半載而痊 一小兒年十一歲面白或赤足軟不能

久行用地黃丸加鹿茸年許而瘥畢姻後兩目羞明兩
足仍軟用前丸及補中益氣湯而瘥後病復發增口渴
足熱頭顱覺開視物覺大此腎虛瞳人散大而然也服
前藥遠房事則愈因不自保終患腎痿而歿仲陽先生
云此證屬腦髓不足不能榮養宜用地黃丸補之有至
七八歲或十四五歲氣血既盛而自合若縱恣色慾戕
賊真陰亦不能盡其壽矣 一小兒形瘦不時咳嗽自
用參蘇飲一劑更加喘急驚搐面白或黃余謂此稟脾

肺不足而形氣虛羸因前劑峻利外邪雖去而肺氣益
虛肺虛則宜補脾先用異功散加桔梗鈎藤鈎一劑痰
喘頓定乃去桔梗加半夏當歸再劑驚搐亦去又加酸
棗仁治之而安年十五歲發熱痰盛作渴面赤形體羸
瘦用地黃丸加五味子及補中益氣湯各百餘劑而形
氣漸壯若認為陰火用黃檗知母等藥復傷生化之源
其亦不治者矣 一小兒五歲尚飲乳耳前後頸間至
缺盆以手推尋其筋結小核如貫珠隱於肌肉之間小

便不調面色青黃形氣羸瘦此稟母之肝火為患用九
味蘆薈丸五味異功散加山梔柴胡與兒飲之又以加
味逍遙散與母服之尋愈 一小兒患虛羸耳出穢水
左手尺關洪數而無力余為清肝補腎耳中雖愈脉未
全斂畢姻後患瘵證誤服黃檗知母之類復傷元氣不
勝寒暑勞役無日不病幾至危殆余大補脾腎滋元氣
而愈 一小兒患症如前肢體消瘦面色痿黃大便酸
臭此脾虛食積用四味肥兒丸五味異功散治之而愈

一小兒九歲吞酸惡食肌體消瘦腹中作痛余謂食積虛羸也用保和丸而愈後腹中數痛皆服保和丸余曰此因脾胃虛而飲食所傷也當調補脾土以杜後患不信後腹痛喜按余用五味異功散二劑因未應自用平胃散等藥腹脹作痛余仍以異功散加木香四劑而愈若屢用攻伐之劑陰損元氣多致虛羸慎之

參苓白朮散

方見不乳食

地黃丸

加肉桂一兩名
加減八味丸

治小兒肝經虛熱血燥或風客

淫氣而患癰癰結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎疝腦熱消瘦手足如冷寒熱往來滑瀉肚脹口臭乾渴齒齲潰爛爪黑面黧遍身兩耳生瘡或兩耳出水或發熱自汗盜汗便血諸血失瘡等證其功不可盡述

即六味地黃丸方見腎藏

補中益氣湯 治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等證

人參 黃耆 各一錢
白朮 甘草 陳皮 各五分
升麻

柴胡

各二分

當歸

八分

右薑棗水煎空心午前服

愚按前方若因藥尅伐元氣虛損惡寒發熱肢體倦
怠飲食少思或魚飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉
洪大弦虛或微細軟弱右寸關獨甚者宜用之凡久
病或過服尅伐之劑虧損元氣而虛證悉具者最宜
煎湯若母有脾胃不足之證或陰虛內熱致兒為患
者尤宜用之

八珍湯

四物四君合用

錢氏異功散 治脾胃飲食少思吐瀉不食凡虛冷證

先與數服以正胃氣

即五味異功散見吐瀉

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母脾胃虛兒患此證亦當服之

外臺小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食羸惡辛苦乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿痿黃

瘦瘠四肢痿躄繚疾服之令充悅方

芍藥

一錢灸
令黃

黃耆

鼈甲

灸

人參

各四分

柴胡

八分

茯苓

六分

甘草

灸

乾薑

各二分如熟
以枳實代

已上藥搗篩蜜和為丸如大

豆服五丸日二服忌如常法千金有大黃無黃耆

服一丸一歲以上乳服三丸七歲兒服十九日二服

聖惠黃耆丸

治小兒羸瘦體熱面色痿黃不欲乳食

黃耆

剉

赤芍藥

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

胡黃連

各半

兩

麥門冬

去心焙

鼈甲

塗酥炙微黃去

裙襴各一兩

柴胡

去苗三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大不計時候以
粥飲下五丸量兒大小以意加減

秦朮丸 治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃 秦

朮

去苗

桑根白皮

剉

枳殼

麩炒微黃去瓢

地骨皮

黃耆

剉

人參

去蘆頭

赤茯苓

甘草

炙微赤剉

犀角

屑各半兩

龍膽

去蘆

頭一分

柴胡

三分去苗

已上藥搗羅為末鍊蜜和丸如

菘豆大不計時候用粥飲下五丸更隨兒大小增減

麥門冬丸 治小兒雖食不著肌膚羸瘦骨熱小便赤

黃

麥門冬

去心焙
一兩

人參

去蘆頭

黃耆

剉

青蒿子

黃連

去鬚

桑根白皮

剉

枳殼

麩炒微黃去穢

地骨皮

各半兩

柴胡

去苗

三分

上件搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大不計時

候以熟水研五丸服量兒大小以意加減

燒黃瓜丸

治小兒羸瘦體熱乳食全少

黃瓜

大者一枚

陳橘皮

湯浸去白穢焙

黃連

去鬚各半兩

鼈甲

童子便浸三宿炙微黃去裙襴

胡黃連

柴胡

去苗各一兩

已上搗羅為散以黃瓜

切開頭去瓢內藥末令滿以切下盖子蓋之用香麥
麩和搜固濟可厚三分於塘灰火內燒令麩焦黃為
度取出去麩放冷入麝香一錢都研和丸如菘豆大
每服食前米飲下七丸更量兒大小以意加減

大黃丸 治小兒胃氣不調不嗜食不生肌肉 大黃

乾地黄 茯苓 當歸 柴胡 杏仁

各三分

為末蜜丸麻子大飲下五丸日進三服

豬肚丸 解小兒肌熱時或泄瀉及有積滯不思飲食

肌肉消瘦

鼈甲

一兩同童子小便并醋共一升熱浸炙盡為度

白朮

薯蕷

各一兩

胡

黃連

人參

去蘆頭

青橘皮

紫苑

去土

桃仁

湯浸去皮尖雙

仁

木香

甘草

炙各半兩

柴胡

去蘆頭一兩二分

已上藥搗

羅為末入在淨豬肚內繫定煮令極爛為度出與藥同杵令黏和如桐子大每服二十丸不計時候溫水飲下

香甲丸

治男子婦人童男室女氣血虛疎肌膚消瘦

百節疼潮作熱五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿
氣滯婦人經血凝澀健脾胃暢神氣充肌膚澤顏色

柴胡

生乾地黄

京三稜

各三分

鼈甲

醋煮黃

神麩

杏仁

熟乾地黄

麥蘖

炒各一兩

牛膝

木香

薑

黃

當歸

各半兩

白朮

川芎

各一分

研為細末白

麩糊丸如梧桐子大每服十丸空心茶清下或米飲
亦好

右八方挾熱者宜之

聖惠訶梨勒散 治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食不

欲乳食四肢不和 訶梨勒皮 陳橘皮

湯浸去白
瓢焙各半

兩黃耆剉 人參去蘆頭 白朮 藿香 桂心 白朮

苓各一分 甘草炙微赤
剉半分 已上藥搗麤羅為散每服

一錢以水一小盞入生薑少許棗一枚煎至五分去

滓溫服日三四服量兒大小以意加減

溫脾散 治小兒脾氣不和食少無力肌膚羸瘦 訶

梨勒皮 人參去蘆頭
各三分 白朮 木香 黃耆剉 白

茯苓 藿香 陳橘皮 湯浸去白瓢焙 桔梗 去蘆頭 甘草

灸微赤 剉一分

已上藥搗麤羅為散每服一錢以水一

小盞入生薑少許棗一枚煎至五分去滓不計時候
量兒大小增減溫服

五香煎 治小兒脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦 丁

香 沉香 木香 藿香 白朮 各一兩 麝香 三錢 細研

入 白茯苓 陳橘皮 湯浸去白瓢焙 黃耆 剉各一兩 訶梨勒皮

甘草 灸微赤 剉 各半兩 已上藥搗篩為散以水五升慢

火煎至一升以布絞汁却入鍋內煎麝香及蜜三合
生薑汁半合棗肉二十枚慢火熬成煎每服以粥飲
調下半茶匙量兒大小以意加減 右二方挾冷者
宜之

湯氏云小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸
乃積而生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草

黃連

燕莢

去皮先炒黃色次入
前二味一處炒赤色

各一
兩

研為末另入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍

米大三歲兒服三十九空米飲送下

露星膏

黃耆

蜜水

胡黃連

地骨皮

柴胡

各等分

右為末煉蜜如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯浸服之

錢氏橘連丸

治疳瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮

一兩黃連

米泔浸一宿一兩半

研為細末另研入麝香五分

豬膽七個分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟米粥和丸如菉豆大每服十丸至二

三十丸米飲下量兒加減無時

海藏云黃連苦燥可
以瀉脾火長肌肉

二聖丸

治小兒藏府或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連

去鬚

黃蘗

去麤皮
各一兩

研為細末入豬膽內重湯

煮熟丸如菘豆大每服二三十丸米飲下量兒加減

頻服無妨

張渙金粟丹

方見內
疳條

香蟾丹

治肌瘦面黃胸高脚細

乾蟾

五枚水浸去
骨用瓦藏餅

一枚頂頭上取開入蟾餅內鹽泥固濟未炭火燒
留一竅子以烟息為度取出地上放一宿出火毒

胡黃連

二蛇 蛇皮

一兩 燒灰

地龍

半兩 微炒

天竺黃

蟬殼

各一分已上並
為細末次入

朱砂

半兩 細研

麝香

一分 細研

右件都一處研勻糯米飯和如黍米大每服十粒米
飲下不拘時候量兒大小加減

萬人方雷丸散

治小兒一切疳肚脹腹滿手脚枯細

眼目口鼻生瘡身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦面無

光澤

雷丸

生 鶴蟲

生 史君子

去殼

胡黃連

微炒 蘆薈

研各半兩

麝香

半錢 蟾

一枚 酒浸

一宿 慢火

炙熟 去皮

足骨 焙

木香

肉

豆蔻

各一分

蕪荑

一兩去皮
微炒研入

朱砂

二錢研留
少許為衣

已上

藥搗羅為末研合令勻用豬膽四個取汁傾入瓷
盞中外以重湯煮過和杵為丸如黍米大每服五丸
至七丸麥門冬熟水下早晨日午空心臨卧服

孔氏神聖丸

肥小兒疳藥常服永無腸藏之疾

胡

黃連

去皮

宣連

去毛

白蕪荑

去皮

木香

蘆薈

各一錢

史君

子

二十枚

上除蘆薈一味外五味銀器內用豬膽

汁熬成膏後入蘆薈同丸如菜豆大每服五七粒空

心日午臨卧米湯下神效

豬肚丸

治小兒疳熱面瘦

柴胡

黃連

秦艽

各一

兩

蕪荑

二兩用瓦上焙乾去殼
取肉別為末臨時入用

用豬肚子一個

中庸者破開洗淨入前藥三味末於內以酒半餅童子小便一升煮乾舂令得所放蕪荑末又舂勻丸如桐子大每服二十九飲下

王氏手集治小兒疳瘦大人五勞七傷方

宣黃連

斤半

去鬚及蘆頭為細末

積豬肚

一個去脂膜將黃連末穰正內縫合於三斗米內蒸以米熟軟

為度

上藥取出爛研丸如粟米大風乾隨兒大小
加減日三服三歲兒每服五七丸至十九大人服如
桐子大每服二十九丸空心米飲下

趙氏斧槌丸

治小兒疳久服肥白

乾蝦蟆一枚白礬

膽礬

綠礬

各半兩四味同入罐子內炭火燒礬枯為度

京三稜

石

三稜

雞爪三稜

草薺

鶴蝨

雷丸

淡蕪

萸

黑狗脊

木香

各半兩

沒石子

三枚

史君子

十枚蘆

蒼

熊膽

各一錢

研為末醋煮乾棗取肉爛研入

少麵糊和藥極熟丸如菘豆大每服七丸米飲下

玉柱杖散

治小兒疳瘦

黃芪

二兩

白茯苓

半兩

人參

白朮

各一兩

研為末以水一盞藥一錢煎七分溫

服

蘆薈丸

治小兒諸疳羸瘦不生肌肉

蘆薈

木香

紅芍藥

沒石子

各半兩

史君子

去殼

胡黃連

各二錢半

肉

豆蔻

二人錢

人參

一錢

右為細末入麝香半錢別研令細與藥拌勻蜜水打

麩糊為丸每服十五丸米飲下空心食前服

吉氏益兒丸 治小兒一切疳瘦夜多盜汗肌肉熱

人參 白朮 茯苓 柴胡去苗 甘草炙 陳皮去白 鼈

甲醋炙去裙襴 京三稜濕紙裹煨香 為細末煉蜜丸

如鷄頭實大每服一九米飲化食前日三服

朱氏家傳肥兒丸 白蕪荑去殼 黃連去鬚 神麩 麥蘖

各等分

右為末用豬膽煮糊圓如大麻子大每服三十丸

食前米飲下張氏家傳莊氏家傳方皆同或治疳積
或治疳瘦

六味肥兒丸 治疳多因缺乳食肉大早或患臟腑胃

虛療諸般疳化蟲治黃瘦肚急消疳退疳熱可常服

黃連

局方加肉豆蔻

陳皮

去白局方去此用木香

神麴

炒局方有史君子

麥

藥

炒各一兩局方加三稜蓬莪

川棟肉

炒一兩

白蘼蕪

半兩局方去此用攢

榔

研為末神麴糊丸麻子大每服三十丸空心

米飲吞下 薛按前方又治脾胃飲食少思肌肉消

瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴精神怠
倦大便秘臭嗜食泥土或口鼻頭生瘡肚見青筋牙
齒下利便白五疳用此丸加乾蟾一兩蘆薈五錢尤
妙

秘方肥兒丸

消疳進食

黃連

錢五

木香

錢一

神麩

麥

藥

各一兩
並炒

史君子

煨

肉豆蔻

錢五

檳榔

錢一

蝦蟇

一枚

一個白朮

一兩

右為末麵糊丸如粟米大空心米飲下量兒加減

朱氏家傳治小兒脾疹疳瘦驚積方

右用黃蘗一個去瓢用黃連末填滿蒸爛取出用
朴硝末一錢蓋頭臨夜方取然後露一宿研爛為丸
如小菘豆大每服五丸熟水下

潔古云小兒疳病肌瘦血氣不足同大人勞瘵之疾治
之 按以潔古此論詳之不拘冷熱虛羸皆用四君子
地黃丸與前藥相兼服為得也然有胸膈積痰不受參
朮地黃之補者先用清疳取積之藥然後補劑可施故

備載諸方以俟採擇誠以病之變態多端非執一隅可
以御百變若看方三年無病不治者鮮不以為繁雜矣
針灸羸瘦不生肌膚 胃脘壯灸一

田小兒疳瘦於胃下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠
骨尾上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾
翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦賁豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴

各灸七壯

鶴節

湯氏云小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黄丸加鹿茸牛膝

地黄丸 治頭顙不合體瘦骨露有如鶴膝皆腎虛不足并治腎疝天柱傾倒腎主骨也

熟地黄

洗焙
八錢

澤瀉

洗二
錢

牡丹皮

去
心

白茯苓

各三
錢

山

茱萸肉

牛膝

鹿茸

炙

山藥

各四錢

為末蜜丸梧子大三歲已下三二丸溫水空心化下

丁奚

疳脹異名

巢氏云小兒丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精減損無以榮其氣血致肌肉消瘦其病腹大頸小黃瘦是也若久不差則變成谷癥傷飽哺露病一名丁奚三種大體相似輕重立名也 真珠囊凡小兒或因吐而瀉久不差或病退不

能行膝大腸紅號曰丁奚七歲已下號鼓椎風十五已下號鶴膝風蓋此並是風冷傷於腎所致腎主骨故也
莊氏疳脹丁奚辨證云小兒腹大如有青筋見即曰疳脹也如無青筋乃名丁奚是因過飽傷食而得之

曾丁奚者亦久積成疳之證皆因飲食過傷於脾胃胃虛不能磨化飲食飲食漸減無以生其氣血面白色慘潮熱往來腹大而多青筋手足如筒顛顛開解頸項

小而身黃瘦先投萬應丸

通治五疳

次參苓白朮散

不乳食 早

晨一服與養胃氣及醍醐散進食食後下烏犀丸積三粒

至五粒助脾化食此即用迎奪之法間投醒脾散慢沉

香檳榔丸木香莪朮丸宿食次第調理有渴瀉腹痛千金

膏自好若脾氣稍和飲食漸進再以化癖丸積快活丸

常服或用烏犀丸略下二三行勻氣散疝止補有寒熱

往來柴胡飲疝熱主之腹脹投南星腹皮散水腫有餘熱麥

芽柳枝煎湯調三解散潮熱有蟲下史君子丸腹病斯疾得

之非一朝一夕然施治之法亦須漸漸令其平復欲求

速効則難矣凡鷄酒羊麪魚酢甘甜生冷毒物宜忌之
十全丹 治丁奚哺露神效

檳榔 枳殼麪炒 青皮 陳皮 三稜炒 蓬朮炒 砂

仁各半兩 丁香 木香各一分 香附一兩

右為末神麪糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸
一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白菴史
君子蘆薈蝦蟇川芎

醍醐散 治吐瀉後調和脾胃消進飲食及丁奚哺露

虛熱煩渴氣逆心惡

陳皮

去白

縮砂仁

厚朴

去粗皮剉碎薑汁

沒一宿慢火焙乾

麥芽

洗淨

焙乾

烏梅

和枝各五錢

良薑

剉東壁土炒

乾葛

烏藥

各二錢半

草

菓仁

炮二錢

甘草

炙三錢

剉碎每服二錢水一盞薑

二片棗一枚鹽少許煎七分空心溫服

快活丸

治丁奚疳證皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋

小便白濁睡卧煩躁神氣昏沉常服健脾化積進食

肥肌

蒸餅

一兩去頂剝空入青礬半錢重仍以碎餅屑緊塞上用水紙封定灰火中炮透取出候冷

之用

右件剉焙為末別以肥棗用米泔水浸經一宿飯上蒸少時去皮核用乳鉢爛杵如糊同前餅末亭分再杵勻丸麻仁大每服三十丸至五十丸溫米清湯無時送下兒小者亦以米湯化服其蒸餅不拘個數大約以一兩入青礬半錢重為定下常如前法製半斤作一料後人切勿以見方不重藥為誤余嘗屢試屢

驗其餅如南饅頭樣者是也

聖惠赤芍藥丸 治小兒丁奚雖食不生肌肉腹大食

不消化

赤芍藥

川大黃

微炒

鼈甲

醋塗炙令黃去裙襴各三分

桂心

赤茯苓

柴胡

去苗各

已上藥搗羅為末鍊蜜

和丸如麻子大每服煎蜜湯下五丸日三服

嬰孺芍藥丸 治小兒百病有寒熱大腹食不消化不

生肌肉痿痺

芍藥

茯苓

大黃

各五分

柴胡

四分 鼈

甲三分 桂心二分 人參一分 研為末蜜丸三歲

已下服三小豆大不知加之七八歲三桐子大不知加之苦腹堅大者加鼈甲一分渴者加菰蘆二分病甚者服二十日効已試大良一方有杏仁二兩人參三分

張渙大射香丹 治小兒羸瘦腹大見青筋及丁奚等病

射香研 朱砂細研 粉霜研各半兩 五靈脂 肉豆蔻仁

乾蟾

塗醃炙
各一兩

夜明砂

白礬灰

各半
兩

乾地龍

炒一
分

乾蠃

七個去翅
炙令黃熟

右件搗羅為末與朱砂等同研勻細煉蜜和如黍米

大每服三粒至五粒溫水下量兒大小加減服之

初虞世治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨鷄子破頂

入蜘蛛一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛

食其鷄子累効必數枚方愈

肘後方搗生薤根以豬脂煎稍稍服 或熟炙鼠肉哺

之亦治哺露

哺露

湯哺露者因乳食不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損
肌肉不榮骨柴羸露吸吸苦熱謂之哺露也宜射香進食

丸

方見
積癖

曾哺露者亦由乳哺不節損於脾胃脾胃損而飲食減
形容羸瘦則藏府之氣不能宣通時有熱之謂哺露
此候與丁奚相去不遠但食多吐逆藏氣虛冷而泄瀉

無度糞中有蟲治法同前丁奚證藥惟加養藏湯服之

方見赤

白痢

聖惠人參丸 治小兒哺露失衣當風濕冷水浴苦腹

大時痢或寒熱如瘧不欲食縱食不生肌肉或不消


化四肢羸瘦

人參 麥門冬 去心焙 半夏 湯洗七遍去滑 黃耆 川大黃

微炒 白茯苓 柴胡 黃芩 各三分 訶梨勒 煨去皮 甘草

災微 赤對鼈甲 塗醋炙令黃去裙襴各一兩 芎藭 半兩 已上藥搥羅

為末煉蜜丸如麻子大一二歲兒以粥飲下三丸四
五歲五丸日三服量大小加減



證治準繩卷九十四