

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百三

詳校官人醫院醫官臣姜景

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣樊宗清

欽定四庫全書

證治準繩卷一百三

明 王肯堂 撰

外科

潰瘍

大法癰疽已破膿出者是也 集驗云癰疽既破膿出
肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脈之洪數
漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色

鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥
十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢
大退氣血未復宜多用人參當歸黃芪四物湯之類癰
疽雖已見膿根脚赤暈反展開濶或不痛或大痛此毒
氣不退金銀白芷散十宣散去厚朴桂倍人參川歸黃
芪加忍冬藤連翹犀角瓜蔓根消毒之藥春末夏間及
秋初宜加酒芩黃連黃檗羌活腰已下可去桔梗見膿
後須以補氣血藥為主解毒藥助之或不宜於補藥者

宜忍冬九四圍腫焮處用毫針燒赤刺之約一米深紅
腫則縮服藥脈得和緩為佳或破後不潰瘍口堅硬者
風也用蜈蝎散傅之或蠹肉不腐用雄黃輕粉敷之大
忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃或兼他證
又另議藥治腐肉不知痛痒正黑者可去之但不傷四
畔好肉及裏面良肉當去外之黑腐者下皆去黃白如
絮之狀膿內有紅血絲路又不可動此項大膿次日必
自脫落庶免傷其良肉若怕刀砭三四日必自脫落但

用刀去者新肉易長毒氣漸消凡腐肉亦有少臭氣腐敗去後則無變四圍腐者漸漸去令淨用長肉膏貼間日用猪蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下面良肉色白而平略無紋理亦不能如米如粟不見漸生之意或膿水清淡或臭此積毒內連五臟血氣枯竭乃是危證肉不能長氣血不榮衛氣不護瘡則風寒著之用北艾黃芪湯熏洗生肌長肉藥傳之用乳香膏長肉等膏

貼之或肉雖長起色紫者遺毒也用地榆湯活血散敷追毒膏貼之即自紅活瘡口漸收仍用長肉膏貼或瘡口痒用細茶葱鹽煎湯熱洗或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消即使長肉必防流注之患或更糜潰瘡口如錢大時恐轉他證危殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可便去膏藥 兔遺方云凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫焮熱者即用緊急收赤

腫藥圍定不令引開中心即用抽膿聚毒散貼之急令
散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴
看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補
雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎不令再腫須
疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食
其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒
氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止矣內補
謂參芪之屬排膿
謂皂角刺之屬 薛膿熟而不潰者陽氣虛也宜補

之如聖愈湯之類瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑柴
火灸之 不作膿膿不潰氣虛也 托裏消毒散去金銀
花白芷連翹三味加參术肉桂如不應暫用十全大補
湯 腫赤作痛血凝滯也 本方加乳香沒藥如不應暫
用仙方活命飲 膿出反痛氣血虛也 去三味加參芪
歸地 潰後食少無睡或發熱者虛也 宜補之內補黃
芪湯之類 倦怠嬾言食少不睡者虛也 宜補之黃芪
人參湯之類 寒氣襲於瘡口不斂或陷下不斂者溫

補之十全大補湯 脈大無力或濇而微肌肉遲生者
氣血俱虛也峻補之十全大補湯倍用參芪 肉赤而
不斂血虛有熱也托裏消毒散去三味加熟地丹皮
肉黯而不斂陽氣虛寒也前散去三味加參芪白薇官
桂 漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也前散去三味加
人參白朮如不應如薑桂更不應急加附子 肉白而
不斂陽氣虛也前散去三味加參芪歸朮 腫多而不
斂氣血虛也前散去三味加參芪歸朮熟地黃如不應

暫用十全大補湯 飲食少思而不斂胃氣虛也前散

去三味加參芪如不應暫用補中益氣湯 飲食難化而不斂脾氣虛也前散去三味加參术如不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸 腫多而帶赤血虛也前

散去三味加歸地參术如不應暫用八珍湯加牡丹皮

出血作痛發熟等另分條在後

辨膿集驗云脈緊而數為膿未成緊去但數為膿已成以手按上熱者為有膿不熱者為無膿按之牢硬未有

膿也按之半軟半硬已有膿也大軟方是膿成也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之即復者為有膿也不復者無膿也小按便痛薄皮剝起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深也淺者宜藥點破高突者宜鍛針深者宜烙更詳虛實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久積陰生陽寒化為熱以

此潰必成瘻宜早服內塞藥以排之諸瘻瘤疣贅等至年衰皆自內潰不一於補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒熱發渴經久不消其人面色萎黃皮熱上蒸已成膿也治見本條手足指稍及乳上宜膿熟大潰方可開之麻痘後肢節上癰稍覺有膿便須決破遲則成攣曲之疾

取膿凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白

良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實
久而方消 夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並
宜灼艾惟癰膿成則宜針疽膿成則宜烙 切宜熟視
詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用替針丸
自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不可用針刀也

丹溪

云精要論戒用針刀業
外科者當參參服膺

替針丸 治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香

一字硇砂一字以上

沒藥

乳香

各一字

石灰餅藥內種糯米十四粒其法用石灰五升爐灰
三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三二
升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却
用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒
種在皮紙面上一宿即是

右為細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津
貼瘡頭薄處即破膿滯不快則用一粒納瘡口內使
膿不滯好肉易生

又方

雄雀糞

二十粒

硇砂

陳倉米

沒藥

各一字

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口眼中即

潰膿出

替針丁香丸

草烏尖

硇砂

白丁香

堅者

右為末酸醋調點將破者令速潰若急則無如刀快

蜞針一法亦妙見後

梅治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀糞塗頭上乾即易之雀糞中堅者為雄

本事治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紝之即膿出巴豆一枚去皮膜不去心油鹽豉十四粒口中含去皮令軟同研爛真麝香少許如雞丸入少稀糊捏作餅子如鼠糞大大小臨時看瘡口紝之只以紙燃子送入藥須臾必痛忍之良久膿遂出

丹出一切瘡口用出蛾繭殼燒存性無灰酒調下每服

一枚服下一箇時辰便有瘡口一箇若服兩枚出瘡口
兩箇

精癰成膿宜針其鐵用馬銜鐵為之形如韭葉兩面皆
利可以橫直梨開五六分許取其毒血如覺病輕須先
灸而後梨 嬌按癰如椒眼數十粒或如蜂窠蓮房而
膿出痛不除宜用針者以針橫直梨之則毒血挾膿出
而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必梨之也又法
當椒眼上各各灸之亦佳不必梨也

靈鍛針者末如劍鋒以取大膿也 夫癰氣之息者宜

以針開除去之

病疑篇王注云息癰也死肉也
今世用刀割去死肉者是也

治腐腫者刺腐上視癰大小深淺刺刺大者多血小者

深之必端內針為故正

長刺節論
之八字衍文也
大者多血小者深
刺七

字取膿之法
盡失備矣

精疽成膿宜烙可用銀篦大二分長六寸火上燒令赤

急手熨烙毒上得膿為効 兔遺凡癰覺在虛處及眼

不見處皆是惡症如發高腫紫赤皮薄光澤覺裏有膿

毒諸藥貼煥不破者宜用熟銅鍼於油火上燎透先用墨筆點定却當頭以針淺刺入隨針出膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紝紝入針孔引出膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫不退疼不除但膿出二逆也腫疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害稍緩即恐傷筋骨內疼凡近筋脈骨節處不得亂行針烙

反致他病也。患疽初生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一箇最大者即是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定挿入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作紝子紝入候次日取出其膿即隨紝下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙。凡患發背

覺似有膿成便用大熟鐵針烙當正頭上烙之其烙並
用麻油燈上燒令通紅烙入可二寸許初入肉即須橫
挿入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰熟更
不得用針烙如見橫長赤引開濶當須兩頭下火針令
膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少
瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也
尤宜詳審不可造次便行針烙亦看患人氣脈勻和榮
衛氣不積滯血脈不致凝澁即行針烙無畏切須仔細

患人氣虛脈氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可
容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針
烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引
膿如針刺無膿是氣伏也不可用針烙 丹或問烙法
如何曰膿或汪洋欲出柰何皮厚肉深難穴者既前無
內托之藥先致力於內後又不用烙以開竅脈膿何由
出蓋膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則
毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功於潰瘍

也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐嚇而脇取利也

發表一男子潰後發熱頭痛脈浮緊虛而兼表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈
一男子風襲瘡口牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而斂
一男子患癰將斂遍身作痒脈浮以消風散二服而止更以托裏藥而愈

攻裏薛一人胸患癰焮痛煩燥發熱作渴脈數而實時

季冬予謂此熱毒內畜須捨時從證欲治以疎黃連湯
彼以時當隆寒乃難用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二
劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連翹山梔四劑
出水而消 羅謙甫治賈倉使父

見發背

清熱一男子患癰潰而飲酒煥痛發熱服黃連解毒湯二
劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便秘脈實
者用清涼飲治之

己亥羅至元壬午有王伯祿者年五十七右臂膊腫盛

上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈症俱
寒舉瘻醫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔起
之膿清稀解待日再開之加呃逆不絕彥和與丁香柿
蒂湯兩服稍緩待日呃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲
食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸二七壯又處以
乾薑附子木香沉香茴香羌活類藥咬咀一兩半欲與
服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑
附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細

皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛呃逆者胃中虛極也諸腫瘍瘍皆屬心火是定理也此症內外相反須當捨時從症非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸症悉去飲食進瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者大人之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣况醫乎守常知變豈可同日而語哉 陳錄判母治案見 脾

托裏溫中湯 治瘍為寒變而內陷者膿出清稀皮膚

涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促呃逆不絕不得安卧時有昏憒

丁香 沉香 茴香 益智仁 陳皮各一木香

一錢 羌活 乾薑 炮各半錢 甘草 炙二錢 黑附子 炮去皮四錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦辛以附子乾薑

大辛熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活苦辛
溫透關節久火甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒
則嘔吐呃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散

寒為佐瘡氣內攻氣聚而滿木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也

右㕮咀作一服水三盞生薑五片煎至一鍾去滓不拘時溫服忌一切冷物

補虛薛一童子腋下患癰不斂膿清脈大倦怠懶食少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可 一男子腰患毒

膿熟不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈此人後患濕氣遂為痼疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療慎之一婦

人患臂癰瘍口紫陷膿清不斂彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及服十全大補湯百劑始愈一婦人患附骨癰久而不斂致腿細短軟脈

來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脈澁遲緩者易愈以其有胃氣故也脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑羸散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一男子腰中患此發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸木膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生大凡癰疽藉氣血為主若患而不起或潰而不腐或不收斂

及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脈大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若凍瘻流注之證尤當補益否則更患他證必難措置慎之一上舍年踰四十因怒腸內作痛不止數日

後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛予謂怒氣
傷肝致血傷氣鬱為患以小柴胡湯對四物倍用芍歸
黃芪貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫癟內外皆壅宜托
裏表散為主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不
可用況此證為氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復
求治視之虛證併臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予
謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑
少則更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪

肉桂芍歸數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而瘳夫成針之却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因榮衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛况各經氣血多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脈證俱屬不足腫癟內外皆壅宜托裏表散為主乃補氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫焮痛甚煩躁

脈大辛熱之劑不但腫癟不可用雖潰瘍亦不可用也
凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲老幼稟氣虛實
及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥
概治結腫之證以致取敗者多矣 趙無錫華氏年六
十患背瘡潰發大如旋盤而色赤想是平日多服金石
藥毒發所致問之果然因令侵晨飲羊血三五升始用
退熱解毒生氣血之劑煩以生肌膏半月後肌生膿少
予因歸令服此藥百餘帖方可安全一月後復來招徃

視其瘡皮肉已堅厚如常但食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不服脈之沉微甚因知其氣血止可供給瘡平而已於真氣則已竭不可治即古人所謂死於瘡結痂之後果不出月而死不獨此膿出後之虛若因虛而發癰疽者亦然若以常法攻之則氣血不勝藥力之散而愈虛邪得以乘機入內多成不救

加味十全湯 治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸 地黃蒸 當歸 川芎 人參 茯苓

芍藥炒白朮陳皮各一粉草炙桂心五味子

兩牛烏藥錢

右咬咀每服一兩用水一椀生薑五片棗二枚同煎分作二服留查晒乾為末服之丹溪云加味十全湯須者年之老壯資之強弱症之緩急時之寒熱加減用之

丹溪云加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實為切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其

不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科
於瘡癆腫平痛寬遂以為安漫不加省往往於結痂後
兩三月或半年虛證乃見醫者不察病者不悟無補接
調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱
求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言問不答肌上起
白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半
年前曾於臂背腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五
香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予為作參芪白朮

當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者
大半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨
藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白
丸子作料煎飲子頓服之予諫之不聽因而不救書以
為警云

補中益氣湯 治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾
發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脈洪大而
無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芪

炙一錢

甘草

炙人參

當歸

酒一錢

升麻

柴胡

陳皮

各三分

作一劑

水二鍾

薑三

片棗

二枚

煎一鍾空心服

人參養榮湯

治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦急肌肉

消瘦面色痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣

血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥

一錢半

人參

陳皮

黃芪

蜜炙桂心

當歸

拌酒白术

甘草

炙各一錢

熟地黃

酒拌五味子

炒杵

茯苓

各七

半分
遠志去心炒五分
作一劑水二鍾薑三片棗一枚

煎八分食前服

四君子湯 治脾胃虛弱或因耗伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜於前湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用四物沉陰

之劑脾胃復傷諸證蜂起若命火衰而脾土虛寒必

用八味丸以補土母

人參 茯苓 白术各二錢 甘草一錢

右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼耗伐腫痛不消或不

潰斂宜服此湯以壯營氣諸證自愈即前方加陳皮

半夏

異功散 治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

四物湯 治血虛發熱或因失血或因耗伐或因潰後
致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若
脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮
以補脾

熟地黃 當歸各三錢 芍藥二錢 川芎一錢

右水煎服

八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退
虛熱此氣血虛之大藥也

當歸酒
川芎 芍藥炒熟地黃酒
人參 白朮炒

茯苓錢各一
甘草分五
作一劑水二鍾薑三片棗

二枚煎八分食前服

十全大補湯 治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若氣血不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參 肉桂 地黃
蒸焙酒洗
川芎 白芍藥炒白朮

炒黃芪

鹽水拌炒一錢

當歸

酒拌各一錢

甘草

炙五分

作一劑用

水二鍾薑棗煎服

歸脾湯

治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能

攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾

作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候

不准晡熱內熱或唇瘡流注等症不能消散潰斂

白朮 白茯苓

黃芪

炒

當歸

龍眼肉

遠志

肉

酸棗仁

炒各一錢

木香

五分

甘草

炙三分

人參

一錢

右薑棗水煎服

黃芪人參湯 治諸瘍破後食少無睡及有虛熱穢氣

所觸者

黃芪錢二人參 白朮 麥門冬 蒼朮 陳皮

升麻 五味子 當歸身 甘草各一錢 黃檗炒四分

炒翹五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛瘍口不斂或膿熱內

熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便
不實等症

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎 菖蒲藥各一

錢 柴胡 甘草 各五分

右水煎服

內補黃芪湯

見癰疽兼症痛條

人參散 治癰疽內虛不足

人參 白朮 白茯苓 拘杞子 各一 熟地黃
兩

黃芪

二兩

桂心

白芍藥

當歸

微炒

甘草

炙各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不拘時溫服

麥門冬湯 治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬

去黃芪剉

五味子

炒白茯苓

去黑皮人參去

官桂

去粗皮當歸切

遠志

去芎藶各一錢半

甘草

炙七錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑半分擘碎大棗
二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服

護壁都尉 治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜
補之此潰後服至愈而止

防風去蘆厚朴去粗皮
薑汁炒苦梗

白芷

黃芪炙各半兩

川芎 甘草 柳桂 當歸各三錢人參二錢

右為末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更
服為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見

六味丸一名六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎為主凡
病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可

用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅
盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥
痛口舌瘡梨齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不
足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗
盜汗諸血失血失音水泛為痰之聖藥血虛發熱之
神劑也

熟地黃生者八兩

自製

山茱萸肉

山藥各二兩

四兩

白茯苓

牡丹皮

澤瀉各三兩

右地黃杵膏餘為末蜜和丸桐子大每服七八十九

滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患
流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不
化躋腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一
兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸治症同前即六味丸加肉桂五味子各一

兩

東垣癰疽用藥加減法
如發背疔腫膿潰前後虛而
頭痛者托裏藥內加五味子
恍惚不寧加入參茯神
虛而發熱者加地黃瓜蔓根
潮熱者加柴胡地骨
皮渴不止者加知母赤小豆
虛煩者加枸杞天門
冬自利者加厚朴 腫多者加當歸川芎 痛甚者
加芍藥乳香 肌肉遲生者加白薇官桂 有風邪者
加獨活防風 心驚悸者加丹砂 口目瞤動者加羌
活細辛 嘔逆者加丁香藿葉 痰多者加半夏陳皮

作痛丹溪云膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者

此為虛也宜補之

托裏消毒散去後三味加參芪歸地

脈數虛而痛者

屬虛火宜滋陰

托裏散加生地

脈數實而痛者邪氣實也宜

泄之 脈實便秘而痛者邪在內也宜下之

清涼飲

濇而痛者氣血虛寒也溫補之

定痛托裏散

亦有穢氣所

觸者宜和解之

東垣黃芪人參湯丹溪云芍藥乳香之類

亦有風寒所逼

者宜溫散之

敗毒散丹溪云防風桂枝之類

若有膿為脂膜間隔不

出或作脹痛者宜用針引之或用利刀剪之腐肉堵塞

者去之

丹權小娘瘡後右腿股生癧破後筋吊疼脈虛而濇詢
之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

川芎 當歸頭 條芩 生地黃 赤芍藥

牛膝

黃檗

甘草

炙二分

青皮

炒五分

檳榔

五分

通草

三錢桂皮一錢

右煎食前熟飲之

人參內托散 治瘡瘍潰爛而作痛者

人參 黃芪 當歸 川芎 厚朴 防風

桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草

右入糯米一撮水煎服

餘見後兼證痛門宜參者

發熱戴院使云未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見鬼
神膿去已多而大熱不休者似為難治蓋毒之得膿猶
傷寒表證之得汗汗已而反大熱則為壞傷寒矣又云
患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴縱

有發熱躁擾等證不可以治宜用益榮生津之劑若大

熱不止者難療 脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也

宜補氣

補中益氣湯

脈濶而熱者血虛也宜補血

四物湯

人參養榮湯

午前熱補氣為主

四君子湯

午後熱補

血為主

四物湯

脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散
之 脉沉數發熱而痛者邪在內也宜下之

薛瘡癆發熱煩躁或出血過多或潰膿大泄或汙多亡
陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表

之間而非火也若發熱無寐血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯發熱煩躁肉瞶筋惕氣血虛也用八珍湯大渴面赤脈洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脈沉而微陰盛發躁也用四君加薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發熱者重陽無陰也當峻補其陰治者詳之托裏消毒散加減法頭痛發熱邪在表也本方加川

芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用參敗毒散

頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹二味倍參芪

發熱飲冷便祕內熱也去參芪歸朮加大黃 發熱

飲熱便祕內虛也去二味加參芪歸朮 面目赤色

煩熱作渴脈大而虛血脫發躁也去連翹金銀花白

芷三味倍黃芪當歸如不應暫用當歸補血湯 身

熱惡衣欲投於水脈沉微細氣脫發躁也去三味加

肉桂附子如不應暫用附子理中湯 若婦人勞役

恚怒或適經行發熱譫語或夜間熱甚病在血分也
去三味加生地黃牡丹皮柴胡如不應暫用加味四
物湯

一男子膿熱不潰微痛少食倦怠發熱予為針之膿涌
出熱益甚乃虛故也急以人參黃芪湯二劑熱愈甚此
藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而
痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脈
洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛

發躁宜當歸補血湯主之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脈洪大按之無力此氣血虛寒也用十全大補加麥門五味治之其症益甚仍用前藥加附子一錢四劑諸證悉退却去附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰吐痰作渴頭痛惡

寒或熱來復去或不時而動仍用補中益氣數劑諸症漸愈元氣漸復乃去附子再加肉桂五分百餘劑而愈一男子背瘡不斂小便赤澁譽腫發熱口乾體倦脈洪數而無力用參芪歸木熟地芍芍陳皮麥門五味炙草肉桂以補元氣引火歸經脈症益甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉桂又數劑而愈此症因前失補元氣故耳操江伍都憲背瘡愈後大熱誤為熱火用苦寒藥一鍾寒熱益甚欲冷水浴身脈浮大按之全無余

曰此陽氣虛浮於肌表無根之火也急用六君子加附子一劑即愈

娘舅子見素膏粱厚味四十三歲疽發於背瘍醫投五香湯躁熱欲狂予固沮之而後已潰後平靜一日熱復大作五六日益甚脈洪數無倫醫皆以為虛宜補予私計膏粱之變重以五香之熱當治以苦寒且大便不行數日矣盍下之以泄其毒乎乃研石膏末兩許知母二三錢甘草一錢黃瓜蔓一枚和仁搗碎為一劑命僮熾

炭注水而自煎之醫夏生苦口力諫以隆冬潰瘍無用
白虎法余故復加石膏兩許而置大黃片五錢於袖中
湯既沸則以袖籠藥銚若為移遠火者而潛下大黃於
銚中時妻叔二三輩皆環爐坐注目而視不覺也夏生
語于聲甫飲是藥必死別去聲甫以告余哂之藥成持
以飲外舅少頃大便下結糞及食物未化者滿行圍中
熱退身涼乃以四君子湯調之月餘而平先是每旦診
脈皆言不思食食少而瘡大去死肉多自慮何以生肌

斂口乎予信之初意其便溺阻隔而漫下之亦不知其為傷食發熱也夏生愧甚遂徙去

黃芪散 治癰潰後補虛去客熱

黃芪 石膏各二兩知母 麥門冬去心白芍藥

白茯苓 桂心 熟地黃 人參去蘆川升麻各一兩

甘草炙微赤半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日三

四服

當歸補血湯 治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤
面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此
脈虛血虛也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃芪炙一兩當歸酒拌三錢 作一劑水一鍾半煎六分

服

沉香散 治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香剉 柴胡去苗黃芪 麥門冬去心一兩 各 白朮七錢半

熟地黃二兩 黃芩 瓜蔓根 甘草生剉各半兩

右判每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五十
粒煎至六分去滓不拘時溫服

加味逍遙散 治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒
熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或
發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳
腹脹小便欠利

甘草 炙當歸 芍藥 酒炒茯苓 白朮 炒柴胡 錢一
牡丹皮 山梔 炒各一

右水煎服

梔子黃芩湯 治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住用以退熱

漏蘆 連翹 山梔仁 黃芩去心防風 石韋如無

有以桑白皮代生甘草 生犀角屑人參 苦參各去蘆

茯苓去皮各二錢半生黃芪一兩去叉蘆

右為粗末每服四大錢水一鍾煎至六分去滓溫服
惡寒一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪大

料四劑而止。膿水尚多，投八珍湯加桂數劑，漸少。惟瘡口不合，以附子餅及十全大補湯每劑加炮附子五分，數劑乃去。附子又服月餘而愈。一男子潰後畏寒，脈虛，以四君子加炮薑四劑而愈。以十全大補湯月餘而斂。仲景云：脈虛則血虛，血虛生寒，陽氣不足也。瘡腫脈虛，宜托裏和養血信夫。

嘔逆丹溪治一老人年七十

云云見兼症嘔條

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土，生肺金，進美飲食。

方見內癥門

肺癰降下

禁忌丹五香湯即五香連翹湯去射干大黃升麻連翹加參犀角若用於腫瘍猶可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用於潰瘍雖多有參芪甘草之緩補而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎

精要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香美益其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾土若香美者

但能起火經以熱傷脾熱傷氣為戒今曰益脾養氣若施之於腫瘍者似有暢達之理潰瘍後用香美恐有發濕熱損真陰之患矣

精要云熱盛脈數與漏蘆湯單煮大黃等湯不甚熱脈緩弱只投五香連翹湯夫熱盛脈數若腫瘍時臟腑秘而體實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者熱盛脈數去死為近其可下乎緩弱之脈古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膿湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則津液生

氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示脈症何以知其當下後又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脈症恐自但有大渴必與峻下後尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪于不得內托以致熱毒衝心與琥珀犀角膏夫於腫瘍時用之猶或近理若

於潰瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不助病邪致虛以速其死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰體虛縱有舊熱將自漸因膿血而消何必以峻令利動臟腑若在秋冬何異用刀剝耶

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出不可專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者

又有先感寒邪脾氣不正而有此證者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散瀉衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之瀉衛可乎若用於腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又未知用於腫瘍耶潰瘍耶

免遺穴有孔慎風仍慎再合如再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性

恐傷氣害人之命也 三因瘡瘍未合風入為破傷風
濕入為破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認
治癰疽瘰疬潰後尤宜謹之

追蝕膿蠹癧之薄皮剝起癰疽之瘡口繫細瘰疬火針
破核之後皆可用追蝕破膿之藥癰疽開後瘡口再閉
宜用藥紝以通之或用紙或用髮或用乾稻草葉皆可
塗燃紝塗以蟾酥硇砂白丁香巴豆寒食麵之類或用
五灰膏隨輕重塗紝用之瘡疽腐敗可用手法去之或

用金寶膏去之或用雄黃輕粉傅之多待數日亦自脫落疽破後有蠹肉努出者遠志末酒調塗之則漸漸消去如不消用五灰膏塗之則消癰疽久流膿水不腐不敗氣血不能滋養瘡口滯毒日漸內侵好肉而為蠹肉膿水過處漸成膜管如鵝毛管而軟其瘡口如魚嘴樣日久不能愈筋爛骨壞用金寶膏或塗或紝或封之一日三四次用之不耐痛者一日二次用之其蠹肉膜管消盡以滋潤膏藥貼之 薛新甫云瘡瘍之症膿成者

當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫丹溪先生
云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅
固而行經活血佐之令其內消余嘗治脈症虛弱者用
托裏之藥則氣血壯而肉不死脈症實熱者用清熱之
劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內
皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散
已成自潰又何死肉之有若不大痛或不痛或不赤或
內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝炙及十

全大補加羌桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒
自解又何假於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍
加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死者自潰已
潰者自斂若初起或因射伐或犯房事以致色黯而不
痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附湯溫補回陽亦
有可生 吳庠史邦直之內仲夏患背疽死肉不潰發
熱痛甚作嘔少食口乾飲湯脈洪大按之如無此內真
寒而外假熱當捨時從症先用六君加炮薑肉桂四劑

飲食頓進諸症頓退又用十全大補仍加薑桂之類五
十餘劑而死肉潰又五十餘劑而新肉生斯人氣血充
盛而瘡易起易斂使醫者遂知預為托裏必無此患
六合回生丹又名六合合奪命散 治發背癰疽潰爛者有回生
之妙

鉛粉兩輕粉一銀硃一雄黃一乳香一

竈上炭焦沒藥一赤芍一

各二分牛共一
兩一錢二分半

右六味各擇真正好者研為極細末收貯凡治其病

先煎好濃茶將瘡洗淨軟帛拭乾後剖開豬腰子一枚用藥一分摻於豬腰子上却傳患處待豬腰子上發熱如蒸良久取去自此拔毒氣減痛苦定瘡口出膿穢不可手擠第二日依前法仍傳之第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同前

心陽焦閻老先生嘗施此方用藥一分傳一次則止
茶仙施此方加藥至三五分傳數次見効尤速功多
在拔其毒耳瘡口大者恐一箇豬腰子傳之不足可
加牛箇剖腰子法不可剖脫做兩斷須要相連成片

大約量瘡口大小捲藥則可用續豬
腰子為佳其腰子有毒宜深埋之

若臘瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上量
瘡大小裁其蠟紙炙熱捲藥一二分粘在蠟紙上面
貼瘡綿縛住任瘡出盡惡水即愈若患下瘡仍用豬
腰子切作寬片捲藥縛裏瘡上或以尖刀穿開豬腰
子納藥于內籠套其瘡亦良羊魚鵝雞犬鴨及發毒
菜物俱忌之

驪龍散 治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠五分牛糞

十二月生用餘月燒存性

鐵鏞各重一兩

右研細末以豬腦髓和好醋調傅瘡口三五次愈初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏 在膿潰後圍瘡口

麥飯石不拘多少炭火煅至紅以好米醋淬之如此煅淬十數次研為末重羅去粗者取細末入乳鉢數人更遍研五七日如麵極細為妙

白蘚

研為細末鹿角不用自脫者須用帶腦頂骨全者却是生取之角截作二三寸長炭

大燒令烟盡羅為末再

入乳鉢更過研令極細

右用麥飯石細末

二兩

白薇

末二兩

鹿角灰

四兩

務要研得

膿

精粗之異如此

和合量藥末多寡用經年好米醋入銀石

器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末用竹箇子不住手

攪熬一二時久令稀稠得所提出以磁器盛之候冷

以紙蓋覆勿令著塵用時先以豬蹄湯洗去膿血以

故帛搘乾鵝翎蘸膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但

留中心一口如錢大未潰能令內消已潰則排膿如
湍水逐日瘡口收斂斂瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊
布片塗藥貼瘡但內膜不穿亦能取安洗瘡不可手
觸嫩肉亦不可口氣吹著合藥亦忌腋氣之人及月
經見行婦人見之仍可熬好米醋一大椀收磁器內
候逐日用藥于瘡上久則藥乾以鵝翎點醋拂拭藥
上勿令絅也初則一日一洗一換藥十日後兩日一
換 古方云麥飯石顏色黃白類麥飯曾作磨者尤

佳按麥飯石不可作磨狀如麥飯團半粒點如無此
石常以舊麵家磨近齒處石代之取其有麥性故也
或溪中尋白石如豆如米大者即是也其石大小不
等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯

解毒百用膏

豬牙皂角 煨 南星 各一兩 大米 一合 合黑臭小粉 乾者四兩炒焦

去火
毒

右為末和勻蜜水調圍 治癩樸酒醋調圍

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用

逼毒散

黃藥子

白藥子

各一兩

赤小豆

二兩

雄黃

一錢

右為末水調傅

青散子 治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口

生肌

槿花葉

盛時收陰乾
取四兩為末

青赤小豆

白芨

各二兩

右為末臨時用槿花末三錢匕白芨小豆末各一錢

匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼
雄黃解毒散 治一切癰腫潰爛毒勢盛者先用此藥

二三次以後用豬蹄湯

雄黃一兩 白礬四兩 寒水石兩 煅一

熱入前藥一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

豬蹄湯 治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口
便須用此湯洗

香白芷

火不見

黃芩

去心

赤芍藥

露蜂房

取有蜂者

當歸去尾
羌活
生甘草各等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將獐豬前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油花盡下面滓肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫溫徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并月經見行婦人貓犬並不許入病人房洗瘡切勿以手觸著洗疽之

方所傳甚多唯此方極効其用露蜂房有理益以毒驅毒也

集香散 洗癰疽潰爛

白芷 薤香 茅香 香附子 防風

各三錢

木香

甘草各一錢 作一劑用水三盞煎數沸去渣淋洗

患處

薛按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得臭則逆即此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡或有

瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後宜用此方須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有瘡口即用膏藥貼之至收口為度最忌生肌之劑

熏洗方 凡諸發及癰疽癰癧瘻瘍湯盪火燒等疾或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤一握擂細用無灰酒瀘汁服之以滓傅瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之上俟其瘡出膿便以

殼豬蹄湯等十分淨洗久洗為妙至一二時辰不妨
次用後藥熏之

好降真香末 楓香末

右二味於銚中攪勻丸如彈子大却取香爐一枚依
爐口造紙烟筒一箇如燒龍涎香樣慢火薰之緊以
烟筒口薰瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更薰未出
膿者即出已出膿者即乾直候生肌合口然後止向
後有赤腫去處又再熏大概欲屏去穢氣也

金匱要略 卷之三
癰疽有死肉不去者用白丁香霜梅深則紐之淺則乾
掺於膏藥上甚妙

海又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉
不惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃散 以雄黃一錢另研巴豆不去皮研如泥
入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

烏金膏 治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生
若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰

若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙
燃薰紙其內有等發背因元氣虛弱或因尅伐元氣
胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之
劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋
如刀劃之狀中央漸黑漸脫須用純陽之藥以接其
元氣庶能收斂若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元
氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益
而又害之

用巴豆一味去殼炒黑研如膏丹於患處臨用塗之
追毒丹 治瘡疽黑陷者用針刀開瘡納此丹使之潰
然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆
治之

巴豆七粒去皮心
去油研如泥 不白丁香 輕粉各一錢 雄黃

黃丹各二錢

右件研和加白麵三錢滴水為丸如麥大針破瘡納
之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去

不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散 治瘡口惡肉毒潰膿血

巴豆五錢寒食麵一兩好細墨一錢

右為細末用水和麵作餅子將巴豆包定休教透氣文武火燒成深黑色為細末量瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用掃五七次妙

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水調稠厚周圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸勿令滾出麵外次日用金銀花煎湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

薛按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之劑

治惡瘡有死肉者及追膿保命

白丁香 輕粉 粉霜 雄黃 麝香 各一錢

右為細末新飯和作錠子用之

神異膏 治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃 五錢 滑石 倍 用

右為末洗後摻瘡上外用綿紙覆蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

止痛拔毒膏 治一切瘡發臭爛不可近未破則貼破已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

蟹螯四十枚 柳枝四十條 木鱉子七箇 乳香 没藥

麝香少許 松脂三錢

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹五兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪令勻入甕器中收了後用

郭氏青金錠子

銅綠錢三 青礬 膽礬 輕粉 硫霜 白丁香

苦草莖各一錢 腦子少許 麝香

右將草薢研細次下研藥同研極細打稠糊為錠子
或煉蜜加白芨末一錢為錠如麻黃粗細約二三寸
長者瘡口深淺紕入疼者可治不疼難治

第一般緊峻碧雲錠子砒霜生開瘡口用

第二般緊緩碧霞錠子砒霜煅去死肉用

第三般緩慢碧玉錠子去砒霜加枯礬生好肉用

翠霞錠子 治年深冷漏日久惡瘡有死肉用之

銅綠 寒水石 煅滑石 各三錢 明礬 腸粉 砒霜

雲母石

研如粉各一
兩二錢半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡口深淺紙之如修合候天色晴明則可

信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子 黃丹 砒霜 鷹屎 土硝 白芨

銅綠

鐵牛腦子 各一錢半
許少

麝香

右研細末些兒乳汁和為錠子用中病即止
紅玉錠子 去歹肉生肌

乾臘脂

白礬

枯各
三錢

輕粉

砒霜

砒霜

黃丹

腦子

麝香

各少許

右研極細末稠糊和為錠子用之

時効針頭散

追蝕惡瘡及肉兼治瘰癧

赤石脂

牛乳香

白丁香

各二錢

砒霜

生黃丹

各一錢

輕粉

麝香

各半錢

蜈蚣

一條燒乾

右為極細末摻於瘡口歹肉自去矣若動刀針其瘡

雖可有癥

追毒餅 治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不閉膿水自出瘡自乾好

極好信石錢半雄黃 雌黃 大硃砂錢各一輕粉少許

右研為細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之

肉服內追毒丹

方見前

薛按此以毒攻毒之意也嘗治一縣尹背癰竟背腐

潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用桃紅散色漸
赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此亦大
毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故攻毒有効然有
氣血虛不能腐潰宜補養氣血常治發背初起未成
膿先用烏金膏或援生膏點患處數點以殺其大勢
更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子
湯加藿香連進三五劑如外皮腐動用雄黃解毒散
洗之每日用烏金膏塗腐處候有瘡口即用紙作燃

蘸烏金膏紉入瘡內若有膿為筋膜間隔不出致作
脹痛用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用猪
蹄湯洗如膿稠焮痛飲食如常瘀肉自腐用消毒藥
與托裏相兼服之仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好
肉即去之如膿不稠不稀仍作痛飲食不甘瘀肉腐
遲用桑枝灸患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或
膿清稀不焮痛者服大補之劑仍用桑枝灸之以補
接陽氣解散鬱毒其肉自腐

翠青錠子 又名善効錠子治腦疽發背惡瘡并潰爛

追膿水長肌

銅青錢四明礬枯 韶粉

乳香另研青黛各一錢半白斂

輕粉各一錢

麝香半錢杏仁二七粒去皮尖另研

如有死肉加

白丁香一錢

右為細末稠糊為餅子或糯米飯和亦得看淺深絀之直至瘡平復猶可用之大有神効如前數方不宜多用謂犯生砒也此藥無毒恐病家猜疑是毒藥請

口內嘗之為憑也

搜膿錠子 先用追蝕等錠子蝕去歹肉惡物止有膿

水者宜因之

自然銅

川芎

白芷

各半兩

黃連

白薇

各二錢半牛

麝香

少許

右為極細末糯米飯和為錠子用之或作散末乾上

亦佳

右二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人無算凡瘡

口深而窄者先以綿杖子展淨膿水却以軟飯和成
錠子長短大小一以瘡為準須令藥至底乃効外以
膏藥護之若瘡口淺而闊大者藥湯洗過拭乾只以
乾末捲之如瘡口乾燥以自死竹蘸豆油點著以椀
承取滴下油瀝調前藥末雞羽蘸塗膿汁自止新肉
自生神効

麝香輕粉散 治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆

治

麝香 輕粉各半 白礬飛一錢 乳香 没藥各一兩

右為細末量瘡乾貼

神効當歸膏 治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能止痛推陳致新

當歸二兩 麻油四兩 白蠟五錢如用黃蠟一兩尤効 先用當歸入

油煎至焦黑色去渣入蠟鎔化即成膏矣此方用蠟為君前人每云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善訟者杖後隨食蠟

兩許飲酒一兩碗一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠍之功為大用者不可忽之

神異膏

精要

治諸般惡毒瘡癧發背癰疽其妙如神

露蜂房

要用蜂兒多者為妙細剪淨一兩

全蛇蛻

鹽水洗培乾

玄參

去蘆

各半

綿黃芪

七錢半

黃丹

五兩研細後入

杏仁

去皮尖切小片一兩

男

子亂髮

洗淨焙乾如雞子大

真麻油

一斤

右件藥先將麻油入銀跳中同亂髮於風爐上慢慢

文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變黑
好綿濾去渣再將所熬清油入銀鍋內然後入黃芪
玄參二味慢火熬一二時取出鍋子安一冷風爐上
候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝
急攪移鍋於火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿
濾過後復入清油在鍋內乘冷投黃丹急攪片時又
移鍋於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘
轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成

就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用甕器內
封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟
熬添麻油在內甕器盛封蓋於甌上蒸乘熱攪勻收
而用之膏藥熬成了須用所盛甕器置淨水盆中出
火毒一晝夜歇三日方可用熬此膏藥極難於火候
須耐煩看火緊慢火猛則藥中火發十萬謹戒膏藥方甚
多効無
出於此

垣熟瘡寒膏藥

當歸

水洗
乾一兩
半切如
寸許水洗
乾

杏仁

湯浸去皮
尖一百箇

黃丹

研細
六兩肥嫩柳枝

三兩半切如
寸許水洗
乾肥嫩桃枝

一兩切如
寸洗淨乾

麻油

一斤

右件先熬麻油熟下桃柳枝熬令半焦以綿裹當歸

杏仁同煎至柳枝黑焦為度去藥渣濾油澄淨抹去
銚中渣滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成滴水中
不散為度

寒瘡熱膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸梢桃柳枝分兩

倒過便是

神仙太乙膏 治八發癰疽及一切惡瘡軟癧不問年

月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣蟹大蛟傷
湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡
淨軟帛拭乾却用紺帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血
氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉
纏喉風並用新綿裹膏藥置口中含化一切風赤眼
用膏捏作小餅貼太陽穴後服以山梔子湯送下打

撲傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘻瘍鹽湯洗貼酒下一丸婦人血脉不通甘草湯下一切瘻癧并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參 白芷 當歸 赤芍藥 肉桂
去皮粗

大黃 生地黃各一兩

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬
黑色濾去渣入黃丹一斤青柳枝不住手攪候滴水
中成珠不粘手為度傾入磁器中以甄蓋口掘窖子
埋陰樹下以土覆三日出火毒欲服丸如雞子大

金絲萬應膏 治癩撲傷損手足肩背并寒濕脚氣疼
痛不可忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青半

威靈仙

黃蠟

各二兩

木鼈子

二十八箇

去殼切片

研子
蓖麻子一百箇
去殼研
沒藥各一兩
乳香別研
麻油夏二兩
春

秋三兩
冬四兩

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪候焦
黑色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤二
斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟蓖麻木蠻子泥不住
手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手扯拔如金
絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加瀝青試得如
法却下乳沒未起鍋在炭火上再用槐柳條攪數百

次又以籠布瀘膏在水盆內扯拔如金絲頻換水浸
一日却用小銚盛頓如落馬墜車於被傷疼痛處火
上炙熱貼透骨肉為驗連換熱水數次浴之則熱血
聚處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽貼背
心上

善應膏得効

治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫打
撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡
疥癬貼之即愈又治婦人吹乳以藥丸如梧子大新

汲水下二十九肺癰腸癰亦可為丸吞服溫酒米飲
或桔梗甘草煎湯皆可不可犯葷手及火焙

上等黃丹

八兩極細研

白膠香

明沒藥

滴乳香

並別研

研大當歸

川白芷

杏仁

去皮尖

大黃

草烏頭

川烏頭

赤芍藥

檳榔

生乾地黃

土芍

亂髮

洗淨滴青

別研各一兩

右除乳香汲水外將磁石銚子盛香油一斤浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮煎少時用生

絹帛瀘去滓留下一兩藥油復將所瀘油於慢火上
熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有
微烟起提起藥鉗將柳條點藥滴在水面上凝結成
珠不散方成膏如不成珠上火再熬直待成膏提起
藥鉗攪無烟出却入乳香沒藥白膠香末攪勻傾出
磁器內將元留下浸藥鉗油一併收拾器內用新汲
水將藥器坐放水內一日一換過三日出火毒方可
用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內攪勻得所

教膏極難於火候須耐煩者火緊慢火猛則藥中火發不但失藥性又燎傷製藥人面目慎之

玄武膏 治癰疽發背疔腫內外膿瘍陰症諸惡瘡及頭頂癰疽不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止疼生肌累有神驗若下腫先用銀篦或鹿角針於疔瘍中間及四畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却用此膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼則將皂角二三片煎油調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大土豆

去殼

木鱉子

去殼各二兩淨

黃丹

研細四兩

真清油

十兩

槐柳嫩枝

各七寸長七條剉細

右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏

治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋寒

諸病

當歸尾

川白芷

杏仁

去皮

玄參

豬牙皂角

去皮
草烏
各三
弦

生剉用

白膠香

明者八兩

連鬚葉葱

肥者十根

沒

藥

乳香

別研為末各半兩

滴青

明者半斤

黃蠟

明者一兩

男子亂

髮洗淨浸如雞子大

右用清油半斤將八味依前法熬濾却入膠香滴青
攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥

貼膏法 如瘡有膿血不淨痂癥閉礙須用藥水洗淨
拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用
紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日三日一
換貼至愈

長肌膏 治年久諸般爛瘡貼之即愈

白燭油

錢四
黃蠟八

香油八

大楓子去殼切

五錢黃連

三錢

番木鱉肉

切細二錢

黃檗三錢

右同煎濾去渣入後

枯礬三錢

輕粉三錢

蜜陀僧五分各

研細

右將前七味煎濾入後三味拌勻俟凝者瘡口大小
做薄餅簪穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶湯洗
瘡洗餅再貼以好為度

生肌夫肌肉者脾胃之所主也潰後收斂遲速乃血氣
衰盛使然但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑若膿毒

未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛而不斂其害大矣

薛氏云瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪晡熱內熱陰血虛也四物加參术膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應竹葉石膏湯熱渴而小便頻數腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗肉去後

新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日而斂蓋瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源為人身之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本牢固誠哉是言也可不慎歟 外治用翠青錠子者淺深紝之如刃肉惡物已去止有膿水却用搜膿錠子瘡口淺平則以散末乾上直至膿淨肉滿方用生肌散四畔輕輕摻之蹙令漸小以致於合則無他患矣

精要生肌散

寒水石 碎滑石 烏鰲骨 龍骨 各一
定粉

蜜陀僧 白礬灰 乾臙脂 各半

右為細末乾摻用之

平肌散 治諸瘡久不斂

蜜陀僧 煅花藥石 煅白龍骨 各一
乳香研輕粉 各一

錢

右為細末和勻乾摻

立應散

郭氏

治金瘡血出不止并諸瘡久不生肌

寒水石

煅一兩半

花藥石

龍骨

黃丹

沒藥

各半

黃藥子

七錢半

一方加白芨乳香輕粉

右為細末如一切金刃刀鎌傷者用藥敷上絹帛紮之不作膿血瘡膜水乾貼生肌定疼

生肌散

白礬

桔梗

檳榔各一兩

黃丹

血竭各一錢

輕粉

半錢

蜜陀僧

一錢半

紅玉散

軟石膏

兩半
煅

黃丹

炒一
錢半

完肌散

定粉

枯礬

黃連

乳香

龍骨

各二
錢

黃丹

輕粉

各一
錢

右各料為極細末貼瘡口生肌長肉者輕重選用之
生肌散 治瘡口不合

木香

二錢

黃丹

枯礬

各五
錢

輕粉

二
錢

右件各另為細末用猪膽汁拌勻晒乾再研細擦患處

薛按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也
蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類
以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰
爛耳若此方誠有見也亦有血氣俱虛不能生者當
用托裏之劑又有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆
豉餅灸之若流注頑瘡內有膿管或瘀肉或癰核須

用針頭散腐之錐子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大潰
當用神効當歸膏則能去腐生新止痛大有神効

神祕方 治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去膿
右用地黃汁一升松脂二兩薰陸香一兩羊腎脂牛
酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消即納
羊脂酥更用蠟半雞子大一同相和以慢火煎令水
盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

收口東垣斂瘡口方木香櫟榔散用之決無疼痛以蠟

油塗覆瘡上生肌斂肉甚速必無惡血瘡口疾令易取平復惟膏粱熟瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香檳榔散方

木香 檳榔 黃連各等分

右為極細末新汲水調攤紙上貼之濕則乾貼

治寒瘡斂瘡口藥

當歸身一錢洗淨晒乾青皮去白二分木香一分黃連五分

右四味為極細末蠟油調塗取効甚速

保命乳香散 瘡口大者

寒水石

煅

滑石

各兩

乳香

沒藥

各兩

腦子

少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

聖効散 収斂瘡口

黃檗

一兩去粗皮細切炒至赤黑色

穿山甲

一兩

炒黃檳榔

木香

各半

兩炒令黃色
雞腔脰生用七枚

右為細末每用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻瘡

上

桃紅散 敗瘡口定痛辟風邪

滑石四兩 乳香一錢 輕粉各二錢 小豆粉一兩 寒水石三兩

右為細末乾摻口上 一方改小豆粉為定粉

又方治瘡口久不收

小椒黑一錢炒 定粉 風化硝二錢 白礬半錢 乳香

沒藥各一錢

右為細末摻之

有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔膜耳自謂必死用大鯽魚一尾去腸肚以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥為細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮於瘡遂致如此用北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯澆洗瘡口四圍淨肉以絹帛兜艾葉乘熱澆沃一日一次洗了

須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無効夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熟洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪於冷滯大抵潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎

補接即參芪歸
术之類是也

蘇亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取一錢七酒調

金匱要略 卷一百三
服治瘡久不合神驗

丹溪云
陰之功甚大
髮補

收斂斂瘡口止有柳皮白芨煎湯飲之

黃丹散 斂瘡口

黃丹

煅

白芨

枯

龍骨

寒水石

乳香

木香

不見

黃連

火

黃芩

檳榔

膩粉

各錢

三腦子

許少

右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾却
摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則

又譽作



證治準繩 卷一百三