

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十五

詳校官太醫院院使臣張肇基  
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣王秉鉅

欽定四庫全書

證治準繩卷七十五

明 王肯堂 撰

幼科

肝臟門

驚悸

薛人身有九藏心藏神肝藏魂二經皆主於血血虧則神魂失寧而生驚悸也經曰東方青色入通於肝其病

發驚駭又曰二陽一陰發病主驚駭驚者心卒動而恐怖也悸者心跳動而怔忡也二者因心虛血少故健忘之證隨之用四物安神之類丹溪謂亦有屬痰者宜用溫膽湯加辰砂遠志之類若思慮便動虛也用養心湯時作時止痰也用茯苓丸觸事易驚心膽虛怯也用溫膽湯卧驚多魘血不歸源也用真珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定志丸恐畏不能獨處膽氣虛冷也用茯神湯睡卧煩躁膽氣實熱也用酸棗仁丸眩運驚悸風

痰內作也用本事辰砂遠志丸思慮鬱結脾虛氣滯用  
歸脾湯前證雖曰屬心與肝而血之所統實主於脾脾  
之志曰思思慮多則血耗損而不能滋養於肝心者脾  
使之也思慮內動未嘗有不役其心者夫心為君火之  
藏十二官之主也夫君之德不怒而威無為而治故宜  
鎮之以靜謐戒之以妄動動則相火翕合煽爍陰精精  
血既虧則火空獨發是以驚悸怔忡之所由生五志之  
火心所不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者

不可不知鎮靜而寡欲然人孰無思也思之正則無妄動之欲矣朱子曰必使道心常為一身之主而人心每聽命焉此善養於心者也

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽憚氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏湯洗竹茹 枳實炒橘皮去白各二兩 甘草炙一兩 白

茯苓一兩

半

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食前  
服

寧志丸 治心虛多驚若有所痰宜吐之

人參 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 當歸

酸棗仁 溫酒浸半日去殼 遠志 炒各半兩 乳香 硫砂 石

菖蒲 各三錢

右為末蜜九桐子大每服三十九食後棗湯下

茯神散 治五藏氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神定

志

茯神

去人參

龍齒

另研

遠志

去心

桂心

防風

獨

活

酸棗仁

細辛

白术

炒各三錢

乾薑

炮三兩

右為末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要茯苓補心湯 治心氣不足喜悲愁怒衄血面黃

五心煩熱或咽喉間痛舌本作強

茯苓

四錢

桂心

甘草

炒各三分

紫石英

煅

人參

麥門

冬

去心各一錢

大棗

二枚

右水煎服

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨處

胸中煩悶

茯神去木酸棗仁炒黃耆炒梔子仁炒白芍藥炒五

味子

杵桂心

熟地黃

自製人參各一

甘草

五錢炒

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡卧神志不安驚悸怔

忡

茯神去酸棗仁炒遠志去心柏子仁炒防風各一枳

殼炒生地黃杵膏各半兩青竹茹二錢

五分

右為末蜜丸梧子大每服七八十九滾湯下

定志丸 治心神虛怯所患同前或語言鬼怪喜笑驚

悸

人參 茯苓各一兩  
葛蒲 遠志去心各五錢

一兩

右為末蜜丸如梧子大每服七八十九滾湯下

治要茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心神

恍惚

茯神

麥門冬各一  
兩半

通草升麻各一  
兩

紫苑

桂心

各七錢  
五分

知母

一大棗一枚  
十二

淡竹茹五錢  
赤石脂

右每服一兩水煎

朱雀丸 治心病怔忡不止

白茯苓

二兩沈香半  
兩

右為末蜜丸小豆大每服三十九人參煎湯下

世傳密陀僧散 治驚氣入心絡不能語者昔有人為

狼及犬蛇所驚皆以此而安

密陀僧

研極細  
末如粉

右茶清調一錢七

丹溪硃砂丸 治勞役心跳

硃砂 當歸身 白芍藥 側柏葉 各三錢  
炒各一  
半

陳皮 甘草 黃連

炒各一  
錢半

右用豬心血為丸粟米大每服百丸龍眼湯下

本事辰砂遠志丸 消風化痰鎮心安神

人參

石菖蒲

去毛遠志

去心

茯神

各二兩

川芎

山藥

白附子 麥門冬

細辛 鐵粉

辰砂

各五錢

右為末用生薑汁入水糊丸菉豆大以硃砂為衣每

服一二十丸臨睡生薑湯下

加味歸脾湯去丹皮山梔即歸脾湯 治脾虛弱損健

忘驚悸等證

人參

黃耆

茯神

去木各一錢

甘草

五分

白朮

炒一錢

木

香分五遠志去心酸棗仁研龍眼肉 當歸 牡丹皮

山梔炒各一錢

右水煎服 愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調脯熟內熱或璽唇流注等證致兒為患者令子母俱服之

辰砂膽星膏 治小兒痰熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂一錢牛膽南星一兩琥珀青礞石末各一錢天竺

黃二錢甘草五分麝香少許

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時服薑

湯化下

木通散 治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心

火利驚熱

羌活 山梔子各二錢大黃煨木通 赤茯苓 甘

草各一錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不

拘時服

癇

婁驚癇即急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所觸為乳哺失節停結癖積而得之其候神氣拂鬱睡眼直視面目牽引口噤涎流腹肚脹膨手足搐掣似死似生或聲或啞

或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者為  
癇若一身強硬終日不醒則為瘡證矣

陰陽二癇陽癇初作時病先身熱瘦瘥驚啼叫噏而後  
發脈浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易  
治若病先身冷不驚瘥不啼呼而作脈沈者為陰癇  
乃慢驚也此病內在五臟外在骨髓劇者難治曾陽  
癇者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三  
次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三

度故曰三次所謂驚風三發便為癇即此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫咬牙手足掣搦面色紅紫六脈浮數以百解散加五和湯水煎疎解次下痰用水晶丹或半夏丸。陰癇者因慢驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脈息沈微故嬰孩寶書云睡中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加日生湯同煎調寬氣飲和解。

風驚食三癇千金云小兒之癇有三風癇驚癇食癇也  
風癇緣衣緩汗出風因入也初時先屈指如數物乃作  
驚癇起於驚怖大啼乃作食癇其先不哺乳吐而變熟  
後發然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二凡是  
先寒後發熱者皆食癇也驚癇皆按圖灸之風癇當以  
豬心湯食癇當下乃愈紫霜丸佳按此論三癇蓋有  
三因之分風癇屬外因驚癇屬內因食癇屬不內外因  
也又按全嬰方云風癇因將養失度血氣不和或厚衣

汗出腠理開舒風邪而入之其病在肝肝主風驗其證  
目青面紅發搐宜驅風膏大青膏琥珀散鎮驚藥有熱  
四順飲退後與利驚丸下其痰涎驚癇因血氣盛實臟  
腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入為之其病在  
心心主驚驗其證忽然呌聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮  
心丸有熱四順飲利驚丸下之不生別病也食癘其病  
在脾脾納食驗其證嘔吐酸氣即發搐此病或大便酸  
臭紫丸子下之已上三證大同小異並屬陽也各目睛

鮮斜手足潮搐或作豬聲發過即差皆十生一死也

五臟癇三因云古方有五癇五臟癇六畜癇等名證不同難於備載別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴以馬屬在午手少陰君火主之故其病應於心二曰羊癇作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應乎脾三曰雞癇作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之應乎胃四曰豬癇作豬叫聲以豬屬亥手厥陰心包主之應乎右腎五曰牛癇作牛吼聲以牛屬丑手太陰濕土主之應乎

肺此五癇應乎五畜應乎五臟者也發則旋暈顛倒口  
眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃乃甦各隨  
所感施以治法 錢凡治五癇皆隨臟治之每臟各一  
獸犬癇反折上竄犬呌肝也羊癇目瞪吐舌羊呌心也  
牛癇目直視腹滿牛呌脾也雞癇驚跳反折手縱雞呌  
肺也豬癇如尸吐沫豬呌腎也五癇重者死病後甚者  
亦死輕者五色丸主之 薛面赤目瞪吐舌齧舌心煩  
氣短其聲如羊者曰心癇 面青唇青兩眼上竄手足

攀掣反折其聲如犬者曰肝癇 面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如豬者曰腎癇 面如枯骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癇 面色痿黃直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癇 五癇通用五色丸為主仍參以各經之藥 心癇屬血虛者用養心湯發熱飲冷為實熱用虎睛丸發熱飲湯為虛熱用妙香散 肝癇者虛證用地黃丸抽搐有力為實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸 腎癇者用地黃

丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之 肺癇者屬氣虛用補肺散面色瘦黃者土不能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸 脾癇者用五味異功散若面青瀉利飲食少思用六君子加木香柴胡 按千金叙六畜癇無五臟之分屬錢氏始分之而無馬癇一證曾氏謂初發作羊犬聲者咽喉為風痰所梗聲自如此其理甚明言六畜者特强名耳故丹溪謂於經既無所據而治法亦未見有五者之分所以

不必分五也

治法仁齋曰大概血滯心竅邪氣在心積驚成癇通行  
心經調平血脈順氣豁痰乃其要也假令小兒有熱有  
痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癇之漸即以  
紫霜丸導之方見變蒸熟時間量與紫霜丸減其盛氣則無

驚風癇釣之患癇證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛  
如線見之則為爪破須令出血啼吠亦得氣通諸癇發  
不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩聲音道

路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮為末  
雄豬膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癇丸并南  
星散以菖蒲煎湯調下甘遂豬心湯和蘇合香丸一丸  
皆治癇之要藥也 劉小兒神尚弱驚則神不守舍舍  
空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致  
痰迷心竅而作者治法當尋火尋痰而前人多用鎮墜  
清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此  
藥未易驅逐在上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實

在裏者亦湏下之隨病輕重而用之也 潔如有客痰

發熱而有聲煎大黃荆芥湯下五色丸

潮熱有時積

熟也桃枝丸主之

方見積熱

壯熱不退當用地骨皮散

方見潮熱

下五色丸

風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫

不熱當用白虎湯加蒼朮下五色丸 薛此皆元氣不

足之證湏以紫河車

即小兒胞衣

丸為主而以補藥佐之設

若泛行劫伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多至

不救 一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐似驚癇

過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益氣湯而愈  
一小兒十歲一小兒七歲各有癇證歲發二次後因  
出痘及飲食停滯舉發頻數用六君子補中益氣二湯  
而愈一小兒患前證每發吐痰困倦半晌而甦諸藥  
不應年至十三而頻發用紫河車生研爛入人參當歸  
末丸桐子大每服三五十丸日進三五服乳化下一日  
漸愈又佐以八珍湯全愈一小兒七歲發驚癇每作  
先君令其恣飲人乳後發漸疎而輕至十四歲復發仍

用人乳不應余令用肥厚紫河車研爛人乳調如泥日  
服二三次至數具而愈後常用加減八味丸而安至二  
十三歲發而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大  
補湯而痊

通治五癇錢氏五色丸

硃砂

研半  
丙

水銀

一研半  
丙

雄黃

熬一  
丙

鉛

三丙同熬  
丙

水銀

熬真珠末一  
研

丙

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹

雄黃 雌黃 朱鑽真珠各一  
鉛成屑 水銀一  
半

右研合極勻蜜丸桐子大每服三丸至五丸薑棗湯  
下湏搗二三萬杵乃可丸

風癇口議云先用化痰寬利胸膈開通關竅安鎮心神  
然後與治風癇藥服之又云先用化風丹去其風熱次  
服奪魂散定癇

散風丹 治小兒風癇先用此藥

牛膽南星一錢 羌活 獨活 防風 天麻 人參

川芎 荆芥穗 細辛各一錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不拘時送下

保安丸 治小兒諸風癇久後亦驗

五靈脂半兩 川烏生用去皮  
尖二錢半

右為末豬心血為丸如梧桐子大每服一丸用生薑

湯化下不拘時服

獨活湯 治小兒風癇解表通裏

獨活 麻黃去川芎各一錢 大黃 甘草炒各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時溫服

細辛大黃湯 治小兒風癇內熱

天麻 防風各半兩 細辛 大黃焙各二錢半 川芎各二錢半 甘草

錢半  
炎一

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四分  
不拘時服

牛黃丸 治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽南星 全蝎

焙去毒

蟬殼各二錢半

防風

牛黃

白附子

生真殭蠶

炒去絲嘴

天麻

各一錢半

麝香

錢半

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次  
入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荆芥生薑煎  
湯送下不拘時服

化風丹 涼風化痰退熱定搐

牛膽南星

二錢

羌活 獨活

天麻 防風

甘草

荆芥穗

人參

川芎

各一錢

右為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯化開

服

一方有全蝎一枚

辛無甘草

驚癇口議先涼三焦利驚去熱安神定志平調臟腑溫化痰涎然後與治驚癇藥服之

比金丹

人參 白茯苓 遠志去心 山藥 辰砂 天麻

石菖蒲 川芎 甘草炙各一分 天南星炮二錢生薑汁製 腐

香字

右為細末煉蜜為丸皂子大每服一粒煎金銀薄荷湯化下 一方有琥珀錢二錢 青黛一錢 無山藥

錢氏蛇黃丸 治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃真者三箇火煅醋淬處為末 鐘金七分一匙 膜香另入一匙

右為末飯九桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水化

下

鎮驚丸 治小兒一切驚癇

茯神

去心木  
鐵粉

遠志

去心  
薑  
製培

紫石英

燒醋  
淬研

人參

去  
蘆

琥珀

滑石

蛇黃

煅醋  
淬

南星

炮各二  
錢半

龍齒

熊

膽

各半  
分

輕粉

三  
分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三

五丸煎金銀湯磨化不拘時服

虎睛丸 治小兒驚癇邪氣入心

虎睛

細研

遠志

薑製焙去心

犀角

鎊

大黃

濕紙裹煨

石菖蒲

麥門冬

去心二錢

蟶蠅

足翅炒三枚去

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五七丸竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸 治小兒驚癇心熱

遠志

去心薑製焙

雄黃

鐵粉

琥珀

各二錢

砂金

一錢

銀箔

四片麝香許

右為細末煮棗取肉為丸如梧桐子大每服三五丸

煎去心麥門冬湯化下不拘時服

清神散 治小兒驚癇

犀角 白蘚皮

石菖蒲

遠志

去心  
製  
薑

半夏

湯  
泡

各二  
錢半

茯神

半  
兩

大黃

培

人參

甘草

炙各一  
錢半

右為末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

食癘妙聖丹 治小兒食癘通利

雄黃

蝎梢

硃砂

代赭石

煅

醋

輕粉

麝香

各二  
錢半

巴豆

三箇去  
皮出油

杏仁

去皮尖微  
炒二錢

右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯磨化不拘時服

天麻丸 治小兒食癇有痰

南星

炮  
錢二

白附子

炮  
錢二

天麻

去油二

牙硝

川靈脂

全

蝎

焙各輕粉半

巴豆

錢一錢半

霜

錢二半

右為末稀麩糊為丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

清鎮蛇黃散 治小兒諸癇

蛇黃

一箇  
七次研細

淬  
鹽金

各二錢  
雄黃

各二錢

青礞石

硃砂

砂  
錢

一  
錢

鐵粉  
篩淨細  
研三分

右為末搗粳米飯為丸如梧桐子大每服三五丸人

參煎湯磨化不拘時服

地龍散

治小兒諸癆發歇無時

乾地龍

半兩  
培

虎睛

一對  
炙

人參

二錢  
半

金銀箔

三十  
片

天

竺黃

硃砂

代赭石

煅  
淬

鐵粉

各二  
錢

雄黃

一  
錢

半

輕粉

半  
錢

右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓三

兩

人參 地骨皮

甘草 麥門冬

桑白

皮各二

馬牙硝二

錢 龍腦

各三

麝香

錢

牛黃

半兩

硃砂

錢二

烏犀一

金箔三十

錢五

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣如風癩冬月溫水化下夏月涼水化下不以時二三歲者日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新汲水下

奪魂散 定癇

白殭蠶

去絲炒令黃色半兩

蛇含石

燒紅用米醋淬七八次碾碎

白附子

炮各二分

生銀 生金

牛黃

如無以膽製倍加用之

烏梢蛇頭

七八寸許酒炙

白茯苓

天麻

各二錢

天南星

末一分生薑汁浸一宿焙

蜈蚣

一條酒浸炙焦

犀角

鎊二錢

腦子

少麝香少許

右件為末蒸棗肉為丸如麻子大每服十丸至十五

丸二十九煎金銀薄荷湯下硃砂為衣

本草古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁

和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮心雌黃丸 治小兒癲癇欲發眼暗瘓癰聲惡嚼舌

雌黃 黃丹各一錢研一

研一錢

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵三百下丸如菉豆大每服三丸溫熱水下一日

三服此方得自名醫之家極有神效

拔萃妙香丸 安神通關辟惡氣

辰砂研九

兩

龍腦

賦粉

麝香

研各七錢半

牛黃

半金

西金

箔  
九十片研

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者七錢半同煉勻  
為丸每兩作三十丸米飲化下

鎮心丸

硃砂 龍齒 牛黃各一錢 鐵粉 琥珀 人參  
茯神 防風 全蝎七箇炙

右為末燈心湯調下三歲一字

蜜陀僧散 治心癟不語及諸驚失音用蜜陀僧為末

每服一匙米醋湯調下大人服一錢熟酒下

代赭石散 治陰陽癇

代赭石 煅醋淬研為末  
水飛過曬乾

右為末每服半錢以金銀煎湯和金箔銀箔調連進  
二服脚脰上有赤斑乃邪氣發出可治無赤斑則難  
治

神應丹

辰砂 不以多  
少研

右以豬心血和之得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就丸  
如桐子大每服一丸後食臨卧煎人參湯下

清心牛黃清心丸 治小兒躁悶項背強直腰背反張  
時發時醒

牛黃

一兩二錢研

麝香

研龍腦

另鑄羊角末

鎊各一兩當歸

去蘆防風

去蘆去

黃芩

麥門冬

去心去皮尖雙仁

白芍藥

白术

各一兩當歸各一兩

桔梗

白茯苓

去皮去粗

柴胡

去苗去

杏仁

去皮尖雙仁炒黃另研

桔梗

白茯苓

去皮去粗

各一兩二錢半

阿膠

粉剉碎蛤炒

肉桂

去皮去粗

大豆卷

碎炒各一兩七錢半

蒲黃炒人參

去蘆神麴  
兩半

甘草炒

五錢  
八錢另研

飛白歛

乾薑各七錢半

金箔一千二百片內四百片

犀角

末二兩

乾山藥十

大棗一百枚蒸熟去皮  
核爛研成膏入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九用金箔為衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉煎湯溫化服

比金丸

虎睛丸

二方俱見前

清神湯 治驚癇

犀角 鐘遠志 薑白鮮皮 石菖蒲 人參 甘草

炒各一  
錢半

右為末每服五七分麥門冬煎湯調下

酸棗仁丸

見驚悸

養心定志丸

見驚悸

養心湯 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐吐發

熱煩躁

黃耆 白茯苓 茯神 半夏麴 當歸 川芎

辣桂 柏子仁 酸棗仁 五味子 人參各

錢  
甘草 炒四  
錢

右每服一二錢薑棗水煎

妙香散 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少寐盜

汗等證

辰砂

三錢麝香一錢木香一分煨一錢

茯苓

山藥

茯神

遠志

黃耆

炒各一兩桔梗

甘草

人參

各五錢

右各另為末每服一錢溫酒或白湯調服

治痰半夏丸

方見驚搐

星蘇散 治諸風口噤不語

天南星

略炮剉

右每服五七分薑四片紫蘇五葉水煎入雄豬胆少許溫服

治癇方 治太陽陽明二經為病

荆芥穗

四兩白礬為細末

右棗肉為丸如桐子大每服二十九荆芥湯下次三

十九四十九又次五十丸俱食前

礬丹

虢丹 晉礬 各一  
丙

右丹摶鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在  
上以炭五斤煅令炭盡取出細研以不經水豬心血  
為丸如菉豆大每服十九至二十九橘皮湯下

元成二白丸

白礬

一塊約  
一兩

右用生蒸餅剝裏蒸熟去皮可丸入輕粉一字或半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十丸生薑湯下

小兒丸小

硃砂滾涎散 治小兒五癆

硃砂 白礬生赤石脂 硝石各等分

右為細末研蒜膏為丸如菉豆大每服三十九食後

荆芥湯下

琥珀壽星丸

天南星

一箇掘坑用火煅燒坑紅出炭淨入好酒  
一升在火穴中放入南星蓋穴勿令通氣

過一宿取  
出培末

琥珀四兩半  
內硃砂二兩半  
為衣

右以猪心血打乾糊丸如桐子大每服五十丸煎人

參湯送下

南星五生丸

南星 半夏 川烏

白附子 大豆

去皮各一兩

右為細末滴水為丸每服二丸至五丸不過七丸薑

湯下

斷癇丸 治小兒諸癇痰盛

皂角

盈尺者三挺去皮搗碎水三升浸取汁濾過磁器內熬成膏

研細一兩

白礬

煅枯研細一兩

半蝎梢

炒真殭蠶炒雄黃另硃砂研白附子各半

麝香

一錢另研烏蛇酒浸取肉焙乾二錢半

南星

濕紙裹炮熟一兩

赤蟬

蛇

一條酒浸失去頭足

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸如梧桐

子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癇丸 治小兒五癇

赤脚蜈蚣

一條去頭  
足酒浸炙

梢去毒

烏蛇肉酒

炙白附子生

天南星

末圓白半夏宿各二錢半

用薑汁和一  
錢半

熊膽

白礬

新瓦上煅枯各  
一錢二分半

右為末稀麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服二

三丸用薄荷煎湯磨化不拘時服

治小兒驚癇

膽星

二兩去毒炒

白附子

殭蠶

炒川芎各一

兩

薄荷

半兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸薑湯下

吐痰碧穹丹

石綠研九度  
飛十兩

附子尖 烏頭尖

蝎梢各五  
箇

右為末入石綠令勻麪糊丸如雞頭每服用薄荷汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨證治之

下痰控涎丸

川烏生半夏

各半兩

殼蠶生薑汁浸

一宿半兩

全蝎去尖

七箇

鐵粉

三錢甘遂二錢半

右為末生薑自然汁或薄糊丸如菉豆大硃砂為衣  
每服十五丸薑湯下忌甘草

治小兒癇用甘遂末一錢豬心一箇取三管頭血三條  
和甘遂末將豬心批作兩片入藥在內以線縛定外濕  
紙包裏入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末  
一錢和勻分作四丸每服一丸豬心湯化下再服另取  
豬心煎湯此方神效

下劑水晶丹

方見  
癖積

四順飲

二方並  
見熱

利驚

丸

方見  
驚搐

紫霜丸

方見  
蒸熱

當歸大黃湯

治小兒諸癇作熱利下心中惡血

大黃

濕紙  
裏

甘草

炙  
當歸

赤芍

藥各三  
錢

半夏

製  
全蟬

芎

各一  
錢

右為末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

表劑百解散

大青膏

並見  
驚搐

驅風膏

鴉青加辰  
砂全蟬

溫

劑

治陰  
之痛

固真湯

曰生湯

並見  
驚搐

茯神湯

方見  
驚悸

元戎小靈寶丹

附子

炮  
兩

天麻

全蝎

白僵蠶

炒

藿香葉

南

星

炮  
白附子

炮各  
半兩

右為末酒糊丸桐子大溫酒下一十五丸

羅謙甫治魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆僧念  
呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急  
喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服硃犀  
龍麝鎮墜之藥四十餘日前證猶在又添行步動作神

思如癡子診其脈沈弦而急黃帝鍼經云心脈滿大癇  
瘻筋摩又云肝脈小急癇瘻筋摩蓋小兒血氣未定神  
氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癇瘻  
筋摩病久氣弱小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復  
損其氣故添動作如癡內經云暴攣癇眩足不任身取  
天柱穴是也天柱穴乃是太陽之脈所發陽蹻附而行  
也又云癲癇瘻瘻不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古  
云晝發治陽蹻申脈夜發治陰蹻照海先各灸兩蹻各

二七壯次處沈香天麻湯

沈香

益智

川烏

炮去皮各二錢

天麻

防風

半夏

湯炮附子各三錢

炮去皮臍各三錢

羌活

五錢

甘草

炙一錢

當歸

薑屑各一錢

半錢獨活四錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之

當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沈香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得平矣牛黃丸 治因驚中風五癇天鈞客忤潮涎灌壅

白花蛇

酒浸  
取肉

白附子

全蝎

真川烏

一枚半  
丙者生

天

麻

薄荷葉

各半丙已上六味  
先為細末次入

雄黃

五辰砂三錢  
丙辰砂一錢  
腦

子另研牛黃三錢麝香一  
半兩

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一  
盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾丸如芡  
實大蜜器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大  
能發散驚邪

治五癇得效方

露蜂房焙石綠各一  
桂心遠志去人參各半  
砂一  
錢

右為末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

補劑斷癇丹 治癇瘡後復作連綿不除服之有驗

黃耆

蜜水  
塗灸

釣藤鈎

細辛

甘草

炙各半  
兩

蛇蛻皮

寸二

酒  
失蟬蛻

去土  
四箇

牛黃

一錢  
另研

右為末煮棗肉丸麻子大煎入參湯下每服數丸量兒加減

紫河車丸

紫河車即小兒胞衣肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研

化入人參當歸末和勻為丸如芡實大每服五六丸

乳汁化下

八味地黃丸

即六味地黃丸加附子肉桂各一兩治稟賦命門火衰不能

生土以致脾土虛寒或飲食少思或食而不化臍疼  
腹痛夜多漩溺等證經云闢益火之源以消陰翳蓋  
謂此也或乳母命門火衰兒飲其乳致前證者予母  
並宜服之

加減八味丸 治稟賦腎陰不足或吐瀉久病津液虧

損口乾作渴或口舌生瘡兩足發熱或痰氣上湧或

手足厥冷等證

即地黃丸加肉桂  
一兩五味子四丙

地黃丸治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患癩瘻

結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎疳腦

熱肢體消瘦手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾

渴齒齦潰爛爪黑面黧徧身或兩耳生瘡或耳內出

水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等證其功不能

盡述

即六味地黃丸方見腎臟

八珍湯治氣血俱虛陰火內熱或因寇伐之刺脾胃虧

損肌肉消瘦等證

即四君四物二  
湯方見虛勞

十全大補湯治氣血虛弱或稟賦不足寒熱自汗食減  
體瘦發熱作渴頭痛眩暉最宜用之

方見  
虛勞

灸法小兒癩癪驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻柱直  
上入髮際五分 小兒諸癥如噦吐清沫灸巨闕穴三  
壯在鳩尾下一寸陷中是穴 小兒雞癩善驚及掣目  
搖頭灸少陰二壯取法在掌後去腕半寸陷中是穴

小兒驚癇者先驚叫乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脈炷如小麥大 小兒驚癇灸鬼祿一穴三壯取法在上唇內中央絃上是穴 小兒食癇者先寒熱灑淅乃發也灸鳩尾穴上五分三壯 小兒牛癇目視直腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯取法胸蔽骨下五分陷中是穴 小兒馬癇張口搖頭身折反馬鳴也灸僕參穴各三壯取法在足跟骨下白肉際陷中拱取之是穴 小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴也灸第九椎下節間三

五壯 按靈樞經云暴攣足不任身取天柱天柱穴足太陽也又云癲癇瘓癥不知所苦當灸兩蹻之下男陽女陰潔古云晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二壯陽蹻起於眼中循內踝上行至咽喉交貫衝脈照海穴也

不治證錢五癇重者死病後甚者亦死 小兒癇病目直無聲目睹不轉眼生白障眼慢唇黑瞳人瞯動目間青黑面青指黑口出涎沫如白膿口噤肚脹下乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿軟不醒腹

內虛鳴唇逆而痛吐利不止汗出壯熱不止卧久不寢身體反張大人脊下容一手小兒脊下容一指並不治

中風

張渙等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則為害不淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也況小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽掣氣粗涎涌

甚至昏憒口噤即似中風悞以續命等湯投之多至不  
救大人且無真中况小兒乎凡有前證當辨其因若陽  
明經氣虛風邪所乘筋脈拘急者為外因足厥陰肝火  
熾盛筋脈偏急者為內因脾肺虛弱腠理不密外邪乘  
入或驚風過服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津  
液不能養肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生風之  
類中風之類證也

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治  
肝補腎地黃丸治肝瀉青丸 丹溪云痙比癇為虛宜  
帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不用兼風  
藥此論實發前人所未發湯氏雖云痙候十無一生蓋  
未嘗有此法施於人也 薛錢仲陽曰角弓反張者由  
風邪客於太陽經也 經曰風從上受足太陽主周身之  
氣其脈起於目內眞而行於背肝屬木主風所以風邪  
易侵也 夫小兒肌膚未密外邪易傷肝為相火其怒易

發若身反張強直發熱不搐者風傷太陽也宜用人參  
羌活散小續命湯若因暴怒而擊動其肝火者宜用瀉  
青丸若飲前劑其證益甚者此邪氣已去而脾氣虧也  
宜用異功散加芎歸補之若因肝經虛熱或因冠伐真  
氣虛熱生風者宜用異功散地黃丸補之若因下而脾  
氣困憊腹肚膨脹者此中氣損也宜用白朮散補之若  
氣血素弱或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝  
經虛甚也急用地黃丸以補之仍與肝藏參覽一小

兒忽腰背反張目上視面青赤白青屬肝主風赤屬心  
主火此風火相搏用柴胡梔子散倍加釣藤鈎頓安而  
痰如舊又用抱龍丸而愈一小兒忽腰背反張服治  
驚之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異  
功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨用  
前藥即愈遂日以參术末每服五七分炮薑大棗煎湯  
調下服至二兩而不發已上二證元氣虛而病氣實也  
若用攻邪之藥皆誤矣一小兒素患前證痰盛面色

素白而無青余謂肺氣不能平肝肝氣乘脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用人參五錢炮薑三分水煎服而醒至第四劑後加棗二枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執常方鮮有不誤者

人參羌活散

方見驚搐

小續命湯

方見雜病中風

瀉青丸

方見肝臟

異功散

方見吐瀉

柴胡梔子散

方見積熱

抱龍丸

方見驚搐

六君子湯

方見吐瀉

灸角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯大椎下節間灸  
三壯

診湯氏曰身軟時醒者為癇身強直反張如弓不時醒  
者為痙痙候十無一生

搖頭

湯肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下

血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效余既視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土為木所克脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂潰於大便故便血不止遂處一方但損肝驅風而益脾初亦一時之見祇數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

清肝益胃丸

犀角屑 甘草 各一

分

爪蔓根 黃耆

蜜

羌活 白

芍藥 各半 蛇退皮

炙

鈎藤鈎

麻黃

去節

各一錢

防風

兩五

右為末棗肉丸食後薄荷湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦驗

薛經曰諸風掉眩皆屬肝木木得風則搖動乃肝經火盛而生虛風也便血者風木搖動則土受凌虐而不能

統血也或食酸味過多以益其脾致令陰結經日結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在至藏則陰脈不和陰脈不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行滲入腸間故便血也血亦有乳母恚怒風熱熾盛或肝木傷脾使清氣不升或風邪侵入大腸者治法若因風熱用柴胡清肝散若因怒火用加味小柴胡湯若清氣不升脾氣下陷者用補中益氣湯若風邪侵於大腸者用清肝益胃丸肝經血熱妄行者用六味地黃丸脾

土不能培肝木者用六君柴胡釣藤鈎肝木勝脾土者  
用四君芍藥釣藤鈎結陰者用平胃地榆湯 一小兒  
傷風咳嗽痰湧余謂脾虛肺弱痰壅不密風邪外乘用  
六君子湯加桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹  
脹仍用六君子加山楂厚朴而安又停食作瀉服消導  
之藥更加咳嗽余謂當調補脾土不信自用發表丸滯  
前證益甚更加搖頭余以天麻散倍加釣藤鈎及異功  
散而愈 一小兒項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙

抽搐搖頭目劄此肝木尅脾土也用六君子湯及九味  
蘆薈丸頓愈 一小兒病後遇驚即痰甚咬牙抽搐搖  
頭作瀉恪服腦麝硃砂等藥以致慢驚而卒

海食療云蛇蛻皮主去風邪明目治小兒一百二十種  
驚癇寒熱痔瘻毒安胎熬用 治癇弄舌搖頭者宜用  
全蛻

余猶憶少時聞友人孫彭山云嘗見姻家一小兒患驚  
搐延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫至於

常服藥中加入紫河車即時愈按紫河車草名神農木  
經名蚕休唐本名金線重樓錢氏方名白甘遂主治驚  
癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂遵白字療病多效不  
虛也

偏風口噤

薛小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋急  
由風木太甚而乘於脾以勝水濕則筋太燥然燥金主  
於收斂勁切故也又曰風之為病善行而數變或左或

右其因一也治湏審而藥之若足陽明胃經氣虛風邪  
所乘其筋脈偏急者屬外因若足厥陰肝經風熱乘脾  
筋脈偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理不密外邪所乘  
或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養  
肝致口眼歪斜或半身不遂諸證皆屬肝血不足肝火  
生風宜滋腎水養肝血壯脾土治法脾胃虛而動風者  
異功散加柴胡鈞藤鈎脾肺虛而外邪所乘者用鈞藤  
飲肝火血燥者用六味地黃丸津液不足者用白朮散

若無目緊上視寒熱往來小便淋漓面色青潔兩脇脹痛之類皆肝經之本病也或唇口歪斜腹痛少食目胞浮腫面色青黃肢體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五臟相勝而主之設孰其見證緊投風藥反成壞證者有矣一小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也朝用柴胡清肝散夕用異功散加釣藤鈎而愈其時有患前證服祛風導痰之藥者皆不能起一小兒痢後患前證發搐面色痿黃肢體倦怠此元氣虛

冠伐多矣余用補中益氣湯加鈎藤鈎子服而漸愈後  
因乳母七情飲食失宜或兒乳食過多前證仍作服補  
中益氣湯五味異功散而愈

錢全蝎散 治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手  
足偏癱不舉

全蝎去毒殼炒直者 川芎 黃芩去心 甘草 桂枝

赤芍藥 麻黃去節各一兩 天麻錢六分 天南星湯泡七次去皮

臍切焙  
乾五錢

右為粗末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分溫服  
無時量大小與之一日三四服忌羊肉

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下  
及腸胃濕毒下如豆汁或淤血日夜無度

人參 白茯苓 茯菊 肉桂 當歸 白芍藥

白术

各等分

右為散每服二錢入粟米數粒同煎

口喝失音

論見前  
中風條

硃砂丸 治小兒口眼喎斜筋脈牽引

硃砂錢五

全蝎炒

天麻 炒去殼  
白附子 烘乾薑

牛黃各五分

麝香一分

右為末粳米糊丸如黍米大每服三十九用薄荷湯  
不拘時化服

全蝎散 治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎炒

川芎 黃芩

僵蠶炒去絲

赤芍藥 甘草

硃砂

南星湯炮去皮臍焙

天麻各三錢

右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲 治小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳殼

去穰一兩

人參

去蘆五錢

天麻

僵蠶炒去絲屑

羌活

甘草三錢

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎五分不拘時服

木通湯 治小兒血滯於心心竅不通語言不出

木通

石菖蒲多用

防風

枳殼

全蝎

焙僵蠶

炒

甘草 木香 南星 炮各等分

右剉碎每服二錢用水一盞豬心三片生薑一片紫

蘇五葉煎至五分不拘時服

天鈞內鈞

附

天鈞亦驚風之證但天鈞發時頭目仰視驚風則無也  
湯小兒瘺癇不定翻眼擡睛狀若神祟頭目仰視名為  
天鈞凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉  
相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五

壯又灸前後手心各五壯此皆得效之法

九龍控涎散 治天鈞

赤脚蜈蚣

酒塗灸一條

滴乳

天竺黃

二味另研各一錢

臘茶

雄黃

另研甘草炙各二錢

荆芥穗

炒白礬枯各一錢

豆蔻生半錢

右為末每服半錢人參薄荷湯調下

釣藤飲 治天鈞潮熱

半粒一百粒

釣藤 人參 犀角屑

各半兩

全蝎

天麻

各二分

甘

草半  
分

右為末每服一錢水煎服

張小兒心膈壅滯邪熱痰涎蘊積不得宣通或乳母飲酒食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪寒毒氣乘於心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢瘓癰其病名曰天釣甚者爪甲皆青狀如神祟今集經效名方治之於後

一字散 醒風爽精神

天南星 半兩  
炮裂 微炒 蟬殼

微炒 乾蝎

白僵蠶 各一  
分

右件搗羅為細末次入蕎麥麪一分用醋石榴殼一枚將諸藥入在石榴殼內以鹽泥封裹於竈下慢火上燒之泥乾燥為度取出再研勻每服一字溫酒調下

雙金散 治天鈞驚風目久不下

蜈蚣

一箇去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砧子上面南立用竹刀子當脊縫中亭利作兩半

箇左邊者入一貼子內寫左字右邊者亦入一貼子內寫右字不得交錯即大悞矣

麝香一錢

細研先將左邊者同於乳鉢內研作細末却入在  
左字貼內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同  
研極細却入右字貼內收不得相犯每有病者  
眼睛釣上止見白睛兼角弓反張更不能出聲  
者

右用細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻裏  
右亦如之用藥不可多若眼未全下更添些小兒意  
量度其眼隨手便下即止

牛黃散 清心截風

牛黃半兩  
硃砂細研水飛麝香 天竺黃並細研  
蝎梢

釣藤俱為末各一分

右件一處研勻每服一字新汲水調下

白銀丹 治驚風涎潮

天南星

一兩一半炮  
一半生用

白僵蠶

半兩全蝎  
白附子各

牛黃

研麝香研

粉霜

各半分已上搗羅為細末  
次用牛黃等同研勻用

水銀

半兩煮青州棗肉二十箇同研水銀星盡成膏

右都和上件藥石臼內搗一二百下如黍米大每服

五粒至七粒薄荷湯下

抵聖丹 治驚風胸膈不利乳食不下

錫愾脂

一兩細研水飛淘去黑水令盡

牛黃

研鉛霜細研熊膽各一

分研

麝香

半分研

蟾酥

一錢研

右件通研勻粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒  
新汲水下

薛天鈞者發時頭目仰視驚悸壯熱兩目反張淚出不  
流手足搐掣不時悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青益  
因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰鬱滯或外挾

風邪為患法當解利其邪用釣藤飲上氣喘粗者用烏  
蝎四君子湯內釣者腹痛多喘唇黑囊腫僵僂反張眼  
尾赤此胎中受風及外驚所致若內臟抽掣作痛狂叫  
或泄瀉縮脚內證一作外證亦然極難調理內證服聚  
寶丹外證服釣藤飲進乳食者可治若腹痛唇黑囊腫  
之類用聚寶丹若外驚內臟抽搐之類用釣藤飲若因  
乳母醇酒厚味積毒在胃用加味清胃散若因乳母鬱  
怒積熱在肝用加味逍遙散加味歸脾湯俱加漏蘆子

母俱服凡母食膏梁厚味飼兒之時先擠去宿乳然後  
吮之 一小兒因乳母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭  
而曲腰用四物加柴胡防風又用加味逍遙散加熟地  
黃以清肝熱生肝血再用地黃丸滋腎水以生肝木母  
子俱安 一小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘內  
釣腹痛也用五味異功散加木香乾薑一劑與母服之  
頓愈後因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母  
服其子亦安 一小兒曲腰乾啼手足並冷用六君加

乾薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而愈 一小兒忽乾啼作瀉睡中搐手足冷此脾土虛寒肝木侮之而作發搐乃內釣也用益黃散一劑而安用四君加柴胡升麻乳食漸進而安 一小兒乾啼面青或赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝火氣滯用加味逍遙散及越鞠丸以治其母時灌子數滴不旬日子母並愈 一小兒患前證服魏香散而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘粗此元氣虛寒也余先用烏蝎

四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補中益氣湯及五味異功散而痊 一小兒因母每感寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實熱之天鈞也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐瀉面色或青或白手足並冷屬脾氣虛寒用六君木香乾薑而愈三歲後傷食腹痛唇黑作瀉數去後而無糞或糞少而青此氣虛寒下陷用補中益氣湯漸愈 一小兒啼哭陰囊腫大眼目上翻赤脈流淚此肝熱內釣用柴胡清肝散加釣藤鈎治

之諸證漸愈又用鈞藤飲而痊後復發或用祛病根之藥致乳食日少肚中脹痛手足浮腫余先用六君升麻柴胡數劑諸證稍愈又傷乳食吐瀉用平胃散一服即愈一小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈用加味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母大怒發厥而甦兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先用小柴胡湯二劑母子並服少愈其母又嘯酸腹脹用越鞠丸加味歸脾湯佐以加味逍遙散而痊

釣藤膏 魏香散

二方並見腹痛

釣藤飲 治小兒臟寒夜啼陰極發躁此方主之

釣藤 茯神 茯苓 川芎 當歸 木香 甘

草 茄藥

各一錢

右為末每服一錢薑棗水煎若心經熱臉紅舌白小便赤澁用釣藤飲去木香加硃砂末一錢木通湯下

釣藤飲 治天鈞風搐

釣藤

犀角

天麻

各七分

全蝎

五箇

木香

甘草

各五

分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

釣藤飲子 治驚風天釣卒然驚悸眼目翻騰

釣藤

炒五分 麻黃節去甘草炙各三分

天麻

川芎

防風

人參

各七分

全蝎

炒去毒五箇

殭蠶

炒七箇

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

乳香丸 治驚風內釣腹痛驚啼

乳香

半錢 没藥

沈香

各一錢

蝎梢

十四箇

雞心檳榔

一錢

半

右為末蜜丸桐子大每服二三錢菖蒲釣藤鈎煎湯  
下

木香丸 治同前

木香 全蝎各五分 没藥 懷香 釣藤鈎各一錢

右各別為末以大蒜研爛和丸桐子大臘乾每服二

丸釣藤煎湯下

牛黃丸 治小兒一切驚風五癇天釣客忤痰涎四肢

抽掣

白花蛇

酒浸  
取肉

白附子

全蝎

川烏

一隻重半兩  
生用去皮臍

天麻

薄荷葉

各半兩已上  
為細末次入

雄黃

半辰砂三  
兩

黃

錢麝香

片腦

各半錢  
另研

右件為細末一處和勻麻黃去節二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒入蜜少許熬成膏劑煎藥末為丸如芡實大用金箔為衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散風邪

塗頂膏 治天鈞風備急

烏頭生皮 草臺子各二錢

右為末每用一錢新汲水調敷兒項上

天漿子散 治小兒天鈞驚風

天漿子炙 蝎梢 犀角屑 丹砂另研 雄黃另研 附子

南星炮去皮 白附子 半夏 水銀另研 乳香另研

白僵蠶 賦粉另研 牛黃另研各一錢 蘇香一字另研 銀箔五片

研

右為細末和勻每服一字用薄荷湯調下量兒大小  
加減服

青黛丸 治小兒天釣客忤五疳八痢十二種驚癇

青黛 天竺黃 乾蝦蟆一箇黃泥包裹燒赤去泥乾蝦牛殼

黃連 人參 地龍去土釣藤炒龍膽草各二錢半蘆

蒼 熊膽各半錢牛黃 麝香 雄黃 丹砂各一錢

夜明沙去土淨 胡黃連各三錢

右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三丸空心米

飲湯送下

再生散 治小兒天鈞驚風潮搐項筋緊強手足厥冷

烏蛇

酒浸取肉

天麻

南星

炮去皮

全蝎

炒去毒各二錢半

麝香

膾粉

各五分

丹砂

另研二錢

牛黃

另研白附子

炮各一錢

右為細末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯調下量兒

大小加減服

三白散 治小兒盤腸氣釣先服此藥後服釣藤膏

白牽牛

一兩炒

白术

桑白皮

陳皮

木通

各三錢

右為細末每服半錢用生薑湯調不拘時服

廣利方治癇迷嚼舌仰視牛黃大豆許和蜜水調

拘攣

續命湯 治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘草 炙防

風 杏仁 去皮官桂 去皮防已 附子 炮裂去皮  
尖炒桂皮 防已 附子 炮裂去皮  
臍各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘

時服

追風散 治小兒感冐發熱手足拘攣

人參 茯苓 防風 川芎 柴胡 羌活 枳

殼 桔梗 甘草

各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

手拳不展

張渙云小兒所受肝氣怯弱致筋脈攣縮兩手伸展無力薏苡丹主之

薏苡丹 治手拳不展

薏苡仁

湯浸去皮研細

當歸

洗焙

秦艽

去蘆

防風

酸棗仁

炒

羌活

各等分

右為細末煉蜜和如芡實大每服一粒至二粒麝香  
荆芥湯化下不拘時候

聖惠方兒在胞母臟腑虛為風冷所乘兒生肝氣不足  
致筋脈攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散前就此  
加減以

其方平和  
故列於首

薏苡仁

七錢  
五分

秦艽

防風

酸棗仁

炒微

甘草

微炙  
赤各

半兩

當歸

焙各二  
錢半

為散每一錢水一小盞煎五分不計時候量兒加減  
驥羊角散 治兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不

通

驥羊角

羌活

五加皮

白蘚皮

桂心

各二  
錢半

麻黃

半兩去  
根節

甘草

炙微赤一  
錢二分半

為散每服一錢水一小鍾煎五分量兒加減不拘時

溫服

脚拳不展

張渙云緣稟受腎氣不足者氣血未榮脚指拳縮手足不能伸展海桐皮散主之

海桐皮散 治脚拳不展

海桐皮 當歸湯洗  
培乾牡丹皮 熟地黃 牛膝酒浸

培各一兩  
山茱萸 補骨脂各半

右為細末每服一錢水八分入葱白二寸煎至五分

去滓溫服食前

聖惠兒在胞母臟腑有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸

焙

麻黃

去根節各半兩

酸棗仁

微炒

人參

杜

仲

微炙

桂心

各二錢半

右為細末每服一錢水一小盞薑少許煎五分量兒  
大小乳前分減服

乾地黃丸

生地黃

郁李仁

湯浸去皮尖  
微炒各半兩

牛膝

防風

桂

心海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁

各二錢半

右為末蜜丸如菉豆乳前溫酒下七丸量兒加減



證治準繩卷七十五