

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十三

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官進士_臣朱 鈐

校對官中書_臣吳 俊

謄錄監生_臣李 觀 光

欽定四庫全書

證治準繩卷四十三

明 王肯堂 撰

傷寒

陽明病

循衣摸牀 渴 嘔 乾嘔

循衣摸牀危惡之候也有二證其一由太陽中風以火劫汗因成壞病捻衣摸牀小便利者生不利者死其一

由陽明裏熱之極循衣摸牀脈弦者生瀼者死

太陽中風以火發汗邪風被火兩陽相薰其身發黃陽
盛則欲劫陰虛則小便難但頭汗出口乾咽爛或不大
便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者
可治

汗詳頭

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上

至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若虜
者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者
生瀼者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利

止後服

成若吐若下皆傷胃氣不大便五六日至十餘日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明

壬子申酉戌日晡所發潮熱者陽明熱甚也
者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也
有餘若劇者是熱氣太甚也熱太甚于內昏冒正氣使
不識人至于循衣摸牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝
而陰未絕者生陽勝而陰絕者死劇脈者為陽勝脈弦為
陰有餘脈澀澀為陰不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕而猶
可生脈澀則絕陰故不可治其邪熱微而未至于劇者
但發熱譫語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下
藥中病即止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則
止後服趙此段當分作三截看自傷寒若吐若下後
不解不大便五六日至十餘日晡所發潮熱不惡寒
寒獨語如見鬼狀正為上一截是將潮熱譫語不惡寒
不大便對為現證下文又分作一截以辨劇者微者之
殊微者但發熱譫語但字為義以發熱譫語之外別無

他證其用承氣湯曰一服利止後服見其熱輕猶恐下
之太過也至于劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安
微喘直視如此熱極證危不可不決其死生以斷之
脈弦者生瀉者死此陽熱已極若脈弦為陰未絕猶可
下之以復其陰若脈瀉為陰絕不可藥而必死矣今活
人書但言劇者而去其微者二字混兩證通作一證總
曰用承氣湯又將脈弦者生瀉者死本劇者斷語移而
維于缺者服藥之後豈有但發熱譫語無別惡候遽然
脈瀉而致于死耶仲景論中雖別有潮熱譫語脈瀉難
治一證乃是服承氣湯後未曾得大便蘊毒不泄脈反
微瀉為正衰邪勝故難治此論中病微者服湯得利後
則邪熱因泄而解矣尚何生死之議耶又云弦者陽也
瀉者陰也陽病見陰脈者生在仲景
法中弦瀉者屬陰不屬陽得無疑乎

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩

手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得
之者十中九死仲景雖有證而無法但云脈弦者生
濇者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便秘通
而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸
疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生
此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微
喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者承氣
湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻

物者肝熱也此證在玉函列于陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能

博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作循

衣撮空是肝熱風淫未疾此論誠當然莫若以為肺熱之邪其人必妄言亂語難經云肺邪入心為譫語

附

婁嘗治循衣摸牀數人皆用大補氣虛之劑惟一人兼
關振脈代遂於補劑中畧加桂二分亦振止脈和而愈

渴

經云病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也又曰服柴胡湯已渴者屬陽明也故以渴入陽明門

成傷寒邪傳裏則渴邪在表則不渴夫三陽雖或有渴不如三陰之甚也故太陰腹滿噎乾少陰口燥舌乾而渴厥陰則消渴消渴者飲水多而小便少謂其熱能消水也蓋初傳則熱微而渴微傳深則熱甚而渴甚也凡渴與水勿令極意三陽微渴者五苓散大渴者白虎湯三陰熱甚而渴者順下之其或渴微而強多飲之則成悸動支結喘咳餉噦乾嘔腫滿下利小便不利皆由此

也

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴

者五苓散

張煩渴用白虎湯宜也其用五苓散滲津液何哉曰白虎乃表證已解邪傳裏而煩渴者

用之今脈尚浮身有微熱而渴乃表邪未全解故用桂枝之辛和肌表白木茯苓之甘淡以潤虛燥也按此

說亦未瑩太陽經也膀胱腑也膀胱者溺之室也五苓散者利溺藥也膀胱者津液之府故東垣以渴為膀胱

經本病然則治渴者當瀉膀胱之熱瀉膀胱之熱者利小便而已矣發汗已脈浮數煩

渴者五苓散本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解

其人渴而燥煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆

五苓散方

猪苓

去皮十銖

澤瀉

一兩六銖半

茯苓

十八銖

桂

去麤皮半兩

白朮

十八銖

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈

苓者令也通行津液尅伐腎邪專為號令者苓之功也五苓之中茯苓為主故曰五苓散內經曰淡味滲泄為陽水飲內蓄須滲泄之必以甘淡為主故以茯苓甘平為君猪苓甘平為臣雖甘也終歸甘淡脾惡

濕水飲內蓄則脾氣不治益脾勝濕必以甘溫為助
故以白朮甘溫為佐內經曰鹹味滲泄為陰泄飲導
溺必以鹹為助故以澤瀉為使水蓄不行則腎氣燥
內經曰腎惡燥急食辛以潤之散濕潤燥必以桂枝
辛熱為使多飲煖水令汗出而愈者以辛散而水氣外泄故解

服桂枝湯大汗後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參

湯 太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病柴胡白虎桂

枝去桂加人參 傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒

白虎加人參湯 傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不

可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

渴欲飲水無表證者太陽證罷轉屬陽明也下條意亦同皆太陽轉屬陽明故渴也 傷寒病若

吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風

大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者白虎加人參湯主之

壬注云若純在表則惡風無時今表裏無熱故時時惡風也

白虎加人參湯 治渴而脈洪小便利者

生石膏碎四兩 知母一兩半 甘草一兩 粳米一合 人參五錢

右㕮咀每服一兩水煎溫服

許有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外

發熱予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在胃脘而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐若下後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又曰脈浮滑此以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正謂張仲

景于此表裏目差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒
中渴表裏發熱故前後二證或云表裏俱熱或云表
熱裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻
黃與葛根證安可行白虎也林億見所稱表裏不同
便謂之差是亦不思之過也

張用藥有遲速之弊故設法以關防法有關防不盡
者則著方以拯治也假如上二條前條乃仲景設法
以關防也後條及傷寒病若吐若下後七八日不解

結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴口舌乾燥而煩
欲水數升者以白虎加人參湯主之此二條則著方
以拯治也夫白虎湯專治大煩大渴古人設法之意
惟恐表證未罷而輒用之治有太速之弊若背微惡
寒及時時惡風二證其中煩渴已甚非白虎不能過
也必候表邪俱盡未免有太遲之愆也此乃法之關
防不盡者故著方以拯治也苟不著方必然違法此
方法之妙所以不可偏廢也

吳或問白虎湯仲景以表不解者不可與又時時惡
風背上惡寒者此有表也又以白虎主之何也蓋石
膏卒寒解足陽明經本熱蒸蒸發熱潮熱表裏皆熱
舌燥煩渴之聖藥也且時時者時或惡風而不常也
背上惡者但覺微惡而不甚也所有盛熱燥渴而用
則無疑矣若夫表證惡寒常在背上惡寒而不燥渴
者切不可用也又太陽經發熱而渴無汗者不可與
之但汗後脈洪大而渴者則可與也如陰傷寒面赤

煩燥身熱與其胃虛惡心大便不實脈弱食少無大熱者切不可用也如悞用之則傾危可立而待矣

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯 傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥

復利其小便故也

白虎加人參湯小柴胡湯去半夏加瓜蒌竹葉

收其陽明汗多此陽明

病未解而渴胃中津液乾燥若與猪苓湯復利其小便是為實實虛虛之弊也

陽明病脈浮

而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

少陽傷寒中風往來寒熱胸脇滿默默不欲飲食心煩喜嘔或渴或欬者小柴胡湯若渴者去半夏加人參括
萎根 傷寒四五日身熱惡風項強脇下滿手足溫而
渴者小柴胡湯 得病六七日脈遲浮弱惡風手足溫

醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡不

中與也

或云下重渴欲飲水嘔者五苓加茵陳蒿湯

少陰渴而下利屬少陰其病但魚欲寐小便白者四逆

湯魚咳嘔不得眠小便不白者猪苓湯魚白利純青色

水者大承氣湯有熱者白頭翁湯

方論見下利

厥陰消渴氣上衝心心疼飢不欲食食則吐虵若下之

則利不止若欲飲水少少與之愈

邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太

陰則腹滿而咽乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥陰而消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便少者謂之消渴木生于火肝氣通心厥陰容熱氣上撞心中疼熱傷寒六七日厥陰受病之時為傳經盡則當入府胃虛客熱飢不欲食虯在胃中無食則動聞食氣而出得食虯出此熱在厥陰經也設使下之虛其胃氣厥陰木邪相乘必吐下不止按成氏為表陽邪傳裏者非也消渴心中疼熱也

隨病治例渴而頭汗小便不利魚脇滿往來寒熱者柴

胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵陳蒿湯

論見頭汗

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘小青龍湯 又心下有水氣咳

而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍

湯

俱宜去半夏
加栝蒌根

夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加人參

湯及酒黃連主之

方見中暑惡寒身熱者證
似表也足冷者不可表

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門

論見
腹滿

表解不惡寒而渴者宜白虎湯

渴而脇滿及往來寒熱其證未經汗者小柴胡去半夏

加人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯

詳見脇
滿痛并

往來
寒熱

渴而心下鞭痛日晡潮熱不大便者為結胸宜大陷胸湯若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不

利者宜五苓散

詳見結胸
痞氣二門

病在陽明應汗之反以冷水噴之灌之其熱益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與猪苓湯

論見
結胸

文蛤散方

文蛤

一兩即海蛤粉也河間丹溪多用之大能治痰

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胸中有寒

論見濕痺

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩燥不得眠者及厥

陰病氣起衝心心疼吐衄者少少與之愈

論見前條及氣上衝

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之

何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八

日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極

意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘

若噦不可與之忽然大汗出是為自愈也

活人云凡病非大渴不可

飲水若小渴咽乾者少少呷潤之令其胃中和乃佳

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者

亦強與之飲因成其禍不可復救

活人云強飲水致飲停心下滿結喘者常

以五苓散或陷胸湯主之

下利脈弱脈數而渴者自愈

論見下利

渴

而發熱其脈不弦緊而浮弱者汗出愈

論見
瘧語

婁活人云切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯
陽明證汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不
可與白虎耶太陽證得汗後脈洪大而渴者方可與
之也陽明渴終不可與五苓散耶陽明證小便不利
汗少脈浮而渴者方可與之也

趙活人切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯陽
明證汗多而渴者不可與五苓散愚詳仲景論治渴

藥有不可與之戒有二傷寒脈浮發熱無汗渴欲飲
水無表證者白虎加人參湯表不解不可與活人不
云表不解但云無汗不可與則誤矣經云陽明汗多
而渴不可與猪苓湯活人改作五苓散蓋猪苓專滲
泄五苓兼汗利安得而改之經既云汗多而渴者不
可與猪苓湯而太陽傷寒汗出而渴復用五苓散者
蓋渴雖同汗之多寡則異太陽屬表未至汗多胃躁
故用五苓滲熱和表非若陽明屬裏汗多而胃躁也

經又云陽明發熱汗多急下之均是陽明汗多前證
戒利小便此證不戒利大便何也蓋渴者邪氣散漫
在經未收斂入胃作實此證不渴則內已作實外又
發熱恐熱內竭津液故急下之且猪苓五苓又有可
疑者太陽病脈浮小便不利微熱消渴者五苓散陽
明脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯脈證皆
同何故用藥之不同耶然太陽邪在表發汗不解故
用五苓和表行津液陽明邪已入裏熱客下焦故用

猪苓滲瀉其熱噫白虎猪苓五苓等藥若能證察於
機微治明於權變則可與不可與庶得仲景之妙外
有自利而渴條下註云傷寒熱入于藏流于少陰之
經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲註用猪苓湯白頭
翁湯又後下利問中重出自利而渴條下却云腎虛
故引水自救通用白通四逆猪苓等湯一問以渴為
熱一問以渴為虛冰炭不侔何憑分別又且分隸兩
門設使後人臨病檢閱前後兩不相聞疑誤豈小今

詳定少陰病欬而下利嘔渴心煩不得眠及厥陰證
下利欲飲水是皆傳經之邪熱脈必沈細數仲景故
以滑石黃連等清利之其或少陰自利而渴欲吐不
吐心煩但欲寐是直入本經之陰邪也脈必沈微仲
景故以附子乾薑溫之本問何不如此明示脈證合
為一門而明辨之庶一見而兩得焉清之溫之隨其
攸利又何疑誤之有

吳凡渴當分六經而治太陽經標熱在表則不渴若

熱傳入膀胱之本則煩渴脈浮數小便不利也五苓散切不可與白虎湯凡陽明病脈長標熱無汗而渴者葛根解肌湯或六神通解散倍葛根以汗解之若陽明熱傳于胃中本熱惡熱濺濺汗出而渴脈浮洪數者人參白虎湯五苓不中與也若陽明本熱或蒸蒸而熱潮熱煩渴舌燥口乾飲水大便實者大柴胡湯或調胃承氣湯下之若內未實尚未可下宜小柴胡增損用之少陽脈弦數口苦咽乾發熱而渴者小

柴胡去半夏加瓜蒌根餘見本條太陰自利則不渴
惟少陰有口苦飲水小便色白者此下有寒也脈沈
者附子湯若身寒厥逆脈滑而口渴者此裏有熱也
人參白虎湯凡陰證煩躁口渴不能用水脈沈足冷
者宜四逆湯冷飲之凡傷寒時氣等證欲飲水者為
欲愈蓋得水則能和其胃氣汗出而解不與水則乾
燥無由而作汗遂致悶亂而死也凡與水須察病人
勇怯邪熱輕重多少與之寧從不及不可太過恐水

多不能滲化停畜為害多矣其水須用新汲井中者
為良凡熱病熱甚大便實者以玄明粉一二錢加入
水中飲之最妙凡中暑煩渴者加辰砂天水散調水
中飲之尤良如虛人煩渴不飲水以燈心煎湯浸水
中與之凡口渴細茶湯白梅湯菜豆湯皆可飲香水
梨雪梨嫩藕西瓜皆可食凡用冰須以涼水洗去鹽
味方可

戴凡渴問其所飲欲冷欲熱欲多欲少若飲多而欲

冷者陽渴也更須審其有何證在經也其太陽證小便不利而渴者五苓散其陽明證大便不利而渴者宜於前本經求之已利猶渴宜白虎湯其少陽證寒熱往來而渴者小柴胡湯去半夏加括萋根如其數陰亦有自利而渴各已見本經但陰有渴古人多用冷劑以其皆挾陽氣耳經雖陰而病則陽也然亦有下清穀不係熱利純是陰證而反見渴者此是陰在下隔陽於上兼因洩瀉津液既去枯燥而渴其人雖

引飲所飲自少而常喜溫不可投冷劑宜理中湯或
四逆湯加人參一錢渴甚連理湯 有陽證不渴陰
證反渴者陽明不甚渴太陰乃大渴不可不知治渴
一也有堅腎水而渴止者有利小便而渴愈者堅腎
水則用天花粉之屬利小便則用茯苓猪苓之類蓋
太陰以利小便為先陽明以利小便為戒少陽以膽
經半表半裏未可下之其人或大渴不止當以小柴
胡湯加天花粉之屬堅其腎水腎水既堅自還滲入

大腸大便微通熱去而渴解若病在太陽太陽在膀胱腎經非利小便則熱無從去渴何由愈外有非太陽證煩躁發渴此乃陰盛隔陽不當潤其渴惟當治其陰

附

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止之也恐復損胃氣愈不能食白朮茯苓是也

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮

與之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊
無表裏病胸中大熱發渴引飲皆曰陽證欲飲之水予
反與薑附等藥緊脈反沈細陽猶未生以桂附薑烏之
類酒丸與百丸接之二日中十餘服病人身熱煩燥不
寧欲作汗也又以前丸接之覆以厚衣陽脈方出而作
大汗翌日大小便始通下瘀血一盆如豬肝然用胃風
湯加桂附三服血止其寒甚如此亦世所未見也
少陰證口燥舌乾而渴尺寸脈俱沈沈遲則四逆湯沈

疾則大承氣湯 少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沈細而虛者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯 治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參 黃芩 柴胡 葛根 甘草

各一兩

山梔

炙

各半兩

右為麤末每服五錢薑棗煎溫服

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之

方見陽毒

風溫加

渴甚者宜瓜蒌湯

方見風溫

中暑伏熱累治不瘥其人發

渴不已酒蒸黃連丸主之

方見中暑

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔乾嘔欲吐

成嘔者聲物兼出也俗謂之哕非也夫哕與噦蓋字異而音義俱同吐者但吐出其物而無聲故有乾嘔而無乾吐嘔有責為熱者責為寒者至於吐家則悉言虛冷也嘔又有停飲者有胃腕有膿者皆當明辨之嘔而發熱

者柴胡湯證具與其嘔不止心下急鬱鬱微煩大柴胡湯主之者是邪熱為嘔也膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之與其乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之是寒邪為嘔也先嘔後渴者此為欲解先渴後嘔者為水停心下此屬飲家是停飲嘔者嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是胃腕有膿而嘔也諸如此者雖有殊別大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則為嘔也是以半表半裏證多云嘔也傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反

能食而不嘔此為三陰不受邪是知邪氣傳裏者必致嘔也至於乾薑附子湯證云不嘔不渴為裏無熱十棗湯證云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也即此視之其嘔為裏熱故矣嘔家之為病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不可攻也謂其逆氣而未收斂為實也其嘔而脈弱小便復

利身有微熱見厥者已為難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實疾證之逆順為施藥劑治則當矣

太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛嘔逆服陰陽俱緊者名曰傷寒麻黃湯 太陽病過經十餘日反二三

下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

按仲景雖曰嘔家雖有陽明證不可攻攻之為逆然陽明伏熱熏蒸清道而嘔且煩者非以苦寒直折之不可

故用大柴
胡下之

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下

利者大柴胡 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而

胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下

者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微

澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也成心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胸

中痛當責邪熱客于胸中大便反澹腹微滿則邪熱已下于胃也日數雖多若不經吐下止是傳邪亦未可下

當與柴胡湯以除上中二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非柴胡湯所能去調胃承氣

湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也 按經文溫溫當作溫溫又以嘔下當有闕文蓋嘔家正為柴胡證也豈

逸微澹
字那

嘔而發熱者小柴胡湯主之 傷寒六七日

發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴

胡加桂枝湯主之 太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根加半夏湯主之 活人云頭疼身熱痛肌熱
目疼鼻乾脈浮而長是也

葛根半夏湯方

葛根 半夏 各二錢 麻黃 生薑 各一錢半 甘草 芍藥

桂枝 各一錢 大棗 二枚

右咬咀以水一斗先煎麻黃葛根減二升去白沫納

諸藥煎取三升溫服一升覆取微汗

陽明傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出漉漉然者是

轉屬陽明也

大柴胡湯

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯

主之得湯反劇者屬上焦也

葛根半夏湯

傷寒嘔多雖有陽

明證不可攻之黃芩生薑半夏湯小柴胡湯

活人用桔梗湯

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴

胡湯 陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足

厥者必苦頭痛

或用真武湯去茯苓

少陽嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡湯若魚下

利者乃太陽少陽合病宜黃芩加半夏薑湯

論見往來寒熱

及下利 太陽陽明合病自下利為在表當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利者為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩湯以和解之嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散逆氣

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以

他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯

血弱氣盡腠

理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪

高痛下故使嘔也小柴胡湯主之

邪氣外甚湯不主裏氣不和氣下而不

上者但下利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不下利也與小柴胡湯以解半表半裏之邪

渴而

飲水嘔者柴胡不中與也

活人云宜治腸間水赤痰苓湯主之方見後

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之
少陰病下利脈微澀嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之
少陰病二三日不已至四五日腹

痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯去附子加生薑

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩燥數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血黃芩芍藥湯抵當湯 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯 傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾

薑黃連黃芩人參湯

傷寒邪自傳表為木自寒下醫反吐下損傷正氣寒氣內為格拒經

曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛而死是更逆吐下與乾薑黃芩人參湯以通寒格趙

仲景之意以木因寒下醫復吐下因成寒格吐證經云格則吐逆若更復吐下治之為逆故用乾薑以溫棗黃

連黃芩反佐以取之人參補正氣也今活人却言關脈遲故用此藥何耶雖然脈遲為胃中虛冷而吐者固也

又有脈數為胃中虛冷而吐者仲景嘗言之矣病人脈數數為客熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣

微高氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也今以其脈異證同故引此以為診視之別

虵厥者其人當吐虵今病者靜而復時煩此為藏寒虵

上入膈故煩須臾復上得食而嘔又煩者虵聞食臭出

其人當自吐虵烏梅丸

詳吐虵

渴先渴却嘔者為水停心下此屬飲家

活人云赤茯苓湯主之

先嘔却渴者此為欲解候也

金匱云嘔思水者急與之

下利嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無

熱者為陰宜猪苓湯真武湯

並見吐利門

煩嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑豉湯若未曾吐

汗下後兼欬而渴者宜猪苓湯

詳見不得眠

嘔家有瘕膿者不必治膿盡自愈

服桂枝嘔者酒客

病

戴陽明證具雖顯然有可下證者兼之嘔多猶屬上焦未可遽下宜小柴胡湯若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人禹間素有痰飲停飲傷滯且以二陳湯定之候嘔吐定徐進解太陽經藥若先嘔却渴者宜猪苓湯先渴却嘔者宜治禹間之水小半夏茯苓湯渴欲飲水水入即吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而小腸不利也宜五苓散

若少陰不渴而吐或乾嘔者理中湯去白朮加生薑
嘔而吐涎沫者吳茱萸湯 太陰厥陰間有嘔吐太
陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生薑煎已上陰證
乃陰中之陰宜用熱劑陽入陰者能為利而不為嘔
嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也 又有
陽證病新瘥後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜
竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯 大凡得之太陽而嘔
者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人

初得病太陽證有嘔吐不住藥投暖劑莫能治之知
太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則
合少陽其嘔為熱用暖劑非矣 又記有人初病具
太陽證而嘔一家少長患狀悉類與養胃湯入服無
不立效此時行之氣適然如此是為傷寒雜病又非
可以正經傷寒律之也

吳初得之嘔逆嘔噦清水嘔吐飲食者皆著寒傷胃
也如惡寒拘急未發熱而嘔逆或吐食者宜加減藿

香正氣散或入參養胃湯若已發熱者十味芎蘇散
發散或葛根湯加生薑半夏若自汗者不可發汗宜
正氣散去紫蘇以和之況發熱口苦脈弦數而嘔心
煩而嘔脇脇滿而嘔往來寒熱而嘔日晡發熱而嘔
皆屬少陽並小柴胡倍加半夏生薑主之熱少減黃
芩口乾加葛根括萎根心煩加薑汁炒黃連心下痞
滿加枳實若潮熱內實不大便嘔不止心下鬱鬱微
煩者大柴胡下凡嘔吐胃家有熱脈弦數口苦煩渴

胃有寒脈弦遲逆冷不食有水氣先渴後嘔腹滿怔
忡有膿血喉中腥氣奔逆上衝不煩治之嘔膿盡自
愈此四者不可不辨凡太陰腹滿吐食不下或腹痛
嘔吐脈沈者理中湯加半夏陳皮藿香厚朴生薑之
類寒甚加附子九少陰飲食入口即吐心下溫溫欲
吐復不能吐手足寒脈沈細者四逆湯加半夏生薑
橘皮之類凡厥陰嘔吐涎沫逆冷脈沈微者吳茱萸
四逆湯加半夏生薑陳皮之類

乾嘔欲吐太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯 傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯

張或問小青龍與小柴胡證皆嘔而發汗表裏之證大槩彷彿何故二方用藥之不同曰夫傷寒表不解裏熱未甚而渴欲飲水不能多不當與之以腹中熱尚少而不能消水飲停蓄故作諸證然水寒作病非

溫熱之劑不能解故用小青龍湯發汗散水原其理
初無裏證因水寒以致然也夫小柴胡證係傷寒發
熱熱邪傳裏在于半表半裏之間熱氣內攻故生諸
證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同故用藥有
薑桂柴苓之異也

傷寒中風醫反下之其人下利日十數行穀不化腹中
雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂
病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以胃中虛客氣

上逆故使鞭也甘草瀉心湯 傷寒一日太陽受之脈

若靜者為不傳頗欲吐若燥煩脈數急者為傳也宜與

麻黃湯表罷小柴胡白虎湯 傷寒胸中有熱胃中有

邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯 太陽中風下利嘔逆

表解者可攻之其人漉漉汗出發作有時頭痛心下痞

鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未

和也十棗湯 太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾

嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者與小柴胡湯

張或云乾嘔脇痛小柴胡十棗湯皆有之一和解一攻
伐何也蓋小柴胡病在半表半裏間外有寒熱往來內
有乾嘔諸病所以不可攻下宜和解以散表裏之邪夫
十棗湯證外無寒熱其人熱熱汗出此表已解也但頭
痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內蓄但有
伏飲是裏未和也與十棗湯以下熱逐飲已上二證宜
從表證以決有表證而乾嘔脇痛者乃柴胡湯證也無
表證而乾嘔脇痛即十棗湯證也上文所言頭痛者而
飲家有此證不可以常法拘仲景所以述此者
恐後學見其頭痛以為表不解而不收用也 食穀欲

吐者屬陽明也吳茱萸湯得湯反劇者屬上焦也小柴

胡湯梔子豉湯黃芩湯食穀欲吐者胃不受也與吳茱萸湯以溫胃得湯反劇者上焦

不納也 少陰病飲食入口即吐心中噤噤欲吐不能吐

始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯少陽病下利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥冷脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利正脈不出者通脈四逆湯 少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也 太陰病脈微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧

者死 病解後虛羸少氣欲吐者竹葉石膏湯

附

赤茯苓湯 治傷寒嘔噦心下滿胸膈有停水頭眩心

悸

赤茯苓 人參各一
兩 半夏
製 橘紅 芎藭

白朮 各半
兩

右咬咀每服四錢薑五片水煎服

葛根湯 治傷寒乾嘔不止 葛根 人參 麥門冬
去心

甘草

炙各一兩

半夏

薑製

黃芪

各七錢半

白茯苓

白朮

各半兩

右咬咀每服三錢生薑三片棗二枚同煎服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱 胸脇痛

胸滿 胸痛 耳聾

少陽經治法雖悉屬和解然有誤汗譏語屬胃一證宜調胃下之少陽雖無汗解之法然有小柴胡加薑桂者亦溫解微汗之意又此經本證胸脇痛耳聾寒熱往來乾嘔或嘔苦水宜小柴胡湯和解之倘不解者却宜大

柴胡湯下之若胸脇多痰瓜蒂散吐之斯仲景之微旨也

和解

小柴胡湯

小柴胡加桂湯

吐

瓜蒂散

下

調胃承氣湯

大柴胡湯

少陽之病口苦咽乾目眩也

足少陽者膽經也內經曰有病口苦者名曰膽痺甲

乙經曰膽者中精之府五臟取決於膽咽為之使少陽之脈起於目銳眥少陽受邪故口苦咽乾目眩活人

云宜小柴胡湯

尺寸俱弦者少陽受病也以其脈循脇絡於

耳故胸脇痛而耳聾

查少陽篇有胸脇滿而無痛證或云少陽病耳聾目赤胸滿而煩

為中風口苦咽乾目眩為傷寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿

而煩者不可吐下吐下則悸而驚

誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚傷寒

脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫

語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

成經曰三部俱

脈細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以脈弦細知邪容少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液

胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譫語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃為少陽本邪干之故煩

而悸凡頭痛俱為在表惟此頭痛為少陽者何以脈弦細也可汗不可汗當以此為法此少陽陽明宜重

則小承氣輕則大柴胡蓋少陽不可下陽明不可不下
故以小承氣湯少少與之取微利也成氏以調胃承氣
主之誤矣調胃承氣太
陽陽明藥也不可宿
傷寒三日少陽脈小者欲已

也成內經曰大則邪至小則平傷寒三日邪傳少陽脈當弦緊以脈小者邪氣微而欲已也少陽病

欲解時從寅至辰上內經曰陽中之少陽通於春氣寅卯辰少陽木旺之時

海辨表裏中三說假令少陽證頭痛往來寒熱脈浮

此三證但有一即為表也口失滋味腹中不和

小便或閉而不通或泄而不調但有一即為裏也

如無上下表裏證餘皆虛熱也是病在其中矣

張或謂少陽膽經縈紆盤屈皆多于各經及觀少陽篇中治證至簡又不聞何藥為本經之正法何也夫經絡所據太陽在後以為表陽明在前以為裏少陽在側夾于表裏之間故曰半表半裏治法在表者宜汗在裏者宜下既居兩間非汗下所宜故治療無正法也經曰少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚上條又云不可發汗似此其汗下吐三法皆少陽所忌其劑不過和解而已所

以仲景止以小柴胡湯而為用至當也然而經絡支
別雖多所行非由正道故為病亦不能多矣

口苦咽乾 口乾 舌乾 咽不利 口爛

成咽乾口燥舌澀俱為熱證但有微甚耳惟太陽中寒
桂枝附子湯證由誤汗咽乾作甘草乾薑湯以復其陽
者隨其逆治壞病者也非治其本寒也然咽乾之由有
由汗下後而得者有不因汗下而得者其間治法或和
解或微汗或急下或微下當考兼有之證而施輕重之

治然其為熱則一也蓋經謂咽喉乾燥亦不可汗以其多有裏證故也實無寒病善治者尤宜互考渴條乃獲全功

太陽咽喉乾燥者不可發汗

津液不足也

傷寒脈浮自汗

小便數心煩微惡寒脚攣急本桂枝附子湯證反與桂枝湯攻表得之便厥咽乾煩躁吐逆者甘草乾薑湯

傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩者白虎加人參湯 本下之心下痞與瀉

心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散

太陽病重發汗復下之不大便五六日舌上燥渴日晡
小有潮熱從心下至小腹硬滿而痛者大陷胸湯

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒
誤下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤
下之則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒針則不

得眠

許學士云宜
小柴胡湯

陽明病口燥漱水不欲嚥者必衄

或用黃芩芍藥湯犀角地黃湯 陽明病汗若下後渴

欲飲水口乾舌燥者白虎加入參湯 脈浮發熱口乾

鼻燥能食者必衄或用黃芩湯 陽明中風口苦咽乾

腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊或用麻黃小柴胡湯

少陽口苦咽乾目眩宜小柴胡湯

少陰病自利清水色純青心下痛口乾燥者急下之宜

大承氣湯 少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

大承氣湯 成傷寒傳經五六日邪傳少陰則口燥舌乾而渴為邪漸深也今少陰病得之二三日邪

氣未深入之時使作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水乾也急與大承湯下之以全腎也正經自病其深入宜急

下之若燥則死腎水乾燥故也
當下之證宜用今少陰病亦用何也
張氏云承氣湯陽明
主養四旁四二有病皆能傳之入胃其胃土燥則腎水
乾以二三日則口燥咽乾是熱之深傳之速也故曰急
下之以全腎水夫土實則水清謂水穀不相混故自利
清水而口乾燥此胃土實熱而致然也下利色青青肝
也乃肝邪傳腎緣腎之經脈從肺出絡心注胸中由是
而心下痛故急下以去實熱逐腎邪其六七日腹脹不
大便以入府之邪壅甚胃土勝則腎涸故急下以逐胃
熱滋腎水蓋陽明與少陰皆有急下之條然而證雖不
同其入府之理則一是以皆用大承氣也按舌乾輕
咽乾重者蓋咽乾雖皆通于少陰之絡而舌又為心之
苗也傷寒喜陽而惡陰故舌輕為輕也

厥陰傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥冷下部

脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者難治麻黃升麻湯傷寒一二日至四五日而厥者必發熱應下之反發其汗必口傷爛赤

吳少陰脈疾可下脈沈附子湯加知母黃芩麥門冬五味子天花粉若虛熱病後煩熱不解者以竹葉石膏湯須去半夏加天花粉潤之凡發汗吐下後口燥咽乾此津液衰少腎水不升虛火上炎也宜生津益氣湯或竹葉石膏湯若脈沈微足冷舌燥者多難治

其少陰有急下以救腎水之例若虛人水竭火燥不可下者以補中益氣湯倍加人參五味麥門冬天花粉黃蘗知母以滋水也

狐惑病亦咽乾默默不欲眠目不能閉聲啞咽乾為狐惑但蟲蝕下部者為狐其咽乾下唇有瘡黃連犀角湯趙活人謂脾藏有熱則津液枯少故令口燥而咽乾津液枯少固也然非獨脾藏有熱脾主太陰太陰腹滿而咽乾此可言脾熱特一證耳餘皆非也如白虎

加人參湯證口舌乾燥者表裏俱熱也口苦咽乾者少陽經熱或陽明中風也口燥咽乾急下之自利清水色純青心下痛口乾燥者少陰經熱也咽乾煩燥吐逆者誤汗津液少而欲作陽明內熱者如上數證豈亦脾藏有熱哉

眩

凡傷寒頭眩者莫不因汗吐下虛其上焦元氣之所致也眩者目無常主頭眩者俗謂頭旋眼花是也眩冒者

昏冒是也少陽口苦咽乾目眩者少陽居表裏之間以表邪漸入於裏表中陽虛故目眩也太陽少陽併病或眩者責其虛也傷寒有起則頭眩與眩冒者皆汗吐下後所致是知其陽虛也故針經曰上虛則眩下虛則厥眩雖為虛又陽明中風但頭眩不惡寒者此又風主眩也凡此皆非逆候及其諸逆發汗劇者言亂目眩者死噫病勢已成可得半愈及病已劇神醫莫為也

太陽傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩

服沈緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草

湯主之

吐下後裏虛氣上逆心下逆滿氣上衝胸表虛湯不足起則頭眩脈浮緊邪在表當發汗脈沈

緊邪在裏不可汗汗則外動經絡損傷陽氣則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以和經益陽

真武湯

主之汗後補不止用以密腠理未能止汗

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微

八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕

者久而成痿

傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱虛虛煩脈甚微為正氣內虛邪氣獨在至七八日

正氣當復邪氣當罷尚心下痞脇下滿氣上衝咽喉眩冒者是正氣未復而邪留也經脈動惕者經絡之氣虛

極久則熱氣還經必成痿弱
或用真武湯桂枝茯苓白朮甘草湯

少陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞
禁下 太陽太陽併病頭項強痛眩冒時如結胸心下
痞鞭刺大椎第一間肺俞肝俞禁發汗汗則譫語脈弦
五六日譫語不止刺期門

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難欲作
穀疸須下之腹滿如故所以然者脈遲故也

見前陽明病

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不
欬者咽不痛

陽明病身不重但頭眩而不惡寒者陽明中風而風內攻也經曰陽明病若能食名

中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者胃之系欬甚則咽傷故咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也

逆散加桔梗小柴胡乃本經中風非傷寒小承氣湯

少陽少陽之病口苦咽乾目眩也小柴胡湯加天麻川芎

少陰下利止而頭眩時時自冒者死下利則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤方論見動氣活人云宜小

建中湯諸逆誤汗而言亂目眩者死論見

吳太陽中風頭眩頭搖者脈浮弦而急也羌活神木

湯加防風天麻之類若血虛頭眩者以四物湯加人

參天麻之類若痰火上攻者加酒苓竹瀝之類若內傷勞役陰虛頭眩者宜補中益氣湯加川芎天麻防風蔓荊子之類若下焦元氣虛脫者宜入參養榮湯或大建中湯加天麻曾治一婦人服藿香正氣三劑汗出過多頭眩身搖發熱脈虛數遂用人參養榮湯倍加人參為主加天麻少佐酒炒黃蘗二服而愈易老曰頭旋目黑非天麻不能除故加之少加黃蘗以救腎水也

往來寒熱

成往來寒熱者寒已而熱作熱已而寒起蓋寒為陰熱
為陽裏為陰表為陽邪客于表與陽爭則發寒矣邪入
于裏與陰爭則發熱矣表邪多則寒多而熱少裏邪多
則熱多而寒少邪在半表半裏之間外與陽爭而為寒
內與陰爭而為熱表裏之不拘內外之無定由是寒熱
往來而無常也故以小柴胡立諸加減法以和解之又
寒熱如瘧與夫往來寒熱似是而非也如瘧者止作有

時正氣與邪爭則作分則止矣往來寒熱則止作無時
或往或來日有三五發或者十數發此其與瘧異也雖
然往來寒熱屬半表半裏當和解之又有病至十餘日
熱結在裏復往來寒熱亦宜大柴胡下而愈 趙傷寒
百問歌第五十九問中以陰陽相勝陽不足則先寒後
熱陰不足則先熱後寒此特論陰陽雜病二氣自相乘
勝然也非可以語傷寒

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食

心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞
鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小

柴胡湯主之

成病有在表者有在裏者有在表裏之間者此邪氣在表裏之間謂之半表半裏證

五六日邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日也王函曰中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風或傷寒非是傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胸膈苦滿知邪氣在表裏之間少陽行身之側胸脇為少陽之部故經曰其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾默默靜也邪在表則呻吟不安邪在裏則心煩悶亂內經曰陽人之陰則靜然

者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏則不能食不欲飲食者邪在表裏之間未至於心下不能飲食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔心煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處則所傳不一故有或為之證有柴胡證但見一證便是即是此或為之證

本太陽病不解

轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐

下脈沈緊者與小柴胡湯

成太陽轉入少陽是表邪入于裏脇下鞭滿不能食往來

寒熱邪在半表半裏之間若已經吐下脈沈緊者邪氣入府為裏實尚未可吐下脈沈緊為傳裏雖深未至入府外猶未解與小柴胡湯以和解之若已吐下發汗溫針譖語柴胡湯證

罷此為壞病知犯何逆以法治之

成少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗

溫鍼損耗津液胃中乾燥木邪于胃必發譫語若柴胡證不能者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之逆以法治之救壞病助榮衛生津液桂枝湯求之

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利

渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴

胡桂枝乾薑湯主之

難知曰若用柴胡而移時于早晚氣移于血血移于氣是邪無所容

之地故知其欲自解也傷寒五六日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者則邪氣猶在半表半裏之間為未解也胸脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小使不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴不嘔知非裏熱也

傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗者津液不足而陽虛于上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液以助

血弱氣虛腠理開邪氣因入與正氣相搏結

於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食

藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主

之按血弱氣盡至結于脇下是釋胸脇苦滿句正邪分爭三句是釋往來寒熱句倒裝法也默默不欲飲食

兼上文滿痛而言藏府相連四句釋心煩喜嘔也

小柴胡湯方

柴胡半斤半夏半升

湯洗

人參

甘草

黃芩

生薑

各三

兩
大棗十二
枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日三服

成內經曰熱淫于內以苦發之柴胡黃芩之苦以發
傳邪之熱裏不足者以甘緩之人參甘草之甘以緩
中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半夏以除
嘔邪在半表則榮衛爭之辛甘解之並棗以和榮衛
加減法少陽邪在胸中
用此加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括萋實一枚胸中煩而

不嘔熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用
人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛溫熱宜

寒瘵聚宜苦括蔓若渴者去半夏加人參合前成四

兩半括蔓根四兩半夏燥津液非渴者所宜人參甘

物為當若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩惡寒

通壅通壅功若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩甘

少止痛功大人中滿痞者去大棗之甘鹹若心下悸小便不利者

以炙之痞鞭者加牡蠣之鹹飲而水蓄不行為悸小便不利

去黃芩加茯苓四兩內經曰腎欲堅急食苦以堅腎

得苦則水益堅故去黃芩淡味滲泄為陽扶苓甘淡以泄伏水若不渴外有微熱者

去人參加桂三兩溫覆取微汗愈不渴者裏和也故

表未解也加桂以發汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半

升乾薑二兩

欬者氣逆也甘則壅氣故去人參大棗內經曰肺欲收急食酸以收之五味子

之酸以收逆氣肺寒則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也

傷寒邪氣在表者必漬形以為汗邪氣在裏者必蕩

滌以取利其於不外不內半表半裏是當和解則可

也小柴胡和解表裏之劑內經曰熱淫于內以苦發

之邪在半表半裏則半成熟矣熱氣內傳變不可測

須迎而奪之必先散熱是以苦寒為主故以柴胡為

君黃芩為臣以成徹熱發表之劑邪氣傳裏則裏氣
不治故用人參甘草為主以扶正氣而復之也邪初
入裏氣必逆也是以辛散之物為之助故用半夏為
佐以順逆氣而散邪也裏氣平正則邪氣不得深入
是以三味佐柴胡以和裏內經曰辛甘發散為陽表
邪未已逆遷內傳既未作實宜當兩解其在外者必
以辛甘發散故用生薑大棗為使輔柴胡以和表也
七物相合兩解之劑當矣邪氣自表未斂為實乘虛

而溱則所傳不一故有增損以禦之胸中煩而不嘔
煩者熱也嘔者氣逆也煩而不嘔則熱聚而氣不逆
邪氣欲漸成實也人參甘補去之使不助熱也半夏
辛散去之以無逆氣也除熱必以寒泄熱必以苦加
括萋實以通胸中之鬱熱若渴者津液不足半夏味
辛性燥滲津液物也去之則津液易生人參味甘而
潤括萋根味苦而堅堅潤相合津液生而渴自己邪
氣入裏裏氣不足則墜寒而腹中痛黃芩苦寒而寒

中去之則氣易和芍藥酸泄而利中加之則裏氣得通而痛自己內經曰甘者令人中滿大棗甘溫去之則鞭滿散鹹以熨堅牡蠣味酸鹹寒加之則痞者消而鞭者熨若心下悸小便不利水畜而不行也內經曰腎欲堅急食苦以堅之堅腎則水益堅黃芩苦寒去之則蓄水浸行內經曰淡味滲泄為陽茯苓甘淡加之則津液通流若不渴外有微熱不渴則津液足去人參以人參為主內之物也外有微熱則表證多

加桂枝以取汗發散表邪也若欬者肺氣逆也甘補中則氣愈逆故去人參大棗之甘肺欲收急食酸以收之氣逆不收故加五味子之酸蓋咳本於寒寒氣內淫則散以乾薑之辛熱生薑乾薑一物也生者溫乾者熱故以乾易生也

吳或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分陰陽而用之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱之藥半表半裏之熱除往來寒熱小有日晡潮熱也佐以

黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛以退寒人參大
棗之甘溫以助正氣解渴生津液則陰陽和而邪氣
解矣但太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也
如用之豈曰無害若夫令陽寒面赤發熱脈沈足冷
者服之立至危殆可不慎哉及內虛有寒大便不實
脈息小弱與婦人新產發熱皆不可用也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯
必蒸蒸而振却發熱汗出而解

成邪在半表半裏之間
為柴胡證即未作裏實

醫使以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不為逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也傷寒中風有正氣勝陽氣生却復發熱汗出而解也

柴胡證但見一證便是不必悉具柴胡證是邪氣在表裏之間也或胸中煩

而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬但見一證便宜與柴胡湯隨或為證以法治之不必待其證候全具也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出大陷

胸湯主之
詳結胸

大柴胡湯方

柴胡半斤

半夏半升

黃芩

芍藥各三兩

生薑

切片五兩

大棗拾二枚

枳實四枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方有大黃二兩 若加大黃恐不為大柴胡湯也

成方有緩峻輕重醫當臨時斟酌如大滿大實堅有燥屎者非駛劑則不能泄是以有大小承氣湯之峻

也如不至大堅滿惟邪熱甚而須攻下者又非承氣湯之可投必也輕緩之劑乃大柴胡湯用以逐邪熱也經曰傷寒發熱七八日雖脈浮數可下之宜大柴胡湯又曰太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解可與大柴胡下之則愈是知大柴胡為下劑之緩也傷寒主于可下則為熱有餘應火而歸心若先入心折熱必以苦為主故以柴胡苦平微

寒為君黃芩苦寒為臣內經曰酸苦湧泄為陰泄實
折熱必以酸苦故以芍藥枳實為佐辛者散也散逆
氣者必以辛甘者緩也緩正氣者必以甘故用半夏
生薑之辛溫大棗之甘溫為之使也一方加大黃以
大黃有將軍之號而功專蕩滌必應以大黃為使
許有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與
之不除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去
之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與

大柴胡湯三服而病除蓋大黃蕩滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名大柴胡須酒洗生用有力

張或問大柴胡若內煩裏實者固宜用也其嘔而下利者亦用之何也夫治病節目虛實二者而已裏虛者雖使難而勿攻裏實者雖吐利而可下經曰汗多則便難脈遲尚未可攻以遲為不足即裏氣未實故也此以大柴胡主之凡吐利心腹濡軟為裏虛嘔吐

而下利心下痞鞭者是裏實也下之當然況太陽病
過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者
先以小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解
也與大柴胡湯下之則愈然嘔不止而微煩裏熱已
甚結于胃中故下之則愈二節病證雖有參差其裏
實同一機耳皆與大柴胡者宜也

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利
渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴

胡桂枝乾薑湯主之

已發汗而復下之雖不失先發後攻之序及當汗而反下之宜然既

汗之邪當自散若不待其全解及內實而復下之是猶傷于早也烏得不結然已發汗則邪勢已衰雖或失之

下早故結亦當微也

成註欠明故著之

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤

枳實根四兩

桂枝去麤皮三兩

牡蠣煨

乾薑

黃芩各二兩

甘草炙一兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日三服初服微煩再服汗出便愈

厥內經曰熱淫于內以苦寒之柴胡黃芩之苦以解
傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在
表之邪鹹以軟之牡蠣之鹹以消胸脇之滿辛以潤
之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為渴苦以
堅之括萋之
苦以生津液

病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下
之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱
欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒
陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣
弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝

冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰
氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲瀋故知血亡也
右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦
欲著複衣服瀋因大下所致故病當惡寒後發熱之
時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝
冷勝熱非是盛夏牽延至盛冬也

胸脇痛

邪氣傳裏必先自胸而脇以次經心腹而入胃也是以

胸滿多帶表證脇滿多帶半表半裏證如下後脈促胸
滿者桂枝去芍藥湯又太陽與陽明合病喘而胸滿者
不可下宜黃麻湯二者屬表須汗之蓋胸中至表猶近
也及脇則更不言發汗但和解而已經曰設胸滿脇痛
者及胸脇滿不去者與夫本太陽病不解傳入少陽脇
下便滿乾嘔往來寒熱脈沈緊者俱宜小柴胡和解之
也大抵初邪入裏尚未停留為實但鬱積生滿者和解
斯可矣若留于胸中聚而為實者又非吐下之不可已

如發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯若胸中痞硬
氣上衝咽喉不得息者此胸中有寒瓜蒂散二者均是
吐劑又當知梔子吐虛煩客氣熱瓜蒂吐痰實宿寒也
太陽病十日已去脈浮細而嗜卧者外已解也若胸滿
脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯 傷寒四五日
身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半
夏加人參栝蒌根主之 傷寒五六日中風往來寒熱
胸脇苦滿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴

或腹中滿或脇下痞鞭或心中悸小便不利或不渴身
有微熱或欬小柴胡湯主之 傷寒十三日不解胸脇
滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而
不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者
實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之
得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫數下之不
能食脇滿痛面目及身黃項強小便難者與柴胡湯必
下重 傳經熱邪脇滿乾嘔大柴胡湯 太陽中風下

利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭
痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此
表解裏未和也宜十棗湯

十棗湯方

芫花

炒黑

甘遂

大戟

各等分

右為細末和合之再入臼中杵二三百下先以水一
升煮肥棗十枚取五六合去渣納藥末強人一錢虛
人半錢單飲棗湯送下平旦服若下少病不除者明

日更服加五分利後米粥調養若合下不下令人脹
滿徧身浮腫也昔杜士問孫兆曰十棗湯畢竟治甚
病孫曰治太陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未
和孫曰頭痛心下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未
和也杜曰公但言病證而所以裏未和之故要緊總
未言也孫曰某嘗於此未決願聽開喻杜曰裏未和
者蓋痰與燥氣壅於中焦故頭疼乾嘔短氣汗出是
痰隔也非十棗不治但此湯不宜輕用恐損人於倏

忽用藥者慎之

陽明病潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之 陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者小柴胡湯 陽明中風脈弦浮大短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯脈但浮無餘證者麻黃湯 本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦不欲飲水而嘔者柴胡證也若因水而嘔者水停心下也

少陽脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽

方論見往來寒熱

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩燥數日小便利色白者熱除也欲得食為病愈若厥而嘔胸脇煩

滿者必使血

黃芩芍藥湯小柴胡湯抵當湯

吳綬治脇下痛加枳實青皮桔梗芍藥脇下硬加牡蠣粉若增寒拘急往來寒熱而胸脇滿者加桂枝白芍藥俱小柴胡湯內加之

婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結胸

狀謔者刺期門

論見謔語

吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩冒脈動惕者

成痿

論見痞

下後脈弦者必兩脇拘急 脇下素有痛連在臍傍痛

引少腹入陰筋者名藏結死

左右者陰陽之道路脇之部也宿痞在脇則陰陽之

道路不通故邪不得傳經而直入于臟是以死也

胸滿

論見前脇滿痛條

內兼脇病者已前見

太陽太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

陽受氣于胸中喘而胸滿者陽氣不宣發瘕而逆也心
下滿腹滿皆為實當下之此以為胸滿非裏實故不可
下雖有陽明然與太陽合病為屬表是與麻黃湯發汗

發汗若下之而煩熱胸

中窒者梔子豉湯

陽受氣于胸中發汗若下使陽氣不足邪熱客于胸中結而不散故煩熱

而胸中窒塞與梔子豉湯以吐胸中之邪

病如桂枝證頭不痛項不强寸

脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒

也當吐之宜瓜蒂散

病如桂枝證為發熱汗出惡風言邪在表也頭痛項強為桂枝證具

若頭項不痛強則邪不在表而傳裏也浮為在表沈為
在裏今寸脈微浮則邪不在表亦不在裏而在胸中胸
中與表相應故知邪在胸中者猶如桂枝證而寸脈微
浮也以胸中痞鞭上衝咽喉不得息知寒邪客于胸中

而不在表也千金曰浮上部填塞胸心胸中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐胸中之邪若氣不上衝則不可用也

太陽病下之脈促胸滿者桂枝去芍藥湯

方論見惡寒

若脈促不結胸者欲解也 下後胸滿小便不利若

魚煩驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯

方論

見驚門

若魚噦而舌胎者為濕痺

陽明潮熱大便溏小便可胸脇滿屬陽明

見脇滿痛

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者若吐下之

則悸而驚救逆小柴胡去黃芩加茯苓湯

少陽之脈起于目眚走于

耳中其支者下胸中貫膈風傷氣風則為熱少陽中風
氣壅而熱故耳聾目赤胸滿而煩邪在少陽為半表半
裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸
以下除滿下則亡血血虛者驚

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自

痛若下之必胸下結鞭

太陰為病陽邪傳裏也太陰之脈布胃中邪氣壅而為腹滿上

不得降者嘔吐而食不下不得升者自利益甚時腹
自痛陰塞在內而為腹痛者則為常痛此陽邪于裏雖
痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留于
胸下為結鞭經曰病發于陰而反下之因作痞瀉心
湯理中湯元不渴四逆湯趙活人第十八問中云太
陰者脾之經主胸高腹脹愚嘗觀成氏明理論云胸中
至表猶近所以仲景云喘而胸滿者麻黃湯是屬表而
可汗者也又云胸脇滿者小柴胡湯屬半表半裏而可

和解者也至于太陰止云腹滿而吐食不下時腹自痛或腹滿而咽乾由此觀之可見太陰不主胸上者明矣

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯

少陰之脈從腎上貫肝鬲入肺

中則循喉嚨其支別者從肺出絡心注胸中邪自陽經傳于少陰陰虛客熱下利咽痛胸滿心煩也與猪膚湯

調陰散熱咽痛五方大能解

厥陰病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿而

煩飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

手足厥冷者邪

氣內陷也脈緊牢者為實邪氣入府則脈沈今脈乍緊知邪結在胸中為實故心下滿而煩胃中無邪則喜飢以病在胸中雖飢而不能食與瓜蒂散以吐胸中之邪手足厥冷非脈緊胸痛別之

熱少厥

微胸脇煩滿一證已前見

吳胸滿多用吐法實者宜瓜蒂散虛者宜人參蘆薈
以香蘇散飲下一甌以手探喉中吐之亦可凡傷寒
三四日已傳少陽經脈弦口苦發熱而胸滿宜小柴
胡湯若胸中滿悶者加枳實桔梗各二錢以利之若
胸脇滿而煩者加瓜蒌實三錢黃連一錢半 活人
治胸滿氣痞不寬只用枳殼桔梗各二錢生薑五片
名曰枳殼湯 凡心之上胸之分宜枳殼心之下胃

之分宜枳實蓋枳殼能泄至高之氣枳實能泄至低之氣其瓜蒌仁能瀉肺洗滌胸中痰垢之要藥也故胸滿而煩必加之一法治氣痞胸滿用小麥蘗一二升以生枳殼切半同炒令熟去枳殼以帛包熟蘗熨胸中頓易熱之則氣易散而愈矣

胸痛

胸脇痛而耳聾尺脈俱弦者少陽受病也

論見大法活人云柴胡湯

之主

病胸中諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反
有涎漉下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之
利即止

吐下後嘔嘔欲吐胸中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃

承氣湯

詳嘔

耳聾

耳聾有二一由重發汗虛一由少陽中風 胸脇痛耳
聾尺寸脈俱弦者少陽受病也

未持脈時病人又手自冒心試教令欬而不欬者此必

耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

黃者建中湯

少陽中風兩耳無聞目赤胸滿而煩者不可吐下吐下

則悸而驚

或用小柴胡湯

少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥者此兩感證厥陰

榮衛不通耳聾囊縮不知人危矣濕溫證治在太陰

不可汗汗則不能言耳聾不知病處身青面色變名曰

重暈

白虎加蒼木湯

陽毒

陽毒之證初受病時所加邪毒深重加以當汗失汗當下失下或吐下後邪熱乘虛而入誤服熱藥使毒熱散漫如抱薪救求火無不延燎至於六脈沈實舌卷焦黑鼻中如烟煤身面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌棄衣而走皆其證也五日可治六七日不可治

升麻鼈甲湯 治陽毒為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血

升麻 二兩

當歸

蜀椒

炒去汗

甘草

各一兩

鼈甲

手指大一一片

雄黃

研半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金方陽毒升麻湯有桂無鼈甲陰毒甘草湯無雄黃

附

活陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下

膿血五日可治七日不可治

升麻 犀角鎊 射干 黃芩 人參 甘草各等

分

右以咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗解不解重

作

陽毒梔子湯 治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻 黃芩 杏仁 石膏各二錢 梔子 赤芍藥

知母 大青各一錢 甘草五分 柴胡一錢半

右吹咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃一兩半 桂心七錢半 甘草炙 芒硝 大腹皮

木通各一兩 桃仁二十一枚

右吹咀水煎服以利為度

海葛根散 治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根七錢半 黃芩 大黃醋炒 甘草 梔子

朴硝各半兩

右咬咀水煎服

活黑奴丸

治時行病六七日未得汗脈洪大或數面

赤目痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日

已上不解熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不

治或人精鬼已竭心下尚煖撥開其口灌藥下咽即

活魚治陽毒及發斑

麻黃

去節泡
三兩

大黃

二兩
釜底煤研

黃芩

芒硝

灶突墨

研

梁上塵

小麥奴

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與
冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服
一九須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥
揔之成黑勃是也此藥須是病人大渴倍常燥盛者
乃可與之若不渴者服之反為禍耳

脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤以水漬布薄
之疊布數重新水漬之稍按去水塔於胸上須臾蒸熱
又漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於

水中勢纔退則已亦一良法也

丹砂丸

治傷寒陰陽二毒危惡形證

舶上硫黃

水銀

太陰玄晶石

太陽石

各一兩

硝石

半兩

右為末用無油銚子以文武火炒上頂藥令勻如灰色研極細生薑自然汁浸炊餅丸如菜豆大每服五丸龍腦生薑蜜水下壓其燥也若陽毒棗湯下陰毒白湯下

白虎加人參名化斑湯 斑盛者青黛一物湯 咽痛

玄參升麻湯

青黛一物湯

青黛

如棗大一塊

用新汲水研服

玄參升麻湯

升麻 玄參 甘草 各半兩

水三盞煎一盞半去滓服


陶陽毒傷寒服藥不效斑爛皮膚手足皮俱脫身如

塗硃眼珠如火燥渴欲死脈洪大而有力昏不知人
宜三黃石膏湯主之或升麻梔子湯吐之 若熱甚
時狂時昏口噤咬牙藥不可下者用水漬法候牙寬
狂亂稍定投藥亦良如黑奴丸不可輕用

活陽氣獨勝陰氣暴絕必發燥狂走妄言面赤咽痛
發斑或下下利赤黃脈洪實或滑促宜酸苦之藥救
陰 陽毒輕者桔梗大黃湯 陽毒升麻湯 梔子
仁湯 又龍膽草一物湯

趙陽根于陰陰根于陽無陽則陰無以化無陰則陽無以生可見兩者不能相無也又仲景云陽氣先絕陰氣後絕此人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭此人死身色必赤則知陰陽二氣在人身中不可偏絕則無復生之理今活人書論陰毒而曰陽氣絕論陽毒而曰陰氣絕既絕矣即為不治之證又何藥焉蓋陰陽二證之深重也又挾毒氣是為陰毒陽毒故其藥皆用升麻犀角雄黃大青輩以解其毒然後陽

毒泄而陰氣復陰毒泄而陽氣復大汗出而解矣活
人書何不曰陽氣極盛陰氣極微為陽毒陰氣極盛
陽氣極微為陰毒庶不為極絕之證



證治準繩卷四十三