

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十五

詳校官太醫院醫士 臣 舒儀

編修 臣 倉聖脈 覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官助教 臣 卜維吉

謄錄監生 臣 陸潮愈

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十四

明薛己訂

婦人良方

產後遍身疼痛方論第一

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致肢體沈重不利筋脈引急發熱頭痛宜用越痛散治之陳無擇云若兼感寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗

則筋脈抽搐手足厥冷則變為瘧當大補氣血為主

愚按前症若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物
炮薑紅花桃仁澤蘭補而敗之若按而痛稍緩此是
血虛也用四物炮薑人參白朮補而養之

附治驗

一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服
解散祛血之藥不時昏憤六脈洪大如無用補中益
氣加炮薑半夏一劑頓退二三四劑寢食甘美但背

強而痛用八珍散大補湯調理而安

一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之症也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而全愈

趁痛散 治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝

酒炒

甘草

炒

薤白

各一兩

當歸

桂心

白朮

炒

黃芪

炒

獨活

生薑

各半兩

兩

右每服半兩水煎

五積散

方見四卷第九論

附方

四物湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

八珍湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

產後腰痛方論第二

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎為胎胞所繫此因產勞傷

腎氣以致風冷客之若連背脊痛久未已後遇有娠必至損動

愚按前症真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補為主佐以寄生湯如不應須十全大補加附子
附治驗

一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔余以為脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲匙許四劑後漸安服百餘劑而愈

治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沈重行步艱難

獨活

川芎

芍藥

炒桂心

續斷

桑寄生

生薑

各六分

當歸

防風

各八分

右水煎服

四神湯即生料五積散加桃仁逐敗血去風濕產後惡露不盡腰重痛或兩股痛如錐刺宜服桃仁湯如若作癱用五香連翹湯

桃仁湯 治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿股作

痛急用此湯治之如未應多變作癱須用五香連翹湯

桃仁

去皮
共

蘇木

生地黄

各半
兩

玄蟲

去足
翅炒

水蛭

炒

三十
箇

右每服五錢薑水煎空心熱服以惡露下為度

五香連翹湯

木香

丁香

沈香

乳香

麝香

升麻

獨

活

桑寄生

連翹

木通

各二
兩

右每服五錢水煎入竹瀝少許服

當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出壯熱氣短

黃芪

炒

芍藥

炒各二兩

當歸

右每服四錢水煎

附方

十全大補湯治症同前又治自汗盜汗或內熱晡熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨脹脇肋作痛或臍腹陰冷二便不調或頭頸時痛眩暈目花或

心神不寧恍惚不寐或形容不充肢體作痛或鼻吸
氣冷急趨氣促或因飲食勞役起居失宜或更有一
切虛熱之症但服此藥補其根本諸症悉退

方見二
十四卷

第四
論

獨活寄生湯

方見四卷第七論

產後惡露不絕方論第三

產後惡露不絕因傷經血或內有冷氣而臟腑不調故
也

愚按前症若肝氣熱而不能主血用六味地黄丸若
肝氣虛而不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝
血用六君子湯胃氣下陷而不能統血用補中益氣
湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經
怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用十全
大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸

附治驗

一產婦惡露淋漓體倦面黃食少惡寒晝夜不寐驚

悸汗出此脾經虛熱用加味歸脾湯而痊後因怒脇
脹作嘔少食用六君加柴胡治之而痊

一方用蒲黃二兩水煎頓服

一方貫衆醋蘸炙乾為末每服二錢米飲調下

返魂丹

一名益母草丸

治產後惡露不絕及胎前產後諸症

益母

草四五月採取陰乾用葉及子
○子名菟蔚子不許犯鉄錘

為末煉蜜丸彈子大

每服一九細嚼米飲下臨產腹痛或胎動不安或漏

血當歸湯化下死胎或胎衣不出或牙關緊急或血

暈血熱煩悶如見鬼神併童子小便入酒少許化下
惡露腹痛或淋瀝或月水不調當歸酒化下

附方

六味丸

方見二十四卷第十一論

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

補中益氣湯

六君子湯

加味四物湯

三方見二十四卷第六論

一味防風丸

方見十二卷第六論

產後惡露不下方論第四

產後惡露不下因臟腑勞傷氣血虛損或風冷相搏所致

愚按前症若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花
蕊石散若因去血過多而煩熱不止宜參第七論主

治

附治驗

方藥

一產婦患前症服峻厲之劑惡露隨下久而昏憤以手護其腹余曰此脾氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

失笑散

方見後

人參理中湯

方見後

花蕊石散

方見十八卷第四論

返魂丹

方見前

產後惡露上攻心痛方論第五

產後心痛為陰血虧損隨火上衝心絡名曰心胞絡痛
宜大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕死
夕發朝死無藥可救

憑按前症若陽氣虛寒用岩蜜湯溫之瘀血上衝用
失笑散散之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡
肚腹作痛以手按之却不痛此血虛也須用補養之

劑

附治驗

一產婦患前症昏憤口禁冷汗不止手足厥逆用六君子加附子一錢以回其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安

一產婦患前症手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復痛亦用前藥而安

一產婦患前症用大黃等藥其血雖下復患頭痛發

熱惡寒次日昏憤自以兩手堅護其腹不得診脈視其面色青白余為脾氣虛寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加薑桂調理而安

大岩蜜湯 治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地黄 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥 炒 乾薑

炒甘草 炒桂心 小草 各一兩 細辛 半兩

右每服半兩水煎

失笑散 治產後惡血上攻心腹作痛或牙關緊急一服可愈

五靈脂

蒲黃

各錢

右醋水煎一味靈脂尤妙

六君子湯

方見二十四卷第六論

十全大補湯

八珍湯

二方見二十四卷第四論

產後惡露腹痛方論第六

產後腹痛或因外感五邪內傷六淫或瘀血壅滯所致
當審其因而治之

愚按前症若瘀血內停用失笑散風寒外感用五積
散

附治驗

一婦產後小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停灌以失
笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

一婦人經水來比常度過多不止遂服瀉藥止之致

腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈

隱居澤蘭湯 治產後惡露腹痛或胃滿少氣

澤蘭 生地黃 當歸 芍藥 生薑 甘草

分 妙五 大棗 四 箇

右水煎服

四物湯 方見二十四卷第六論

五積散 方見第四卷九論

失笑散 方見前

產後兒枕腹痛方論第七

產後兒枕者乃母胎中宿血也或因風冷凝滯於小腹
而作痛

愚按前症若宿血作痛失矣散行之既散而仍痛四
神散調之若惡心作嘔此屬氣虛用六君子健其胃
氣若發熱頭痛或腹痛按而不痛此屬血虛用四物
炮薑參朮補其脾氣

附治驗

一產婦患前症或用驅逐之劑昏憤口喙手足發搐
此血氣虛極之變症也用八珍湯加炮薑二錢四劑
未應又以十全大補湯加炮薑一錢二劑而甦

一方用山查濃煎汁入砂糖少許再煎熱服

失笑散 方見前

四神散 方見第四卷第四論

六君子湯

四物湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

產後小腹痛方論第八

產後小腹痛由惡露凝結或外寒相搏若久而不散必成血瘕而月水不調

愚按前症若因氣滯用延胡索散若因外寒用五積散若因怒氣用四物加木香柴胡若因血虛用四物參朮炮薑若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑若因脾

虛血弱用六君當歸炮薑治之

附治驗

一產婦患前症或作嘔或昏瞶此脾氣虛寒用人參
理中湯漸愈又以補中益氣湯加茯苓半夏全愈後
復作痛而兼喘仍用補中益氣湯培補脾肺而瘥

延胡索散 治產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索

桂心

各半兩

當歸

一兩

右為末每服二錢食前用熱酒調下失笑散尤效

當歸養血丸 治產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 炒各二兩 桂心 一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十丸溫酒下

附方

人參理中湯 治陽氣虛弱小腹作痛或脾胃虛弱飲食少思或去後無度或嘔吐腹痛或飲食難化胸膈不利 加附子名附子理中湯

人參 白朮 乾薑 炮 甘草 炙各等分

右每服五七錢或一兩水煎服

五積散

方見四卷第九論

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

產後寒疝腹痛方論第九

產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳
無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊

肉湯治之

愚按前症若脾胃虛弱寒邪所侵用蟠蔥散若肝經
濕熱小便不利用龍膽瀉肝湯仍參前論恐有瘀血
為患

附治驗

一產婦小腹作痛小便不利內熱晡熱形體倦怠余
用加味逍遙散以清肝火生肝血用補中益氣湯補
脾胃升陽氣而痊

羊肉湯 治產婦脾虛寒邪所乘以致腹痛或頭眩脇

臍急痛

精羊肉

四兩

當歸

川芎

各半兩

生薑

一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

蟠葱散

龍膽瀉肝湯

二方見二十四卷第八論

加味逍遙散

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

產後兩脇脹痛方論第十

產後兩脇脹痛因惡露不盡或肝經血虛或肝經氣滯
當分而治之

愚按前症若肝經血瘀用玄胡索散若肝經氣滯用
四君青皮柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血
俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味丸
若肺金勢盛尅制肝木用瀉白散仍參照前各論主
之

附治驗

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

經效方 治產後肝經氣滯不平脇肋腹痛或寒熱往來內熱哺熱

當歸一錢五分芍藥炒苦梗炒枳殼炒檳榔各八分桂心

青木香 柴胡各六分

右水煎服

當歸散 治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發熱腹痛或腹脇脹滿以當歸乾薑等分每服三錢水煎

抵聖湯 治血滯腹痛或腹悶滿嘔吐不食方見後卷第八論

四君子湯

四物湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

六味丸

方見二十四卷第十一論

瀉白散

方見五卷第二論

玄胡索散

方見前

產後積聚癥塊方論第十一

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成然積為陰陰性沈伏故痛不離其部聚為陽陽性浮動故痛無常處皆由飲食不節起居失宜產後血氣虛弱風冷

所乘搏於臟腑耳

愚按前症乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固元氣為主若求旦夕之效而攻其邪則速其危矣當參前六七論及七卷痲痺諸論治之

附治驗方藥

一產婦腹中似有一蠶或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皎白脉浮而濇余謂此肝氣虛而血弱也不信乃行破血行氣痛益甚轉動無常又認以

為血蠶專用破血祛逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益
信為蠶確服下蟲等藥去血甚多形氣愈虛肢節間
各結小核隱於肉裏以為蠶子畏藥而走於外余云
肝臟血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋
肢節胸項皆屬肝膽部分養其脾土補金水以滋肝
血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治
而愈

一婦月經不調兩拘腫脹小便澀滯腹中一塊作痛

或上攻脇腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦
飲食無味殊類瘵症久而不愈余謂肝脾血氣虧損
用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而愈

逍遙散

八珍湯

歸脾湯

三方見二十四卷第四論

產後血瘕方論第十二

產後瘀血與氣相搏名曰瘕謂其痛而無定處此因風

有風冷而成輕則否澁重則不通

愚按前症乃寒邪乘客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養為善難經云任脈之病男子為七疝女子為瘕聚當參前後各論治之

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸

八分

桂心

芍藥

炒

血竭

蒲黃

炒各六分

延胡索

炒四分

右為末每服二錢空心酒調下

葛氏方治症同前用桂心為末每服一錢空心酒調下

產後餘血奔心煩悶方論第十三

產後瘀血奔心蓋因分娩後不飲童便以致虛火上炎所致宜用後方主之

愚按前症當與前第五論同治

金黃散 治惡熱上衝肚腹作痛或發熱作渴

延胡索 蒲黃 各一兩 桂心

右為末酒調服

一方用炒蒲黃每服三錢水煎服失笑散亦佳

產後虛熱發熱方論第十四 原無論

竊謂前症乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火症投以涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱未復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無

火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也治法前症無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯

附治驗

大尹俞君之內產後發熱嘔熱吐血使血兼盜汗小

便頻數胸脇脹痛肚腹痞悶余曰此諸臟虛損也症當固本為善自恃知醫用降火之劑更加瀉利腸鳴吐嘔不食腹痛足冷始信余言診其脈或浮洪或沈細或如無其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨時從症先用六君子加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸症漸退更佐以十全大補湯半載全愈儒者楊敬之內人所患同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命

門火虛不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用
八味丸補土之母而痊

人參當歸湯 治產後虛煩短氣煩悶

人參 當歸 麥門冬 桂心 生地黄

各二錢

大棗 四錢 粳米 一合 淡竹葉 二錢 芍藥 一錢 炒黃

右水煎服

蒲黃散 治症同上方見前兒枕病

四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤效

六味丸

八味丸

二方見二十四卷第十一論

八珍湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

薛氏醫案卷四十四

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十五

明 薛己 訂

婦人良方

產後口乾痞悶方論第一

論曰產後口乾痞悶因食米麩乾飯太早脾胃不能消
化熱鬱所致慎不可下但服見現丸則愈無擇云若內
積憂煩外傷燥熱宜四物湯去地黃加入參烏梅可愈

愚按前症若宿食停滯用六君枳實神麩若因肉食所致更加山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受傷用六君子湯或燕酸噉腐加炮薑作瀉更加升麻如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯為是

附治驗

一婦人食前黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導等藥不應飲食日減饑體日瘦半年矣余謂此食

積為患用大酒麴炒為末溫酒調服二錢俄間腹鳴
良久仍下糝而愈

一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等
分為末以陳皮湯送下數服而愈

見現丸

薑黃炒 三稜 錯 萹澄茄 陳皮 良薑 人參

莪朮

酒炒各
等分

右為末用蘿蔔汁糊丸桐子大每服三十九白湯下

產後心煩發渴宜清心蓮子飲

方見六卷首論

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

四神丸

方見八卷第八論

產後血渴方論第二

竊謂前症若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯

若血虛發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁
用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味
白朮散

附治驗

一產婦患前症朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛
余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更
加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥
門五味氣血漸復

附方

十味白朮散

治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因

吐瀉所致

人參

白朮

炒

木香

白茯苓

甘草

炒

藿香

乾葛

各一錢

一

右水煎服

竹葉歸芪湯

治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉

一錢五分

當歸

一錢

黃芪

二錢

白朮

人參

各一錢

甘草

炒五
分 麥門冬 七
去心 分

右水煎服

四物湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

當歸補血湯

方見二十四卷第十一論

產後乍寒乍熱方論第三

產後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則乍寒

陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散愚按前症若因陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味地黃丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

附治驗

一產婦惡寒發熱余以為血氣虛寒用十全大補加
炮薑而寒熱愈用補中益氣而肢體安又食後犯怒
惡寒發熱抽搖咬牙面色青中隱黃此肝木侮脾土
飲食停滯用六君子加木香一劑而安

一產婦惡寒發熱余以為氣血俱虛不信反用小柴
胡湯致汗出譫語煩熱作渴肢體抽搖余用十全大
補二劑益甚脉洪大重按如無此藥力不能及乃加

附子四劑稍緩數劑而安

增損四物湯

人參 當歸 芍藥 炒川芎 乾薑 炒各一兩 甘草 四錢

右每服四錢水薑煎

大調經散 治產後惡露未消寒熱自汗或肚腹作痛

大豆 一兩五錢 炒去皮 茯神 一兩 真琥珀 一錢

右為末每服二錢空心濃煎關 紫蘇湯調下

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

當歸補血湯

方見二十四卷第十一論

八珍湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

六味地黃丸

方見二十四卷第十一論

產後瘡疾方論第四

郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽不

和若藥作瘧疾治之誤矣陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草菓飲生熟飲四獸飲選用之

愚按前症當與第十四卷第十論參看用藥以補胃氣為主佐以草菓飲之類若胃氣稍充以草菓飲為主佐以補胃之劑大抵產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲

食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用
藿香正氣散如外邪少飲食多用人參養胃湯勞役
所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑
中氣虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子益氣
虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交
作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒
戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退若誤用清
脾截瘧之類多致不起

附治驗

一產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿適身作痛三日不食嘔酸噯氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶令用猪膽汁導而通之其糞且不甚燥一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細或弦緊或沈伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑

脈症稍得又用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥
一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補
中益氣兼服百餘劑而尋愈

產後瘧疾心脾痛見小產

產後瘧勞方論第五 闕文

愚按瘧勞蓋產後虛弱元氣不復所致故寒熱食少
頭目四肢腹痛若脾虛而不能生血者用六君子湯
加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥

門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓
荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝
腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味
子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍
加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢用加味道逍遙散大
抵此症多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而
作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其
病自愈矣仍照虛煩發熱方論主治

增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧食少腹脹

柴胡 人參 甘草炒 半夏炒 陳皮 川芎 白

芍藥炒各等分

右每服五錢水薑棗煎日二服

白茯苓散 治產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓一兩 當歸一兩 川芎 桂心 白芍藥炒 黃芪

炒人參各半兩 熟地黄半兩
兩 自製

右先以水三盞入猪腎一雙薑棗各三事煎二盞去

之入煎藥半兩煎一盞服

猪腰子粥 治產後羸勞發熱用猪腰子一枚去膜切

片用鹽酒拌先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋和將

腰子鋪碗底以熱粥蓋之如作蠶生狀空心服

黃芪建中湯 治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒 肉桂各一兩 甘草炒七錢 白芍藥炒二兩

右每服五錢用薑棗水煎日三二服虛甚須加附子

附方

六君子湯

補中益氣湯

四物湯

三方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

八珍湯

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

產後虛羸方論第六

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎

起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中平及難產者毋論日期必須調養平復方可治事否則氣血復傷虛羸之症作矣

愚按前症產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若噦氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸症自愈矣

黃雌雞湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌雞

一隻去頭足翅羽腸肚細切

當歸

白朮

炒

熟地黄

自製桂心

黃芪

炒各半兩

右先以水七鍾煮雞至三鍾每用汁一鍾藥四錢煎日三服

十全大補湯 治產後氣血未復形體虛弱發熱惡寒

等症

方見二十四卷第四論

產後風虛冷勞方論第七

產後氣血勞傷臟腑虛弱若風冷乘之血氣愈虛形氣羸損風冷入臟令人無子謂之風虛冷勞也

愚按前症若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

產寶方治產後虛羸不生肌肉

黃芪炒 當歸 芍藥炒 人參各三錢 桂心 甘草炒

川芎

生薑

各四錢

大棗

十二枚

右水煎分三服

又方猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之

產後腹脹嘔吐方論第八

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之

愚按前症若敗血散於腸胃宜用前方若飲食停於脾胃宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大

凡損其脾者當節其飲食為善

附治驗

一產婦患前症或用抵聖湯敗血已下前症益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

抵聖湯

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮 甘草

炒各
一錢

右用生薑焙乾半兩水煎

愚按前方最宜用之

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

產後嘔逆不食方論第九

經云胃為水穀之海以養臟腑因產後胃氣虛弱飲食

所傷必致嘔逆故不食也

愚按前症若因飲食過時用四君子湯飲食過多用
六君子湯飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲
食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣
虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土
用六君升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔
吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附
子理中湯多有生者

附治驗

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌
體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛
也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六
君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調補而痊

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

訶子肉 兩半 人參 一兩 甘草 炒半兩

右每服五錢薑水煎

治產後胃虛嘔逆

橘紅兩一半夏

甘草

炒各半兩

藿香

三兩

右每服五錢薑水煎

治產後嘔逆不食白朮

五錢

薑六錢

水煎徐徐溫服

石蓮散

治產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

石蓮肉

兩半

白茯苓

兩一

丁香

五錢

右為末每服二錢不拘時用薑湯或米飲調下日三

服

附方

錢氏益黃散 治脾土虛寒水反來侮以致嘔吐不食
或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症

陳皮

一兩

青皮

訶子肉

甘草

炙

丁香

二錢

右為粗末每服四錢水煎服

人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼作瘡
疾

半夏 厚朴 製橘紅 八分 藿香葉 草葉 茯苓

人參

五分

甘草

炙三分

蒼朮

一錢

右薑七片烏梅一箇水煎服

四君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

八味丸

方見二十四卷第十一論

附子理中湯

方見二十卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

產後霍亂方論第十

產後霍亂因臟腑虛損飲食不消觸冒風冷所致若熱而飲水者五苓散寒而不飲水者理中丸虛冷者加附子來復丹尤妙

愚按此症當與後卷第十一論互相主治

附治驗

一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈後胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作泄瀉余謂此脾胃俱虛

用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼恚怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之劑必致不起

一產婦吐瀉酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

白朮散 治脾胃傷吐瀉腹痛煩渴手足逆冷或大便

不實

白朮

橘紅

麥門冬

去心人參

乾薑

炮各一兩

甘草

半兩

右每服四錢薑水煎

附子散

治脾胃虛寒吐瀉腹痛手足逆冷或自汗口

噤

附子

炮

白朮

炒當歸

吳茱萸

丁香

橘紅

甘草

炒各半兩

右為末每服二錢粥飲調若脾胃虛用參苓白朮散

附方

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍

亂泄瀉或作瘧疾

藿香

一錢五分

桔梗

炒

大腹皮

紫蘇

茯苓

白芷

半夏麩

陳皮

白朮

炒

厚朴

製各一錢

甘草

炙五分

右薑棗水煎熱服

五苓散

白朮炒 猪苓各一錢 桂三分 澤瀉二錢五分 茯苓一錢

右水煎服

理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹膨脹

人參 白朮炒 乾薑炮 甘草炙各一錢

右為末米糊丸彈子大每服一丸嚼細白湯下

來復丹 治伏暑泄瀉身熱脈弱其效如神倉卒間須

用此藥

硝石一兩同硫黃火上微炒用柳條攪結砂子不可火大 太陰玄精石 舶

上硫黃

各一兩

五靈脂

去砂石

青皮

陳皮

各二兩

右為末醋糊丸小豆大每服三十九空心米飲下


易簡方云硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫黃性寒味澁若作煖藥以止瀉誤矣蓋由啖食生冷或冒暑熱之氣中脫閉結揮霍變亂非此藥不能通利三焦分理陰陽其功益速

六君子湯

方見二十四卷第六論

八味丸

方見二十四卷第十一論



薛氏醫案卷四十五

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十六

詳校官太醫院醫士臣舒係

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣陸潮愈

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十六

婦人良方

產後寒熱方論第一

產後發熱頭痛身疼雖如傷寒時氣雖常用麻黃亦不可輕易如早起勞動為寒所傷則漸漸惡寒翕翕發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差若大便堅作嘔不

明薛己訂

能食用小柴胡湯加生薑地黃主之

愚按病機要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃
氣及上中二焦為之三禁不可汗不可下不可利小
便發汗者同傷寒下之早證利大便則脈數而已動
於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不
犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣

附方

人參當歸散 治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節

作痛或虛煩咽燥

人參 當歸 生地黄 桂心 麥門冬

去心各一兩

白芍藥

右粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去之入藥五錢棗二枚煎服虛甚用熟地黄

小柴胡湯 治傷風四肢煩熱頭疼若頭不疼而作煩

二物黃芩湯 方見二十四卷第二論

二物黃芩湯

黃芩

半兩

苦參

一兩

生地黄

二兩

右每服四錢水煎

增損柴胡湯

治虛弱寒熱少食腹脹等症

方見勞瘵

竹葉防風湯

治產後傷風發熱面赤氣喘頭痛

淡竹葉

半把

防風

人參

桂枝

苦梗

甘草

半各

兩葛根

一兩五錢

右每服五錢薑棗水煎汗出項強加附子嘔加半夏

治惡露不盡晝則明了暮則譫語寒熱如見鬼此熱入

血室用柴胡地黃湯或四物加柴胡

方見六卷十五論

產後頭痛方論第二

夫頭者諸陽之會也產後胃氣虛弱飲食少思陽氣微弱不能上升故頭痛苦因敗血黑龍丹言之甚詳

愚按前症若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

附治驗

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而痊

芎附散 治氣虛頭痛用大附子一枚去皮臍切四片拌麩醋一碗炙附煎盡同川芎一兩為末每服二錢

清茶調服

治血虛頭疼當歸川芎每服五錢水煎

產後頭痛都梁丸亦可治

方見四卷第六論

附方

補中益氣湯

四物湯

二方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

六味丸

方見二十四卷第十一論

產後咳嗽方論第三

夫肺主於氣產後肺氣虛故外邪感而咳嗽所由作也
若食鹽醃之類而致者難治若因麪積滯而致者服黑
神散五積散可愈

愚按前症若陰血虛四物湯加參朮陳皮桔梗肺氣
虛四君加芎歸桔梗陰火上炎六味地黄丸加參朮
風寒所感補中益氣湯加桔梗紫蘇若瘀血入肺發
喘兼口鼻起黑或鼻出血急用二味參蘇飲亦有得

生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本
胃氣一虛五臟失所百病生焉經云肺屬辛金生於
巳土脾土既虛不能生金則腠理不密外邪易感矣
治當壯土金生腎水以制火為善

附治驗

一產婦朝吐痰夜發熱無寐泥用清痰降火之藥肌
體日瘦飲食日少余曰朝間吐痰脾氣虛也夜間發
熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加

味道遙散加味歸脾湯以次調補不月而痊

一產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口禁痰盛
余謂脾肺氣虛腠理不密用補中益氣加肉桂數劑
而安

一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感余用參蘇
飲一鍾頓愈與補中益氣加桔梗茯苓半夏一劑將
痊又與六君黃芪以實腠理全愈

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱微作無時此

陰火上炎余用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而
關於肺用異功散而愈

知母散 治惡露上攻咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參 各五錢 桃仁 杏仁

並生去皮
尖各一兩

右每服五錢水煎

治風寒咳嗽

甘草 桔梗

各六分

款冬花

四分 麥門冬

生地黄

各一

錢二分 葱白

一握

右水煎服

旋覆花湯

治咳嗽最良

方見下有汗者去麻黃

附方

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿

不食面浮氣逆等症

人參 白朮

炒 甘草

炒 茯苓

陳皮

各一錢

右薑棗水煎服

六君子湯

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

二味參蘇飲

方見後

參蘇飲

方見六卷第十一論

產後喉中氣急喘促方論第四

產後喉中氣急喘促因榮血暴竭衛氣無主獨聚于肺
名曰孤陽最為難治若因敗血停凝服奪命丹若因榮
血暴絕服芎藭湯若因風寒所傷服旋覆花湯若因氣
鬱結服小調經散若因傷飲食服見現丸

愚按前症若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更
加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽
氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲

附治驗

一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣
虛脫用參附湯四劑而愈

二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參一兩蘇木二兩

右水煎頓服

旋覆花湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐卧不寧

旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麩 荆芥穗

甘草 茯苓 五味子 杏仁 麻黃

各等分

右每服四錢薑棗水煎

有汗者莫服

五味子湯 治產後喘促脈伏而厥

五味子

杵人參炒

杏仁

各二錢

麥門冬

去心

陳皮

各一錢

右薑三片棗二枚水煎服

芎藭湯

方見後

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

參附湯

方見十八卷第六論

產後口鼻黑鼻衄方論第五

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脈之海起於鼻
交額中還出頰口交人中左之右右之左此產後氣虛
榮血散亂胃絕肺敗之症也急取緋線一條并產婦頂
心髮兩條緊繫中指節更無藥可療

愚按胃脈俠口繞承漿益鼻準屬脾土鼻孔屬肺金

誠胃虛肺損氣脫血死之症急用二味參蘇飲加附
子五錢亦有得生者 方見前

產後咳噫方論第六

夫肺主於氣而稟於胃蓋產後脾胃傷損風冷所搏故
咳噫也急灸期門三壯必愈此穴乃胃之大絡 穴見六

卷第十

愚按前症屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投

參附湯亦有復生者

方見十八
卷第六論

丁香散 治心煩咳噫

丁香 白芷錢各五 伏龍肝兩一

右為末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散 治咳逆

羌活 附子炮 茴香炒各半兩 木香 白薑炮各一錢

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎服

一方用桂心五錢薑汁三合水煎服

產後血崩方論第七

產後血崩因經脈未復而勞傷或食酸鹹之味若小腹滿痛肝經已傷最為難治急服固經丸主之

愚按前症若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛痞芤窮湯肝火血妄行加味道遙散脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼

附治驗

一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如湧

四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用人參炮黑薑四劑稍愈又十全大補三十餘劑而痊

一產婦血崩因怒其血如湧仆地口禁目斜手足抽搐此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸症悉退但食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈

固經丸

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

炒

木賊

各半兩

附子

一箇炮

右為末飯丸桐子大每服二十九溫酒或米飲下

芎藭湯

芎藭

當歸

芍藥

各等分

右每服五錢水煎

附方

失笑散

方見二十卷第五論

十全大補湯

加味逍遙散

加味歸脾湯

三方見二十四卷第四論

補中益氣湯

六君子湯

四君子湯

三方見二十四卷第六論

清胃散

方見二十四卷首論

六味丸

方見二十四卷第十二論

產後月水不調方論第八

產後月水不調由血氣虛損風邪所客邪正相搏以致
經候失期或多或少而不得其平也

愚按前症若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴
胡丹皮不及期而來血熱也四物山梔柴胡將來而
作痛血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也
四物加參朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連
丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陳治當臨症
制宜

附治驗

一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之劑其血如崩

腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈
以加味逍遙散調理而安

琥珀散 治經脈不調飲食少思日漸消瘦

琥珀 牛膝 生地黃 當歸 桃仁 赤芍

藥 各半
兩

右每服五錢水薑煎

附方

八珍湯

加味道遙散

二方見二十四卷第四論

四物湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

二陳湯

方見二十四卷第五論

產後月水不通方論第九

產後乳子周歲而經不行是其常也若半歲而經行此血有餘也若一二歲不行而無疾不必服藥若肢體倦怠食少內熱是血少也宜健脾胃以藥通之則誤矣

愚按前症脾胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加牡丹皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛用八珍牡丹皮仍參前論主之

附治驗方藥

一產婦月經年餘不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少倦怠胃滿氣壅朝用加味逍遙散夕用四君子湯月許諸症稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈

六君子湯

四物湯

四君子湯

三方見二十四卷第六論

歸脾湯

加味道遙散

八珍湯

三方見二十四卷第四論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

產後四肢浮腫方論第十

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經散陳
無擇云若風邪所乘於氣分皮膚腫而浮虛乃氣也若
皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜發汗水腫者宜利
小便

愚按前症若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益
脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參第一卷水分血分

主治

附治驗

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沈香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈又補中益氣而脾胃健小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

右為末每服五分薑汁溫酒調

大調經散最治腫滿喘急煩渴小便不利

方見二十一卷第三論

漢防已散 治水腫

漢防已

猪苓

枳殼

炒

桑白皮

各一兩

商陸

甘

草

各三錢

右每服四錢水煎

治血虛氣腫水腫

澤蘭葉 防已

等分

右為末每服二錢溫酒調下醋湯亦可

金匱加減腎氣丸 治脾腎虛寒腰重脚腫濕飲留積

小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫氣喘痰甚或已成
水症其效如神

白茯苓

二兩

附子

半兩

川牛膝

肉桂

澤瀉

車前

子 山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黄

四兩
搗碎

酒拌
杵膏

右為末和地黃膏煉蜜丸桐子大每服七八十九空

心米飲下

附方

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

產後腹痛瀉利方論第十一

產後腹痛瀉利因腸胃虛怯寒邪乘襲或水穀不化洄泄腸鳴或手足逆冷用調中湯治之陳無擇云若六淫七情而致者當隨所感而治之

愚按前症若胸膈飽脹或惡食吞酸此飲食停滯用
六君枳實山查以消導若食既消而仍痛更或頭痛
熱渴惡寒欲嘔此中氣被傷用補中益氣半夏茯苓
以健脾胃

附治驗

一產婦腹痛發熱惡食余以為飲食傷脾被反服破
血之劑加寒熱頭痛嘔吐涎沫用化痰理氣四肢逆
冷泄瀉下墜余用六君加炮薑肉桂木香再用補中

益氣湯而愈

一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘唇
腫盜汗竟夜不寐此脾經虛熱之症用當歸六黃湯
內黃芩連柏炒黑一劑汗止乃用歸脾八珍兼服而
愈

調中湯

良薑 當歸 桂心 芍藥 附子 炒 川芎 各一兩

甘草

鈔 炒五錢

右每服三錢水煎服

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

當歸六黃湯

方見十九卷第六論

歸脾湯

八珍湯

二方見二十四卷第四論

產後赤白痢方論第十二

產後痢疾因飲食六淫七情傷於脾胃或血滲大腸皆為難治若飲食不進謂之虛痢氣字不順謂之氣痢治法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則溫涼調之滑者澀之虛者補之水穀不分者分利之性情執滯者和順之未有不安者也

愚按前症白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用六君加穀蘗若麩食所傷用六君加麥蘗若肉食所傷用六君加山查神麩凡兼嘔吐俱加藿香若兼嘔

酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木尅脾土用六君
加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久
瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢
色黃乃脾土真氣宜加木香肉豆蔻若屬脾土虛寒
用六君加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四
神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土
母若小便瀋滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸
以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫須補胃

為主若久而不愈是腎氣虧損也必用四神六味八味三藥以補足三陰若用分利導水之劑是虛其虛也

一產婦泄痢腹痛年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而不能攝痰歸源用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而痊

一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更

下痢腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱萸愈又用八珍大補兼服調理尋愈

五味子散 治產後泄瀉或腎泄在侵晨五更作瀉飲食不進或大便不實不時去後為丸尤效

五味子 炒三兩 吳茱萸 炒五錢

右為末每服二錢白湯調

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思

二神丸

二方見八卷第八論

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第八論

香連丸

方見八卷第八論

八味丸

六味丸

二方見二十四卷第十一論

金匱腎氣丸

方見前

八珍湯

方見二十四卷第四論

薛氏醫案卷四十六