

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

醫門法律卷七

詳校官太醫院醫官臣姜鳳
編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒
校對官編修臣盧遂
謄錄監生臣鄧世俊

欽定四庫全書

醫門法律卷七

南昌喻昌撰

熱濕暑三氣門

法二十五條
律十一條

論三篇

六氣春主厥陰風木秋主陽明燥金冬主太陽寒水各行其政惟春分以後秋分以前少陽相火少陰君火太陰濕土三氣合行其事是故天本熱也而益以日之暑日本烈也而載以地之濕三氣交動時分時合

其分也以風動於中勝濕解蒸不覺其苦其合也天之熱氣下地之濕氣上人在氣交之中受其炎蒸無隙可避多有體倦神昏肌膚痺起胸膺痞出頭面癆生者矣甚則消渴癰疽吐瀉瘧痢又無所不病矣其不能澹泊滋味屏逐聲色者且以濕熱預傷金水二臟為秋冬發病之根故病之繁而且苛者莫如夏月為最夫天氣無形之熱與地氣有形之濕交合而大生廣生之機益彰然殺機每伏於生機之內所稱移

星易宿龍蛇起陸者即於夏月見之人身亦然內經運氣主病凡屬少陰君火即與太陰濕土一類同推不分彼此而太陰司天濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之治濕之法則然矣下文即出治熱之法云濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止可見濕淫而至於上甚即為熱淫其人之汗必為濕熱所鬱而不能外泄故不更治其濕但令汗出如其故常斯熱從汗散其上甚之濕即隨之俱散

耳觀於內經濕熱二氣合推即以得汗互解妙義彰
彰矣

仲景以痝病濕病渴病其為太陽經外感之候者合而
名篇蓋痝為熱病之最惡者而要皆為濕熱之所釀
正從三氣交動中會其微旨也然三氣雜病非傷寒
之比者曷可枚舉但有一端為時令所乘即當推三
氣主病何有何無孰淺孰深以求確然之治如當風
冒濕飲醇啖燭精津素虧熱毒內蘊濕邪久著之體

發為瘡瘍瘧痢黃渾腫滿消渴痿厥之病既有濕熱
多寡之不同又有氣血虛實之各異向非深入軒岐
仲景堂奧而取途於諸家之狹隘所稱活人手眼果
安在哉故會三氣交病之義以審脈辨證用方其於
濕熱之孰多孰少治療之從上從下補救之先陰先
陽纖悉畢貫矣不遵聖法而欲免過差其可得乎

金匱論痙病於風木主事之時蚤巳申不可汗下之戒
云夫風病下之則痙復發汗必拘急見風與熱合而

生病風則內應肝而主筋熱則內應心而主脈妄下
損陰則筋失養而成痙妄汗損陽則脈失養而拘急
矣至濕暯所釀之痙其不可汗下之意則為少變維
時陽氣在外既屢以發汗為戒及遇無汗之剛痙又
不得不用葛根湯取其微汗至於下法全不示戒且
云可與大承氣湯其意甚微見身內之陰為外熱所
耗容有不得不下之證但十中不得一二終非可訓
之定法畧舉其端聽用者之裁酌耳然亦見風寒之

邪中人不可妄用苦藥濕熱之邪中人不可妄用辛溫矣

論金匱治痘用括萎根桂枝湯方

本文云太陽病其證備身體強几几然脈反沈遲此為痙括萎根桂枝湯主之傷寒方中治項背几几用桂枝加葛根湯矣此因時令不同故方亦少變彼之汗出惡風其邪在表而此之太陽證固不具備其邪之亦在於表可知也但以脈之沈遲知其在表之邪

為內濕所持而不解即係濕熱二邪交合不當從風寒之表法起見故不用葛根之發汗解肌改用桔萎根味苦入陰擅生津徹熱之長者為君合之桂枝湯和榮衛養筋脈而治其痙乃變表法為和法也

論金匱治痙用葛根湯方

本文云太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙葛根湯主之傷寒論太陽篇中項背几几無汗惡風者用葛根湯此證亦用之者以其邪

在太陽陽明兩經之界兩經之熱並於胸中必延傷
肺金清肅之氣故水道不行而小便少津液不布而
無汗也陽明之筋脈內結胃口外行胸中過人迎環
口熱并陽明斯筋脈牽引口噤不得語也然剛痙無
汗必從汗解況濕邪內鬱必以汗出如故而止故用
此湯合解兩經之濕熱與風寒之表法無害其同也

論金匱治痙用太承氣湯方

本文云痙為病胸滿口噤卧不著席脚攣急必齦齒

可與大承氣湯仲景之用此方其說甚長乃死裏求生之法也靈樞謂熱而痙者死腰折瘻癰齒齧也茲所云卧不著席即腰折之變文脚攣急即瘻癰之變文且齧齒加以胸滿口噤上中下三焦熱邪充斥死不旋踵矣何以投是湯乎在傷寒證腹滿可下胸滿則不可下又何以投是湯乎須知所謂胸滿不可下者謂其邪尚在表未入於裏故不可下此證入裏之熱極深極重匪可比倫況陽熱至極陰血立至消亡

即小小下之尚不足以勝其陽救其陰故取用大下
之方以承領其一綫之陰氣陰氣不盡為陽熱所劫
因而得生者多矣可與二字甚活臨證酌而用之初
非定法也既有下之重傷其陰之大戒復有下之急
救其陰之活法學者欲為深造端在斯矣

痙病論

喻昌曰六淫之邪至於成痙乃病證之最多最深最惡
最易惑人者軒岐仲景與中之與後世固解因至肆無

忌憚鑿空妄譚此唱彼和天枉接踵豈操生人之術以
殺人耶繇辨之不蚤辨耳夫瘡者強也後名為瘡傳者
之誤也素問謂諸瘡項強皆屬於濕是病機領主於濕
矣千金推廣其義謂太陽中風重感寒濕則變瘡見太
陽中風身必多汗或衣被不更寒濕內襲或重感天時
之寒地氣之濕因而變瘡是合風寒濕三者以論瘡矣
金匱以瘡濕賜名篇又合熱暑濕三者言之然所謂柔
瘡剛瘡未嘗不兼及風寒且亦云發汗過多因致瘡見

夏月人本多汗尤不可過發其汗也古今言痙之書止
此後世王海藏論痙知宗仲景雖識有未充要亦識大
之賢矣傷寒論載痙病五條尚論篇中已明之茲復詳
金匱所增十條其旨已悉然終古大惑不立論以破其
疑心有未慊誠以仲景論痙病所舉者太陽一經耳後
之治此病者謂太陽行身之背故頸項强背反張屬在
太陽而用金匱桂枝葛根二方茫不應手每歸咎仲景
之未備不思外感六淫之邪由太陽而傳六經乃自然

之行度邪不盡傳即不已故三陽三陰皆足致痙仲景之書通身手眼雖未明言其隱而不發之旨未嘗不躍然心目如太陽之傳陽明項背几几少陽之頸項強是知三陽皆有痙矣而三陰豈曰無之海藏謂三陽太陰皆病痙獨不及少陰厥陰云背反張屬太陽低頭視下手足牽引肘膝相攜屬陽明一目或左或右斜視一手一足搐搦屬少陽發熱脈沈細腹痛屬太陰以防風當歸湯治太陽陽明發汗過多而致痙者以柴胡加防風

湯治少陽汗後不解寒熱往來而成痙者雖不及少陰厥陰然其製附子散桂心白朮湯附子防風散意原有在觀其白朮湯下云上解三陽下安太陰一種苦心無非謂傳入少陰厥陰必成死證耳詎知傳經之邪如風雨之來而畫地以限其不至豈可得乎況足少陰厥陰之痙不死者亦多靈樞謂足少陰之經筋循脊內俠膂上至頂與足太陽筋合其病在此為主痼癥及痙在外陽病者不能俛在內陰病者不能仰是則足少陰之藏

與足太陽之府兩相連絡而以不能俛者知為太陽主外不能仰者知為少陰主內其辨精矣素問亦謂太陽者一日而主外則二日陽明三日少陽之主外從可識矣少陰主內則太陰厥陰之主內從可識矣仲景之以頭強脊強不能俛者指為太陽之痙原以該三陽也而其以身蜷足蜷不能仰者指為少陰之痙以該三陰實所謂引而不發躍然心目者也素問謂腎病者善脹尻以代踵脊以代頭形容少陰病俛而不能仰之狀更著

海藏謂低頭視下肘膝相構正不能仰之陰病反指為
陽明之症立言殊有未確況仲景謂少陰病下利若利
自止惡寒而踴卧手足溫者可治又謂少陰病惡寒而
踴時自煩欲去衣被者可治言可用溫以治之也然仲
景於太陽證獨見背惡寒者無俟其身踴蚤已從陰急
溫而預救其不能仰於少陰證而見口燥咽乾及下利
純青水者無俟項背牽強蚤已從陽急下而預救其不
能俛蓋藏陰之盛府有先徵府陽之極入藏立槁此皆

神而明之之事後代諸賢非不心維其義究莫能口贊一辭亦可見由賢希聖升天之難若不肖者之涉誕則墜淵之易矣即如小兒之體脆神怯不耐外感壯熱多成瘡病後世妄以驚風立名有四證生八候之鑿說實則指瘡病之頭搖手勁者為驚風之抽掣指瘡病之卒口噤脚攣急者為驚風之搐搦指瘡病之背反張者為驚風之角弓反張幼科翕然宗之病家坦然任之不治外淫之邪反投金石腦麝之藥千中千死而不悟也又

如新產婦人血舍空虛外風襲入而成痙病仲景之所
明言不肖者不顧悖聖輒稱產後驚風妄投湯藥亦千
中千死而不悟也昌不惜金針度人其如若輩之不受
度者轉生讐恨何哉可慨也已

痙脈論

喻昌曰痙證之顯者後世且并其名而失之況痙脈之
微乎然而可得言也痙證異於常證痙脈必異於常脈
是故體強其脈亦強求其柔軟和緩必不可得況強脈

恒雜於陰脈之內所以沈弦沈繫邪深脈錮難於亟奪仲景謂脈陰陽俱繫亡陽也此屬少陰見非太陽之繫比也又謂少陰病脈繫至七八日脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解可見痙證之欲解必緊實之脈轉為微弱而現劇病之本象乃可漸返平脈不遽解也古今言痙證之及脈者莫如金匱然皆片言居要非深明傷寒比類互推之法茫然不知其立言之意故因論痙病而并及痙脈焉其曰太陽病發熱脈沈而細名曰痙為難

治以發熱為太陽證沈細為少陰脈陽病而得陰脈故難治也難治初非不治仲景治發熱脈沈原有麻黃附子細辛之法正當此例用之設仍用太陽之桂枝葛根二方則立剷孤陽之根真不治矣以少陰所藏者精所宅者神精者陰也神者陽也凡見微脈即陽之微見細脈即陰之細微則易於亡陽細則易於亡陰此其所以難治也故病傳厥陰而少陰之精神未虧即無死證其厥逆下利煩躁脈微而死者究竟以厥陰而累少陰之

絕耳此脈中之真消息凡病皆然不但為瘻脈之金鍼也其曰太陽病其證備身體強几几然脈反沈遲此為瘻雖亦陽證陰脈而遲與微細大有不同遲乃太陽榮血之陰受病故脈之朝於寸口者其來遲遲是榮血不能充養筋脈而成瘻但取益陰生津以和筋脈而不與少陰同法矣兩證之夾陰脈其辨如此其引脈經云瘻家其脈伏堅直上下而復以按之緊如弦直上下行互發其義明伏非伏藏之伏按之可得即所謂沈也堅非

漫無著落即緊如弦不為指撓邪氣堅實也直上下行者督脈與足太陽合行於脊裏太陽邪盛督脈亦顯其盛緣督脈行身之背壬脈行身之前如天地子午之位居南北之中故其脈見則直上直下脈經謂直上下行者督脈也見之則大人癲小兒癇者是也惟其夾於沈脈之內重按始得所以病癲癇及癇有非陽病可比若舉指即見直上直下則病為陽狂其證登高踰垣勇力且倍平昔何至攣縮若是耶痙證陰脈之似陽其辨又

如此然在傷寒誤發少陰汗者必動其血為下厥上竭亡陰而難治而痝病之誤發其汗者必動其濕濕雖陰類乃外受之陰邪非身中陰血之比但所動之陽奔入濕中為濕所沒而成滅頂之凶即是亡陽之變證仲景曰其脈如蛇不言其證然未發汗之先已見惡寒頭搖口噤背張脚攣幾幾陽之欲亡則發汗以後內闢筋惕舌卷囊縮背曲肩垂項似拔腰似折頸筋粗勁四末逆冷皆痝病之所畢具不待言矣第因發汗而動下焦之

濕又因發汗逼令真陽脫入濕中是則多汗亡陽之外更添亡陽一證所以形容其脈如蛇言脫出之陽本急疾親上輕矯若龍為濕之遲滯所紐則如蛇行之象儘力奔迸究竟不能奮飛也此脈之至變義之至精而從來未解者也更有暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者痙之文不敘病之原委突云欲解如禪家半偈令人何處下參耶試一參之妙不容言矣蓋傷寒傳至厥陰有欲解者有過經不解者此之出欲解之證復出不解

之脈殆謂痙傳厥陰其經已盡解與不解辨其脈證而可知也欲解之證厥陰之邪必傳脾土尅其所勝腹當為之暴脹本內經厥陰在泉民病腹脹之義以論證亦見厥陰不再傳太陽而但轉太陰邪欲解耳解則其脈必見微浮何以知之於傷寒厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈而知之也若脈仍陰象反見沈弦必自病其筋脈而拘急成痙亦如過經之例未可定其解期矣至於論治六經皆有成法金匱但取太陽二方陽明一

方為例而厥陰之筋脈自病又必少陰之陽虛不能柔
養筋脈所致所以脈反沈弦此當用溫以救其陽也傷
寒厥陰亡陽必顯內拘急之證內拘急者即靈樞在內
者陰病不能仰之與旨故知少陰主內厥陰之用溫仍
從少陰溫之也又厥陰下利腹脹滿者仲景亦先溫其
裏病機雖云諸腹脹大皆屬於熱而暴腹脹大乃是少
陰陽虛更兼陰盛故其腹之脹大不徐而暴也陰故暴
陽即不暴故知厥陰亦從少陰之溫法也不溫則不但

無解期且有死期矣昌特推原仲景以誘掖來學未知其能弋獲否也謹論

經曰傷於濕者下先受之言地濕之中人先中其履地之足然後漸及於上者也曰濕流關節言地濕之中人流入四肢百節猶未入於藏府者也曰陰受濕氣言地濕之中人已入於太陰脾土未入於陽明胃土者也曰濕上甚為熱此則下受之濕襲入三陽胸背頭面之間從上焦之陽而變為熱濕者也濕至上焦

而變熱其證夏月為最多蓋夏月地之濕氣上合於天之熱氣日之暑氣結為炎蒸人身應之頭面赤腫瘡癆叢生疫邪竊據其繇來自非一日矣

諸家論濕但云濕流關節止耳至濕上甚為熱之旨從未言及今悉論之濕上甚為熱內經豎一義云汗出如故而止妙不容言蓋濕上甚為熱即所謂地氣上為雲也汗出如故即所謂天氣下為雨也天氣下為雨而地氣之上升者已解散不存矣治病之機豈不

深可會哉

濕上甚為熱其人小便必不利益膀胱之氣化先為濕熱所壅而不行是以既上之濕難於下趨經又云治濕不利小便非其治也可見治上甚之濕熱利其小便即為第二義矣然有陽實陽虛二候陽實者小便色赤而痛利其小便則上焦遏鬱之陽氣通其濕熱自從膀胱下注而出矣陽虛者小便色白不時淋滴而多汗一切利小水之藥即不得施若誤施之即犯

虛虛之戒不可不辨也

金匱治上焦之濕本內經濕上甚為熱之義而分輕重
二證輕者但發熱面赤而喘頭痛鼻塞而煩邪在上
焦裏無別病者但內藥鼻中搐去濕熱所釀黃水而
已以鼻竅為腦之門戶故即從鼻中行其宣利之法
乃最神最捷之法也重者身熱足寒時頭熱面赤目
赤皆濕上甚為熱之明徵濕熱上甚故頭熱面赤目
赤濕熱上甚故陽氣上壅不下通於陰而足寒自成

無已謂是濕傷於下風傷於上仲景發明內經與旨成土苴矣豈其不讀內經耶豈風始生熱濕不生熱耶在冬月傷寒已為熱病豈夏月傷濕反不為熱病耶詳仲景以上甚為熱之重證發入痙病最重之條而不言其治昌欲於此微露一緘然而竿頭之步觀者得無望之却走乎內經原有上者下之之法邪從下而上必驅之使從下出一定之理也其證輕者裏無別病但搐其黃水從清陽之鼻竅而下出則其重

而裏多危證者必驅其黃水從前後二陰之竅而出
所可意會也金匱於本文之下增若發其汗者二十
四字垂戒初不以下為戒又可意會也但下法之難
不推其所以不可汗之故即不得其所以用下之權
仲景以其頭搖口噤背張幾幾陽之欲亡若更發其
汗重虛衛外之陽惡寒必轉甚若發汗已其脈如蛇
真陽脫離頃刻死矣繇是推之濕上甚為熱之重者
非用下法難以更生而下法必以溫藥下之庶幾濕

去而陽不隨之俱去耳此非無徵之言也仲景即於本篇申一義云下之額上汗出微喘小便利者死豈非因下而并奪其陽之大戒乎噫嘻此殆與性與天道同義矣

論金匱治濕用麻黃白朮湯方

本文云濕家身煩疼可與麻黃湯發其汗為宜慎不可以火攻之此治熱濕兩停表裏兼治之方也身煩者熱也身疼者濕也用麻黃取微汗以散表熱用

白朮健脾以行裏濕而麻黃得朮則雖發汗不至多
汗朮得麻黃并可行表裏之濕下趨水道又兩相維
持也傷寒失汗而發黃用麻黃連翹赤小豆湯分解
濕熱亦是此意但傷寒無用朮之法金匱復出此法
又可見雜證脾濕內淫必以朮為主治矣

合論金匱治濕用桂枝附子湯白朮附子湯甘草附子
湯三方

凡夏月之濕皆為熱濕非如冬月之濕為寒濕也而

金匱取用附子之方不一而足者何耶宜乎據方推證者莫不指熱濕為寒濕矣不思陽氣素虛之人至夏月必且益虛虛故陽氣不充於身而陰濕得以據之此而以治濕之常藥施之其虛陽必隨濕而俱去有死而已故陽虛濕盛舍助陽別無驅濕之法亦不得不用之法耳

桂枝附子湯 白朮附子湯

本文云傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉

側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

用桂枝附子溫經助陽固護表裏以驅其濕以其不嘔不渴津液未損故用之也若其人大便堅則津液不充矣小便自利則津液下走矣故去桂枝之走津液而加白朮以滋大便之乾也此連下條甘草附子湯俱傷寒論太陰篇中之文也傷寒痽濕暘篇中不載而金匱痉濕暘篇中載之可見治

風濕與治熱濕其陽虛者之用本方不當彼此異同矣而傷寒論但云若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之金匱重立其方且於方下云一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如蝟狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳成無己註傷寒於此條云以桂枝散表之風附子逐經中之濕總不言及陽虛而昌諄複言之得此一段始為有據其一服覺身痺者藥力雖動其濕而陽氣

尚未充不便運旋也三服都盡陽氣若可行矣遍
身如攢針之刺其渙而難萃之狀尚若此金匱可
謂善於形容矣不但此也人身藉有陽氣手持足
行輕矯無前何至不能自轉側乎此豈可諉咎於
濕乎即謂濕勝陽氣果安往乎況其證不嘔不渴
其脈浮虛而濶陽虛確然無疑無已輒以治風濕
之外邪為訓寧不貽誤後人耶

甘草附子湯

本文云風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

此亦陽虛之證以前條大約相同風傷其衛而陽不固於外濕流關節而陽不充於經用此固衛溫經散濕也

論金匱防已黃芪湯

本文云風濕脈浮身重汗出惡風防已黃芪湯主之

此治衛外之陽大虛而在裏之真陽無患者附子
即不可用但用黃芪實衛白朮健脾取甘溫從陽
之義以緩圖而平治之方下云服後當如蟲行皮
中從腰以下如水煖坐被上又以一被圍腰以下
溫令微汗差可見汗出乃是陽虛自汗而腰以下
屬陰之分則無汗也服此雖動其濕而衛外之陽
尚不足以勝之故皮中如蟲行較前遍身如蟬之
狀為少殺矣姑以煖被圍腰以下接令微汗以漸

取差亦從下受者從下出之之法也

脾惡濕夏月濕熱相蒸多有發黃之候然與傷寒陽明
瘀熱發黃微有不同彼屬熱多其色明亮此屬濕多
其色黯晦

內經云濕勝為著痹金匱獨以屬之腎名曰腎著云腎
著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反
不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏
冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑

苓木湯主之此證乃濕陰中腎之外廓與腎之中藏無預者也地濕之邪著寒藏外廓則陰氣凝聚故腰中冷如坐水中實非腎藏之精氣冷也若精氣冷則膀胱引之從夾脊逆於中上二焦榮衛上下之病不可勝言今邪止著下焦飲食如故不渴小便自利且與腸胃之府無預況腎藏乎此不過身勞汗出衣裏冷濕久久得之但用甘草乾薑茯苓白朮甘溫從陽淡滲行濕足矣又何取煖胃壯陽為哉 甘薑苓

木湯

內經病機十九條叙熱病獨多謂諸病喘嘔吐酸暴注
下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍
疹瘤氣結核吐下霍亂督鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血
泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譖妄衄衄血污皆
屬於熱劉河間逐病分註了明所以後世宗之故原
病式不可不讀也

雜病惡寒者乃熱甚於內也經云惡寒戰慄者皆屬於

熱又云禁慄如喪神守皆屬於火原病式曰病熱甚而反覺其寒此為病熱實非寒者是也古人遇戰慄之證有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱證但有虛實之分耳

雜病發熱者乃陰虛於下也經云陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂至浮散於肌表之間而惡熱也實非有熱當作陰虛治而用補養之法可也

東垣發熱惡熱大渴不止煩燥肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱者如不能食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣非如能食而熱口舌乾燥大便難者可用寒下之比

又有脚膝痿弱下尻臀皆冷陰汗臊臭精滑不固脈沈數有力為火鬱於內逼陰向外即陽盛拒陰當用苦

寒藥下之者此水火徵兆之微脈證治例之妙取之
為法

夏月火乘土位濕熱相合病多煩燥悶亂四肢發熱或
身體沈重走注疼痛皆濕熱相搏鬱而不伸故致熱
也

內經叙病機十九條而屬火者五謂諸熱瞀瘛暴瘖冒
昧躁擾狂越罵詈驚駭肘腫疼酸氣逆衝上禁慄如
喪神守噦嘔瘍瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目

昧不明暴注瞤瘓暴病暴死皆屬於火原病式解之甚詳

丹谿曰相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也然則厥陰風木之後少陽相火雖分主六十日而相火實隨觸而動四時皆然不定主於春夏之間矣但熱暑濕三

氣交合而相火尤為易動則有之也

黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃樸硝之屬若腎水受傷

真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之
如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病
以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷
物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之
如升麻葛根之屬不明諳此求為大病施治何所依
據耶

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土原病式曰諸痙強直積飲
痞膈中滿霍亂吐下體重脇腫肉如泥按之不起皆

屬於濕脈經曰脈來滑疾身熱煩喘胸滿口燥發黃者濕熱脈洪而緩陰陽兩虛濕熱自甚脈洪而動濕熱為痛也

內經因於濕首如裹丹谿解之甚明謂濕者土之濁氣首為諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明係焉濁氣薰蒸清道不通沈重不利似乎有物蒙之失而不治濕鬱為熱熱留不去大筋脰短者熱傷血不能養筋故為拘攣小筋弛長者濕傷筋不能束骨故為

痿弱

因於氣為腫王註亦明謂素常氣疾濕熱加之氣濕熱爭故為腫也邪氣漸盛正氣漸微陽氣衰少致邪代正氣不宣通故四維發腫諸陽受氣於四肢也然則今人見膝間關節腫疼全以為風治者豈不悞耶

濕病所主內傷外感不同況有寒濕風濕各異而夏月三氣雜合為病不過大同小異多少先後之分耳

人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎暄感人於冥冥之

中原病式云諸強迫積飲等證皆屬於濕或腫滿體
寒而有水氣乘必小便赤少不通或濁是蓄熱入裏
極深非病寒也

大抵治法宜理脾清熱利小便為上故治濕不利小便
非其治也宜桂苓甘露木香葶藶木通治之守真曰
葶藶木香散下神芎丸此藥下水濕消腫脹利小便
理脾胃無出乎此也腹脹脚腫甚者舟車丸下之濕
熱內深發黃茵陳湯下之或佐以防己黃芪當以脈

證辨之如脈滑數小便赤澑引飲者皆宜下之也

濕溫之證因傷濕而復傷暑也治在太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在名曰重暍如此死者

醫殺之也

詳見卷一

中濕有與中風相似者其脈必沈澑沈細繇脾虛素多積痰偶觸時令濕熱內搏其痰心胸涎壅口眼喝邪半身不遂昏不知人其治亦在太陰若作中風治則

脾氣立虧亦殺之也

暑風見本門後

風濕論

喻昌曰風也濕也二氣之無定體而隨時變易者也濕在冬為寒濕在春為風濕在夏為熱濕在秋為燥濕以濕土寄王於四季之末其氣每隨四時之氣而變遷昌言之矣惟風亦然風在冬為感發之寒風在春為調暢之溫風在夏為南薰之熱風在秋為淒其之涼風內經謂風者百病之長其變無常者是也其中人也風則上先受之濕則下先受之俱從太陽膀胱經而入風傷其

衛濕流關節風邪從陽而親上濕邪從陰而親下風邪無形而居外濕邪有形而居內上下內外之間邪相搏擊故顯汗出惡風短氣發熱頭痛骨節煩疼身重微腫等證此固宜從汗解第汗法不與常法相同用麻黃湯必加白朮或加薏苡仁以去其濕用桂枝湯必去芍藥加白朮甚者加附子以溫其經其取汗又貴徐不貴驟驟則風去濕存徐則風濕俱去也其有不可發汗者緣風濕相搏多夾陽虛陽虛即不可汗但可用辛熱氣壯

之藥扶陽以逐濕而已凡見短氣雖為邪阻其正當慮
胸中陽虛凡見汗出微喘雖為肺氣感邪當慮真陽欲
脫明眼辨之必早也傷寒論中風濕相搏以夏熱而例
三時金匱痙濕喝篇中風濕相搏以冬寒而例
曰病者一身盡痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷於
汗出當風或久傷取冷所致豈非夏月當風取涼過久
而閉其汗乎日晡所劇其病在陽明然與痙病之齦齒
熱甚入深陽明可下之證不同此但可汗而不可下也

何以言之內經謂太陰陽明為表裏外合肌肉故陽受風氣陰受濕氣所以風濕客於太陰陽明即為半表半裏而一身之肌肉盡痛即為在表之邪未除故可汗而不可下也況人身之氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日西屬陽明日晡所劇邪在陽明而太陽少陽之氣猶未盡退故亦可汗不可下也觀金匱一則曰可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之再則曰可與麻黃杏子薏苡甘草湯雖未言及不可下

而其可汗不可下之意此例具見矣若下之則虛其胃氣而風邪下陷濕邪上湧其變不可勝言矣其濕流關節之痛脈見沈細者則非有外風與之相搏祇名濕痺濕痺者濕邪痺其身中之陽氣也利其小便則陽氣通行無礙而關節之痺并解矣設小便利已而關節之痺不解必其人陽氣為濕所持而不得外泄或但頭間有汗而身中無汗反欲得被蓋向火者又當微汗以通其陽也因風濕相搏之文錯見不一難於會通故并及之

暘者中暑之稱淮南子蔭暘人於樾下其名久矣後世以動而得之為中熱靜而得之為中暑然則道途中暘之人可謂靜而得之耶動靜二字只可分外感內傷動而得之為外感天日之暑熱靜而得之因避天日之暑熱而反受陰濕風露瓜果生冷所傷則有之矣時令小寒大寒而人受之者為傷寒時令小暑大暑而人受之者即為傷暑勞苦之人凌寒觸暑故多病寒暑安養之人非有飲食房勞為之招寒引暑則寒

暑無繇入也所以膏粱藜藿東南西北治不同也

體中多濕之人最易中暑兩相感召故也外暑蒸動內
濕二氣交通因而中暑所以肥人濕多夏月百計避
暑反為暑所中者不能避身之濕即不能避天之暑
也益元散驅濕從小便出夏月服之解暑有自來矣
然體盛濕多則宜之清潤無濕之人津液為時令所
耗當用生脈散充其津液若用益元妄利小水竭其
下泉枯槁立至況暑熱蒸動之濕即肥人多有內夾

虛寒因至霍亂吐瀉冷汗四逆動關性命者徒恃益元解暑驅濕反促其臟腑氣絕者比比可不辨而輕用之歟不特此也凡見汗多之體即不可利其小便蓋胃中只此津液夫既外泄又復下行所謂立匱之術也仲景名曰無陽其脈見短促結代則去生遠矣中暑卒倒無知名曰暑風大率有虛實兩途實者痰之實也平素積痰充滿經絡一旦感召盛暑痰阻其氣卒倒流涎此濕暋合病之最劇者也宜先吐其痰後

清其暑猶易為也虛者陽之虛也平素陽氣衰微不振陰寒久已用事一旦感召盛暑邪湊其虛此濕暘病之得自虛寒者也宜回陽藥中兼清其暑最難為也丹溪謂火令流金鑠石何陰冷之有立言未免偏執十中不無二三之誤也夫我看積雪終古未消豈以他山不然遂謂夏月曠刹皆熱火乎人身之有積陰乃至湯火不能溫者何以異此內經謂無者求之虛者責之可見不但有者實者之當求責矣管見謂

大黃龍丸有中暘昏死灌之立甦者非一徵乎間亦有中氣者為七情所傷氣厥無痰宜用蘇合香丸灌之許學士云此氣暴厥逆而然氣復即已雖不藥亦愈然甦後暑則宜清也

夏月人身之陽以汗而外泄人身之陰以熱而內耗陰陽兩俱不足仲景於中暘病禁用汗下溫鍼汗則傷其陽下則傷其陰溫鍼則引火熱內攻故禁之也而其用藥但取甘寒生津保肺固陽益陰為治此等關

係最鉅今特挈出靈樞有云陰陽俱不足補陽則
陰竭瀉陰則陽亡蓋謂陽以陰為宅補陽須不傷其
陰陰以陽為根瀉陰須不動其陽夫旣陰陽俱不足
則補瀉未可輕言纔有補瀉必造其偏如重陰重陽
之屬其初不過差之毫厘耳所以過用甘溫恐犯補
陽之戒過用苦寒恐犯瀉陰之戒但用一甘一寒陰
陽兩無偏勝之藥清解暑熱而平治之所以為百代
之宗也

合論金匱治暯用白虎加人參湯爪蒂湯二方

金匱治暯病止出二方一者白虎加人參湯
熱以夏月之熱淫必僭而犯上傷其肺金耗其津液
用之以救肺金存津液也孫思邈之生脈散李東垣
之清暑益氣湯亦旣祖之矣一者爪蒂散額治其濕
以夏月之濕淫上甚為熱亦先傷其肺金故外清之
水得以聚於皮間皮者肺之合也用以搐其胸中之
水或吐或瀉而出則肺氣得以不壅而皮間之水得

以下趨也何後人但宗仲景五苓散為例如河間之通苓散子和之桂苓甘露飲非不得導濕消暑之意求其引伸瓜蒂湯之制以治上焦濕熱而清夫肺金則絕無一方矣故特舉二方合論其義見無形之熱傷其肺金則用白虎加人參湯救之有形之濕傷其肺金則用瓜蒂湯救之各有所主也二方傷寒痽濕暘篇中不載金匱瘡濕暘篇中復出之金鍼暗度宜識之矣

白虎加人參湯 本文云太陽中熱者渴是也其人
汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之本方之
義已見尚論一百一十三方中茲再詳之夏月汗
出惡寒者衛氣虛也身熱而渴者肺金受火耗而
燥渴也內經曰心移熱於肺傳為膈消消亦渴也
心火適王肺金受制證屬太陽然與冬月感寒之
治不同用此湯以救肺金是為第一義矣

瓜蒂湯

本文云太陽中暋身疼重而脈微弱此以夏月傷冷
水水行皮中所致一切爪蒂湯主之 變散為湯
而去赤小豆酸漿水獨用爪蒂一味煎服搐去胸
中之水則皮中之水得以俱出也搐中有宣泄之
義汗如其故不復水漬皮間矣此即內經以水灌
汗乃至不復汗之證仲景會其意言中暋者兼乎
中濕有所祖也然水行皮中何以脈見微弱耶蓋
中暋脈本虛弱而濕居皮膚內合於肺阻礙榮衛

之運行其脈更見微弱也。賜脈虛弱按之無力濕脈微弱舉之不利濕與賜合之脈則舉按皆不利也。擣去其水而榮衛通肺氣行舉指流利即濕去之徵。按之有力即賜解之徵一物之微其功效之神且捷者有如此矣。

水行皮中乃夏月偶傷之水或過飲冷水或以冷水灌汗因致水漬皮中遏鬱其外出之陽以故身熱疼重用瓜蒂一物驅逐其水則陽氣行而遏鬱

之病解矣凡形寒飲冷則傷肺乃積漸使然此偶
傷之水不過傷肺所合之皮毛故一搐即通并無
藉赤小豆酸漿水之羣力也即是推之久傷取冷
如風寒雨露從天氣而得之者皆足遏鬱其上焦
之陽又與地氣之濕從足先受宜利其小便者異
治矣可無辨歟

夏月卒倒不省人事名曰暑風乃心火暴甚暑熱乘之
令人噎悶昏不知人然亦有他藏素虛暑得深中者

但不似心藏之篤耳如入肝則眩運頑脾入脾則昏
睡不覺入肺則喘滿痿躄入腎則消渴雖當補益與
清解兼行然必審其屬於何藏用藥乃得相當也

傷暑之脈內經曰脈虛身熱得之傷暑甲乙經曰熟傷
氣而不傷形所以脈虛者是也若難經曰其脈浮大
而散殊有不然夫浮大而散乃心之本脈非病脈也
仲景不言但補其偏曰弦細芤遲芤即虛豁也弦細
遲即熱傷氣之應也其水行皮中之脈則曰微弱見

脈為水濕所持陽氣不行也統而言之曰虛分而言之曰弦細芤遲微弱其不以浮大之脈混入虛脈之中稱為病暑之脈慮何周耶

日中勞役而觸冒其暑者此宜清涼解其暑毒如白虎湯益元散黃連香薷飲三黃石膏湯之類皆可取用也

深居廣廈襲風涼食生冷遏抑其陽而病暑者一切治暑清涼之方即不得徑情直施如無汗仍須透表以

宣其陽如吐利急須和解以安其中甚者少用溫藥
以從治之故冒暑之霍亂吐瀉以治暑為主避暑之
霍亂吐瀉以和中溫中為主不可不辨也

元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨
詳以夏月暑證五方歷試見聞廣耳其取用小半夏
茯苓湯不治其暑顧治其濕又以半夏茯苓少加甘
草名消暑丸見消暑在消其濕名正言順矣其香薷
飲用香薷扁豆厚朴為主方熱盛則去扁豆加黃連

為君治其心火濕盛則去黃連加茯苓甘草治其脾
濕其縮脾飲則以脾為濕所浸淫而重滯於扁豆葛
根甘草中佐以烏梅砂仁草果以快脾而去脾所惡
之濕甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者
又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃為濕
所竊據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅香之辛
香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香飲予以治
暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於

熱濕虛寒淺深緩急間酌而用之其利溥矣而後來
諸賢以益虛繼之河間之桂苓甘露飲五苓三石意
在生津液以益胃之虛子和之桂苓甘露飲用人參
葛根甘草藿香木香益虛之中又兼去濁或用十味
香薷飲於局方五味中增人參黃芪白朮陳皮木瓜
益虛以去濕熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃芪
湯又補中實衛以去其濕熱肥白內虛之人勿論中
暑與否所宜頻服者也中暑必顯燥煩熱悶東垣倣

仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去濕為首
務夫燥與濕相反者也而清燥亦務除濕非東垣具
過人之識不及此矣又如益元散之去濕而加辰砂
則并去其熱五苓散之去濕而加人參則益虛加辰
砂減桂則去熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝
濕合之局方則大備矣然尚有未備焉昌觀暑風一
證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方
雖有大黃龍丸初不為暑風立法管見從而贊之曰

有中暎昏死灌之立甦則其方亦可得治暑風之一斑矣儻或其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸寧不立至危殆乎良方復有地榆散治中暑昏迷不省人事而欲死者但用平常涼血之藥清解深入血分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名為潑火散者知言哉夫中天火運流金燦石而此能潑之益見暑風為心火暴甚煎熬陰血舍清心涼血之外無可撲滅耳綜羣方而論列之以其詳故益加

詳焉諸方俱彙
本門後

律十一條

凡治瘡病不察致病之因率爾施治醫之罪也

因者或外感六淫或因發汗過多或因瘡家誤汗或
因風病誤下或因灸後火熾或因陰血素虧或因陽
氣素弱各各不同不辨其因從何救藥耶

凡治瘡病不深明傷寒經候脈候妄肩其任者醫之罪
也 不知邪在何經則藥與病不相當不知脈有可

據則藥徒用而無濟故瘡病之壞不出亡陰亡陽兩途亡陰者精血津液素虧不能榮養其筋脈此宜急救其陰也亡陽者陽氣素薄不能充養柔和其筋脈此宜急救其陽也陰已虧而復補其陽則陰立盡陽已薄而復補其陰則陽立盡不明傷寒經候脈理則動手輒錯何可自貽冥報耶

凡治小兒瘡病妄稱驚風名色輕用鎮驚之藥者立殺其兒此通國所當共禁者也 小兒不耐傷寒壯熱

易至昏沈即於其前放銃呐喊有所不知妄揑驚風
輕施鎮墜勾引外邪深入內藏千中千死從未有一
救者通國不為共禁寧有底止哉

凡治產後癰病妄稱產後驚風輕用鎮驚之藥者立
殺其婦此庸工所當知警者也 產後血舍空虛外
風易入仲景謂新產亡血虛多汗出喜中風故令病
癰後賢各從血舍驅風成法可遵非甚不肖者必不
妄用鎮驚之藥不似小兒驚風之名貽害千古在賢

智且不免焉茲約通國共為厲禁革除驚風二字不許出口入耳凡兒病發熱昏沈務擇傷寒名家循經救治百不失一於以打破小兒人鬼關人天共快也

凡治濕病禁發其汗而陽鬱者不微汗之轉致傷人醫之過也 濕家不可發汗以身本多汗易至亡陽故濕溫之證誤發其汗名曰重暘此為醫之所殺古律垂戒深矣其久冒風涼恣食生冷乃至以水灌汗遏抑其陽者不微汗之病無從解內經謂當暑汗不出

者秋風成瘧亦其一也不當汗者反發其汗當微汗者全不取汗因噎廢食此之謂矣

凡治濕病當利小便而陽虛者一概利之轉至殺人醫之罪也 濕家當利小便此大法也而真陽素虛之人汗出小便滴瀝正泉竭而陽欲出亡之象若以為濕熱恣膽利之真陽無水維附頃刻脫離而死矣此法所不禁中之大禁也

凡治中濕危篤之候即當固護其陽若以風藥勝濕是

為操刃即以溫藥理脾亦為待斃醫之罪也

人身陽盛則輕矯濕盛則重著乃至身重如山百脈
痛楚不能轉側此而不用附子回陽勝濕更欲何待
在表之濕其有可汗者用附子合桂枝湯以驅之外
出在裏之濕其有可下者用附子合細辛大黃以驅
之下出在中之濕則用附子合白朮以溫中而燥其
脾今之用白朮而雜入羌防枳朴梔橘等藥且無濟
於事況用枳榔滑石舟車導水濬川等法乎

凡治中暑病不辨外感內傷動靜勞逸一槩襲用成方者醫之罪也 傷寒夾陰誤用陽旦湯得之便厥傷暑夾陰誤用香薷飲入喉便喑後賢於香薷飲中加人參黃芪白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有見也而不辨證者之貽誤寧止此乎


凡治中暑病不兼治其濕者醫之過也

熱蒸其濕是為暑無濕則但為乾熱而已非暑也故肥人濕多即病暑者多瘦人火多即病熱者多

凡治中暑病遇無汗者必以得汗為正若但清其內不解其外醫之罪也 中暑必至多汗反無汗者非因水濕所持即為風寒所閉此宜先散外邪得汗已方清其內若不先從外解則清之不勝清究成瘧痢等患貽累無窮

凡治中暑病無故妄行溫補致令暑邪深入逼血妄行醫之罪也 噎傷氣纔中即懨懨短息有似乎虛故清暑益氣兼而行之不知者妄行溫補致令暑邪深

入血分而成効痢即遇隆冬大寒漫無解期故熱邪
誤以溫治其害無窮也



醫門法律卷七

欽定四庫全書

子部

醫門法律卷八

詳校官太醫院醫官臣姜鳳

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣鄒世俊

欽定四庫全書

醫門法律卷八

南昌喻昌撰

傷燥門

論一首 法十一條
律五條

秋燥論

喻昌曰燥之與濕有霄壤之殊燥者天之氣也濕者地之氣也水流濕火就燥各從其類此勝彼負兩不相謀春月地氣動而濕勝斯草木暢茂秋月天氣肅而燥勝

斯草木黃落故春分以後之濕秋分以後之燥各司其政今指秋月之燥為濕是必指夏月之熱為寒然後可奈何內經病機一十九條獨遺燥氣他凡秋傷於燥皆謂秋傷於濕歷代諸賢隨文作解弗察其訛昌特正之大意謂春傷於風夏傷於暑長夏傷於濕秋傷於燥冬傷於寒覺六氣配四時之旨與五運不相背戾而千古之大疑始一抉也然則秋燥可無論乎夫秋不遽燥也大熱之後繼以涼生涼生而熱解漸至大涼而燥令乃

行焉經謂陽明所至始為燥終為涼者亦誤文也豈有
新秋月華露湛星潤淵澄天香遍野萬寶垂實歸之燥
政迨至山空月小水落石出天降繁霜地凝白齒一往
堅急勁切之化反謂涼生不謂燥乎或者疑燥從火化
故先燥而後涼此非理也深乎深乎上古脈要曰春不
沈夏不弦秋不數冬不濇是謂四塞謂脈之從四時者
不循序漸進則四塞而不通也所以春夏秋冬孟月之
脈仍循冬春夏秋季月之常不改其度俟二分二至以

後始轉而從本令之王氣乃為平人順脈也故天道春不分不溫夏不至不熱自然之運悠久無疆使在人之脈方春即以弦應方夏即以數應躁促所加不三時而歲度終矣其能長世乎即是推之秋月之所以忌數脈者以其新秋為燥所勝故忌之也若不病之人新秋而脈帶微數乃天真之脈何反忌之耶且夫始為燥終為涼涼已即當寒矣何至十月而反溫耶涼已反溫失時之序天道不幾頓乎不知十月之溫不從涼轉正從燥

生蓋金位之下火氣承之以故初冬常溫其脈之應仍
從乎金之濇耳由濇而沈其濇也為生水之金其沈也
即為水中之金矣珠輝玉映傷燥云乎哉然新秋之涼
方以却暑也而夏月所受暑邪即從涼發經云當暑汗
不出者秋成風瘧舉一瘧而凡當風取涼以水灌汗迺
至不復汗而傷其內者病發皆當如瘧之例治之矣其
內傷生冷成滯下者并可從瘧而比例矣以其原來皆
暑濕之邪外內所主雖不同同從秋風發之耳若夫深

秋燥金主病則大異焉經曰燥勝則乾夫乾之為害非
遠赤地千里也有乾於外而皮膚皴揭者有乾於內而
精血枯涸者有乾於津液而榮衛氣衰肉爍而皮著於
骨者隨其大經小絡所屬上下中外前後各為病所燥
之所勝亦云燥矣至所傷則更厲燥金所傷本摧肝木
甚則自戕肺金蓋肺金主氣而治節行焉此惟土生之
金堅剛不撓故能生殺自由紀綱不紊若病起於秋而
傷其燥金受火刑化剛為柔方圓且隨型埴欲仍清肅

之舊其可得耶經謂欬不止而出白血者死白血謂色
淺紅而似肉似肺者非肺金自削何以有此試觀草木
菁英可掬一乘金氣忽焉改容焦其上首而燥氣先傷
上焦華蓋豈不明耶詳此則病機之諸氣滯鬱皆屬於
肺諸痿喘嘔皆屬於上二條明指燥病言矣生氣通天
論謂秋傷於燥上逆而欬發為痿厥燥病之要一言而
終與病機二條適相脗合祇以誤傳傷燥為傷濕解者
競指燥病為濕病遂至經旨不明今一論之而燥病之

機了無餘義矣其左胠脇痛不能轉側嗌乾面塵身無
膏澤足外反熱腰痛驚駭筋攣丈夫癩疝婦人少腹痛
目昧背瘡則燥病之本於肝而散見不一者也內經燥淫
所勝其主治必以苦溫者用火之氣味而制其勝也其
佐以或酸或辛者臨病制宜宜補則佐酸宜寫則佐辛
也其下之亦以苦溫者如清甚生寒留而不去則不當
用寒下宜以苦溫下之即氣有餘亦但以辛寫之不以
寒也要知金性畏熱燥復畏寒有宜用平寒而佐以苦

甘者必以冷熱和平為方制乃盡善也又六氣凡見下承之氣方制即宜少變如金位之下火氣承之則苦溫之屬宜減恐其以火濟火也即用下亦當變苦溫而從寒下也此內經治燥溼之旨可贊一辭者也至於肺氣贌鬱痰喘嘔欬皆傷燥之劇病又非制勝一法所能理也茲併入燥門細商良治學者精心求之罔不獲矣若但以潤治燥不求病情不適病所猶未免涉於龐疎耳痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡下文但言飲食自

倍腸胃乃傷曾不及於肺也其所以致躁而令陰氣消亡之故引而未發也至靈樞云形寒飲冷則傷肺始知傷肺關於寒冷矣可見肺氣外達皮毛內行水道形寒則外寒從皮毛內行飲冷則水冷從胸中上溢遏抑肺氣不令外揚下達其治節不行周身之氣無所稟仰而肺病矣究竟肺為嬌臟寒冷所傷者十之二三火熱所傷者十之七八寒冷所傷不過裏束其外火熱所傷則更消爍其中所以為害倍烈也然

火熱傷肺以致諸氣贖鬱諸痿喘嘔而成躁病百道
方中率皆依樣葫蘆如烏藥香附紫蘇半夏茯苓厚
朴丁沈訶蔻薑桂蓬稜枳榔益智之屬方方取足祇
因內經脫遺躁證後之無識者競皆以躁治躁恬於
操刃曾不顧陰氣之消亡耳

雖以東垣之大賢其治躁諸方但養榮血及補肝腎虧
損二便閉結而已初不論及於肺也是非謂中下二
焦有躁病而上焦獨無也不過闕經旨傷濕之疑遂

因仍不察耳夫諸氣膾鬱之屬於肺者屬於肺之燥非屬於肺之濕也苟肺氣不燥則諸氣稟清肅之令而週身四達亦胡致膾鬱耶諸痿喘嘔之屬於上者上亦指肺不指心也若統上焦心肺並言則心病不主痿喘及嘔也惟肺燥甚則肺葉痿而不用肺氣逆而喘鳴食難過膈而嘔出三者皆燥證之極者也經文原有逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿之文其可稱為濕病乎更考東垣治肺消方中引用白荳蔻草澄

茄及治諸氣方中雜用辛香行氣之藥覺於傷燥一途有未悉耳又如丹溪折衷雜證為後代所宗亦無一方一論及於肺燥但於熱鬱湯下云有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣於脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此治非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者夫蒸蒸不解非肺氣為熱所內蒸而不能外達那方用蓮翹薄荷葉黃芩山梔仁麥門冬甘草鬱金爪姜皮穰八味竹葉為引方後復

設為問答云何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也似此一方示不欲以燥助火之意於熱鬱之條其不敢以燥益燥重傷肺金隱然可會何為不立燥病一門暢發其義耶又如繆仲醇治病所用者無非四君四物二冬二母沙參玄參黃芪山藥蘿子橘紅桑葉枇杷葉杏仁棗仁扁豆蓮心爪姜五味升葛柴前芩連梔柏滑石石膏菊花枸杞牛膝續斷薏苡木瓜胡麻首烏豆豉霜梅膠飴之屬千方

一律不過選擇於此增入對證一二味自成一家識者稱其不盡用方書所載投之輒効蓋獨開門戶者也又有稱其精於本草擇用五六十種無過之藥屢獲奇驗無以多為者昌謂不然世之患燥病者多仲醇喜用潤劑於治燥似乎獨開門戶然亦聰明偶合未有發明可以治內傷之燥不可以治外感之燥何況風寒暑濕哉節取其長可矣

內經云心移熱於肺傳為鬲消肺燥之繇來者遠矣苟

其人腎水足以上升而交於心則心火下降而交於腎不傳於肺矣心火不傳於肺曾何傷燥之虞哉即腎水或見不足其腸胃津血足以協濟上供肺亦不致過傷也若夫中下之澤盡竭而高源之水猶得措於不傾則必無之事矣所以經文又云二陽結謂之消手陽明大腸熱結而津不潤足陽明胃熱結而血不榮證成消渴舌上赤裂大渴引飲與心移熱於肺傳為鬲消文雖異而義則一也治鬲消者用白虎加人

參湯頴救其肺以施於諸氣膾鬱諸痿喘嘔罔不合矣學者可不知引伸觸類以求坐進此道耶

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲男子少精女子不月其傳為風消其傳為息貴死不治此亦肺燥所繇來而未經掲出者夫燥而令男子精液衰少女子津血枯閑亦云極矣然其始但不利於隱曲之事耳其旣則胃之燥傳入於脾而為風消風消者風熱熾而肌肉消削也大腸之燥傳入於肺而為息貴

息竒者息有音而上奔不下也是則胃腸合心脾以
共成肺金之燥三藏二府陰氣消亡殆盡尚可救療
乎夫由心之肺已為死陰之屬然脾氣散二陽之精
上輸於肺猶得少甦涸鮫今以燥之為害令生我者
盡轉而浚我之生故直斷為死不治也從前憤憤特
繹明之

病機十九條內云諸濇枯涸乾勁皴揭皆屬於燥燥金
雖為秋令雖屬陰經然異於寒濕同於火熱火熱勝

則金衰火熱勝則風熾風能勝濕熱能耗液轉令陽
實陰虛故風火熱之氣勝於水土而為燥也

肝主於筋風氣自甚燥熱加之則液聚於胸膈不榮於
筋脈而筋燥故勁強緊急而口噤或瘓痙昏冒僵仆
也

風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者善伸數欠筋脈拘急
或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦若風熱燥并鬱
甚於裏則必為煩滿必為悶結故燥有表裏氣血之

分也

至於筋緩不收痿痺不仁因其風熱勝濕為燥日久乃燥病之甚者也至於諸氣膾鬱諸痿喘嘔皆屬於肺金從燥化金且自病而肺氣日見消亡又何論痿痺乎

五藏五志之火皆有真液以養之故凝聚不動而真液尤賴腎之陰精胃之津液交灌於不竭若腎胃之水不繼則五藏之真陰隨耗五志之火翕然內動而下

上中三消之病作矣河間云燥太甚而脾胃乾涸則成消渴亦其一也

燥病必渴而渴之所屬各不同有心肺氣厥而渴有肝脾而渴有脾熱而渴有腎熱而渴有胃與大腸結熱而渴有小腸痺熱而渴有因病瘧而渴有因素食肥甘而渴有因醉飲入房而渴有因遠行勞倦遇大熱而渴有因傷害胃乾而渴有因風而渴五藏部分不同病之所遇各異其為燥熱亡液則一也另詳消渴

門

治燥病者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸中燥熱之甚濟胃中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不濇則病日已矣

腎惡燥急食辛以潤之故腎主五液津則大便如常若饑飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥仲景云小便利大便硬不可攻下以脾約丸潤之戒輕下而

重傷津液也然藏結復有陽結陰結之不同陽結者以辛涼潤之陰結者以辛溫潤之其辨又在微芒之間矣

律五條

凡秋月燥病誤以為濕治者操刃之事也從前未明咎猶可諉今明知故犯傷人必多孽鏡當前悔之無及凡治燥病燥在氣而治血燥在血而治氣燥在表而治裏燥在裏而治表藥不適病醫之過也

凡治雜病有兼帶燥證者誤用燥藥轉成其燥因致危困者醫之罪也

凡治燥病須分肝肺二藏見證肝藏見證治其肺燥可也若肺藏見證反治其肝則坐誤矣醫之罪也肝藏見燥證固當急救肝葉勿令焦損然清其肺金除其燥本尤為先務若肺金自病不及於肝即顧力救肺焦枯且恐立至尚可分功緩圖乎

凡治燥病不深達治燥之旨但用潤劑潤燥雖不重傷

亦誤時日祇名龐工所當戒也

熱濕暑三氣門諸方

痙病廿方 热病十五方 溫病十五方 暑病三

十二方

括萎根桂枝湯方

金匱方

論具本門前

括萎根

二兩

桂枝

三兩

芍藥

兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃食熟粥發之

按此方原是不欲發汗之意以夏月縱不得汗服藥亦易透出也若服此食頃不得汗當食熱粥發之所以桂枝有汗能止無汗能發也然旣以括萎根爲君當增之桂枝爲臣當減之大約括萎根三錢桂枝一錢五分芍藥二錢甘草一錢五分生薑三片大棗二枚無汗發以熱粥連服三劑可也蓋濕持其汗或兼微受風寒營衛不和設不用此通其營衛則未痽者成痽已痽者難愈矣 凡用古方分兩當倣此裁酌

葛根湯方

金匱方
論具本門中

葛根

四兩

桂枝

三兩

麻黃

兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大

棗

十二枚

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯方法及禁忌

按此方為夏月傷寒脈繫發熱無汗者而設仲景云夏月脈洪大者是其本位若其人病苦頭疼發熱無

汗者須發其汗亦此意也然身纔有潤便撤其覆勿令汗出為節可矣

大承氣湯方

金匱方論具本門

大黃

四兩酒洗

厚朴

半斤炙去皮

枳實

三枚炙

芒硝

一合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得

下止服

按此治癰病之極重難返死裏求生之法在邪甚而

正未大傷者服此十有九活所以仲景著之為法也

麻黃加獨活防風湯

治剛
瘡

麻黃去節桂枝各一兩

芍藥三兩

甘草半兩

獨活一兩

防風各一兩

兩

右剉細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫服指爪乾燥屬風熱甚者

方見三卷中風門

元戎四物湯 治臟結祕滯者

當歸 熟地黃 川芎 白芍藥 大黃 煅桃仁

各等分水
煎或丸

丹谿大補丸

降陰火補腎水治陰虛燥熱

黃柏炒褐色

知母酒浸炒各四兩

熟地黃蒸酒

敗龜板酒

板炙黃各六兩

右為末猪脊髓和煉蜜丸如桐子大每七十丸空心

淡鹽湯送下

六味地黃丸

治下焦燥熱小便澀而數又治腎氣虛久新憔悴
寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血自汗澀
汗水泛為痰咽燥口渴眼花耳聾等證功效不能
盡

懷熟地

八兩
杵膏

山茱萸肉

乾山藥

各四
兩

牡丹皮

白茯苓

澤鴻

各三
兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八
十九空心食前滾湯下

裹清燥救肺湯 治諸氣贖鬱諸痿喘嘔

桑葉

經霜者得金氣而柔潤不
凋取之為君去枝梗三錢

石膏

煅稟清肅之氣
極清肺熱二錢

甘草

和胃生金一錢人參

生胃之津養肺之氣七分

胡麻仁

一錢炒研

真阿

膠分麥門冬

去心一錢

杏仁

炮去皮尖炒黃七分

枇杷葉

一片刷去毛蜜

黃

塗灸

水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服痰多加貝母爪

萎血枯加生地黃熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

昌按諸氣贖鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今

治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸
痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法
以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而
惟喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之
燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣間
有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內經六氣脫
悞秋傷於燥一氣指長夏之濕為秋之燥後人不敢
更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥

夾雜如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬此方命名
清燥救肺湯大約以胃氣為主胃土為肺金之母也
其天門冬雖能保肺然味苦而氣滯恐反傷胃阻痰
故不用也其知母能滋腎水清肺金亦以苦而不用
至如苦寒降火正治之藥尤在所忌蓋肺金自至於
燥所存陰氣不過一線耳倘更以苦寒下其氣傷其
胃其人尚有生理乎誠倣此增損以救肺燥變生諸
症如沃焦救焚不厭其煩庶克有濟耳

燥門諸方

滋燥養榮丸

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸

酒洗
各一錢半

生地黃 熟地黃

白芍藥 泰光

黃芩

酒洗
各一錢半

水煎服

大補地黃丸

治精血枯涸燥熱

黃柏

鹽酒
炒

熟地黃

酒蒸
各四兩

當歸

酒洗

山藥

各二兩

枸杞子

甘州佳
各三兩

知母

鹽酒
炒

山茱萸

各二兩

白芍藥

各二兩

生地黃

二兩 肉蓴蓉 酒各一
五錢 漬玄參 半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十九空心淡

鹽湯送下

東垣潤腸丸

治脾胃中伏火大便祕滯或乾燥閉塞不通全不
思食乃風結祕皆令閉塞也以潤燥和血疎風自
然通矣

麻子仁 桃仁 羌活 當歸尾 大黃 煅各半兩 皂

角仁 泰光 錢 各五

右除另研外為細末五上火煉蜜丸如桐子大每服三五十丸食前白湯下又有潤燥丸一方本方加郁李仁防風

東垣導滯通幽湯

治大便難幽門不通上沖吸門不開噎塞不便燥祕氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸 升麻 桃仁另研各一錢 生地黃 熟地黃各五

分紅花 甘草 炙各三分

右作一服水煎調柂榔末五分服加大黃名當歸潤燥湯

清涼飲子

一名生液
甘露飲

治上焦積熱口舌咽喉乾燥

黃芩 黃連

各二錢

薄荷 玄參

當歸

芍藥

各一錢

錢五分 甘草

一錢

水二鍾煎八分不拘時服大便祕結加大黃二錢

大秦艽湯

治血弱陰虛不能養筋筋燥而手足不能運動

按此方乃後人假托仲景之名而立以治風濕相搏骨節煩疼無汗而成剛痙者然無引及服法殊不精詳當知前葛根湯方內去葛根加獨活防風與此無二但引及服法詳明耳

海藏神术湯

治內傷冷飲外感
寒邪而無汗者

蒼朮 防風

各二兩
甘草一兩
炒

右咬咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脈浮而緊者加羌活二錢太陽脈浮緊中帶弦數者是兼少陽加柴胡二錢太陽脈浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩二錢婦人加當歸或加木香湯或加藁本湯如乳吹煎成調六一散三五錢

按此海藏得意之方也以治春夏外感寒邪內傷生冷發熱而無汗者即痙病亦可用之蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也夫麻黃桂枝遇濕熱時

令原不敢輕用即有宜用之證十中不過一二而已

昌明仲景不得不表揚海藏之功

海藏白朮湯

治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮

三兩防風二兩甘草一兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分溫服一日止用一二服待二三日漸漸汗少為解

按二朮最能行濕夏月分有汗無汗用之所以為神

海藏白朮湯加藥法

上解三陽下安太陰

白朮 如欲汗之解用蒼朮 防風

各一
兩

右㕮咀水煎至七分溫服若發熱引飲者加黃芩甘草若頭疼惡風者加羌活散羌活一錢五分川芎七分五釐細辛五分是也若身熱目痛者加石羔湯石羔二錢半知母八分白芷一錢是也腹中痛者加芍藥湯芍藥二錢桂枝一錢是也往來寒熱而嘔者加柴胡散柴胡二錢半夏一錢是也心下痞者加枳實一錢若有裏證加大黃一錢量虛實加減之邪去止

服

三方總稱神木所稱上解三陽下安太陰縱未必然而太陰脾惡濕者也夏月預清其濕俾不與熱邪相合其得力不亦多乎

海藏桂枝葛根湯

治傷風項背強及有汗不惡風柔痺即仲景桂枝湯去麻黃也若無汗之剛痺又必用麻黃矣可見麻黃桂枝夏月原有不得不不用之病蓋邪在太陽

通其營衛則外受之邪有出無入其所全不更大乎但未可執為常法耳學者參之

海藏桂枝加川芎防風湯

治發熱自汗而不惡寒者名曰柔痽即仲景葛根湯去麻黃葛根加川芎防風也

海藏柴胡加防風湯

治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脈弦此少陽風痽

柴胡 防風

各一兩

半夏

六錢

人參

黃芩

各五錢

生

薑

甘草

各六分

大棗

三枚

每服一兩水三盞煎一盞半去渣溫服

海藏防風當歸湯

治發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽
兼陽明也宜去風養血

防風 當歸 川芎 地黃

各一兩

每服一兩水三盞煎至二盞溫服

按瘡病本太陽經病太陽日久勢必傳遍六經然必兼乎太陽二方治太陽兼少陽太陽兼陽明論證頗詳超越尋常萬萬惜其於三陰之瘡獨詳太陰連出五方似欲推及少陰厥陰而未明言觀其後三方項下云手足厥冷筋脈拘急意可識矣然終是三陰混同立治未有精詳且三陰經既有陰瘡矣又豈無陽瘡耶此等處和尚論篇三陰經細參自為得師可矣

海藏八物白朮散

治傷寒陰瘡三日面腫手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白术 茯苓

五味子

各半兩

桂心

三分

麻黃

半兩

良薑

羌活

半兩

附子

三分

每服四錢水一大盞薑五片同煎至五分去渣溫服無時

按此方乃太陽兼三陰之證治也

海藏桂枝加芍藥防風防己湯

治發熱脈沈而細者附太陰也必腹痛

桂枝

一兩半

防風

防已

各一兩

芍藥

二兩

生薑

一兩半

大

棗

六枚

每服一兩水三盞煎至一盞半去渣溫服亦宜服小續命湯

按脈沈而細未是太陰確證少陰亦有發熱者服此方及小續命湯恐有不對

海藏附子散

治傷寒陰瘻手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項

強直頭搖口噤

桂心三錢附子一兩

白朮一兩川芎三錢

獨活半兩

每服三錢水一盞棗一枚煎至五分去渣溫服

海藏桂心白朮湯

治傷寒陰瘻手足厥冷筋脈拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心 川芎 附子各等分

每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七分去

查溫服

海藏附子防風散

治傷寒陰瘡閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出

不止

白术

一兩

防風

甘草

七錢

茯苓

附子

乾薑

各七錢

分柴胡

五味

各一兩

桂心

半兩

每服三錢生薑四片同煎去查溫服

按三方俱用白术在內原為太陰而設然俱云汗出

不止則陽亡於外津亡於內方中每兼表散何耶況筋脈拘急全賴陽氣以柔和之陰津以灌潤之中兩不相照殊有未到也

羚羊角散

此四方另選附益

治傷寒陽痙身熱無汗惡寒頭項強直四肢疼痛
煩躁心悸睡卧不得

羚羊角

屑

犀角

屑

防風

淡神

柴胡

麥門冬

人參

葛根

枳壳

甘草

炙各二錢

五分

石膏

龍

齒
各五
錢

右咬咀每服五錢水一鍾煎至五分去渣溫服不拘時

按此方治陽瘡深得清解之法

麥門冬散

治傷寒陽瘡身體壯熱項背強直心膈煩燥發熱

惡寒頭面赤色四肢疼痛

麥門冬

地骨皮

麻黃去節

赤茯苓去皮

知母 黃

芩 赤芍藥 白蘚皮 杏仁

麸炒去皮尖

甘草 犀

角屑

各七分半

右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去渣溫服不拘時

按此方徑用麻黃不用防柴葛枳其意更深但羚角石膏似不可少

石膏散

治傷寒陽痙通身壯熱目眩頭痛

石膏

二兩

秦光

去土一兩

龍齒

另研一兩

犀角屑

各半兩

前胡

各半兩

拘時

犀角屑

各半兩

前胡

各半兩

牛黃散

各半兩

右咬咀每服五錢水一大盞入豆豉五十粒葱白七莖同煎至五分去渣入牛黃末一字攪令勻溫服不拘時

按三方俱用龍齒之濬似有未當餘藥則各極其妙此方用豆豉葱白作引調入牛黃末更妙

牛黃散

治傷寒陽痙發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神

煩躁

牛黃

另研

麝香

另研

犀角屑

硃砂水

人參

飛

赤茯苓

防風

芎藭

甘草

麥門冬

桂心

地骨

皮

天麻

各二錢半

右為細末研勻每服二錢竹瀝調下不拘時

按發熱惡寒之證邪在經絡此一方直攻神明何耶
即謂邪入心胞用犀羚牛黃足矣何并硃砂麝香而
用之毋乃開門延寇乎

海藏愈風湯

一名舉卿
古拜飲

治一切失血筋脈繫急產後與汗後搐搦

荆芥

為細末

先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁調前末三五錢和查服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

按此海藏治風人血分之方與痙病無涉然而金匱有垂戒二條云夫風病下之則痙復發汗必拘急又

云瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡設使不發汗
但用此方治之亦何遽成瘡病耶蓋邪風從虛而入
補則補其邪汗則傷其正惟先服此出其風隨即補
之乃為要訣耳以上治瘡

人參瀉肺湯

治熱十
五方

治肺經積熱上喘嗽嗽胸膈脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 桔子仁 枳壳 炒 薄荷 甘草

連翹 杏仁 去皮尖 桑白皮 大黃 桔梗 各等分

每服七錢水二盞煎八分食後通口服

按人參肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺立名可見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也況人參之溫以一味清涼監之有餘如此大隊寒下之藥不推之為君其敢用乎

天門冬散

治肺壅腦熱鼻乾大便祕濁

天門冬

去心

桑白皮

升麻 大黃

枳壳

麸炒

甘草

各八分 荆芥一錢

水二盞煎八分食後溫服

按此方藥味較前少減然用升麻且升且降以散上焦壅熱可取

半夏湯

治膽熱精神不守熱泄

半夏麌 黃芩 軍薑 炮
遠志心 茶荳 生地黃

去微炒研

各八分
黍米一合 酸棗仁八分

長流水二盞煎八分食後溫服

按此方雖曰治膽熱尚有未備如柴胡人參青黛羚羊角猪膽汁之屬加入一二味為切

赤茯苓湯

治膀胱實熱小便不通口苦舌乾咽腫不利

赤茯苓 猪苓 葵子 枳實 瞿麥 木通

黃芩 車前 滑石 甘草

各等分

水二盞薑三片煎八分食前服

按此方不清肺熱，利小便且有降無升，上竅不開，徒開其下，是名霸道，是為劫法庸醫多蹈此。

龍腦雞蘇丸

除煩熱，鬱熱，肺熱，咳嗽，吐血，鼻衄，血崩，消渴，驚悸，解酒毒，膈熱，口臭，口瘡，清心明目。

薄荷葉一兩炒各二錢生地黃六錢浸汁麥門冬四錢蒲黃炒用阿膠

黃芪一錢人參二錢甘草二錢半銀柴胡木通二錢

通浸二日
取汁入膏

右為末用蜜三兩煉過後下地黃汁等藥熬成膏丸
如梧桐子大每服二十九嚼碎湯送下

按此丸兩解氣分血分之熱有益無損宜常製用之
利膈散

治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗 牛蒡子炒人

參 甘草

各一兩

右為末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚加

僵蠶一兩

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降
下之味其見甚超較涼膈散更勝

地黃煎 治積熱

地黃汁

四升
三合

茯神

知母

各四
兩

葳蕤

四
兩

括萎根

生薑汁

鮮地骨皮

生麥冬汁

白蜜

各二
升

膏

八兩
合

竹瀝

合

右㕮咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去渣

下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火
煎至出六升初服四合日三服夜一服加至五七合
四五月作散服之

按此方生津涼血制火徹熱兼擅其長再加人參乃
治虛熱之聖方也

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嚥物妨悶
致咽閉壅塞及天行時熱發強昏憒

芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝 青黛 石膏

寒水石

水研各等
飛甘草分

右將甘草煎湯二升去渣卻入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消溶得所卻入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研為細末每用少許含化津嚥不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小竹筒吹藥入喉中即愈

按此方倣紫雪之制而不用黃金犀羚等貴重之藥

亦為簡便

消毒犀角飲

治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅盛腮項結核口舌
生瘡及遍生瘡癧已潰未潰並宜服之

犀角磨汁一錢 防風各一錢 鼠粘子炒二錢 荆芥穗一錢 甘草炙一錢

半

水二盞煎一盞食後溫服

按此方瀕清上焦蘊熱與利膈散畧同彼可多服此

可暫服耳

四物二連湯

治血虛虛勞發熱五心煩熱晝則了明夜則發熱
當歸 生地黃 白芍藥各一錢 川芎 黃連 胡

黃連

各八分

水盞半加薑煎

四順清涼引子

治血熱壅實面赤蘊結煩悶

大黃 赤芍藥 當歸 甘草

各一
錢

水盞半煎八分食遠通口服

按二方清血分之熱然惟實熱可用虛熱則不宜用恐傷其胃也

牛黃膏

治熱入血室發狂心熱不認人者

牛黃一錢 硃砂一錢 鬱金各二錢 腦子五分 甘草 牡丹皮

錢
各二

右為末煉蜜丸皂角子大新汲水化下

按此方乃清鎮安神之劑熱由心胞襲入神明不得已而用之也

楊氏秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸成勞或嗽或寒或熱聲啞不出體虛
自汗四肢倦怠

柴胡錢二人參錢一鼈甲炙一秦艽錢一當歸錢一地骨皮錢一

半夏錢半紫苑錢一甘草錢一

右咬咀水煎服

按此治少陽經久熱成勞氣血兩治之法

局方當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃芪 當歸

右咬咀水煎

按此足三陰血分之病若以肺氣虛熱白虎湯法施之則脾氣從之下溜轉促其陰之亡耳蓋病深之人服藥中窺未必効一不當而追之不及矣可不辨哉再按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發耳是則胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃為平人迨至積熱既久然後治之已為失算況於藥不對病乎所以肥人之病多因血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病因津液素衰而生火炎之熱治肥人之熱

慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可執方妄施矣
茲所錄方各宜自為推廣至表裏之熱及升陽滋陰
等法各有類方此不及

再按大腑實熱腹脹不通口舌生瘡有生薑瀉心湯
一法太奇用生薑橘皮竹茹黃芩梔子仁白朮各三
兩桂心一兩茯苓芒硝各二兩生地黃十兩咬咀入
大棗煎每服一兩蓋必陰虛血燥火熱難伏為從治
耳因推金匱腎氣丸童子亦可服附桂者不過從治

法虛熱得除可多服哉

以上治

瘦熱

金匱麻黃白朮湯方

論見前

治濕十五方

麻黃

三兩去節

桂枝

二兩

甘草

一兩炙

杏仁

七十箇去皮尖

白朮

四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取二升半去渣溫服八合覆取微似汗

桂枝附子湯方

論見前

桂枝

四兩

生薑

三兩

附子

一枚炮去皮切八片

甘草

二兩

大棗

十二枚

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

白朮附子湯方

白朮二兩附子一枚半甘草一兩半生薑一兩半大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去渣分溫三服一服覺身庠半日再服三服都盡其人如蝟狀勿怪即是木附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯方

甘草二兩炙附子二箇白朮二兩桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升
多者服六七合為妙

金匱麻黃杏子薏苡甘草湯方

病者一身盡痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷
於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏子

薏苡甘草湯

麻黃

去節炮四兩

甘草

炙一兩

薏苡仁

半斤

杏仁

七十粒去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去渣溫服

有微汗避風

金匱防已黃芪湯

防已

一兩

甘草

半兩炒

白朮

七錢半

黃芪

一兩二錢半

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去渣溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上沖加桂枝三分下有沈寒者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如水緩坐被上又以一被繞腰以下溫令微汗差

和劑五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有
腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外
感風寒及寒濕客於經絡腰脚痠疼及婦人經血
不調或難產並治

白芷 茯苓 半夏湯洗 七次 當歸 川芎 甘草炒

肉桂 芍藥各三兩 枳壳麸炒

麻黃去節未梢浸去 陳皮去白各六兩

桔

梗十二兩 厚朴薑炒四兩 乾薑炮皮廿四兩

蒼术

右咬咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣加茱萸煖人調經催生加艾醋

按此一方能治多病粗工咸樂用之而海藏云麻黃桂芍甘草即各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃散也枳壳桔梗陳皮茯苓半夏即枳桔二陳湯也又川芎當歸治血兼乾薑厚朴散氣此數藥相合為解表溫中泄濕之劑去痰消痞調經之方雖為內寒外

感表裏之分所制實非仲景表裏麻黃桂枝薑附之
的方也主積冷嘔泄時疫項背拘急加葱白豆豉厥
逆加吳茱萸寒熱咳逆加棗婦人難產加醋始知用
之非一途也惟知活法者其擇之由海藏所云觀之
可見裏急者治先其裏表急者治先其表毋取於兩
頭忙矣

活人敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 芎芻 枳壳 白

茯苓 桔梗

人參

已上各一兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒瘟疫風濕風眩拘踠風痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼及老人小孩兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知為度煩熱口乾加黃芩

昌鄙見三氣門中推此方為第一以其功之著也雷

公問黃帝曰三陽莫當何謂也帝曰三陽并至如風雨如霹靂故人莫能當也然則夏月三氣聚合其為病也豈同一氣之易當乎人感三氣而病病而死其氣互傳乃至十百千萬則為疫矣倘病者日服此藥二三劑所受疫邪不復留於胸中詎不快哉方中所用皆辛平更以人參大力者負荷其正驅逐其邪所以活人百千萬億奈何庸醫俗子往往減去人參不用曾與衆方有別而能活人耶

清熱滲濕方

黃柏

鹽水炒

黃連

茯苓

澤瀉

各一錢

蒼朮

白

木

各一錢半

甘草

五分

水二鍾煎八分服

如單用滲濕去黃連黃柏加橘皮乾薑

昌閱此一方差合鄙意以夏月所受之濕為熱濕暑
濕而羣方所主之藥多在寒濕風濕殊不慊耳方後
云云乃是去寒增熱依樣葫蘆矣

二术四苓湯

治諸濕膿滿一身盡痛發熱煩悶二便不利

白朮 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉 黃芩 羌

活 芍藥 桔子仁 甘草

各等分

水三盞薑三片燈心一撮煎服

此方通治表裏濕邪從水道出兼清暑熱之氣所宜
遵也

桂苓甘露飲

治濕熱內甚煩渴瀉利小便濇大便急霍亂吐下

卷八
頭痛口乾

方見本門

羌活勝濕湯

治脊痛項強腰如折項如拔上沖頭痛乃足太陽
經氣不行此方主之

羌活 獨活

各一錢

藁本 防風

各半錢

荆子 川芎

甘草

分夾四分

水二盞煎八分食後溫服

按濕上甚而熱汗之則易下之則難故當變其常法
而為表散此方得之

續隨子丸

治肺經有濕通身虛腫滿悶不快或欬或喘

人參 漢防已 赤茯苓 寒食麵 包半兩 桔榔 木

香 各半兩 莢蘆 四兩 繼隨子 一兩 海金沙 半兩

右為末棗肉丸梧子大每三十九桑白皮湯下

按攻下之方多過於峻此治肺經病以人參為君海

金砂散以白朮為君差可耳

除濕湯

治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便溏泄小便或瀦或利

半夏麪

炒

厚朴

薑

蒼术

米泔製

藿香葉

炙

陳皮

去白

白茯苓

各一兩

甘草

炙七錢

白朮

生用

一兩

右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食

前溫服

按脾惡濕濕從下入而傷其脾是以身重足軟小便濇大便反利不溫其脾濕無由去當以此方加清熱利水藥

白术酒

治中濕骨節疼痛

白术一兩酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒以水代之

按此方顧一理脾不分功於利小便蓋以脾能健運

自濕不留而從水道出耳然則胃中津液不充不敢利其小便者得此非聖藥乎

金匱白虎加人參湯

有論

治暑三十二方

知母

六兩

石膏

一斤

甘草

二兩

粳米

一合

人參

三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去渣溫服一升日三服

金匱爪蒂湯

有論

爪蒂

二十七箇

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

清暑益氣湯

東垣
方

治夏月暑熱蒸人人感之四肢倦怠胸滿氣促肢節疼或氣高而喘身熱而煩心下痞脹小便黃數大便溏泄或痢口渴不思飲食自汗體重

人參 黃芪 升麻 蒼朮

各一錢

白朮

神麌

各五分

分陳皮 炙甘草 黃柏 麥門冬 當歸 乾

葛 五味子 澤瀉 青皮

各三分

右水煎溫服

諸方總論見前

人參益氣湯

東垣

治暑熱傷氣四肢倦急嗜卧手指麻木

人參

一錢六分

黃芪

二錢

白芍

七分

甘草

一分

五味子

一錢三十粒

柴

胡

六分

升麻

五分

右水煎服

生脈散

治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口乾作渴汗出
不止或濕熱大行金為火制絕寒水生化之源致
肢體痠軟脚敲眼黑最宜服之

人參 麥門冬 五味子

各等分

右水煎服

竹葉石膏湯 治暑熱煩燥

石膏 一兩 半夏 二錢 人參 麥門冬 各三錢 甘草 二錢 竹

葉 二十箇
搗碎

右薑三片水煎服

黃芪人參湯

并加減法

黃芪

一錢自汗過多者加一錢

人參

白术各五分

蒼朮

五分無汗一錢

橘皮

不去白

甘草

當歸身

酒洗

麥門冬

各二分

黃柏

神曲

炒各三分

升麻

六分

五味子

九粒

水二盞煎一盞去渣稍熱食遠或空心服之忌酒濕
麵大料物之類及過食冷物如心下痞悶加黃連二
三分胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分脇下
三分胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分脇下

痛或縮急加柴胡二三分頭痛目中溜火加黃連二
三分川芎三分頭目不清利上壅上熱加蔓荆子三
分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃二分如氣
短精神少夢寐間困乏無力加五味子九粒大便濇
隔一二日不見致食少食不下血中伏火而不得潤
也加當歸身生地黃各五分桃仁三粒去皮尖麻子
仁研泥五分如大便通行所加之藥勿再服如大便
又不快利勿用別藥少加大黃五分煨如久不利非

血結血閉而不通也是熱則生風其病人必顯風證
單血藥不可復加只宜常服黃芪人參湯外用羌活
防風各五錢水四盞煎至一盞去渣空心服之大便
必大走也一服便止胸中氣滯加青皮倍陳皮去其
邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之氣
滯太甚或補藥太過或心下有憂滯鬱結之事更加
木香二三分砂仁二三分白荳蔻二分與正藥同煎
服 腹痛不惡寒者加芍藥五分黃芩二分卻減五

味子

香薷飲

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

香薷一
斤厚朴
製白扁豆
炒各半斤

每服五錢水盞半煎八分不拘時溫服

五物香薷飲 驅暑和平

即前方少加茯苓甘草也

黃連香薷飲

黃連四兩 香薷一斤 厚朴半斤

每服四錢如前服

十味香薷飲

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利

香薷 人參 陳皮 白朮 茯苓 黃芪 木

爪 厚朴 扁豆 甘草

各五錢

咬咀水煎每服一兩

宣明桂苓甘露飲

共八味

茯苓

澤瀉

各一兩

白朮

石膏

寒水石

各一兩

滑

石

膏四兩

猪苓

肉桂各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

子和桂苓甘露飲

治伏暑發渴脈虛水逆滯共十二味

即前方加人參甘草乾葛各一兩藿香木香各一
錢減桂只用一錢猪苓不用

桂苓丸

治冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便亦少

肉桂 茯苓

各一兩

右為末蜜丸每兩作十九每細嚼一丸白湯下

五苓散

加人參一錢
名春澤湯

治暑濕為病發熱頭疼煩躁而渴

白术 猪苓 茯苓

各二兩半

澤瀉

二兩半

肉桂

一兩

右為末每服三二錢熱湯調下

辰砂五苓散 加辰砂等分減桂三之一

益元散 即天水散

治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼偏主石淋及婦人產難催生下乳神

効

桂府滑石

膩白者
六兩

粉草

一兩

右為極細末每服三錢白湯調下新水亦得加薄荷少許名雞蘇散加青黛末少許名碧玉散治療並同但以迴避世俗之輕侮耳加辰砂少許名辰砂益元

散

通苓散

治傷暑潮熱煩渴小便不利

麥門冬 淡竹葉 車前穂 燈心

各等分水煎服

三黃石膏湯

黃連

二錢

黃柏

山梔

玄參

各一錢

黃芩

知母

各一錢

石膏

三錢

甘草

七分

水煎服

錢五分

白虎加蒼朮湯

即本方不用人參加蒼朮二兩增水作四服

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒
陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏

食

香薷

二錢

砂仁

半夏

湯洗七次

杏仁

去皮尖

人參

甘草

炙各五分

赤茯苓

藿香

白扁豆

炒去皮尖

厚朴

薑汁製

木瓜

各一
錢

水二鍾薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

却暑散

赤茯苓 甘草 生各一
四兩 寒食麵 生薑 各一
斤

右為細末每服二錢不拘時新汲水或白湯調服

消暑丸 治伏暑引飲脾胃不利

半夏

一斤用醋
五升煮乾

甘草

生用

茯苓

各半
斤

右為末薑汁糊丸毋見生水如桐子大每服五十丸

不拘時熟湯送下中暑為患藥下即甦傷暑發熱頭
疼服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦
不為害應是暑藥皆不及此若停痰飲並用生薑湯
下入夏之後不可闕此

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉

去毛
炙

陳皮

去白
焙

丁香

厚朴

去皮
炙

各半兩
半

白

茅根

麥門冬

乾木瓜

甘草

香薷

一錢
半

右搗羅為末每服二錢水一盞生薑三片煎七分溫
服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒三歲
以下可服半錢更量大小加減

瀉火散

即地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并治傷暑煩躁口
苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆

赤芍藥 黃連 青皮

去白各等分

每服三錢漿水調服若血痢水煎服

香薷丸

治大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸膈煩
滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍
亂吐利轉筋

香薷一
兩

各五錢

甘草
炙赤

檀香
剉

丁香
各二錢

半

右為細末煉蜜為丸每兩作三十九每服一丸細嚼溫湯下

酒煮黃連丸

治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連兩 十二
好酒五斤

右將黃連以酒煮乾研為末滴水丸如梧桐子大空心

送下三五十九

水葫蘆丸 治冒暑毒解煩渴

川百藥煎三兩 人參二錢 麥門冬二錢 烏梅肉白梅肉

乾葛兩 甘草各半

右為細末麵糊為丸如雞頭實大含化一丸夏月出行可度一日

按孔明五月渡瀘深入不毛分給此丸於軍士故名
水葫蘆孟德遙指前有梅林失於未備耳

縮脾飲 消暑氣除煩渴

縮砂仁

烏梅肉

淨

草菴皮

煨去皮

甘草

炙各四兩

乾葛

白扁豆

去皮炒各二兩

每服四錢水一碗煎八分水澄冷服以解煩或欲熱
欲溫任意服代熟水飲之極妙

大順散

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁
相干陰陽氣逆霍亂嘔吐藏府不調

甘草 乾薑 杏仁 去皮尖 桂枝 去皮

右先將甘草用白砂炒次入薑卻下杏仁炒過篩去
沙淨合桂為末每服二三錢湯點服

冷香引子

治傷暑渴霍亂腹痛煩躁脈沈微或伏

附子 炮 陳皮 各一錢 草菴 炙 甘草 各一錢半

水盞半盞十片煎八分去渣井水頓冷服

大黃龍丸

治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃

硝石各一兩

白礬


雄黃

滑石各半兩

白麵

四兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每服三十丸新井水下管見云有中暎昏死灌之立甦



醫門法律卷八