

四庫全書

子部

欽定四庫全書

仁齋直指卷十二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

瀉痢

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻壅惡風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之面垢背寒自汗發渴受溫得之一身盡痛重着浮黃或

青黃身體拘急寒慄鼓領腰脊俱疼寒去未幾內外皆  
熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也  
或內伏寒痰寒從背起冷如掌大瘡之寒熱其豈非陰  
陽二氣更相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則  
熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱  
也冰水不能寒衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以  
作衛氣與邪氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行  
陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內搏故發

於暮夜若乃邪氣內搏於五臟橫連於募原其道遠其行遲不能與衛氣交併故有隔日發有三四日一發衛氣之行疾行遲病作之有蚤有晏甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣瘡有數種○風瘡自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而為瘡風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫瘡一證亦先熱後寒此為傷寒壞病與風瘡大畧則同熱多寒少小柴胡湯熱

少寒多小柴胡湯內加官桂○寒瘡自感寒而得無汗惡寒攣痛面慘轉而為瘡寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪生料五積散增桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則薑附湯附子理中湯○暑瘡者暑勝熱多得之一名痺瘡陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠盍用小柴胡湯香薷散嘔者縮脾飲加生薑溫服下消暑圓熱多燥甚者少與竹葉湯常山柴胡於暑證最便○濕瘡者冒襲雨濕汗出濕

浴得之身體痛重肢節煩疼嘔逆脹滿盍用五苓散除  
濕湯加蒼朮伏苓輩寒多者术附湯最良○牝瘧者久  
受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而  
泄悽慘振振柴胡桂薑湯減半黃芩加以半夏施之為  
當○食瘧一名胃瘧飲食無節飢飽有傷致然也凡食  
啖生冷鹹藏魚鹽肥膩中脘生痰皆為食瘧其狀苦飢  
而不能食食則中滿嘔逆腹痛青皮陳皮草果半夏縮  
砂白豆蔻作劑或四獸湯下紅圓子自有奇功○瘴瘧

挾嵐瘴溪源蒸毒之氣致然也自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多瘴瘡其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂忘亦有啞不能言者皆由敗血瘀於心毒涎聚於脾坡仙指為脾胃實熱所致又有甚於傷暑之瘡耳治之須用涼膈疏通大腸小柴胡加大黃治瘡木香圓觀音圓皆為要藥○如前數證經久不瘥真氣已耗邪氣猶存則有所謂勞瘡瘡母者焉表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來謂之勞瘡法當調養氣血川

芎當歸官桂芍藥輩所不可無○彌年閱歲經吐汗下  
榮衛虧損邪氣伏藏腸間結為癥癖謂之瘡母此證未  
可直攻急作烏頭七棗湯以扶其裏俟其內氣已充繼  
此經效瘡丹或消癖圓下之取愈大抵瘡之初得三數  
日間如火燎原不可嚮邇波濤洶湧未易回瀾當俟其  
稍定而圖之經所謂其盛者可待乘而已瘡方來與正  
發及將解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩  
時之先或遇發日凌晨空心與之諸瘡之脉大約尺寸

俱弦或浮數或緊實或緩濶或虛遲或左手濡而右手  
盛或尺寸盛而關中濡不可定名以為弦也總前治法  
弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮弦浮緊浮數其  
邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可下若夫  
調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴  
欲水漿藥入輒吐人參煎湯效抑猶有說焉嘗讀二廣  
攝生見其論議若瘴瘡若暑毒每用疎轉之劑取下根  
源里有先傷暑後發瘡涉年餘者度其腹中有癰水磨

沉香下解毒雄黃圓黑血如泥泄下極臭由是獲愈因  
知諸瘡皆有根在治法之外又當隨輕重而利導之實者  
與巴豆大黃虛者用養正丹輩不然常山於瘡每每作  
效何耶蓋瘡家多蓄黃水常山為能破其癥而下其水也

瘧瘡證治

麻黃白朮湯治感風發瘡

麻黃去節

官桂

青皮

陳皮

川芎

白芷

半夏麴

紫蘇

茯苓

白术

北梗

甘草炙等分

加細辛

擗榔

右剉散每服參錢薑肆片棗貳枚空心煎服

五積散感寒發瘡初作以此解散

蒼朮炒取皮兩

北梗壹兩

麻黃去節

枳殼製兩

陳皮各陸錢

乾薑

厚朴半錢

川芎

當歸

白芍藥

白芷

甘草

炒

半夏

製

官桂

伏苓

各參  
錢

右剉散每服參錢水盞半葱白參寸薑參片煎半空

心服

養胃湯加桂治感寒發瘧

厚朴

製

蒼朮

炒

半夏

製各  
壹兩

人參

茯苓

草果

霍香

各半  
兩

橘紅

參

甘草

炙壹  
分

右剉散每服參錢水盞半薑伍片烏梅半箇煎半溫  
服

解毒雄黃圓

方見積熱門

養正丹主寒瘻

方見痼冷門

薑附湯附子理中湯主寒瘻

方見

寒類

草果飲諸瘻通用加乾薑治寒瘻

草果

白芷

良薑

青皮

川芎

紫蘇葉

甘草炒等分

右剉散每參錢煎服

小柴胡湯治暑瘧純熟方見血類或寒熱等則加桂

香薷散治傷暑發瘧

香薷肆兩

肆兩

厚朴製

製

扁豆製各

貳兩

右剉散每參錢烏梅壹箇水煎臨熟入薑汁壹匙溫服

五物香薷湯香薷縮脾飲並主暑證方見暑類

常山飲治傷暑發瘧

嫩黃川常山 知母

草果仁

甘草

炙各  
壹兩

良薑

陸  
錢

烏梅肉

半  
兩

右㕮咀每參錢水壹椀薑伍片棗叁枚煎半稍冷服

七寶剉散治暑瘡諸瘡

川常山 雞心檳榔

青皮

刮去  
白

甘草

炙各  
半兩

草果仁

貳  
錢

右細剉每參錢桃柳枝各柒寸烏梅參箇水大碗煎

半稍冷空心服

五苓散治傷濕發瘡及小便不利

方見水飲類

加劑除濕湯木附湯並主濕瘡或加官桂伏苓

方見濕類

柴胡桂薑湯治牝瘡但寒或寒多微熱

柴胡

貳兩

辣桂

參分

桔萎根

壹兩

乾薑

炮兩

甘草

炙分

牡蠣

煅各半兩

黃芩

參錢字

內加半夏麴

半兩

右剉散每服參錢薑棗煎服

二陳湯治食瘡諸瘡

陳皮

甘草

炙  
一兩

半夏

製各  
伍兩

茯苓

叁  
兩

右㕮咀每服參錢薑伍片烏梅半箇煎服寒多者加草果熟多者加前胡如青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意增用

四獸湯治食瘡諸瘡和胃消痰

半夏

製

人參

伏苓

白术

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

各分等

甘草

炙減半

右咬咀以鹽少許淹食項濕紙厚裹慢火煨香熟每服肆錢水壹椀煎半溫服

紅圓子治食瘡食積氣滯腹脹

京三稜

水浸軟  
截碎

蓬莪木

煨

青皮

陳皮

各伍兩

胡椒

乾薑

炮各  
參兩

右為末米醋煮米粉糊圓桐子大礬紅為衣每伍拾  
圓二陳湯四獸湯皆可下

烏頭七棗湯治久瘡但久瘡但寒及脾寒發瘡或寒重  
熱輕

大川烏頭

壹箇  
再炮  
再浸凡七次  
以鹽水浸  
裂

右細剉分貳服每服薑柒厚片棗柒箇葱白三寸水  
大椀煎半先喫棗稍冷服

又方用小附子壹枚修製一同烏附皆能溫脾挾風則

用川烏寒甚則用附子

治癰木香圓

牽牛

壹斤淘去浮者焙搗  
搗取末肆兩別頓

雞心檳榔

陳橘紅

各貳兩

青木香

人參

熟附子

厚朴

製

官桂

去皮麓

京三棱

羌活

獨活

乾薑

炮

甘草

炙

川芎

川大黃

剉

芍藥

各半兩

肉豆蔻

陸箇

右為末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共壹兩研和煉蜜圓桐子大每服貳拾圓橘皮煎湯下以通利為度

地龍飲治癰瘡諸瘡大熱煩躁

生地龍

參條研極細

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加腦子少許

觀音圓取下暑毒瘡毒

圓白半夏

生

烏梅肉

母丁香

川巴豆

不去油  
件各拾枚

右為末薑麪糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服伍圓臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

芎歸鱉甲散治勞瘍寒熱

當歸

川芎

芍藥

青皮

陳皮

伏苓

半夏

製各  
壹分

鱉甲

醋炙黃  
半兩

右剉散每參錢薑伍片棗貳箇小烏梅壹箇水煎服

熟多加柴胡寒多加草果

五勞圓治勞瘧瘧久病

嫩黃常山

參兩  
半

桃仁

去皮尖炒  
壹兩貳錢

辣桂

去麩皮  
柒錢半

淡豉

叁  
兩

烏梅肉

貳  
兩

右日乾為末煉蜜圓梧子大每參肆拾圓空心溫酒  
下不飲者熟水入些酒下

經效瘡丹治瘡母結癖寒熱無已

真阿魏

雄黃各貳錢半

朱砂壹錢半

右沸湯泡阿魏研散雄朱為末和之稀麪糊圓桐子  
大每壹圓人參煎湯候冷空心服瘧瘧桃枝煎湯冷  
服臨發磨壹圓傅鼻頭口畔

消癖圓治瘡母停水結癖腹脇堅痛

芫花

炒

朱砂

研細等分

右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎棗湯下去癖須

用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯

驅瘡湯治諸瘡久瘡

草果仁

青皮

陳皮

人參

伏苓

半夏

厚朴

製

蒼朮

炒

雞心檳榔

白术

甘草

炙各半兩

良薑

壹分

右剉散每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹箇空心煎服  
生熟飲治脾寒發瘡及寒多熱少

草果

肉豆蔻

各兩箇壹  
喂壹生

川厚朴

方寸許  
二片

生薑

貳塊半生  
半濕紙

喂甘草

貳寸半  
生半炙

右剉散分貳服每服壹椀水貳棗壹烏梅煎半空心

服

蒜丹圓截瘡消瘻

草丹

蟬

穿山甲

熱灰中炮  
焦各壹分

土硃

半兩

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓生

薑烏梅紫蘇煎湯下

七物湯治諸瘧

常山酒浸  
蒸

檳榔

草果

青皮

陳皮

川厚朴製

甘草

炒等  
分

右剉細每服參錢薑伍片烏梅貳箇水壹椀煎半露  
壹宿來早溫服之如熱多加柴胡

載瘧丹臻志修合

土朱

貳兩半

真綠豆粉

貳兩壹兩生入  
藥壹兩煮糊

信砒

有鋒芒者半兩研細生

右用綠豆粉糊築和參件圓如麻子每服止貳圓新汲水研桃軟空心服是日飲食微和而已

勝金圓治一切瘧寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚中滿

雞心檳榔

壹兩

日乾川常山

酒浸蒸焙肆兩

右為末水麪糊圓桐子大每服參拾圓於未發前半

日冷酒下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下貳  
拾圓仍不得喫熱飲食又次日飲食無拘

治瘡方二陳湯貳貼加常山貳錢分作兩服每服薑柒  
片棗貳枚烏梅貳枚水壹椀煎陸分候微冷吞前件脾  
積圓柒圓次日吞參圓

六物湯治久瘡不已寒少熱多

嫩常山貳錢半

柴胡

雞心檳榔

青皮

去白各  
貳錢

草果仁

甘草炙各壹  
錢半

右判分參服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹啜許  
新水貳盞煎半隔宿露空以紗蓋之次早拂明服若  
寒熱等加梨厚朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熟  
附諸方

白虎加桂枝湯

活人方

治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母

甘草

炙

桂枝

粳米

各叁兩

石膏

壹斤

右㕮咀每服伍錢水盞半煎至壹盞去滓溫服

大柴胡湯治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利

為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪

方見傷食門

清脾飲

濟生  
方

治癰瘡脉來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽熱小便赤澀

青皮

去白

厚朴

薑

白朮

半夏

湯泡  
柒次

黃芩

草果仁

柴胡

去苗

伏苓

去皮

甘草

炙各等分

右㕮咀每服肆錢水盞半薑伍片煎柒分溫服不拘

時

正氣散

徐同  
知方

退寒瘡止胃寒進食

藿香

草果

各肆  
兩

半夏

陳皮

厚朴

砂仁

甘草

各壹  
兩

右剉為散生薑棗子煎服如瘡未止俟發日早服

六和湯

人參

草果

知母

貝母

烏梅

白芷

檳榔

柴胡各壹錢  
用酒拌

常山  
錢貳

右咬咀薑參片棗壹枚酒水同煎露壹宿臨發前貳

時服

瘧疾治例

出明醫  
雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發  
有三日一發有間日連二日發有日與夜各發有有  
汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治

法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別  
陽分陰分而用藥邪瘡及新發熱者可散可截虛瘡  
及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去

苗

白朮

蒼朮

米泔浸各壹錢

已上三味瘡疾必用之藥

陳皮染

甘草炎伍分

乾葛壹錢貳分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩伏苓

半夏各壹錢熟甚頭痛加川芎軟石膏各壹錢口渴加

石膏知母麥門冬各壹錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各壹錢酒洗紅花酒炒黃芪各肆兩提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各壹錢以補氣川芎當歸白芍藥熟

地黃各壹錢以補血

若陽瘡多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼  
朮白朮黃芩乾薑以發之

若陰瘡多汗用當歸白芍藥熟地黃黃芪黃薑以斂  
之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰  
有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主  
若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者

加人參壹錢酒炒芍藥大麥芽各壹錢

若傷食痞悶或有食積者加神曲麥芽枳實炒各貳  
錢

黃車

伍

若痰盛加薑製半夏南星枳實

炒各一錢

黃芩黃連

各一錢

陸

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山

各一錢

烏梅淨肉

三箇

者肥

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已  
無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩陳皮以滋  
補氣血

仁齋直指卷十二

欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷十四

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈴

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

霍亂吐瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦為否陽隔陰而不降陰無陽而不升此  
否之所以痞而不通也人具此陰陽揮霍變亂結搏於  
中卒然吐瀉或瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶

煩疼其視天地不交之否異乎否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下利發熱增寒頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋頹頓特反掌間蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液驟亡宗筋失其所養故攣急甚則舌卷縮囊危甚風燭矣然亦何以致此哉曰胃傷暑毒露卧卑濕當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而發焉於是邪正相干中脘節閉氣不得通吐利暴作所

謂脾受賊邪木來勝土者此也治法霍香正氣散加霍  
香生薑為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉  
其若傷暑所致未可遽投香薷散沉冷之劑自合先治  
中脘如二陳湯橘皮半夏湯草次則以香薷溫服散暑  
解煩昧者指為脾胃虛冷遽用人參白朮芍子肉豆蔻  
之屬以壯胃澁腸不思風冷未散驟以參朮芍蔻攏補  
寒邪邪氣得之愈盛愈作縱得淹延或下痢或久瀉或  
腹脹虛浮或中滿不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍

亂死者少乾霍亂死者多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則止猶可幸免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣闔隔陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍變亂如人被髮交爭必有以挾之可也古方用來復丹正取躁利之意但多則太溫莫若薑湯下蘇感圓為愈霍亂氣息劣不欲言者不治

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而復嘔吐者中脘挾風寒

也治喘嗽莫先於調肺既調肺而復喘嗽者風寒在表  
或在裏也瀉痢之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留  
蓄風寒邪氣之所致乎故必隨其感受解散於其先則  
某病某藥庶乎其對證矣解散風寒不換金正氣散為  
上其間增益則青皮官桂良薑乾薑擇用最良若欲其  
清解則紫蘇荆芥乾葛柴胡等草劑量可也惟暑亦然  
每每隱伏作病或為熱嘔或為焦煩或為腹痛或泄痢  
不止暑中類多有之炎藥蘊隆念慮又當及此此說雖

詳於卷首敬用申之

吐瀉證治

霍香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小便不利  
者加伏苓方見嘔吐門此藥能溫散風寒濕氣若暑證加香薷

薷

五苓散治霍亂熱多發渴方見水飲門

良薑飲治霍亂神效

良薑

霍香

陳皮各一兩

甘草

炙參分

右剉細每參錢水煎服

又方

霍香葉

良薑

木瓜

右同煎治霍亂水瀉效

治要除濕湯

半夏麴

川厚朴

製

蒼朮

炒各兩

霍香葉

陳皮

伏苓

各壹兩

甘草

炙  
柒  
錢

右剉散每服肆錢薑柒片棗壹枚煎服霍亂瀉而不  
吐者加桂吐而不瀉者去蒼术加桂丁香吐瀉俱作  
兼腹痛者只加桂

胡椒湯治霍亂吐瀉

胡椒

柒

生綠豆

貳拾  
壹  
粒

右末煎宣木瓜湯溫和調下

治中湯治飲食居處不節以致霍亂方見嘔門本方青皮

陳皮乾薑能散風冷

香薷剉散治傷暑霍亂

方見暑門

木瓜湯治吐瀉不已轉筋擾悶

酸木瓜

壹兩

茴香

壹分微炒

甘草

錢爻貳錢

吳茱萸

半兩半次焙

右剉散每肆錢薑伍片紫蘇拾葉空心急煎服

四順附子湯治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣小不

語急服

生附子

白薑

人參

甘草

炒各  
壹分

炮

右剉每服肆錢水貳盞煎壹盞空腹服腹痛加桂小  
便不利加伏苓仍用炒鹽熨或用薑附湯

方見  
寒類

薑鹽飲治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹

鹽

壹兩

生薑

半兩  
切

右同炒令色變以童尿兩盞煎壹盞分為貳溫服

益湯法治乾霍亂心腹絞痛欲吐不吐欲下不下

先以鹽湯壹盞頓服候吐出令透不吐再服續以剉  
理中湯倍加橘紅與之或霍香正氣散加官桂伏苓  
倍加枳殼或蘇合香圓用枳殼散調下

蘇合香圓

方見諸氣門

用枳殼壹分木瓜半分煎湯調下治

乾霍亂不吐不渴氣痞於中心腹絞痛此證最惡

鹽熨方治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽貳椀紙包紗護頓其胷前并腹肚上截以熨斗  
火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事

霍亂吐瀉臨時無藥以生蒜頭研細塗心下及兩脚心即止

附諸方

不換金正氣散治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼

方見瀉  
痢門

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉病

方見  
暑門

理中湯治中寒霍亂吐瀉

方見  
寒門

七氣湯

三因  
方

治七氣鬱結五臟之間互相刑尅陰陽不

和搏霍亂吐利交作

半夏

湯丸  
伍兩

厚朴

薑  
製

桂心

各  
卷

白芍藥

伏苓

去皮各肆兩

紫蘇葉

橘皮

各貳兩

人參

去蘆壹兩

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚

煎七分溫服

加減理中湯

人參

白朮

乾薑

甘草

炙各等分

若為寒氣溫氣所干者加附子壹兩名附子理中湯

若霍亂吐瀉加陳皮青皮各壹兩名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏壹兩每服生薑

拾片同煎

若泄瀉者加橘紅伏苓各壹兩名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子壹兩○不喜飲

米穀不化者加縮砂仁壹兩共成八味

若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮  
加熟附名四順湯

若傷寒結胃先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸  
吐和後胃痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加  
枳實伏苓各壹兩名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根壹兩

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏壹兩

若臍上築者腎氣動也去术加官桂壹兩半腎惡燥

故去木恐作奔豚故加官桂

若悸多加伏苓壹兩

若渴欲飲水者添加术半兩

若腹滿者去白术加附子壹兩

若飲酒過多及啖炙燙熱食發為鼻衄加川芎壹兩

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血

脉

泄瀉

泄瀉方論

胃為水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸大腸腸胃虛弱或挾風挾寒或傷暑傷濕停冷蓄熱冷熱不調泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重着冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥水之熱氣無所發泄

故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以  
熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷干而成泄或澁或  
溏裏急後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃  
不能消心腹膨脹所下酸臭可驗焉治法當究其感受  
之源然後為之固實不窒其源吾恐決瀆四出莫知其  
終者矣雖然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂  
泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄焉腎泄何如曰  
腹痛無定處似痢非痢骨弱面黧脚下時冷者是也前

件諸方條例于后至若泄利之後腹滿身疼是則為表  
裏俱病先當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯  
與之活人書言之詳矣抑猶有繙餘之論焉肝者脾之  
賊未能勝土古人慮之固也經曰肝腎氣虛為病泄瀉  
亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門戶要束之具  
束則不泄也不然泄瀉而面色青慘者古書謂肝經受  
寒所致特設當歸厚朴湯以主之果何意哉

下利惡證  
其載活人

泄瀉證治

理中湯治腸胃虛弱泄瀉有聲泄瀉頻併

人參

白朮

乾薑

甘草

炒各  
壹兩

加伏苓

川厚朴

製各  
卷分

右剉細每服參錢空心煎服  
調中散治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉

縮砂

蓬朮

炮

乾薑

炮

肉桂

茴香

炒

草果

各半兩

麥牙

炒

益智仁

橘紅

各分

蒼术

炒

神曲

炒

甜梗

各一兩

甘草

錢

炙卷

右末每服參錢薑棗并少鹽煎服  
肉蔻散治脾虛腸鳴泄瀉不食

大肉豆蔻

壹枝剝小瓣子入乳香三小塊  
在內以麪裹煨熟為度去麪

右末每壹錢水飲調下

治要除濕湯治風邪泄瀉加辣桂寒邪泄瀉加乾薑良

薑通用加木香

方見瀉門

香薷剗散

方見暑門

治傷暑泄瀉更增伏苓

平胃散治傷濕泄瀉

橘紅

厚朴

製各參兩半

蒼朮

炒伍兩半

甘草

炙壹兩

右剗細每服參錢薑棗煎服

又法以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎暑瀉濕瀉

諸證皆驗

黃連阿膠圓治暑瀉熱瀉方見喫門用五苓散送下方見水飲門

又洞泄方車前子末米飲下

薯皮湯治協熱泄瀉亦治血痢

薯皮參

兩

黃芩貳

兩

黃連壹

兩

右剉每服肆錢水大盞煎染分入阿膠末半錢再煎

少頃溫服

薑附湯治冷證泄瀉方見寒類

米附湯見濕

通用

大已寒圓治虛冷腸鳴滑泄

良薑

乾薑

炮各  
兩

肉桂

草撥

各肆  
兩

右末麪糊圓桐子大每伍拾圓米飲下

戊己圓治冷熱不調泄瀉

吳茱萸

炒

黃連

去鬚

白芍藥

等分

右末米糊圓桐子大每參拾圓空心米飲下

真人養臟湯治冷熱不調泄瀉裏急後重

罂粟殼

去筋萼蜜炙  
壹兩捌錢

木香

白芍藥

各捌錢

訶子肉

六錢

人參

白朮

當歸

各叁錢

甘草

肉桂

各肆錢

右朮末每服貳錢薑棗煎食前服先用縮砂煎湯下

感應圓

方見張滿門

俟其積消然後服此

雞舌香散治飧食生冷久為冷積

良薑

辣桂

香附

淨炒

益智仁

天台烏藥

各壹兩

甘草

炎半兩

右末每貳錢入少鹽沸湯點吞感應圓

三棱散酒食傷積用此

京三棱 炙

蓬莪术 炙

益智仁

甘草 炙

青皮 去白 貳兩

白茯苓 肆兩

右末每貳錢少鹽煎吞感應圓治傷食泄瀉俟酸臭  
出盡即服固腸散止之

固腸散治冷瀉腸滑及下痢頻併

罌粟殼

去筋萼壹兩

陳米 炒壹兩

乾薑 炙

甘草 炙各貳  
錢半

肉豆蔻 生貳  
錢

木香 壓

錢

右末每貳錢薑棗煎食前服

寶勝散治泄瀉不止

川厚朴 製壹  
兩半

肉豆蔻

訶子 炙

縮砂

橘紅

蒼朮 炒

伏苓 各壹  
兩

木香  
兩

甘草 炒肆  
錢

右籠末每參錢薑棗煎服手足冷加炒乾薑

安督圓

方見水飲門

治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面

鰲腰脚時冷用和劑

七氣湯送下

方見氣門

震靈丹治腎泄證候同前

禹餘糧

火煅醋淬不計遍

次手撲得碎為度

丁香代赭石

如上修製

赤石脂

紫石英

杆碎以上各肆兩入甘鵝

內以瓦蓋口鹽泥固濟候

乾月硬炭壹拾斤煅通紅火盡為度入地坑埋出火毒或宿研末

的乳香

別研

沒藥

五靈脂

並去砂石研各貳兩

朱砂

壺研

丙

右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服參圓  
用炒故紙入棗煎湯調鐘乳粉少許空心送下小兒  
腎泄白膿褐汁面黯齒脫懶人怯寒震靈丹末入此  
鐘乳粉以棗煎炒故紙取熱汁調下

木香散治脾腎俱虛泄瀉

肉豆蔻

麯裹  
紙煨

故紙炒

白术

白伏苓

各半  
兩

木香

甘草

炙各  
壹分

右剗細每參錢食前薑棗煎溫服

二神圓治脾腎俱虛泄瀉不食

破故紙肆兩炒

肉豆蔻貳兩生

右末用肥棗蒸爛取肉研膏夾和杵圓桐子大每服肆拾圓清米湯下若飯食後常一泄服此頓愈

當歸厚朴湯治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸炒

厚朴製各貳兩

官桂參

良薑

伍兩

右剉散每參錢食前服

附諸方

白术芍藥湯

機要方

治太陰脾經受濕水泄注下體重徵

滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化

白术

芍藥各一兩

甘草五錢

右㕮咀每服壹兩水煎

升陽除濕湯

技粹方

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓

蒼术

壹兩

陳皮

甘草

大麥芽

各叁錢

右㕮咀水煎食後熱服

升陽除濕防風湯

東垣方

如大便閉塞或裏急後重數至

圊而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必致重  
病及鬱結而不通也又此道舉其陽則陰氣自降矣

蒼术

米泔浸去皮乾淨肆兩

防風

錢

白术

白茯苓

白芍藥

各壹錢

右咬咀除蒼木另作片子水壹碗半煎至貳盞內諸

藥同煎至壹大盞食前熱服

益胃湯

拔粹方

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰

燥熱短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身體皆悶口

乾不喜飲冷

黃芩

甘草

半夏

湯泡各  
貳分

黃芩

柴胡

人參

白术

益智各參

當歸梢

升麻各半  
錢

陳皮半  
錢

蒼朮壹錢  
半

右咬咀水盞半煎捌分食前通口服

胃苓湯治感暑夾食泄瀉煩渴平胃散五苓散相合

蒼朮

陳皮

厚朴  
薑  
製

甘草

白术

伏苓

猪苓

澤瀉

桂

右咬咀水煎入鹽少許服如作末藥湯服亦可

柴苓湯分理陰陽治瀉解熱

柴胡

黃芩

半夏

甘草

減半

人參

猪苓

白朮

伏苓

澤瀉

各等分

水貳鍾薑參片煎服

養胃湯治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹脹痛腸鳴泄瀉

方見

門

痺瘡

五苓散益元散

並見暑門

丹溪方治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是  
脾泄

黃芩

炒半  
兩

白朮

炒貳  
兩

白芍藥

酒拌  
炒半  
兩

半夏

泡各  
半兩

神曲

炒

山楂

炒各壹  
半兩

藿香

壹  
兩

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯  
下

錢氏白朮散治氣血俱虛神弱之人或吐瀉

人參

白伏苓

白术

木香

甘草

藿香各壹  
兩

乾薑

半  
兩

右為粗末每服伍錢水壹鍾煎分食前溫服

參芩白术散治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉方見虛勞門  
溫脾止瀉散治大人小兒久瀉滑脫不止

乾薑

微  
炒

白芷

附子

生各  
壹錢

右為細末用生白蜜丸如彈子大按入內一二日即

止

泄瀉治例

出明醫雜著

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收濕之

主方

白术

錢貳

白伏苓

白芍藥

炒各壹錢半

以上三味泄瀉必用之藥

陳皮

壹錢

炙甘草

去皮伍分

若傷食泄

黃或食積加神曲大麥芽山楂子各壹錢炒

黃連

柴消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香各消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香

各伍分

若小便赤澁短少加澤瀉豬苓木通各壹錢以分利之

夏月再加茵陳

柴炒山梔仁肆分

若口渴引飲加乾葛

壹錢半人參麥門冬各壹錢

升麻滑

石分肆烏梅肉貳箇

若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒黃連蒼木澤

瀉各壹升麻木通各伍發熱燥渴加乾葛石膏各

錢黃疸小便黃赤加茵陳壹山梔木通各伍

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連茵陳乾葛各

錢木香伍神麵麥芽各捌分

若寒月溏泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神麵麥芽

炙乾薑各壹砂仁益智木香各柒分

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參  
黃芪各壹錢以補中氣升麻柴胡各肆分以升提之加  
羌活防風藁本白芷等風藥各叁肆分助風以平之更  
加炙乾薑伍分以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃芪人參各壹錢神

麵麥芽各壹錢木香各貳分過乾薑伍分

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻壹錢荳子皮赤石脂

各壹錢  
煨木香炙乾薑各伍分

針灸法脾腧二穴

在十一推下兩傍各開寸半主泄瀉

中脘一穴

在臍上四寸主

腹痛關元一穴

在臍下三寸療腹泄不止

天樞二穴

在臍傍各開三寸治腹滿脾洩

瀉大腸俞二穴

在十六推下各開寸半灸三壯治腸鳴腹脹暴瀉

欽定四庫全書

仁齋直指卷十四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

瀉痢

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻壅惡風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之面垢背寒自汗發渴受溫得之一身盡痛重着浮黃或

停冷則淒清腸鳴或蘊熱則發熱煩燥冷熱不調者乍  
澁乍溏飲食傷飽者注下酸臭諸有積以肚熱纏痛推  
之諸有氣以狀如蟹湧驗之究其受病之源決之對病  
之劑大要以散風邪行滯氣開胃脘為先不可遽用肉  
豆蔻奇子白朮輩以補住寒邪不可遽投罌粟殼龍骨  
牡蠣輩以閉澁腸胃邪氣得補而愈盛補之愈盛而愈  
作不為纏擾撮痛則為裏急後重所以日夕淹延而未  
已也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若

風邪挾熱則所下黃而赤焉其白者冷搏腸間津液凝滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若膿涕而血雜之輕者白涕中間微有赤縷是也內挾風邪故清血流注或濕毒乘虛入腸胃之間則下如豆汁或有瘀血是也論者以手足寒為冷手足溫為熱於理甚當亦當合赤白而並觀之庶乎其的矣雖然風寒暑濕感之於外者也其有大嚼傷飽宿酒漿醯醢以成積滯房闥縱情加奔走勞役以耗精

血此非病生於內者乎必明白內外而權度之則受病淺深用藥輕重知有定嚮矣母槩曰無積不成痢○下痢壯熱須用敗毒散加陳米間與五苓散黃連阿膠丸○下痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃有風邪熱者赤者與敗毒散冷者白者不換金正氣散加木香

瀉痢證治

敗毒散治風邪寒邪壯熱下痢方見寒類陳米飲調五苓散

佐之

方見水飲門

不換金正氣散治風邪寒邪冷證下痢

方見寒類

治要除濕湯

方見吐瀉門

加官桂木香治風寒冷證下痢加

乾薑伏苓治傷濕下痢仍以五苓散利其小便

理中湯

方見瀉門

加厚朴木香伏苓治濕冷下痢

艾薑丸治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

肆兩炒焦存性

川白薑

壹分炮

右為末醋煮麪糊丸桐子大每柒拾丸食前清米飲

下

人參豆蔻散冷證瀉痢通用

木香

厚朴製

蒼朮米泔浸曬

乾薑炮

肉豆蔻生各

半夏麵

陳皮

阿膠炒各肆兩

縮砂

甘草

炒各貳兩半

罂粟殼去筋萼

淹炒肆兩醋

右剉每參錢薑棗煎食前服

香薷剉散五物香薷湯六和湯方見暑門治傷暑下痢五苓

散佐之

升麻湯

升麻

白芍藥

甘草炙各拾兩

白乾葛拾伍兩

右麓末每參錢薑參片同煎吞感應丸治傷暑下痢

纏痛

黃連阿膠丸

方見家門

蘖皮湯方見瀉門

治熱證發熱下痢亦治

暑痢

香連丸治冷熱不調瀉痢

黃連

壹兩用茱萸半兩  
炒去茱萸不用

木香

壹分

右取香連為末醋糊丸桐子大每參拾丸米飲下前

戊己丸通用

真人養臟湯治冷熱不調下痢方見瀉門依前法用之

三稜散治食積下痢腹痛方見瀉門依前法用之

感應丸

方見諸氣門

解毒雄黃丸

方見熱門

治諸積下痢用五

芩散送下

和劑流氣飲

大異香散五膈寬中散

方見諸氣門

治諸氣痢

牛乳湯治氣痢泄如蟹湧

草撥末

貳錢

牛乳

半升

右同煎減半空腹服

柴連丸治赤白下痢

吳茱萸

揀淨

黃連

去鬚半寸一截同炒熟分為二處

右各碾末醋麪糊丸桐子大赤痢專服黃連白痢專服茱萸赤白併服或多或少以意增減每服柒拾丸陳米飲下以愈為度

胃風湯治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

人參

白伏苓

川芎

當歸

辣桂

白术

白芍藥

等分

右剉每服參錢粟米百餘粒同煎食前熟服腹痛加

木香

肉蔻散治冷證久痢不止

方見  
瀉門

附子理中湯

方見寒類

木附湯

方見濕類

治虛損久痢四

肢厥冷以意擇用

禁口痢方

石蓮肉

日乾

右為末每服貳錢陳米飲調下便覺思食仍以日照  
東方壁土炒真橘皮為末薑棗略煎佐之

斷下湯止赤白痢

伏苓

白术

各壹錢

甘草

半錢

草果

連皮壹枝

大瞿粟殼

拾肆枝去筋萼剪碎醋浸炒燥

加木香

半錢

右為麌末分作兩服每服薑伍片大棗參箇大烏梅

參箇食前煎服固腸散

方見瀉門通用

玉華白丹治臟腑久虛止瀉止痢

陽起石

入乾鍋煅通紅酒淬  
煩陰地令乾莫見日

白石脂

煅紅

左顧牡蠣

鹽泥周濟煅紅  
取白者各半兩

鍾乳粉

壹兩

右研極細如粉和畢糯米糊圓空心米飲下渴者人

參湯下亦治腸風下血又震靈丹

方見瀉門通用

赤石脂禹餘糧湯治瀉痢諸藥不效以此固其下焦

赤石脂

剉小塊

禹餘糧

煅醋淬以碎為度

右等分夾和每服肆錢空心煎溫服

瀉痢須要衣服周密恐傷風冷凡蘊熱血痢裏急而痛甚雖已躁通蕩滌然其痛不減者非熱亦非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾用藥當以川芎為佐榮血一調其痛立止

附諸方

防風芍藥湯

拔粹方

治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及

頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩

各壹兩

右㕮咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口  
服

經驗柏皮湯治傷寒下痢亦治久血熱痢

蘖皮

參兩

黃芩

貳兩

黃連

壹兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服腹  
痛加山梔子小便不利加赤伏苓阿膠煎服

芍藥蘖皮湯子和方 治一切溫熱惡心痢頻併窘痛無問

膿血

芍藥

黃蘖

各壹兩

當歸

黃連

各半兩

石為末水丸豆大溫水下參肆拾丸等服忌油膩生

冷熱物

黃連香薷飲治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯治暑病內傷下痢不思飲食發熱並見泄暑門

白术芍藥湯機要方 治老人奉養太過飲食傷脾時或瀉

痢

錢氏白术散治氣血俱虛之人或瀉或痢

並見泄瀉門

蒼朮芍藥湯粹粹方 治痢疾痛甚者

蒼朮

貳兩

芍藥

壹兩

黃芩

官桂

錢各伍

右咬咀每壹兩水貳鍾煎至壹鍾溫服

芍藥黃芩湯

拔粹  
方

治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉

洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥

各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服食前

調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯

俱見傷寒門

四物湯

保命集

治下痢純血

川芎

當歸

白芍藥

生地黃

槐花

黃連

御米殼

等分

右咬咀水煎服

地榆芍藥湯

拔粹方

治泄痢膿血乃至脫肛

蒼术

捌兩

地榆

貳兩

卷柏

芍藥

各叁兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾食前通口服

阿膠梅連丸

宣明方

治下痢無間久新赤白青黑疼痛諸

証

金井阿膠

淨草灰炒透  
明白別研細

赤伏苓

烏梅肉

去核炒

赤芍藥

黃柏

剉炒

黃連

去鬚

乾薑

炮

當歸

酒洗各等分

右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下拾丸  
食前連夜伍陸服小兒丸如菉豆大忌油膩脂肥諸

物

石榴皮散 經驗方 治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下貳錢  
保和丸專治脾虛因積作後重者不可下用此消導方見 聚積門

秘傳香連丸治男婦小兒諸般痢疾作痛並久痢虛脫  
濃血不止者服之神效如初痢一二日之間不可服恐  
攔住積滯熱毒他証愈劇反為咎矣

川黃連

酒潤炒伍兩

木香

白豆蔻

各壹兩半

乳香

沒藥

各伍錢

右為細末麪糊丸如彈子大每服壹丸赤者甘草湯

擦下白者生薑湯下

黃連湯治痢疾

黃連

滑石

生地黃

白芍藥

蒼朮

台朮

當歸

青皮

條黃芩

各等分

右咬咀每服柒錢水貳盞煎捌分去滓食遠溫服

大柴胡湯治下痢舌黃口燥脣滿作渴身熱腹脹譫語  
此必有燥屎宜下後服木香黃連苦堅之三乙承氣湯  
暑毒溫熱傷後下痢膿血宜服二方

見傷寒門

針灸法見前泄瀉門詳施

脫肛

脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫  
非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟

虛則寒寒則內氣餒而不能收而况大腸之厚薄膏脂  
之瘠肥亦視夫內氣之虛實何如耳大凡脫肛須以溫  
湯澆令和軟然後摩導而入治法以溫斂行之其有產  
婦用力過多及小兒呴號努氣久痢不止風邪襲虛亦  
有此證○凡腸頭作癢即是腹中有蟲生艾苦練根煎  
湯熏洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔漏者登溷  
不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染  
污其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷

後須用一洗

脫肛證治

蝟皮散治肛門脫出不收

蝟皮

壹箇火內燒令焦黃存性

磁石

半兩法醋煎數沸  
焦磁石末次為末

辣桂

錢參

鱉頭

壹枚慢火  
炙令焦黃

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破草鞋底灸

上面熨按令入

鱉頭散治脫肛

鱉頭

瘦火炙  
黑黃

右為末塗傅腸頭用軟紙襯輕輕按入仍以方寸匕

食前米飲調下

磁石散治脫肛

磁石

半兩焦入煎沸  
醋中凡柒次

右為末每服壹錢空心米飲調下

香荆散治脫肛

大香附

荆芥穗各半

縮砂貳錢

右末每服參錢食前新水煎數沸即服小兒通用

釣腸丸治大腸空冷脫肛不收及腸風諸痔

白朮

枯

綠礬

枯

訶子

煨取肉

枳殼

去穰  
炒

白附子

去皮臍  
上各壹兩

生南星

黃瓜蔓

壹箇燒  
存性

蝟皮

壹箇剉碎  
罐燒存性

生半夏

生附子

去皮臍  
上各壹兩

雞冠花

剉炒貳  
兩半

胡桃仁

柒箇不用油  
罐內燒存性

右細末醋煮麪糊丸桐子大每服貳拾丸空心溫酒

下或枳殼散送下

縮砂湯治大腸虛而浹熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

右末每貯錢米飲調下

黃連阿膠丸

方見  
欽門

治腸虛為暑熱所攻脫肛紅腫肛門

熱痛仍以荆芥穗朴硝泡湯溫洗次用薄荷煎鵬砂丸  
津液調傳

鐵粉散治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

鐵粉

研細

右入白斂末夾和傅之即按入

蒲黃膏治脫肛熱痛

生蒲黃以豬膏和傅即按入

桑螺膏治脫肛

桑椹上緣桑螺子

燒存性

右末以猪膏和塗雨後緣桑者佳

橡斗膏治脫肛

橡斗子燒存性猪脂和傅

木賊散治脫肛不熱

木賊燒存性為末，繖以帛按入

獨虎散治脫肛不收五倍子半兩末并水參，碗入磁瓶慢火煎半續入朴硝、荆芥穗各壹錢乘熱熏洗仍以五倍子末傅之

石灰方治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熟以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海

螺蛸末傳

敗毒散小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪  
加陳米煎方見寒類

桑葉方

黃皮桑根取葉參升煎帶溫

石以布盛罨小兒肛門輕手按入次用門臼中細塵  
綿包撲之

小兒灸法百會穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折

中在順之中心端正螺毛處是也兩手握蒜炙灸則肛  
腸自收

濕黽證蟲蝕肛門咽乾唇瘡齒晦

方見活人總括

附諸方

二靈散治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨

煅伍錢

木賊

燒存性貳錢伍分

右為末摻托之

一方治脫肛用五倍子為末每用參錢入白礬壹塊水

貳碗煎洗

一方用蔓陀羅花子連殼壹對橡斗拾陸箇搗碎水煎參伍沸入朴硝熱洗其肛自收

一方用浮萍為末乾貼患處

針灸法命門一穴

在十四推下灸二七壯治大腸虛冷脫肛不收長強一穴尾

閻骨夾底灸二七壯治痢腸風痔漏脫肛不收

仁齋直指卷十四