

四庫全書

子部

欽定四庫全書

宣明方論卷七

金 劉完素 撰

燥門

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致
金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液
故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也

則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃為痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此者亢則害承乃制也癥者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也 經曰血不流而滯故血內凝而乃

瘕也

小腸移熱於大腸乃為瘕瘕大腸移熱於小腸謂血熱相搏則血溢而為伏瘕血澁不利月事沈滯而不行故行為瘕瘕為瘕與伏同瘕與疝同為傳寫誤也世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛

寒主筋縮故急主痛寒極

血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為寒誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之
五藏六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於臍上
大如臂上至於心橫於心上如屋梁故曰伏梁肝之積
名曰贛音奔氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人痰
瘧脾之積名曰痞氣在胃腕覆大如杯久不愈令人四
肢不收發黃疸食不為膚肌肺之積名曰息贛結在右
脇下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發為肺癰
腎之積名曰贛音奔狫在於小腹上至心下如狫贛走往

來無定久不愈令人喘逆發為骨痿少氣乏力此為五藏之積也嘗究斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沈細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂 芫

花 大戟 荆三稜 蓬莪朮 川棟子 葫蘆

巴 巴 戟 已上各一兩 巴豆 去皮不出油二分 陳米 三合將芭豆一處同

炒縮砂仁 一兩半

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麪糊和丸如菜豆大每服五七丸食後加減看虛實隨湯水下

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣

逐風功不可述

枳殼

去穰
麩炒

木通

剉炒

青皮

去皮

陳皮

去白

桑白皮

剉炒

蘿蔔

子

微炒

白牽牛

炒

黑牽牛

炒

莪茂

煨

茴香

炒

荆三稜

煨各
等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二十九煎橘皮湯下不計時候

透隔寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛

一兩

芒硝

三兩

川大黃

二兩

甘遂

半兩

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減踈動止
密補固真丹 治皮腎真元損虛泄痢痰嗽痞水穀
酸臭飲食無味臍腹冷痛肢體麻痺下虛痰厥上實壅
滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒稿面鰲身悴唇黃口燥
髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣一切脾胃虛證常服補
養宜通氣血

天南星半兩半夏半兩製神麩 麥蘖 茴香炒 荊三稜

炮各一兩白附子 乾生薑 川烏頭生各一兩 巴豆七筒 牽

牛三代赭石二官桂一

右為末水和丸小豆大每服十九加至五十九溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸 治和脾胃膈消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂 乾薑各半木香一分大黃 蓬莪朮 芫花

醋拌濕炒乾枳殼去穢陳皮各半半夏二兩牽牛半斤取末四兩茵

香一兩巴豆四筒

右為末滴水為丸如小豆大每服二三十丸溫水下

散金丸 治心胸腰腹急痛或淋悶升產後經病血刺

痛

當歸

兩半

破故紙

黑牽牛

各五錢
別研用

輕粉

硃砂

粉霜

各一分

蓬莪茂

二錢
炒

右同研勻棗同為膏蜜丸梧子大新水下一丸病甚者加得利後復

泥金丸 治心腹急痛取久效能消積滯推陳致新

黃蘗

大黃

巴豆

五靈脂

各半
兩

猪牙皂角

一分

輕粉

鉛霜

硃砂

各一分

右研勻煉密拌得所杵干下丸菴豆大新水下一丸
未利更加服

狀元丸

治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

巴豆

五十各取霜

神麴

半兩末

半夏

一兩洗

雄黃

白麴

一兩

炒

右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫水
下童子二九三四歲一丸歲半半丸止嗽溫瀝汁下

止嘔吐生薑湯下

玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索

青皮

去白

陳皮

去白

當歸

木香

雄黃

別研

荆三稜

生薑

各一兩

右為末酒麪糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯

下

又一方

無陳皮

生薑

有廣茂

一兩

檳榔

分兩同

大延胡索散

治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥瘕

癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦楝 蓬

莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎 桔梗

黃芩 大黃 甘草 檳榔

各半兩

一兩二錢

右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食
前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨
各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良
後常服

三稜湯 治癥瘕痞積聚不散堅滿痞膈食不下腹

脹

荊三稜

兩二

白朮

兩一

蓬莪茂

兩半

當歸

兩半

檳榔

木

香

錢三

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚癥癖氣塊及大小結胸痛不能

仰按

天南星

半夏

芫花

自然銅

等分
生用

右為末醋煮麩糊為丸如桐子大每服五七丸食前
溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕容搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急
津液凝溢便溺不利赤癰疥疽癰發背疥癬走注脚氣
無首尾瘡癩功效不可盡述

檳榔 甘遂 葦靈仙 赤芍藥 澤瀉 葶歷

已上各 乳香 沒藥 黑牽牛 大戟 陳
二兩 一兩 半兩 二兩
別研

皮 四兩
去白

右為末麩糊為丸如桐子大每服五十九至七八十
丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麩
食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛
及遠臍腹痛不可忍者

川大黃

三兩新水浸一宿
蒸熟切片子焙

乾薑

一兩
炮

大附子

半兩
去皮

臍
鱉甲 一兩半

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥

九如桐子大每服十九至二十九空心服或酒米飲
下後取積如魚腸膿血爛肉汁青水當下

開結妙功丸 治佛熱內盛瘰癧堅積腸腹癥瘕結聚
疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸滑泄逆氣煩心不
得眠咳喘噦逆不能食或風濕內攻肢體麻痺腫脹黃
瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴痛神思煩鬱偏正頭疼
筋脉拘攣肢體麻痺走注疼痛酸兩目昏眩中風偏枯邪
氣上逆上實下虛脚膝痠軟不通氣血

荆三稜 炮

茴香

各一兩 炒

川烏頭

四兩

神麴

麥芽

大

黃

各一兩 好醋半升 熬成稠膏 不破 堅積不須熬膏水丸

乾薑

巴豆

二箇 破堅

積用

半夏

半兩

桂

二錢

牽牛

二錢

右為末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸溫水冷
水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却涼尤數以加至
快利三五行以意消息病去為度

木香分氣丸

治積滯癍塊不消心腹痞結疼痛搶刺

如覆杯狀

陳皮去白檳榔各一兩破故紙二兩木香一兩黑牽牛二十

兩炒香熟取末
五兩半餘不用

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十丸生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣寒水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞嗽食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰水宿食不消中滿膈氣刺痛寬中開胃導飲食

桂心一兩陳皮去白甘草炙各二兩砂仁四十箇廣茂各半當歸各半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九食前細嚼沸湯化下

導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒

木香

各一錢

蝎梢

三錢

巴豆

八箇出油為度

右為末後入芑豆霜研勻醋麪糊和丸如菉豆大朱砂為衣每服五九至十九淡醋湯下

積氣丹 治一切新久沈積氣塊面黃黑瘦諸氣無力

癥瘕積聚口吐酸水

檳榔

二筒

芫花

一兩

硃砂

二錢

芭豆

二錢半生

青皮

去白

陳皮

各三

錢

蓬莪茂

雞爪黃連

京三稜

章柳根

牛

膝

各一兩

肉豆蔻

三筒

大戟

川大黃

甘遂

白牽

牛

乾薑

青礞石

乾漆

各半兩

木香

二錢

石菖蒲

錢三

右為末醋麪和為丸如桐子大每服一九臨卧燒棗湯下每夜一丸或二丸候肚內作聲病退為度

金露紫苑丸

治一切脾積兩肋虛脹臍疼痛

草烏頭

去尖炒

黃連

兩半

官桂

桔梗

乾地黄

生薑

川椒

蕪荑

紫苑

去皮

柴胡

防風

厚

朴

甘草

人參

川芎

鼈甲

酒浸

貝母

枳殼

去穰甘遂

各一兩

巴豆

三兩醋煮半日出油

入硃砂

右為末水煮麩糊為丸如桐子大每服五丸空心臨
卧米飲湯下或微踈動詳虛實加減

信香十方青金膏

灌頂法王子所傳十二上願云藥

師瑠璃光如來應當供養正徧知明行足善遊世間解
無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯變生
百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿塞急痛或
酒積食積癥瘕積聚痞疝堅積中滿膈氣食臭酸醋嘔
吐翻胃或膈痺消中善食而瘦或消渴多飲而數色角切頻
也小便或腸風下血痔瘻痒痛或胃癰痞或偏身癰疽
惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡

瘰肉或下痢腹痛或一切風氣肢體疼痛及中風偏枯
或痰逆生風痰涎嗽兼產後腹痛及小兒瘡疾諸風潮
搐但平人常服補養宣行榮衛調飲食

信砒 乳香 輕粉 粉霜 芭豆
已上各一兩 兩同研 龍

腦半錢 麝香半錢 青黛二錢 黃蠟三錢
字同研

右研細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菜豆至小豆
大先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候
面東頂禮一丸淨器盛水送下如合藥即淨處面東

每一丸密念呪三遍或病人不能呪請人呪

或師氏呪過 呪曰

信香十方青金膏 藥師圓成蜜遍拋

普濟有緣除百病 仰吞一粒體堅牢

密呪曰

但言八金剛 莫說十方佛

五蘊六根俱不道 十二上願自然成

金黃丸 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荆三稜

香附子

半兩

澤瀉

二錢半

巴豆

四十九粒出

黍米

粉

牽牛

二錢半

右為末用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三丸至五

丸如心痛艾醋湯下七丸

逆氣丸 治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬膈
進美飲食

薑黃

四兩

香附子

四兩

縮砂

甘草

廣茂

各二兩

丁皮

甘松

木香

荆三稜

各一兩

白檀

半兩

藿香葉

兩半

右為末入菜豆粉二兩用湯浸蒸餅為丸如桐子大
每服三二十九細嚼日湯下食後日進三服

丁香散 治痲痺氣脇下痞滿息而不消積而不散元
氣在胃不妨食者

好丁香

二十
五箇

白丁香

七十
箇

蜜陀僧

舶上硫黃

黃鶯調

各五
分

右為細末每服一字皂子煎湯調下不計時候治肚
内生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃

三兩

黑牽牛頭末

一兩

硃砂

三錢

山梔子

半兩

輕粉

右為末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每

服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯氣

結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃內有癩癬氣并

當有疔蟲蛇蟲攻心腹俱痛忽中傷寒頭痛不忍狀若

山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥宣通三五行立瘥

或中風口喎語多蹇澁睡後口中涎出不限時節不問
男子女人但五日一服不過三服永瘥人患腰膝疼痛
脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒疳痢脫肛者量
大小與服利三五行自瘥大人久泄氣痢狀若休息痢
止有時俱一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷
熱老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常時
蓋緣搜出藏府中積滯蟲膿故也無孕婦人久患血虛
氣弱痿黃無力者亦可依方服宣通氣候殊不困倦無

妨此藥凡有百病並皆治之其功不可具載有孕婦人
或遇陰晦時即不可服天道清明可進若雖復疾而未
愈者再可服

黃耆 木通 桑白皮 陳皮 各一兩 胡椒 白木

木香

各半兩

白牽牛

四兩炒別取頭末

右七味為細末每服二錢牽牛末二錢生薑二錢切
作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用生薑湯或
溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後

以白粥補之痊矣

五積丹 治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一鈹

一尺二寸火燒留性淨盆合之四面土壅合物令出煙

巴豆

十二箇白

麵一兩五錢同炒令黃色為度

右為末醋麵糊為丸菘豆大每服十九鹽湯下食後

加減

宣明方論卷七

欽定四庫全書

宣明方論卷八

金 劉完素 撰

水濕門

夫諸濕者濕為土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物
濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱怫
鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自
熱生而熱氣尚多以為兼證云濕熱亦猶風熱義同雖

病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸 治中滿腹脹喘嗽淋瀝一切水濕腫滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別

辨或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢
及小兒驚疳積熱乳癖滿並宜服之

甘遂 大戟

芫花

醋拌濕炒
各半兩

牽牛 二兩 大黃

一兩
為細

末
輕粉錢一

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸
溫水下每日三服加至快利後却常服病去為度
設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進
酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶

則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃柏兩一牽牛兩四大黃兩二輕粉錢二甘遂 大戟

芫花

各一分
依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣常得効 賈同知稱之不已乃神仙奇絕之藥也

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大

便滑洩

葶藶

茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

各一分

木香

半錢

澤瀉

木通

甘草

各半兩

辣桂

一分

滑石

三兩

右為末每服三錢白湯調下食前 此藥下水濕消

腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者

此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是能反為注泄此

正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳

白朮木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便闕者

白朮

木猪苓

皮去

赤茯苓

甘草

澤瀉

各半兩

木

香

檳榔

錢三

陳皮

二兩去白

官桂

錢二

滑石

三兩

右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食

後去滓溫服

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大

便滑洩

橘皮一兩 去白 木香一分 滑石六兩 檳榔三錢 茯苓一兩 去皮 木猪

苓去皮 澤瀉 白朮 官桂各半 甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓

溫服大小便秘先服十棗湯 二三日後再服此藥

葶藶膏 治水腫腹腹

牛黃 麝香 龍腦各一分 昆布 海藻上同三分洗

牛桂心各八分 椒目三分 葶藶六分炒

右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十九日

再服稍利小便為度詳虛實加減

茯苓散 治諸般氣腫等疾

芫花

醋拌炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防己

各二

錢半

陳皮

去白

白檳榔

瞿麥

各半兩

藁本

二錢半

滑石

三分

大戟

炒三分

右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取
下碧淥水如爛羊脂即瘥如未盡隔日又服腫消如
故不用服忌鹽百日

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏

製

甘草

炙

厚朴

去皮

陳皮

去白

藿香

各等分

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前

二氣散 治水氣蠱脹滿

白牽牛

黑牽牛

各二錢

右為末用大麥麩四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一盞下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃

葶藶

一兩用糯米和炒半熟米不用

澤瀉

二椒目

兩大戟

巴戟

去心茯苓

去黑皮

芫花

醋五升浸一日炒

甘遂

桑白皮

已上各一兩

右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒物油膩血物

從腳腫根在心加葶藶 從肚腫根在腹加椒目

從陰腫根在胸加澤瀉 從膝腫根在肝加芫花

從面腫根在肺加桑白 從心腫根在肋加雄黃

從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小腸加巴戟

從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在胃加茯苓

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶 海藻 海蛤 芫花醋浸炒 甘遂 大戟

甜葶藶 樟柳根 續隨子 巴戟各等分去心

右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨卧間日再服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石

各等分

右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子十五箇 黃蘘半兩 甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一

日服溫喫不計時候

大戟丸 治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶
背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便溇泄
不能坐卧

大戟

芫花

醋炒

甘遂

海帶

海藻

郁李仁

續隨子

各半兩

樟柳根

一兩已上

八味為末

每料抄

藥末十五錢七分

便入後藥

硃砂

輕粉

各一錢

粉霜

各一錢

水銀砂子

一皂子

大龍腦

半錢 巴豆

二十一箇

生用去皮

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菉豆大每服五
丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實加減

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進

飲食

粉霜 硃砂 海蛤 寒水石燒粉 玄精石 白丁

香 頭白麩各一錢 輕粉三錢 海金砂一錢

右研勻著紙裹數重上使麩裹又紙裹冷酒蘸了桑
柴火燒麩熟為度宿餗餅和丸如桐子大每服三丸

生薑湯下一日三服二日加一九至六日不加即止
以補之妙

苦葶藶丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參

一兩

苦葶藶

四兩

於鍋內紙
上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五
丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前 此藥恐君
子不信試驗之

肉豆蔻丸 治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻 檳榔


輕粉

各一分

黑牽牛

一兩半
取頭末

右為末麩糊為丸如菘豆大每服十九至二十九煎
連翹湯下食後日三服



宣明方論卷八

欽定四庫全書

子部

宣明方論卷

九五至十五

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣吳敬時

欽定四庫全書

宣明方論卷九

金 劉完素 撰

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛痺
肺風寒隨玄府而入腠理開張內外相合先傳肺而入
遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉

中介介如梗壯甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸

治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡

述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓

去皮 天南星

薄荷葉

各半兩

半夏

乾

生薑

白礬

生

寒水石

各一

兩

蛤粉

一

藿香葉

一

分

右為末麩糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸

治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏

生薑製

瓜蒌

杏仁

去皮尖

麻黃

白礬

枯

款冬

花

各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如梧子大每服二十九

煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮

甘草

炙

葛根

各一兩

厚朴

半兩

右件為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六分去滓食前服顯仁丸仙朮芎散大人參半夏丸

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥

解肌熱止咳嗽

橘皮

半兩

半夏

二錢

半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎
至七分去滓溫服

知母茯苓湯 治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

茯苓

皮去

甘草

兩各一

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

洗七次

柴胡

白朮

款冬花

桔梗

麥

門冬

黃芩

兩半

川芎

三錢

阿膠

三錢

炒

右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分

去滓稍熱服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭
疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮 甘

草各一兩 白薑半兩

右為末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎
至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往
來寒暑

杏仁去皮桔梗

陳皮去白

茯苓去皮

漢防已

白礬

桑白皮各三錢

薄荷葉一錢

甘草二寸

猪牙皂角一錢

錠

右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後溫服

防已丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已

二錢

杏仁

三錢

木香

二錢

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九丸煎桑白皮

湯下如大便悶加葶藶一兩食後服

葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦葶藶

蛤粉

各三錢

桑白皮

山梔子

人參

荊芥穗

薄荷葉

赤茯苓

去皮陳皮

桔梗

杏

仁

甘草

各半兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分

去滓溫服食後

保安半夏丸 治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴咽

乾煩渴大小便澁滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈
氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏

天南星

各半兩

牽牛

一兩

大黃

半兩

黃蘗

一兩

蛤

粉

一兩

巴豆

四箇

右為末水為丸如小豆大每服十九丸五丸溫水下
食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有乾薑一錢
半

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸

潮熱

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母

白朮 川芎 黃耆 紫苑 荆芥 地骨皮

各一

分 茯苓 去皮 黃芩 連翹 大黃 薄荷

各半兩山
梔子同

甘草 桔梗 各一兩 石膏 滑石 寒水石

半兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦

人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉

甘草

錢四

巴豆

燈燒存性

盆硝

各二錢

輕粉

二錢豆

豉

一兩慢火炒

五靈脂

二錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫瀝汁下續後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微煖効心腹急痛溫酒下二丸未効再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或大便流利再服

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰

膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏

甘草

各一兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金

花丸 一名既濟解毒丸

寧神散 治一切痰嗽不已者諸藥無效世傳極驗

御米囊

一觔生醋炒

烏梅

四兩

右為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

賈同知方 御米殼一兩烏梅肉兩依前法服之

康少尹傳 煎烏梅湯尤妙

桂苓白朮丸 治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結

痛悶推進飲食調和藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉痢皆能
開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解酒毒療肺
痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止為度隨證
調之

揀桂 乾生薑各一分茯苓去皮半夏一兩白朮紅皮

去白澤瀉各半
兩

右為末麩糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸日

三服病在膈上食後在下食前在中不計時候或一

法更加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜萋實一枚去
子用穰

右為末以寒食麩和為餅子炙黃為末每服一錢溫

水化乳糖下日三服効乃止

又方 治寒嗽

麻黃

四兩

官桂

一兩

蠶

二錢

右為末以蠶同煎每服一二錢溫服

寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼

四兩

木瓜

三兩

御米殼一處用蜜

二兩水化同炒微黃

五味子

一兩

人參

一兩

皂角

二兩

右為末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

驚甲丸 治吐血咳嗽神効

鱉甲

一箇九肋者醋炙黃

柴胡

一兩酒浸一宿

杏仁

一兩童子小便浸炒

甘遂

一兩

人參

半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十丸至十五丸煎

生薑湯下

又方用厚朴

一兩生薑製

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏

一兩甘草

半兩

右為末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下

人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬

天南星

半夏

各半兩

甘草

二錢半炙

人參

二錢赤

小豆

四十粒

杏仁

四十粒

猪牙皂角

一錢

右為末用多年小米一升熬粥和丸如桐子大每服十五丸炒蘿蔔子湯臨卧下

仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松

花膏下過多服此藥無不効

人參

沙參

玄參

紫團參

丹參

白朮

牡蠣 知母

甘草 各二兩

蛤蚧

一對頭尾全用河水淨洗文武火酥

炙黃色

右為末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

松花膏 治三二十年勞嗽預九月間宣利一切痰涎肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘

草 蒼朮 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿

公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏半兩洗 葶藶水研成膏 杏仁各半兩炒研成膏 朱砂 五靈

脂各一兩微炒

右為末更研勻生薑汁煮麩糊為丸如桐子大每服

十五丸生薑湯下

大百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧

一對
蜜炙

元州鱉甲

一箇去
裙醋炙

附子

一人參
兩

柴胡

川乾薑

白茯苓

去皮

白朮

茴香

青皮

去白
杏仁

去皮

知母

貝母

陳皮

去白官桂

甘草

炙半夏

生薑
製

蒼朮

湯浸各一兩蘇
木龍膽各半兩

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵

煎

小百勞散 治勞喘嗽不已自汗者

御米殼

不拘多少炒

右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子

九兩

良薑

一兩半

紅皮

去白

茴香

炒各一兩

乾薑

兩半甘

草七兩 鹽一斤

炙炒

右為末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米殼

蜜炒一兩

人參

陳皮

去白甘草

炙一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

勞門

白朮黃耆散 治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少肌

瘦昏昧

白朮

黃耆

當歸

黃芩

去皮

芍藥

各半

石膏

甘草

各二兩

茯苓

寒水石

各一兩

官桂

一分

人參

川

芎

各三分

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

一日三服

人參白朮湯方 在消渴門第一方是也

此乃為同不復錄耳

黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目

黃連

好者不拘多少

右為末酒麩糊為丸如小豆大每服二十九丸溫水下

不計時候日三服

必効散 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不已

川烏頭

生一兩

天南星

生半兩

右為末每服二錢蘿菈八塊如母指大以水煮熟去滓食後服嚼

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不

調月水過多喘嗽者

當歸 芍藥 川芎 白朮 染槐子 黃藥子

各半 生地黄 甘草 茯苓 去皮 黃芩 白龍骨 各一兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食前
紫菀散 治勞體熱心寒脉滑短咳嗽婦人多有此疾
口乾眼澁骨痠短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開發玄
府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通澁滯和榮衛順

三焦兼服人參白朮湯

紫菀 桑白皮 桔梗 續斷 甘草 五味子

各一兩 赤小豆合

右為末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同煎至七分溫服去滓

枳實飲子 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣

枳殼 一兩 吳半夏

一兩湯洗七次以生薑汁浸三日火炒黃色用半夏

紅芍藥

柴胡

各一兩

黃芩

半一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至
八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續
服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通

桃仁

二兩湯洗火炒

川大黃

川朴硝

各二兩

螻蟲

一兩去翅頭足

右為末用醋五升入金銀鐺內以慢火熬成膏可丸
如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午
際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣未再服候鮮紅

即住服

盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急

款冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂

甘草 白礬 佛耳草

各等分

右為末每服一錢竹筒子吸喫日三服立效

焚香透膈散 治一切勞咳嗽壅滯胸膈痞滿

雄黃 佛耳草 鵝管石 款冬花

各等分

右為末每服用藥一錢安在香爐子上焚著以開口

吸烟在喉中立効

鴛粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者

御米殼

一兩用
蜜炒

烏梅肉

揀人參

呵子肉

葶

蔗 桑白皮

各半
兩

右為細末每服二三錢百沸湯潑臨卧調下

新添三黃丸 治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚者

大黃 黃芩

黃連

各等
分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二三十丸加至五

十九生薑湯下不計時候日三服妙

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩讞語
聲沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不思飲食白日閒睡
夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃頻發喘咳遍
身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾拘急發寒熱五心
煩燥唇乾多渴胸膈不利喉咽噎塞疔羸瘦弱經曰脉
大為勞宜服此藥

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮 地

骨皮

丁香皮

牡丹皮

棕蔕皮

已上諸藥全燒為灰末用

十大錢秤

當歸

一兩

木香

紅芍藥

半兩

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同煎至七分溫服如婦人血臟臍下冷痛似刀攪遍身腫滿室女經脉不通用斑猫一兩大黃一兩炒剉二味為末用黃狗膽汁以溫酒送下一錢如臍下痛止心間痰未止不服二味

宣明方論卷九

欽定四庫全書

宣明方論卷十

金 劉完素 撰

燥門

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致
金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液
故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也

又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯渴
又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液玄腑閉塞不能浸
潤金受火鬱不能發聲

經云肺主聲

肢痛痠戾者風熱濕相

致而遂以偏枯語音澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液
而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注
多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皺揭屬於燥也 又如

胃膈瘴熱煩滿饑不欲食或瘴成消中善食而瘦或燥
熱鬱甚而成消渴多飲而數小便

或因熱病或恣酒飲
誤服熱藥以致脾胃

真陰陽損虛
肝心衰弱也

狂陽火燥其三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行也周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴日夜狂飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止渴徒注為小便多出俗未明妄為下焦虛冷誤人多矣 又如周身熱燥鬱故變為雀目或內障癰疽瘡瘍上為咳嗽喘下為痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化者變為水腫濕脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者為消腎也此為三消病也消渴消中消腎經意

但皆熱之所致也

人參白朮湯 治胃膈痺熱煩滿饑不欲食痺成為消
中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療
一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積
毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產
後煩渴氣液不得宣通

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子

荊芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉

各半兩

茯苓

皮連翹

瓜蒌根

乾葛

各一兩

甘草

三兩

藿香葉

青木香

官桂

各一分

石膏

四兩

寒水石

二兩

滑石

半斤

右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑

三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢

得臟腑流利取効如常服以意加減兼服

消痞丸散以散腸胃

結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩

黃丹

漢防已

括萎實

各等分

右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進三二服即止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參三錢 白朮 澤瀉 瓜蒌 桔梗 梔子 連

翹各半兩 葛根 黃芩 大黃 薄荷 白茯苓各一兩

甘草一兩半 石膏二兩 滑石 寒水石各三兩

右為末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸

大黃甘草飲子 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升

先煮三沸出
淘苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

大麓者四
兩長四指

碎打

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水
少候大豆軟盛大盆中故冷令病人食豆渴食豆湯
無時停止腑臟自然清潤如渴尚不止再服前藥不
三五日自愈

痢門

總論

夫痢者五臟窘毒結而不散或生冷物或冒寒暑失饑不能開發又傷冷熱等食更或服暖藥過鬱化成利自古人三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡癩初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃者乃熱青利是寒太素曰五泄有溇泄鶩泄殄泄濡泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者

受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癰閉淋痛

利小便偏主石淋

乃服金石熱藥多待為砂石從小便淋出者也

腸胃中積聚

寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消蓄水止渴

寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五藏大養脾胃之氣

此腎水之藏非為王之府也理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一

切虛損主癩瘡驚悸

其季切驚動貌

健忘止煩滿短氣藏傷咳

嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋
骨通經脉和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐
勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏
延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚
恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍

身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血
衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也
惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石

六兩 甘草一兩 炙

右為末每服三錢

許

蜜少溫水調下

無蜜亦得

日三服欲冷

飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎葱豉湯調下四

錢

每服水一盞葱白五十箇豉五十粒煮取汁一盞調服

併合服効為度此藥

是寒涼解散鬱熱苦澀甚不解多服此藥無害但有

益而無損俗惡性寒兼喜得之賤物而不明素問造化之理故不能體會神驗之言而多不用焉若以隨

證用之知此方之仙藥也不可闕之

傷寒邪熱太甚照用分兩而不

可減省往往投以此藥則汗出自愈裏熱便得宣通而愈若半在裏半在表可和解而不可發汗吐下者

頓服少許多愈亦獲小效是解散怫鬱邪熱甚者小加減

涼膈散

和解為主故男婦皆可服之不

加蒼朮末

二分同蔥豉煎湯調服甚良或孕婦不宜服

滑石麻黃桂枝

要

汗當即用甘草兩蒼朮

二兩同為末每服二錢水一盞半更加入

葱白

五

五十枚同煎至六分去滓

逼毒散

非孕婦可服

太白散

加

麻黃

二兩去節如法煎服世云

神白散

或逼毒散與加

麻黃蒼朮

各等分去節秤

濟衆云青龍散

或青龍散欲更加入

滑石與蒼朮

二倍最為發汗

之妙藥也

唯正可汗者即用此服之則轉加利也名為

大通毒散

或解利兩感同

更兼煎

涼膈散

調下

益元散

四錢或下乳用猪肉麩羹或酒之類調下四錢不計時候

日三服宜食肉麩羹粥

催產

用溫油漿調下三錢併二三服以產為度或死胎不下者煎

三

一承氣湯

一服調下五錢須臾更頻用溫油漿調服前後俱下胎可活產母也凡難產或死胎

不下皆由風熱燥溢緊欬結滯不能舒緩是故產戶不得自然開也其藥力至則熱結頓開而產矣慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸

證由不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見渴甚者不少飲水本為善心為害多矣豈知治病之道俱在臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥之常多用雖為劫至大俗以病異藥同將為妄行反招侮慢今以若黃丹

令桃仁色紅玉散若加青黛令輕粉碧色名碧玉散若加薄荷葉

末一分 雞蘇散主療並同但以遭愚俗之妄侮慢耳

玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸方不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣得宣行者宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中虛水腫腹脹兼

療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉者勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

醋麩炒

大戟

各半

兩牽牛

四兩取末二兩

已上同細末

輕粉

三分

青黛

一兩

右為末勻水丸小豆大初服十九每服加十九空腹
日午臨卧三服以快利為度後常服十五二十九數
日後得食久病未痊除者再加取利後却常服以
意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米或麻
子大退驚疳熱積不下者須常服十九

阿膠梅連丸

治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠

淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉

去核炒

黃蘗

剉黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

半兩各等

分

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食

前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂肥諸物也

牛黃神金丸

治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白

諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚疳積熱疰

癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉

粉霜

硃砂

以上別研

雄黃

研

朱砂

信砒

巴豆

去皮各一錢

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱砂信砒再
研下丹粉研勻別研芭豆爛為油與前藥研勻近火
上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新
水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調甘露
散是桂苓甘露飲或益元散亦得

芍藥藥皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿血
並宜服之

芍藥

黃蘗

各一兩

當歸

黃連

各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下三四十九每日兼夜
五六服忌油膩脂肥發熱等物

二勝丸 治瀉痢虛損問久新者加減服之

淡豉

二兩

白朮

三錢

甘草

五分

右同杵為膏丸如桐子大每服三丸或四丸以米飲湯

下如未愈及赤白痢腹滿脇痛者加一二九

杏仁丸 治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重諸證

杏仁

四十
九箇

芭豆

四十九
箇去皮

右以藥同燒存性研細如泥用蠟鎔和為丸如桐子
大每服一二九煎大黃湯間日下之

白朮聖散子 治一切瀉痢久不瘥并滯積疼腫者亦

治

御米殼

二兩
蜜炒

當歸

肉豆蔻

縮砂

石榴皮

訶子 乾薑炮 陳皮 白朮 甘草 芍藥各等分

右為細末每服二錢水一大盞入乳汁少許去滓服
勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脘浮滑赤白疼痛不
已者微小者立止

芭豆皮

楮實葉

同燒存
性等分

右為末鎔蠟丸如棗豆大每服三四丸米飲湯下

大聖金真散 治一切寒熱赤白瀉痢諸證

御米殼

半斤
炒

甘草

一兩
炙

乾薑

當歸

各三
錢

醋石榴

皮一兩陳皮去白茯苓各五錢

右為末每服二錢水一盞小兒半盞每一盞煎至七

分食前忌油膩生冷毒物等

車前子散名一斷痢散 治一切痢不止者

車前子不以多少炒香

右為末每服二錢米飲調下食前空心服

象骨散 治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消黃瘦疼酸
食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重一切後重裏急夜

起頻併不思飲食皆可治之

象骨

四兩炒

訶子

取肉二兩

肉豆蔻

一兩

枳殼

一兩

乾薑

半兩

右為末每服三錢水一盞半煎至八分微冷溫服食

前日三服

海蛤玉粉散 治血痢解藏中積毒熱

海蛤

二十箇炒焦研末

右為末每服二錢入蜜少許冷水調服不拘時候

宣明方論卷十

欽定四庫全書

宣明方論卷十一

金 劉完素 撰

婦人門

總論

素問曰目得血而能視耳得血而能聽指得血而能攝
掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑得血
而能氣然血所通流則氣亦然也氣血宣行其中神自

清利而應機能用矣

素問氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血藏為基本也夫婦人之病手太陽足少陰小腸心之經絡為裏表起自任衝之脉於經脉之下以上毛際循腹裏關元上至咽喉頤循面目過帶脉貫臍而止以婦人月水一月一來如期謂之月信其不來則風熱傷於經血故血在內不通或內受邪熱脾胃虛損不能飲食食既不克榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤或大腸虛變為下痢

流入闕元致絕子嗣為子藏冷虛勞損而病帶下起於胞內則夫帶下之造化但分經絡標本殊異為病之本氣也其病所發正在過帶脉之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也法曰頭目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小便秘澁滯脉實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多有之為病寒豈能然素問亢則害承迺制謂亢過極而反兼勝己之化制其甚也則如火煉金熱極則反化為水及六月熱極則物反出液而濕

潤林木流津故肝熱則出泣心熱則出汗脾熱則出涎
肺熱則出涕腎熱甚則唾 大凡俗論已煎熱湯煮極
則沸溢及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脉濕
熱甚者津液涌而溢已為帶下見俗醫白帶下者但依
方論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣
通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散 治徧身燥濕相搏玄府緻密遂令佞悸
發渴飲食減少不為肌膚

人參

三錢

白朮

七錢

薄荷

半兩

縮砂仁

三錢

生地黃

三錢

茯苓

一兩

甘草

去皮

黃芩

各半兩

滑石

一錢

藿香

三錢

石膏

一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

日進二三服

白朮湯 治妊娠血液虛衰痿弱難以運動氣滯痺麻

榮衛不能通宣常服養液潤燥開通結滯令血昌盛

白朮 三 寒水石 當歸 黃芩 芍藥 人參

石膏 乾葛 防風 乾薑 藿香 甘草 茯苓

苓一兩木香

崔宣武方

用白朮一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至五分去滓溫服食前日三服

二氣湯 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦恒不思美食有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃

四兩別為末醋一升慢火熬成膏子

當歸

二兩

白芍藥

二兩

右為末以膏子和丸如桐子大每服二十九淡醋湯

下食前日進三服

如月水不通加入

乾漆

三錢炒焦用

沒藥

兩半

砂

三錢研

官桂

二錢

斑猫

三錢

去頭足炒熟用本草云

此用熬不可生用則吐瀉

用本

草云

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多及帶下淋瀝無

問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡露胎痛動不安及大小兒痢瀉並宜服之

當歸

芍藥

黃連

染槐子

艾葉

炒各半兩

龍骨

黃蘗

各一兩

茯苓

半兩

木香

一分

右末滴水為丸如小豆大温米飲下三四十丸食前

日三四服

當歸人參散

治產後虛損痿弱難以運動疼痛胸滿

不思飲食

當歸

白朮

黃芩

芍藥

大黃

茯苓

去皮陳

皮

各半兩

人參

黃耆

剉

川芎

厚朴

去皮薑製

官桂肉

各三錢

甘草

一兩枳殼

四錢去穢炒

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓

不計時候溫服如大便閉以此散下和中丸

增損四物湯 治月經不調心腹疼痛補血臟溫經注
顏

川芎 當歸 芍藥 熟地黄 白朮 牡丹皮

各半 地骨皮 一兩

右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服食前
當歸川芎散 治風壅頭目昏眩痛悶筋脉拘倦肢體
麻痺保護胎氣調和榮衛

當歸

川芎

各半兩

甘草

二兩半

黃芩

四兩

薄荷

一兩

縮砂

仁分

右為末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進三服
辰砂大紅丸 治產後寒熱運悶血氣塊硬疼痛不止

朱砂

一兩一半入藥一半為衣

附子

炮

沒藥

半兩

海馬

半錢

乳香

茯苓

肉桂

玄胡

薑黃

礪砂

各半兩

斑猫

一分

生地黃

一兩

右為末酒煮麩糊為丸如酸棗大每服一丸煎當歸酒下放溫經水不行煎紅花酒下

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨

炒燒綿灰

血餘灰

汗脂者
各等分

右為細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢

沒藥丹 治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急痛
或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱煩渴喘
急悶亂肢體疼倦大小人心腹暴痛孕婦自利惡物過
多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可強行宜調氣養血
細詳證用

沒藥一錢當歸

大黃

一兩

牽牛

二兩

輕粉

一錢官桂

已上

同研末 硃砂一錢 同研

右研勻醋麩糊為丸如小豆大每服五丸至十九溫水下以快利取積病下為度雖利後病未痊者後再加取利止心腹急痛煎乳香下未止取大便利

黃藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參

白朮

知母

石膏

各一兩

川芎

桔梗

各一分

甘草

一兩紫苑

槐花子

柴胡

各一分

右為麤末抄三錢水一盞煎至七分濾汁溫服食前

但一服

大延胡索散

治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶

或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索

當歸

赤芍藥

京三稜

川楝子

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎

各一分

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草

一兩

檳榔

一錢

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方煎服得利尤好

枳實檳榔丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實

檳榔

黃連

黃蘗

黃芩

當歸

阿

膠

灰炒
細研

木香

各半
兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時

候日進三服

軟金花丸 治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經病

刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗者兼治

血積食積

當歸

半兩
焙

乾漆

二錢
生

輕粉

斑猫

生全用
為末

硃砂

粉霜

各一錢

芭豆

二錢
去油

右為末同研細棗肉為膏旋丸如菉豆大每服一九
新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃

紅花

各二兩

蝨蟲

十箇去翅足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五
七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮

黃芩

各等分

右為末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍
溫服

海蛤丸 治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼痛
寒熱口乾舌澁不思飲食

海蛤 半夏 芫花醋炒紅娘子去翅訶子炒玄胡

索 川棟子麩裏煨 茴香炒各乳香三錢 砂半 硃兩

砂半入藥 沒藥各一 當歸一兩
半為衣 兩研

右為末醋煮麩糊為丸如小豆大每服五丸至十丸

醋湯下量人病虛實加減

烏金散 治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子 肉桂 蒲黃 當歸 蝨蟲 血餘灰

水蛭 鯉魚灰 木香 青皮 皂角 大者灸各半兩 芍

藥 半兩 芫花 三兩 醋浸 芑豆 一錢 出油 硃砂 少許 棕皮灰 紅花

一兩 川烏頭 半兩

右為末每服半錢加至一錢煎生薑湯調下空心食

前忌油膩物

伏龍肝散 治婦人血崩不止或結作片者

芎藭

一兩

生地黄

一分

阿膠

八錢

當歸

一兩

續斷

一分

地榆

刺薊根

一兩

伏龍肝

七錢

青竹茹

八錢

右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服
不計時候後服補藥

阿膠丸

阿膠

鱉甲

六分

續斷

五分

龍骨

一兩

芎藭

六分

地膽

四分

鹿茸

五分

烏魚骨

八錢

丹參

六錢

龜甲

一錢

右為末醋麩糊為丸如桐子大每服三十九丸艾湯下
日進三四服

麝香杏仁散 治婦人陰瘡

麝香

少許杏仁燒存性不以多少

右為細末如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿繫口
臨上藥灸熱安在陰內立愈

硃砂斑猫丸 治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無

問久新

皂角末

錢二

芭豆

四箇
去油

硃砂

錢一

礪砂

一皂子
大塊

乾蝎

一箇

全

斑猫

十箇

紅娘子

五箇

水蛭

三箇

右為細末蜜和丸分作十五丸每服一九至二丸三
丸溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治
之或大便或小便不多出也

宣明方論卷十一

欽定四庫全書

宣明方論卷十二

金 劉完素 撰

補養門

補養寒論

素問云諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰也至者為極也少陰者冬脉所旺居北而屬水為寒為歸藏為周密寒中收引拘縮寒之用也其病上下所生

水澄徹冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化吐利清冷為病則如天氣寒而水自清也

素問云太陽受寒血凝為痲太陰受寒氣聚為疝但脉急而寒之象也急主於痛故緊急也又內經云數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒脉當遲緩寒毒內鬱洪數為熱所養心之脉也寒氣生清水清就於濕故以下利清白此乃腸胃寒化物失常熱則壅澁不通寒勝則火衰火衰金旺吐利腥穢腥者金肺之屬也熱則喜

酸寒則水腥只如四肢逆冷堅痞腹滿屈伸不便禁固
戰慄謂陰水主之舒倦不便診其脉沉伏而遲病之證
也若身涼不渴而寒蹇足而卧惡聞人聲不欲言皆陰
證也陰陽停則和偏則病如陽氣暴絕陰氣獨勝則為
寒證陰氣暴絕陽氣獨勝則為熱證

經曰陽盛陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽實
外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽當涼
膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆湯主之

論曰

大凡治病必求標本受先者為本次者為標此為兼證故知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行也本病相傳先以治其急六氣為本三陰三陽為標故病氣為本受病經絡藏府謂之標也

補養類

防風當歸飲子 治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚陽陰虛內寒陰實內熱上實下虛怯弱不耐或表熱而身

熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進
退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒裏多則發
熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏畜熱極
深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴
者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴
而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極甚陽
氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者
或熱極悶寒不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒

者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切
風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳
鳴及聾咽嗑不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽
心脇鬱痞腸胃燥澁小便溺淋悶或是皮膚瘙癢手足
麻痺又或筋脉拘急肢體倦怠或渾身肌肉跳動心忪
驚悸或口眼喎斜語言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及
或腸胃燥熱怫鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善
飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過

多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也
無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順
飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功
驗自可知矣

當歸 大黃 柴胡 人參 黃芩 甘草 炙 芍

藥 各一兩 滑石 六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至

七分去渣溫服下補校

此方未為至當恐當時傳寫之誤

雙芝丸 治補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服注顏不老

熟乾地黄

焙取末

石斛

去根酒炙

五味子

焙

黃耆

剉

肉苁蓉

蓉

酒浸

牛膝

酒浸

杜仲

蜜水浸炮

兔絲子

酒浸三日炒

麋鹿角霜

半斤沉香

三錢

麝香

二錢研

人參

白茯苓

去皮

覆盆子

乾山藥

木瓜

天麻

秦艸

已上一兩

薏苡仁

二兩

炒

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九至三四十

丸溫酒下鹽湯米飲亦可

凡年五十歲已上加

入黑附子

以青鹽湯

蕪鹿角

一大對去頂三指

硫黃

半斤

以上用此油釜中以水

同煮令微沸勿太急甚水耗只旋添溫水須用水以備添也煉令角膠汁出盡其角如霜以手捻如膩粉乃盛之取用勿令穢污也

內固丹 治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨勁健渾如壯士

肉蓯蓉

酒浸茵香

炒一兩

破故紙

胡蘆巴

炒

巴戟

心去

黑附子

炮

川棟子

胡桃仁

各四兩
麩炒

右為末研桃仁為膏餘藥末和勻酒麩糊為丸如桐

子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食前虛者加

至五七十九丸此藥明目補腎烏鬚進美食空心

大補丸 治男子脾腎不足不問久新者

陳莖子

陳蘿蔔子

已上
炒

麩仁

去皮各
半兩

川山甲

七
片

用酒
炙麩香
少許

右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒送下

食前空心

蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧一對 乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香

各一錢 川山甲二錢

右為細末每服一錢好溫酒調下空心食前

金鎖丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨水飛 兔絲子一兩 破故紙 韭子 澤瀉 牡蠣

各半兩 麝香少許

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十九丸溫酒下
空心食前日三服

調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮

紅皮

各一兩

大黃

一兩

牽牛

三兩

右為細末滴水和丸如桐子大每服三二十九丸溫水

下空心食前

水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石

研

木香

乳香

研

青鹽

各一分

茴香

炒

骨碎

補炒杜仲各半兩去皮生薑炙絲盡白龍骨一兩緊者槌碎絹袋盛大豆蒸熟取

出焙乾研黃戍腎一對酒一升煮熱切作片子焙入白茯苓一兩與腎為末

右為細末酒麩糊和丸如皂子大每服二丸溫酒下
空心忌房室

和氣地黃湯 治沉積氣結不散調養榮衛補順陰陽
常服以代湯茶酒果

木香一揀桂皮去茯苓皮去白芥子各一錢炒香白朮 乾

山藥 川芎 當歸各一分焙桂花 縮砂仁各半錢甘

草半兩
灸

右為細末入麝香少許研勻用數重油紙或甃器內
密封起每用蜜二斤餵飴一斤溫好甜水五升化勻
開抄前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香焦槌碎濕
地黄根計切長寸約取汁半盞溫服

白朮調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛

上不所出水液澄澈清冷穀不化小便清白不澁身涼
不渴本末不經有見陽熱證其脉遲者是也此因飲食
冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相擊而反陽
氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為

冷當以脉證別之夫濕熱上瀉常見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉也當以標本之不可治或熱證誤服此白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣一通而愈別無加害無問寒熱久新並宜服之或有口瘡目疾孕婦等吐瀉者以畏乾薑官桂不服

白朮

茯苓

去皮紅皮

去白澤瀉

各半

乾薑

炮

官桂

去皮

縮砂仁

藿香

各一分

甘草

一兩

右為末白湯化蜜少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十九名白朮調中丸小兒一服分三服

人參白朮散

此方證同調中湯治法

人參 白朮 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤

瀉 滑石 藿香

各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分溫服妊婦加蒼
朮三五片熱服

白朮散 治傷寒下後餘熱以藥下之大過胃中虛熱
飲水無力也當生胃中津液多服此藥

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草

劉炎

藿香葉

乾葛

劉各二兩

右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如
飲水者多煎與之無時也

丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子

一兩

母丁香

四十

生薑

半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑
汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附
子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為
度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢米

湯一盞調下日進三服

何首烏丸

治男子元藏虛損髮白再黑填精

何首烏

斤半肉苁蓉

六兩牛膝

四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏甑內蒸棗軟用切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十九丸即止却減至數効如神妙

煨腎丸

治男子腰膝疼夜多小便者

川棟子 馬棟花 破故紙 胡蘆巴 茴香各炒

分等

右除茴香外四味酒浸同為末煮麩糊為丸如桐子
大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

神仙楮實丸 治積冷氣衝心胸及背有蛻蟲疼痛痔
瘻瘰癧氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化上逆氣奔
於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上氣咳嗽眼
花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩

男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩
利陽道衰弱婦人月水不通小便冷痛赤白帶下一切
冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子

一升淘去
泥微炒

官桂

四兩
去皮

牛膝

半斤酒
浸三日

乾薑

三兩

炮

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服二十九丸温酒空
心食前鹽湯亦得

補中丸 治一切氣疾心腹疴痛嘔吐氣逆不思美食

厚朴

生薑製香

乾薑

炮

陳皮

去白

白茯苓

去皮

甘草

炙紫各等分

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化

下細嚼亦得

萆澄茄丸

治中焦痞塞氣逆上攻心腹疴痛吐逆下

痢美飲食

萆澄茄

半兩

良薑

二兩

神麴

炒

青皮

去白

官桂

去皮各一兩

阿

魏

半兩醋麴裹煨熟

右為末醋麴糊為丸如桐子大每服二十九丸生薑湯

下不計時候

宣明方論卷十二