

四庫全書

子部

欽定四庫全書

宣明方論卷十三

金 劉完素 撰

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽疹瘡瘤氣結核怫鬱甚者皆熱
五臟不和九竅不通六府不和留結為癰近於火氣微
熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也

按之而痛止或按之而無益或喘痛動應手或與心背
相引而痛或脇肋與少腹相引而痛或腹痛或引陰股
宿昔而成積或卒然而痛死不知人而少間復生或痛
而閉不通者諸痛各不同形經日寒氣客於脉外則脉
寒脉寒則蹇縮蹇縮則脉絀音督脉絀急則外引小腹衛
氣不得通流故卒然而痛得炆則痛止寒氣客於經脉
之中相薄則脉滿滿則血氣亂故痛而不可按寒氣客
於腸胃之間膜原之下血不得散小腹急引故痛按之

血氣散痛乃止也脇肋痛者寒氣客於厥陰之絡脉也
背與心相引痛者寒氣客於背俞之脉注於心相引痛
寒氣客於陰股血泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒
氣客於五臟厥逆上壅陰氣竭陽氣未入故卒然痛死
氣復反則生矣視其五色黃赤為熱白青則為寒青黑
為痛經日感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣
骨痛熱則骨弛肉消但痛痒瘡瘍癰痛腫血聚者皆屬
心火熱也不可一例傷寒凡治痛者先察本次明經絡

皮部虛實用藥無悞矣

神砂一粒丹 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩 鬱金 橘紅 等附子停用

右為末醋麪糊為丸如酸棗大以朱砂為衣每服一
丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

神聖代鍼散

乳香 沒藥 當歸 香白芷 川芎 羌青

一兩去
足翅

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神効只是要詳疾證用藥

茴香丸 治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者

茴香 炒 良薑

官桂

各半兩

蒼朮

一兩 汁浸

右為末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十九生薑湯
止痛溫酒下空心食後

赴痛丸 治一切走注疼痛婦人經脉住滯水腫腹脹

甘遂 大戟 芫花 黑牽牛

各等分

右為末以蕎麥同末和作餅子扞切為棋子煮熟服
之得利為度每服一錢加減相虛實

六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金鑰
匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走疰疼痛

大黃

一兩紙
裏煨

白牽牛

半兩
生

黑牽牛

微炒

甘遂

各半
兩

檳

榔

三錢
生

輕粉

一錢

右為細末每服一錢密水調下服量虛實加減

定痛丸

治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先

整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢然後服藥

大効

乳香

一分 川椒

當歸

沒藥

赤芍藥

川芎

自然銅

右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者
先用竹夾夾定三五日依舊小可與服

香穀散 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人

事

舶上茴香

用鹽炒

枳殼

各一兩

沒藥

半兩

右為末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服

金鍼丸

亦名陸神丸

治陽絕痞氣心腹不忍者

丁香 木香 乳香 阿魏 輕粉 骨碎補

去毛

檳榔 官桂 桂心 芭豆去皮杏仁去皮 不灰木

肉豆蔻

陽起石

硃砂

各等分

右為細末水麪糊為丸如小豆大每服一九針穿作
孔子小油內滾過燈焰內燎遍於油中蘸死嚼生薑
下不計時候日三服虛實加減

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎嘯

草烏頭

五靈脂

各一觔

木鼈子

四兩

白膠香

半觔地龍

四兩去土炒

細墨

一兩

乳香

一兩

當歸

二兩焙

沒藥

二兩

麝香

一錢

右為末再研一千下糯米麩糊和丸如桐子大每服
一九至二九溫酒下喫藥罷遍身微汗立驗

沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥

乳香
別研

乳香

各三
錢

川山甲

五錢
炙

木鼈子

四錢

右為細末每服半錢一錢酒大半盞同煎溫服不計

時候

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑踈風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澁而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔

素問云因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸癖為痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核

甚者而變成瘰也五臟切宜保養勿令受邪

香殼丸 治濕熱內甚因而飽食腸癖成痔久而成瘰

速服悉愈之

木香

黃蘗

各三錢

枳殼

去穰炒

厚朴

各半兩

黃連

一兩

皮

一箇燒

當歸

四錢

荊芥穗

三錢

右為末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸溫水食

前日三服

槿藤子丸

治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而不

治乃變成瘻

黃耆 枳實 槐花 荆芥穗 鳳眼草

已上各
二兩

槿藤子

一對
炙

皂子

三百
箇炙

右為細末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸空心
酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血物等

烏荊丸 治腸風痔疾大腸闕澁

川烏頭

二兩
炮

荆芥穗

四兩

右為末醋麪糊為丸每服二三十丸如桐子大溫水

下日三服

黃耆葛花丸

治腸中久積熱痔瘻下血疼痛

黃耆

葛花

黃赤小豆花

各一兩

白芍

赤芍藥

黃芩

當歸

各三分

丹皮

一兩 檳榔

白蒺梨

皂

角子仁

炒各半兩

生地黄

焙一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九至三十九

煎桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得

黃連散

治腸風下血疼痛不止

鷄冠花 黃連 貫衆 川大黃 烏梅 各一兩 甘

草

三分

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不計時候

乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻無問久新

宣黃連

白礬

各一兩

穀精草

半兩

石榴

一箇用刀子割下蓋子裏

面取子三停一停次將黃連白礬碎內入石榴內用元蓋子合用

右以濕紙一張裹了後用膠渥拍作餅子裹石榴以炭火燒通赤為度取出去渥紙次將穀精草於鈹子

內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下
日三服

木香厚朴湯 治痔瘻脫肛腸胃間冷腹脇虛脹不思飲食

木香 桂心 桃仁 陳皮 厚朴各一兩 肉豆蔻

赤石脂各半兩 皂角子三兩去皮 大附三分

右為末每服二錢溫粥飲調下食前

瘧門

瘧疾總論

素問云瘧瘧皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽
上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頷
此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開
得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣晝行陽夜行陰
氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也 其有
間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭

不得出是以間日作也其作晏與早者邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先客於脊背每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入則病作晏也

大寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣煩寃手足熱欲吐名曰苦瘧有餘則瀉不足則補熱為有

餘寒為不足已得火不能溫熱已冰水不涼氣陰勝併於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱故瘧者陰陽風寒虛實邪氣不常之所作也

辟邪丹 治嵐嶂鬼瘧食瘧併月頻日者

菘豆

雄黑豆

各四十粒

信砒

半錢別研

黃丹

一錢為衣

硃砂

二粒

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒已用東南桃心取七枝研汁將并花水早晨日欲

出不出向日吞之醋湯亦得已發日服

斬邪丹 治諸般瘧疾無時不止者

菜豆

小豆

三十粒口退皮再入

硃砂

信砒

各一錢

右為末同研細滴水和丸勻分作十九每服一九已
早晨服夜間於北斗下香水獻至早晨用新倒流水

送下

斷魔如聖丹

信砒

錢一 蜘蛛

大者三箇

雄黑豆

四十粒

右為末滴水和丸如豌豆大如來日發於今晚夜北
斗下獻於早晨已紙裹於耳內扎一九立見愈神聖
一粒可醫三人

辰砂丸 治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砒

甘草

錢各一

硃砂

錢二 大豆 四十粒

右為末滴水和丸勻分作四十九服發日早晨日欲
出煎桃心湯下忌熱物

瘧神丹 治諸般瘧疾

信砒一兩雄黃一錢

右以於五月重五日用饅子尖拌勻研三千下日未
出不令鷄犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東
冷水下一丸

趨鬼丹 治一切瘧疾神効

信砒一錢大豆七錢雄黃 輕粉 荷葉各半錢甘草一寸

右為末滴水為丸如小豆大重午日未出不見鷄犬
婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日

服忌熱物

宣明方論卷十三

欽定四庫全書

宣明方論卷十四

金 劉完素 撰

眼目門

眼科總論

素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之
經絡所主肝臟受虛而即補腎實而即瀉心 夫人之
眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能別辯賢愚

天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣貫五輪外
應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊衝火炎上行
故攻目昏滲澀疼痛赤絲皆發榮衛實則能視榮衛虛
則昏暗凡人多食熱物或嗜五辛坐濕當風凌寒冒暑
將息失度皆喪目之源也

黃連膏 治一切眼目痰肉攀睛風痒淚落不止

朴硝 一斗以水半斗淘淨去土陰乾用 黃連 半 白丁香 五升以水一斗淘淨

去土攪細用

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮
牙者取出挖乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連
細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加蜜妙點之效矣
滌昏膏 治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣

好崖蜜

筋一

黃連

兩一

沒藥

兩半

黃丹

一兩

炒紫色

右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠
更入沒藥末同熬數沸瀝去滓洗甚妙後更用通天
散嚙鼻

通天散 治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目

赤芍藥 川芎 黃連 黃芩 玄胡索 草烏

頭 當歸 乳香

別研各等分

右為細末每服少許紙撚子蘸藥任之鼻嚏神效

神芳散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙

齒悶痛

川芎 鬱金 各二錢 荆芥穗 一分 薄荷葉 一分 盆硝 二錢 紅

豆 一錢已上為細末後入盆硝

右研勻鼻內嚙三兩刺耳力慢加藥病甚者兼夜嚙
之凡熱多風少隨證選用諸藥

金絲膏 治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼或痛

宣黃連

半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸淨經半日許取汁與前汁放別用水

半盞蜜

白礬

一分如無以青鹽代之

山梔子

二錢好者槌碎

與黃連淨同煮五十沸取盡力子
濾去滓與前黃連汁一處入篩藥

右用銀甕器內同熬十餘沸用生絹上細紙數重再

濾過用時常點

白藥子散 治一切疔眼赤爛目生翳膜內外瘡疾并
小兒吐痢

白藥子

一兩 甘草

半兩

右為末用猪肝一葉批開糝藥五錢水一大盞煮熟
食後服

胡黃連散 治一切久新赤目疼痛不能坐卧并大小
人口瘡

胡黃連

檳榔

各半兩

麝香

少許別研

右為細末研細點之如口瘡每服半錢麝香一字勻
口瘡大小貼之忌食魚猪油膩物

碧霞丹 點一切惡眼風赤者

龍腦 麝香 硃砂各二錢 血竭 沒藥 乳香

銅青各一錢 鵬砂三錢

右為末滴水和丸如桐子大每服一九新水化開點
之立效

菩薩散 治遠年近日一切眼疾

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 太陽石

雨餘石 河洛石 礬礦石 雲母石 盧甘

石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 陽

起石 猪牙石 代赭石 碧霞石 烏魚石

青鹽

各一兩

硃砂

半兩

蜜陀僧

一兩

銅青

一兩

黃丹

四兩

麝香

腦子

一錢

輕粉

半錢

鵬砂

三錢

乳香

二錢

雄膽

一兩

白砂

蜜

二兩

右為細末以井花水九大碗熬就作四碗點水內落

下錢許大不散可如散者再熬濾滓過露旋點

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外

氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活 治腦熱 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳 香白芷 清利

頭目 細辛 乾菜子 二味起 蘇子 起拳 川芎 治頭 蒼

木 明目暖 水藏 甘菊花 荆芥穗 治目中 黃芩 洗心 石

膏 二味 藁本 治偏正 甘草 解諸藥毒 各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調

下或茶清或淘米第二遍泔亦得日進三服至十日
漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣

重明散 治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙苓脾

防風 甘草 井泉石 蒼木 各半 丹參 白朮

石決明 草決明 各三分

右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進三
服食後

雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗
淚出羞明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉生風粟或
痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細
小視物不明皆因腎水不能漑濟於肝水此藥久服大
補腎藏添目力

肉苁蓉一兩 牛膝一兩 芭豆一兩 浸一宿
去皮心 菊花二兩 黑附

子青鹽二錢以河水三升 枸杞子二兩 川椒三兩
同煮為度去皮臍一兩 去目

右為末元浸藥酒煮麪糊為丸如桐子大每服十九

空心酒下世人服藥不知多少根源徃徃不效耳

丁香復光丸 治一切遠近目疾

丁香

二錢

巴豆

一錢去皮油

半夏

二兩

烏梅

半兩去核

南鵬砂

三錢

腦子

二盆

硝

半兩縮砂

仁

二錢

甘草

半兩

荆芥穗

二錢

右為末醋煮麪糊為丸如菜豆大每服十九至十五丸米泔下食後日三服

已上諸方係先生親驗可錄

小兒門

小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證為少陰君火暴強直支綆戾裏急筋縮也皆屬風證為厥陰風木大小兒六歲之上為小兒十八歲已上為少年其六歲已下者諸經不載是以乳下櫻兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟腑迺得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘

於心心受邪熱乃發為驚驚不止返為潮搐則為病也
大槩小兒病者純陽熱多冷少故引 素問少陰厥陰
證以小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚
而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱此證
皆謂熱甚而風生 素問驚駭驚愕少陰君火也

小兒脾疳痢瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青為熱證明
矣痢色黃者何為火甚則水衰而脾土旺故痢色黃也
痢色紅赤者為心火熱甚深也痢色黑者為火熱過極

則反兼水化制之故色黑也

五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澁為寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷白不澁身涼不渴脈遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而澁者為之熱證世傳大人小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白便言論為寒證誤矣

向不脈候別之

仲景邪熱不化穀豈為寒

也

大人亦同

小兒方類

龍腦地黃膏 治小兒急慢驚風涎痰上潮心胸天吊
驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病不
已與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃

別搗

甘草

橫文者別搗

麝香

一錢別研

雄黃

水鹿者一別研

生腦子

一錢別研

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油
單裹如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如

小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服

新汲水下大解暑毒如孕婦人常服新生男女永無

疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉二龍腦少水化

下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服立效

分肢散 治小兒卒風大人人口眼喎斜風涎裏心驚癇

天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆

半兩不出油

川大黃

一兩半朴硝兩

右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起

如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒
胃喉驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字
茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒
一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐
瀉不定以葱白湯立止

珍珠丸 治小兒虛中積熱驚癇等疾

巴豆霜 膩粉二錢滑石二錢天南星一錢蝎稍二十箇

續隨子二十四箇粉霜一錢

筒去皮半

右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三九至一九十五歲每服五九至十九點茶湯下荊芥湯亦得虛實加減

牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾

肉桂

鬱金

各一兩

馬牙硝

四兩

甘草

半兩並生

右為末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服半錢五歲已下服一字永無驚疳癩風患服之立效

硃砂丸 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取
驚積

硃砂 天南星 巴豆霜 各一錢

右為末麪糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二
丸或天吊戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈

鬱金散 治小兒急慢驚風等疾

鬱金 一枚 巴豆 七箇去皮
大者 不出油

右研為細末每服一字煎竹葉湯放溫下把藥抄盪

唇上放以湯充下喉咽為妙

澤瀉散 治小兒勦軀膈上壅熱涎潮

澤瀉

一分

蟬殼

全者二

黃明膠

手掌大一

片炙令焦

右為細末每服一大錢溫米湯調下日進二服未愈再服

鎮庭散 治小兒一切驚喘肚脹咳嗽

鬱金

大黃

各半兩

甘草

三錢

輕粉

一錢

右為末每服半錢用薄荷汁硃砂細研冷水以木匙

瀝下

定命散 治小兒天吊驚風不能哭泣

梨蘆 川芎 麝金

各等分

右研為細末鼻中嚙之如哭可醫

金肺散 治小兒諸般喘嗽急驚風神效

錫灰一錢 漢防已二錢 鬱金一錢 砒黃二錢 半夏一錢 夏一錢 湯洗七

次

右為細末每服半錢加一錢小兒加減煎猪肉湯下

日進二服食後

厚朴散 治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴 呵子皮半兩史君子一箇揀丁香十箇茯苓 吳

白朮

青皮

各二錢

甘草

一寸炒

右為末每服一字一歲加減用清米湯下

人參散 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及踈轉後服之

人參

半兩

茯苓

二兩半

牛犀

二錢半

甘草

半兩

乾葛

半兩

桔梗

二錢

半

右為末每服二錢水一大盞入燈心五莖同煎至六
分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減
碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬

半兩研

銅青

一分研

粉霜

輕粉

各一錢

右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多
不定煎葱白湯投之立止效

桃符丸 治小兒風熱

大黃 郁李仁 黃栢 宣連 蔚金 各一分 芭豆

二七箇去皮
出油為霜 輕粉 二錢

右為細末滴水為丸如棗豆大以硃砂為衣每服二
丸用桃符煎湯下看大人小兒加減

宣明方論卷十四

欽定四庫全書

宣明方論卷十五

金 劉完素 撰

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽疹瘡瘤氣結核怫鬱甚者皆熱
五臟不和九竅不通六府不和留結為癰近於火氣微
熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也

人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡
腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風
濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣
客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭
無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核
腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂
虛為寒也正謂熱之微甚也痒者美疾也故火旺於夏
而萬物蕃鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其痒轉甚

者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通
陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其
痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越拂熱
內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉果
菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛者水之化也
癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡
也疹浮而小癩疹也瘤氣赤瘤丹燥熱勝氣火之色也
如意散 治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸

牛蒡子

荆芥

各一分

牡蠣

半兩

輕粉

半錢

砒二錢

右為細末研勻每臨卧抄一錢油調徧身搓摩上一半如後有痒不止更少許塗之股髀之間聞香悉愈信效散 治風熱上客陽明之經牙齒疳蝕斷宣腐臭血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發有時兼解中金石一切毒藥

信砒

一錢

黃丹

二錢

千古石灰

如無但以陳久者炒細研四錢

右研細末入青鹽一分麝香少許如無此二味亦得
每上抄三兩大豆許先洗漱淨以手指蘸藥捺上下
牙齒斷澀涎勿嚥之須臾漱淨或有蝕處再上少許
日三四次常用如意一上以頻為妙或服金石藥致
病便一日三四上更不上牙齒如神或已上牙齒者
傳之即愈或平人常用頗能清利頭目寬膈美食使
髭鬚遲白久用亦能固牙齒便遲老人氣於面而手
足陽明經絡貫注憂思則氣結而血液不行燥怫鬱

而血衰不能榮養藏府故早蒼黃而班白也此藥能使陽明氣血宣通故效能然也 又方使龍骨不用

石灰

神聖餅子 治一切打撲傷損金石刀刃血出不止者

立效此藥上無膿退痂便愈

烏魚骨

一兩五月五日
前准備下

萵苣菜

一握
一握

青蘗草

一握約一虎口八
手取團圓是也

石灰

四兩

右以五月五日未出本人不語將取三味同杵爛

次後下餘藥味杵得所搏作餅子曬乾用時旋刮敷之

芙蓉膏 治徧滿頭面大小諸靨子或身體者

料炭灰 桑柴灰 蕎麥蘄灰

各半升

右灰用熱湯淋取 升熬至五分又用

獨角仙

一箇不用角

紅娘子

半錢不去翅足

糯米

四十粒

石灰

一兩

風化者

右為末將前項灰汁調如麪糊相似在瓷合子內於

土底埋五七日取出使用取癰痕靨內刺破用細竹簽子點之放藥用濕紙搭藥再點至三上見癰痕時冷水淋洗忌薑醋魚馬肉

鉛白霜散 治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者

鉛白霜錢二銅錄錢二白礬一塊
大許

右為末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之

麝香散 治大小人口齒腐蝕出血斷根宣爛者

上好鹹土不以麝香真好者
多少少許

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再
與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神效

乳香散 治一切瘰癧瘡新久遠近不已者

乳香一錢 砒霜一錢 硃砂半錢 紅娘子一十四箇
去翅足 黃丹

半錢

右為末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢裏捲
大破瘡上白麩糊如不破者灸柴炷大者不過一月
其瘰癧核自下

後飲瘡生肌藥 黃蘗

不以多少

為細末麪糊塗患處甚妙

五香丸 治一切惡瘡癩癧結核無首尾及諸瘡腫

沉香 木香 鷄舌香

各一兩

薰陸香 麝香

各三錢

連翹

一兩半

右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

紫參丸 治熱毒癩癧腫痛已內消瘡已破出膿水服

此藥

紫參

苦參

各一錢判

連翹

二兩

丹參

一兩半

膩粉

三錢

麝香

三錢

別研滑石

二兩

右為末別用玄參一觔搗碎以酒三碗浸三日採取
汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗為末用玄參酒熬
皂子未成膏和前藥如桐子大每服一九以黃耆湯
下一日加一九至患人歲數即止如四十則二十每
日却減一九瘡自乾有結內消

麝香雄黃散

治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

麝香 雄黃 乳香 硃砂各二錢 土蜂窩 露蜂

窩

燒灰

右研為細末以醋調少許塗咬着處或不辯認得多
凝是惡瘡三五日不療即毒入心難瘥忌鷄魚油膩
物

硃砂散 治一切疔瘡

硃砂 雄黃 天南星 砒霜 各等分 麝香 少許

右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已

聖力散 治諸疔瘡腫

草烏頭 白及 白歛 木鼈子去地龍皮 金毛

狗脊

各二錢半 麝香三錢 黃丹少許

右研為細末用針針到生肉痛者用藥黃水出為度
川山甲散 治一切通氣破瘡腫行膿血如神效

川山甲 木鼈子 烏龍角各等分都燒存性

右為末每服一錢半空心熱酒調下至中下午瘡破膿
血便行

守瘕丸 治瘕瘕結硬

通草

二兩 一大合 去皮尖研

牛蒡子

一合 出油

吳射干 昆

布

去鹹

呵梨勒

海藻

各四兩 去鹹

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進三服

鬼代丹 治打着不痛

無名異

研

沒藥

研

乳香

研

自然銅

醋淬 研

地龍

去木

鼈子

去殼各等分

右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛

黃丹

一兩

蜜陀僧

半兩

輕粉

一錢

麝香

半兩

龍腦

一字

右為細末摻藥在瘡上用青白子塗之內留一眼子

香藥丸 治瘰癧瘡

硃砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂

各等

分

右為末糯米粉為丸如桐子大每服十九加至二十

丸皂角子臨卧

紅玉槌子 治一切牙疳

砒霜

一塊皂角子大

黃丹

煨過

魯土

右為細末餵餅和作劑子任牙

桃花散 治一切瘡生肌藥

白及 白斂 黃栢 黃連

乳香

別研

麝香

別研

黃

丹

各等分

右為細末摻於瘡上三二日生肌肉滿

追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂

螺兒青 棟甘草 各一兩 白礬 二錢半

右為細末每服一錢新汲水調下立止

膽礬丸 治男子年少而鬢髮班白

土馬踪 燒存性 石馬踪 燒存性 半夏 各一兩 生薑 二兩 胡桃

十真膽礬 半兩 川五倍子 一兩

右為末和作一塊絹袋子盛如彈子大熱酒水各少

許浸下藥汁淋洗頭髮一月神效

伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶

伏神

去皮

麥門冬

地骨皮

茯苓

各一兩

白蘚皮

酸棗仁

沙參

甘草

炙半兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服

鐵脚丸

治大小便不通

皂角

炙去皮不以多少去却子

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十九酒服

全聖散

治小腸膀胱氣痛不忍者

地膽

半兩去足麪微炒

滑石

一兩

硃砂

半錢

右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服

琥珀散 治五淋

滑石

二兩

木通

當歸

木香

尉金

扁竹

各一兩

琥珀

二兩

右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服

葵子散 治小便不通

葵子

茯苓

去黑皮
各等分

右為末每服四錢水一盞煎三沸食前

倒換散

治無問久新癰悶不通小腹急痛肛門腫疼

大黃

小便不通減半 荊芥穗 大便不通減半各等分

右件藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨時加

減服

敗毒散

治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運

大黃

黃藥子

紫河車

赤芍藥

甘草

各等分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑瓜
萸湯同調下此藥偏治婦人

補真丹 治男子元藏虛冷與陽固腎不虛

黑附子

一兩煨

陽起石

火燒酒淬三錢

海馬

二錢

乳香 雄黃

為衣 血竭

各三錢

石蓮子

去殼皮心

黑錫

炒去砂子半兩

石鷲子

燒

醋一分 麝香

右為細末麪糊為丸每服二十九用五香湯空心下

五香湯

沉香 箋香 乳香 麝香 檀香

右為細末每服半錢煎湯下

新添 一醉烏法治頭鬚白再黑方

訶梨勒

十箇不去核

醋石榴

三箇大者取汁

碌礬

五分

生地黄汁

一升 礪砂

研

硫黃

研各一錢

右藥同入甕瓶內用二味汁浸密封勿令透氣至四十九日後取出其訶子狀若黑梅至夜臨卧含一枚
噉津到曉爛嚼以酒一盞下之三二日後再服忌葱

大蒜蘿蔔

宣明方論卷十五

页

缺