

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要卷一萬七百二十一

子部

欽定授時通考卷五十八

農餘

彙考

詩豳風六月食鬱及蓂七月亨葵及菽八月剝棗

傳鬱棣屬蓂蓂蓂也剝擊也

又七月食瓜八月斷壺九月叔苴采茶薪樗食我農夫  
傳壺瓠也叔拾也苴麻子也樗惡木也瓠瓜瓠之畜

麻實之糝乾茶之菜惡木之薪亦所以助田力養農夫之具

又九月築場圃

傳春夏為圃秋冬為場箋場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成熟堅築以為場疏種樹菜果則謂之圃茹者咀嚼之名以為菜之別稱故書傳謂菜為茹

又小雅中田有廬疆場有瓜是剝是蒞



曰菰張晏曰有核曰果無核曰菰臣瓚曰木上曰果  
地上曰菰百草或取根謂菱芡之屬或取實謂若榛  
栗之屬皆是根實可食也

又甸師共野果菰之屬

注郊外曰野果桃李之屬菰瓜瓠之屬

又載師掌任土之法以場圃任園地

注圃樹果蔬之屬季秋於中為場樊圃謂之園疏田  
首之界家有二畝半以為井竈葱韭者故得種樹果

蔬之屬

又閤師凡任民任圃以樹事貢草木

注謂葵韭果蔬之屬

又委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物  
注野謂遠郊以外也凡疏材草木有實者也凡畜聚  
之物瓜瓠葵芋禦冬之具也疏材是草之實材是木  
之實故鄭并言之九職中聚斂疏材云百草根實不  
以木解材文略也

又山虞掌山林之政令仲冬斬陽木仲夏斬陰木

注鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬康成謂陽木生山南者陰木生山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調

又凡服耜斬季材以時入之

注季猶穉也服與耜宜用穉材尚柔刃也服牝服車之材

又澤虞共澤物之奠

注蔓豆之實芹茆菱芡之屬

又掌染草掌以春秋斂染草之物

注染草茅蒐橐蘆豕首紫蒨之屬疏更有藍皁象斗  
之等衆多故以之屬兼之也

又場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而  
藏之

注果棗李之屬蒹瓜瓠之屬珍異葡萄枇杷之屬

又柞氏掌攻草木及林麓夏日至今刊陽木而火之冬



日至令剝陰木而水之若欲其化也則春秋變其水火  
注刊剝互言耳皆謂斫去次地之皮生山南為陽木  
生山北為陰木火之水之則使其肄不生化猶生也  
謂時以種穀也變其水火者乃所火則水之所水則  
火之則其土和美疏斬而復生曰肄若以水火斬而  
不復重生故云使其肄不生也

又雜氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而  
芟之冬日至而耜之

注故書萌作薨杜子春云薨當為萌謂耕反其萌芽  
書亦或為萌康成謂萌之者以茲其所生者夷之  
以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣含實曰繩芟其繩  
則實不成孰耜之以耜側凍土剗之疏云含實曰繩  
者秋時草物含實也

又若欲其化也則以水火變之

注謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和  
美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其

一時著之

史記貨殖列傳陸地牧馬二百蹄

索隱曰按馬有四足二百蹄有五十匹也

牛蹄角千

漢書音義曰百六十七頭也

千足羊澤中千足羴

韋昭曰二百五

十頭水居千石魚陂

徐廣曰魚以斤兩為記也。○正義曰言陂澤養魚一歲收得千石魚賣也

山居千章之材

章大材也

安邑千樹棗燕秦千樹栗蜀漢江

陵千樹橘淮北常山已南河濟之間千樹萩陳夏千畝

漆齊魯千畝桑麻渭川千畝竹及名國萬家之城帶郭

千畝畝鍾之田

徐廣曰六斛四斗也

若干畝卮茜

徐廣曰卮音支鮮支也茜音倩

一名紅藍其花  
染繒赤黃也

千畦薑韭

徐廣曰千畦二十五畝  
駟案韋昭曰畦猶墾

此其

人皆與千戶侯等

又通邑大都酤一歲千釀

正義曰釀千瓮  
酤醢醋云酒酤

醢醬千坵醬

千甌孟康曰甌石甌  
受一石故云甌

屠牛羊彘千皮販穀糶千鍾薪橐

千車船長千丈木千章竹竿萬个

正義曰釋名云  
竹曰个木曰枚

其輶

車百乘牛車千兩木器槩者千枚

徐廣曰槩  
音休漆也

銅器千鈞

素木鐵器若庖茵千石馬蹄躐千牛千足羊彘千雙僮

手指千

漢書音義曰僮奴婢也古者無空手游日皆筋  
有作務須手指故曰手指以別馬牛蹄角也

角丹沙千斤其帛絮細布千鈞文采千匹搨布皮革千

石

顏師古曰麤厚之布也

漆千斤藥麴鹽豉干荅鮐鯊千斤

說文云鮐

海魚也鯊刀魚也

鯁千石鮑千鈞

正義曰鯁謂雜小魚也鮑白也

棗栗千石者

三之

言棗栗三千石乃與上物相等

狐貂裘千皮羔羊裘千石旃席千

具佗果菜千鍾

果菜雜果菜於山野采取

子貸金錢千貫節駟會貧

賈三之廉賈五之此亦比千乘之家其大率也

漢書食貨志田中不得有樹用妨五穀還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蔬殖於疆易雞豚狗彘毋失其時

又循吏傳黃霸為潁川太守使郵亭鄉官皆畜雞豚為  
條教班行民間勸以務耕桑節用殖財種樹畜養

又龔遂為渤海太守勸民務農桑令口種一樹榆百本  
蠶五十本葱一畦韭家二母彘五雞秋冬課收歛益畜  
果實菱芡勞來循行郡中皆有畜積

又貨殖傳先王之制教民種樹畜養五穀六畜及至魚  
鼈鳥獸萑蒲材幹器械之資所以養生送終之具靡不  
皆育育之以時而用之有節山不荏蕪澤不伐天蠃魚

麋卵咸有常禁所以順時宣氣蕃阜庶物穡足功用如此之備也

園籬

齊民要術凡作園籬者於墻基之所方整耕治凡耕作三壟中間相去各二尺秋上酸棗熟時收於壟中概種之至明年秋生高三尺許間斷去惡者相去一尺留一根必須稀概均調行五條直相明當至明年春剝去橫枝剝必留距

若不留距候皮痕大逢寒即死此剝樹常法也

剝訖即編為巴籬

隨宜夾剝務使舒緩

急則不復得長故也

又至明年春更剝其末

又編之高七尺便足

欲高作者亦任人意

折柳樊圃斯其義也

種樹

書曰棘能辟霜花果以棘園中即茂

其種柳作之者一尺一樹初時斜插

插時即編其種榆莢者一同酸棗如其栽榆與柳斜直

高與人等然後編之數年長成共相感迫交柯錯葉特

似房櫳既圖龍蛇之形復寫鳥獸之狀緣勢嵌寄其貌

非一若值巧人其便採用則無事不成尤宜作杙其盤

紆第鬱其文互起縈布錦繡萬變不窮



農政全書凡作園於西北兩邊種竹以禦風則果木畏寒者不至凍損若於園中度地開池以便養魚灌園則所起之土挑向西北二邊築成土阜種竹其上尤善西北既有竹園禦風但竹葉生高下半仍透風老圃家作稻草苫縛竹上遮滿之若種慈竹則上下皆隱蔽矣

又凡作園籬諸品 冬青取其幹可作骨取子作藥取其葉冬夏不凋病在二十年後即爛壞或云以豬糞壅之則久宜試二三八九月移 爵梅取其條葉作刷綠

布取其榦可作骨取其遠年者根株盤結可作几杅等  
器正二月移 五加皮取其榦可作骨取其刺可却姦  
取其芽可食取其根皮作藥作酒正月挿 金櫻子取  
其刺可却姦取其花香味可翫取其子可作藥正月挿  
梅取其花香味可翫取其榦可作骨取其榦上微有  
刺移種不拘時 枸杞取其芽可食取其子作藥取其  
根作藥取其榦作骨正八九月挿 飛來子取其花可  
食種不拘時 椒取其刺可却姦取其榦可作骨取其

實可食可作藥取其葉可作味核可作油四月種 菜

萹取其榦可作骨取其實可食可作藥 梔子取其榦

可作骨取其花香單臺者取其子作藥作染色取其葉

不凋 貓奶子取其榦可作骨取其刺可却姦取其葉

冬夏不凋取其花香取其嫩葉可食名神仙茶此移種

者 迎春花取其花早種於籬內 酸棗取其榦可作

骨取其枝可却姦取其子可食取其仁藥材移種不拘

時 木筆取其榦可作骨取其花美分移於籬內 桑

取其榦可作骨取其葉可飼蠶取其椹可食可作藥壓  
條 枳取其榦可作骨取其刺可却姦取其枝可蓋墻  
可賣取其子可傳生接博移種 槿取其榦可作骨取  
其花不拘時插 野薔薇取其刺可却姦取其花可蒸  
露可插可移 穀樹取其榦可作骨取其汁可作膠書  
金字取其子中藥材取其皮可造紙取其木可種葦  
棟取其榦可作骨且速成 榆取其榦可作骨且速成  
莢可食 白楊取其榦可作骨速成修取為薪且不若

楊柳之多蛀也宜插 刺杉取其榦可作骨刺可却姦

阜莢榦作骨且速成芽可食有刺可却姦 種山礬

不凋花香易成 插金銀花花香中藥 移椿樹易成

芽可食 種枇杷易成冬月開花花藥材榦葉俱青

挿小葉樹易成芽可食 木龍易成葉貼毒瘡不凋

栽種

淮南子夫移樹者失其陰陽之性則莫不枯槁 高誘曰失猶易

齊民要術凡移栽一切樹木欲記其陰陽不令轉易 陰陽

易位則難生小小  
栽者不須記也

大樹髡之

不髡風  
搖則死

小則不髡先為深

坑內樹訖以水沃之著土令如薄泥東西南北搖之良

久搖則泥入根間無不活者不然後下土堅築

近上二  
寸不築

取其柔潤也時時灌溉常令潤澤

每澆水盡即以溲土覆之  
覆則保澤不覆則乾涸

埋之欲深勿令搖動凡栽樹訖皆不用手捉及六畜觸

突

戰國策曰夫柳縱橫顛倒樹之皆  
生十人樹之一人搖之則無生矣

凡栽樹正月為上

時諺曰正月可栽樹  
言得時易生也

二月為中時三月為下時棗雞口

槐兔目桑蝦蟆眼榆負瘤散自餘雜木鼠耳虫趨各其

時此等名目皆是葉生形容之所象似以此時栽種者葉皆即生早栽者葉晚出雖然寧大早為佳不可晚也

樹大率種數既多不可一一備舉凡不見者栽時之

法皆求之此條崔寔曰正月自朔暨晦可移諸樹竹漆桐梓松栢雜木唯有果實者及望而止過十五日則果少實務本新書曰一切移栽枝記南北根深土遠寬掘土以蓆包包裹不令見日大車上般載以人捧拽緩緩而行車前數百步平治路上車轍務要平坦不令車輪搖擺於處所依法栽培樹樹決活古人有云移樹無時

莫令樹知區宜寬深以水攪土成泥仍糝新粟大麥百餘粒即下樹栽樹大者須以木扶架若根不動搖雖丈許之木可活仍須芟去繁枝則不招風務本直言云近聞諸般材木比之往年價直重貴蓋因不種不栽一年少如一年可為深惜古人云木奴千無凶年木奴者一切樹木皆是也自生自長不費衣食不憂水旱其果木材植等物可以自用有餘又可以易換諸物若能多廣栽種不惟無凶年之患抑亦有久遠之利焉種樹書曰



凡移樹不要傷根鬚須濶不可去土恐傷根

徐光啓曰  
土封縱小

無絕根鬚其法宜先寬掘土封漸用竹木剔去旁土勿傷細根約量人力可致者以繩束之新坑務掐令濶大

令根鬚條直不可卷曲

移樹者以小牌記取南枝不若先鑿窟沃

水攪泥方栽築令實不可踏仍多以木扶之恐風搖動

其顛則根搖雖尺許之木亦不活根不搖雖大可活更

莖上無使枝葉繁則不招風又曰移樹木用穀調泥漿

水於根下沃之無不活者又曰凡栽植忌西風又曰凡

植果木先於霜降後鋤掘轉成圓塚以草索盤定泥土



土者深栽泥中輕輕提起樹根使與地平則其根舒暢  
易活必三四日後方可用水澆灌勿令搖動

柳宗元郭橐駝傳駝所種樹或移徙無不活且碩茂早  
實以蕃他植者雖窺伺倣慕莫能如也有問之對曰橐  
駝非能使木壽且孳也以能順木之天以致其性焉爾  
凡植木之性其本欲舒其培欲平其土欲故其築欲密  
既然已勿動勿慮去不復顧其蒔也若子其置也若棄  
則其天者全而其性得矣故吾不害其長而已非有能

碩而茂之也不抑耗其實而已非有能早而蕃之也他  
植者則不然根拳而土易其培之也若不過焉則不及  
苟有能反是者則又愛之太恩憂之太勤旦視而暮撫  
已去而復顧甚者爪其膚以驗其生枯搖其本以觀其  
踈密而木之性日以離矣雖曰愛之其實害之雖曰憂  
之其實讎之故不我若也

農政全書凡諸木俱宜在下弦後上弦前移種地氣隨  
月而盛觀諸潮汐此理易晰矣方氣盛時生氣全在枝

葉故移則傷其性接則失其氣伐用則潤氣滿中久而生蠹也

又分栽者於樹木根傍生小株每株就本根連處截斷未可便移須待次年方可移植別處或叢生亦必按時月分植則易活也

又壓條者身截半斷屈倒於地熟土兜一區可深五指餘臥條於內用木鉤子攀拘在地以溲土壅近身半段露梢頭半段勿壅以肥水灌區中至梅雨時枝葉仍茂

根必生矣次年此日初葉將萌方斷連處是年霜降後  
移栽尤妙

又凡扦插花木先於肥地熟斲細土成畦用水滲定正  
二月間樹芽將動時揀肥旺發條斷長尺餘每條上下  
削成馬耳狀以小杖刺土深約與樹條過半然後以條  
插入土壅入每穴相去尺許常澆令潤搭棚蔽日至冬  
換作煖蔭次年去之候長高移栽初欲扦插天陰方可  
用手過雨十分無雨難有分數矣大凡草木有餘者皆

可採條種尋枝條嫩直者刀削去皮二寸許以蜜固底  
次用生山藥搗碎塗蜜上將細軟黃泥裹外埋陰處自  
然生根

又春花以半開者摘下即插之蘿蔔上實土花盆內種  
之灌溉以時花過則根生矣不傷生意又可得種亦奇  
法也立夏日取交春一個時辰內扦插各色樹木入地  
四五寸無不活者當年即便生結又云於正二月上旬  
取樹木嫩枝扦插勝於種核五年方大扦插全活則二

年已生矣食經曰種名果法三月上旬斫好直枝如大  
母指長五尺內著芋魁種之無芋大蕪菁根亦可用

便民圖凡果樹茂而不結實者於元日五更以斧斑駁  
雜砧則子繁而不落謂之嫁果十二月晦日夜同若嫁  
李樹以石頭安樹了中

又正月間根芽未生於根旁寬深掘開尋攢心釘地根  
鑿去謂之騙樹留四邊亂根勿動仍用土覆蓋築實則  
結子肥大勝插接者



農桑輯要凡木皆有雌雄而雄者多不結實可鑿木作  
方寸大以雌木填之乃實以銀杏雄樹試之便驗社日  
以杵舂百果樹下則結實牢不實者亦宜用此法  
種樹書鑿果樹納少鍾乳粉則子多且美又樹老以鍾  
乳末和泥於根上揭去皮抹之復茂

農政全書雄木無用而衆雌之中間有一二雄者更妙  
諺云羣雌間一雄結實飽蓬蓬

接果

務本新書凡桑果以接博為妙一年後便可獲利昔人

以之譬螟子者取其速肖之義也凡接枝條必擇其美

宜用宿條向陽者庶氣壯而茂嫩條陰弱而難成

根株各從其類

然荆桑亦可接魯桑梅可

接杏桃可接李

接工用細齒截鋸一連厚脊利刃小刀一把要

當心手凝穩又必趁時

以春分前後十日為宜或取其條視青為期然必待時暄可接

蓋欲藉陽和之氣也

一經接博二氣交通以惡為美以彼易此其

利有不可勝言者矣接博其法有六一曰身接

先用細鋸截去

元樹枝莖作盤砧高可及肩以利刃小刀際其盤之兩旁微啓小罅深可寸半先用竹籠之測其深淺却以所

接條約五寸長一頭削作小筵子先噙口中做津液以助其氣却內之罇中皮肉相對插之訖用皮樹封緊寬緊得所用牛糞和泥斟酌封裏之勿令透風外仍上留二眼以泄其氣徐光啓曰謂砧宜用老鴉背為妙高如馬低

**二曰根接**

鋸截斷元樹身去地五寸許以所接條削筵插之一如身接法就以土培封之

以棘圍護之

**三曰皮接**

用小利刃刀子於元樹身八字斜剉之以小竹籤測其淺深以所接枝條

皮肉相向插之封護如前法候接枝發茂去其元樹枝莖使之莖茂耳

**四曰枝接**

如皮接之法而

差近之耳

**五曰鑿接**

小樹為宜先於元樹橫枝上截去留一尺許於所接條樹上眼外方半寸刀

尖割斷皮肉至骨併帶凝揭皮肉一方片須帶芽心口噙少時取出印濕痕於橫枝上以刀尖依痕刻斷元樹鑿處大小如之以接按之上下兩頭以桑皮封緊緊慢得所仍用牛糞泥塗護之隨樹大小酌量多少接之



向陽細嫩枝如筋麤者長四寸許陰枝即少實其枝須兩節兼須是二年枝方可接接時微批一頭入砧處插入砧緣劈處令入五分其入須兩邊批所接枝皮處插了令與砧皮齊切令寬急得所寬即陽氣不應急則力大夾煞全在細意酌度插枝了別取本色樹皮一片長尺餘潤二三分纏所接樹枝並砧緣瘡口恐雨水入纏訖即以黃泥泥之其砧面並枝頭並以黃泥泥之對插一邊皆同此法泥訖仍以紙裹頭麻繩縛之恐泥落故

也砧上有葉生即旋去之乃以大糞壅其砧根外以刺  
棘遮護勿使有物動撥其枝春雨得所尤易活其實內  
子相類者林檎梨向木瓜砧上栗子向櫟砧上皆活蓋  
是類也張約齋種花法注云春分和氣盡接不得夏至  
陽氣盛種不得春接樹必待貼頭回青無有不活大都  
在春分前後亦有宜待穀雨者何云春  
分不接也種則立  
夏後便不宜矣

立春正月中旬宜接櫻桃木樨徘徊

黃薔薇正月下旬宜接桃梅杏李半支紅臘梅梨棗栗

柿楊梅紫薔薇

浙人亦云然宜試之恐  
彼中稍暖故得早耳

二月上旬可接

紫笑綿橙匾橘已上種接莖於十二月間沃以糞壤兩  
至春時花果自然結實立秋後可接林檎川海棠黃海  
棠寒球轉身紅視家棠梨葉海棠南海棠以上接法並  
要時將頭與木身皮對皮骨對骨用麻皮緊緊纏上用  
箬葉寬覆之如萌出相長即撒去箬葉無有不盛也但  
取實内核相似葉相同者皆可接換下向根貼謂之樹  
貼如桃貼接杏接梅標貼接栗蓋此類也枳接柑橘亦  
宜本色接換本色美者最妙若貼大宜高截貼小宜近

地截截訖用利刀銛貼上齒痕尋樹木佳者取到接頭  
須經二年肥盛嫩枝如筋大者斷長三四寸以上根頭  
一寸半用薄刀子刻下中半刻成判官頭樣削其骨成  
馬耳狀又將馬耳尖頭薄骨翻轉割去半分將接頭口  
內噙養溫暖以借生氣然後將刀於貼盤左右皮內膜  
外批豁兩道或三道納所噙接頭於渠子內極要快捷  
緊密須使老樹肌肉與接頭肌肉相對着或二或三皆  
了用竹籜攔寸許劈開雙指齊貼面於接頭外面所批



痕處包裹定麻皮復用竹籜包其貼頂縛定次用爛泥封其纏處舊麻縛着上用寬甕盛土培養接頭勿令透風見日土乾則灑之所包土上條芽長出非接頭上者悉令去之以防分力培土上露接頭一二眼通活氣上用竹籜蔽之以防日雨

種樹書凡接花木雖已接活內有脂力未全包生接頭切要愛護如梅雨浸其皮必不活

又凡接矮果及花用好黃泥曬乾篩過以小便浸之又

晒乾篩過再浸之凡十餘度以泥封樹皮用竹筒破兩  
半封裹之則根立生次年斷其皮截根栽之

又接樹須取向南隔年者接之則着子多經數次接者  
核小但核不可種耳不可接者乃用過貼先移葉相似  
之小樹於其畔可以枝相交合處以刀各削其半對合  
着竹籜包裹麻皮纏固泥封之大樹所合枝傍截半段  
小樹所合枝去稍弱不必半段欲花果兩般合色則勿  
去其稍來年春始截斷復待長定然後移栽

農政全書接樹有三訣第一觀青第二就節第三對縫  
依此三法萬不失一

修葺澆灌

便民圖修葺法正月間削去低枝小亂者勿令分樹氣  
力則結子自肥大又曰凡樹脚下常令耘草清淨草多  
則引蟲蠹亦能偷力乏樹勿使下有坑坎雨後水清根  
朽葉黃宜令平滿高如地面三五寸

農政全書凡果木皆須剪去繁枝使力不分試看開花

結果之際凡無花無果細枝後來亦須發葉豈不減力  
若預先芟去則力聚於花果矣

又凡果俱三年老枝上所生則大而甘

又凡樹欲取材如椐榆杉柏之類可令挺枝無旁枝其  
他取花葉芽實者皆令枝旁生剝削令至六七尺其下  
可通人行如此便於採掇凡本樹未發芽前半月以上  
俱可修理

種樹書澆灌法凡木早晚以水沃其上以唧筒唧水其

上必須用停久冷糞正宜臘月亦必和水三之一草之類宜四季用肥如正月則用五分糞五分水二月三分糞七分水三四月二分糞八分水五六月七八月十一二月八分糞二分水臘月純糞不妨遇天旱只宜白水澆或加一分糞二月或用澆肥多有所忌假如二月樹上已發嫩條必生新根澆肥則根枯而死如萌未發者不妨三月亦然又有一等不怕肥者如石榴茉莉之屬雖多肥不妨五月夏至梅雨時澆肥根必腐爛八月亦不

可澆肥白露雨至必生細根肥之則死六七月花木發  
生已定者皆可輕輕用肥謹依月令等級澆之及小春  
時便能發旺如柑橘之類則不可但用肥則皮被破脂  
流冬必死矣

徐光啓曰蘇人種  
柑橘用肥培壅

一切樹木俱宜十一二

月正月餘皆不可合用灰糞和土或麻餅屑和土壅根  
高三五寸澆水實定不可太過

### 收種下種

農政全書收種下種法凡收子核必擇其美者作種必

待果實熟甚劈取於墻下向陽暖處深寬為坑以牛馬糞和土以半於坑底鋪平取核尖頭向上排定復以糞土覆之令厚尺餘至春生芽萬不失一忌水浸風吹皆令仁腐一切草木種子俱瓢盛懸掛為佳凡取種子必充實老黑者曬乾以瓶收貯高懸勿近地氣恐生白摸則無用隔年亦不生及時秧子勿使遲誤亦不宜太早地不厭高土肥為上鋤不厭數土鬆彌良各要按時及節臨下子時必日中曬曝擇淨然合浸者浸之不浸便





夜必霜此時放火作燭少得烟氣則免於霜矣

種樹書草木羊食者不長凡花最忌麝香瓜尤忌之賸  
栽蒜薤之類則不損又法於上風頭以艾和雄黃末焚  
即如初

又木自南而北多過寒而枯只於臘月去根旁土麥穰  
厚覆之燃火深培如故則不過一二年皆結實若歲用  
此法則南北不殊猶人注艾耳

又果樹生小青蟲虹蜻盼掛樹自無

便民圖治蠹蟲法正月間削杉木作釘塞其穴則蟲立死正月一日五更把火遍照一切果樹下則無蟲災或清明日亦可

農桑輯要木有蠹蟲以芫花納孔中或納百部葉蟲立死

農政全書凡治樹中蠹蟲以硫黃研極細末和河泥少許令稠遍塞蠹孔中其孔多而細即遍塗其枝幹蟲即盡死矣又法用鐵線作鉤取之又用硫黃雄黃作烟塞

之即死或用桐油紙油燃塞之亦驗如生毛蟲以魚腥水潑根或埋蠶蛾於地下

又凡鳥來食果或張網罩樹多損樹枝或持竿鼓柝甚費力須用弩射取一二置竿首倚竿於樹其鳥悉不來

### 採果伐木

便民圖採果實法凡果實初熟時以兩手採摘則年年結實果子熟時須一頓摘其美者遲留之雖待熟亦不美勿先摘動被人盜吃飛禽就來窺食切宜謹之

遯齋閱覽用人髮掛枝上則飛鳥不敢近

種樹書凡果實未全熟時摘若熟了即抽過筋脉來歲

必不盛

徐光啓曰宜少留以養其力有過不採者甚壞樹

果實異常者根下必

有毒蛇切不可食

齊民要術凡伐木四月七月則不蟲而堅韌榆莢下桑

椹落亦其時也然則凡木有子實者候其子實將熟皆

其時也

非時者蟲蛀且脆也

凡非時之木水漚一月或火燻取乾

蟲則不生

水浸之木皆亦柔韌

禮記月令孟春之月禁止伐木孟

夏之月無伐大樹

逆時氣也

季夏之月樹木方盛乃命虞人

入山行木為斬伐季秋之月草木黃落乃伐薪為炭仲

冬之月日短至則伐木取竹箭淮南子曰草木未落斧

斤不入山林

九月草木解也

崔寔曰自正月以終季夏不可伐

木必生蠹蟲或曰以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析


間解之害又犯時令非急勿伐十一月伐竹木十二月

斬竹伐木不蛀斫松在下弦後上弦前永無白蟻他樹

亦同



欽定授時通考卷五十八



總校官庶吉士 臣侍 朝

校對官庶吉士 臣嚴 福

騰錄舉人 臣杜安詩

騰錄監生 臣朱 溥

繪圖騰錄監生 臣王玉海



欽定四庫全書薈要

子部

欽定授時通考卷

五十九  
六十

詳校官主事臣陳木



欽定四庫全書薈要卷一萬七百二十二子部

欽定授時通考卷五十九

農餘

蔬一

蔓菁

菲

同蒿

蔓蒿

牡蒿

賴蒿

蘆蒿

白菜

芥  
芥藍

菠薐

莧菜

馬齒莧

冬葵

龍葵

終葵

蒲葵

天葵

苦菜

薤菜

芸薹

焯菜

薇

巢菜

蕨 迷蕨

水蕨

藜 藜藿

灰藿

薺菜



蔓菁



蔓菁

蔓菁一名蕪菁

北人名蔓菁并汾河朔間燒食其根呼為蕪根蕪菁南北之通稱

一名

葑一名須一名蕘蕪一名蕘一名芥

爾雅云須蕘蕪蕘云陳宋之間謂之

葑幽州人謂之芥陳楚謂之蕘齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙魏謂之大芥七者一物也

一名九英

菘

塞北河西種者名九英蔓菁亦曰九英菘

一名諸葛菜

蜀人呼為諸葛菜

一名馬

王菜

苗徭獠狠地方產菜味澀多刺即諸葛菜也相傳為馬殷所遺故名

一名鷄毛菜

夏月

則枯蔬圃復謂之鷄毛菜

苗名蕘

孫緬云蕘蕪菁苗也

根為沙吉木兒

蒙古人呼其根

云根長而白形如胡蘿蔔霜後特軟美蒸煮煨任用梢

似芋魁含有膏潤頗近穀氣莖粗葉大而厚潤夏初起  
莖開黃花四出如芥結角亦如芥子勻圓似芥子紫赤  
色莖葉稍遜於根亦柔膩不類他菜人久食蔬菜無穀  
氣即有菜色食蔓菁者獨否蔓菁四時皆有四時皆可  
食春食苗初夏食心亦謂之莖秋食莖冬食根數口之  
家能蒔數百本亦可終歲足蔬子可打油然燈甚明每  
畝根葉可得五十石每三石可當米一石是一畝可得  
米十五六石則三人卒歲之需也此菜北方甚多河東

太原所出其根極大又出西番吐谷渾地氣味苦溫無  
毒常食通中下氣利五臟止消渴去心腹冷痛解麩毒  
入丸藥服令人肥健尤宜婦人

劉賓客嘉話錄公曰諸葛所止令兵士獨種蔓菁者何  
絢曰取其纜出甲者生啗一也葉舒可煮食二也久居  
隨以滋長三也棄去不惜四也回則易尋而採之五也  
冬有根可劬食六也比諸蔬屬其利不亦溥乎曰信矣  
三蜀之人亦呼蔓菁為諸葛菜江陵亦然



兼明書今人呼菘為蔓菁云北地生者為蔓菁江南生者為菘此蓋習俗之非也余少時亦謂菘為蔓菁常見醫方用蔓菁子為辟穀藥又為塗頭油又用之消毒腫每訝菘子有此諸功殊不知其所謂近讀齊民要術乃知蔓菁是蘿蔔苗即醫方所用蔓菁子是也漢桓帝時年饑勸人種蔓菁以充饑諸葛亮征漢令軍人種蘿菔則蘿菔蔓菁為一物無所疑也

雲南記雋州界緣山野間有菜大葉而麤莖其根若大



者作乾漫散而勞種不用溼

溼則地堅葉焦

既生不鋤九月末

收葉仍留根取子十月中犁粗耨拾取耕出者

若不耕時則留

者英不茂實不繁也

春夏畦種供食者與畦葵法同剪訖更種從

春至秋可得三輩常供好菹取根者用大小麥底六月

中種十月將凍耕出之一畝得數車早出者根細

羣芳譜種法先薙草雨過即耕不雨先一日灌地使透

次日熟耕作畦或耬種或漫撒覆土厚一指五六日內

有雨不須灌無雨屛水灌溝中遙澗之勿澆土令地實

以沙土高者為上宜厚壅之擇子下種出甲後即耘出  
小者為茹若不欲移植取次耘出存其大者令相去尺  
許若欲移植俟苗長五七寸擇其大者移之先耕熟地  
作畦深七八寸起土作壟藝苗其上壟土虛浮根大倍  
常一法子欲陳用鰻鱧汁浸之曝乾種可無蟲取子者  
當六七月種來年四月收若中春種亦即生臺與秋種  
者同熟但根小莖矮子少耳供食者正月至八月皆可  
種凡遇水旱他穀已晚但有隙地即可種此以濟口食

一法地方一尺五寸植一本一步十六本一畝三千六百本每本子一合可得三石六斗比菜子可多三四倍

利

菲

附

爾雅菲芴

注即土瓜也疏菲似菑莖麤葉厚而長有毛三月中蒸嚮為茹甘美可作羹幽州人謂之芴今河內人謂之宿菜

又菲蔥菜

注菲草生下濕地似蕪菁華赤色可食

同蒿



同蒿

同蒿一名蓬蒿

形氣同蓬蒿也

莖肥葉綠有刻缺微似白蒿甘

脆滑膩四月起莖高二尺餘開花深黃色狀如單瓣菊  
花一花結子近百成毬如地菘及苦蕒子最易繁茂以  
佐日用最為佳品主安氣養脾胃消水飲多食動風氣  
熏心令氣滿

王氏農書春二月種可為常食秋社前十日種可為秋  
菜如欲出種春菜食不盡者可為子俱是畦種其葉又



可湯泡以配茶茗實菜中之有異味者

羣芳譜種植肥地治畦如種他菜法

萋蒿

附

萋蒿一名白蒿一名繁

爾雅云繁皤蒿注云白蒿也

一名蔞

爾雅云購蒿注

云萋蒿也生下田初出可啖

一名由

一作游

胡爾雅云繁由胡

一名旁勃

爾雅云北

海人謂之旁勃有水陸二種

爾雅通謂之繁曰繁皤蒿即今陸生艾蒿也辛熏不美曰繁由胡即

今水生萋蒿也又曰繁之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣形

狀相似但水生者辛香而美生陂澤中二月發苗葉似

嫩艾而岐細面青背白其葉或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食蓋嘉蔬也

牡蒿

附

爾雅蔚牡蒿

注無子者疏一名馬新蒿

本草一名齊頭蒿

諸蒿葉尖此獨參而禿故有齊頭之名

三四月生苗其

葉扁而本狹參有禿岐嫩時可茹秋開細黃花結實大如車前實而內子細微不可見故人以為無子也

藟蒿 附

爾雅葍藟蕭

注今藟蒿也初生亦可食疏葉青白色莖似箸而輕  
肥始生香可生食又可蒸食本草葍即陸生藟蒿俗  
呼艾蒿

藟蒿 附

爾雅莪蘿

注今莪蒿也亦曰藟蒿疏一名蘿蒿生澤田漸洳之

處葉似斜蒿而細科生三月中莖可生食又可蒸香  
美味頗似萹蒿

本草一名抱娘蒿似小薊宿蒿先於百草

菜白





莖葉皆扁味甘溫無毒利腸胃除胸煩解酒渴利大小  
便和中止嗽冬汁尤佳夏至前菘菜食發皮膚風癢動  
氣發病又有春不老一名八斤菜葉似白菜而大甚脆  
嫩四時可種醃食甚美

菜譜有春菘有晚菘





芥



# 芥

芥一名辣菜一名臘菜

其氣味辛辣有介然之義又可過冬也本草云冬月食者俗呼

臘菜春月食者俗呼春菜四月食者謂之夏菜

一名水蘇一名勞祖性辛溫無

毒溫中下氣豁痰利膈處處有之種類不一有青芥又名

刺芥葉大子粗葉似菘有柔毛

味極辣可生食其子可藏冬瓜

紫芥莖葉純紫可愛作齏最美

白芥

一名胡芥一名蜀芥來自戎中而盛於蜀八九月種至

春深莖高二三尺葉如花芥葉青白色為茹甚美莖易

起而中空性脆最畏狂風大雪須謹護之三月開黃花

結角子如梁米黃白色又有一種莖大而中實者尤高

子亦大白芥子堪入藥味極

他如南芥刺芥

按此即青芥旋

辛美利九竅明目通中

芥馬芥

葉如青芥

花芥

葉多刻缺如蘿蔔英

石芥

低小者

皺葉芥

大芥一名皺葉

芥大葉皺紋色尤深綠味更辛辣入藥用

之類皆菜之美者三月開黃花結

莢一二寸子如蘇子大色紫味辛芥心嫩者為芥藍極脆李時珍曰芥性辛熱而散久食耗真元昏眼目發瘡痔劉恂嶺南異物志云南土芥高五六尺子大如鷄子此又芥之尤異者也

芥  
四民月令六月大暑中伏後可收芥子七月八月可種

齊民要術取葉者七月半種地欲糞熟一畝用子一升  
種法與蕪菁同既生亦不鋤之十月收取子者二三月  
好雨澤時種性不耐寒經冬則死故須春種早則畦種水澆五月熟而  
收子

王氏農書今江南農家所種如種葵法俟成苗必移栽

之早者七月半後種遲者八月種厚加培壅草即鋤之早即灌之冬芥

經春長心中為鹽淡二苴亦任為鹽菜如收子者即不  
摘心蓋南北異宜故種畧不同而其用則一

芥藍附

芥藍芥屬也葉色如藍故南人謂之芥藍仍可擘取食  
故北人謂之擘藍其葉大於菘根大於芥莖苗大於白  
芥子大於蔓菁花淡黃色其苗葉根心俱任為蔬子可  
壓油亦四時可種四時可食大畧如蔓菁也但食根之  
菜如芥蘆菔蔓菁之屬魁皆在土中此則魁在土上為  
異耳收根者須四五月種少長擘食其葉漸擘魁漸大  
八九月并根葉取之葉作菹或作乾菜根剝去皮或煮

食或糟藏醬豉留根至明春復發苗可採食三月花四月實子每畝可收三四石

農政全書種芥藍宜耕熟地厚壅之土强者多用草灰和之耕熟後或漫散子取次耘之或種苗長數寸移植之或就平地種或作埕大畧與種蔓菁同法但須疎行則魁大子多每本令相去一尺餘

又凡菜種多冬榮夏枯獨芥藍乾枯收子之後根復生藥經數年不壞蓋一種之後無論子粒傳生即原本亦

供數年採拾冬月悉取葉空留根來年亦生或并斫去  
大根稍存入土細根來年亦生

又芥藍莖葉用芝麻油煮如常煮菜法食之并飲其汁  
能散積痰其葉及子亦能消食積解麵毒

又菜名藍者不止因葉色似藍北人直用作澱可染紬  
帛勝於福青





稜菠



菠薐

菠薐一名波斯草一名赤根菜

詢芻錄云南人呼菠菜北人呼赤根菜

一

名鸚鵡菜出西域頗陵國今訛為菠薐蓋頗陵之轉聲

也

見劉賓客嘉話錄

莖柔脆中空葉綠膩柔厚直出一尖傍出

兩尖似鼓子花葉之狀而稍長大根長數寸大如桔梗色赤味甘美四月起莖尺許開碎白花叢簇不顯有雌雄雌者結實有刺狀如蒺藜子葉與根味甘冷滑無毒利五臟通腸胃熱開胸膈下氣調中止渴潤燥解酒毒

服丹石人最宜麻油炒食甚美北人以為常食春月出

臺嫩而且美春暮臺漸老沸湯晾過曬乾備用甚佳可

久食誠四時可用之菜也

八九月種者可備冬食  
正二月種者可備春蔬

農桑輯要菠薐作畦下種如蘿蔔法春正月二月皆可

種逐旋食用秋社後二十日種於畦下以乾馬糞培之


以備霜雪十月內以水沃之以備冬食

羣芳譜種植正二月內將子水浸一二日候脹撈出控

乾盆覆地上俟芽出擇肥鬆地作畦於每月下旬下種

勤澆灌可逐旋食用此菜必過月朔乃生即晦日下種  
與十餘日前種者同出亦一異也春種多蟲不如秋種  
者佳

菜菔



莧

莧凡五種赤莧

一名黃爾雅云黃赤莧注云今莧菜之赤莧者本草云一名花莧莖葉深赤

白莧人莧

俱大寒又名糠莧胡莧二莧味勝他莧但大者為白莧小者為人莧或謂之細莧其實一

也其子霜後方熟細而黑色又細莧俗名野莧猪好食之亦名猪莧紫莧莖葉皆紫無毒

染瓜者五色莧今稀諸莧皆三月種葉如藍莖葉皆高大

易見故名莧

或曰莧從見諧聲也

開細花成穗穗中細子扁而光

黑與青葙子鷄冠子無別老則抽莖甚高六月以後不堪食子霜後始熟九月收五莧俱氣味甘冷利無毒並

利大小腸治初痢滑胎通竅明目除邪去寒熱白莧補  
氣除熱赤莧主赤痢射工沙虱紫莧殺蟲毒治氣痢忌  
與鼈共食

農桑輯要人莧但五月種之

今人有三四月種者

如欲出種留食

不盡者八月收子

馬齒莧

附

馬齒莧一名馬莧一名五行草

以其葉青梗赤花黃根白子黑也

一名

五方草

亦五行之義

一名長命菜

其性耐久難燥

一名九頭獅子草

一名馬齒龍牙處處有之柔莖布地葉對生比並圓整如馬齒故名六七月開細花結小尖實實中細子如葶藶子狀苗煮熟曬乾可為蔬有二種葉大者名狔耳草不堪用小葉者又名鼠齒莧節葉間有水銀每十觔可得八兩或十兩氣味酸寒無毒散血消腫利腸滑胎解毒通淋治產後虛汗



葵冬



冬葵

葵說文曰菜也農書曰陽草也

天有十日癸與終始故葵從癸

有紫莖

白莖二種葉之小者為鴨脚葵今南北皆有之一名露

葵

古人採葵必待露解

一名滑葵

言其性也

為百菜之主備四時之饌

本豐而耐旱

一作寒

味甘而無毒供食之餘可為菹腊枯

枘之遺可為榜簇子若根則能療疾咸無棄材誠蔬茹之上品也

詩豳風七月烹葵及菽

本草綱目李時珍曰古人種為常食今種之者頗鮮其實大如指頂皮薄而扁實內子輕虛如榆莢仁六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵正月復種者為春葵然宿根至春亦生

四民月令正月可種葵芥又六月六日種葵中伏以後可種冬葵

齊民要術臨種時必燥曝葵子

葵子雖經歲不泯然地溼種者瘠而不肥

不厭良薄即糞之春必畦種水澆

春多風旱非畦不得且畦者省地而菜多

一畦供得一口

畦長兩步廣一步

大則水難勻

深掘以熟糞對半和

土覆其上令厚一寸鐵齒耙耬之令熟足踏使堅平用

水澆潤水盡下子又以熟糞和土覆其上令厚一寸餘

葵生三葉然後澆之

澆用晨夕日中便止

每一掐輒耙耬地令起

下水加糞三掐更種一歲之中凡得三輩凡畦種之物

悉如之早種者必秋耕十月末地將凍散子勞之人足

踐踏之乃佳踐者菜肥地釋即生鋤不厭數五月初更

種之

春者既老秋葉落未生故種此相接

六月一日種白莖秋葵

白者宜乾紫莖

者乾即黑而澀

仍留五月種者取子

春葵子熟不均故須留中輩

於此時附

地剪却春葵冷根上柎生者柔輒美於秋葵掐秋菜必

留五六葉

不掐則莖孤葉多則科大

八月半剪去

留其歧歧多者則去地一二寸獨莖

者亦可去地四五寸

柎生肥嫩比至收時高與人膝等莖葉皆美

科雖不高菜實倍多

若不剪早生者雖高數尺柯葉堅硬全不中食

收待霜降

傷早黃爛

傷晚黑澀

羣芳譜葵甚易生地不論肥瘠宜於不堪作田之地多

種以防荒年採淪曬乾收貯

龍葵 附

本草一名苦葵一名苦菜

益州有苦菜乃是苦蕒即龍葵也

一名天茄

子一名水茄一名天泡草一名老鴉酸漿草

與酸漿相類故加老

鴉以別之

一名老鴉眼睛草

五爪龍亦名老鴉眼睛草同名異物也

李時珍曰

龍葵龍珠一類二種也皆處處有之四月生苗高二三

尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以

後開小白花五出黃藥結子正圓大如五味子上有小

蒂數顆同綴其味酸中有細子亦如茄子之子但生青

熟黑者為龍葵生青熟赤者為龍珠

莖葵 附

爾雅莖葵繁露

注承露也大莖小葉華紫黃色

本草一名落葵一名藤葵一名天葵一名繁葵一名御

菜一名臙脂菜

坡詩注云豐湖有燕  
脂藤生菜滑美勝蓴

蔓生葉似杏葉而

肥厚軟滑可茹八九月開細紫花累累結實如五味子

熟則紫黑色揉取汁紅如臙脂女人飾面點唇及染布

物謂之胡臙脂亦曰染絳子但色易變耳其葉最能承  
露其子垂垂亦如綴露故得露名

蒲葵

附

羣芳譜蒲葵葉似葵可食

天葵

附

羣芳譜天葵一名苳一名菟葵

爾雅云苳菟葵注云頗似葵而小葉狀如藜有

毛

雷公所謂紫背天葵是也葉如錢而厚嫩背微紫生


崖石凡丹石之類得此始神但世人罕識唐本草注苗



如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉



菜苦



# 苦菜

苦菜一名苦苣一名苦蕒一名編苣一名游冬

博雅云游冬苦

菜也埤雅云此草凌冬不凋故名

一名天香菜葉狹而綠帶碧莖空斷

之有白汁花黃如初綻野菊花春夏旋開一花結子一

叢如同蒿子花罷則萼斂子上有白毛茸茸隨風飄揚

落處即生今處處有之但在北方者至冬而凋在南方

者冬夏常青為少異耳味苦寒無毒夏天宜食能益心

和血通氣主治腸澼渴熱中疾惡瘡霍亂後胃氣煩逆

忌與蜜同食作肉痔脾胃虛寒人不可多食

禮記月令孟夏之月苦菜秀

又內則濡豚包苦實蓼

疏言濡豚之時包裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼

爾雅荼苦菜


疏一名茶草一名選

陸璣詩疏生山田及澤中得霜甜脆而美

欽定四庫全書

欽定校時通考  
卷五十九

菜薹



蕹菜

蕹菜

蕹與壅同此菜惟以壅成故謂之蕹

幹柔如蔓中空葉似菠稜及塹

頭開白花堪茹南人編葦為筏作小孔浮水上種子於水中長成莖葉皆出葦孔中隨水上下南方之奇蔬也陸種者宜濕地畏霜雪九月藏土窖中三四月取出壅以糞土節節生芽一本可成一畦生嶺南今江夏金陵多時之



臺雲



雲臺


雲臺菜

塞外有雲臺成  
始種此菜故名

一名寒菜一名胡菜一名臺菜

一名臺芥一名油菜單莖圓肥淡青色葉附莖上形如  
白菜嫩時可炒食既老莖端開花如蘿蔔花結角中有  
子本草九月十月下種生葉冬春採臺心為茹三月則  
老不可食開小黃花四瓣子灰赤色炒過榨油黃色燃  
燈甚明

菜蔞





薇



薇

薇

字說云微賤所食因謂之微

一名野豌豆 一名大巢菜

本草項氏曰巢菜有

大小二種大者即薇乃野豌豆之不實者小者即東坡所謂元修菜也

生麥田及原隰中

本草云非水草也莖葉氣味皆似豌豆其藿作蔬入羹皆宜

爾雅薇垂水

注生於水邊疏草生於水濱而枝葉垂於水者曰薇  
陸璣詩疏薇山菜也今官園種之以供宗廟祭祀

巢菜附

四川志巢菜州縣俱出葉似槐而小其子如小豆夏時種以糞田其苗可食

蘇軾元修菜詩序菜之美者有吾鄉之巢

陸游巢菜詩序蜀蔬有兩巢大巢豌豆之不實者小巢生稻畦中東坡所賦元修菜是也吳中絕多名漂搖草一名野蠶豆但人不知取食耳





蕨



蕨

蕨一名鼈

爾雅云蕨鼈注云廣雅云紫藜非也江西謂之鼈陸璣詩疏云山菜也周秦曰蕨齊魯曰

鼈埤雅云狀如大雀拳足又如其足之蹙也故謂之蕨俗云初生亦類鼈故曰鼈也

二三月生芽

拳曲狀如小兒拳長則展寬如鳳毛高三四尺莖嫩時

無葉採取以灰湯煮去涎滑曬乾作蔬味甘滑肉煮甚

美薑醋拌食亦佳荒年可救饑根紫色皮肉有白粉搗

爛洗澄取粉名蕨粉可蒸食亦可盪皮作線色淡紫味

滑美陸璣謂可供祭祀今山中處處有之

齊民要術二月中高八九寸老有葉淪為茹滑美如葵  
三月中其端散為三枝枝有數葉葉似青蒿長麓堅長  
不可食用

爾雅翼蕨紫色而肥野人今歲焚山則來歲蕨菜繁生  
其舊生蕨之處蕨葉老硬敷披人誌之謂之蕨基

迷蕨

附

爾雅纂月爾

注即紫纂也似蕨可食

本草李時珍曰紫蓼似蕨有花而味苦初生亦可食三  
蒼謂之迷蕨

水蕨

附

本草水蕨似蕨生水中呂氏春秋云菜之美者有雲夢  
之萱即此菜也

藜



藜

藜一名萊一名紅心灰藿一名臘脂菜一名鶴頂草一名落藜生不擇地處處有之即灰藿之紅心者莖葉稍大嫩時亦可食老則莖可為杖氣味甘平微毒殺蟲煎湯洗蟲瘡漱齒匿蟲搗爛塗諸蟲傷

藿藿

附

爾雅拜藿藿

注藿藿亦似藜疏此亦似藜而葉大者名拜一名藿藿

灰藿附

灰藿一名灰滌菜一名金鎖天今訛為灰條菜處處原野有之四月生苗莖有紫紅線稜葉尖有刻缺面青背白莖心嫩葉皆有細白灰如沙為蔬亦佳氣味甘平無毒治惡瘡蟲咬面黥等疾忌著肉作瘡五月漸老高者數尺七八月開細白花結實成簇如毬中有細子蒸曝取仁可炊飯及磨粉食救荒本草云結子成穗者味甘散者味苦生墻下樹下者忌用白者謂之蛇灰有毒





菜薺



薺菜

薺一名護生草

本草云薺生濟濟故謂之薺釋家取其莖作挑燈杖可避蚊蛾謂之護生草

野生有大小數種小薺花葉莖扁味美最細者名沙薺

大薺科葉皆大而味不及小薺莖硬有毛者名薺蔞

爾雅

云薺蔞大薺疏云又名薺蔞  
薺一名太薺一名馬辛

味欠佳冬至後生苗二三月

起莖五六寸開細白花結莢如小萍有三角莢內細子

名差

爾雅云差薺實疏云薺子  
味甘人取其葉作菹及羹

四月收師曠所謂歲欲

豐甘草先生即此

野菜譜江薺

生臘月生熟皆可食花  
時不可食但可作蠶用

倒灌薺

生早田采  
之熟食亦

可作  
蠶

蒿柴薺

其葉可食  
其根可燃

掃帚薺

春采  
熟食

碎米薺

三月采皆  
可作蠶

春秋繁露薺以美冬水氣也薺甘味也乘於水氣故美者甘勝寒也薺之言濟所以濟大水也

欽定授時通考卷五十九