

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部  
仁端錄卷十五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣常 楡

謄錄監生臣舒秀岐

欽定四庫全書

仁端錄卷十五

明 徐謙 撰

陳葵 剛定

疥癬門

痘痂雖落失于調理毒滯不散風邪不清拂鬱既久漸生疥癩須分虛實施治先陽明而後太陰以瀉火涼血祛風拔毒為主用連翹散升麻葛根湯解毒防風湯苦參

九外用摩風膏敷之

先有疥瘡痘後虛處而發則氣血為瘡所發至六七朝瘡盤先黑不能起灌連服內托散庶免坐陷之患若手足項頸胸背要害之處不黑或瘡顆發水泡者肺氣雖散猶或可救

痘發諸毒瘡新愈之處者陽毒重也若痘不乾紅雖重不死用

三朝期內氣虛血痺自作者用蘇葉荊芥湯浴之內服

芍藥地黃黃芪白朮防風牛蒡蟬蛻僵蠶

梅瘡破爛倍用牛黃土茯苓若痛極略加乳香平常藥  
味一毫勿用

搗搯成瘡者用百花膏塗之絲瓜葉為末摻之

痘疤紫突身熱煩渴便秘者餘邪盛也用四順清涼飲  
犀角解毒湯

疤白凹陷瘡潰不收潮熱便溏者脾虛也用四君子湯  
加黃芪防風川芎苡仁黃連外敷綿繭散

二便清調者餘毒在裡也治宜解托用黃芪防風當歸芍藥連翹金銀花

瘡久羸瘦潮熱煩渴者氣血虛津液枯也用十全大補湯補中益氣湯

風寒在表者宜解散之

衣被過煖炙燂發瘡者宜清解之

過用清涼毒為寒抑隱現者宜發其汗使瘡再發然後調理用百解散

遍身膿水淋漓者用加味解毒飲外敷茅屋末益元散  
當歸膏

治案

一痘遍身膿瘡久而肌瘦潮熱此毒已外泄宜固正氣  
為主用補中益氣湯加苡仁芍藥茯苓防風金銀花石  
斛外用水銀膏

一女十七歲痘後膿疥逢時即發用苦參當歸芍藥川  
芎防風荆芥白芷枸杞連翹蔓荊薄荷蒺藜瓜蒞丹參

胡麻首烏黃米為丸服之而愈

一順痘十二朝成膿疥身熱煩躁此毒壅失解也用當歸金銀花芍藥連翹防風牛蒡白芷苡仁而愈若失于解散多有損其肢目者

一痘正面勻朗綻突少神四肢平塌色黯漿雖滿而難收功因手足膿疥腫痛泄氣故也用保元湯加黃芪芍藥當歸牛蒡白朮陳皮防風肉桂而愈此症若單補而不保脾決不收功



一痘出膿疥後疤痕黑大有似痘疔而頭面分明初即  
疎解涼血七八日後根窠紅黑不清又用涼解十一二  
日根顆淡紅用生血溫補之味

一痘後手搔痒遂發風血瘡用苦參山梔連翹防風  
獨活苡仁黃芩蠟丸服并灸三里風池二穴各五七壯而愈  
一痘勻朗不易胖大淡白少神煩躁不寧因頭上素患  
肥瘡太盛耗泄元氣故也先用白芨膏紙封頭瘡後用  
保元湯而愈

一痘後遍身生肥瘡忽自愈而喘脹搐搦此全倒靨論  
先用升發瘡再作後用犀角解毒湯加人參而愈此症亦  
有用百解散發為丹腫者

連翹散

防風 荆芥 連翹 當歸 生地 羌活 牛蒡

薄荷 蔓荊子

苦參丸

黃連 苦參 黃芩 大黃 甘菊 梔子 防風

枳實 元參 獨活蜜丸

摩風膏

蕪荑 苦參 川椒 硫黃 輕粉 巴豆 松香

黃占 麻油煎成調塗擦之

金花散

黃栢 東丹 黃連 黃芩 大黃 輕粉 麝香 臙

猪油調塗

蓮花散

蓮花 白芷 川芎 當歸 荆芥 牛蒡 紫草

木通 甘草 生地水煎

治痘風瘡方

楊樹頭二十四個搗入雞子青桐油調塗

百草膏

羊糞煨清油調搽

頭項發核門

三陽之脈自頭而上三陰之脈自頸而還項者陰陽之

道路咽喉之管束也痘發頸項須疎若密則名鎖項其  
道路上不降下不升內不出外不入經曰出入廢則神  
機化滅升降止則氣立孤危

玉髓云患痘時有核發于頭項不拘定處或發于未痘  
之先或與痘並發名曰訶核蓋痘毒也因風寒閉塞腠  
理內虛不能送毒而出火炎上而為陽毒慎勿先治其  
毒

治毒之藥寒涼能冰毒使住外毒雖平內痘不出三四

日死矣故陽谷用木香散加氣血藥并解其毒痘大發  
綻而毒亦自退次用人參黃芪當歸芍藥川芎麥冬白  
朮連翹半夏腹皮桔梗木香生薑生地大棗連進四劑  
痘色紅活蒼蠟重出贈痘毒散喉不痛痒而全愈雖當  
夏月亦以非丁香不能攻裡驅血非大補氣血如四物  
湯加黃芪白朮白芷桔梗之類不能托發痘瘡非清涼  
如減去官桂半夏訶子前胡腹皮加入連翹黃芩射乾  
之類不能治咽喉痛也

治案

一痘十朝外左邊上齧潰爛外頰紅腫外用抑揚散同  
葱汁酒漿搗敷每日一換不用紙封內服紫花地丁連  
翹牛蒡山茨菇花粉白芍生地丹皮甘草元參桔梗貝  
母黃連黃芩川芎當歸先以金銀花一兩煎汁服頰腫  
口疳漸平月餘忽發夜熱左腮下生一核大如李子色白  
按之而疼外用礪砂一錢胆礬五分麝香半燒酒薄薄調  
勻新筆蘸塗上內服黃芩元參羌活前胡連翹牛蒡貝

母龍草甘草白芍山梔先以夏枯草一兩煎汁服連進四五劑而愈

一耳後赤腫結核寒熱頭疼體痛此感冒不正之氣所結乃時毒也用十神解毒湯治之而愈

發泡門

發泡肺熱也肺主氣合于皮毛熱毒在肺傳至皮毛故津液沸起而為泡白而空者氣虛也白而清水者氣實也紅紫血泡者血熱也氣之過盛也必噎氣之振作如



風之撓物無所不入七日及于膈則呵欠噎噎其氣漸  
洩痘即不能起發圓暈七日後若入于腹則如雷鳴便  
氣不泄尤難成漿此由氣盛而血不足故發為水泡乃  
若氣虛空泡因脾胃虛弱不能制水亦能發泡土虛水  
漬之義也當補脾順虛利水而泡自實用補中益氣湯  
加川芎芍藥茯苓車前木通或保元湯加白芍

白泡有水者乃氣實也用清肺飲或升麻湯加生地黃  
苓

氣實血熱發紅紫泡者乃毒在肝經火熾若釜中之沸湯發泡也用清肺飲加當歸生地熱甚加黃芩黃連  
氣虛畧有水者用四君子湯合清肺飲

有血多而不能化漿成泡者宜峻補其血用參歸鹿茸湯

膿窠與水泡相半者蓋肺主氣為囊胞主血為膿小兒痘多氣血有限故如是不足為異

十分之中一二分有膿者猶有生意

渾身皆泡此危症也但胃氣好而能食者亦可醫治然毒氣未散防發癰毒若光明磊落形如銀杏殼者內雖潰而可斂

紫黑血泡前後連絡此毒盛外溢肺氣絕也不治

灌膿將收時有大泡無分紅白有痘多而相并此似是而非不必慮

有向來生瘡或破傷未痊新結痕迹一旦發痘四圍叢集作泡宜細辨之此症又易作痒勿令抓破變為蝕瘡

多致不治宜先以針刺破其泡吮去惡血後用胭脂塗法合百花膏敷之痒則用茵陳熏法

初起于手足見一二粒比衆痘更覺顯大色白按之甚軟刺破乃一包清水是泡母也若失治則水泡泛溢難制初起治之無不見效用至寶飲加草薢減去川芎桔梗

腎火盛而成水泡因曾用過升提之藥提起腎火故成水泡也用知母黃栢

痘功將半而發水泡用救破爛法治之加桂皮腹皮泡至腦背者不治若標時失于解毒降火至此又不可用桂皮腹皮矣所以痘初以解毒降火為大關要也

泡破掀殼宜重用補劑泡殼之下必膿厚痂厚者方吉初起細密糊塗後成大泡清水虛漿此衛氣不斂之逆痘不久皮脫肉乾而死

灌膿時發白泡如彈子大者宜刺破以滑石末敷之仍服利皮膚間水之藥用保元湯加白朮茯苓榴皮

前後發水泡是毒盛溢于皮膚之上不治

七朝不灌膿而起水泡乃肝虛為肺所凌也當峻補其  
血用三化湯或參歸鹿茸湯

至寶飲

桔梗 前胡 山查 當歸 連翹 川芎 木香

茯神 紅花 青皮

手足水泡方

荊芥 防風 牛蒡 甘草 白芍 銀花 升麻

羌活 首烏 山茨菇在加上加川芎

痘疔門

氣弱血滯毒聚不化而成疔有之則諸毒沮而為痘害  
疔有黑白二種

黑疔者黑陷焦枯如螺螄靨陷下四圍起水如新炙瘡  
內有一粒硬核指按不動不疼或黑高如痣有根者即  
俗名鵝眼疔也若黑大而軟無根盤者是血熱焦紫之  
黑痘

白疔者色白脚硬是也色白而無根者是泡母不可誤治以致傷泄元氣

疔宜速治遲則毒透內膜須用銀針挑斷其根吮去惡血血紅易治血黑難治

疔結四肢不近臟腑者雖穿筋骨可治

疔結腹背者恐穿臟腑難治

疔結關轄難治疔結顯處易治

疔結方廣其毒峻宜解下之



疔在各部其毒緩但須解毒

自初點至收痂皆有疔患宜分虛實位次以治之

虛痘發疔若漿清結疤能食便秘調四肢發疔脾胃尚強者可治用內托解毒散服之使潰出疔根外敷生肌散

有漿清結疤食減便秘溏發疔脾胃既虛毒反勝正十四五日乾陷而死

熱毒發疔漿足壓厚壯熱煩渴能食便秘為有餘之毒不盡用四順清涼飲或神功散加雄黃大黃黃芩黃連

煎服外以拔毒膏點之立見紅活

痘破出黑血諸痘不起此症難治用月仙方活命飲外用隔蒜灸法

初點起脹時痘疔黑陷閉塞毒出之路而煩躁喘渴者以針挑破吮出惡血用胭脂納入四聖膏或四聖快斑散或涼血解毒湯加紅花木通茜根仍以保元湯調理若二便秘結用宣風快斑湯解之

收靨後有數塊水出按指不動不痛或陷下有水或疔

潰成坑內見筋骨者此餘毒在心心經失解故也用人  
參敗毒散加連翹銀花上加升麻白芷手加桂枝腰加  
杜仲足加牛膝木瓜外用珍珠膏四聖膏趙氏敷藥方  
臭加阿魏為末摻之力壯用礪砂一二釐入四聖膏腐  
去其根用象皮散敷萬應膏貼可收功

內治法

內治須服調氣養血之藥用無比散加猪尾血三五滴  
調下服後下惡血如爛魚腸葡萄穗者吉如紫黑惡血

者凶

外治法

將藥填疔孔中以滿為度其毒自散痘仍灌漿用四聖膏或二聖散或飛過雄黃同蟾酥拌勻為丸挑疔點入力壯者用巴豆一粒硃砂一分研爛點入一時突出隨以生肌散敷之長肉膏貼之收功

肺疔 先灰後黑多見于腮頰中庭嘴角手足腰腹

腎疔 色黑多見于地閣後頸耳竅腎俞腰脊陽物

秦虎疔 生于耳竅以吸其髓必煩躁詁語腦痛垂頭  
叫掣亟以鵝管石女貞子薄荷研末吹入再以馬蘭根  
寸斷塞耳門

亡汲疔 生于眼沿以燻其血必睛赤腫脹臉赤詁煩  
瞋啼號怒治如鼻疔法外挑破處用瓦松搗爛卷之

捲簾疔 腫于舌根以耗其元必煩渴詁狂怒啼手足  
掣舞臉赤舌捲喉鎖難食用銀鈎挑破出惡血苦茶漱  
淨敷龍宮丹

燕窩疔 匿于腋下以耗其氣必手垂刺痛腋下腫脹  
眼碧渴飲吐沫詘煩挑去其根出盡惡血用珍珠油胭脂塗之又服消毒飲

伏砒疔 駐于陽物馬口以熬其血痛極叫呼小便腫  
閉不通煩躁眼直豎脩時焦黑則危亟用銀硃冰片蟾  
酥牛黃麝香為末將黃連濃煎候冷調藥蘸納竅中外  
以油菜子搓捋其皮內服木通敗毒散

虺毒疔 結于尾閭以殘督脈必大便秘腹脹嘔吐惡

渴胸如墜石

火珠疔 填于鼻孔以錮其鼻必熱渴眼冷煩燥眼赤  
痰并氣難出入痘紫鈎破用黃連膏冰片調點眼角服  
瀉金散

蝦毒疔 盤于膝間灣處以爍其陰必眼赤筋束痘色  
焦紫宜亟用

匣石疔 生于手縫指陽明受毒治宜拔毒延至傳脾  
難救

注命疔 生于足心以戕其腎必腮黑腫神碧色手掣筋抽直透過足膝盤處鈎去其根盡毒血用田螺吐水調冰片點之次以慎火紫菜豆浸爛去其皮搗罨患處內服化毒丹

透腸疔 簇于肛門以傷其胃必極痛腹脹腸鳴大便祕結煩躁不思飲食宜挑破之用金銀花防風煎湯次以輕粉冰片珍珠白斂蘸塗

蜂螫疔 纏于足指縫此五氣已離也必抽筋骨硬疼



痛難行兩太陽臉痘如椒皮惡渴煩躁

治案

一痘漿清四肢發疔數處能食便調因脾胃實強以內托解毒散治之潰出疔根又用生肌散而愈

一痘漿清便瀉減食發疔二十餘處因脾胃虛弱正不勝邪毒反內攻解不致十四日死

一痘漿足發疔數處壯熱煩渴便秘能食此餘毒未盡也以四順清涼飲治之而愈

內托解毒散

人參 黃芪 當歸 甘草 白芍 白芷 連翹

金銀花 川芎 牛蒡 上部倍川芎下部加牛膝木

瓜蒌仁獨活足加防風末潰加穿山甲

生肌散

象皮 白占 龍骨煨 血竭 白石脂 乳香 沒藥

末藥 冰片 地鼈蟲 赤石脂 輕粉為末滲之

神功散

益母草花 紫草茸 蜂房 過山龍 白芍 青黛

滑石 甘草水煎調下治胎膏末二三分立見紅活

灸法

大蒜一片小艾炷灸五壯換蒜再灸灸後挑破出血

四聖膏 治唇口咽喉疔毒口牙疳

珍珠

七粒

頭髮

二分

冰片

半分

豌豆灰

四十九粒

共為末一

方有血竭硃砂雄黃

涼血解毒湯

歸尾 生地 地丁花 紫草 蟬退 番白草

人參敗毒散

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 柴胡 薄荷

枳殼 川芎 桔梗 甘草 牛蒡加荆芥防風即

荆防敗毒散

趙氏敷藥方

赤石脂 官粉 黃柏 血竭 伏龍肝 飛丹 髮

灰 蜜陀僧 乳香 沒藥 冰片

無比散

膩粉 硃砂 冰片 麝香 牛黃一方有蟾酥

長肉膏

防風 荊芥 白芷 生地 當歸 香油一筋煎加

黃占白占松香煎成入沒藥赤石脂蜜陀僧血竭

龍宮丹

冰片 硼砂 青黛 薄荷 荊芥 殭蠶 黃連為

末吹入

消毒散

牛蒡 甘草 木通 茯苓 生地 紅花 荊芥

連翹 燈心水煎

解毒湯

歸尾 生地 紫花地丁 番白丁 蟬脫

救焚散

地蜈蚣草 晒乾棟樹根 扁蓄 益母草 大血結

草 尖刀草 一名地青 紫草茸 紫花地丁 乾水煎服

奇功散

紫草茸 製胎骨服全神功散法

癰疽諸毒門

凡痘初失解發中失補托終失消散或過于溫補致餘毒蘊留陽明肌肉間骨節內幸正氣不虧內不容邪故得發出肌表輕則癰瘡重則痘毒總是餘毒血熱所致須分陰陽虛實痘期前後部位經絡治之

不治之毒有十二處

百會 印堂 咽喉 耳後 手心 足心 背脊

心窩 兩肋 六脈 陰臟

按膿用針法

輕按便痛者膿淺也針不可深重按方痛者膿深也針不可淺按之不起者膿未成也針不可早按之隨指即起者膿已成也針不可遲後以紙撚條蘸香油納入針口外貼膏藥使膿流盡

初起治法治宜發散用和解升麻湯



未成膿治法用犀角地黃湯

毒多治法要用罨法留一二處出膿弗貼膏藥服參芪  
內托散

移毒法毒發關節致命處將罨毒藥作膏敷上移下敷  
左移右

徐氏治法初起活剝蝦蟆皮加冰片麝香少許貼毒上  
即時拔出毒氣

七日前發瘰宜任之

七日後發疔不可峻攻用牛蒡荆芥當歸助氣逐毒當  
自解也

紅腫掀痛色赤熱渴脈數有力此毒盛而正氣足乃陽  
毒也用活命飲清涼解毒湯能食便秘者下之用四順  
清涼飲外敷抑揚散發熱者用犀角消毒飲便秘而發  
熱者用清熱消毒飲發渴用麥冬散

堅硬微痛或不痛肉色如故痘根白色不潰不斂食少  
便溏此脾胃氣虛乃發毒也散其寒氣則陽自斂矣用

托裡回陽散外敷玉龍膏若其勢欲潰者用鐵箍散圍方欲元氣虛寒不能消散潰爛或潰而腫不消口不飲者必須溫補

陰毒膿雖已成但皮肉腫厚不甚紅色如牛皮橘皮不即潰者須量淺深破去其膿貼膏藥引出膿血則無內攻膿腐傷筋之患用反陽湯貼關陰膏

陰毒用寒涼則氣血滯而毒益深好肉反死如內脹涼藥敗毒之劑胃寒不能運行淤血寒不能消散死肉寒

不能潰腐新肉寒不能生化矣

未發痘未發熱之先而發毒此名元陽毒宜活血解肌  
發表令其自散俟痘脹而毒自消如用敷貼之藥則痘  
發必重反致傷命用人參芎歸湯當歸活血湯和解升  
麻湯

痘起發灌漿而發毒者宜活血解毒托裡大發其痘使  
其自愈用參芪托毒飲亦不用敷藥

兒若痘多力不勝毒涼血溫補俱不可用多致不治若

痘色紅潤不犯火症者須乘六七朝時六經傳遍周而復始之候亟用托毒法托出毒一二處即保全矣連進醍醐飲二三貼方效若見標太重者用當歸桔梗白朮川芎熟地桂枝水酒全煎但不宜多用若非六七朝之期并犯火症者托亦不效

用身毒發初時熱甚須內外夾攻急消散之若成膿則不堪矣內服大連翹飲外塗三豆漿

毒游走不定亟內托之遲則攻心必死經云自陰成陽

必生成陽復陰必死

氣血凝滯于關節則毒必發于曲池委中而不散用十  
三味敗毒散

手足腕腿掀赤強不能舉動用活命飲外用黃豆末調  
敷

腿膝流注腫痛者脾虛也先用活命飲後用補中益氣  
湯六味地黃丸

腿膝腫痛膿水不止內熱晡熱體倦肌瘦此元氣復傷

也用補陰八珍湯六味地黃丸久服自愈

掀腫而軟者發于肌肉也

肉色不變者發于骨也

根赤而作痒者血虛也用四物湯加丹皮

根赤而作痛者血熱也用四物湯加金銀花連翹

色白而作痒者氣虛也用四君子湯加芍藥當歸

色白而作痛者氣熱也用四君子湯加金銀花連翹黃

芩

色白而不掀痛者氣血俱虛也用托裡散

毒頭紅腫者宜涼血

卵色白者宜溫補

痘多紅活發毒則生根顆灰白毒多難治

未成膿而腫痛者用荊芥敗毒飲或仙方活命飲活血  
解毒湯解毒內托散敗毒散排毒散

氣虛食少者用十宣散流氣飲

毒淺小者用小柴胡湯加生地黃湯又加神功散



不成膿不作腐者用八珍湯

已成膿者用消毒飲加黃芩連翹當歸芍藥上引用升麻下引用牛膝或托裡會膿散加人參連翹川芎當歸已潰而膿厚不痛者用十全大補湯加金銀花連翹

膿清反痛熱渴倦怠者此氣血虛甚也用十全大補湯膿盡而不斂者脾氣虛也用六君子湯

膿不乾而煩悶者用黃芪六一湯

痘後癰疽手足相發內服五香歸芪散外用熨洗法

肝虛則毒入目肺虛則毒成疥腎虛則毒發骨節脾虛則毒壅肌膚

毒流入脾則發于足腕臑用消毒飲解毒內托散必勝膏

毒流入肺則發于手腕臑必氣粗喘急胸突或發口唇用如聖散五福化毒丹解毒內托散雄黃解毒丸十奇湯

毒流大腸則便垢膿血用駐車丸阿膠丸

毒流三陽經則為瘰癧結核必腮頰疼痛頭痛用宣風散荊防敗毒散外用抑揚散同葱頭酒漿搗敷

落痂時預覘發毒

透唇靨起上下兩分然後徧靨盡者無餘毒如靨有間斷或花靨或痘顆邊有一線紅暈者此毒未盡也雖輕頭上亦必發小毒用參芪內托散

痘毒流注

痘後元氣不足不能逐毒歸并一處故致流散漫腫結

塊多是餘毒血熱所成當別類而治

煩渴壯熱左尺脈浮而無力此火熾血燥也用六味地

黃丸

眼合不開身腫不消壯熱不清此毒在諸經也

盜汗發熱口渴此毒在心也

睡中驚悸多怒此毒在肝也

耳尻尚熱此毒在腎也

毒不赤腫不痛成膿不潰皆元氣虛也當先補而後針

之不使毒氣內攻氣血脫陷用人參托裡散

不赤腫而清水奔流用十全大補湯

腫硬未成膿者浸生豆搗塗膏汁或鷄子清調塗

膿厚而元氣不脫者用元參赤芍人參官桂連翹花粉

甘草節角刺山甲

膿出而內熱晡熱者血氣虧也用八珍湯加金銀花

凡諸毒只宜留一二處出膿以洩其毒餘當圍退用玉

龍膏毒法

凡藥以固元氣涼血解毒為主用十宣托裡散分上下  
用藥一日不可緩上引用赤芍甘草節連翹桔梗升麻  
下引用葛根檳榔牛膝助以貝母白芷金銀花瓜蒌根  
發寒熱用知母黃芩黃柏便秘用大黃

治案

一痘漿足為尸穢氣觸倒靨焦黑四肢腫痛幸其能食  
便調正不容邪發一痘疽用內托解毒之味而愈

一兒七朝順痘有行漿之勢兩臂腫大如瓜幸能食便

調此少陽經虛毒滯而不散也補其陽則腫自愈用人參茯苓肉桂當歸芍藥白芷羌活防風人中黃治之漿足腫消而愈

一痘症全前漿雖滿痂腫處成膿竟損一目

一痘症同前兩臂腫痛用解藥而不充毒不退反寒戰危篤此治其標而失于補托也以保元湯加丁香肉桂白朮橘紅治之漿足而痂厚解托成膿而愈

一痘漿雖滿而四肢清水痂薄如麩二十日而肩臂腫

痛有謂餘毒而用養血解血毒毒不退而反倦怠此陰虛而毒滯不化也大補氣血解毒使氣血調暢毒一處出膿則化矣用四君子湯加陳皮芍藥當歸白芷羌活連翹金銀花調理而愈此症若常用解毒則傷脾胃若嘔瀉厥逆耗散元氣者用附子理中湯加肉蓯朮香枝熱腫痛者用四君子湯加金銀花黃芪白芷若常解毒不固元氣只以圍藥塗敷腫雖退而毒內蘊非損手足則腸脹喘急而死



一痘密而內強過補而生癰煩燥口渴先以三黃九利之再用清解之味腫消而愈

一兒發癰于小腿下年餘尚潰腐不能收口此至陰之下無陽氣充托膿血氣寒虛弱也宜補助元氣用千金內托散加牛膝槓榔首烏土茯苓潰出嫩骨收口而愈蓋毒久不散凝結成骨與地四生金之義同斷

一痘毒流注四五個于臂肩之上痂薄少神粘着不脫此氣虛不足也用十宣托裡散外用針刺破用吸筒吸

膿以玉龍膏圍之而愈

一痘毒出清水六脈微弱衛氣虛寒用保元湯加肉桂  
附子白朮而愈

一痘大腿腫痛此蓄毒鬱于肉分丹腫也用當歸地黃  
丹皮連翹白芷木瓜大黃

清涼解毒湯

當歸 生地 丹皮 連翹 木通 桔梗 牛蒡

四順清涼飲

赤芍 獨活 白芷 菖蒲 紫荊皮

清熱消毒飲

黃連 梔子 連翹 歸尾 川芎 白芍 生地

金銀花 甘草

托裡回陽散

陳皮 升麻 柴胡 白朮 人參 附子 黃芪

甘草 當歸 肉桂

玉龍膏

草烏 南星 良薑 白芷 赤芍 肉桂 葱酒調塗  
鐵箍散圍方

廣膠 大黃 南星 半夏 白欽 黃丹 乳香

沒藥好醋半椀化膠為丸臨用醋化圍之

又方

鳳凰退燒灰調塗

又方

白芨 白欽 貝母 菘豆粉 黃栢 芙蓉葉好醋

調塗圍

反陽湯

紫花地丁晒乾八兩酒三觔煮至觔半隨量與服酒醉為度

關陰膏

鐵銹 輕粉 麝香 白松香 麻油煎膏

和解升麻湯

羌活 防風 人參 芍藥 甘草 川芎

當歸活血湯

當歸 赤芍 紫草 川芎 紅花 木香 血竭

參芪托毒散

人參 黃芪 白朮

卷毒方

橘葉搗自然汁白酒藥等分搗成膏卷毒上

醞醕飲

退朮 生地 桂枝 防風 殭蠶 白芍 落花生

熟地

消毒飲

荊芥 牛蒡 生姜一方有金銀花雄黃

解毒內托散

荊芥 防風 當歸 黃芪 赤芍 木通 連翹

甘草節 金銀花

必勝膏又名拔毒膏

馬齒莧汁 豬油蜜共煎膏一方有菘豆赤小豆

又方

葱白搗如泥加蜜貼之誤食之則殺人

又方

貝母 赤石脂 白石脂 白芨 白歛 龍骨 猪  
脊髓共搗為膏

雄黃解毒丸

雄黃 麝金 巴豆

十奇方



人參 黃芪 川芎 當歸 防風 白芷 厚朴

桔梗 甘草 官桂

駐車丸

當歸 川連 阿膠 乾薑

阿膠丸

阿膠 茯苓 川連

托裡散

人參 陳皮 川芎 白芍 熟地 茯苓 黃芪

當歸 甘草

荆芥敗毒飲

升麻 乾葛 前胡 紫蘇 川芎 羌活 防風

荆芥 薄荷 桔梗 枳殼 牛蒡 蟬退 山查

甘草 地骨皮

排毒散

大黃 歸尾 白芷 沉香 木香 炒黑穿山甲共

為末

流氣飲

人參 黃芪 當歸 桔梗 厚朴 白芷 甘草

防風 川芎 桂心

小柴胡湯

人參 柴胡 黃芩 生地 半夏 甘草

方

乾絲瓜連皮子燒灰研末糖調服

敷毒方

蜒虻搗敷

又方

磁器末

松香

脂油調塗

又方

嫩松香全蜜搗敷

又方

南星

五倍子

大黃

硝

醋調敷

托裡會膿散

川芎 芍藥 紅花 桃仁 防風 白芷 乳香

沒藥 大黃

秘葉散

水龍骨 白欵 蚯蚓泥 白芨 芙蓉葉 皂角

山茨菇 葱頭 生薑 草麻 乳香 沒藥 黃豆

末 黑豆末 菘豆末共搗溫湯燉熟塗圍中留一孔

五香歸芪散

沉香 木香 丁香 芸香 藿香 桂枝 蟬退

當歸 黃芪 炙甘草 連翹 防風 升麻 白芍

甜瓜蒂水煎

燂洗法

乾荷葉 甜瓜蒂 芫荽子濃煎洗之

十宣托裡散

人參 黃芪 當歸 白芍 茯苓 白朮 白芷

連翹 甘草 角刺 金銀花

元海痘毒膏

蜈蚣三條 蛇殼一條 川山甲五片 銅青 飛丹各一兩 元參 丹

皮各五錢 煉白松香六兩 菜油半 煎膏一方加磁器

王臨川方

陳年芸香紙捲蘸油燒滴下如漆者加磁椀砂少許調塗

許玉華方

廣膠一兩 頓化 煉松香 猪板油煎膏

褚少泉方

五倍子

入銀硃在內封煨

龜板尖

煨

面粉

昇

松香

醋莧汁製

黃占

白占

麻油一飭煎膏

太乙膏

元參

白芷

當歸

肉桂

赤芍

大黃

生地

紫草

女髮灰

荊芥

防風

桑枝

槐枝

桃枝

柳枝

麻油

黃丹

松香

乳香

沒藥

鉛粉

黃占

白占煎膏

破棺丸



大黃

二兩半  
生半熟

朴硝

甘草

各一兩  
六錢

蜜丸沖酒服

提毒散

桑寄生

生薑

人參

玄參

白朮

續斷

鳳凰散

治不收口

暈死鵝

煨

鳳凰花

冰片

黃丹

輕粉

枯礬為末

摻之

平肺散

桑皮

杏仁

半夏

蘇梗

荆芥

廣皮

茯苓

青皮 人參 地骨皮 知母 五味子 甘草 生薑煎服

參芪湯

人參 白朮 蒼朮 陳皮 當歸 神曲 甘草炙

五味子 黃芪炙 黃柏 升麻

加味解毒散

金銀花 黃連 連翹 漏蘆 梔子 白芷 當歸

防風 甘草

倪心宇內清痘毒方

黑黃牛屎尖

煨

血餘灰

大黃黑糖為丸每服一九白

湯化下

獨活湯

羌活 獨活 荆芥 防風 牛膝 紫草煎服

一提金

乳香 沒藥 牙皂 人涎 麝香 琥珀 硃砂

雄黃 蟬蛻 殭蠶 蜈蚣炙 每服半分至二分酒下

施季泉餘毒方

人參 犀角 茯苓 金銀花 甘草 羚羊角 珍珠蜜丸日進二服

托裡挑肌散

黃芪 當歸 白芷 槐角 防己 角刺 牛蒡

花粉 甘草節 蟬退 苡仁 羌活 獨活 連翹

生地 元參 殭蠶 木瓜 金銀花 加棗豆二百

粒 生姜 一片水煎

傅心生肌散

象皮 白占 龍骨 血竭 地鼈蟲 白石脂煨乳

香 沒藥 冰片 輕粉 赤石脂 共為末 摻之

陳敬山收口摻藥方

鉛粉每鉛一兩 鎔水銀 五錢 冷研成粉 松香陳醋煮 乾三錢 白龍骨煨五 白螺

螂煨五 輕粉一錢 研製 冰片二 滑石一 研勻 摻之

又方

蘆甘石便煨 研末 摻之

蠲毒散

人參 黃芪 當歸 白朮 白芍 羌活 連翹

元參 麻仁 金銀花 花粉手加桂枝足加牛膝煎

服

內潰疽毒方

楊樹菌不大不小者用蜜乳酒共浸焙乾為末或酒或湯送下可消可潰可收

圍藥方

黃栢 大黃 紫花地丁 白芙蓉葉共為末醋調

又方

烏檣樹根皮 白芨 白欵 芙蓉葉 赤小豆 金線重樓草 五倍子 野葡萄根醋調

文蛤散

南星 大黃 朴硝 五倍子醋調

烏龍膏

芙蓉葉 五倍子 皮硝 陳小粉 黑乳香 沒藥

射香 鷄子青調圍

朱少泉方

初起用蟾酥 冰片 射香酒調塗頂上

已成者用醋製松香 馬齒莧 龜板尖 灰鷄子青

調

又方

白豆 菘豆 白芨 白斂 胆星 鬱金 牡蠣灰

馬屁勃 煨 共為末葱汁蜜水調圍



板黃門

黃者脾土之正色若氣得以衛血得以榮自然飽滿黃活倘陰陽既離泉毒猖熾根窠薄劣房囊痿瘦則漿板膩灰滯乾蠟而不明以手抵之凝結板定此臟腑痿而陰陽絕也須分部位先用歸身黃芪煎酒次入蟬蛻殭蠶為末調服或澄泉散自然融活

方廣天庭板黃若餘部皆潤活則腦發癩

腮臉板黃若餘部潤美則肩阜發癩

肚腹板黃若餘部潤活則曲池發癰

背脊三里板黃若餘部潤美則兩軸發癰

板黃死症

尻骨 遍身 兩肋 陽毬 眼眶 唇舌 頸項前  
後

附痘瘡方

艾葉薰之桑葉薄荷湯浴之自去

血游門

元氣虛弱毒火逼血散漫于肌膚而為血游非丹非斑不能附痘成漿矣

標點血游乃火盛也痘必不起不漿用鎮陰丹

漿期血游乃虛極也痘必不膿不靨用返陽丹

靨期血游乃毒血散漫也治宜解毒


鎮陰丹

蘆根 黃芩 山梔 連翹 元參 生地 荊芥

歸身 乾薑 山查

返陽丹

人參 黃芪 當歸 生地 陳皮 屋游



仁端錄卷十五

欽定四庫全書

子部  
仁端錄卷十六

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣常循

謄錄監生臣舒秀岐

欽定四庫全書

仁端錄卷十六

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

正疹門

疹子之名隨地各異江浙謂之痧子新安謂之麻子北地謂之疹子其症以透發避風節食解毒為主若以易出易沒而忽之災青立至出現三日身和色淡者為順

從頭至足俱出者為齊頭面最多鼻梁一直上下俱有者為透以次收沒者為吉

疹斑水赤癰丹各別歌

疹如麻子斑如錦水痘如珠赤色紅隱藏不現亦不沒丹突如雲片塊全

原疹賦

疹雖胎毒多帶時行先發于陽後發于陰毒盛于脾熱流于心臟腑之傷肺則尤甚始終之變腎則無症憎寒

壯熱有似傷寒眼胞困倦而難起鼻流清涕而不乾咳  
嗽噴涕少食煩渴身疼氣急嘔吐泄瀉腮紅眼赤邪目  
視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其形若  
疥其色若丹出現三日漸沒為安隨出隨沒喘急須防  
根顆若腫兮疹而無癰皮膚如赤兮疹以夾斑如錦鱗  
明兮十有九效似煤灰黑兮百無一痊毒欲發盡而勿  
留疹欲出透而無病或邪氣之鬱遏兮留而不去或正  
氣之損傷兮困而未伸毒歸五臟變有四症歸脾胃兮



泄瀉不止而變痢歸心肝兮煩熱不退而發驚咳嗽久  
而出血兮毒歸于肺牙關爛而疔蝕兮毒歸于腎肺受  
風寒忽生喘急心肺火燦口舌生瘡毒為食滯腸鳴腹  
痛肺胃蘊熱津液長乾發不出而煩躁兮不久即死黑  
不變而詘妄兮必不復生氣蒸蒸兮色赤痢滴滴兮氣  
腥羸瘦骨肉之氣脫癰癥智識之神昏喘急兮胸高肩  
聳疔爛兮漏腮缺唇休誇當世之妙手難留一息之遊  
魂更有恣食醎酸咳嗽痰涎之不已喜啖辛燥火熱焰

灼之不寧甘甜過而齒齲生冷多而糞清鷄易生風魚  
能動火食之不節風火相生邪反滋甚兮斑疹不息毒  
反深入兮疫癘再經病齒終身兮癩癩時發鼻常鼽鼻  
兮日常赤疼洩數短澁兮乃小腸膀胱之受熱便溏垢  
蠱兮必脾胃倉廩之被焚哮喘炎上逆氣丹瘤燥灼赤  
形唇舌疔糜兮心脾殘焰未息咽喉腫痛兮管鑰餘燼  
猶存皮焦髮槁榮衛之液已竭為腫為熱風寒之客已  
深疹後多痢兮熱毒移于大腸咳嗽喉痛兮痰氣聚于

心胸若痧疹而口渴心煩法要生津養血飲食減少治宜調胃和中餘症不常臨期通變

治疹賦

微汗常出熱勢越而不留清便自調邪氣行而多壅滕理鬱即當發散腸胃秘亟與疏通衄反解邪利反疏毒所喜者身上清涼所怕者喉中腫痛飲水頻法在生津養血飲食少方須救胃和中出之太甚發表為貴出之過密解毒為先母伐天和勿傷歲氣溫補須防助邪寒涼

宜顧傷胃應出不出兮初升麻次通聖奪命大發而有  
準應收不收兮初葛根次化斑涼膈大解而最靈色淡  
白兮為虛四物去川芎加紅花桂枝色紫黑兮為熱化  
斑去人參加元參燒屎奪命發斑之聖藥無價解疫癘  
之神方散毒防風開發轉關之將連翹解毒制伏降虜  
之兵如錦爛漫兮服化斑而艷斂似火薰蒸兮飲涼膈  
而熱清咽痛兮甘桔牛蒡止咳嗽更能潤肺弱赤兮導  
赤芍藥定驚悸又可涼心便秘兮胆導承氣便秘泄兮猪

苓黃芩大渴兮膈焦置栝萋于白虎苦煩兮裡熱如山  
梔于安神熱不除者柴葛合乎四物或調元湯而加麥  
冬知母若無作搐濟以抱龍鎮驚咳不止者杏蒹全乎  
阿膠或五拗湯而加茅根地黃若無帶血啣以補肺大  
平注下兮異攻猪苓澤瀉虛滑者大加參苓滯下兮黃  
連當歸白芍休息者少與真人惟有牙疳之一症元呼  
走馬之名初息臭而內腐漸血出而穿齦內服地黃三  
黃兮制其火焰外擦文蛤溺白兮殺其蠹蟲齒牙若脫

落兮崩沙之勢可畏聲音若嘎啞兮孤感之症難明氣血  
已虛八物增減而可飲水穀不納二陳斟酌以堪行欲  
定良方藥性宜別荆芥防風發腠理之邪留升麻葛根  
開榮衛之蘊熱人參補氣地黃涼血黃連入心而瀉火  
黃芩入肺而定喘元參石膏治邪火之浮游梔子連翹  
開毒火之鬱結括蕁潤肺止嗽須合麥冬知母降火生  
津必同黃栢芍藥和其腹痛白朮燥其脾泄治溺赤兮  
苓通醫咽痛兮甘桔辰砂可鎮神驚硝黃以通秘結牙

金匱要略卷之六  
卷十六  
疔疔蛤配其溺白喉秘射乾助以鼠粘五味杏仁定喘  
氣薄荷竹葉解膚熱火燒人尿蜜炙麻黃發斑毒之出  
現今邪毒之抒張枳實山查消脾熱而化毒兜鈴地骨  
清肺熱以回瘡消腫定喘兮葶藶取效活血止痢兮忍  
冬最良

原疹論

孫一奎曰疹子係生初淫火與痘同出命門兩腎中間  
有命門穴臟腑之本十二經脈之根三焦之原呼吸之

門此太極之理而陰陽五行係焉天之癘氣一動則所稟之毒隨之而發陽感之則出疹陰感之則出痘陽浮淺故易出易斂然而實成于陰蓋疹非血濟則氣何依烏能收斂陰陽所以互為其根也昔人謂痘出于臟疹出于腑皆非也疹出于腑則涕嗽毒從毛竅而出心肺位高故火症見于上部為多是干于臟矣痘與疹皆出命門但分陰陽耳痘屬陰故多虛寒而可溫補疹屬陽故多實熱而可清解發得毒盡則無內攻故服藥起居



不可閉塞其毒亦不得盡情發洩以遺後患

疹症先動陽分而後歸于陰經故標屬陰而本屬陽其熱也氣與血相搏故血多虛耗其治也先發散行氣而後滋陰補血

疹以六時收者非也必出三日後體漸和疹漸收者吉若一出即收變患立至

疹類不同有中府之正疹有癘氣之發疹有風寒之發疹有內傷之發疹有胎熱之發疹

遍身點點如珠色紅似散不散往往成狗癬疥此胎毒似疹也不作疹治

繆仲淳曰痧子者手太陰肺手陽明胃二經之火熱又感時行瘟疫之氣故發也其症咳嗽嘔涕痰涎口渴嘔吐煩悶躁亂神昏咽痛唇焦眼中多淚治宜發散清涼為主辛散之味如荊芥西河柳葛根麻黃牛蒡石膏清涼之劑如元參竹葉花粉薄荷青黛甘寒之藥如麥冬蔗漿天冬生地甘草苦寒之藥如黃芩黃連黃柏貝母

大黃

痧疹不宜隨症施治惟當解肺胃二經之邪熱

疹家禁忌

一忌溫補

多用溫補

原缺四字

如人參黃芪白朮

二忌辛熱

多用辛熱反能塞毒如麻黃桂枝

三忌悍燥

熱甚煎血元氣虛耗如桂附之類

四忌鹹酸

食鹹易成哮喘食酸疹沒太早聲音不清

咳嗽成癆

五忌驟用寒涼 雖足以解外熱然適以遏內熱

六忌生冷風寒 遏抑肌膚腠理成麻風痧癆

七忌葷腥辛辣 食雞則終身起粟如鷄皮遇出疹之

時重複出疹食猪肉亦然食蝦蟹則發不透食辛熱則

易驚食煎炒則易泄瀉

已上禁忌須守四十九日重者百日一有犯者終身固疾

疹家時令

疹雖胎毒亦由疫氣故必先知歲氣次順時令

溫暖時月以辛涼發之用防風解毒湯

大熱時月以辛寒發之用黃連解毒湯

太寒時月以辛溫發之用桂枝解毒湯

乍寒乍熱時月以辛平發之用升麻葛根湯

疹家形色

凡疹多于耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而勻淨色以淡紅為輕

色紅無火化也以化斑湯為主人參白虎湯為佐

色白血不足也用養榮湯

紫赤乾燥晦暗不明火毒熾也宜養陰退陽滋陰涼血  
則熱自除用六一散大青湯元參解毒湯

色黑熱極至重也勿妄施治惟燒人屎可救大便秘者  
亟疏通之

輕疹

顆粒勻淨淡紅鮮潤上多下少五日而出微嗽而出透

發三日漸漸隱沒

重疹

大熱而出紅紫暗燥咽喉腫痛頭面不出不食便秘感  
冒風寒以致早沒喘脹瀉痢

死疹

黑陷乾枯隨出隨沒身熱腹脹面色青白鼻清糞黑鼻  
煽口張目無神光氣急喘促心頭翕翕鼻中出血不省  
人事通關無嘔眉豎胸高唇燥舌烈搖頭舞手鼻爛唇

穿牙疳漏頰鼻梁發點皆死症也

### 治喘嗽之疹

喘者邪壅于肺也勿用喘藥大忌麻黃用之益喘用竹葉石膏湯加西河柳元參薄荷凡喘而嗽者易治喘而不嗽者難治

汗出大熱而喘甚者內熱甚也用杏仁石膏甘草

夏月身熱頭疼喘嗽無汗者雖屬夏令實為風寒閉塞也宜汗之用升麻湯加羌活白芷荆芥前胡知母桔梗



用前方得汗疹透而身熱者用香茹飲合化斑湯

夏月熱甚煩渴兼暑毒者用香茹飲合枳殼湯

喘滿便秘者用前胡枳殼湯加大黃黃芩或小承氣湯  
防風通聖散

治寒抑之疹

冬月大寒抑鬱不出者用白虎湯加麻黃

風寒閉塞不出身熱咳嗽嘔吐不食用麻黃葛根湯消  
毒飲治之

治訖語之疹

發熱時煩喘訖語用升麻葛根湯調辰砂六一散

訖而小便不通者用導赤散

訖而小便如泔者用四苓散加木通車前

訖語如狂者用解毒湯調辰砂六一散有痰加貝母有熱加青皮柴胡咳嗽加麥冬知母百合

治汗多之疹

毒從汗散不可止之但汗出太過恐神脫生變用當歸

六黃湯加浮麥

治血多之疹

毒從血解不可止之若衄血太多此火迫血妄行也宜解之用茅花湯加元參草霜

衄無吐血輕者用黃芩湯加黑梔童便重者用涼膈散加生地黑梔童便

治水蓄之疹

口渴而恣與湯水則有此症

水入于肺則為喘為渴用葶藶杏仁

水入于脾則為腫腹為自利

水入于胃則為嘔用四苓散

水入于心則為驚悸用赤苓燈心湯

水入于肝則為腸痛用芫花

水入于腎與膀胱則為小便閉陰囊腫用車前木通

疹前症治

凡用發藥而疹即出者為順自頭至足俱出者為齊頭

面最多鼻梁一直上下俱出者為透

發疹之藥宜用升麻湯宣毒發表湯寒則加麻黃紫蘇羌活川芎熱則加黃芩蔥白生薑元荈使腠理開發微汗潤澤庶免熱毒閉遏若出不快不透再用升麻葛根湯小柴胡湯麻黃湯加發藥再發之

發表不出用麻黃山梔黃芩黃連大黃連翹牛蒡石膏蟬退紅花或消毒飲

發熱時或嘔吐或自利或滯下此毒火內迫也用竹茹

石膏湯以治吐用升麻澤瀉湯以治利

毒重而裡急後重滯下者用黃芩芍藥湯加黃連生地  
木通人參枳殼大黃或黃連清肺湯

疹出稠密紅紫而痢下清水此陽毒得洩吉兆也疹透  
則瀉止矣用升麻葛根湯或平胃散加連翹或解毒湯  
合四苓散

瀉而喘嗽溺赤澀者用柴苓湯

瀉而煩渴者用白虎湯加蒼朮猪苓

不熱不渴食少二便自利疹色淡紅此虛寒危症也方議溫補或無收澀

疹已收瀉不止身壯熱此疹未必盡也仍用發藥如升麻葛根湯解毒湯之類若用訶子肉蔻之澀藥則生他變

疹出而咳嗽口渴心煩者乃毒乘心肺發未盡也宜瀉心肺用瀉白散加花粉連翹元參黃連或黃連杏仁湯人參白虎湯

發熱時口渴不可恣與湯水宜生津解毒用菘豆燈心炒米湯人參白虎湯

咽喉腫痛不能飲食者毒火上熏也不可妄針出血用牛蒡湯甘桔湯加連翹牛蒡或十全散玉鎖匙吹之

咽喉澆水唇燥舌胎者毒留心胃也用黃連解毒湯加牛蒡

咳嗽氣促宜清金降火用山梔茯苓桔梗石膏知母瓜蒌麥冬杏仁牛蒡元參竹葉骨皮虛則加人參



疹沒太早

疹出一日而忽沒者風寒所遏也不亟治必舌白唇濕胃爛而死用消毒飲升麻湯或杏仁石膏連翹荊芥防風羌活枳殼甘草以發散之縱不復出大勢自安然後隨用黃芩黃連山梔石膏柴胡葛根薄荷連翹牛蒡青黛滑石知母黃栢元參人中黃之類治之若少緩非喘脹而死即犯口疳下痢煩燥等症

疹沒太遲

疹出三日漸收為佳若連綿數日不收者必外發未盡  
內有寒熱也宜清利之則熱自解疹自消矣用化斑湯  
三味消毒飲加元參桔梗石膏四物湯加清利之藥有  
失血者加犀角汁

孕婦出疹

出疹熱毒墮胎胎多受傷而母無恙者以疹與痘不同  
痘宜內實故胎去而母亡疹宜內虛故胎去而母安究  
以母子兩全為妙

出疹以安胎清熱為主用黃芩四苓湯加黃芩白朮砂仁蘇梗腹皮

胎氣上冲多服前方又用苧麻根艾煎湯磨枳榔服

熱甚墮胎此危症也先用四物湯加減後用疹家解毒藥

疹後症治

疹毒貴早發散遲則災禍立至後有餘邪均為凶候總以解毒消毒為主

疹後元氣弱忌用人參白朮宜用白芍甘草扁豆青黛  
山藥麥冬桂圓多服自強

疹家嘔吐有發散之妙不必施治若疹後煩熱嘔吐則  
毒尚留連肺胃也用化斑湯解毒湯便秘者少加大黃  
傷食者用四君子湯加消食藥傷暑者用四苓散加黃  
連香茹切忌木香豆蔻丁香乾薑肉訶子

疹後因火毒煎熬陰血虛耗以致午後熱甚者治宜滋  
陰清火用清胃解毒湯

胃熱而發熱連綿者用集聖丸胃苓湯

餘熱未盡日夜煩躁詬語狂亂者用辰砂六一散辰砂  
五苓散

疹後潮熱似瘧者用小柴胡湯加清肺養血之藥

疹後壯熱咳嗽便秘煩熱者此疹邪不解也用三黃丸  
清膈散金花丸或知母麥冬前胡元參黃連當歸花粉  
之類

身熱煩渴不已此虛煩也用竹葉石膏湯去半夏加乾

葛花粉熟雖退而嗽渴不止者用沙參麥冬貝母五味  
知母陳皮花粉桔梗甘草

疹後壯熱漸至羸瘦搐掣悶瞽晝夜不寧此熱在心肺  
二經也用養血湯安神丸

疹後壯熱煩躁驚搐悶瞽此血耗毒乘心肝也宜養血  
安神四物湯加麥冬棗仁燈心甘草龍胆茯神辰砂黃  
連石菖蒲淡竹葉

痘後中氣虛乾嗽便溏減食潮熱治宜溫補用六君子

湯

疹後熱毒入胃久而不散致成牙齦黑爛血出而為走  
馬疔兩頰浮腫穿頰破腮缺唇破鼻聲啞不食為崩沙  
狐惑之症矣用仲淳牙疔方或用人中白蘆會史君子  
龍胆草黃連五靈脂蒸餅為丸服之可以清胃外用文  
蛤散雄黃散鴉片吹疔散

狐惑用牛黃散金花丸

牙疔紅腫用清胃湯合甘草桔梗湯

疹毒不盡潰爛乾嗽不已此毒乘心胃也舌白至唇濕處者胃爛不治未至胃爛者用人參清胃湯吹入人中白散

疹後補益太早口疳痰嗽身熱腹飽用清胃湯加枳殼腹皮

疹後瀉痢皆由熱邪內陷也惟宜升散大忌止澀仍用升麻葛根白芍甘草扁豆黃連滑石西河柳山藥黃芩為丸服



積熱移于大腸而泄痢者用四苓散加黃芩黃連芍藥  
苡仁滑石甘草

瀉痢壯熱煩渴痢下鮮血不止用白頭翁湯

痢下膿血裡急後重先用三黃丸次用黃連解毒湯加  
金銀花更效

脾胃虛氣滯下不止食少脈緩肢冷用理中湯歸芍六  
君子湯而不效者口噤而死

疹初瀉痢疹後變患休息痢不論赤白皆餘毒留于大

腸也實者用三黃丸香連黃芩芍藥湯虛者宜補

疹後喘嗽此餘毒未盡也用清肺飲麥冬清肺湯仲淳  
疹後喘嗽方以清餘熱熱消痰解勿用收斂之味

嗽喘連聲飲食噎出或咳出血此毒乘肺也用麥冬清  
肺飲加連翹此症若胸高如龜氣喘衄血搖頭扭頸面  
青黑暗者不治

疹後壯熱咳嗽痰血此毒留肺胃也用黃芩黃連知母  
梔子元參花粉人中黃

喘嗽連聲但無血不噎飲食者此非肺毒不可純用清肺之藥用養陰湯

發散大過致肺氣虛耗嗽不連續者用小異攻散加麥冬五味貝母桔梗

乾咳潮熱便溏減食此中氣弱也宜溫補之用六君子湯

喘嗽而實者用葶藶丸虛者用清肺飲

疹後乾嗽久而龜背龜胸足腿俱細者蓋腎衰髓枯虛

邪入內而成此痼疾也先以防風驅其邪後以八味地黃丸加當歸人參杜仲牛膝石斛鹿茸萆薢首烏兔絲子苡仁外用驅風壯筋活血膏藥貼患處又灸肺腧膈腧二穴

龜背龜胸而脾肺不足右脈緩弱者先用補藥俟脾土稍固再用前藥治之則漸壯漸平但不能如舊耳

咽喉腫痛此餘毒不解也用甘桔湯加牛蒡石膏元參射乾外吹葛槿散

疹後聲啞咳嗽身熱久而不愈此餘邪未盡肺金受尅故也用清金降火湯加竹瀝薑汁或甘桔牛蒡湯加蘇子前胡桑皮杏仁知母元參麥冬瓜蒌

心腹作痛此熱毒為食積壅滯也多致下痢宜于解毒藥中兼消化順氣之藥

別無他症猝然心腹絞痛汗出如水此元氣弱偶中惡也朝發夕死或用蘇合香丸

疹後兩目赤腫壯熱煩渴此毒乘肝胃也若失治多致

喪明用清胃解毒湯

疹後生瘡此餘毒未盡也用金銀花連翹荆芥元參甘草生薑生胡麻黃連木通

疹後餘毒壯熱煩渴宜先以葛根湯驅邪次以犀角地黃湯涼血

肢節疼痛發癩名曰沙毒變黑成痧疔與治毒同法

疹後餘毒二便失血用犀角地黃湯合解毒湯或四物湯加山茵山梔木通犀角利其小便使熱氣下行衄血

用茅根湯

疹後不食脾虛不能磨食也用四物湯加神曲砂仁

治案

一兒身熱喘脹以外感治之不效內傷治之亦不效視其背隱隱赤色乃疹也用麻黃湯表之頭面不出而死一兒身熱似痘遍身報點沈虛明黃錦雲皆以為痘黃綺雲年甫十二未習醫獨以為疹父詬之對曰兒聞父言疹為肺胃風熱今兩鼻流涕豈非疹乎已而果然後

成名醫

一疹出紫色喘嗽穢瀉不食用解毒飲挑痧法而愈

一疹出紫色便秘溺澀煩躁悶亂用大柴胡湯利之而

愈

一兒過于風寒疹不易透用桂枝湯加葛根麻黃前胡  
又用厚被裹之以大劑防風湯熏床下以芫荽防風湯  
浴頭面手足以芫蘘芫荽湯夏之而愈

一兒身熱頭疼骨痛咳嗽喘急嘔噦不食乃傷寒而無



出疹也治若少緩雖透必變紫黑悶亂而死用百祥散  
十神解毒湯而愈

一兒出疹而恣食停滯腹飽便秘壯熱詰語用大黃枳  
實瓜蒌厚朴黃連甘草利之而尚喘嗽脈遲肢冷又用  
附子理中湯歸芍六君子湯而愈

一兒疹出表散後肌膚隱隱成片又為風寒所鬱變渾  
身青紫煩躁悶亂喘脹欲出不出用麻黃桂枝湯加葛  
根得微汗而愈

一兒疹半出壯熱煩躁喘脹悶亂乃出不透而內攻也  
用麻黃甘草桔梗前胡葛根荆芥牛蒡枳殼疹出二三  
番又用養陰湯加人參不食用陳皮山藥及麻杏膏而  
愈

一兒疹隱頭面不出面青喘脹悶亂右寸脈微此正氣  
虛不能升毒也用麻桂枝湯加人參又用防風元參湯  
及浴法而愈

一疹出盡而壯熱秘結喘脹詰語此毒壅未盡也用黃

連栝萸枳實石膏桑皮知母人中黃而愈

一兒汗出疹透猶喘不止亦邪壅也用麻黃杏仁石膏而愈

一疹出咳嗽喘急用大無比散小無比散即喘定神安此熱毒從小便而出也

一兒仲春出疹誤服寒藥生梨寒鬱而沒喘悶面青肢冷聲啞昏暈用麻黃湯加葛根柴胡甘草桔梗紫蘇乾薑覆被取汗而愈

一兒疹雖出而喘反甚乃驟用麻黃燥烈之藥火盛而肺太熱也宜清潤之用桔梗前胡牛蒡杏仁元參知母黃芩花粉而愈

一疹發不出喘嗽煩渴悶亂繆仲淳用西河柳麥冬牛蒡蟬退荆芥甘草薄荷知母竹葉石膏冬米而愈

一兒疹極重尚善飯仲淳以西河柳元參貝母麥冬知母石膏竹葉二劑而疹遍體皆赤連進四服疹雖出而煩躁不止也又用前藥加黃芩黃連黃栢而愈

一兒寒月出疹不透喘脹悶亂煩躁用去節麻黃葛根  
麥冬貝母前胡知母荊芥元參甘草西河柳一服疹透  
而愈

一新婚出疹痰嗽不已咸謂餘毒用清解而痰愈多干  
後嗽甚此陰虛火熾而潮熱也用六味地黃丸加當歸  
芍藥而愈

一孕婦疹不出熱極悶亂喘脹用清熱安胎藥而熱甚  
危急此懷胎內實故也法當下其胎則熱解而母命可

保用表散下胎之藥而愈

一孕婦出疹觸動其胎胎墮而去血過多疹雖收而煩躁悶亂乃血脫故也當兼理氣用理中湯而甦又用人參當歸阿膠炮薑荊芥艾葉而愈

一孕婦出疹熱墮而難產用魚膠三寸燒存性麝香一分共沖酒服而立產橫生者亦用此法但雖產而子不活

一產婦疹不易出熱甚而去血不止乃氣血不足不能

逐毒出外也用麻黃葛根湯加人參當歸白芷阿膠而愈

一婦疹後輕咳嗽朝涼暮熱少神肌瘦唇赤咸以氣血不足用八珍湯不效細詢其夫知不慎房勞所致用六味地黃丸合生脈散絕慾百日而愈

清金降火湯

當歸 芍藥 陳皮 貝母 生地 瓜蒌 元參

黃芩 茯苓 天冬 麥冬 杏仁 桑皮 石膏

黃連 蘇梗 甘草

養陰湯

川芎 當歸 生地 芍藥 五味 麥冬 黃芩

桔梗

桂枝湯

麻黃 桂枝 赤芍 荊芥 防風 羌活 川芎

甘草 桔梗 牛蒡 人參

黃連湯



黃芩 黃連 黃栢 山梔 牛蒡 桔梗 甘草

防風 荆芥 木通 知母 元參 石膏

防風湯

荆芥 防風 連翹 桔梗 木通 牛蒡 薄荷

石膏 知母 枳殼 竹葉 燈心 甘草

化斑湯

連翹 牛蒡 元參 升麻 知母 石膏 骨皮

甘草 淡竹葉 粘米

大青湯

元參 大青 桔梗 知母 升麻 石膏 骨皮

甘草 木通 小樞 人中黃水煎同人尿調服

元參解毒湯

黃芩 元參 生地 桔梗 甘草 山樞 葛根

荊芥

奪命散

麻黃 升麻 紅花 牛蒡 連翹 蟬退 紫草

人中黃

宣毒發表湯

升麻 葛根 牛蒡 連翹 前胡 杏仁 木通

竹葉 防風 荊芥 桔梗 薄荷 甘草

三仁膏

桃仁 杏仁 芫荽子

加減麻黃散

升麻 麻黃 牛蒡 蟬退 人中黃 黃芩 黃連

黃栢 山梔 大黃 紅花

原  
關散

山梔 麻黃 黃芩 黃連 大黃 連翹 牛蒡  
石膏 蟬退 紅花

解毒湯

川芎 當歸 生地 白芍 黃連 黃芩 山梔  
牛蒡 連翹 甘草 桔梗

黃連杏仁湯

陳皮 黃連 杏仁 麻黃 枳殼 葛根 瀉加厚朴  
甘草

十全散

黃連 黃芩 黃柏 苦參 延胡索 礪砂 乳香  
雄黃 孩兒茶 為末 吹喉

玉鎖匙

礪砂 朴硝 殭蠶 冰片 為末 吹喉

安神丸

當歸 茯神 龍胆草

養血湯

川芎 當歸 麥冬 生地 梔子 元參 杏仁

麻黃 竹葉

疹後瘡疾方

鼈甲 茯苓 山查 貝母 麥冬 橘紅 知母

柴胡 甘草 渴甚加石膏

仲淳治疹後牙疳方

連翹 荆芥 元參 乾葛 升麻 黃連 甘草

生地 犀角

金花丸

黃芩 黃連 黃柏 山梔水泛為末白湯服

牛黃散

黃牛糞後尖焙存性人中白煨黃柏末吹入

清胃湯

升麻 當歸 黃連 丹皮 生地

清胃解毒湯

升麻 當歸 黃連 丹皮 生地 人參 麥冬

白頭翁湯

秦皮 白頭翁 黃連 黃栢

麥冬清肺湯

大黃 麥冬 麻黃 知母 羌活 甘草 石膏

葶藶

麥冬清肺飲



知母 貝母 天冬 麥冬 桔梗 甘草 杏仁

牛蒡 石膏 馬兜鈴 粘米一方無石膏有款冬骨

皮

清肺飲

即四君子湯加麥冬五味子貝母知母款冬

仲淳治疹後咳嗽方

貝母 瓜蒌根 甘草 麥冬 元參 薄荷 桔梗

葛槿散

牙皂 紫葛 白槿花 礪砂 明礬 龜板灰共為

末吹入

麻杏膏

麻黃 杏仁

升麻解毒湯

葛根 升麻 羌活 連翹 柴胡 前胡 甘草

桔梗 荆芥 防風 赤芍 竹葉

大無比散

滑石 甘草 辰砂 雄黃為末

小無比散

石膏 滑石 甘草 寒水石 鬱金為末

化毒消表湯

牛蒡 花粉 連翹 黃連 黃芩 山梔 骨皮

知母 葛根 元參 桔梗 前胡 甘草 防風

薄荷

清熱導滯湯

黃芩 黃連 白芍 枳殼 六一散 厚朴 青皮

檳榔 當歸 甘草 連翹 牛蒡 大黃

清金化毒湯

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天冬 麥冬

兜鈴 木通 山梔 花粉

柴胡四物湯

人參 柴胡 當歸 黃芩 川芎 生地 白芍

骨皮 麥冬 知母 竹葉

麻黃散

升麻 麻黃 牛蒡 人中黃 蟬退

化斑解毒湯

元參 知母 石膏 人中黃 升麻 大清 牛蒡

連翹 淡竹葉 大黃

猪苓湯

澤瀉 猪苓 滑石 赤苓 甘草 黃連 升麻

發痧疹方

胡蘆子 桃仁泥 元芫 杏仁泥

文蛤散

五倍子 朴硝 大黃 南星為末醋塗

人中白散

黃栢 人中白 枯礬 黃連 冰片 蟬退紙煨為末

敷之

痧癆方

白灰莧根陰乾為末糖調服

抱龍丸

琥珀 檀香 天竺黃 人參 茯苓 粉草 枳實

枳殼 山藥 辰砂 胆星 金箔 為衣 薄荷湯下

驅風散

荊芥 防風 牛膝 苾仁 首烏 便浸 晒乾 苦參 肥皂

核仁 花粉 殭蠶 共為末 每服二錢 同土茯苓 雄猪

油粘米 菘豆水 四碗 全煎至二碗 分作二次 溫服

牙疳方

荆芥 連翹 葛根 升麻 黃連 甘草 生地

元參 犀角

又方


琥珀 硃砂 茯神 冰片 人參 酸棗仁 犀角  
汁蜜丸麥冬湯下

疎風散

連翹 防風 荆芥 當歸 元參 前胡 桔梗

葛根 杏仁 黃芩 牛蒡 知母 甘草





仁端錄卷十六