

三

農

紀

三農經卷之三

古蜀

張宗法師古重

小引

萬理得於天非地不能賜一靈賦於人非物不能生
物因人而生人受物而成兩相得與爲三

太古時無粒食飲血茹毛神農氏始嘗艸別穀以教民耕
蓆軒帳氏教以蒸餽周官有五穀六穀八穀之名謂人有
八穀百穀之詠素問云五穀爲養麻黍稷黍豆以配五臟
周禮職方氏辨土九州之穀地官辨土宜種稑之種以教
稼穡樹蔬皆所以重民命也周禮太宰以九職任萬民日
三農平地曲辰澤農山農三農生九穀黍稷菽稻麻麥豆粱

穀是也說文云穀者善也穀以養人穀蔬爲切要爾雅翼云粢者黍稷之總名穀者衆豆之總名以稻者溉穀之總名三穀各二十蔬果各二十是爲百穀矣汲冢周書云恤地必爲之圖以齊其物剔其害惡度其量以利其陂溝受其農時修其等列務其土質則是矣

墾荒

先以利刃刈剗草木排列首尾整齊待乾趁天晴風順發火焚之或種油蔴或種芝蕨一季使根腐敗然後鋤去根柢縱橫犁耕人牛兩便不致損力又無蟲害之患物理論云芝蕨之于艸木猶鎔錫之于五金也性可制耳

田未耕日生已耕日熟初耕日陽再耕日轉生者欲深而
猛熟者欲廉而淺春耕宜遲遲者取春勁寒氣漸弱地脈
治通秋耕宜早早者趁天氣未寒將陽和之氣掩在土內
來春苗茂春氣透十脈通可耕堅土強地黑塘土輒土磨
其理刈草草生復耕及逢小雨復耕和之勿令有土塊以
待時所謂強以弱之杏始華輒輕耕弱土望杏花落後復
耕草生有雨澤耕里薅之土甚輕者馬牛踐之所謂弱以
強之

黃田

土右厚薄田有美惡得人之營可化惡爲美假糞之力可
變薄爲厚以生生之工歲歲種之不得糞助土疲氣衰則

生長難茂農夫必儲糞以育之則土力精壯而收穫必倍
此子輿氏所謂百畝之糞士農夫食九人也然土壤氣魄
其類不一肥沃饒確美惡不同而相治之法各有其宜黑
壤性美矣然過糞不有官得上以解之則苗茂而實堅薄
礎性惡矣仗糞力滋培則苗長而實收上性雖異須治得
其宜恐可植而難齊民要術云美田之法菉豆爲上小豆
胡麻次之恐皆五六月耩種六七月犁掩刈之每畝倍收
其與糞矢同較熟其勝

積糞

一積地莫如積糞地多糞少枉費人工須于秋收場土所
小穢穢等並須收停一處每日布牛馬欄內二三處宿

使~~鹽~~成糞收聚除積堆積每日亦如前法至春可得糞三十車餘移平場廠翻篩極細每畝用五車勻撒于常者六畝○一草木葉盛時芟倒就地待日曬半乾發移所處掩器廐烟燄記云仲夏之月利以芟草可以肥田又將所耘剗之草掘穴深壅田中漚化亦可肥田又可除草江南三月草長刈以踏秋田歲歲若此故土力常盛吳地剗山草茅皮治糞歲穰不斂○一冬則收腐藥敗草雜枯朽根壞亥及棄菜堆焚之令烟出勿見火久熑成糞及勿移川便湧澆灌趁天晴翻覆再灌○一禽獸之毛羽甚是肥澤若能收積之爲糞勝于他糞百倍三角收積爲法治灰亦過常糞○一溝港內淤泥以掀撥上岸日晒渥定

成塊同大糞相用比常糞力倍○一魚塘近至停水處內
有淤泥其性清涼甚宜疏宜未于春初放乾水透序上晒
乾入糞甚佳○一農居之側必置糞爲篤楹以辟雨
浸屋中當鑿深池挖甃以磚石須用石灰封固勿使浸漏凡
掃除塵土灰化稜秕落葉積而焚之沃以肥液積久乃多
移出篩去瓦砾礫爲細末以備播種○一厨下深鑿一
坑以磚石細甃不致滲漏上蓋以木板棚架留以便所每
簸壳灰化過濾其中滌器肥水與滌漿沉淀漚自然腐爛
三歲三四出壁澆灌草飲桑更茂○一欲計置糞須用一
人一牲駕車一輛諸處搬運得一人拥一擔于各路搬取
拾天日人月深積少成多

占種

欲知來歲宜穀冬至日平旦諸子種用袋囊盛之埋陰處
冬至後五十日發起量之息最多歲所宜種○神農紀載
法云五時見生而樹生見死而薙死師臘云五木者五穀
之先欲知五穀先視五木擇其木盛者來年多種之萬不
失一古書云禾生于桑或楊大麥生于杏小麥生于桃和
生于柳或楊黍生于榆大豆生于李麻生于荆或楊五木
自天生五穀待人生五穀候十五木故生而樹生也靡草
死麥秋至草木黃落禾乃登故曰先死而薙死也蒔種各
有依敍能得時宜不違先後之序則相繼以生盛

種子

凡子種泡濕者則難生生亦尋死若種傷濕泡者生虫子
種雜綜不純者貯之及種時先半月之前晒乾極燥令馬就
穀處踐之令馬食數口不遺蚜蝗又法以十二月三九中
積雪水澆之耐旱小虫○上句種者上收中有種者中收
下旬種者下收良田宜晚種薄田宜早種良田非獨宜晚
早亦無害薄田種晚必不成山田宜強苗勁禾以耐風雪
澤田宜弱苗疎莖以求華實神契云黃土宜禾黑墳宜麥
赤土宜粟沃泉宜稻因土性之宜

種法

漫種先計地畝之寬狹審土之肥瘦然後定其子種之

大小或豆或麥務要布種均勻以管盛子次在腋下右手
持而揚之隨撒隨行尋民要術云凡種要半遲緩行人保
以足蹕隴底欲土實易生也惟土堅石礲處宜之○一耩
耩法以木造似斗形土大下小中藏一機在內耩于下自
三竅順軸下子上口添子耩前三犁犁地三行耩耩隨耩
耩子牛行人搖量畝計子不致苗有細秧之患今農家製
砘車隨耩耩子後循隴碾過使根土相着功力甚速惟平
夷處宜之○一點種先審田之大小酌子種之多少以灰
糞和子種均勻以牛淺耕成行種人以左手腕提糞子
以右手撮子糞勾點耩溝中或七八寸一科或尺許隨足
掩土蓋之此法易于耩鋤不畏暴雨凡山陵坡坳難耕處

須以右手墾土左手點子當將子插盛袋挾頸土垂于胸前隨鑿隨點苗生稀稠得宜丈易上鋤○一瓠種法以瓠鑽多竅子盛瓠中隨行隨搖而種之須稠密得所以瓠捲過覆土既深暴雨不致掘撻且耐旱便耘○一閑種凡出城近邑高危傾陵皆可爲區田糞種小澆以備早災區長丈餘廣三尺鑿起宿土以雜草火燎之免虫蟲益以瓠王將子納于區上候苗生視稠密去留旱以水澆潤以溝引治蔬蓏者宜○一芽種法以子先用氽淘洗轉籜上覆以溫紗三日後芽生然後下種先以熱畦內以水浸潤移芽種後篩細壅覆之以防日暘此法苗生齊紳又不壅惟治圃者宜之苦有虫蠹以苦參根泡水滌石灰水浸酒

苗上

耘苗

以小鋤爲良勿以無州而暫停及時鋤苗且滋茂又月早而莖堅若清而遲耘必爲草蔽苗不滋茂實不堅重耕之助苗之長大矣

收穫

當熟至卽黃收穫不宜過老太老禾則折節則色裂若逢天雨功損其半必趁天晴麥收不致雨淋濕泥實亦佳美葉亦鮮明

麥

麥圓經五苗似韭如稻高二三尺春深抽莖有十五節空

心方穗實藏壳內世生壳外生青熟黃穗左右分合一種
每二十倉一倉包三十粒其六十粒若其年三粒者上收一
粒者中收一粒者下收又有倉不及數者曰荒有兩岐者
爲瑞秋種夏獲種有早中晚三等品有有芒無芒兩樣色
有白赤紫粒有圓長扁其類甚多各地化氣說文云天降
瑞麥象芒刺之形如足行來故字從足從夕覽書云自迦
師錦字典云作稼詩云貽我來來象其實夕象其根也
秋種厚獨謂之麥俗稍小麥者粒形也麥者脈也食之可
以養其脈也

種麥地宜天生意互中伏中五更時趁露未乾陽氣在下
耕之人得其涼牛得其快先任地即喜或種其家田特忌

之肩候苗開花結角犁翻大地脉于着糞此之謂種閏店
種因宜白露前後逢上戊爲上時逢中戊爲中時逢下戊
爲下時種須揀成實無雀麥野荳者宜節般去草子及
秕粒者得稻子油拌過則無虫而耐旱大抵土欲肥耕
欲深耙欲數種欲勻以灰蓋之喜糞愛雨苗出數寸
得雨乃佳若初種得大雨則子追撻難生小雨爲妙三
月兩麥收若三春微雨人夏微風此麥大有之年

芸麥鋤麥惟春初間惟耧種點種者可鋤麥未起身時以
三寸利刃鋤鋤去荳豆雀麥將土芸蓋麥苗留心遇春
雨倍長苗將苞時以水溉更佳

穫麥護麥者防露傷也若天下砂露用牀席或鉛長繩上

須浸晨全兩人對持其繩于麥壠拽去砂露則不傷麥

刈麥麥半黃帶青時刈一半合熟一半益麥熟同時不比

他禾熟有先後若候齊熟一遇風雨必拋撒刈遇晴

即收須密加苦蓋趁晴急宜旋刈旋收旋打揚收起即

未淨候所收打遍將揩再打大抵農家之忙莫過麥蚕

若遷延遲時秋苗亦誤粒鋤故老農云收麥如救火

貯法太平御見玉麥之生蟻由溼也萬物之寢皆有化止

麥之化區以灰法干中伏內晒極乾趁熱收藏覆以石

灰則不生虫又法和以蚕矢辟蠹或艾葉簽耳剗碎周

收若少濕必生虫忌乙丑巳卯戊申己丑日收貯炒虹

凡麥吐穗收漿時劈開麥實有紅虫如蚯者在穎穗間

過三日不見矣

本性麥味甘而氣溫素問云麥穀心肺玄云麥有浮平屬
木詳慎云屬金火旺而藏許以時鄭以形素問以功性
麥俱四時中和之氣兼寒暑溫涼之性受風更霜陽之
化繼絕續之爲利甚溥穀中之至貴者也春生主夏亦
收然不及秋種者但有小毒耳秋種亦有南歸之異南
方早濕冬來少雪春時多雨麥受早濕之氣至夜華食
之生熟腹痛難消且江淮宜魚稻河洛宜羊棗地氣使
然也故形同而性殊北者固佳陳者更良 麥味甘氣
溫養氣不足補五臟 麥味甘氣寒可慰風濕 浮麥
益氣除熱止目汗骨蒸 疹粉可去熱除毒 麵飭解

熟和中素食要品油煎則熱 麥苗解酒疸消虫毒
中黑穢名奴主天行熱 毒

効方小兒痘潰不能着席睡卧者用夾襪盛麩縫合籍取性涼而軟治以麩淘淨其效此誠妙法也

中暑者以生麩調水服之又止衄血吐血

援神契云王者德至

子地則嘉禾生博云天地之精

上爲日月來爲五穀

蓋穀者民之所天兩天之精華

在焉神農作天錫嘉同秀殷同本與秀伊

升稱南嶽之相而管針吉其君

六百里之禾爲童信

○徵瑞經云王者德至而嘉禾

上禾者仁卉也其大

盈倉二石二斗一百石云穀時

之麥穗長而莖黑一

匕以爲行而服薄而赤色存

之者重食蠅先時者

音雨木至陽動即而多疾其

次羊之者致香以息

以節後時者苗弱而

體瘦薄而美革

彼人則其力如此者不

大麥

大麥圖經云莖葉與黍相似但葉微大莖微粗色深青而白粉傳芒長穗大壳粒相粘不易去脫其堪饑作粥食造酒爲麴爲醬佳餌牛馬其良大麥者越麥也大穧取紫禾未熟而先熟爲穀之長故得大名半亦大也粒大于黍各種而形類

種蒼小麥不過冬大麥不過年此方言也極寒極溫之地多種于春宜于稱田豆地收後耕種或漫或樣或點隨方隨人勤怠但冬則寒烏籍田打耗子種宜速植爲最陰陽書云天麥生于杏工百日秀秀復五十日成生干亥旺于卯長于辰老于巳死于午惡于戌忌亥子日刈穫熟貯同小麥

本性天麥味甘而氣平涼寬中壯血爲麪久服髮不白苗
河小便大麥芽味鹹氣溫孕婦忌服食米泔則乳渴食
麥芽則乳收

妙方冬月手面皴瘃者米大麥葉煮湯洗之

麥本金氣降火此登

物理論云粟本木氣遇金而熟
此有天之氣屬陽也供乎而少陰而生也
桂菊蘿蔔金而開洛其水而調此任地之根屬陰也
是知天氣始于少陰百穀始生終于厥陰萬物
地氣始于厥陰萬物發生終于水萬物歸根故云
當死者生失時者死。應瑞圖云嘉禾者五穀之長
也衣者異本而同秀質者同本而異秀。漢書云范
增有時絕指窮居自若妻子以拾遺自資兒常拾得
妻五解姓人尹臺造之一解夫兒不得過後
加訓令疏達六解還言麥已雜誓不肯受

補錄

穢本圖經云柴莖長大如稭莖穗吐左右子結枝傍芒刺

包粒收其子可爲麪爲娘麪能耐食和蜜可爲糕豐茂刈
苗飼牛馬甚良易肥故俗稱爲油麥山東河北秦巴多種
之穀有二種一種類大麥而粒小穗不連壳麤連壳大麥
與小麥相似此麥與穀麥種類其功用不同而形亦異宜
山種不畏風寒穀者野塘之義其形獨穀也從廣者言其
易種廣收也

植熟理且耕熟土秋冬種但冰寒之處在春動土融時種
之亦佳

本性穀味甘而氣溫暴食似動氣久食令人多力
効方送行者以之炒熟蜜和食耐餓

醫書云凡出征令兵腿囊河沙袋藏炒麪遇危險地
方急取其囊去沙可跳澗健行絕糧則袋麪可以度飢

自澠河
以北

青稞

青稞葉類麴而深青穗類穢而子離壳青實圓故曰青
稞以其形實而名之也關中一種顆粒微小色微青
以何牛馬沐洛河北之處一種黃穎但小麥而粒大皮薄
多麩可吞以粒食磨麩爲殼麩和蜜拌作路糧又釀酒甚
佳

植蕷種與大麥同若水寒之地宜三四月種六七月收頻
土溫和之上而植者少爲其枯多實少也

本性青稞味甘氣寒益脾潤肌

村陽編云元和大珍因貢碧麥形大干中華之麥麥
異有青色者皆可食之每百克以鹽水浸一五日則食之

麥出

自鵠鹿縣志

云

穀麥似大麥出京州

綿遠云施

姜三月種八月收

蘭麥似小麥而粒狀大

涇州地也

蕎麥

秦園經云蕎麥三尖莖亦梗空四稜生節枝生左右開小紅花內瓣黃蕊蘿蔔葉結實垂懸裸三棱嫩青老黑亦有黃色者苗之妙異于衆禾在半長苗半開花半結子半收實至老不衰失時而獲則孫爲祖禪將往孫一名較方土記名烏麥一名花麥其形弱而趨易散曰蕎曰穀者苗長而花實盛也磨蕎如麥故人麥品也

施種於中折耕土極乾秋後以灰糞種之八九月收春種者六七月收難據其種之時惟獨其種之方溫平之

處食之多合人病至于西北極寒之方以齋食爲天味
極美可麪可餅可羹可粉南人以實齋熟開口又驅乾
搗米食

本性齋味甘氣

寒齊賜益氣苗味酸寒禁人以濕指卧病

屬厥汁人染色退油膩練絲帛能倒手夏麻苧毒

宗白樂曰我少年時在鄉里遇青紅兩黃

南史曹景

騎扶馬羸年少帶數十騎弓弦急舌聲高

如儀鳴叫

平澤中送鹿我射之渴欲其肉就食其

臂頭若耳不知老

泉渠覽耳後生頭髮人此無不復人息

車慢小

之將王今來吾相作貴人轉動不得行

色色使

人輒言不可閉置車中如三日之新婦此

君齋

荳蔻經云藥可多枝藥如荳蔻花帶綠色綵實多種

其色紅而不黑 稍尖而稜角不暗其味苦 麴黃色山坡處
廣種其收實過 蒜豐年倒牛馬甚良是年可救饑

楂蕷種收與蒜同但蒜乃嬌翹之物不耐雨淋狀圓生葉
宜避雨打追牧晒貯藏秋鮮者或拌以油菜子或開發
同種及蒜收而麥菜亦茂不害其便爾蒸其青磨熟可
為餌復但氣昧苦惡熟使氣流滴去黃水色若猪肝和
蜜餞食甘美

本性苦熱味苦氣寒有小毒涼血清燥多食傷胃發風虛
氣

笏方薦蕷皮黑豆皮麥皮淡明子菊花作稅至老目不

典故集解傳

卷之三

有金穰木毀木輕火皇大壯庚六歲早

歲一大亂皆祖謙兄政論光王有道者之政上也

李悝之政次也所在精善有可均處使以清道移

民後桀又從也或無焉段摩弱最不也古人處之詳

矣遺當自

唐書舊序下不之教于可產之地當歲歲

精以爲墮如之物設遇御糲可能活命甚于葛此本

醜之

美

御麥

御麥圓經云葉輪類纂高六七尺六七月開苞吐穗節側生葉狀腋生苞苞微長顏如紅纓紙狀苞內包實如搗捶形五六寸許苞外排列粒子纍纍然如米實又有黑白紅青之色有種有精花放于頂實生于節子結子外精載于內亦穀中之奇者其經進御故曰御麥產于西康且昔麥麥者言磨麪如麥也粒可果可釀酒南人呼爲苞黑楚

人呼爲芭麥河洛人呼爲玉梁戎翟是也

種蔬種宜山土三月點種每科須三尺詩種二三粒苗出六七寸耨其草去其苗弱者留壯者一株三月晴八九月穫穗歸苞以木架透風令乾宜在室中閉戶塞窓報之不致耗穢再晒乾收存

本性御麥味甘氣寒滿腸下氣多食令人冷滿

効方小便淋瀝御麥

根煎湯服

醫說
鳴隨至其人傳
援母悲鳴自擲而死破腹腸寸寸新縫一古者聞而如之嘆云人傷求生物乃生其間觸福兩相爭母發死兒援死激發惡心啓善心求其形而察之自此退人事以訪道

稷

稷一名穡實可供祭也今人以稷呼粟呼穀以穄以聚呼
稷釋文云穀之有浮壳者爲粟粒實圓者爲秬孔子曰粟
之爲言穡也秬乃六穀之總稱又古文作黍象穗在禾土
之形春秋題辭云秬爲金所立爲陽之精故西合不爲秬
也鄭康成云粢稷也按祭祀之號稷日明粢則粢又稷矣
古者以秬爲稷粢黍穧之總名今之言秬者古爲秬矣後
人專以秬之細者爲秬粗者爲麻以不粘者爲粟以別穧
也齊民要術云秬爲稷黍之總名今河洛稱之曰穀江淮
稱之曰粟粒曰小米曰金米曰使米顛倒五泥莫指其穧
神農五穀者麻黍稷麥豆是也周禮六穀者黍稷稱粢麥
穄是也又九穀者稷黍麻麥暗梁谷大豆小豆是也西陽

雜記九穀者黍稷稻梁三豆二麥是也粟爲陸穀之總名
稱爲水穀之總名穀爲粟稻蔬果百穀之總名今以一禾
而兼稱粟穀之名正家亥之末別陶陰之不分耳陸機書
黍稷辨云稷之爲言栗無疑矣因真定志雷禮一言而解
今古之惑訛稷者叟也叟從禾詩云叟叟良耜吉進力治
稼也稷乃另種穟如人覓其稷字象田中垂紉之形苗高
三四尺似蜀黍稈空而有節細而矮葉若小蘆而有毛穗
似蒲而有毫稷粒成粒狀兆人日食不可缺之糧也成熟有
早晚苗幹有高下性質有強弱滋味有美惡其種甚多呼
名不一有粘不粘之別須順天時量地宜用刀少而成功
多在情反道則勞而無報

種藝土欲肥耕欲深相欲細子須成實者簸去秕缺以膠
雪水浸之仲春之雨爲妙小雨初按濕潤之氣大兩候
按乾先相後種種後旋以石砘砘令土堅則苗出旺盛
遇天旱苗出土仍砘春種宜深夏種宜淺早禾晚禾宜
兼種防歲有所宜干云閏年宜晚禾大旱宜早早田收
多于晚早田淨而易治晚田無機難治且早穀米實而
多晚穀米少而虛苗行宜疎疎則穗大來年任麥

耘鋤鋤無度數以多爲妙第一遍曰撒苗二遍曰定科去
其密者弱者留其壯者第三遍曰擁本鋤既深擁其之
以護根則耐旱第四遍曰復籠俗名添米凡鋤以小鋤
爲良苗出壅則深鋤不厭數周而復始勿以芟草而忘

功鋤非無去益養取土孰而實多糠薄而米美鋤得土
遍可得入米春鋤起地夏鋤除草春鋤不得獨濕六月
以後雖濕亦不妨

刈穀食貨志云力耕數耘收穫如城盜之至故熟須刈乾
須積刈早則傷稼刈晚則折穗遇風則收減濕積則稉
糧積晚則粒耗連雨則生耳所以收穫不司綏也

本性稷味淡而氣微寒養腎益氣和五臟通氣血壯顏色
陳者可益壽北人常食日用不可離者淮水治瘻亂泄
酸水洗皮膚癩痒煮鵝皮治小兒疳利粟糠和藥可薰
痔漏稷奴利小腹除煩熱

効方目錄王季馮道嘗診脈二三年死求于日者亦如言

又卜之匪吉 一日獨步地間遇一士相語甚投道以實
告士曰我有接命術可能行乎先于地掘一穴本蓋土
墳留殼得三十年穀米爲飯食併去五味如是于日自
可免死道知其言至于卜之死日竟無事又延百日出
形反少人聞而求其故曰得異人如是方也



周禮地官

目舍人掌粟人之藏詳日九穀俱藏爲王

栗弗能字

也○管子金栗云野與市爭民金與粟爭

貴又曰

諸侯咸鍾之國也故栗十鍾而鑄金程諸

侯山東之

國也故栗五金而鑄金○而子且金生而

栗死栗死

而金生金一兩生于境外栗十二石死于

境外栗十

二石生于境外金一兩死于境外好生金

乎境內則

金栗而死金府兩處好生栗于境內則金

栗而生

而存時雨盈宮覽得時之天長嗣長穗大木

而莖殺其葉圓而薄陳其半多沃而食彈若此

不風失時者莖葉枯萎以節衡神知而力奪稻米不

香後當者莖葉枯萎而太銹穗闊而青零多粗瘦不

捕○魯論孔子與原憲票憲貧清自守辟而不
受孔子云何不以票與鄰里鄉黨何以舜爲

穉

穉字解云穉之穉者爾雅名衆唐本草以穉穉者爲穉篆文象禾體柔弱形故稱穉爲穉是也兆方以此釀酒而汗少于秔黍穉則穉之穉者有赤白黃三色可熬餌可餐饅半穉半秔煮粥甚良

穉穉耕耜及種効收護與穉同

本性穉味甘而氣微寒釀酒則熱若常食據五臟動風症閉人小兒不宜多食同鷄鵝肉食或與卵食成癰癧穉者肺之穀也故能去寒熱利大腸大腸者肺之舍而肺多作皮毛熱也

晉書陶淵明傳

作歸夫來
卧遇涼風

明爲彭澤令不爲五斗粟而折腰掛冠歸
時種秫釀酒以自飲嘗言五六月北窓不
惜半自謂義皇上人○西說碑放隱居南

山豹林谷

學行高古性頗嗜酒躬耕種秫以自釀所
居有林泉

之勝真完名至闕固辭還

山每候酒

日空山清寂响以養和

黍

黍苗似蘆高三四尺結子成枝而疎散外有薄壳如稷子而光滑有粘不猶色有紅黃黑白米似黃米而稍大惟黑者今然禮以爲稷說文云黍者暑也當暑而生暑露而穗六書精蘊云黍從下黍衆子散垂之形故其名不一亦曰穀白曰芑黑曰秬又一稃一米曰秬閼西人呼爲糜蕡北人呼爲聚江淮人呼爲黍楚人以麻葉裹成穗謂黍角五日祭三間之遺穀又秬鬯一卣則黍之爲酒尚矣今古以

黍稷用稱而不能其核皆出于指稷爲粟穀而五穀六穀
九穀之中又添一穀如算法之實位添一子乘除不准任
位去一子而因歸不令以粟穀爲稷而梁得粟之實黍得
黍之實矣律呂議古之定律者以上董桓黍之中累之以
生律度衡量後人取黍定之終不協律或云秬乃黍之中
一称三米之黍也比黍得天地中和之氣而生蓋不當有
有則一種百同一米粒並均無大小故可定律他黍則
不然古人先得黃種而後度之以黍不足則易之以大有
餘則易之以小約九十黍之辰申容于二百黍之實以見
周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生于黍也欲求
律者亦求之於聲氣之元而母必之秬黍則得矣

種黍宜高潤土耕耙極熟或淺種默在地宜之三月種
五月熟四月種者七月熟五 月種者八月熟但稭苗大
而黍小宜較稭頗稠熟卽刈之刈後趁凜卽打則穫易
脫退則擰着粒則難脫白者亞于稷赤者多粘正秦人
之稱麻者

本性黍味甘氣微寒不粘着可食粘者久食生熱發病疾
昏五臘令人好睡人勃絕血小兒多食令火不能行猶
大食之足踰屈孫思邈云黍乃肺之穀也肺病宜之不
可合蜜及葵同食醉卧確革令人生癟

効方月令正月三日黍熟印乘作羹飯可辟疫氣

穀王制唐人春陽作夏陽麥休舊泰冬陽精耕以期黍
以魚子茶以麻種以麻磨若草也。朝子季當爲印全

魯起聚爲長穀子

之孔子使子貢問其餘責

之曰始吾嘗與人共食

之不外乎吾子也

吾子之食

之

養女子

即分金粟周金以造之

之賢者全其身

之賢者全其身

之

之

王劉功在河者明自謀願

泰春秋人西漢

之賢者全其身

之賢者全其身

之

之

草日供服食養性道兆山東皇

皆書自號日更臯子

之賢者全其身

之賢者全其身

之

之

梁

粱狀如蘆而內實葉亦似蘆莖粗高丈穗大如蠶粒若椒
米紅黑色米性堅實種有粘不粘者有黃青白赤粘者可
釀酒可造餳可饁不粘者可造麪可備水可消餌者甚良
莖可織第編篠夾籬供興稍可筭帶壳可染酒廣雅云禾
稷穡雅云蘆穄一名狹梁一名蘆粟一名稻黍一名蜀秫
一名高粱因形稈黍故有多名也考周禮六穀九穀有粱
無粟可知粟乃陸穀之總名矣自漢以後始以大而芒長

者爲梁小而芒短爲粟今則久通呼爲粟而梁之名隱矣
今穗粟之占長大穗粗粒而有紅白黃毛者皆粱也這志
石解梁與粱遼東有亦梁青冀有黃梁楚襄有竹節青梁
江東有自漢江有果梁粒圓形小祀者稷用誤矣

種藝種不官早濕地二月種者爲早三月種者爲晚早得
于多晚得于少種或漫種點苗生三四寸鋤一遍五六
寸鋤一遍七八寸再鋤以壅根留强者去弱者並著相
去尺餘一株諺云苗稀穢大子圓粒堅苗及尺餘再耘
耨且耐旱不畏風雨博物志種蜀黍年久生蛇梁乃到
禾也舊風雨蜀多山山多風雨故以宜種之地曰蜀黍
刈穀種稻不官過老須粒帶微嫩四五月收之造米不

糙米潔而味先刈其穡桔束爲把架高柳待乾熟之酒
乾入財

本性梁味甘氣微寒白梁和中生津青梁益氣補中黃梁
益脾養胃諸梁宜人爲飯甚佳乃穀之美者

効方五符經云青梁米一斗赤石脂三斤水漬置煖處一
二日土青白衣堆丸如拳大服三丸不餓

孟說云青梁米以苦酒浸三日百蒸百曬藏之遠行一
殮可度百日若重殮之四百九日不餓

九月九日取梁根名龍瓜陰乾燒存性治瘧難橫生酒
調一錢

占覽得時之未與時之稼約莖相若稱之得時者重
粟之多量粟相若而春之得時者多米量米相若而

食之得時者可代飢楚故得十之稼廿貞否其味皆其氣草百日食之耳自聰明心意獻智四衛交強焰氣不入身無苛疾○東坡稼說蓋嘗觀夫富人稼乎其田美而多其食足而有餘其田美而多則可以更休而地方得完其之常及其熟故富人之稼常美少稅而多賣久藏而不腐今十口之家而供百畝之用寸寸而吸之日夜以望之勤耨鍤艾相尋以上者如魚鱗而地猶種之常不及期而鍤之常不及熟此豈得復有美稼哉○列子窮有餽色客有言于鄭子陽者曰列御寇有道之士也甚貧陋而窮毋乃不好士乎鄭子陽遇之栗列于再身而辭使者列子人其妻望而附忠曰間有造者妻子皆逸樂今有餽色矣君過而遺死粟先生交弗受又豈非命哉列子笑而未之曰吾非知也以人言而棄正其罪我且以人之言此否所以不受也其後民作難殺陽子列子曰受人之養而不以其難不義若死其難則死無道也死無道也降不死也不義去逃也豈不遠哉○沈存中枕中記開元中名翁經州郡有盧生同王人方整黃梁翁取囊中枕幾登第高魁人指出將君寵貴尊輒散其家日酒宴賓友子弟孝孫尚效婢僕實四四如意空無禪處

年五土榮盛無比一夕卒遂悟
時呂翁在偏問諸黃梁猶未就

利

秈形與稻同種出本異猶桑之荆魯禽之鷄鴨也乃時穀之屬山產之禾也故字從山粢與稻同但粗長實與稻同但長糙米有赤白爲飯香美釀酒濃釀可熬糖可炒米平原之地皆可種之早種早熟晚種晚熟六十日可叢水原頗少陸地古濕者皆可種此穀中之至美者

稱耕耘耜上熟每秈二升得糲五石每畝三升量地着子宜稀稠得所每科只不過五六粒多則苗結難發少恐子生不齊苗生宜密勑至三四寸時勑之六七寸又勑尺餘再勑勑不厭多勑則子圓實堅苗冲去其稗梯

壅其叢根禾將稟時天若少旱引水灌之卽去毋久停茂而美○又注脊以肥土耕耙極熟治區下種苗生去草待生五六寸就土掘爲叢分一科移他田中栽之相去五六寸一科每科以水飲苗甦卽勑或以糞水澆之多勑爲準此法爲麥地菜地恐遲而設若此治之實美而佳亦那田就宜之法耳或山或平皆宜

刈穫稻子難脫宜先刈其穗收歸緩敲如獲栗法如路遠刈向田中留七八日晒夜露可打可升但耗損耳本性穎味甘氣溫溫中益氣天生五穀所以養人得之則生不得則死惟此穀得天地中和之氣有造化生育之功非他穀可比故人藥有所畧耳

人種麥方百斛米一斗擇堅者如是酒熟時分
熟蒸畢晒乾先以糯米三斗造酒酒熟取酒時分
將酒醉拌蒸米暮浸日晒以醉盡爲度將新淨鐵燒米
每用以一掃涼水吞之可飽一日飲食任意

宋史大東山不種乃美穀其利生民止原可種違使就
閩取其種三萬斛分公帑諸道種使民種之○吳越春
秋誘兒云春種八穀夏長而養秋成而聚冬蓄而應
夫天有收而生而不收種一死也夏民無苗二死也
秋成無聚三死也冬藏無蓄四死也雖有堯舜之德
無如之何○東海郭母葬于山角哭徵木于地羣鳥
爭食數數如此烏聞哭聲莫不感焉因
得於明間後復訖其實乃傷寒子也

移

移苗葉似黍抽莖三稜穗若粟而分岐狀如鴈爪粒如黍
實而細茶褐色稃其薄可米可麪可釀酒可煎餠荒年可

濟饑幹飼牛馬甚良

稗

降稗禾中之界者故字從界葉莖穗如黍耐旱少虫患稈
曹芥褐色粒黃而圓如黍粒可米可麩可釀酒可熬糖
年可濟饑冬月可飼畜五穀不成不如梯稗蓀之以備荒
年宋史云曹彬有芳赫精稊之稱

植蔬春耕熟土三月內或漫或點或山或平地皆可
生耘勦草盡淨至三青七黃用刈敵

本性稼昧甘氣寒健脰養胃間弘景云烏稗可代糧汁發

地折莖皆死

蜀光武時流城兵亡民逃遁山來寄居按食一也得
活者不過故人及大半出而討忠正惟存生殺民人

而食口救荒也唐天復丙子之春五穀皆不熟
亡出中州於花鄉賣餉民果之春米而食以活人民
今五穀種而不加勤稼而不
知富豈年受餓四年餓死

薏苡

薏苡圖經云葉如黍莖高六七尺夏未抽莖莖節傷生枝
枝稍開花結實色青白下圓上尖散顆零落如小豆大有
稊穡之別春米爲飯甘美可釀酒一名芭蕷一名解蠶其
葉似蠶食而鮮散又似芑黍之苗故有解蠶芑之名一
名贛米乃堅硬有贛強之義一名星葵苗初生蓬虆赤黑
也救荒本草云回回穀西番黍始白漢馬伏波征交趾節
之載入中國薏遜白也苡者車前藥也合二草之美故名

置孰慧草勁禾也宜山地種與高粱苞麥同其耘治候熟
收實刈桔留根次年宿根復苗結實但苗弱子稀不若
另種者佳

本性慧以味甘氣微寒益脾潤肺清熱勝濕煑飯作麵食
之良相能殺虫利水至者忌食

効方蛇虫久不除者以幹取甘麋食之可効

漢書寫援征交趾衆十卒皆病甚憂之遊于廿間遇
老示一草而曰此卒士病者服之頓愈深奇之詢其
土人名著以服此草則強矣

耐飢載人中華而播基之

豆

豆圖經云莢高二尺葉圓而有尖色青上有毛一本分
枝枝至秋開小花有白有些紫成簇結果長十餘多者三四

粒少者一二粒矣滿莢充筭蒼穧脫乃種種有早中晚形
有大小圓扁色有黃曰赤黑斑褐可醬可豉可腐可芽可
筆油可炒果爲餚未其製用甚多角名莢葉名莢莢名筭
实名豆釋名曰未俗作菽菽乃莢殼之總名篆文未象莢
生附莖垂下之形豆象子在莢中之形廣雅大豆菽小豆
荅州錄云始生泰山平澤其葉可收以飼豕牲其莢壳可
以喂牛馬其筭可以炊飲食

自夢宜下步所宜先以諸豆平量盛甕內冬至日埋陰地
後十五日發取量之取最多者種之大豆保步易得可
以備凶年小豆不保步而難得也

植耕種宜芒種前後太早則葉盛太遲則苗弱漫種難于

耘耥而結莢多點種易於耘耥而實粒圓點種者每科
相去八九寸許每穴只宜二三粒多則苗不秀有芽種
者有區種者肥地宜稀薄地宜密早種宜稀晚種宜密
月內有三卯宜豆忌種西南風申酉日

鋤豆苗生開毛葉兩瓣卽耥一遍易長且短草苗生西五
寸鋤一遍壅其根苗七八寸鋤一遍葉衛足耐旱開花
時又壅勿以無草而止鋤老農訣曰豆耘開花子園滿
莢若秋雨淋濕葉繁起蔓其苗或蓬或倒難花難实急
刈其豆之嫩莢招其落葉令日曬風透不致淮鹽種書
云夏至種豆不用深耕豆花憎見日則黃爛而焦
收穫宜葉落莢枯方熟宜五六株一束收貯高架避蟲

形經級排列任其遲早敲之且鮮美不蠹

藏則穀之難久持貯者惟豆易于腐蛀皆因濕泥而生宜
晒不宜大日遇大日則皮碎膚裂宜半陰半晴晒之不
時翻攬合乾收貯免蛀汚

本性豆味甘氣溫益氣和中久服令人身輕或炒熟或者
熟性涼造豉性極洽作醬生卷性平半食之溢馬食之
涼一体之中數变炒豆同豬肉食壅氣致死小兒忌之
十岁者無妨服草麻子及厚朴者並忌食炒豆犯之瘓
効方張子辟穀方黑豆五斗揀淘淨蒸三遍晒乾去皮利
麻子三升浸蒸三遍去皮并研末糯米三斗煮和搗爲
劑若拳夫人熟蒸一宿服之至飽如渴飲麻子水之麻

湯亦可勿食一切二博物志云救荒取大豆調勿生熟
按合光暖徹豆丙先日不食以冷水鰣服訖一切魚肉
蔬食不得復食渴飲涼水初小困十日後体方強健不
思食漢左慈方

知景先辟穀方大豆五升淘淨蒸三遍去皮大麻子一
升浸一宿蒸三遍合開口取仁各搗末水和成團如拳
大入甌內蒸從戊王子止寅出甌晒乾若服以飽芻度
母食一切物第一頓飽七日第二頓四十九日第三頓
三百日第四頓永不餓不住老少令人強健容貌紅白
永不憔悴渴研大麻子湯飲之更勝滋潤臟腑若欲重
食物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥物如金剛經

食物

甄權云每食後摩抹豆君三十粒令人長生不老

食似覺身重一年以後似覺身輕又益陽

李守愚每

晨以共花水吞黑豆三十五粒謂之五味散至老視聽

強陶華以鹽水煮黑豆常食之能補腎益力醫家之

穀其形類引之以鹽所以妙也



呂氏春秋云得時之

豆長莖短足其莢二七莢多

枝數節莢葉繁實人

救則圓小菽則博以芳稱之垂

食之自以香如此者

不虫先時者必長葛浮葉散節

後時者短莖蔬節木虛不实○魏書曹不卽位召其

弟植曰問子有七步才傷我吟之恤未及七口者豆

葛豆箕豆在盆中泣木是同根生將心何太急

小豆

小豆圓經三莖高尺餘許葉本圓而末尖並生三葉一桔

主有微毛秋開小花黃白結角一二寸內包實七八粒有

紅白綠黃數種實按菉豆而大可糜食可炒食可爲餅可
泡爲粉作索盪并可飼畜濟民之要穀也董仲舒云菽是
大豆有二種荅是小豆有三種今之赤豆菉豆豈豆白豆
皆小豆屬也本草云繁小而赤墮者入藥其餘不堪入藥
河洛多種之凡種土中頂实而生者菽也人豆也種土中
留實而生者荅也小豆也小者言稭粒之細也雖曰菉穀
其種各族小豆不能保发而难得也

種豆種宜夏至前後太遲則苗難長易生草艱于耘勦又
恐霜臨月凜不及結子種太早則葉繁莖葛鬱泥不花
不能結實土不宜肥耕不宜深宜點種芽葛鬱泥不花
秋雨林勞草長淮除苗出二寸坳一尺土其弱者及

者每科只留一株四五寸又鋤七八寸者亦勿令使風
將

收種待葉落莢枯三青七黃時拔而收之架欄日月乾破
實箇可銅畜桔可然火

本性小豆味甘氣涼調中養臟合魚酢食成湯渴作醬同
飯食生口瘡人食之足重驢食之足輕卒時路渴形小
色赤者乃心之穀也其性下行入陰分通小水當可止
小水若麻黃能發汗根又止汗物理之異如此

効方五行書云朔旦十五日用赤小豆十四粒麻子七粒
投井中可辟疫又云五月初七日新布裹赤小豆置井
中三日取出男吞七粒女吞十四粒竟年不病元旦而

東以薪水吞赤小豆三七粒 年無諸病立秋日而東
以井水吞赤小豆七粒 一秋不染病 一時記云十二月
二十五日夜煮赤小豆粥一家人小食之在外之人以
留其分俟其歸食謂之 驅疫粥 婦經止而忽又來因
房事所觸名曰漏胎用 赤小豆芽爲末水調方寸匕日
而止

夢時記共王氏有不
肖子冬至日夕爲疫鬼畏亦小
豆政後人于是作赤小豆粥以服之○漢楊擇自書
示口家作苦夢時伏嘔甚羊鷄焦斗酒白刃家本秦
人能負茶酒後耳甚附缶而呼鳴鳥其詩曰田彼
防山蘿移不治種一耗其落而
傷其人生有樂耳須富貴何爲

赤豆

張子園經云齒間餘許
葉青小而有毛秋開小白花

莢長二三寸嫩青老黑較赤小豆莢微小有色鮮粒大者
少澤粉多有色暗粒小者皮厚粉少可作粥飯可釀酒可
造粉爲餅蒸餅溫皮作粥爲食中美物生白芽爲疏中佳
品可制牲易肥不生外症乃藥之精良實至也原古以色
命名曰綠豆今人以袁書也一名植豆義取其執叔之宜種
者也

種薯蕷宜薄田不宜厚草不宜太遲浸種者恐荒于草蕷
種者恐擗于科其年旱不蛀此又有牧又已而日下種
刈麻後植早種者爲摘葉旋熟旋摘其熟遲種者爲拔
葉待齊黃熟拔歸敵

李性素豆味甘氣寒遇及解毒利熱忌存仁反榧子壳合

魚酢食合人肝黃成渴病

効方一切暑熱煩燥

菉豆煮粥食之

集異錄一士貧

菉豆耘草急有蠅飛集其首而鳴

以爲異求卜卜

者曰菉豆者狀真老而過少昔朱升

除中書郎時有

飛蠅集祀

之兆今羽必發

後果應

碗豆

豌豆圖經云蔓生有
狀亦有淡紫者亦有
自者生莢寸餘許子如葉九梧子大
有六七粒及八者嫩
青老莢實有斑色收子可炒食可造
粉可爲麪粒可以貯
飼牛馬甚強健可喂畜爾雞翼云咸
菽月令云革豆于金
方青小豆別錄云青斑豆號黑豆
通志云酒醪更種出
大宛釋名胡豆以豌豆孫爲胡豆

非苗葉子實莢莢可經霜雪固得其名而穀
亦可从藏以備荒白豌豆南葛藤花葵同類但形
圓大花葵粒俱白者尚未有今種出西域粒狀若大豆色
白而圓其胎帶黑熟可茹熟可煮食子可炒食可爲粉製
索片同豌造用亦同

種熟八九月漫種熟地中或種稻地或種豆地中春發
水概歲臨夏熟老莖枯莢叢散實飽乾收貯

本性豌豆味甘氣平能榮衛益中氣多食發氣病網目云
豌豆屬土故其所主病多脾胃元人飲膳每用此豆去
皮同羊肉治食補中益氣

勃方痘丁紫黑塊臭或有黑線此爲險症豌豆四十九粒

燒存性童髮灰三分珍珠十四粒研香以胭脂爲膏先

以新針破丁用口呑去惡血以膏少許點之卽紅活目

宋書忠武常曰我有一馬日食豆草一石終日奔馳不覺其困日食豆草半石若食瘦矣可見大賞必有大報凡事有其量也

蠶豆

蠶豆圖經云在淮南空葉狀如槐本圓赤而深青色

青紫摩一枝五葉三日開花如蝶紫白色結若連綿如大

豆頗似蚕形莢青老則黃實黃色如指尖大中暗不顯

所著四方亦有赤色者可著食炒食可爲羹粉餉牛馬

養壯苗可肥田桔可為橘可鹽水煮狀若老蚕形供客

蠶豆王桢云謂其始朝貢名之天平御覽云漢使張騫得

種豆不此豆也

植春秋八月種潤濕地或于九月點刈稻叢中取粒分撒
予以叢蓋之五月收實與蚕同收

本性蠶豆味甘氣平快中和胃藥可醒酒

効方凡手足背生瘡年久難癒者口嚼蚕豆敷妙

蜀荒記二人負豆避山中一人負金避山中負豆者
食其金以蚕豆易之得豆者有食而生得金者無食
而死其人得生復負金去

彬豆

彬豆形小粒細形如野翹搖狀莢長五六寸蕃密甚多粒似茄米而微大每莢一二粒苗高五六寸名彬取其象義地此方產之穀西北多蒔以爲飼食生芽作蔬蔓可飼畜

喂牛馬甚良

植蔬春種秋收惟土廣處可蒔果桑圃空落土亦宜植宜
陸土耕熟或耧種或漫種苗生鋤草淨至莢老蔓枯穫
本性彬豆味甘氣溫潤膚快肌開胃寬腸

効方凡小便赤黃不利者煮粥食

舊記秦修霸橋一鄉老助彬豆三百石與工匠爲賄
監修者咸以爲誰不明日畫皆黑駢遲至而完其數

服衆驗

拔山豆

拔山豆宜種山坡地故名拔山喜引蔓乃荅屬也苗葉如
偃豆形畧同而色淡綠蔓長如豇豆結莢如菉豆實比菉
豆而窄長得色點綠可麪可粥可煮食飼畜甚良

植於瘠地肥熟地宜勿苗生棚俟老莢若肥田者不
耕至伏中開花結莢犁翻甚干壅矢可種葵麥等留飼
牲者亦不必去草隨草滋茂子熟收割喂之甚佳

本性拔山豆味甘氣涼行血下氣生食令人脹滿

明紀天飢流賊亂民逃匿山中負豆充飢遺之明年
小人采其莢煮食之豐年乃至賤之豆凶年爲可珍
之穀

澆豆

澆豆者植澆中菱豆之類乃菽之屬因其性而得名葉似
稍豆形若小豆不堪旱植多莳旱稻田中子若小黃豆大
黃色亦有灰黑色者可腐可豉可醬可芽飼畜甚良乃
方產之穀

種蔬早稻半黃時漫種田中經一宿放水乾苗二三十日

稻留豆苗去水耘耥八九月熟連桔拔收

本性涼豆味甘氣溫下氣通閑養腎益脾

有客諸侯三農紀稿喟然嘆曰子之書徒災筆墨其
植蔬不外齊民要術其栽培不外上植農書其形性
不外本草綱目其載集不外羣苦空亦猶誤性命者
不過劉程朱之清曉工文辭者狃于拾漢史之贅牙
又何奇觀乎乃農夫無廣兒博聞所缺畧甚多未嘗

審問明辨予唯唯考證其稿再三年乃出

稽豆

稽豆苗小葉小形若葛開黃白花結莢實黑最小背小野
生故名鹿豆又名盧豆其苗肥茂故得稽稱農人收而蔞
之名稽豆可熟食可作粉可肥田每畝炒熟一斗甚于糲
渣發芽亦方產之苗也

植菴三四月種耘耥苗老莢熟之肥田者花開後收
翻泥爛種菜麥倍收

苦子

苦子方產之蔓苗耳留实生芽起蔓小葉細列對生深表
方莖紫花亦有紅白花者牽延遍布結莢寸餘子如蘇子
而大黑麻色不堪食用本草云野豌豆廣雅云天巢菜喜
生原濕地嫩時可茹大者詩疏名薇乃野豌之不实者小
者卽蘇東坡所謂元修菜也可采作蔬食可晒乾作美食
先以酒烹之否則令人心跳頭暉蜀人呼爲若干取其葉
蔓繁茂之義蜀農植以冀田甚于蚕矢麻渣他處少產乃
方苗也

種熟稻初黃稍時漫撒田中至明年四五月收穫若糞用
者花初開犁泥種麻種禾甚壯盛有溝田不起苕苗者
以糞拌點之或收種者或拌白豌豆雜種之收穫落子
篩之各別初種後苗生忌水臨春時以水飲茂

也見其形不見其色雷也聞其聲不見其形鹽之于水誰知其鹽膠之于星謂知其膠正所謂空空色色之道人日用在其中而不覺

梗稻

梗與秔同乃稻不粘穀之總名也本草以晚者爲梗孰不知晚亦有糯者博物志云梗乃穀之至硬者得燥易化梗者硬也堪作飯黏者糯也堪作酒今之釀酒爲糯是失爲飯者乃不粘稻反以呼粘是以梗爲粘也北人以梗和穀

人以和糴穀隨方言諺矣穀似麥先高而後圓成粒六
節中空約二尺餘抽莖吐穗散稃尖各分如黃瓜子而皮
有皴糙紋遇午花開壳闊過午花收壳合嫩青老黃而堅
種有水陸南方上下塗泥多宜水稭北方平澤多宜陸稭
種有早中晚三等有白黃赤黑各色有大小長短有性無
芒異族米有堅鬆赤白烏紫大細圓長之殊味有香否軟
硬否別性有寒溫異賦南北稻名不一其形隨水土所化
而苗莖粒米更變春秋匙說云稻之爲籍也舍水盛其德
也大陰舍水漸能化也

治秧田採肥腴土於冬間鋤起引水凍过去水則土脈活
春來易治以灰糞水澆之不生虫不長草浸後晒乾耕

翻再耕相濃孰方可下秧則子不陷又易生癟或以青草或以灰糞厚鍤于田內畜燭治孰方可下種或于冬間收乾敗葉廄布田中趁日風焚之則土燥而苗茂又且少蔓老農云秧是半年春業農者豈可忽乎

浸種早稻宜清明晚稻宜穀雨粧長色紅雜者不堪俗種須取粒圓實純者作種簸去稜稊秕半用瓦器盛浸塘水書浸夜收禁入流水芽若未吐以草盒之浸三四日微見白芽如針尖狀令長二三分候天氣晴明攏起晾去水氣宜侵晨水定風和然後下種蓋以草灰至八九日秧青引水浸之更令缺水老農云丑日不下秧

出田秧長三四寸時宜于夜靜點蠶草火照遙畱畔𦗷焚

此乃我到處見秧間以絕後虫患

耕種田治田之法各处土宜天候不一總不过春暖花開犁翻耜平或上灰糞或特田中去年秋種苗禾犁翻或納青草鋪撒田間渥塌至七八日但腐再耕相者二分水泥相合

插秧芒種前後三時內插者爲早宜上旬拔秧須極手拔出就水洗淨去根上泥擦去稗草須根齊藥順用草束小把量田畝拔秧用小筐裝負于田匀布乘把後混水插之但秧不可以留久則煩鬱苗難茂田水勿合清清則土氣洽落苗久不發插須得六莖爲一叢六棵爲一行宜淺不宜深約離五六寸許足不宜頻那舒手只

插大叢却那一遍逐旋插去務整齊以便耘耨

耩水禾插田日秧既插田日禾初插田苗微黃萎至穀口
变青以耩耙子禾稈中搜鬆禾根苗易茂取其把斷橫
穗則直根下行能盛隨去稗稈

耘稻用耩後數日或灰糞或餅渣爲末撒田間細網耩之
近秋放乾水將田渥濕塗謂之熇稻入水候土乾爲
之擗稻然後引水浸田謂之還水直至稻成熟方可去
水若遇天旱急將田鋤一遍勿令開裂候天哭雲臆其
有雨遍澆糞水待雨勿令水缺則禾發不歇

起蒙平日收灰于棚中收便溺浸透日晒乾仍沿爲灰逢
日晴晨有露清晨持灰遍撒于苗稈上得雨洗下人禾

播种稻已将熟薄田壁而不依肥田植如山地之法及在日间综错宜以竿屢俯伏致免参差难于整齐穗江淮熟稻之處稻黄时在田中旋芟旋拌将熟不计形四方上澗下狹口寬四尺餘為尺餘名曰拌桶刈稻隨把鋪田成行过午一人執稻幹拌向桶中以筐圍半或兩人和拌不用筐圍一人束草遇雨亦可刈候晴方拌亦有用圓桶者一人拌者功緩二人拌者其功速但子粒輕落河洛之處稻熟刈穟東把收归停廠宇後方敲子草復另刈另束江淮收稻上雨下水刈一束架竿斧连归厰落其子考之四方高卑寒温各熟不一时各

穂不一注有處築場圍以木爲架者編荆爲門式深丈
許高六七尺十月收稻積其上夜間就內安卧不惟煖
可避寒兼以夜能防盜夏逢春徐打落其实入倉可以久
留

留種稻熟時選揀穗之佳美粒之圓實與土之得宜者向
田中選摘其稍收刈徐于簍內每穗去頭尾存中間
節胡下勿脫皮又勿過老恐種變水易須晒乾后淨藏
若可木器內若藏瓦器內則水步難生若遇濕則苗出
尋死老農云肥田不如換種將此色穀種植三季又選
彼色種植八季年年換種易田而種不特稻也諸穀皆
然

物種要味目生涼燶熟南人日用之食北人食之則
北方十月收穫天氣寒涼物從氣化故也太抵南人
梗早梗性熱北方自梗遲梗性涼新者甚附著實利血
脈益五臟壯筋骨食茨蕷作粥食持精強智常食乾梗
飯令人不噎然南人食麥麵而燥煩北人食稻米而痼
冷非穀之不宜人乃人之不宜穀也如南人所是南方
秉離之氣稍午時開花亦火之賦如北人所產北方秉
坎之氣麥子時開花亦水之賦是以物各從類而親也
米泔水清燥涼血和氣血益精神止飢渴炒米湯益
胃除濕不去火毒令人作渴幹燒灰淋水解砒毒

効方小兒初生三日應開胃氣碎米濃煎外如豆許與兒

飲之三七日又可與哺慎不得與雜藥

穀

唐書李百藥七陸能文父與友陸義等其讀徐陵文

有列卿耶之間謂不得其事百藥曰春被郿子籍相

杜顥既在相邦答人嘗口求語孔也度子隙察七日

不食告饑于野人得米一斗顏回仲由炊之有塵墨

隨飯中同取而食之子貢以責孔子召回曰子於而進飯吾將祭先人焉同日有塵墨墮飯中置之則不潔棄之則可惜回卽食之不可祭也○莊子子張與

子桑友罪猶子曰子貢曰子桑病矣勃久無糧遂蔑襄飯而往

事之

穀稻

穀稻釀酒之穀也穀者漸穀之總名象人在田間之義
字林元穀者粘穀也穀不粘穀也然穀甚類以粘不粘爲
異耳周禮有稻人漢有稻臣孔子云食夫稻今俗以飯粳
呼粘大失訛矣形苗葉莖穗實頭梗穀同但葉微黃不若

穎穎之青綠實色有赤黃紅白形有大小圓長有芒無芒
米亦有赤白圓長齊民要術云穀有九格雉木大黃馬首
虎皮次色是矣今隨土化水变形殊粒異其名種種稻花
午開幕合得陰之精有至七開七合者日中甚香故農云
穀怕午時風糯者糯也粘者粘也其粘糯可釀酒可爲粢
可糕可傷可炒具造用甚多考周禮以稻爲佳蔬蔬者菜
可如也稻苗乃草難作蔬論亦不知當時稻又屬別蔬物
又不知古文錯訛恐後人誤釋之耳職之者細心加詳考
焉莫于就誤因訛而漫禮乎非其職不敢以妄議

植穀齊民要術云凡下地停處燥堅焰濕則淤泥難治而
易荒燒埆而刈禾者種者殺種尤甚故五六月暵之以

擬大麥如水澇不種九月一轉春種稻萬不矢一下地
不問秋夏候水盡地白背時速犁耙耢頻翻熟二月上
旬種爲上時三月種爲中時四月種爲下時漬種分開
口樓耩揜種之卽再遍耢苗長二寸許耙耢而鋤之鋤
欲遠每經一兩輒耙耢苗高尺許四月雨耨之科大知
概者五月間霖雨時分拔而栽之一注水區難干引流
殺水者求水又乾求乾又水至夏則溢至秋則涸法以
黃泥和草爲泥糊取秧八丸莖以糊丸根聯微乾式入
水不沉不浮以當爲度如是量取丸之散秧丸于水區
中如插秧式令勻近秋水降禾下禾深水沉連去得養
此穗結實與種播者較

詎第四方天地氣候迥異擇其宜者耕之秧田宜肥秧
苗宜稀可以耐旱經老挿田易茂倘遇旱过時秧宜植
以大叢若得秋口嚴利則全收逢露亦僅半淮南子云
江水肥而宜稻種稻者蓄陂塘以灌之置堤閘以止之
種時先放水十日後曳碌碡于遍地既熟然後下種留
苗生五六寸拔而秧离七八寸則耘之耘畢故水熇之
欲秀用水浸之苗既長茂稊拔以去張勞農收穫當及
時江南上雨下水牧稻又用喬杆築架乃不失遺刈早
則米青而不堅刈晚則子零落而耗傷又恐風雨敗壞
稻之孰穫不得一概而言抱朴子云南海普安有稻一
歲九熟西域天竺土溽熱一步四熟拾遺記東有融臯

五穀多良有旬日之稍異物志冬夏再種二統志雷州
十一月下種揚雪耕耘次年四月熟浙江一夢雨種廣
東二插其秧江西稻田中復插其稻荆楚大半雨種載
蘭雜記新昌有犁田不宜旱禾夏至後始插秧秧成穗
放乾田水經烈日曝土坼裂如碎腐狀更妙至七月盡
八月初得雨纔佳土蘇醒而禾茂若于此時無雨然後
汲水灌溉若日曝未久而逢雨水則苗冷瘦不能發芽
之夏三月漫種耘薅畢然後引水溉蜀中旱秧水插
山陰會稽田灌以鹽滷水或壅鹽草灰不則碓收孽孽
台州近海所禾犯滷潮則死故作碶堰惟拒之嚴州壅
禾多用石灰台州用蚌蛤灰得鹽則苗茂不失此乃各

方之異

本性糯米味甘氣寒釀酒則熟久食糯米令人身軟小滿尤食之足曲不能行牛馬食其糲足至孕婦雜而食令子不利合酒食令人醉難醒小兒病人大宜忌之癰痘可作飯食爲粥食止消渴治水消鷄鴉毒解穰藉彈鞞去寒濕

効方糯米一升浸一宿炒研爲末山藥一兩爲末勻和每

用半盞得胡椒末少許入沙糖二匕沸水調服大有

滋補久服緩精此上品方也

雞舌

性說陶淵明荔彭澤令忿在三百畝悉令吏種秔稻

妻子固諸種植乃使二百畝秔五十畝種秔○晉書孔羣好飲酒嘗書平親舊今年田得七百畝佔不

子麌葉事十丞相謂云卿回爲恒飲酒不見酒家覆不

不

萬布日月糜爛曰不見糟肉而更堪食之齊桓公飲酒醉遣其冠恥之三日不朝管仲曰此非有國者之恥也公何不雪之以政公曰善因發倉廩賜貧窮論固固出蘇非處二日而晏子之日公胡不復遺地乎

穉

穉苗如稻葉而深綠稻苗葉邊有黍穉光滑而無毛根下帶紫抽莖初如稭穗老則分散結子如黍茶褐色每斗可得米三升可米可麅救荒書云烏禾爾雅云遼言穉者禾之穉可與伯仲也淮南子云離先稻熟而農夫耕不以小利防大獲

稗

稗救荒書云生水田及下濕地苗似黍八月抽莖如粟梗出穟分散如鴉爪狀內有細子如黍粒而赤其稃甚濃其

叫粗可不可麴歎年可救荒黔志之穀一名犹爪粟一名鴨掌稗季時珍亦爲不粘之穀不實之禾孰不知犹爪者秔也鴨掌者粘也可醸酒可熬糖黔方貴移而賤稻爲稻之穫有豐歉苗招虫蠹也范勝之云稗堪水旱薄無不熟又特滋茂良田畝得三千斛

穢耕春耕田極熟如下秧法亦有旱種者亦如插秧法但秧宜疊而淺惟稗宜深而斜節間生根耨亦如稻同收穫亦同

本性稊稗水味甘而寒補中益氣

魏武使典農種之頃收二千斛斛得水三四斗醸酒甚美醸飲不減栗米蒸一斛可當稻虧二斛宜擇其桔長粒大者種之倘遇水旱宜多種○列女傳老萊子逃世耕于蒙山楚王親至其門口守固之孤惲

見先生老萊日諾妻曰竊聞之居亂世爲人所制能免于患乎妾不能爲人所制委而去老萊子隨之隱山申采草实而食收羽毛而衣自是終身不見

古圖

張宗法師古圖著

小引

代穀以濟饑者繁矣。有時生者有不時生者。有土產者有不土產者。莫若取諸便年稔則采以佐穀。考歎則收以濟饑亦不累于地。又不困乎穀。一舉而兩便。

蔓菁

蔓菁一名蕪菁。一名九英。松一名諸葛菜。爾雅云須蕡。蕪詩云采葑采菲。毛萇註云葑湏也。孫炎云葑一名蕘方土記云葑蔓菁也。楊子雲云蕪蔓菁也。陳楚謂之蕘芥。魯謂之蕘。閼西謂之蕪菁。魏趙謂之大芥。皆一物也。根長而

日形若胡蘿蔔營霜後轉軟蒸者任用稍似芋魁略有苦澀
頗近穀氣莖粗葉大而厚潤夏初起苔開黃花四出如芥
菜渾同臺人久食菜蔬無穀氣卽有菜色食蔓獨則否
四時皆可食春食苗夏初食心秋食莖冬食根時二之家
能薅數百本亦可終歲足疏子可笮油燃土甚明

心葉種宜七月初每畝用丁二升法以先雜草兩過卽犁
若無雨先一日灌地令透次日耕作畦種覆土厚一指
得砂土高者爲上故墟壤尤佳苗出後去小者爲茹
若不欲移植取次芸出大者令相去尺許若欲移植候
苗長六七寸擇其大者移之先耕熟地作畦起土壅既
苗其上壅土浮虛根大僅當每畝種枳可得五十不無

三石可當米一石是一亩可得米十四五石則可三人
卒歲之栗也子陳用鰻鰐油浸之曬乾種可少虫蟲收
子者當六七月種至四月收若春種者亦卽生蠶與秋
種者同熟然根小莖稈子少若供食者正月至八月皆
可種凡遇水旱他穀已晚但有隙地即可種之以濟口
食若得地方一尺五寸植一本一步卽十六本每畝
得三千六百本每本得子一合共得子三石六斗比油
菜子可利多二三倍十月終耕出蔓菁根數晒過冬月
蒸熟甘而有味和羊肉煮甚美春生苔爲蔬中上品四
月收子比脂麻易種油煉熟炒摻比麻油香美其子九
蒸九晒爲粉可塗帛

本性蔓菁子味苦氣溫常服利上下氣潤五臟解麁毒介人強健

効方
辟穀石蠶青子熟時采之水煎三遍令去苦味曝乾搗末每服一錢鹽水小小服延年夜可讀書三月三日采蔓菁花陰乾爲末空心井水下抱朴子方蔓菁子三升煮熟脯乾爲末每晨井花水服方寸匕無所忌服一年能夜視物一預禳時疫立春後遇庚子日煮蔓菁汁合家服之不限多少一年可免時疫

廣志云五臺山深谷居人每年人歲種三百六十木一日食一本不妨絕糧○後漢書諸葛武侯行兵所止合軍土猶稱煮食其餘出士可生啖一也藥解可煮食二也久居則犯以葛目三也草不合惜田也疑則可得而采五也限可食去此故合田日武侯諸葛果目上

辛

芋圖經云王芝芋者吁也芋魁之狀地輿云蹲馬若鳴之蹲生也蜀山之下沃野有蹲鳴至死不饑更記云歲生十三子閏生十三兒芋屬甚多各種不同而俗呼亦異不過以水旱備之旱芋山地可植水芋澤田可種葉如荷長而不圓當心出苗者爲芋頭四面附生者爲芋子秋後掘食之葉莖亦可茹食惟蜀產者大而圓他土產者形長芋不開花時開者至秋抽莖開黃花傍有一長蔓護之如牛蓮形皮上有微毛如鱗次裹之其根可煮可恨可果豐年葉悵可飼豕甚于穀實博物志云閼刷鍋聲則不生子

植蔬揀肥潤土耕極熟三月內擇壬申壬午壬戌辛巳戊

中庚子辛卯日植將芋芽向上勺種候生三四葉高四五寸至四月移栽芋性畏旱宜近水砂土區深可二三尺許行欲寬可風透木欲深深得根大春宜種夏種難生秋宜壅不壅則瘦鋤宜頻澆宜改宿降宜掘其壅須鋤開根邊土加以肥渥壅根使力回于相則愈肥大范勝之云區方深各三尺下實立箕尺有五寸以糞著上如箕原一區種五本要勺再以糞上之芋成箕爛皆長三三寸南方多水芋北方多旱芋宜二尺一科每畝爲科一千一百六十科散種若子每科二斤每畝爲斤三千四百二十斤以熟糞數倍于穀

善芋宜處露未乾及雨後耘锄令根傍土虛則栽若對日

其初生苗萬七月在芋四角掘土壅根加以灰糞等土
每穴子园大霜後起之水芋不耘耥但宜中加之河

十月酒

十月揀根園大長尖者就屋簷下掘坑以瓦砾鋪底
將種下內以草莖蓋之勿令凍爛至來春三月取出理
肥地生芽移栽芋多惡種卽田園所植亦須慎擇有種
青色多斑者味最劣有青芋魁一有小毒若食先以灰
者後和薑煮次易水者熟可解簽麻乃堪食野芋大毒
殺人芋三年不采成苗葉根相似誤食者用土漿解或
豆汁糞清灌之

本性平味甘氣平滑寬腸胃充肌膚小兒禁食滯胃氣難
治其後已

匏化有風疾服風藥者禁食服餌家宜忌爲其性滑也
同魚肉者食補中益氣益舌者殺人

萌荒書望之所至凡草木無有遺者猶不食芋藥日

夏炎是其考驗也○華談述上列陽隱民王屋山昆

一鄉殊爲烽所繁墮地瘻欲裂裳行人呻吟破革幹以傷死就溝厓之長久腹消如故○秦晉秦破趙遷卓氏之蜀夫婦并篠行諸遷虜少有節財爭與更求附近處七葭葫推卓氏曰此地淮濱吾間泰山之下汎破下有孽賜至死不飢乃遠求遷致之臨甲即鍼山破鋤並著賀易當至敵國

諸

諸海人云甘諦南方名菴諸本草名朱諸藥青莖赤引蔓粟本大末圓而尖其根形圓而長末本銳皮赤肉黃白質理細潤巨者如盃亦有大如瓶者小者如指生啖之氣如桂花熟聞之臭若蘭微苗撲地傳主一蔓至數十百莖節

節生根一畝種數十石瘠地數二十倍海人以當穀可生食蒸食煮食燶食可切米晒乾收貯作粥食可磨粉可餌餌可釀酒其利甚多蔓可飼牛馬根養猪易長蓏根中之至最者

種熟蕷宜离土砂地熟以土起畦作壅二三尺以根栽
脊間遇旱汲澆以水遇涝急引瀉水苗蔓延猶加土糞
換之每生諸根若芳逢水害旱災至七八月中氣候不
及種熟五穀卽宜剪藤種諸以救饑至于虫蝗爲災惟
諸在土薦食不及縱令莖葉皆盡尚能復生遇蝗信到
時急覆土逼葬蝗去滋生更易天災物害不能爲損耕
宜夢前壅宜大糞春分後下種若地非砂土須柴灰和

牛馬糞人土中使土脈散緩與砂土同重耕起要極深
將諸根每段節三四寸長覆上深半寸許每穴相去七
八尺橫三三尺蔓生旣茂苗長一丈留二尺作老根餘
剪三節爲一段挿入土中大約二分入土一分留外卽
生隨長隨剪隨種隨牛蔓延與原種者不異凡栽須順
栽若倒栽則在生在外者生枝在土者生卵約各節生
根卽從其逆緩處斷之令各成根苗每節可得卵三五
粒三月至八月俱可種但卵有大小八九月始生卵冬
至乃止始生便可食若未須者勿頻掘令居土日漸大
到冬季後須盡掘出不則敗腐矣

用地凡諸三月種者每株用地方一步有半而卵遍地

每畝約用諸三十六株四五月種者地方二步而
焉每畝約六十株六月種者地方一步者半而
每畝約一百六株七月種者地方一步而卵遍焉每畝
約二百四十株八月種者地方三尺以內所得卵小矣
畝約九百六十株密疎畧以此準之九月畦種生卵如
著頂如棗核擬種

藏種八月揀近根卵堅實者陰乾以軟草裹之置無風和
煖處勿令水凍乃南土收種之法霜降前取近根藤臘
令乾于竈下掘窖約深尺餘寸先下穢秕三四寸次置
種于內又土加穢秕蓋三四寸以土覆之乃北土收種
之法又法七八月收近根老藤入木筩中至霜降前置

草筍內以穢秕置向陽近火處至春取卵種植各土囊溫不同須宜其地而藏之可也

木性柔諸味甘氣平補虛益損巧薯蕷同功初食覺滿久服則快但忌與醋同食

廣志甘諸生朱產海中人
蒸酒切如米貯以充飢名

不業耕稼惟植甘諸秋熟
諸外客俱牛不得矣以甘

諸若梗粟然飫以甘諸酒
諸故耳口閉志洋人自海

海中人壽永百歲食日
外得此種海人因示不合出

洋人取諸爰入汲水绳中
○甘諸有十二勝牧人多

因得渡海分種遂間中耳
一也色赤味甘諸上拜中

俗爲蔓絕可也益人與山
竹種今步一莖來步過畝

四也葉蔓附地隨節生根
來年不得失六也可

風雨不得浸漬五也牧當
克邊責七也可酿酒人也

也久收時居可旋作餅每

勝用餡蜜九也生熟可食
也脊夏拜初冬收枝葉極

盛草移不容但須壅土不
容耘種無妨農工十二也

○正象晉川人家有嗜

地但只數尺仰見天日便
可種得石許此松荒第

義也人不忽諸耳曰自述田地下者不宜諸若
之地植豆者少易以種諸有數倍之復得
後以比種畝可收數十石數口之家此種一
汲水澆灌蝗則用土掩藏一至成熟終步足食