

醫

燈

續

焰

醫燈續焰卷十

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖異評

門人 魯應遶兆青 校

蕭明俊公溥

痿病脉證第六十七

痿病肺虛。脉多微緩。或濡或緊。或細或濡。

痿者。委也。足痿不用。有委靡不振之義。故字從委。

其證五藏俱能成。而此獨歸之肺者。本素問也。素問痿論。岐伯曰。肺熱焦。則皮毛虛弱。急薄。若則生痿躄。又曰。肺者。藏之長也。爲心之蓋也。有所失忘。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱。葉焦。五藏因肺熱。葉焦。發爲痿躄。觀岐伯所言。則知五藏之痿。必自肺始。內則先葉焦。而外則先皮毛虛弱。急薄也。蓋肺居心上。爲最高。外合皮毛。爲最表。故云藏之長。心之蓋。主一身之氣。而司呼吸。朝百脉而行榮衛。

故○平○人○氣○象○論○曰○藏○真○高○于○肺○以○行○榮○衛○陰○陽○也○
其○令○收○降○其○化○清○肅○故○有○失○怠○求○謀○不○得○則○肺○氣○
鬱○鬱○則○收○者○愈○收○氣○思○爲○火○而○熱○生○焉○熱○則○清○肅○
之○化○不○行○炎○蒸○之○邪○自○迫○斯○時○也○氣○不○寧○靜○則○喘○
鳴○藏○不○濡○潤○則○焦○萎○然○不○獨○一○肺○止○也○蒸○熏○榮○衛○
耗○竭○藏○陰○嗣○是○五○藏○之○合○如○筋○脈○肉○骨○之○屬○亦○皆○
不○得○其○榮○潤○而○諸○痿○之○證○作○矣○故○岐○伯○又○曰○心○氣○
熱○則○下○脈○厥○而○上○上○則○下○脈○虛○虛○則○生○脈○痿○樞○折○

挈。脰縱而不任地也。

宜丹溪虎潛丸
補陰丸之類

肝氣熱則膽

泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發爲筋痿。

宜四

物湯三因加減
百斤丸之類

脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發

爲肉痿。

宜東垣神効黃耆湯
錢氏湯黃散之類

腎氣熱則腰脊不舉。

骨枯而髓減發爲骨痿。

宜丹溪虎潛丸三因
加減四斤丸之類

此皆

言肺熱葉焦皮毛急薄熱留着不去災及四藏而

發爲諸痿也若四藏不虛其隙可乘則熱亦不能

據襲故下文岐伯復曰悲衰大甚則胞絡絕胞絡

絕則陽氣內動。發則心下崩。數洩血也。故本論曰。

大經空虛。發爲肌痺。傳爲脉痿。

宜仲景多其汗。黑地黃丸之類。

此言悲哀太甚。致心系急而胞絡絕。評熱論曰。胞脉者。屬心而絡于胞中。絕則不能上交于心。亢陽內迫。內迫則血溢下崩。隨洩而出。崩則大經空虛。無以榮灌脉絡。故先爲肌痺而漸傳爲脉痿也。又曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。故下經曰。筋痿者。生于

肝使內也。

宜知藥入味九四物湯加味逍遙散之類

此言外想邪淫而

不遂。及甚于入房。一則肝火抑鬱。一則陰精耗亡。

皆前陰所關。前陰者宗筋也。宗筋無陰以養。而反

爲火迫。故弛縱痿弱。及淫念動。而白物隨下。故筋

痿者。生于肝使內也。又曰。有漸于濕。以水爲事。若

有所爾。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發爲肉痿。

故下經曰。肉痿者。得于濕地也。

宜胃苓湯仲景方已黃耆湯東垣參

木湯之類此言從事于水濕之處。居處皆濕。漸受其邪。

留著而滯漬肌肉之間。久則肌肉不仁。發爲肉痿。
故肉痿者。得之濕地也。又曰。有所遠行勞倦。逢大
熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍于腎。腎者。水
藏也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發
爲骨痿。故下經曰。骨痿者。生于大熱也。宜知榮入
味九六味
充補陰
充之類此言遠行勞倦。逢熱而渴。渴則內熱殊甚。
內熱甚。則乘其虛者而迫之。遠行勞倦。則腎氣適
虛。經脈別論云。持重遠行
汗出于腎。腎虛明矣。腎虛則受其熱而不

勝。漸至髓減骨枯。以致足不任身。發爲骨痿。故骨痿者。生于大熱也。又曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脉者。經脉之海也。主滲灌谿谷。與陽明合于宗筋。陰陽總宗筋之會。會于氣街。而陽明爲之長。皆屬于帶脉而終于督脉。腰脊不舉。似兼督脉證。故陽明虛。則宗筋縱。帶脉不引。前白注。似帶脉不引證。故足痿不用也。又曰。各補其榮而通其俞。調其虛實。和其逆順。筋脉骨肉。各以其時。

受月。則病已矣。前岐伯論痿之感受傳變。可謂盡矣。而終復歸之陽明者。何哉。蓋陽明爲水穀之海。衝爲血海。此不言水穀而言五藏六府之海。不言血而言經脈之海。見藏府經脈。無非二者爲之源。一潤宗筋爲陽。一灌谿谷爲陰。總宗筋而會于氣街。推陽明爲之長者。氣街乃陽明正脈。亦有尊水穀之義。督脈直行。帶脈橫圍。陽明衝脈皆屬帶而絡督。陽明虛。則不能榮養宗筋。而帶脈亦無力收。

經本切音理
辨自來

引故足痿不用也。是知束骨利機關者。必藉乎宗筋。而宗筋又藉陽明之榮潤。故治痿者。獨取陽明也。然必兼視各藏之榮俞。宜補宜通。受病之時。凡或衰或盛。而後逆順可和。虛實可調。病良已矣。此岐伯答帝治痿之針法也。其脈多微緩。或濇或緊。或細或濡者。以微應皮毛。緩應肌肉。濇應血脈。緊應筋膜。細濡應骨髓耳。

附方

虎潛丸

見第五十一

補陰丸

黃檗

知母

俱鹽酒拌炒

熟地黄

敗龜板

酥炙各四兩

白芍藥

炭

陳皮

牛膝

酒浸各二兩

虎脰骨

酥炙

瑣陽

酒浸酥炙

當歸

酒洗各一兩半

冬月加乾薑

五錢半

右爲末酒煮羯羊肉爲丸鹽湯下。

四物湯

見第二十一

肝腎

虛用緩中

持之劑因

虛大熱淫

肉何以用

能持五味要

知虛熱與邪

自是不同

三因加減四斤丸 治腎肝虛熱淫于內致筋骨

痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉

潮熱時作飲食無味不生力氣諸虛不足。

肉蓯蓉

酒浸

牛膝

酒浸

天麻

木瓜

乾

鹿茸

燎去毛切酥炙

五味子

酒浸

熟地黄

芫絲子

酒浸另研各等分

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服五十九。空心

溫酒米飲任下。一方不用五味子。有杜仲。

東垣神効黃耆湯

黃耆

二錢

人參

去蘆

白芍藥

炙甘草

各一錢

蔓荊子

剉二分

陳皮

去白五分

水一盞八分煎一盞去滓臨卧稍熱服如小便

淋澁加澤瀉五分如有大便熱證加黃檗酒炒

四次三分麻木不仁雖有熱不用黃檗再加黃

耆一錢如眼縮小去芍藥忌酒醋濕麪大料物

葱韭蒜及淡滲生冷硬物麻木重甚者加芍藥

日陽虛
寬而服
勿藥恐
也

木通各一錢

錢氏瀉黃散

見第四十九

仲景炙甘草湯

見第三十三

黑地黃丸

見第五十一

知葉八味丸

見第三十日

加味逍遙散

見第五十一

胃苓湯

見第十七

仲景防己黃耆湯

防己

一兩

甘艸

半兩

白朮

七錢

黃耆

去蘆一兩一分

右剉，每抄五錢，七生薑四片，大棗一枚，水盞半煎八分，去滓，溫服，良久再服，喘者，加麻黃半兩，胃中不和，加芍藥三分，氣上衝者，加桂枝三分，下有陳寒者，加細辛三分，服後當如重行皮中，從腰下如水，後坐被上，又以一被繞腰以下，溫令微汗差。

東垣參朮湯 治氣虛顛掉

人參

白朮

黃耆

各二錢

白茯苓

炙甘草

陳皮

各一錢

甚者加附子

童便製一錢

水二鍾煎八分食前服。

六味丸

見第十六

痺病脉證第六十八

風寒濕氣合而爲痺。浮澹而緊。三脉乃備。

五藏之所
合言謂之五

此者爲肌痺。以秋遇此者爲皮痺。帝曰。內舍五藏。六府何氣使然。岐伯曰。五藏皆有合。病久而不愈者。內舍於其合也。故骨痺不已。復感于邪。內舍于腎。筋痺不已。復感于邪。內舍于肝。脉痺不已。復感于邪。內舍于心。肌痺不已。復感于邪。內舍于脾。皮痺不已。復感于邪。內舍于肺。所謂痺者。各以其時。重感于風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者。肺痺者。煩滿喘而嘔。宜急治之。蘇子湯之類。心痺者。脉不通。煩則心

下鼓暴上氣而喘。盜乾善噫。厥氣上則恐。

宜茯苓湯之類

肝痺者。夜卧則驚。多飲。數小便。上爲引如懷。

宜薤白散

奇効人參散之類

腎痺者。善脹。尻以代踵。脊以代頭。

宜加味五

痺湯奇効人參散之類

脾痺者。四肢懈墮。發欬嘔汁。上爲大

塞。

宜溫中法麴丸黃耆丸之類

腸痺者。數飲而出不得。中氣喘

爭。時發殭世。

宜茯苓川芎湯之類

胞痺者。少腹勝臑。按之內

痛。若沃以湯。澀于小便。上爲清涕。

宜腎氣湯之類

陰氣者。

靜則神巖。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。淫氣喘

在感之邪
歎曰淫

息痺聚于肺。淫氣憂思。痺聚于心。淫氣遺溺。痺聚于腎。淫氣乏竭。痺聚于肝。淫氣肌絕。痺聚在脾。諸痺不已。亦益內也。其風氣勝者。其人易已也。帝曰。痺其時有死者。或疼久者。或易已者。其故何也。岐伯曰。其入藏者死。其留連筋骨間者。疼久。其留皮膚間者。易已。帝曰。其容于六府者。何也。岐伯曰。此亦其食欲居處。爲其病本也。六府亦各有俞。風寒濕氣。中其俞。而舍於處。之。循俞而入。各舍其府也。

帝曰。以針治之。奈何。岐伯曰。五藏有俞。六府有
循脉之分。各有所發。各隨其過。則病瘳也。帝曰。榮
衛之氣。亦令人痺乎。岐伯曰。榮者。水穀之精氣也。
和調于五藏。灑陳于六府。乃能入于脉也。故循脉
上下。貫五藏。絡六府也。衛者。水穀之悍氣也。其氣
慄疾滑利。不能入于脉也。故循皮膚之中。分肉之
間。熏于膏膜。散于胸腹。逆其氣則病。從其氣則愈。
不與風寒濕氣合。故不爲痺。帝曰。善。痺或痛。或不

痛。或不仁。或寒。或熱。或燥。或濕。其故何也。岐伯曰。痛者。寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行。滯經絡時疎。故不通。皮膚不營。故爲不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒也。其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝。陽遭甲乙經作乘陰。故爲痺熱。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫痺之爲病。不痛何也。岐伯曰。痺在于骨則重。在于脉則血凝。

而不流。在于筋則屈不伸。在于肉則不仁。在于皮則寒。故具此五者則不痛也。凡痺之類。逢寒則虫。

甲乙經作急

逢熱則縱。帝曰善。其脉浮濇而緊者。浮爲

風。濇爲濕。緊爲寒。乃一脉中見此三種。始爲三邪雜合。若雜合中。邪有偏勝。則又當審脉之浮多。濇多。緊多。以別之也。至方十一首。固與本論府藏證

對。殊不知三邪之變。見于形體者。不可勝紀。論中雖分行痛着三種。而三種之證。未經列出。如痛痿

走注麻木不仁。拳攣重着等證。似與前方。漠不相
關。若集治之。恐迂緩無裨。故又選對證名方於後。
以便採用焉。行痺宜仙靈脾散三因松涎丹痺痺
宜烏藥散丹溪二妙散着痺宜
煎通神效黃耆湯濕痺除
濕湯史國公浸酒之類

附方

當歸湯

當歸

酒洗
二錢

赤芍藥

煨一
錢半

獨活

防風

赤茯苓

黃芩

秦艽

各一錢

杏仁

去皮尖八分

甘艸

六分

桂心

三分

水二鍾。薑三片。煎八分。不拘時溫服。

紫蘇子湯 治肺痺胸心滿塞。上氣不下。

紫蘇子

炒八兩

半夏

湯洗五兩

陳皮

去白

桂心

各三兩

人參

白朮

甘艸

炙各二兩

右咬咀。每服四錢。水一盞。生薑五片。棗一枚。煎

七分。去滓。不拘時溫服。

茯神湯 治心痺。神思昏塞。四肢不利。胸中煩悶。
時復恐悸。

茯神

去木

羌活

去蘆

麻黃

去節根

麥門冬

去心焙

龍齒

各一兩

遠志

去心

犀角屑

薏苡仁

人參

去蘆

蔓荊子

防風

各七錢五分

赤芍藥

茸艸

各五錢

右咬咀。每服三錢。水一鍾。薑五片。煎七分。去滓。不拘時溫服。

草薺丸 治肝痺。緩筋脉。去邪毒。調榮衛。

草薺

羌活

去蘆

天麻

酒浸一宿切焙各一

兩

附子

炮去皮臍半兩

乳香

沒藥

另研各二錢半

右爲細末。入乳香沒藥同研勻。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。空心溫酒化下。日再服。

奇効人參散 治肝癰氣逆。胸脇引痛。眠卧多驚。
筋脉學急。此藥鎮肝去邪。

人參

二兩

杜仲

去麁皮炒

黃耆

蜜炙

酸棗仁

微炒

茯神

去木各一兩

五味子

細辛

去苗

熟地黄

秦艽

去苗土

羌活

去蘆

丹砂

細研

芍藥

各半兩

右爲細末。入丹砂。再研令勻。每服一錢。不拘時。
溫酒調下。日三服。

五味五痺湯 治五藏痺證。

人參

茯苓

當歸

酒洗

白芍藥

煨

川芎

各一錢 肝心腎痺倍之

五味子

十五粒

白朮

一錢 脾痺倍之

細辛

七分

甘艸

五分

水二鍾。煎八分。食遠服。肝痺。加酸棗仁。柴胡。

心痺。加遠志。茯神。麥門冬。脾痺。加厚朴。枳

實。砂仁。神麩。肺痺。加半夏。紫苑。杏仁。麻黃。

腎痺。加獨活。官桂。杜仲。牛膝。黃耆。草薢。

溫中法麩丸。治脚痺。發欬嘔汁。

法麩炒

枳實炒

白茯苓

吳茱萸

湯浸
焙炒

桂心

厚朴

去皮薑
汁炒

當歸

切
焙

甘艸

炙各
三兩

麥蘖

微炒
五合

細辛

去
前

乾薑

炮

麥門冬

去心
焙

附子

去
皮臍

糖棗

炒

人參

各一
兩

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十九。食前熟

水下。日三服。

黃耆丸 治脾痺。肌肉消瘦。心腹脹滿。水穀不化。食即欲嘔。飲食無味。四肢怠惰。或時自利。

黃耆

剉

石解

去根

附子

炮去皮臍

肉蓯蓉

酒浸切焙

益智

去皮

白朮

人參

各一兩

厚朴

去皮薑汁炒

桂心

各一兩半

五味子

當歸

白豆蔻

去殼

枳實

炒

沉香

剉

良薑

各七錢五分

訶梨勒

煨去核
二兩

吳茱萸

湯洗

丁香

各半
兩

爲細末。煮棗肉和。搗五百杵。丸如梧子大。每服
三十九。食前溫酒送下。

茯苓川芎湯

赤茯苓

一錢
半

桑白皮

防風

蒼朮

米泔浸
一宿炒

麻黃

芍藥

煨

當歸

酒洗各
一錢

官桂

五分

川芎

一錢
二分

甘草

四分

水二鍾。棗二枚。煎八分。食前溫服。

腎瀝湯

麥門冬

去心

五加皮

犀角

各一錢半

杜仲

薑汁炒去心

桔梗

赤芍藥

煨

木通

各一錢

桑螵蛸

一餅

水二鍾。入羊腎少許。煎八分。食前服。

仙靈脾散 治風走注。往來不定。

仙靈脾

威靈仙

芍藥

蒼耳子

炒

桂心

各一兩

右爲細末。每服一錢。溫酒調。不拘時。

三因控涎丹

見第二十二

烏藥順氣散

見第六十五

丹溪二妙散

治筋骨疼痛。因濕熱者。如有氣。加

氣藥。如血虛。加補血藥。如痛甚。加薑汁。熱辣服

之。

黃藥

炒

蒼朮

炒製
云皮

治腎口筋骨
燥而用蒼朮
之燥非有濕
者不可各隨
氣血加藥是
一生活

右爲末。生薑研。入湯煎沸調服。此二物皆有雄壯之氣。如表實氣實者。少酒佐之。

東垣神効黃耆湯

見第六十七

東垣溫經除濕湯 治肢節沉重疼痛無力之聖

藥。

羌活

七分

獨活

黃蘗

麻黃

去節

當歸

各三分

柴胡

黃耆

黃連

木香

草豆蔻

神麩

各二分

人參

甘草

炙

澤瀉

猪苓

白朮

各一錢

陳皮

蒼朮

各二錢

白芍藥

三錢

升麻

五分

右作二服。用水二大盞。煎一盞。去滓。食遠稍熱服。

史國公浸酒方 專治左癱右瘓。四肢頑麻。骨節

酸疼。諸般寒濕風氣。

當歸

虎脛骨

酒浸一日
焙乾酥炙

羌活

鼈甲

炙

草薺

防風

去蘆

秦朮

川牛膝

松節

晚蠶砂

各二兩

枸杞子

五兩

乾茄根

八兩飯
上蒸熟

用無灰酒一斗。絹袋盛藥入酒內。封十日。取飲時。不可面向蟬口。恐藥氣衝人頭面。飲酒不可間斷。飲盡藥滓。晒乾爲末。米糊丸。梧子大。空心

酒下五十九。忌食發風動氣之物。

五疸脉證第六十丸

五疸實熱。脉必洪數。澁微屬虛。最忌發渴。

疸者。黃疸也。謂濕疸。穀疸。女勞疸。酒疸。及黃汗也。名雖分五。實脾胃爲之總司。濕熱爲之原始。夫脾胃屬土。合肌肉而至四肢。其化濕。其性滯着。其色黃。其脉遲緩。所畏者風木。而復喜風之燥。能制者寒水。而反惡水之濕。人之疾也。若內無脾胃之鬱。

香蒸如胆酒
藥劑合時造
實疏人身之
濕熱成疸

五疸雖
原皆本

是則
以此
致

外無風濕之搏。雖有外邪。氣機自利。熱不會蒸。黃
又何自而成乎。故金匱要畧論濕疸曰。寸口脈浮
而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢苦煩。脾
色必黃。瘀熱以行。蓋言風之獨行者。乃名中風。中
風則腠理空疎。皮毛開泄。汗出熱越。不能發黃。今
則脈浮而緩。浮固爲風。緩爲土濕。濕則痺着。非若
風之疎利。必鬱瘀成熱。脾土所主之四肢。亦苦煩
悶。而黃色則蒸行於表也。其論穀疸。則曰。跌陽脈

穀道係食氣
易胃如飯傷
熱濕者然

緊而數。數則爲熱。熱則消穀。緊則爲寒。食卽爲滿。
尺脈浮。爲傷腎。跌陽脈緊。爲傷脾。風寒相搏。食穀
卽眩。穀氣不消。胃中苦澀。濁氣下流。小便不通。陰
被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。夫人飲食
入胃。胃主消納。脾主運輸。脾胃溫和。兩稱其職。今
胃熱而過于強。則徒能消納。脾寒而失之弱。則不
能運輸。旣寒且弱。肝木得以乘之。木者。風也。風與
寒搏。脾愈不運。更加以食。氣愈不消。搏於寒。則中

爲滿。搏於風。則上爲眩。氣既不消。胃中自濁。濁則不能清升。而反下流。下流則脾之緊寒乘腎。胃之

數熱乘膀胱。

尚書洪範曰土爰稼穡。穡穡作其夫。萬物藉土以生。人賴稼穡以養。稼穡

者穀也。穀氣下流而必歸之腎。與膀胱者亦土乘水義。難經三十七難曰脾氣通于口。口和則知穀味矣。脾主五味。食味之歸于脾者不可勝數。而芻言一穀味者。正稼穡作其之義也。

膀胱者

都之官。主藏津液。腎者水藏。主通二陰。熱流勝

而小便又復不利。水與熱鬱。未有不蒸。會而成

黃者。以膀胱太陽主表。故黃遍于周身也。

或兼寒熱不食

身瘦得之
使內腎
胃之同
不致有
此症

食即頭眩心胸不安久久發黃
為穀疸宜茵陳湯加減主之
額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便
自利名曰女勞疸腹如水狀不治此言女勞而成
疸則黃不言可知矣細察仲景文義是亦穀氣鬱
蒸之變證也蓋人過勞於房室則傷精精傷則腎
虛腎虛則真水不足真水不足則相火熾炎於是
胃中濁熱之氣不流于膀胱而竟歸之腎一以乘
不足之水虛一以就同類之火熾火熾則君火亦

因而動。況子午同氣。心腎交通。故不惟腎經之足
心熱。而心經之掌。心亦熱也。薄暮氣降。而屬陰。乘
其已虛之陰。助其下流之勢。無如此際。故薄暮病
卽發也。膀胱雖虛急。而熱不內蓄。故小便自利也。
若濕熱相火鬱甚。久而不愈。則脾氣積而不運。腎
氣散而不藏。致腹脹如有水狀者。是脾腎兩敗。故
不治也。金匱又云。黃家日晡所發熱。而反惡寒。此
爲女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下

酒結是積飲
後以將土
之濕化湯酒
之熱飲
身以症得平

熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時瘡。此女
勞之病。非水也。腹滿者難治。宜硝礬散主之。其論
酒疸。則曰心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒
疸。酒疸者。過飲而病黃。亦穀氣鬱蒸之變證也。靈
樞論勇篇云。酒者。水穀之精。熱穀之液也。熱則已
經醞釀。拔其精微。蛻其糟粕。純陽氣勝之物。其性
慳悍。多升而少降。今人飲少酒。卽頭面先紅。此多升少降之明驗也。非上
所云穀氣。未經腐熟醞釀者比。故濕熱不流於下。

但積於中焦。鬱胃薰心。令人外發黃而內煩懊。不能食而時欲吐也。又云。酒疸諸證。小便不利。心中熱。足下熱。又或無熱。譎語。小腹滿。欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。心中熱。欲嘔者。吐之。愈。酒疸下之。久久爲黑疸。目青面黑。心中如噉蒜。莖狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖黑微黃。故知之。酒疸心中懊憹。或熱痛。梔子大黃湯主之。黃汗一證。仲景金匱要畧。收入水氣病中。其三

黃汗以汗出
入水中此類
鬱正脈所致
法當充衛宜
陽故治黃汗
者以黃耆桂
枝湯注

治與治疸亦自懸絕。後人以其汗黃遂列爲五疸之一。實非疸也。今本文旣云五疸則黃汗在其中。似不可移去。姑從之。而論治仍從要畧。在圓機者。自爲識別可也。要畧曰。黃汗之爲病。身體重。發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如檗汁。脈自沉。從何得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入。得之。宜黃耆芍桂酒湯主之。此黃汗之病因也。蓋人作勞汗出。陽氣動張。陰液妄泄。此時玄府未閉。

榮衛兩虛。卽浴于水。水寒之邪。未有不乘虛而入者。入則水濕肉僂。浮陽外拒。鬱搏于肌肉之間。肌肉者。脾土之合。故身則發熱而汗則見黃色也。可
以榮衛虛而受邪。邪入則愈虛。而陽仍不固。陰液
仍泄。卽仲景所云陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出
之義。以汗液出多。故渴。以水氣在表。故狀如風水
水性就下。故脉沉。治以黃耆芍桂酒湯者。所以和
榮固衛。托裏建中。則黃從汗減。水從汗消。與治疽

甲錯言皮膚
燥澀之甚如
甲之錯

之發汗利小便者。固不可同日語也。又云。黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常稜盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已。輒輕者。久久必身腫。腫卽胸中痛。又從腰已上。必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此爲黃汗。桂枝加黃耆湯主之。此黃汗之變證也。黃汗旣爲陰陽。

兩虛。陽則浮散于表。陰則脫根於下。兩脛逆冷者。其常也。今不冷而反發熱。是熱爲濕鬱所成。乘陰之虛。流注下焦。以及于脛。而脛以上之諸節。歷遍而痛。不言可知。此黃汗之傳爲歷節者如此。衛者。陽氣也。勞則陽動。陽動則衛氣張散。卒逢食穀。胃陽驟升。張散之虛。陽不能羈穀氣之慄悍。故與之俱出。而爲汗也。又暮爲陽衰之時。勞動衰耗之陽。暮則愈衰。衰則不能外固。而汗因益出矣。此黃汗

現明義理無
一毫用力處

竭之後証
隨至妙

之挾勞氣者如此。凡熱隨汗而解者。理之常也。今
汗已。反更發熱。如是久久。則津液續亡。肌膚枯澁。
身體又安得不甲錯乎。甲錯而熱仍不止。不但淺
災肌膚。亦將禍延肉理。惡瘡之生。勢所必然。如流注
毒之類故云惡身重者。水濕之邪也。汗出輒輕。似乎邪解。
今云久久者。必輕而復重。重而復輕。亡散衛陽。耗
竭津液。不知其幾。而邪仍不去。則必轉爲身羸而
胸中痛矣。靈樞本藏篇云。衛氣和。則分肉解利。皮

膚調柔，腠理緻密。又云衛氣者，所以溫分肉，充皮膚，肥腠理，司開闔。素問痺論又云，衛氣循皮膚之中，分肉之間，熏于膏膜，散于胸腹。調經論亦云，陽受氣于上焦，以溫皮膚分肉之間。觀諸篇論，則知人身分肉腠理，皆衛氣之所充實。上焦胸腹，皆衛陽之所布輪。今衛氣亡散，分肉腠理，不能緻密而反空虛空虛，故觸而動。上焦胸腹，不得受其熏布，亦隨觸而爲虛痛也。病必欲按榮氣既虛，衛復不固，况

腰已上爲陽，陽主開，故汗出。腰以下爲陰，陰主闔。榮衛虛而邪復滯着，故無汗。唯其無汗，邪不鬆解。故如有物在皮中，而腰腕爲之弛痛也。刺則三焦皆無所御，榮衛不能相將，氣不將于上，則不能食。氣不將于中，則生煩躁，氣不將于下，則小便不利。治以桂枝加黃耆湯者，與上條黃耆芍桂酒湯之義亦同。但此條云食已汗出，常晡盜汗，汗已反熱，汗出輒輕而不解，汗上出而下無，皆似病在汗處。

宜氣
宜
此大

香性

養月

義解

高結結

最爲聖

故加薑棗甘草。蓋欲助脾胃以行津液。蓋辛甘以

別取正汗耳。諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。宜

以汗解之。宜桂枝加黃耆湯至之。治疸利小便固一定之法然脈

浮者鬱在表又宜以汗解也諸黃。猪膏髮煎至之。黃疸病。茵陳

五苓散至之。二者通治之黃疸腹滿。小便不利而赤。自

汗出。此爲表和裏實。當下之。宜大黃硝石湯。汗出爲表

和腹滿便實爲裏實裏實者宜下之黃疸病。小便色不變。欲自利。腹

滿而喘。不可除熱。熱除必臧。臧者。小半夏湯至之。

小便色不變大便欲自利裏無熱也則喘滿諸黃
爲虛象若認爲熱而除之必胃寒作嘔矣
腹痛而嘔者宜柴胡湯腹滿而嘔半表半裏柴胡湯即小柴胡湯也男

子黃小便自利常與虛勞小建中湯黃而小便自利知非濕鬱

乃男子勞役傷脾所致脾傷則見土色病黃疸發熱煩喘胸滿口燥

者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從

濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之凡

肚熱者熱在腹不獨疸也手按則知脈沉渴欲飲水小便不利者皆

發黃沉爲在裏渴爲裏熱熱則多飲而小便復不利必鬱爲黃腹滿舌痿黃燥

不得睡。屬黃家。

胃土鬱則水液不分布故腹滿舌燥經云胃不和則睡不安皆黃家

之先

驅也。黃疸之病當以十八日爲期。治之十日已上。

癢。反刺爲難治。

土旺于四時各一十八日濕土之病期亦應之十日以上則旺氣漸

衰邪宜漸退反刺者則正不勝邪故云難治

疽而渴者其疽難治。疽而

不渴者其疽可治。發於陰部其人必嘔。發於陽部。

其人振寒而發熱也。

濕土鬱而成疽內關脾胃發于脾陰則嘔發於胃陽則振

寒發熱皆二經是動之病

正文云五疸實熱以疽皆濕與熱鬱。

外不得通內不得泄。會蒸成黃。虛鬆而有通泄處。

則不能成黃。故曰實熱若是。則脈自應洪數。濇微者。自應爲虛黃也。渴爲裏熱。黃爲表蒸。表裏熱。乞陰何以堪。又疸旣濕鬱。汗溺不通。可復加之飲乎。渴則多飲。故最忌也。丹溪云黃疸不必分五總。是濕熱不分。則何以處治。是失之太簡。巢氏廣爲九疸。亦失之太繁。唯金匱論證處。方言言中的。學者宗之。自無遺不及之偏也。

附方

金匱茵陳湯 治寒熱不食。食卽頭眩。心胸不安。

久久發黃。名爲穀疸。

日表疸乃

緊結滯於

目可攻發

惟結而

然也

熱宜矣

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩

右以水一斗。先煮茵陳減六升。內二味。煮三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

硝石礬石散

治女勞疸。身黃額黑。日晡發熱惡

寒。膀胱急。小腹滿。足下熱。因作黑疸。其腹滿如水狀。大便必黑。時澇。此女勞之病。非水也。

硝石

礬石

各燒等分

右爲散。以大麥粥汁和服二錢。日三。重衣。覆取汗。隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。

金匱梔子大黃湯 治酒疸。心中懊懣。或熱痛。

山梔子十四枚

大黃一斤

枳實五枚

豆豉一升

右四味。以水六升。煮二升。分溫三服。

金匱黃耆芍藥酒湯

黃耆五兩

白芍藥

桂枝各三兩

右以苦酒一升水七升相和煮三升。溫服一升。當心煩服至六七日乃解。若心煩不止者以苦酒阻故也。

金匱桂枝加黃耆湯 治黃疸脈浮而腹中和者。宜汗之。若腹滿欲嘔吐。懊憹而中和者。宜吐之。不宜此方。

桂枝

白芍藥

生薑

各三兩

黃耆

甘草

各二兩

大棗

十二枚

右以水八升。煮三升。溫服一升。須臾飲熱稀粥一升餘。以助藥力。取微汗。若不汗。更服。

金匱猪膏髮煎

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大二枚

右二味和膏中煎髮消藥成。分再服。病從小便出。

金匱茵陳五苓散

茵陳蒿末

十分

五苓散

五分

右二味和先食飲方寸匕。日三服。

金匱大黃硝石湯

大黃

黃蘗

硝石

各四兩
作滑石

梔子

十五枚

右以水六升。煮二升。去滓。內硝石。更煮取一升。頓服。

金匱小半夏湯

半夏

一斤

生薑

半斤

右以水七升。煮一升半。分溫服。

小柴胡湯

見第四十三

小建中湯

見第二十二

醫燈續燭卷十

續

平恩續編卷十一

錢塘後學潛 楫碩甫註

同邑社盟王公賢望真評

余臣章漢持

門人張履星太章校

朱行陸鄰侯

水病脈證第七十

脈得諸沉。責其有水。浮氣與風。沉石或裏。沉數爲陽。

沉遲爲陰。浮大出厄。虛小可驚。

據正文。水氣有四。曰氣水。曰風水。曰石水。曰裏水。
金匱要畧。多皮水。正水。黃汗。無氣水。裏水。而氣水。
裏水。又各突見一條于後。豈以皮水卽氣水。與風
水之脈皆浮者。皆爲表水。而以正水。石水。黃汗之
脈皆沉者。皆爲裏水者乎。其脈雖諸種不一。而沉
則在在皆兼。卽氣水。風水之在表。而脈應浮者。亦
必有沉沉欲下之變。蓋沉下者。水之性也。以狀言。

素問云水入於經其血乃凝。靈樞云經水者受水而行。之則知水爲血之本若

浮則以位言耳。若沉而數，乃爲陽水。證必兼陽而
熱多。沉而遲，乃爲陰水。證必兼陰而寒多。水脈浮
大，水氣渙散，災厄將出之象。水脈虛小，則正衰邪
存，誠可驚也。金匱要畧曰：風水，其脈自浮。外證骨
節疼痛，惡風。又云：脈浮而洪，浮則爲風，洪則爲氣。
風氣相搏，風強則爲癰疹，身體爲痒，痒爲泄風。久
爲痲癩。氣強則爲水，難以俛仰。風氣相擊，身體洪
腫，汗出乃愈。惡風則虛。此爲風水。不惡風者，小便

風為脾土

黃汗則土

故曰下

白聚上微

多為風水學

者皆知

通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。又云。寸口脈
沉滑者。中有水氣。面目腫大。有熱。名曰風水。視人
之目裹上。微癢如蠶。新卧起狀。其頸脈動。時時欬。
按其手足上。陷而不起者。風水。又云。太陽病。脈浮
而緊。法當骨節疼痛。反不疼。身體反重而痠。其人
不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛發汗
得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周
痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮躁不得眠。此為黃汗。

痛在骨節。欬而喘。不渴者。此爲脾脹。其狀如臍發汗卽愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。又云。風水脈浮身重。汗出惡風者。防已黃耆湯主之。腹痛加芍藥。又云。風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。皮水。其脈亦浮。外證肘腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。又云。皮水爲病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防已茯苓湯主之。又云。厥而

者。蒲灰散主之。正水。其脉沉遲。外證自喘。石水。其

脉自沉。外證腹滿不喘。

黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必

致壅裏水者。一身面目黃腫。其脉沉。小便不利。故

令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越

加水湯主之。甘草麻黃湯亦主之。又云。心水者。其

身重而少氣。不得卧。煩而躁。其人陰腫。

宜防已茯苓湯當歸

散之類肝水者。其腹大。不能自轉側。脇下腹痛。時時

津液微生。小便續通。

宜分氣補心湯當歸散之類

肺水者。其身

白氣也

腫小便難時時鴨溏

宜分氣香蘇飲導
水茯苓湯之類

脾水者其

腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

宜胃
苓湯

調胃白朮澤
瀉散之類

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰

下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

宜金匱腎氣
丸濟生腎氣

左之
類

又云寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒

水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣

衰則身腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利

婦人則經水不通經爲血血不利則爲水名曰

分。宜調榮散四製香附丸之類

又云。寸口脈遲而澹。遲則爲

澹。爲血不足。跌陽脈微而遲。微則爲氣。遲則爲寒。

寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮

衛不利。則腹滿。脇鳴相逐。氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽

氣不通。卽身冷。陰氣不通。卽骨疼。陽前通。則惡寒。

陰氣通。則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。

其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。各曰氣分。

宜防已茯苓湯

費時飲復元丹之類又云。氣分。心下堅大如盤。邊如旋杯。水

飲所作。桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之。又云。心

下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。枳朮湯主之。

旋

也。杯高於盤。邊大於杯。此杯盤之異。總皆水飲聚結。又云。水之爲病。其脈沉

小。屬少陰。浮者爲風。無水。虛脹者爲氣。水發其汗

卽已。脈沉者宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。又云。

病者苦水。面目四肢身體皆腫。小便不利。脈之不

言水。反言胸中痛。氣上衝咽。狀如灸齒。當微欬喘。

審如師言。其脈何類。師曰。寸口脈沉而緊。沉爲水。

緊爲寒。沉緊相搏，結在關元。始時當微，年盛不覺。陽衰之後，榮衛相干。陽損陰盛，結寒微動。腎氣上衝，痰咽塞噎。脇下急痛，醫以爲留飲而大下之。氣擊不去，其病不除。後重吐之，胃家虛煩，咽燥欲飲水。小便不利，水穀不化，面目手足浮腫。又與葶藶丸下水。當時如小差，食飲過度，腫復如前。胸脇苦滿，象如奔豚。其水揚溢，則浮欬喘逆。當先攻擊衝氣令止，乃治欬。欬止其喘自差。先治新病，病當在

後

經宜金匱
腎氣丸

又云跌陽脉當伏。今反緊。本自有寒

疝。痲腹中痛。醫反下之。下之即胸滿短氣。又云跌

陽脉當伏。今反數。本自有熱。消穀。小便數。今反不

利。此欲作水。又云寸口脉浮而遲。浮脉則熱。遲脉

則潛。熱潛相搏。名曰沉。跌陽脉浮而數。浮脉即熱。

數脉即止。熱止相搏。名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉

則絡脉虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。即爲

水矣。又云寸口脉弦而緊。弦則衛氣不行。緊即惡

寒水不沾流走于腸間。又云。少陰脈緊而沉。緊則

為痛。沉則為水。小便即難。脈得諸沉。當責有水。身

體腫重。水病脈出者死。

脈出者。脈出腎少陰之部。水源泛溢而散。欲其歸源

不可

得矣。又云。夫水病人。目下有卧蚕。面目鮮澤。脈伏。

其人消渴。病水腹大。小便不利。其脈沉絕者。有水。

可下之。又云。病下利後。渴飲水。小便不利。腹滿因

腫者。何也。答曰。此法當病水。若小便自利。及汗出。

者。自當愈。又云。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰

此大法

以上腫當發汗乃愈以上金匱論水病之寒熱虛實表裏陰陽藏府氣血雖有多種然約而言之總不外腎脾肺三藏爲之原始也蓋腎居下焦屬水統攝陰液爲水之宗本右爲相火火以濟寒故水得以宣揚也脾居中焦屬土合肌肉爲水之隄防並化穀生津津生不窮故水得以灌溉也肺居上焦屬金主氣爲水之化源行榮衛而出治節故水得以通調也人或房室勞倦憂思恐懼飲食起居

三藏作用得
去說得最精
在就說之

本在腎末在
肺乃水之源
流治六方法
辨此體認

各以類傷其藏而藏氣虛。虛則各失其職。而水液
之常道紊矣。在腎則不能統攝宣揚而停蓄。在脾
則不能隄防灌溉而濫行。在肺則不能生化通調
而壅閉。况脾與胃合。胃又倚腎爲關。關門不利。則
水聚。利則必由于氣化。是肺又爲腎關之所倚也。
故素問水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水
也。右仲景治水方法。皆以脈證爲本。而後量其輕
重虛實。治之百無一失。世俗淺醫。欲求急効。動以

破氣去水爲正治。不知暫寬一二。腫滿續至。坐視其死者。比比可勝。倬哉。後學當不厭其繁而一唯以靈素金匱爲準。斯得之矣。○準繩云。腫病不一。或徧身腫。或四肢腫。面腫。脚腫。皆謂之水氣。然有陽水。有陰水。並可先用五皮飲。或除濕湯。加木瓜。腹皮各半錢。如未効。繼以四磨飲。○徧身腫。煩渴。小便赤澀。大便多閉。此屬陽水。輕宜四磨飲。添磨生枳殼。兼進保和丸。重則疏鑿飲。子利之。以通爲

度亦有雖煩渴而大便已利者。此不可更利。宜用五苓散加水通大腹皮半錢以通小便。○徧身腫不煩渴大便自調或溇泄小便雖少而不赤澀。此屬陰水。宜實脾飲。小便多少如常。有時赤。有時不赤。至晚則微赤却無滯滯者亦屬陰也。不可遽補。木香流氣飲。繼進復元丹。若大便不澇氣息脹滿宜四磨飲下黑錫丹。○四疝腫謂之肢腫。宜五皮飲。加薑黃木瓜各一錢。或四磨飲或用白朮三兩。

咬咀。每服半兩。水一盞半。大棗三枚。拍破。同煎至九分。去滓。溫服。日三。無時。名大棗湯。○面獨腫。蘇子降氣湯。兼氣急者尤宜。或煎熟去滓後。更磨沉香一呷。○有一身之間。唯面與雙脚浮腫。早則面甚。晚則脚甚。經云。面腫爲風。脚腫爲水。乃風濕所致。須問其大小腸通閉。別其陰陽。二證前後用藥。○除濕湯。加木瓜。腹皮。白芷。各半錢。可通用。或以蘇子降氣湯。除濕湯。各半貼煎之。○羅謙甫導滯

通經湯。治面目手足浮腫。○感濕而腫者。其身雖腫而腰下至脚尤腫。腿脹滿尤甚于身。氣或急。或不急。大便或澹。或不澹。但宜通利小便爲佳。煎五

苓散。吞木瓜丸。

內犯牽牛亦不可輕服

間進除濕湯。加木瓜

腹皮各半錢。炒萊菔子七分半。○因氣而腫者。其

脉沉伏。或腹脹。或喘急。宜分氣香蘇飲。○飲食所

傷而腫。或胸滿。或噎氣。宜消導寬中湯。○不服水

土而腫者。胃苓湯。加味五皮湯。○有患生瘡。用乾

自有外
得汗微

生毒
出路不

有與數
邪閉式

能外達
有膨脹喘

而死者慎

瘡藥太早。致徧身腫。宜消風敗毒散。若大便不通。
升麻和氣散。若大便如常。或自利。當導其氣。自小
便出。宜五皮飲。加生料五苓散。腹若腫。只在下。宜
除濕湯。和生料五苓散。加木瓜澤瀉之類。○已上
數條。爲有餘之證。○大病後浮腫。此係脾虛。宜加
味六君子湯。白朮三錢。人參黃耆各一錢半。白茯
苓二錢。陳皮半夏麩芍藥木瓜各一錢。炙甘草大
腹皮木香各五分。薑棗煎服。小便不利。間入五苓

散。○有脾肺虛弱。不能通調水道者。宜用補中益氣湯。補脾肺。六味丸補腎。○有心火尅肺金。不能生腎水。以致小便不利而成水證者。宜人參平肺散。○若腎經陰虧。虛火爍肺金。而小便不生者。用六味地黃丸以補腎水。用補中益氣湯以培脾土。脾肺腎之氣交通。則水穀自然尅化。二經既虛。漸成水脹。又誤用行氣分利之藥。以致小便不利。喘急痰盛。已成蠱證。宜加減金匱腎氣丸主之。○已

白雲精詳集
治惡疫毒
六

上數條爲不足之證。○不足者正氣不足。有餘者。邪氣有餘。凡邪之所湊。必正氣虛也。故以治不足之法。治有餘。則可以治有餘。之法。治不足。則不可。○紫古法。如水腫。因氣爲腫者。加橘皮。○因濕爲腫者。煎防已黃耆湯。調五苓散。因熱爲腫者。八正散。○如火熱燥肺爲腫者。乃絕水之源也。當清肺除燥。水自生矣。于梔子豉湯中加黃芩。○如熱在下焦。陰消。使氣不得化者。當益陰而陽氣自化。黃

腫脹之疾禁
忌須臾

藥黃連是也。○如水服之病當開鬼門。潔淨府也。
白茯苓湯至之。○白茯苓湯能變水。白茯苓澤瀉
各二兩。郁李仁五錢。水一碗。煎至一半。生薑自然
汁入藥。常服無時。從少至多。服五七日後。覺腹下
再腫。治以白朮散。白朮澤瀉各半兩。爲末。煎服三
錢。或丸亦可。煎茯苓湯下三十九。以黃耆芍藥建
中湯之類調養之。平復後。忌房室。豬魚鹽麩等物。
○香茹熬膏。丸如桐子大。每服五丸。日三。漸增以

小便利爲度。○冬瓜不限多少。任喫。○鯉魚一頭。重一斤已上者。煮熟。取汁和冬瓜芎白作羹食之。○青頭鴨。或白鴨。治如食法。細切。和米并五味煮熟作粥食之。宜空腹時進。昔人論水病。知經義者。固惟仲景一人。近世何柏齋。張景岳二論。亦庶幾焉。故附錄於左。柏齋曰。造化之機。水火而已。宜平不宜偏。宜交不宜分。水爲濕。爲寒。火爲燥。爲熱。火性炎上。水性潤下。故火宜在下。水宜在上。則易交。

也。交則爲既濟，不交則爲未濟。不交之極，則分離而
死矣。消渴證，不交而火偏盛也。水氣證，不交而
水偏勝也。制其偏而使之交，則治之之法也。小火
不能化大水，故必先瀉其水，後補其火。開鬼門，瀉
在表在上之水也。潔淨府，瀉在裏在下之水也。水
勢既減，然後用煖藥以補元氣，使水火交，則用藥
之次第也。又云：盧氏以水腫隸肝腎胃而不及脾。
丹溪非之似矣。然實則皆非也。蓋造化生物，天地

水火而已矣。至之者天也。成之者地也。故曰乾知
太始。坤作成物。至于天地交合變化之用。則水火
二氣也。天運水火之氣于地之中。則物生矣。然水
火不可偏盛。太旱物不生。火偏盛也。太澇物亦不
生。水偏盛也。水火和平。則物生矣。此自然之理也。
人之藏府。以脾胃爲主。蓋飲食皆入于胃而運以
脾。猶地之土也。然脾胃能化食與否。實由于水火
二氣。非脾胃所能也。火盛則脾胃燥。水盛則脾胃

濕皆不能化物，乃生諸病。水腫之證，蓋才虛而少，不能化也。火衰則不能化水，故水之入于脾胃者，皆滲入血脈骨肉，血亦化水，肉發腫脹，皆自然之理也。導去其水，使水少減，復補其火，使二氣平和，則病去矣。丹溪謂脾失運化，由肝木侮脾，乃欲清心經之火，使肺金得令以制肝木，則脾土全運化之職，水自順道，乃不爲腫。其詞迂而不切，故書此。

辨之。

景岳曰，愚按腫脹一證，觀靈樞經論之義，則五藏六府，無不有之。再考諸篇，如脈要精微論曰：胃脈實，氣有餘則脹。邪氣藏府病形篇曰：胃病者，腹臌脹，胃皖當心而痛。本神篇曰：脾氣實，則腹脹，溼漉不利。陰陽應象大論曰：濁氣在上，則生臌脹。此皆實脹也。太陰陽明論曰：飲食起居失節，入五藏，則膜滿閉塞。經別篇曰：足太陰之別，公孫虛，則鼓脹。皆虛脹也。經脈篇曰：胃中寒，則脹滿。異法方宜論

曰藏寒生滿病。風論曰胃風鬲塞不通。腹善脹。失
衣則瀉脹。此皆寒脹也。陰陽別論曰二陰一陽發
病。善脹。心滿。診要經終論曰。手少陰終者。腹脹閉。
足太陰終者。腹脹閉。此心脾受傷之脹也。此
六元正紀至真要大等論有云。太陰所至。爲身重
。腑腫。及土鬱之發。太陰之初氣。太陰之勝復。皆濕
勝之腫脹也。有曰水運之太過。有曰寒勝則浮。有
曰太陽之司天。太陽之勝復。皆寒勝之腫脹也。有

曰少陰之司天。少陰之勝復。少陽之司天。少陽之勝復。有曰熱勝則腫。皆火勝之腫脹也。有曰厥陰之司天在泉。厥陰之復。有曰陽明之復。是皆水邪侮土。及金氣反勝之腫脹也。蓋此則不唯五藏六府。卽五運六氣。亦無不皆有是病。然至真要大論曰。諸濕腫滿皆屬于脾。水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水也。又曰。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。由此言之。則諸經雖皆有脹。

然無不關於脾肺腎三藏。蓋脾屬土。主運化。肺屬金。主氣。腎屬水。主五液。凡五氣所化之液。悉屬于腎。五液所行之氣。悉屬于肺。轉輸于二藏之中。以制水生金者。悉屬于脾。所以腫脹之生。無不由此三者。但證有陰陽虛實。如諸論之所云者。不可不辯。大都陽證多熱。熱者多實。陰證多寒。寒者多虛。先脹于內而後及于外者多實。先腫于表而後甚于裏者多虛。小便黃赤。大便秘結者多實。小便清。

白。大便稀澆者多虛。脈滑數有力者多實。弦浮微細者多虛。形色紅黃。氣息盛長者多實。容顏憔悴。音聲短促者多虛。凡是實證。必由六淫有餘傷其外。或飲食怒氣傷其內。故致氣逆不行。三焦壅閉。此則多在氣分。無處不到。故不分部位。而多通身浮腫。又或氣實于中。則爲單腹脹。然腸邪急速。其至必暴。每成于旬日數日之間。此惟少壯者多有之。但破其結氣。利其壅滯。則病無不愈。此治實

在氣不能升
清降濁在血
不能上下分

之道也。若是虛證，必由五志積勞，或酒色過度，傷其脾腎，日積月累，其來有漸。此等病候，多染于中年之外，其形證脈氣，必有虛寒之候，顯然可察。非若實證之暴至，而邪熱壅結，肝氣悍逆之有因也。治實者本無所難，最難者在治虛耳。然虛有在氣者，有在水者，在氣者以脾氣虛寒，不能運化，所謂氣虛中滿者是也。在水者以脾虛不能制水，則寒水反侮脾土，泛濫為害，其始也必從陰分，漸次而

化源正考
八味論
化源正考
八味論

升。按肉如泥。腫有分界。所謂水鼓。水脹者是也。然水雖制于脾。而實至於腎。蓋腎本水藏。而元陽生氣所由出。若腎中陽虛。則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養脾土。陰陽不得其正。則化而爲邪。夫氣卽火也。精卽水也。氣之與水。本爲同類。但在於化與不化耳。故陽旺。則化而精能爲氣。陽衰。則不化而水卽爲邪。凡火盛水虧。則病燥。水盛火虧。則病濕。故火不能化。則陰不從陽。而精氣皆化。

爲水。所以水腫之證。多屬陽虛。故曰寒脹多。熱脹少也。然觀丹溪之治腫脹。云清濁相混。隧道壅塞。而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。遂成脹滿。治宜補其脾。又須養肺金以制木。使脾無賊邪之患。滋腎水以制火。使肺得清化之令。其說重在濕熱。而猶以制火爲言。夫制火固可保金。獨不慮其不生土乎。若以此法。施于陽實而熱者。則可。若以治陽虛而氣不化者。豈不反助陰邪而益其病哉。故予之治。

凡人有禁治
法故有消
詳真之戒

此必察其果係實邪則直清陽明除之極易凡屬
虛勞內損者多從滋補脾腎而愈俱得復元或臨
證之際有虛實未明疑似難決者則寧先以治不
足之法探治有餘若果未投而病反加甚是不宜
補也不妨易輒自無大害倘藥未及病而病自甚
者其輕重真假仍宜詳察若誤以治有餘之法治
不足而曾經峻攻者真氣復傷雖神丹不能療矣
或從清利暫見平復使不大補脾腎以培根本雖

愈目前。未有不危亡。踵至者。此治虛之道也。夫腹
脹之病。多有標實本虛。最爲危候。若辨之不明。則
禍人非淺。

附方

仲景防已黃耆湯 見第六十七

仲景越婢湯 加水四兩。卽越婢加水湯。

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

大棗

十五枚

甘草

二兩

水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮三升。分溫
三服。

防已茯苓湯

防已

黃耆

桂枝

各三兩

茯苓

六兩

甘草

二兩

水六升。煮二升。分溫三服。

蒲灰散

蒲灰

一兩七錢半

滑石

五錢

右杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

甘艸麻黃湯

甘艸

二兩

麻黃

四兩

水五升。先煮麻黃去上沫。內甘艸煮三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。

當歸散 水腫之疾。多由腎氣不能攝養心火。心火不能滋養脾土。故土不制水。水氣盈溢。氣脉閉塞。滲透經絡。發爲浮腫。心腹堅脹。喘滿不安。

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮

各一錢
三分

水二鍾。紫蘇五葉。木瓜一片。煎一鍾。不拘時服。
分氣補心湯 治心氣鬱。發爲四肢浮腫。上氣喘
急。

木通

川芎

前胡

去苗

大腹皮

泡

青皮

白朮

枳殼

炒 碎

甘艸

炙 各一錢

香附

去毛 炒

白茯苓

桔梗

各一錢半

細辛

木香

各五分

水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

分氣香蘇飲

桑白皮

炒

陳皮

茯苓

大腹皮

香附

炒 各一錢

紫蘇

半一錢

桔梗

枳殼各八分

草果仁七分

五味子

十五粒

水二鍾。薑三片。煎八分。入鹽少許。食前服。

導水茯苓湯。治水腫。頭面手足。徧身腫如爛瓜。手按而陷。手起隨高。喘滿倚息。不能轉側。不能倒臥。飲食不下。小便秘澀。溺出如割。或如黑豆汁。諸藥不効。用此卽愈。

赤茯苓

麥門冬去心

澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

右咬咀。每服半兩。水二盞。燈艸二十五根。煎八分。去滓。空心服。如病重者。可用藥五兩。再加去心門冬二兩。燈艸半兩。水一斗。於砂鍋內。熬一大碗。再下小銚內。煎至一大盞。五更空心服。滓再煎服。連進三服。小水自利。一日添加一日。

胃苓湯 見第十七

元戎調胃白朮澤瀉散 治痰病化爲水氣。傳爲

水鼓不能食。

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔

各等分

右爲末。水煎服。一法加白朮。治臍腹上腫如神。
心下痞者。加枳實。下盛者。加牽牛。

金匱八味丸

見第十六

濟生腎氣丸

治腎虛脾弱，腰重脚腫，小便不利。

或肚腹腫脹，或喘急痰盛，已成蠱譫，其効如神。

此證多因脾胃虛弱，治失其宜，元氣復傷而變者，非此不救。

熟地黃

四兩

薯蕷

一兩

山茱萸

一兩

澤瀉

一兩

茯苓

三兩

牡丹皮

一兩

肉桂

一兩

附子

炮五錢

牛膝

一兩

車前子

兩一

右末。煉蜜丸如桐子大。每服七八十九。空心米飲下。

調榮飲 治瘀血留滯化爲水。四肢浮腫。皮肉赤紋。名血分。

蓬朮

川芎

當歸

延胡索

白芷

檳榔

陳皮

赤芍藥

桑白皮

炒

大腹皮

赤茯苓

葶藶

炒

瞿麥

各一錢

大黃

半錢

細辛

官桂

甘艸

各五分

作一服。水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

四製香附丸 治婦人女子經候不調。

香附

浸去皮一斤分作四分酒浸一分鹽水浸一分童便浸一分醋浸一分各三日焙乾

右爲細末。醋糊丸如桐子大。每服七十九。空心

香附自香附
質堅多毛而
無勝爲肺家
專藥故入肺
經以行榮衛
是以婦女經

食前温酒下

香附子血中之氣藥也開鬱行氣而血自調何病不瘳補人宜常服

之

濟生實脾飲 治陰水發腫。用此先實脾土。

厚朴

去皮薑製

白朮

木瓜

去穢

大腹子

附子

炮

木香

不見火

草果仁

白茯苓

去皮

乾薑

炮各一兩

甘艸

炙半兩

右咬咀。每服四錢。水盞薑五片。棗一枚。煎七分。

不拘時溫服。

復元丹

見第六十四

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝

生薑

各三兩

甘草

一兩

大棗

十二枚

麻黃

細辛

各二兩

附子

一枚

右以水七升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取二升。分溫三服。當汗出如蟲行皮中。卽愈。

金匱枳朮湯

枳實

七枚

白朮

二兩

右咬咀以水五升煮取三升分溫三服腹中軟
卽當散也。

麻黃附子湯

麻黃

三兩

甘草

二兩

附子

一枚炮

水七升先煮麻黃去上沫內二味煮取二升半
溫服八合日三服。

葶藶丸 治肺氣咳嗽。面目浮腫。喘促不安。小便

赤色。

甜葶藶

隔紙炒

貝母

煨黃色

木通

各一兩

杏仁

去皮尖雙仁炒

防已

各二兩

爲末。棗肉丸如桐子大。每服五十丸。桑皮煎湯

食前下。

和劑五皮散 治風濕客于脾。經氣血凝滯。致面

目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣喘急。兼治皮

水妊娠胎水

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮

各等分 一方加白木磨沉香木香入服

右咬咀每服三錢水一盞煎七分熱服無時

除濕湯

見第二十一

濟生四磨湯 治七情感傷上氣喘悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水，取七分，煎三五沸，放溫，空心服，或下養正丹尤佳。

濟生疏鑿子飲 治水氣，浮腫喘急，煩躁多渴，大小便不利，服熱藥不得者。

澤瀉

商陸

赤小豆

炒

羌活

去蘆

大腹皮

椒目

木通

秦艽

去蘆

茯苓皮

檳榔

各等分

右改咀。每四錢。水一盞。薑五片。煎七分。空心服。

五苓散 見第十七

和劑木香流氣飲 治諸氣痞塞不通。胸膈膨脹。

面目虛浮。四肢腫滿。口苦咽乾。大小便秘。

半夏 湯洗七次。焙二兩。 青皮 去白。

厚朴 薑製去麁皮。

紫蘇 去梗。 香附子 去毛炒。

甘艸 炙各一斤。

陳皮 去白。二斤。 肉桂 去急皮。不見火。

蓬莪朮 煨。

丁香皮 不見火。 草果仁 各六兩。

木通 去節。八兩。

藿香葉

白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

人參去蘆

石菖蒲各四兩

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑三片。棗二枚。煎

七分。熱服。

和劑黑錫丹 治痰氣壅塞。上盛下虛。心火炎盛。

腎水枯竭。一應下虛之證。及婦人血滲久冷。無子。赤白帶下。

沉香

葫蘆巴

酒浸炒

附子

炮

陽起石

研細水浸各一斤

肉桂

半斤

破故紙

舶茴香

炒

肉豆蔻

剉藥炭

木香

金鈴子

硫黃

黑錫

去滓研各二兩

右用黑蠶或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子。地上出火發研極細。餘藥細末和勻。自朝至暮以研至黑灰色爲度。酒糊丸如桐子大。陰乾。

入布袋內擦令光瑩。每四十九。空心鹽薑湯。或
棗湯下。女人艾棗湯下。

和劑蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。上盛

下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞。并久年肺氣。至効。

紫蘇子

炒

半夏

湯炮各
二錢半

前胡

去
蘆

甘艸

炙

厚朴

去皮薑
製炒

陳皮

去白各
一錢

川當歸

去蘆一
錢半

沉香

七
分

水二鍾。薑三片。煎一鍾。不拘時服。虛冷人。加桂

五分。黃耆一錢。

黃鑑導滯通經湯。治脾濕有餘。及氣不宜通。面
目手足浮腫。

木香

白朮

萊白皮

陳皮

茯苓

各等分

右咬咀。每五錢。水二盞。煎一盞。去滓。溫服。空心
食前。內經云。濕淫所勝。平以苦瀝。以苦燥之。以
淡泄之。陳皮苦溫。理肺氣。去氣滯。故以爲主。瀝

色腎自有白
木而曰苦濕
不用血藥亦
云通經其意
有在可細思

皮甘寒。去肺中水氣。水腫臃脹。利水道。故以爲
佐。木香苦辛溫。除肺中滯氣。白朮苦甘溫。能除
濕和中。以苦燥之。白茯苓甘平。能止渴除濕。利
小便。以淡滲之。故以爲使也。

和劑木瓜圓 治腎經虛弱下攻。腰膝沉重少力。
腿脚腫痒。疰破生瘡。脚心癢痛。筋脉拘攣。或腰
痠緩弱。步履艱難。舉動喘促。面色黧黑。大小便
秘澀。飲食減少。無問久新。並宜服之。

熟地黄

洗焙

陳皮

去白

烏藥

各四兩

黑牽牛

炒三兩

石楠藤

杏仁

去皮

當歸

菴蓉

酒浸焙

乾木瓜

續斷

牛膝

酒浸各二兩

赤芍藥

一兩

右爲細末。酒糊爲圓。如桐子大。空心木瓜湯吞三五十圓。溫酒亦得。

消導寬中湯

白朮

一錢五分

枳實

麩炒

厚朴

薑製

陳皮

半夏

山查肉

茯苓

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子

炒各一袋

水二鍾。薑三片。煎八分。

小便不利加猪苓澤瀉

加味五皮湯

卽五皮散。脚腫加五加皮。木瓜。防

己。不服水土。入胃苓湯。

消風敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗

枳殼

炒

羌活

茯苓

川芎

前胡

甘草

荆芥

防風

各一錢

水二鐘。薑三片。煎八分。食遠服。

和劑升麻和氣散

乾薑

五分

乾葛

一兩

大黃

蒸半兩

熟枳殼

五分

桔梗

熟蒼朮

升麻

各一兩

芍藥

七錢半

陳皮

甘州

各一兩半

當歸

熟半夏

白芷

茯苓

各二錢

每服四錢。水一盞。薑三片。燈心十莖。煎七分。食

前溫服。

補中益氣湯

見第三十九

六味丸

見第十六

東垣人參平肺散 治肺受熱而喘。

桑白皮

各二錢

知母

各一錢

甘草

炙

百病身

利非肺

生之熱

中用人

味

茯苓

人參

地骨皮

天門冬

去心各一錢

青皮

陳皮

各六分

五味子

三十粒
提碎

水二鍾。生薑五片。煎一鍾。食遠溫服。如熱加黃

芩。薄荷葉各一錢。

八正散

見第四十九

梔子豉湯

梔子

十四枚炒

香豉

四合

傷寒汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊憹者。此方
主之。○汗吐下之後。正氣不足。邪氣乘虛而結
于胸中。故煩熱懊憹。煩熱者。煩擾而熱。懊憹者。
懊惱憹悶也。梔子味苦。能湧吐熱邪。香豉氣腐。
能剋制熱勢。所謂苦勝熱。腐勝焦也。是方也。惟
吐無形之虛煩則可。若用之以去實。則非梔子
所能宣矣。宣實者。以瓜蒂散主之。