

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇効良方大全卷之十八

翻胃門

附論

金匱要略曰發汗令陽微陽氣虛脉乃數上為客熱不能消穀
胃中虛冷故也胃氣無餘則朝食暮吐為反胃又六脉陽脉浮
而濶浮則為虛濶則傷脾脾傷則不磨穀而朝食而暮吐也暮
食而朝吐者宿食不化名曰反胃王水注云以晨食入胃胃虛
不能转化至暮胃氣行裏与邪相搏則食反出也巢氏曰榮衛
俱靈血氣不足停水積飲而在胃脘即臟冷臟冷則脾不磨而
宿食不化其氣逆而成反胃也則朝食暮吐暮食朝吐甚則食
已耶吐其脉緊而弦緊為寒弦為虛虛寒相搏故食已即吐曰
反胃經曰食不得入是有大也食入反出是無大也諸書論之
詳矣夫反胃者本乎胃食物所傷嘔吐言胃口翻也多因胃氣
先逆飲酒過傷或積風寒或因憂思悒快或因驚怒抑鬱宿滯

病癖積聚令痰動擾脾靈胃弱不能消磨穀食遂成此證原其所自女人得之由血氣虛損男子得之多因下元冷憊又因喜怒不常驚恐無時氣與痰搏升而不降留於咽喉則成膈噎結於痰者略之不出嚥之不下有大便秘少如羊瘈者名結腸反胃大抵翻胃未嘗不由膈噎而起內經謂陽結謂之膈蓋氣之與神並為陽也逸則氣神安勞則氣神耗氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胃膈則成膈氣留於咽喉則成五噫五膈治之不當歲月因循久則反胃治法氣虛者補其氣血虛者養其血調順陰陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下其證自平王水又云食癖者食已心下痛陰上然不可忍也吐出痛止此胃氣逆而不下行也若脉更散當病食癖又脉病傳肝曰肝癖膈痛出食者是也金匱要略又有肝中寒心中風厥陰之爲病三者皆以食入即吐者全在切脉用藥醫者人

之司命可不謹乎且如十臟氣散治冷膈風膈氣膈痰膈熱膈
憂膈悲膈喜膈水膈食膈對其脉證用之取効用之不當取禍
非輕且翻胃不可峻用香燥之劑治之不循次序如抱薪救火
其脉浮緩者生沉濇者逆在乎審察慎之可也

翻胃通治方

安脾散

治胃氣先逆飲食過傷憂思苦懶宿食癥癖積聚冷

暖動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之皆由血
氣虛損男子得之多因下元虛憊有食罷即吐有朝食暮
吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾
敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而不旋
踵斃矣

高良薑

碎用一兩以百字鹽上土二合水三合煎

南木香

草藥麵

裹水一升陳橘皮湯包入參去芦

白茯苓

白术

胡椒

丁香

各半

甘草

两半

附子黃耆草菜飲 治翻胃不進飲食

白术

官桂

附子

炮

厚朴

去皮姜制

莫姜
細皮各一茶

白芍藥

白茯苓

黃耆

去芦根

良姜

各一茶

白豆蔻

檀香

甘草

炙各五分

半夏

八分
湯泡七次

右作一服水二鍾 生姜五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
丁香煎散 治翻胃嘔吐

丁香

石蓮肉

各十粒生薑七片

北棗

七個切碎

黃黍米

半合
淘淨

右四味用水椀半煎去滓入黃黍米煮稀粥食之

薤白粥

治胸胃牙問久新冷熱皆治

蘇白二莖

鷄子

去黃

人參一

芮細切以根一

加前三合

白粟米三合

桂心

甘草

各半

赤茯苓

半夏

芮細切以根一

右以蘇白鷄子白白粟米三味同煮熟攪勻然後溫熱人
參陽相和調頓服不拘早晚如思食即與粟米粥飲漸

加粳米和之

桂苓散

治翻胃發渴

桂心

甘草

各半

赤茯苓

半夏

澤瀉各二兩

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

姜合丸

治中脘停痰胸膈痞結欲成翻胃

硝砂

上乘

肉桂

去皮

附子

炮去皮

各半

茴香

二錢半炒

丁香

陳皮

去白

青皮

去白

草澄茄

沉香

各半

木香

一兩

右為末次入硝砂研勻酒煮麵糊為丸每兩依二十九每服一丸以生姜一塊剝為合子安藥在內溫紙裹煨令香

去紙放溫細嚼鹽湯送下不拘時

養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁 人參 丁香 細砂仁

肉豆蔻

附子 炮

甘草

沉香

橘紅

麥芽

麥麯

各二兩

粉草

半錢名鐵

右為細末每服二錢姜鹽湯下不拘時服

太倉丸 治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻

二兩 丁香 一兩

細砂仁

三兩

陳倉米

一升用黃七妙米熟去土不用

右為細末用生姜自然汁法丸如梧桐子大每服百丸食後用淡姜湯送下

小半夏丸

治翻胃

半夏

湯泡七次

胡椒

各等分

右爲細末生姜汁和丸如梧桐子大每服三十九食遠用生薑湯送下

十膈氣散 專治十般膈氣令膈風膈氣膈寒膈熱膈憂膈悲

膈水膈食膈喜膈

人參

去芦

白茯苓

官桂

去皮

枳殼

去穰炒去

炒黃

甘草

炙

神曲

炒黃色

麥蘖

炒黃

诃黎勒

皮去核

炒黑

蓬莪术

炭

京三稜

煨

乾生姜

炮

陳皮

去白

白朮

各一兩

厚朴

去皮

姜

檳榔

煨

木香

各半兩

右爲末每二錢益一字白湯調如脾胃不和腹脇脹滿用水一盞姜七片棗一枚益少許煎服

膈氣散 治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

方見膈噎門

五噎散 治五噎食不下嘔噦痰多咽喉塞噎

方見月膈噎門

五膈散

治五種膈氣脅膈痞逆惡心不進飲食

方見膈噎門

五膈寬中散

治七情之氣傷于脾胃以致陰陽不和胃膈痞

痛停痰氣遂成五膈之病一切冷氣並背治之

青皮

去白

陳皮

去白

丁香

各四

厚朴

去皮姜製一斤

白荳蔻

去皮

砂仁

二兩

木香

香附子

炒去毛各三兩

甘草

炙五兩

右爲細末每服二錢不拘時用姜鹽湯調服

五浮丸

治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻胃皆可

服之真良方也

人參

白礪蠶少去絲白术

乾薑

丁香

肉荳蔻去膜橘紅

麥蘖

檳榔

半夏湯泡七次南星

木香

附子

炮去皮脐

草薢炙各等分

炒

右為細末用白麵一分與生薑自然汁搜和作葵子大餅入百佛湯煮令浮極瀝出搗爛和前藥末為丸如梧桐子大每服五十九用淡生薑湯送下不拘時服病甚者不過三服如惡熱藥者去附子大便秘者除肉荳蔻

丁香餅子 治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎翻胃惡心並皆治之

丁香

木香各一

白芷

神麃

合半兩

白术

陳皮

各一兩半

人參

草澄祐各三錢

肉荳蔻

半兩

甘草

二錢

右為細末用生薑汁煮狗和作餅子如棋子大每服一餅空心嚼細生姜湯送下

化鐵丸 治結腸翻胃兼治虛脹緊急如鼓妨悶氣促不能坐卧飲食頓減手足乾瘦累治不效者服之立瘥

五靈脂去沙石 青皮不去白青皮 陳皮不去白陳皮各一兩 陳穄米一合 穄米一作穄米

巴豆

三十粒去膜

右各剉先炒五靈脂香透次下青皮炒候色變又下陳皮亦炒變色却下林米巴豆炒黃色取出以紙搘在地下出火毒掠去巴豆不用番三五粒亦可浸為細末用好米醋浸化蒸餅和丸如菉豆大每服十五丸加至二十丸用葱湯或茶湯送下婦人醋湯或艾湯送下

千轉丹

治翻胃吐食等病

牛涎半斤

好蜜半斤

木鱉子

三十個去皮油研

右共一處入銀器內用慢火焚以槐條七根搗煨乾為夢
每和白粥兩匙日進三服

盤粟粥法 治翻胃不下食

白朮粟米二合

人參

大半
生山羊

五寸
解切
長

右共用水一升二合煮取六合入生薑自然汁及鹽花少
許攪勻分二服不拘時食之亦不妨別物湯丸

甘露湯

治翻胃嘔吐不止飲食減少常服快利胸膈調養脾

胃欣進飲食常州一富人病翻胃往京口甘露寺設水陸
泊舟岸下夢一僧持湯一椀與之飲罷猶記其香味便覓
胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者胸膈尤快
遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散手得之
常以待賓易名曰甘露湯在臨汀療一人旋愈切勿忽之

乾餳糟頭
酒六分

生薑
連皮用
四分

右拌勻搗爛作餅子或焙或曬乾每十兩入炙甘草二兩同研爲末每服二錢用沸湯入盃少許調不拘時服

大効散

治翻胃

田螺殼

瓦蜋殼

二件不以多少在土中多年陳者九佳谷另燒成白灰研細

右每料用田螺殼灰二兩黃蜋殼灰一兩用白梅肉四兩同搜和作團以砂盒子盛蓋了鹽泥固齊發頂火燶令焦黑存性取出研細每服二錢人參縮砂煎湯調下陳米飲亦得如無盒子只以罐蓋兩隻相合依上法燒食前服凡覓心腹疼痛即是翻胃以此藥治之

加味

青金丹

治清嘔不分中焦氣痞若心下牢大如杯或

或熱朝食暮吐暮食朝吐其關脉弦而緊弦則爲虛緊則爲寒虛寒相搏此名爲格與閼格同也是謂之反胃

硫黃

水銀

木香

別研

丁香

別研各半分

右先將硫黃水銀同研至無星次下木香末丁香末研匀
用生姜自然汁盞糊和丸如梧桐子大每服十五丸食前
用米飲送下

健脾丁香散 治翻胃嘔逆氣噎閼格不適

淨全丁香 廣木香 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎一盞時先用好黃土和泥
做成椀一箇却以藥灑在土椀內食前服滓依時再煎服
此方因臺椽吳安之得傳於內臺蓋耘夫都事自得之効
本堂試果驗蓋用土椀盛藥取其有脾土生助之功

鯽魚散 治翻胃

右用大鯽魚一箇去腸胃膽納綠礬末填滿縫口以炭火
炙令黃花急細末每服一錢陳米飲調下日三服

螺泥丸 治翻胃嘔逆

右用大田螺不拘多少洗净磁盆内養令吐出泥用米篩
張灰於地上却將沙皮紙鋪於灰上去已養田螺令泥水
澄清旋去上面清水却將泥傾於紙上候泥乾稠丸如梧
桐子大每服三十丸養香湯下立愈仍將田螺放江中如
殺食之其病則不愈一方用爛殼燒灰服之

治翻胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者

右用甘薯汁七升生姜汁一升相和打如粉分作三服

又方治翻胃

右用驥小便昔有患此疾每遇食餅或羹粥等湏臾吐出
真觀中許率御弟兄及榮粹等家時称名醫奉勑令治聲
竭其術所患竟不能瘳漸至羸憊死在朝夕忽有一術士
云服驥小便極驗日服二合後食微吐一半晡時又食二
合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中

五六人患翻胃同服一時俱瘥此物有毒服之不可過多
盛取來又熱服二合病深七日以來服之良後療人並瘥
治翻胃始因膈噎所成有痰毋無痰非好手不能治

附子片

一兩南星片

一兩巴豆

二十一粒去皮

右用糯米一兩同炒色变去巴豆入乾薑丁香末各半同
前作末五更早掌中舌蘸乾姜半錢津化橘皮湯一呷下
又方治翻胃噎塞煩悶誤藥不効者

右以蘇合香丸與青州白丸子相和勻用生薑汁丸用蘆
根煎湯下或枳殼湯下

又方治翻胃吐黑汁

右用草燈焰為末米糊丸姜湯下仍令服平胃散三十貼

又方治翻胃

用真阿魏末少加外野人涎下乾糞多作末五更初以姜

片蘸食能起死回生

治翻胃吐食除心胸痰水

右以年深蠶爛殼燒為白灰米飲調下一錢辨殼亦得

治翻胃

右用附子一枚極大者坐於磚上四面以炭火逼熱淬生姜自然汁內依前再逼再淬直待生姜汁約至半碗許却搗為細末每服一錢用米飲調下不過三服瘥

太醫院經驗奇効良方卷之十九

嘔吐嚥門 附論

經曰足太陰脾之脉復從胃別上膈注心下是動則病古本強食則嘔脉解篇云所謂食則嘔者物盛滿而上溢故也卒痛論云寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔厥陰之病少腹堅痛厥心病嘔吐食不下入而復出厥甚寒氣入脾念畢而吐至真要大論云諸嘔吐逆衝上皆爲慄火又云諸嘔吐酸皆爲於熱靈樞又曰人之嘔蓋穀入於胃氣上注於肺寒氣邪乘氣俱還入胃新故相亂真邪相攻氣併相逆復出於胃故爲嘔又云胃氣逆為嘔又曰病深者其氣嘔東垣翁明嘔吐氣者俱屬於胃者總司也究其三者之源皆因脾胃虛弱或因寒氣客胃加以飲食所傷而致胃氣上逆或嘔或吐或嘔者皆陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也邪氣充之火逆胃中而

作者也以其虛穴為異耳如嘔者陽明也且陽明者多血多氣故有聲有物氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之孫真人云嘔家多服生姜為嘔家之聖藥也故以生姜為主或有形質物為病者因而越之可也謂上焦氣壅表寒而言之非以濁氣而言之也吐者太陽也太陽多血少氣故有物无声為病也有食入則吐以橘紅主之有食已則吐有食久則吐嘔者少陽也少陽多氣少血故有聲無物氣病也治以姜製半夏米牽牛治嘔止嘔以生姜橘皮半夏湯是也又有膈噎氣噫食久反出名曰反胃反胃者因脾胃虛寒宿穀不化用朝食暮吐暮食朝吐有隨食而隨出者脾腫滿者難治蓋六淫之變七情之逆未嘗不由脾胃而病也故胃為水穀之海上之納水穀胃若受病飲食不下較食不行兼衛不和則寒風虛邪犯其陽飲食飢飽傷其陰則嘔吐之作也乃是足太陰足陽明二經之

病也。金匱要略曰：嘔而心下痞者有嘔而胸滿者有乾嘔而利者有嘔吐穀不得人者有嘔吐病在膈上者有胃反嘔吐者有食已即吐者有胃反吐而渴者有吐後欲飲食者有嘔吐涎沫者有嘔而發熱者有乾嘔半足冷者有嘔而寐弱小便復利身有微熱四肢厥者有似嘔不嘔者有似嘔不嘔心中无柰者古入論嘔吐嘔言之詳矣。見證立方詳其子後全在醫者對證用藥又有婦人懷姪嘔吐者名曰惡阻客從其類而治之又有因時雜亂者當以溫胃養脾之劑外有脚氣攻心嘔吐者此證多端所感不一大抵肺病順者生逆者死以脉推之藥不失其次拿治之必收功矣。

嘔吐嘔通治方

丁香費散

治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香
不思

乾姜

川烏炮去皮

甘草炙各半

紅豆去皮

良姜少

青皮

胡椒各一

陳皮二两

益智去皮三两

右依一服水二鍾生姜三片鹽一捻煎至一鍾不拘時服
大薑香散 治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈
痰滿不進飲食

藿香葉先去土半夏

白朮

木香不見火各半兩

白茯苓去皮

桔梗去芦頭

人參去芦

桃杞葉制云母

官桂不見火

甘草炙各七分

右為末每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服

丁香半夏丸

治胃寒嘔吐吞嚥酸水

丁香不見火一兩

白朮一兩

半夏湯泡七分

乾姜炮

橘紅各二兩

右為細末用生姜自然汁調糊和丸如梧桐子大每服五

七十九食遠生薑湯选下

薑香半夏散 治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噫逆

薑香二錢 半夏湯泡七次水三錢 丁香皮半錢

右作一服水二錢 生姜七片煎至一錢食前服

丁附治中湯 治胃寒停痰嘔吐不止

丁香 甘草炙 青皮炒 陳皮炒

人參各五錢 附子炮 白朮炮 乾薑各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分空心熱服
理中湯 治感寒嘔吐

方見寒門

旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花去梗半夏湯泡七錢

橘紅

乾姜炮各一錢

檳榔

人參

白朮

甘草各一錢

右作一服水二鍾生姜七片煎至一鍾不拘時服

香薷飲 治伏暑嘔吐

方見暑門

玉浮丸 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐

方見翻胃門

安脾散 治停飲傷胃以致嘔食酸酸嘔吐黃水不已

方見翻胃門

藿香安胃散 治嘔吐不止

藿香

半夏

湯泡
七枚

厚朴

姜汁
炒

蒼朮

水泔水
浸炒

陳皮各一

甘草

炙

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
養胃湯 治脾胃虛寒不思飲食翻胃嘔吐

方見翻胃門

半夏湯 治諸嘔嘔心下堅痞膈間有痰水眩暈

半夏

五分

茯苓

三分

右作一服水二鐘煎至一鐘去滓入生姜汁再煎二三沸

不拘時熟服

三乙承氣湯 治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不快時覺腹痛癟悶或下痢赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐

方見傷寒門

沉香煎丸 治嘔吐除中滿痞氣壅逆惡心宿昔成積而黃膩脹臟腑不調水穀不化此藥調順脾胃

沉香

丁香

硫黃

別研

沉香

檳榔

通墨黑

胡椒

丁香

丹砂

別研

水飛

硝砂

明淨者研水飛

良姜

青皮

白

木香

各一

縮砂

去皮半兩

巴豆

去皮心，研新瓦上壓去油，分

阿魏

用醋浸爛月白，題和所研多焦黑

右除別研藥外餘藥為細末入別研藥研勻煉蜜和丸如
菉豆大磁盒盛貯封每服二丸食前臨卧用溫生姜橘皮
湯下更量人虛實大小加減

木香白术散 治嘔而嘔食謂持實擊強是無積也、胃強而乾
嘔有聲無物脾強而吐食持實擊強是以腹中痛當以和

之一名丁香半夏湯

丁香

木香

半夏

一兩

檳榔

二錢

白术

茯苓

各五

甘草

四錢

右為細末每服二錢濃煎生姜芍藥湯調下有積而痛手
按之愈痛無積者按之不痛一方無丁香、

丁香丸 治因食冷物凝滯胃間嘔吐不止

大丁香半兩

胡椒

薑香

甘草炙各三錢

乾薑

肉桂各二錢

右為細末湯浸蒸餅和丸如棗豆大焙乾時上乾嘴不必
飲湯水水入口即愈吐如劑廢弱更加附子隨意

大養胃湯 治飲食傷脾宿食不化朝食暮吐暮食朝吐上氣
復熱四肢冷痺三焦不調反胃虛寒氣在上憂氣在下二
氣並爭但出不入嘔不得食

厚朴去皮

生薑各二兩

肥棗三味同

白朮

山藥

人參

川芎

橘皮

當歸

五味子

藿香

枇杷葉

刷去苦澀

黃蓍

甘草炙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎七分去
滓空心服或為細末米湯調下亦可

大枳殼丸 治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛

飲食不消痰迷嘔惡意醋吞酸飮食遲化並宜服之

枳殼

炒沙

茯苓

去皮

白术

厚朴

蜜製

半夏湯泡

人參

木香

青皮

去穰

檳榔

陳皮

去白

荆三棱

蓬木

炮

麥蘖

神麴

炒沙各二兩

乾生薑

半兩

牽牛

微炒

大黃

各二兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服一百丸食後用生薑湯送下

魏木丸

治中脘有宿食留飲駁蟹心痛口吐清水喫宿腐氣

神麴

三兩

蒼朮

木通湯三宿

陳皮

各一兩

右為細末用生薑汁別煮神麴末為糊和丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時生薑湯送下

十珍餅子

治大人小兒嘔吐痰涎渴寒停無間久病皆治

丁香

沈香

官桂

藿香

肉荳蔻

吳茱萸

柏洗

木香

各半

水艮

子結砂

舶上茴香

各七分

半夏

湯洗

七次

培乾

右為細末煉蜜和丸如小豆大裡作餅子每服十餅不拘時生薑湯下或化服亦得量病加減

助胃膏 治嘔吐不食

人參

白朮

伏苓

橘皮

縮砂

仁各一

丁香

木香

肉荳蔻

煨

草菓仁

各半

白朮

蔻仁

三分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸生薑煎湯化下
一物湯 治卒吐逆粥飲入口即吐因弱無力

人參

柏破

右以水一大升煎取四合頻熱服兼以人參汁煮粥喫立

愈徐郎中患反胃諸方不瘥只服參而愈

炮附子丸

治胃院有熱胃中有寒嘔吐不止

右用附子炮去皮臍碾為細末以麯糊和丸如梧桐子大就濕以大黃末為衣每十九丸加至二十九丸薑湯送下

加味二陳湯

治胃熱嘔吐不已

半夏

湯泡七次

陳皮

各半兩

白茯苓

三枚各半

甘草

一两半

刮笙竹青

四分

右火咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓不

拘時啜服

麥門冬湯

療煩熱嘔逆食下則出

麥門冬

去心

青竹茹

各三

茅根

三

生薑

各五兩

人參

甘草

各一两

右切以水七升煮取二升五合分溫三服如人行五里

一服不吐利忌海藻菘菜

竹叶

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不食

葛根

三兩

半夏

湯泡七
一研甘草
兩炙一

右咬咀每服五錢水二盞入竹茹如棗許生薑五片煎至七分去滓服清汁微冷細細服不拘時有熱乎足心熱政和中一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃猿冰竹茹湯正相當尔亟治藥與之即時愈良方槐花散亦相類一方加棗一枚同煎

加味七氣湯

治氣鬱嘔吐

半夏

製七
兩半

人參

厚朴

製

辣桂

各

茯苓

半
一兩

甘草

酸半

右咬咀每服三錢半生薑七片棗一枚煎至七分去滓服

加木香煎亦得

小丁沉丸 治乾嘔和調胃氣

丁香

檀香子

半兩各半
木香

兩半
縮砂仁

白芷

益智

去皮

陳皮

湯浸去白焰

沈香

甘草

生薑

一斤

宿焰

乾已上各

四兩半句
各一兩

阿魏

一分用醋半
升熬為膏

右爲細末入阿魏膏拌勻用醋煮麪糊和丸如鷄頭實大研丹砂麝香細末各少許同爲末每服一丸細嚼用薑鹽湯送下空心服

草豆蔻湯 治乾嘔和胃下氣

草豆蔻

去皮蘿香

枳殼

去穰

陳皮

白焰

白芷

山芋

各半

桂心

去皮

丁香

各一

右㕮咀明每服三錢水一盞乘二枚擘破栗米少許同煎至

七分去滓食前温服

生薑九

治乾呕恶心 益津液和胃氣

生薑二斤和皮切作片以青皮

生薑三兩同薄

一兩同薄一兩同薄一兩同薄

痛要火毒去白培

甘草

炙剉

陳皮一兩

乾姜各四兩同薄去白培

香白芷

縮砂仁

去皮

胡椒一兩

一兩同薄

蓬术

炮

右為細末以麪糊和丸如小彈子大用丹砂細末為衣每

服一丸細嚼溫酒送下 食前服

開胃丸

治乾嘔氣逆不止

半夏麴

散炒人參一兩

白芷

蕤去皮陳皮去白

白术一兩

右為細末用生薑汁同棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十九不拘時用粥飲送下

參栗湯 治乾嘔不下食

人參一兩

陳粟米半兩

生薑五兩

半夏

另包七次去壳四兩用生薑同搗不焙乾

右同入銀石鍋中慢火焙令焦黃粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚去核煎至七分去滓微熱空心服

三聖散 治嘔逆不食

半夏

七枚大者先以繩子穿透心用左邊布綴穿過於井花水內浸一日一換水浸七日取出來

丁香

四粒半兩

胡椒

四粒

右為細末大人用生薑湯調一字小兒筋頭熊生薑汁後點藥少許口中立愈至甚者不過三服

名連丸 治胃寒嘔逆

石蓮肉

去心附子皮

炮製去

乾薑

一兩

右為細末用粟米粥和丸如棗豆大每服十丸用蜀椒湯

送下嚥止勿再服

溫中白朮丸

治胃寒嘔吐

白朮

三兩半

半夏二兩

乾薑一兩

丁香牛蒡

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時生薑湯送下

恩食丸

助脾胃消導飲食止吐逆

烏梅肉

五味子

神麴炒

麥蘖炒

人參

乾薑炮

甘草炙各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸食前用米飲湯送下

參耆枳朮丸

開胃進食止嘔吐

人參

木香絡三

枳實炒

白朮一兩

陳皮

四兩半

乾生薑二兩

右為細末用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大每服五七

十九不拘時用米湯送下

奇効良方十九卷

新刊太醫院奇効良方二十卷

霍亂門

附論

內經云太陰所至為中滿霍亂吐下河間言霍亂吐下濕為留飲痞膈而傳化失常故甚則霍亂吐瀉也病起于中焦皆因胃暑中熱或因渴大飲或飲而過量或軌而飽食或食而過度飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔時當夏月風濕暑三氣應之故其邪大作矣風者風木也內應足厥陰肝木濕者濕土也內應足太陰脾土暑者火熱也內應手少陰心火此三經各為顯然之病經言諸傳反戾水液渾濁皆屬於熱熱氣燥燥於筋故筋轉而痛應風屬於肝也故諸轉筋以湯瀉之而使腠理開泄腸氣散則愈矣因湯瀉而愈俗反疑於寒也又言濕勝則濡瀉濡為濕土也而脾主濕應濕屬於脾也又言諸嘔吐逆皆屬於熱王注曰炎熱薄燎心之氣也心火炎上胃膈熱甚故為

吐應陽屬於心也是則風動肝熱則轉筋水濕傷脾則為瀉渴
熱乘胃則為此三氣雜乃為霍亂又有乾霍亂濕霍亂之分吐
利並作邪氣得出名為濕霍亂十存八九設若不吐不利揮霍
撩亂邪無所出名為乾霍亂尤死一生且夫人既有入必有出
今有其入而不得出者否也塞巴此其鬱甚而不通也且東垣
發明木鬱則達之意正謂此也如飽食所傷壅塞胃中當吐不
吐者死也內經五亂篇云清氣在陰濁氣在陽乘氣順轉衛氣
逆行亂於胃中是謂大恍亂於腸胃則成霍亂內經又云陰之
所生本在五味陰之五宮傷在五味由此觀之雖五味能養五
臟過則亦能傷人之體弱遂感前證長沙公論治之法有所主
矣若邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且利熱
多欲飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸原病式曰大法吐
利煩渴為熱不渴為寒或熱吐利始得亦不渴者此亡津液後

必渴也。或寒本不渴，若亡津液，過多則燥而渴。但寒者，脉當沉細，而遲熱者，脉當實大而數。戴人論此死生反掌之說，為是病土為風木所尅，土化不行也。嘗以治驗而斥巢氏論，因為寒之兆，以及方士妄用熱劑誤治而死主以六一散通療脾胃受傷，風濕渴三氣為邪於時宜矣。故言飲食調養之節大忌，飲食太早，謂脾胃極損，不能傳化穀入於胃，則必危矣。病安之後，宜以粥飲漸之，養之。大凡霍亂脉大者，生沉細而遲，氣少不語者，為難治也。

霍亂通治方

霍香正氣散 治中寒霍亂，嘔吐泄瀉。

方見傷寒門

通脉四逆湯 治霍亂多寒，肉冷脉絕。

吳茱萸（三錢）附子（二錢）桂心（不見火）

當歸

甘草

支各一錢

白芍藥

木通

細辛

各半錢

右作一服

用

水二

鐘酒半

鐘生薑

七片紅棗

一枚煎至一

鐘不拘時服

薑附湯

治中寒霍亂

轉筋手足厥冷

方見寒門

七氣湯

治七氣鬱結五臟之間互相刑克陰陽不和揮霍變

亂吐利交作

半夏湯泡

厚朴

白芍藥

茯苓

各二錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各半錢一

右作一服

用

水二

鐘生薑

七片紅棗

一枚煎至一

鐘不拘

時服

不換金正氣散

治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼不

止

方見寒門

木瓜湯

治霍亂吐瀉轉筋擾悶

酸木瓜

三錢

吳茱萸

洗過

茴香

炒各

一錢

甘草

一錢

水

右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇十葉煎一鍾食前服

桂苓甘露飲 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利並治之

方見暑門

枇杷葉散

治中暑轉筋煩渴引飲

方見暑門

二香散

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

白术

厚朴

陳皮

茯苓

半夏

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃蓮

扁豆

各一錢

大腹皮

甘草

各半

右作一服用水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘

時服

加味五苓散

治霍亂吐瀉其効如神

即暑門五苓散減桂加蘇木煎

加減理中湯 治霍亂嘔吐

人參

乾薑

白朮錢各三

甘草錢一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

若爲寒氣濕所中者加附子一錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮錢半名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即

進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏錢各一生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓錢各一

一名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子一錢不喜飲食水

不化者再加砂仁一錢

若霍亂嘔心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實白茯苓各一錢名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根一錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏一錢

若脾上築者腎氣動也去木加官桂半錢腎惡燥去木恐作奔豚故加官桂

若慄多者加茯苓一錢

若渴欲飲水者加木薑

若寒者加乾薑半錢

若腹滿者去白朮加附子一錢

若飲酒過多及啖炙燙熟食發爲鼻衄加川芎一錢若傷

胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方

冷香湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不和遂成霍

亂之證

方見暑門

止渴湯 治霍亂煩渴

人參去蘿蔔根麥門冬去心茯苓去皮

瓜蔞根

葛根

澤鴟

桔梗

甘草

炙各五錢

右爲細末每服二錢不拘時用蜜湯調下

回生散 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮去白

薑香去土各半兩

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠

麥門冬去心 人參各三 淡竹葉半 附子半 杏

半夏 甘草炙各

右作一服用水二鍾生薑五片粳米百餘粒煎至一鍾不拘時服

麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心 白茯苓去皮 半夏湯泡七次 檘皮

白朮各半 人參

小麥

甘草炙各半

右作一服用水二鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不拘時服

白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養兼老及治酒積嘔癥

白朮

茯苓去皮

人參

藿香各半

葛根

一兩

木香

二錢

甘草

一錢半

葛根

一錢半

葛根

一錢半

右為細末每服二錢用白湯調下如煩渴加滑石二兩甚者加薑汁續續飲之不拘時服

人參散

止吐逆及治鴟後除煩渴常服

人參

二錢半

茯苓

二錢半

葛根

一錢半

藿香

木香

一錢半

甘草

一錢半

葛根

一錢半

葛根

一錢半

藿香

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
丁香散 治霍亂吐利不止

丁香

桂心

白朮

各半

荊梨勒

去核

葛根

一錢半

葛根

去核

厚朴

去皮

附子

炮去皮

良薑

各三分

陳橘皮

湯浸去白

葛根

去白

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

乾薑湯

治霍亂吐利

心腹疼痛氣逆

手足冷

乾薑

各半

葛根

各半

乾薑

炮

桂心

去皮粗

附子

炮去皮

草荳蔻

去皮

木香

高良薑

炒

肉荳蔻

去殼

乾木瓜

甘草

炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服
香薷丸 治冷熱不調霍亂吐瀉

香薷

一兩半兩

白扁豆

炒

零陵香

赤者去土

藿香

去梗

木香

各一兩

丁香皮

二兩

智仁

一分

右為細末用麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用
溫紫蘇湯下

霍亂證

本自胃經或因寒飲水或傷暑毒或感濕氣冷熱不

調水火相干陰陽相搏故轉筋掣痛經絡亂行暴熱吐瀉
中焦胃氣所主也察其色脉隨經標本此治霍亂吐瀉之
法也

如頭痛發熱邪自風寒而來中焦為熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多飲水者五苓散以散之如邪稍下者居陰分則為寒寒多不飲水者理中丸以溫之如吐利後有表者解之汗出厥者溫之

如既吐且利小便利大汗出內外熱者亦溫之如吐下後汗出厥逆不解脉欲絕者四逆等湯治之

如吐瀉轉筋身熱脈長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯

四君子湯

人參

白朮

茯苓

黃耆各一兩

右剉如麻豆大每服一兩水三盞生薑五片煎至一盞去滓不拘時服

如吐瀉轉筋頭痛自汗脉虛者四君子湯加桂五錢

如吐瀉轉筋脹卡痛脉弦者宜

建中加木瓜柴胡湯 平胃散加木瓜五錢亦可也

桂枝二兩 半
芍藥二兩

甘草一兩

膠陽半升

生薑半

大棗六枚

木瓜五錢

柴胡五錢

右判如麻豆大每服一兩水三盞煎至一盞半去滓下膠
鴆兩匙服

如吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉而細者宜

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯各一兩

芍藥

良薑各五錢

同前法煎服

如吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯各一兩

生薑

附子炮

厚朴三錢

薑製各

同前法煎服

如吐瀉四肢厥冷脉微緩者宜

建中加附子當歸湯

桂枝一兩芍藥二兩甘草半兩膠錫半升

附子三錢當歸三錢

生薑一兩

大棗六枚

同前法煎服

丁香散治霍亂不止

丁香肉荳蔻去穀木香各一

右為細末每服二錢用白粥飲調熱服不拘時

正胃湯治霍亂吐利不止

枇杷葉拭去粗皮厚朴去粗皮桂心去粗皮

右為簾末每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去

津不拘時熱服

東臺飲 治霍亂神効

良臺

藿香

陳皮各一

甘草
炙三兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

吳茱萸湯 治胃暑伏熱腹痛作瀉或痢并飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或胃寒或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉吐瀉併行頭旋眼暈手腳轉筋四肢遂冷用藥遲慢須臾不收命在須刻之間

吳茱萸

木瓜

食鹽各半

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入藥煎至二升已下傾一盞冷熱隨病人眼之辛無前藥用枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽一撮醋一盞同煎至八分溫服或益梅酸等物皆可服

治霍亂吐瀉臨時無藥

右用生蒜頭研細塗心下及兩脚心

水壺散 治備急霍乱吐利不止

右用高良薑火炙令香焦三兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡一方加粳米水煮良薑作粥食之一

方用水煎服

艾熨方 治霍亂吐瀉

右用患人仰卧捲艾鋪臍上如碟子大一指厚熨斗盛火熨之如無熨斗以鎌子盛湯盞之亦可

訶梨勒散 治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣隔不思飲食

訶梨勒皮三分桂心

澤瀉

赤芍藥

乾薑炮

人參各半

白朮

陳皮

湯浸去

厚朴

去粗皮薑汁煎各一兩

甘草一分

右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫溫服

桔梗散 治霍亂食不消化嘔吐不止

桔梗去蘆

陳皮湯浸去白术各一

枇杷葉

拭去毛根黃

乾薑炮

良薑各半

白茯苓三分

甘草一分炙

右㕮咀每服三錢用水一中盞入糀米五十粒紅棗三枚同煎至六分去滓不拘時溫服

正氣丹 治下虛陰陽錯逆霍亂吐利熱食不下

半夏

礞石末生薑汁浸

藿香葉各一

碗黃三分蓋肉

水銀內

朱砂研成丹子分入硫黃汁

附子

醋裂去皮半兩

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大以丹砂末為衣每服二十九丸加至三十丸不拘時米飲送下

丁香散 治霍亂嘔吐不止

丁香

藿香葉去土批把葉拭去毛

右剉碎用水一盞生薑半錢煎七分去滓不拘時熟服

木瓜丸 治霍亂腹中冷氣下利

木瓜乾者

當歸切焙

熟艾微炒

官桂去粗皮

人參各半兩

陳橘皮湯浸白

高良薑炒

訶黎勒皮

厚朴去粗皮

白朮上各半兩

木香半兩

赤石脂二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用米

飲送下

烏梅散

治霍亂後利不止冷汗出服脹脹

烏梅肉微炒

黃連去皮

當歸炮微

附子炮皮去

熱艾上各三分

阿膠炒令紫

肉荳蔻去殼

赤石脂上各半兩

甘草酸半兩

右為細末不拘時以鴆飲調下二錢

黃連丸

治霍亂後不利無度腹中疼痛

黃連

去心
微炒

蘿蔔

微炙

李林

去粗皮生薑汁蒸熟

各上各

三分

當歸

微炒剉碎

乾薑

炮裂

木香

不見火見

她榆

各上各半兩

阿膠

搗碎一兩

右搗為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用粥飲送下

止血湯 治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸

切片

桂心

去粗皮

續斷

各三兩

生地黃

焙

乾薑

炮裂各四兩

阿膠

煑令合

蒲黃

續斷各二兩

甘草

炙各二兩

右搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日三

赤石脂湯 治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛

赤石脂

四兩升麻

白朮

各一兩半

烏梅

去核微炒

乾薑

炮裂各四兩

陳蘋米

微炒

梔子仁

各一兩半

大黃

各半兩

右搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心溫服

人參散

治霍亂身體疼痛四肢逆冷脈理中四順不效者

人參去蘆

白芍藥

當歸炒碎

高良薑各一兩

附子炮去皮

陳皮湯浸

桂心

白术略

右搗篩每服四錢用水一盞盞紅棗三枚煎至六分去滓
不拘時熱服

吳茱萸湯

治霍亂多寒手足厥冷脉絕

吳茱萸半升

當歸切焙

桂心

皮芍藥各三錢

細辛去苗

木通

甘草半錢

右剉如麻豆大每服五錢七用水二盞入生薑一棗大切
碎紅棗二枚煎至一盞去滓不拘時溫服如氣疼去棗加

葛根半兩一方無木通有木香

附子散

治霍亂腹瀉嘔氣逆手足俱冷

附子炮裂去皮

草荳蔻

去皮陳皮湯浸

高良薑炒

桂心 酸半 牛草發

右咬咀每服三錢用水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服

四順附子湯 治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣少不語急
服及治霍亂轉筋肉冷汗出嘔噆

附子生用

白薑炮

人參

牛草

炒各等分

右剉碎每服四錢用水二盞煎至一盞去滓空心服如服
痛加桂小便不利加茯苓仍用炒鹽熨臍中一方附子炮
去皮臍下甚者加龍骨服痛不止者加當歸

四陽散 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服
此藥四肢漸緩神識便省

右用天南星為末每服三錢入生薑五錢紅棗三枚同煎
至八分溫服未省再服

胡椒湯 治霍亂煩悶欲死

胡椒

三十粒

陳皮

高良薑

桂心

半兩

麥門冬

去心三十粒

木瓜

黃酒各半兩

右搗篩每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服
活命散 治男子婦人小兒上吐下瀉霍亂不止面色青黑命

欲臨死者宜服此藥

防風

羌活

獨活

乾薑

細辛

各一分

官桂

去粗皮半分

草荳蔻

肉荳蔻

川芎

各半兩

吳茱萸

乾木瓜

各一兩

右爲細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調連滓服

抵聖散 治霍亂宿食不消心腹疼痛

白朮

二兩

良薑

半兩

白茯苓

去皮去核

吳茱萸

湯泡

人參

水香

粗殼

去皮炒

草荳蔻

去皮

陳皮

甘草

厚朴

去粗皮

生薑

鹽

酒

右為細末每服二錢七不拘時用沸湯調服

桃葉飲

治霍亂吐利不止心腹俱痛

右用桃葉秋冬用枝搗二升以水五盞和浸取汁每服一盞不拘時溫服財後方用桃葉三升十全金方用桃葉煎汁一升立止冬月用桃皮

鹽熨法

治霍亂吐瀉心腹作痛

若用炒鹽二碗紙包護頸其脣前并腹肚上一截以熨斗盛火熨令氣透則甦仍續以炒鹽熨其背鹽湯飲之即止

木香散

治霍亂下利氣脹飲食不消

木香

丁香

白术

炒

山楂子

人參

桂心

去粗皮

石菖蒲

吳茱萸

炒泡

陳皮

去白肉

良薑

肉荳蔻

去殼

草荳蔻

去皮

白荳蔻仁

甘草

炙各等分

右為細末每服二錢七不拘時水瓜煎湯調下

白荳蔻丸

治霍亂及脾胃氣虛腹脹妨悶不思飲食

白荳蔻去皮

诃黎勒去核

人參去蘿各

乾薑炮裂

甘草

炙微赤各半

白木

陳橘皮去白

厚朴

去粗皮生薑汁蜜各一兩

桂心

各半兩

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時生薑棗湯送下日進四五服

珍珠散

治喜怒不常憂思兼并致臟氣鬱結留聚涎飲脅腹

蒲藴或腹疼痛增寒發熱吐利交作

附子

二箇一箇生用一箇炮俱去皮鹽

半夏

湯浸二十一次去滑一兩半

成鍊鍾乳

滑石各半

辰砂

三錢別研

右爲末每服二錢

水二盞生薑七片薑香二三葉蜜半匙

煎七分食前冷服小便不利加木通茅根煎

吳茱萸餅 治霍亂昏塞不利

吳茱萸

湯泡厚朴去粗皮生薑汁製陳皮白扁豆湯浸去

高良薑

人參

胡椒

各一

香薷

木瓜

兩

右為細末用生薑汁半升和藥捻作餅子曝乾臨用時炙燥再碾為細末每服二錢七水一盞煎至七分溫服

乾霍亂

附論

夫霍亂者多吐利也乾霍亂者冷氣導於胃飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也

厚朴湯

治乾霍亂

厚朴

去粗皮生薑自然蜜炙令黃香

枳壳

去核炒

高良薑

檳榔

朴硝

三分

大黃

沙二

右搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服

治命散

治脾

元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心脅癰壅

丁香七粒

葛根半兩

牛草灸一

生薑半兩

鹽一合

右剉碎用童子小便一盞半煎至一盞去滓分二次溫服
冬葵子湯 治乾霍亂大小便不通手足心俱熱悶渴

冬葵子

滑石碎

香薷各二

木瓜一枚細切

右搗篩每服五錢匕水二盞煎至一鍾去滓溫服大小便
通利心中快立 日四五服

中惡霍亂

附論

夫中惡霍亂者客邪內干正氣暴亂使胃中食物不化氣道否
結不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知
識此得之鬼氣所作也

十香丸 治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食

一丁香

蘇合香

白檀香

香附子炒去
梗

沉香

安息香研

薰陸香研

麝香研

木香

高良薑

龍腦研

白木脂研

丹砂

草�研容半兩

調梨勒闌取皮角

犀角鱗骨

厚朴

桂枝去皮生薑各一兩

桃仁闌取皮角

桑角鱗骨

右除別研藥外礮為細末入別研藥同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸不拘時用溫酒送下老少加減服甚者溫酒研下日四五服以瘥為度此藥以礮盒貯之桃枝湯 治中惡霍亂心痛胃脹疗痛喘急

桃東行枝白皮切碎一握

官桂去粗皮

當歸培各三兩

梔子仁四丹砂碎

附子炮裂去皮

吳茱萸湯泡

豆蔻各一兩

右剉如麻豆大每服四錢七用水二鍾生薑三片煎至一

鍾去津不拘時溫服日三夜一

丹珠丸 治中惡霍亂垂死

丹砂研半

附子

炮裂去皮臍一分研為末

雄黃

三豆許研

右用巴豆七粒去皮心別研出油後入丹砂雄黃附子末同研令勻煉蜜和丸如麻子大每服三丸不拘時米飲下若下利未止加三丸至五丸與少冷粥食之即定

白荳蔻丸 治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液內燥食人煩躁睡卧不安

白荳蔻去皮陳橘皮去白

草荳蔻去皮厚朴去粗皮

甘草去皮

白木瓜

白木瓜

半夏湯泡去皮

官桂去粗皮

乾木瓜

縮砂去皮

陳鴉榔

陳鴉榔

瞿麥去皮

人參去皮各

高良薑炒

縮砂去皮

陳鴉榔

陳鴉榔

瞿麥去皮

麥蘖炒

白茯苓

乾薑炮

大耆

桃仁去皮炒

甘草炒各

四兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至四十九空心用米飲送下

人參散 治霍亂吐利汗出心煩

人參去蘚 麥門冬去心火各三

白朮

黃蓍 乾薑

炮

桂心

甘草

炙各半兩

右搗篩每服四錢用水一中盞生薑半分煎至六分去滓頻頻溫服

竹瀝飲 治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者

竹瀝一合 稷米一合

炒以水二盞同研去滓取汁用

右二味和勻頻服之

木香湯 治霍亂煩躁懊憹不得安卧

木香

乾木瓜

紫蘇不去莖各一兩草荳蔻去皮兩半

右搗篩每服三錢七水一盞入黑豆半合許生薑三片煎

至八分去滓溫服日二

竹葉湯 治霍亂利後煩熱躁渴卧不安

右用竹葉濃煎汁飲五六合佳

藿香散 治霍亂逆滿開胃口

藿香葉一兩

丁香各半

訶黎勒煨去核

糯米

三
升

石蓮心

二
百
箇

如無以白

甘草

一
錢

右為細末每服一錢用煨和皮生薑一塊棗二枚去滓煎

湯調下早晚食前服

麥門冬湯 治霍亂逆滿不下食即吐出煩卧不安

方見嘔吐門

白木散 治霍亂胃氣虛乾嘔不止

白木

人參去蘆

蘆香各半

枇杷葉去毛

草蔻蔻去皮高良薑半兩

右搗篩每服三錢用水一中盞入生薑三片煎至六分去

滓不拘時溫服

薤白湯 治霍亂嘔不止

薤白湯 細切半兩 生薑 切細半兩 陳皮 去白三錢

右用水二大盞煎至七分去滓分溫二服

橘皮湯 治霍亂嘔噦不止

橘皮湯 浸白皮去白一兩 甘草 炙各一兩 枇杷葉 拭去黃二兩

右搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服如人行五七里再服

治霍亂轉筋方

附子 炮去皮麻 白藥 各三分 桃枝 切細三寸 蕤根鬚 切細二握

垂柳 切細三錢

川椒 三分

生薑 一兩

裹在脚心

石以水三斗煎三二十沸已來看冷暖淋多時為妙如急

即加醋五升同煎用之

附子湯 治霍亂轉筋淋足

附子一枚去皮鹽水浸一晚 生椒一兩 細綿裹

生薑切碎一分

各葱半斤切碎

右以水一斗煎三兩沸入磁盆中瀝去滓以鹽漬解之冷

熱得所淋洗立瘥

鹽塌方 治霍亂轉筋入腹

右用鹽三合以水五升煎取三升浸青布塌轉筋上一方煮令灼灼爾瀆手足在胷脇者湯洗之入腹者倒擔病人令頭在下腹中平乃止剝者引陰陰縮者必死一方用極鹹鹽湯於槽中暖瀆之

裹足法 治轉筋入腹氣急煩渴

右用木瓜二箇切破以水五升煎取三升取青布浸湯中用裹轉筋上如無木瓜用枝二兩煎亦得或木瓜煎汁服

亦可

治轉筋不止

右用吳茱萸木瓜等分爲末溫酒調服

治沙子絞腸尤急之甚

右用黑神散以童子小便調服如不止再服立愈

絞腸沙方

有一證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之絞腸

沙今考此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因飢飽失

時陰陽暴亂而致急用吐法此法救人不一

右用鹽半盞以熱湯數碗泡鹽令患人飲盡後却以鷄翎
掃咽喉間即時吐所飲鹽湯出盡其證即愈

糯米薑水 治上吐下瀉心腹疼痛水食不下

糯米十
一
生薑
一塊

右作一處搗細用新汲水解服如倉卒無藥極地坑投水

攬之待澄取清飲之亦可名地漿

炙法 霍亂已死腹中尚有幾氣

右用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海穴

洗法 治霍亂轉筋

右用麥一把去兩頭水煎薰洗一夕用陳蓼

瀉法 治霍亂轉筋入腹

右以鹽多用煎湯瀉之