

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇効良方卷之三十六

遺溺失禁門

附論

夫以方論其小便遺失者爲腎與膀胱虛冷不能約其水也今乃以爲熱有所據乎曰此劉河間深得其旨乃作原病式云熱客膀胱鬱結不能滲泄故也或曰小便澁而不通者爲熱道澁不禁者爲寒豈知熱甚而氣血不能宣通則廢渾而神無所用故液滲入膀胱澁溺遺失不能收禁也內經則謂腎肺生病爲遺溺又曰膀胱不禁爲遺溺靈樞謂肝所生病亦遺溺蓋因二經循陰器繫延孔病則陰衛不至氣血虛勞莫能約束水道之竅故遺失不禁也又曰水穀入于口其味有五各注其海津液各走其道故三焦出氣以溫肌肉充皮膚爲其津液流而不行者爲液天熱衣厚則腠理開故汗出也寒氣留於分肉聚沫則爲痛天寒衣薄則腠理閉氣滲不行水下留於膀胱則爲溺與

氣也靈樞又云手太陽虛小便遺遺者觀之則人不獨病在陰
達孔而已夫如是者乃是三焦失瀆之失常何以足三焦之手
少陽從足上入絡膀胱故不約也肺手太陰從上焦通調水道
下輸膀胱腎又上連肺故將兩臟更是子母臟也母虛子亦虛
此非上下三焦氣虛皆足以致其遺溺乎肺屬金腎與膀胱屬
水所以金乃水之源膀胱者乃滲泄之府腎者水之竅今患者不
禁病何止于熱極鬱結壅痺腎部而已又自內經所謂太陰在
東客勝濕客下焦溲便不時太陰之後甚則入腎竅泄無度者
觀之但濕主于否況是沂勝之邪其不爲鬱結壅痺者乎從而
思之聖人之言舉一隅便當以三陽爻前謂肝督膀胱之病不
言其邪可見諸邪蓋能病之也故言手太陰別之匿者為子母
歲氣者之安也可見所生所復不勝之正邪不是能挾之也大
抵人之臟腑蓋心屬火與小腸爲表裏二氣所以受盛是為傳

送又腎爲水合膀胱爲表裏膀胱爲之府水注於膀胱而泄矣
小腸實相交通也若心腎氣弱陽道衰冷傳送失度必遺尿失
禁經云膀胱不利爲癃不約爲遺矣夫水火不濟陰陽不調下
焦苦冷腎與膀胱受尅故不能制水水道滑則因水挾寒而不
禁也又曰下焦苦血虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛寒
不能溫制水液則便溺欬出而不禁乃心不與腎交通或冷或
熱而滑滌隨之也不然若不觀於色不辨於脉不審所兼之病
狀獨指爲冷指爲熱獨務滯水道之寢不求邪所自之本者五
味所從也傷寒踰陳法有曰寸口脉微而濶微者胃氣不行增
者榮氣不足榮衛不能調則三焦無所伸而歸其部上焦不歸
營而吞酸中焦不歸者不能消穀引飲下焦不歸者則遺溺失
禁也治之之法當溫補下元清心寡慾宜用秘元丹家輩子尤
分清飲之類又有產後所傷及小兒胞冷皆有遺溺失禁者臨

證察脉究其所因度其遺禁對病用藥服解効矣

遺溺失禁通治方

二氣丹

治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黃

細研

桂心

為末各

附子

火者一粒去皮

半兩

乾薑

細研末

硃砂

細研二

克

右件拌勻麪糊和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十

丸空心用益湯送下

家韭子丸

治下元虛冷小便不禁或成白濁常服補養元氣

進羹飲食

家韭子

炒大鹿茸

酒浸

四兩

牛膝

酒浸

肉蓯蓉

酒浸

各

巴戟

去心

兔絲子

酒浸各

熟地黃

當歸

各

巴戟

去心

乾薑

炮

桂心

一兩

杜仲

去粗皮炒

石斛

去根

乾薑

炮

桂心

一兩

右爲細末酒黃酒爲丸如梧桐子大每服一百丸空心胃

溫酒或鹽湯送下

茯苓丸 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓

各等分

右為細末以新汲水浸洗澄去漬沫控乾復研每味別取地黃汁與好酒同於良石器內熬成膏搜和丸如彈子大每服一丸細嚼空心用鹽酒送下

鷄內金散 治遺尿失禁

鷄肫脰

一具并楊柳根燒灰
男用頭女用尾

右為細末每服二錢空心溫酒調服一方加豬脬燒灰存性焙乾同為末依前法調服

菟絲子丸 治小便多或致失禁

菟絲子

水酒各
一兩

肉荳蓉

酒醸各
二兩

五朱子

附子

炮去皮
一兩

肉蓯

酒炙
一兩

牡蠣

酒炙
一兩

桑螵蛸

酒炙
一兩

鷄膝
腰多各半兩

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用
鹽酒或鹽湯送下

桑螵蛸散 治小便頻數如稠米泔色此由勞傷心腎得之服
此藥不終劑而愈大能安神定志

桑螵蛸
炙去鹽水

遠志
去心

龍骨

石菖蒲
鹽炙

人參
去薑

茯神
去木

鼈甲
醋炙

當歸
各等分

右為細末每服二錢臨卧時用人參煎湯調服

益智仁湯 治疝氣痛連小腹叫呼不已小便頻數是腎經積
冷所致

方見氣門

治小便遺失方

阿膠
炒

杜鵑
酒

鹿茸
酒炙

桑螵蛸
酒炙

右為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用
鹽酒送下

鹿角霜丸

治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不以多少鋸作鏈子長三寸洗淨用
水桶內浸夏三冬五晝夜用浸水同入鑊內煮之毫湯少
添溫湯日夜不絕候角膝藥熟度輕漬出用力刮去皮如
蛋白放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火熬為膠候
角極乾為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸加
至四十九空心用溫酒或鹽湯送下

牡蠣丸

治小便不禁

牡蠣白者三兩鹽蜜器盒子內更用鹽末一兩蓋
頭鋪底以炭火燉五斤燒半日取出研成粉

赤石脂

三兩生硫蜜拌勻濕於生鐵
盒子內燉次候令乾研成粉

右同研匀酒煮糊和丸如梧桐子大每服十五丸空心用

盜湯送下

鷄腸散 治小便不禁日夜無度

黃鷄腸

雄者四具切破
爭既久令黃色

黃連

去黃
研

內箋容

滑炭
切倍

赤石脂

別研
研

白石脂

別研
研

若參

各五
兩

右為細末更研勻每服二錢食前酒調服日二夜一

治少小膀胱遺尿不自竅方

雄鷄肝

桂心各等
分

右同搗爛如泥丸如小豆大每服十粒溫酒送下日三服

療尿床方

右用羊脬盛水貯令滿繫兩頭煮熟開取水頓服之即瘥

固脬丸 治小便不禁

菟絲子

二兩
利

茴香

一兩

附子

皮
桔梗

桑螵蛸

僵蠅
各一兩

戎鹽

一分

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心
用米飲送下

治小便不禁方

益智仁

巴戟

去心清益酒煮二兩以

桑螵蛸

鬼絲子

酒蒸

右各等分為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九
食前鹽酒或鹽湯送下

澤鴻散 治遺尿小便澁

澤鴻

牡丹皮

牡蛎

煅為

鹿茸去毛研金黃

赤茯苓

桑螵蛸

微少

阿膠

燒掉少一錢

黃芩

右為細末每服二錢食前用酒調服

治小便遺失

阿膠

牡鈣

煅為

桑螵蛸

煑水各

鹿茸

酒炙各一錢

右為細末糯米糊和丸如梧桐子大每服五十九粒水七

盞酒送下一方治遺尿小便澀無熱螺旋有熱耳以水七

升煮取二升分作二服一方以粥飲下

阿膠液 治小便遺失不禁

阿膠

三兩炒

牡蛎

煅成

鹿茸切酥酸

右剉散每服四錢水一盞煎七分空心服或為細末米飲
調服二錢亦可

治小便失禁方

右用鷄腸一具以水三升煮取一升分三服一方用雄鷄
燒灰為末用三指一撮溫鹽水調一錢向北斗服之更良

白薇散 治小便不禁

白薇

白斂

白芍藥各等分

右為細末每服二錢食前以粥飲調下

白茯苓散 治小便不禁日夜不止

白茯苓

龍骨

乾姜

附子

皮

續斷

桂心

甘草

各一兩
巴豆

熟地黃

桑螵蛸

各二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸

兩去毛刺
附子

桂心

桂子

微炒

羊踟躅

酒井

附子

炮去皮

桂心

各一兩

右為細末每服二錢食前以粥飲調服漿水調服亦可

鹿茸散 治腎臟虛腰冷寒夜遺小便

鹿茸

去毛刺

附子

炙令黃

烏賊魚骨

去甲微炙
各三兩

當歸

白芍藥

桑寄生

龍骨研

人參

各一兩
上各

桑螵蛸

火炙令黃

各半兩

右為細末更入龍骨同研令勻每服一錢用溫酒調服空

心日晚臨卧各一服

菟絲子散 治小便多或不禁

菟絲子

二兩酒浸三日曝乾搗為末用

牡蛎

燒為

附子

炮去皮搗

肉蔻

二兩

五味子

各一兩

鷄胫脛

中黃皮

兩微炒

內旋參

二兩

肉蔻

浸炙黃酒

右為細末每服二錢食前以粥飲調下

治小便多或不禁

右用雄鷄喉嚨及矢白胫脛裏黃皮燒為末麥粥清盡服

之亦可以赤鷄翅燒末酒服三指撮日三

治遺尿及小便多或不禁

益智仁

一兩鹽水浸一晚

龍骨

四兩另研

牡蛎

煅研半兩

川烏

法

散

半兩

右為細末酒黃糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心用

川草薢煎湯送下

太醫院經驗奇効良方卷之三十六終

太醫院經驗奇効良方卷之三十七

五疸門

五疸之病諸書所載甚繁其證不過有五一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸黃汗為病身體俱腫汗出不渴其汗能染衣黃如糞汁此由脾胃有熱汗出或風所閉熱結其汗黃也黃疸食已即飢遍身俱黃卧時身體帶青帶赤增寒壯熱此飲酒食過度臟腑熱水穀併積於脾胃風濕相搏熱氣薰蒸發於陰部其人必嘔發於陽部其人必振寒而後熱穀疸之證食畢即頭眩心中怫鬱不安遍身發黃此脾胃有熱因大飢過食所傷胃氣所致也酒疸之病身目發黃心中懊痛足胫蒲小便黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致女勞疸者身目俱黃發熱惡寒小腹蒲急小便不利此由過於勞傷極於房室之後入水所致多渴腹脹者難治丹溪論云不必分

其五等皆濕熱而成固然譬猶醬麵濕與熱搏氣不得凌爵而生黃五疸之分皆是前人之所註且如張長沙謂陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃脉來浮滑緊數乃熱高陽明胃經可作陽明實發黃朱肱云病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃而腠理不開寒熱與宿穀相搏黃蒸而發黃也且如傷寒當汗不汗當利小便不利亦生黃夫脾屬土而受水濕發黃者有之脉來沉細而無力身冷而黃為寒熱搏於太陰脾經當作陰證治之又有畜血一證小便自利大便黑色其人發狂乃為瘀血蓄在下焦而發黃也若嗜酒之人多致發黃蓋酒性大熱熱與濕搏於胃中而黃發於外其證外無熱內則小便不利胷中如啖蒜蒸狀當心足下皆熱又遠則成黑疸脉若浮滑腹滿欲嘔吐者必先吐之脉若沉滑腹滿大便秘者必先下之又有卒然發黃心滿而喘命在須臾者為之卒黃但心戰發熱是也大要

痘病渴者難治不渴者易治痘毒入腹喘滿者危脉洪大大便利而渴者死脉微小小便利不渴者生寸口無脉鼻氣冷者亦不治又有口淡怔忡耳鳴腳弱或微寒熱小便赤白濁又當作虛證治之不可妄用涼藥愈傷血氣治法分利濕熱暑為功當歸病之際在乎脉證辨之人命醫之所繫可不謹乎

正痘通治方

加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為痘煩渴引飲小便不利

茵陳

猪苓去皮

白朮

赤茯苓去皮

澤瀉各二

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服一方有桂心

葛根湯 治酒痘

乾葛三兩

梔子仁

枳實去蕊

豆豉二錢上各

甘草一兩

右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服

當歸白朮湯 治酒疸發黃心腎堅蒲不進飲食小便黃赤其

脉弦濶

當歸

黃芩

茵陳

甘草

炙各一兩

白朮

二兩

半夏

湯泡

杏仁

去皮尖

枳實

炒炒

前胡

一兩

桔梗

二兩

右作一服水二鐘生薑三片煎至一鐘食後服

白朮湯 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心中如啖蒜薹
狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白朮

桂心

各二錢

豆豉

枳實

炒炒

乾葛

杏仁

甘草

炙各一錢

右作一服水二鐘煎至一鐘食前服

秦艽飲子 治五疸

口淡因乾發熱微寒

秦艽去蘿

當歸

去蘿酒浸

芍藥

白朮

宮桂去皮

茯苓

去皮生

陳皮

熟地黃

酒蒸

小草，

川芎

半夏

湯泡

甘草

炙各一

右作一服水二鐘生姜五片煎至一鐘不拘時服

山茵陳散

治痘證發熱大小便秘澁

山茵陳

梔子

各二

赤茯苓

枳實

各一半

葶藶

甘草

絡一

右作一服水二鐘生姜三片煎至一鐘食前服

加味四君子湯

治色痘

人參

白朮

白茯苓

白芍藥

黃芪

白扁豆

炒各二

甘草

絡一

右作一服水二鐘生姜五片紅棗二枚煎一鐘不拘時服

一清飲

治痘證發熱諸熱通用

茈胡三钱

赤茯苓去皮

桑白皮

川芎一钱

甘草炙一钱

右作一服水二钱

生姜三片

紅棗一枚

煎一錢

食前服

茵陳湯

治時行疫熱

在裏發熱

蒸不散

通身發黃

茵陳

三钱

大黃四钱

施子仁二钱

右作一服水二錢

煎至一錢

不拘時服

金黃丸

治酒積食積

諸積面黃疽積硬塊

荆三錢

牽牛一錢

巴豆半錢

研成末

蒸米粉

香附子

各半錢

澤瀉一钱

右為細末用施子仁湯和丸如菜豆大每服三丸至五丸
食遠用白湯送下

較疽丸

專治較疽

苦參三兩

龍膽草一兩

牛膽原片

右為細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如梧桐子大每服五

十九空心熱水或生薑甘草煎湯送下

滑石散 治女勞疸

滑石半

兩

白礬

一兩

右為細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水為度

黃連散 治黃疸大小便秘澁臟腑壅熱

黃連

川大黃

各二兩用
醋酒拌炒

黃芩

甘草

炙各一
兩

右為極細末每服二錢食後用溫水調服日三

必效散 治黃疸通用

牽牛

隔紙
一兩

龍膽草

山梔子

茵陳

黃芩

一
兩

右作一服水二鐘煎至一鐘不拘服

嘴瘻瓜蒂散

治黃痘遍身如金色累効

瓜蒂

二錢

母丁香

一錢

黍米

四十

赤小豆

半錢

右爲細末每夜吹兩鼻孔內噙入便眠明日取下黃水次

服黃連散

桂枝加黃芪湯

治黃汗身腫汗出出已輒輕久久必身潤冒

中痛腰已下無汗其腰強痛如有物在皮中刺者不能飲

食煩燥小便不利

桂枝

二錢

芍藥

三錢

甘草

一錢

黃芪

三錢

右作一服水二鐘生薑五片紅棗三枚煎至一鐘食遠服

仍飲熱粥以助藥力

桔子丸

治時行病惡黃久癰瘍發癰

桔子仁

苦棟

芒硝

大黃

蒸巴上
一兩

杏仁

去皮

七錢

豆豉

豆豉

四錢

軟龍甲

豬黃

常山

半兩

上各

巴豆一錢

右為細末佛焰為丸如梧桐子大每服三丸食遠用米飲送下吐利是効未効加一丸

茵陳散 治黃疸食已即飢身體面目瓜甲牙齒及小便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風濕所搏熱氣脣蒸而成

茵陳

木通

大黃炒

梔子仁

巴豆一兩各

石膏二兩

桔梗一箇

甘草炙半

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片薄白一莖同煎至八分去滓不拘時溫服大小便祕枳實赤茯苓草莖又解傷寒瘀血不解晝發於表發為黃疸其脉浮緊當以汗解獨煎好麻黃湯飲之

黃芪湯 治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪

去蘆
蜜炙

赤芍藥

茜草萬駒

二石膏

四兩

麥門冬

去心
三分

淡駁酒

甘草半兩

右㕮咀每服四錢用水一盞生姜五片煎七分去滓食前
服一方入竹葉十四片不用姜一方無甘草

黃芪苦酒湯 治黃汗身體腫發熱汗出而不渴狀如風水汗
出沾衣色黃如糞汗脉自沉此由汗出入水中浴水入汗
孔中從外而得之

黃芪

剉五
兩

芍藥

官桂

去粗皮
三分

右剉如麻豆大每服五錢匕用苦酒一盞半同煎取七分
去滓不拘時溫服服之當心煩苦酒助故也一方用苦酒
三合水一盞半同煎服

犀角散 治急黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑

黃芩

升麻

桔梗

槐子仁

四兩

茵陳

朴硝

酒二

右咬咀每服四錢水一盞竹葉三七片煎至六分去滓不拘時服

治陰黃汗柴涕嘔黃

右用蓼子搗未平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便中漫少許帛子各書記日色漸退白則瘥不過服五斗而愈

秦艽湯

一名秦艽龍

治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽

去苗土一兩旋覆花

赤茯苓

去皮甘草

劉氏各半兩

右咬咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

瞿麥散

治黃疸小便赤澁心神煩悶

瞿麥

麥門冬

去心

茵陳

黃芩

巴豆各

施子

二兩

大黃

一兩

右㕮咀每服四錢用水一盞煎至六分去滓不拘時服以
小便利為度

太醫院經驗奇効良方卷之三十八

五痺門

附論

素問云痺之安生岐伯對曰周寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為病痺濕氣勝者為著痺其名有五皆由此三氣客於五臟而成遇春得者為筋痺中於肝則筋季夜卧驚恐飲食多而小便數遇夏得者為血痺中於心則血脉不通心下鼓氣暴上逆喘盜乾喜噫遇仲夏得者為肌痺中於脾則四肢怠惰發咳嘔汁遇秋得者為皮痺中於肺則皮無所知煩滿時惟氣奔痛遇冬而得者為骨痺中於腎則骨重不可舉善脹尻以代踵脊以代頭大抵風勝則游走上下無所留止隨其虛邪與血氣相搏聚於關節為弛縱筋脉不收也此名風痺寒勝四肢牽痛關節浮腫為著痺濕氣留而不散汗多四肢酸弱皮膚不仁精神昏塞為著痺風寒濕合而為痺則皮膚

筋痺或肌肉痠痛此為邪中周身搏於血脉積年不止則成癰
疹風瘡按之不痛頭髮脫落為本癰其中又有胞癰腸癰血癰
熱癰者之異名胞癰者小腸膀胱按之內痛而滿水道不化
上為消渴腸癰者三氣乘虛客於大腸其病數飲中氣喘急時
作飧泄小便不通血癰者邪入於陰血之分其狀體常如被微
風所吹骨弱勞瘦汗出卧則不時搖動熱癰者蓋臟腑移熱復
遇風寒濕三氣雜至而客搏經絡留而不行陽遭其陰故癰
瘡然而閼也肌肉熱極体上如鼠走之狀唇口反壞皮膚色變
經曰癰之為病或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕凡有
者寒多也不痛不仁者病久邪深榮衛行滯經絡不通皮膚不
營因而不痛不仁也若陰氣多陽氣少與病相益故寒也若陰
氣少陽氣多病氣勝陽遭陰故熱也至於汗多而濡者其濕甚
也癰而不痛者在骨則重著在脉則血凝在筋則屈不伸在內

痺不仁在皮則寒此五者皆不痛也外有支飲亦令人痺支
飲之病飲之為寒故也治之之法當辨其三氣留不何經部分
或表或裏虛實偏勝推其因詳其證果因三氣為病隨經治之
或不因三氣從他痺而為病者當隨他病而治之又有水痺與
白癰歷節風之證豈可一槩施之在乎醫者誠心究治則庶幾
不差矣

五痺通治方

蠲痺湯 治冷痺手足腰痛沈重及身體煩疼背項拘急

當歸

去蘆根

赤芍藥

黃芪去蘆根

片姜黃

羌活

去上各

作草綫

右作一服用水二鍾生姜五片紅棗一枚煎至一鍾去滓
不拘時服一方加防風二錢

五痺湯 治風寒濕之氣客留肌體手足酸弱麻痺不仁

片姜黃

羌活

白术

防已二分半

甘草錢

右作一服用水二鐘生姜七片煎至一鐘病在上食後服
病在下食前服

羌活湯

治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活

二分半去蘆

當歸

去皮去根

附子

防風

去蘆骨碎補

木香

桃仁

去皮尖刺炒

牛膝

去蘆頭

川芎

桂心

巴豆各一分

甘草

右作一服

用水二鐘生姜五片煎至一鐘不拘時服

防風湯

治血癆皮膚不仁

防風

二分半

赤芍藥

去皮

川獨活

桂心

去皮

秦艽

去芦

赤芍藥

去皮

杏仁

去皮尖

黃芩

甘草錢

一社川當歸去蘆半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服一方
有葛根麻黃無獨活赤芍藥

附散 治五癆身痛

臂間發作不定者

川芎

附子

皮酒去

黃芪

去蘿

白朮

當歸

茈胡

去蘿

防風

去蘿

熟地黃

桂心

甘草

錢一

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾空心服
鵝頭湯 治墮胎風痛不可屈伸

鵝頭

五隻剉碎以鹽水盞取一盞去鵝頭

麻黃

去節

黃芪

芍藥

甘草

錢各二

右作一服用水二鍾煎至一鍾去滓入前蜜再煎一二沸
不拘時溫服

附子八物湯 治白虎歷節身痛如鍼不可忍

附子

炮附子

生

乾薑

炮

熟

芍藥

一錢

葛根

一錢

半白木

二錢

灰芩

去皮

桂心

去皮

人參

去皮

甘草

炙各

錢

右作一服用水二鐘煎至一鐘食前服一方去桂用熟地

黃二錢

茯苓湯 治停畜支飲手足麻痺多瘡眩冒

半夏

湯先

七

赤茯苓

去皮

陳皮

各一兩

枳實

去皮

狗

肉

右此

咀

每服

四錢水

一盞半

姜

七片煎

七分去粗溫那不

狗時

桔梗

去皮

甘草

炙各

半兩

狗

咀四錢水

一盞半

姜七片煎

七分去粗溫那不

三瓣湯

治血氣虛滿手足拘挛風癱等疾背癱

川續斷

杜仲

去皮

熟地

各一錢

當歸

防風

桂心

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

各一錢

川牛膝

細辛

各一錢

川芎

活血

半

黃耆

各一錢

川牛膝

細辛

各一錢

甘草各一

秦艽

生地黃

川芎

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓
不拘時服

舒筋散 治臂痛腰下疼痛

當歸

海桐皮

白朮已上各
三錢

羌活

甘草炙各一錢

官桂

右作一服用水二鍾煎至一鍾腰上疾食後服腰下疾食
前服一方如防也名增味五藥湯

茯苓川芎湯 治著脾流注不去四肢麻痺浮腫

赤茯苓

桑白皮

防風

官桂

川芎

麻黃

芍藥

當歸

甘草炙已上各等分

右作一服用水二鍾紅棗一枚煎一鍾空心服欲汗

紫薑粥投之汗出為度

虎骨散

治白虎風肢節寒痛發則不可忍

虎骨

酒浸去皮
二兩

全蝎

去毒

甘草

炙各半兩

麝香

一分另研

桂心

火燒
不見

乳香

另研

天麻

已上各一兩

白花蛇

攻肉二兩淨浸

續斷丸

右為細末每服三錢不拘時用豆淋酒調服

川續斷

治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川芎

去皮
七錢半

防風

治風

天麻

已上各一兩

乳香

沒藥

各半兩

川續斷

當歸

炒

草薢

附子

酒或末飲送下

蠲痛丸

治諸風疊筋疼有腫滿

川烏

生一錢
生屑

全蝎

去毒二七錢

麝香

另研半錢

黑豆

生七十粒

地龍半兩

右為細末酒糊為丸如葵豆大每服十五丸至二十丸臨
睡用冷冷水送下微汗不妨

升麻湯 治熱痺肌肉熱極体上如鼠走唇口反縱筋脉攀急

諸風皆治

升麻二兩

桔梗去皮

犀角燒

羚羊角燒

人參

防風

羌活一錢

各官桂一錢

右作一服用水二鐘生薑三片煎至一鐘去滓入竹瀝少
許不拘時服

五積散 治寒證麻痺

方見寒門

薏苡仁湯 治手足流注寒痛麻痺不仁難以屈伸

薏苡仁

當歸

芍藥

肉桂去皮

麻黃

甘草

芍藥一錢

白朮一兩

桂皮四兩

去粗皮米炒黃

右㕮咀每服五錢水二盞生姜五片煎至七分去滓食前溫服若病人汗出者去麻黃若病人有熱者去內桂虛實加減服之

尋痛舒筋丸

兩頭尖

五靈脂

芍藥半錢

甘草烏

乳香

沒藥

三錢

右為細末搗生葱汁和丸如梧桐子大每服三五丸臨睡時用溫酒送下益陽亦可忌熱物

人參補氣湯

治兩手指麻木

人參

生甘草

芍藥半錢

甘草

升麻

葛根二錢

黃芪八錢

白芍藥

三錢

荳蔻半錢

五味子

一百四

右㕮咀分作四貼每貼用水二鐘煎至一鐘不拘時服

羌活散

治風痺手腳不仁

羌活

漢防已

防風

酸棗仁

道人頭

川芎

一兩

附子

炮去皮鹽

麻黃

去根

天麻

一兩半

黃松節

薏苡仁

一錢酒

荆芥

一握

右為細末每服二錢不拘時用溫酒調服

循絡丸

治風痺氣滯血脉凝滯筋脉拘難四肢節腰膝強痛行步艱難

沒藥別研

乳香別研

虎骨

酥炙

敗龜板

酥炙

五靈脂

當歸

一兩

各白附子

炮

天麻

酒浸

全蝎

沙參

附子

炮去皮鹽

川烏

炮去皮尖

杜仲

皮炒去粗

地龍

去土

牛膝

一兩

烏蛇

酒浸去皮骨肉

內旋參

酒浸硃砂

別研

續斷

一兩

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前用

溫酒送下

巴戟天湯 治冷痺脚膝疼痛行履艱難

巴戟天

去心三兩附子皮各一

五加皮

兩各一

牛膝

酒浸一

石斛

去根

甘草

炙

草薢

上各兩半

白茯苓

去皮一

防風

去叉三分

右剉如麻豆大每服五錢生姜三片水一盞半煎至一盞去滓空心溫服一方無生姜

松節散

治風寒冷濕搏於筋骨使筋挛掣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛悉皆治之

茯神心木

剉一兩研末

乳香

研末

右入銀石器內炒留兩分性為末每服二錢木瓜酒調下

石斛萬病散

治風濕寒腰脚不遂

石斛

防風

細辛

甘菊花

蜀椒

乾薑

人參

雲母石

附子

杜仲

牛膝

菟絲子酒浸

白术

薯蕷

天雄炮

熟地黃

續斷

巴戟

遠志去心

肉蓯蓉

茯苓

菖蒲

草薢

蛇床子

桂心

山茱萸

酸一五味子半兩

半兩

黃芪酒 治風濕痺身體頑麻皮膚癱瘓筋脈痙急言語蹇澁
手足不遂時覺不仁

方見風門

乳香宣經丸 治風寒濕痺四肢拘繃筋骨疼痛行步艱難脚
氣諸疾並皆治之

乳香

刷研

附子

炮去皮膚

木香

以上各八錢

五靈脂

一兩

黑豆

生船三合

草烏

桂枝

附子

川線子

細狗肉

茴香

附子二兩

防風

去叉

陳皮

去白

黑牽牛

生用

威靈仙

龍骨

烏桑

葉辦四兩

各

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸漸加至五十九丸空心用溫酒送下

透骨通氣歸馬丹

治風寒濕痹四肢拘挛筋骨疼痛行步艱難並宜服之

黃木香

二子草

鴟

三錢

川烏

附頭尖

穿山甲

虎骨

附子

細辛

五靈脂

乳香

沒藥

半兩

各

當歸

赤芍藥

附子

一錢

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三五丸加至十五丸空心用溫酒一盞送下

烏頭粥

治風寒濕痺麻木不仁

川烏頭

生研末

右每用香熟白米半挽入藥末四錢同米以慢火熬熱作
稀薄粥不可稠下生薑汁一茶腳許白蜜三大匙攏匀空
心溫服之為佳如是中濕更入惹苡仁末二錢增米作一
中挽煮服此粥大治手足四肢不隨及重痛不能舉者有
此證者預服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也肝
主四肢風邪客於肝則淫脾脾為肝魁故疾在末較氣引
風溫之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有功予常制
此方以授人服者良驗

蕩痛丸

治風寒濕痹筋骨重疼走注攻刺腰脚無力

草烏

四兩去皮尖

南星

生用

地龍

去土

破故紙

炒

五靈脂

白膠香

蜜開淨石上各

切巴豆二兩

沒藥一兩

乳香別研

京墨

牛角各半兩

右為細末醋者糊為丸如梧桐子大每服十九用溫酒送
下漸加丸數服之

木瓜虎骨丸 治風寒濕客於榮衛合而成痺脚重不仁疼痛
少力足下癱痛不能踏地腰膝筋變不能屈伸又項背拘
急手臂無力耳內蟬鳴頭旋目眩及諸脚氣行步艱難並
宜服之

方見濕門

烏頭湯 治風寒濕脾留於筋脉拘掣不能轉側亦治脚氣

川烏

細辛

川椒

白芍藥

附子

秦艽

官桂

甘草

上各分

防風

乾薑

當歸

白芍藥

上各分

獨活一兩

半兩三

右㕮咀每服二錢水一盞半棗二枚同煎至八分去滓空心服若熱毒多服亦佳凡中風用續命排風風引竹瀝諸湯及神精丹茵等酒之類更加以炙無不愈者然此疾積習之久非一日所能攻背大劑久而取効唐書載王太后中風喑默不語醫者蒸黃芪數斛以薰之得瘥皆此類也今人服三五盞求効責醫也亦速矣孟子曰七年之病求三年之艾久而後知爾

治腰脚不隨方

右取死腰脊骨一具細剉訖更以斧於石上搥碎又取前兩腳全者如前細搥之兩件並於鐵床上以大炭火勿冬翻轉候待脂出甚則投濃羨無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空心隨飲性多則多飲少則少飲未經前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年

以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥忌如藥酒一方
以虎胫骨六七寸淨刮去肉膜等盜酥炙令極黃熟細搗
以絹袋盛用酒一斗置袋子於磁瓶中然後以糠火微煎
審七日後任情飲之當微利便瘥

防風丸 治熱痺

防風去叉

羌活去蘿

僉神去木

五加皮

枳殼燒炭

牛膝酒浸

桂心去皮

麥門冬去心

人參

玄參

黃芩仁

生地黃培

芍藥

丹參已上各

楨榔二兩

磁石火煅

大黃剉炒

松子仁

木香半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸漸加至四
十九空心用溫酒送下

石補散 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口及壞皮膚色變

兼治諸風

石楠葉

附奏
已上各

山芋

附制
已上各

萎蕤

附制
已上各

天雄

附炮
去核
已上各

升麻

附炮
已上各

黃芪

附炮
另研
一兩

桃花

生用
未開者

菊花

未開者
少

甘草

附炮
本二分

石膏

附炮
青米一兩同研
一兩

珍珠

別研
一分

山茱萸

去核
一兩半

丹砂

附炮
一兩

桂枝

附炮
一兩同研
桂細石

右為細末入別研藥更研令勻每服一錢漸加至二錢空

心用溫酒調服

人參散

治肝脾氣逆胃膈引痛眠卧多弊筋脉擗急此藥鎮

肝去邪

人參

附炮
二兩

杜仲

附炮
去粗妙

黃芪

附炮
蜜炙

酸棗仁

微炒
一錢

茯神

去木各
一兩

五味子

附炮
去核

細辛

去苗
一錢

熟地黃

秦艽

去土
一兩

羌活

去蘿
一兩

丹砂

細研
一錢

芎藭

附炮
已上各
一兩

右為細末入丹砂再研令勻每服一錢不拘時用溫酒調

下日三服

補肝湯 治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆拘心腹

痛目不明

烏頭

四枚炮去皮脂

附子

二枚炮去皮脂

山茱萸

去核二枚

官桂

去粗皮三分

薏苡仁

去皮一两

甘草

炙一两

獨活

已上各半两

白蒺藜

去皮一两二钱

柏子仁

另研一两

防風

去叉一两

細辛

已上各二两

右剉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢水一盞半大棗二枚去核同煎至八分去滓不拘時溫服

萆薢丸

治肝腎緩筋脉去邪毒調榮衛

萆薢

一斤

羌活

去蘿一斤

天麻

酒浸一两

川芎

一两

附子

炮去皮一两

乳香

別研一分

沒藥

別研一分

右為細末入乳香沒藥同研勻練蜜為丸如彈子大每服

一丸空心用溫酒化下日再服

犀角散 治心癰精神恍惚恐畏悶亂不得睡卧志氣不定語
言錯謬

犀角骨

牛黃別研

麝香別研

羚羊角骨

白鮮皮

茯神去木

沙參去蘿

天竺黃別研

防風

天麻

獨活

人參

升麻

桔齒

遠志去心

甘草炙已上
錢一錢

麥門冬

去心

丹砂半兩

別研各

龍腦別研

半分

右為細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用麥
門冬湯調下

茯神湯

治心癰神思昏塞四肢不利胃中煩悶時復恐怖

茯神

去木

羌活去蘿

麻黃去根

別研

麥門冬去心

龍齒

已上各

遠志去心

犀角骨

薏苡仁

人參去蘿

苦菊子

防風三錢

各赤芍桑

甘草半錢

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑五片同煎至七分去滓不拘時溫服。

枳實散 治心痺晝夜氣急心微痛氣短促欬唾亦痛不能

飲食

枳實炒

桂心

細辛

桔梗

上各三分

青皮

去白一兩

右㕮咀每服三錢水一中盡生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服。

黃芪丸 治脾腫肌肉消瘦心腹脹滿水穀不化食即欲嘔飲食無味四肢怠墮或時自利

黃芪

剉

石斛

去根

附子

炮去皮

內旋朶

酒浸切焙

益智

夫皮

白术

人參

巴戟各

厚朴

去皮姜蜜炙

桂心巴上各

當歸

白豆蔻去殼

枳實炒

沉香剉

良薑巴上各

調梨勒深法生

吳茱萸湯泡

丁香巴上各

巴附

右為細末，煮棗肉和鴆五百粒丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前用溫酒送下。

溫中法：翹丸 治脾痺發軟嘔汁

法翹炒

枳實炒

白茯苓

吳茱萸湯浸炒

桂心

厚朴法皮薑

當歸切培

甘草

炙巴上各

麥蘖微炒

細辛去苗

乾薑炮

麥門冬去心

附子炮去皮附

桔梗炒

人參

巴上各

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前用熱水送下，日三服。

當歸湯 治肺痺上氣閉塞，胷中脇下支痛，乍作乍止，不得飲

食鹽乾口燥手足冷痛

當歸切焙

防風去叉

黃芪

已上各二兩

杏仁

去皮尖炒五十粒

黃芩

去蕊

細辛去苗

麻黃

去根節水黃二三兩

桂心

去蕊去苗水掠去沫蜜熬

人參

已上各一兩

桂心三兩

芷胡

去蕊入兩

半夏

湯泡去沫五兩

右㕮咀每服四錢水一盞入生薑七片棗二枚煎至七分
去滓不拘時溫服日三夜二

五味子湯治肺痺上氣發欬

五味子

三兩去根

麻黃

去根

細辛

去苗七克

紫苑

去苗

黃芩去蕊

甘草

各二兩

當歸

焙八兩

桂心

已上各一兩

紫蘇子

炒八兩洗七半夏

人參

右㕮咀每服四錢水一盞入生薑五片同煎至六分去滓
不拘時溫服上氣病亦單煮紫蘇子及生紫蘇葉冬月煮
乾枝莖葉服

紫蘇子湯 治肺痺骨心滿塞 上氣不下

紫蘇子

半夏

陳皮

甘草

桂心

上各

兩

兩

兩

各

人參

白术

甘草

桂心

上各

兩

兩

兩

兩

兩

各

右㕮咀每服四錢水一盞入生姜五片棗二枚煎至七分去滓不拘時溫服

白附子丸

治腎臟中風脚膝麻痺腰背強直夜痛言語不利

面紅瘦黑肌體羸瘦

白附子

炮

乾蠟

蜜

防風

去叉

肉桂

荳蔻

沉鬚

橘皮

橘皮

橘皮

橘皮

橘皮

橘皮

橘皮

海桐皮

獨活

大蘆

天麻

仙靈脾

補骨脂

當歸

丹參

草薢

天雄

炮去

皮膚

黃芪

三錢

各

安息香

白花蛇

酒浸去

皮骨炙

牛膝

酒浸

皮膚

桂心

一錢

各

雄黃

研末

麝香

半錢

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十

丸空心用溫酒送下日再服

牛膝酒

治腎氣虛冷後感寒濕為痺

牛膝

秦艽

去苗

川芎

白茯苓

去皮

防風

官桂

去皮

獨活

丹參

去根二兩

五加皮

五兩

薏苡仁

一兩

火麻仁

炒半兩

麥門冬

去心

石斛

去根

杜仲

去皮炒

附子

炮皮去

地骨皮

乾姜

炮上各半

右剉如麻豆大以生綿袋盛用酒一斗浸春夏三月秋冬
五日每服半盞空心溫服日再一方無附子用側子

膏筋丸

治筋骨不能屈伸

海桐皮

沒藥

血竭

木香

巴豆各二錢

肉桂

牛膝

虎骨

防風

木瓜

天麻

巴豆各一錢

乳香

三錢

甜瓜仁

半兩

沉香

橘實子一格半

自然銅

常歸

錢各一

右為細末，煉蜜為丸，如彈子大。每服一丸，細嚼用溫酒送下。忌熱物未服藥先飲酒半盞後服藥。

五加皮酒

治筋痺多愁思，顏色蒼白四肢不營。諸筋拘攣伸

動縮急腹中轉痛

五加皮

枳刺身

豬椒根皮

丹參

八味各一

川芎

乾姜

五味各一

白鮮皮

恭椒

首烏各一

木通

天雄

炮附子去皮

甘草

炙上各四兩

薏苡仁

八兩

火麻仁

三升官桂

去皮

當歸

切焙各三兩

右剉如麻丘大，以夾織袋盛，用清酒三斗浸之。春夏三四宿，秋冬六七宿，初溫服二三合，稍加之以知為度。

羚羊角湯

治筋痺肢節疼痛

羚羊角

薄桂

附子

獨活

配三味各一

半

白芍藥

防風

川芎一兩各

右剉碎每服三大錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓

溫服日一二服

導痔湯 治肺痔血道壅塞

半夏

湯洗
培

官桂

去皮各五兩

黃芩四兩

白茯苓去皮一兩

當歸

功培

遠志去心

龍齒

人參

甘草

炙已上各三兩

茯神去木

枳實炒沙

桔梗炒

各二兩

右㕮咀每服先以水二盞煮粳米半合米熟去米入藥五錢生姜五片棗二枚煎數沸去滓取一盞不拘時溫服

人參丸 治肺痔逆行血脈

人參

麥門冬

各三錢

茯神去木

赤石脂

龍齒

石菖蒲

各二錢

遠志去心

黃芪一兩

熟地黃

二兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食後良久以清粥飲送下

天麻丸 治肌肉痺痺肢體怠墮緩弱惡風頭疼舌本強言語

寒濕

天麻

官桂去粗皮

附子炮去皮

麻黃去節

白芍酒浸去皮骨酥炒

牛膝酒浸去苗酒

當歸切焙

白术

烏蛇酒浸去皮骨酥炒令黃已上各一兩

細辛去苗

當歸切焙

茯神去木

羚羊角線

薏苡仁

白僵蠶炒

全蠍去毒

芎藭上各三錢

防風去叉

人參分各三分

丹砂半兩

牛黃別研

麝香別研

龍腦別研各一分

右為細末入別研藥更研勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服十九加至十五丸不拘特用溫酒送下

羌活湯 治皮膚皮如蟲行腹脇脹痛太陽不利語聲不出

羌活去蘆

沙參

蒺藜子

羚羊角

炒去

細辛去苗

白术

五加皮

生地黃

焙去毛

枳殼炒

官桂去粗

五味子

石菖蒲

去皮

附子炮去

麻黃箭根

赤茯苓去皮

杏仁

湯浸去皮炒

丹參

草薢

郁李仁

湯浸去皮炒

木通

檳榔各半

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分
去滓不拘時溫服

蔓荆實丸

治皮痺不仁

蔓荆實去浮皮

三分

枳殼炒

蒺藜子

炒去

白附子炮

桔梗炒

羌活去蘆

防風去叉

上配各半

皂莢

不生者半斤剉碎用新冰浸一宿以熟水

灌入瓶中

許同前成膏和藥

水

膏

和藥

右為細末以皂莢膏和丸如梧桐子大每服二十九食後

用熱水送下

石斛丸 治督虛骨痺肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便滑
數並宜服之

石斛

去根

牛膝

酒浸切焙

續斷

內黃芩

酒浸切焙

防風

去叉

杜仲

皮炙粗

白茯苓

熟地黃

切焙

茴香

炒微炒

補骨脂

華澄茹

山茱萸

去核

沉香

三分上各

巴戟

去心

覆盆子

桑螵蛸多

五味子

川芎半兩各

石龍芮

菟絲子

酒浸別搗

鹿茸

鰐角去毛

官桂

皮去粗

附子

炮去皮

薏苡仁

少

澤瀉

一兩各

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下日二服

附子獨活湯 治腎臟中風寒濕成骨痺腰脊疼痛不得俛仰

兩脚冷痺痺緩弱不遂頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

附子炮去皮附

獨活

當歸力倍

官桂去粗皮

天麻已上各兩

丹參

防風去叉

石菖蒲

枳殼麸炒

白朮

細辛去苗

山茱萸去核

芍藥

甘草

各半兩

草薢

甘菊花

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生姜三片煎至七分去滓不拘時溫服

黃芪酒

一名小黃芪酒治血痺及諸痺甚者四肢不遂風濕寒

瘡瘍體腫滿疼痛不仁兼治風虛癆痺四肢偏枯兩脚軟弱手不能上頭或小腹縮痛脇下掣急心下有伏水脇下有積飲夜夢愁惄不樂恍惚善忘由風虛五臟受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體腫疼飲食惡冷

商齋惡寒會中寒痛心下寒症及治婦人產後餘疾風蜃
積冷不除者

黃芪

獨活

防風

細辛去苗

牛膝

川芎

附子炮去皮臍

甘草炙

蜀椒

此目并合口者炒升已上各三兩

川烏炮去皮

山茱萸去核

秦艽去苗土

葛根北上各二兩

官桂桂皮

當歸切帶各二兩半

大黃生剉一兩

白朮

乾姜炮各一兩半

右剉如麻豆大用文綃囊盛貯以清酒一斗浸之春夏五
日秋冬七日初服一合日二夜一漸增之以知為度虛弱
者加蕤英二兩下利者加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫
石英各二兩心下多水加茯苓入參各二兩桑三兩酒
盡可更以酒二斗重瀆服之不爾可曝淬搗下飾酒服方
寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風

冷神妙少壯人服勿焚燥老弱人微焚之

草薢丸 治血癥手足癱麻不仁遊走無定風癰等證

草薢炒

山芋

牛膝酒浸

山茱萸去核炒

熟地黃培

澤鴻巴

狗脊去毛

地膚子炒

白朮半兩各

乾漆炒令

天雄皮附去毛

車前子炒

麝蠅各三分

茵芋去皮莖

右除麝蠅生研外搗為細末和令勻煉蜜為丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心用溫酒送下日二夜一

吳茱萸散 治腸寒濕內搏腹痛氣急大便飧泄

吳茱萸炮炙

肉豆蔻炒

乾姜炮

甘草炙各半兩

宿砂仁

陳皮炒

白朮一兩各

厚朴去皮生姜附炙

陳皮去白

良姜二兩各

右為細末每服一錢食前用末飲調服

黃芩蕤散 治腸痺風寒濕內攻腹疼瘻泄

草豆蔻

陳皮去白加一兩

官桂去粗皮

白芷莖仁

肉荳蔻

當歸

切焙

木香

白朮

丁香

良姜已上各半兩

右為細末每服一錢食前生姜棗湯調服

巴戟丸

治胞痺脾腹疼痛小水不利

巴戟去心半兩

桑螵蛸

切破

杜仲

去粗皮

肉蓯蓉

酒浸皮切焙

生地黃

培

附子炮去皮

續斷

山芋已上各半兩

遠志去心三分

石斛

去根

鹿茸酥炙

菟絲子

酒浸宿別湯

山茱萸

去核

五味子

龍骨

官桂已上各三分

右為細末入別搗藥研和令勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒送下日再服

腎瀉湯

治胞痺小腹急痛小便赤澀

麥門冬

五加皮

犀角

各一
杜仲去皮加

桔梗炒

赤芍藥

木通

三分
各一
桑螵蛸

右㕮咀每服五錢水一盞半入羊腎一隻去脂膜切細竹
瀝少許同煎至一盞去滓空心頤服日再服一方用桑白

皮無桑螵蛸

利膈散 治胃痺喘息不通

人參

去黃

赤茯苓

前胡

巴上各
兩
乾姜炮

桂心

甘草

炙巴上

陳皮

去白

荊梨勒

去核

白朮

三分

上各

右㕮咀每服五錢用水一大盞生姜三片煎至五分去滓
不拘時頻頻溫服

半夏湯 治胃痺心下堅痞急痛微背短氣煩悶自汗出

半夏湯

洗切

瓜萎實

一枚

薤白

三分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞生姜三片煎至一盞去
滓食前溫服日三服

吳茱萸散 治胃痺咽喉喧塞不能下食

吳茱萸

湯浸焙以半夏

湯炮

赤茯苓

去皮

鼈甲

附炎黃去脂潤

荆三稜

去薑前胡

青皮

去白

厚朴

去皮去粗皮姜片炙

槟榔

白朮

桂心

七兩上等

枳殼

炒熟半兩

右㕮咀每服五錢水一大盞生姜三片棗三枚煎至五分

去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯 治胃痺心下堅痞

白荳蔻

去皮官桂

木香

人參

半兩上各

荆三稜

根

神曲

炒各

陳皮

去白

麥蘖

炒各三分

乾姜

炮

甘草

炙各

右㕮咀每服三錢水二盞生姜三片鹽少許煎至七分去

滓食前溫服

枳實散 治胃痺心下堅痞胃背拘急心腹不利

枳實
炒 赤茯苓

去皮前胡去翫

陳皮

各一配土

木香

半兩

右㕮咀每服五錢用水一大盞生姜三片煎至五分去滓
食前溫服

半夏湯 治胃痺短氣

半夏

湯洗

茈胡

各半

前胡

去苗

赤茯苓

去皮

官桂

去皮

人參

三分上各

甘草

一分

右㕮咀每服五錢水二盞生姜五片棗三枚擘開煎至一
盞去滓不拘時溫服

桔梗薤白白酒湯 治胃痺之病喘息欬唾胃背痛短氣寸脉

沉而遲關脉小緊數者

桔瓣實一錢
薤白切半

右用白酒七升煮取二升去滓溫服肘後方加半夏四兩
洗去滑同煮之

燮丸散 治腎痺心背疼痛氣悶

烏頭 細辛 附子 茉活

蜀椒桂心配川芎各六錢

右搗篩以少醋拌帛裹微火炙令燬以熨背上取瘥乃止

忍生冷如常法

枳實散 治腎痛及痺痛

枳實艾附官桂酒一錢

右為細末每服二錢用溫酒調服橘皮湯調亦可空心日

午臨卧各一服

防風湯 治脚氣痺弱神驗

防風

防已

蜀椒

細辛

桂心

麻黃

石膏

獨活

黃芩

茵芋

葛根

芍藥

芍藥

甘草

生姜

茯苓

鵝頭

二錢

右㕮咀以竹瀝一斗煮取四升分作六服令一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝湯四刻未覺增損作此方後愈得力又云脉沉細馳風在內者作瀝湯也一方無竹瀝赤小豆每服三錢水一升盡生姜三片煎至七分去滓不拘時溫服

擒虎丹 治風寒濕走注脚癰腰膝重痛

五靈脂

荆芥

川烏

當歸

白膠香

自然銅

火煅研末二兩

每服七次

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九用熱酒送下食後服日進二服

羌活散 治腰脚冷痺及諸風麻木不仁骨髓疼痛不欲飲食

漸加瘦削

羌活 五加皮 酸棗仁 桂心 三上各半兩

防風 去叉 當歸 炒

赤芍藥

丹參 半兩上各半兩

茵芋 二分

牛膝 去苗

附子 炮去皮臍

漏蘆 一兩上各半兩

石咬咀每服三錢水一大盞生姜三片同煎至六分去滓

食前溫服

草薢丸 治腰脚冷痺沉重無力

草薢 一兩 熟地黃 一錢 白芍藥 三上各半兩

牛膝 二兩 五加皮

桂心

酸棗仁 炒

羌活 半兩上各一兩炮 附子 去皮炮

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

薰蒸方

治腎氣衰弱脾腎肝三經受風寒濕停於腿膝使經絡凝而不行變成脚痺故發疼痛此藥和榮衛通經絡

小板一把

葱三大莖切細

鹽一把

小麥麩約四五升許

酒一盞

醋不拘多少只鹽拌上

石於良器炒令極熱摊臥褥下將所患腿脚就臥薰蒸薄衣被蓋得汗出勻褊約半箇時辰撤去炒麩止就鋪褥中卧待一兩時辰覺汗稍解再用收陽粉撲傅汗孔畢然後出鋪臥中勿見風

通痹散 治腰以下至足風寒濕三者合而成痺兩足至膝冷如冰不能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

獨活

川芎

天麻

當歸

白木絡等

右為細末每服二錢食前用好酒調服

六生散

治週痺身體寒痛腰脚癢痒

生石菖蒲

九節者去毛切焙

生地黃

培

生商陸根

洗淨切焙

生枸杞根

各一斤切焙

生華

去皮切

生烏頭

去皮鹽水浸兩日兩夜

石先焙了各秤分兩復以醇酒一斗五升淹浸一宿濾出
曬乾復內酒中令酒盡再曬乾搗為細末每服半錢以清

酒一盞調下漸加至一錢空心臨卧各一服

天雄丸

治風寒濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者

天雄

炮去皮附子炮去皮附子一兩官桂

去皮炮一兩半

乾姜

炮二兩

防風

去叉三兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用溫

酒送下

桔梗湯

治風寒濕痺留著不去四肢痺麻拘挛浮腫

赤桔梗

去皮桑白皮各二兩

防已

官桂去皮一錢

川芎

芍藥

麻黃去根節先煮

桔梗去沫焙乾

當歸

上各二兩半甘草酸三

右㕮咀每服六錢水二盞棗三枚去核煎至一盞去滓空心臨睡服如欲出汗服藥了以生姜熱粥核之汗出慎外風一方去防已用防風