

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇効良方卷之三十九

脚氣門

附論

夫腳氣者有南北之分孫真人云凡四時之中皆不得久坐久立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆成腳氣考暑月久坐久立濕冷之地者則濕熱之氣蒸入經絡病發必熱而四肢痠疼煩悶若寒月久坐久立濕冷也者則濕冷之氣上入經絡病發則四肢皆冷轉筋世有勸工學之士久坐久立於濕地冷風來入經絡不覺成病也內經曰當風取涼醉以入房能成此疾也東垣云千金外臺總錄所錄皆係南方卑濕霧露所聚之地其民腠理踈陽氣不能外固因而發之則清潔襲虛病起於下此由血氣衰弱受清潔之邪氣與血併行膏肓邪氣盛正氣少故血氣滯滯則膏肓則弱故令脾弱也後人名曰脚氣針經云有道以來有道以去治之矣以艾燙爲佳以導

引溫氣出外及飲醪醴以通經散邪所製之方寒藥少熱藥多
用麻黃川烏薑附之屬內經云濕濁于內以苦發之麻黃苦溫
發散者也川烏辛熱走而不能守通行經絡薑附辛甘大熱助
陽退陰亦散清熱之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以
引用藥為主治復審六氣何氣客之治以佐使之藥醫學發明
曰異法方宜論云北方者其地高陵居風寒水列其俗飲滻酪
而肉食凡飲滻酪者以飲多速飲為能經曰因而太飲則氣逆
又云食入於陰行氣為陽乃反陰道是為逆也夫乳酪醇酒者
濕熱之物飲之屬也加以奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不
能煦故下注於足腫積久而成腫滿疼痛此飲食下流之所致
也渴評靈實論曰飲入多而氣少濕居下也况滻酪醇酒之濕
熱甚於飲者也至真要大論云太陰之勝太氣內菀流散於外
足胫附腫飲發於中附腫于下此之謂也故飲入於胃遊溢精

氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎濕流於足脾加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣孫真人云古人少有此疾自永嘉南渡衣冠之人多有之亦此意也東垣云夫脚氣之疾實水濕之所爲也蓋濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也其治法自應不同故諸公詳析而論之羅氏曰古無脚氣之說內經名厥丙湧名緩風後謂之脚氣名雖不同其實一也初得不覺因他病乃始發或奄然大悶經三兩日方覺之先從腳起或緩弱寒痺或行起忽倒或兩脛僵滿或足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或暴食吐逆惡聞食氣或胃痛氣急或偏體痠疼此其候之

不同也其脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕汙而數者起於熱遲而濁者起於寒凡此皆由腎虛而生然婦人亦病脚氣者必因血海虛乘七情遂成斯疾且婦人病此者衆皆因血海虛而得之與男子腎虛相類矣男女用藥固無異但兼以治憂恚之藥無不効也須量人盛衰微加滋補不然則氣血日衰必使年年遇蒸熱而作理之必然陳無擇曰脚氣不專主一氣亦不專在一經故與中風寒暑濕爲異耳兼有所雜生諸病未易分別須尋三陰三陽病所在後察脉虛實爲治發明曰內經論南方者其地下未土弱霧露之所聚也江東嶺南太率如此春夏之交山川蒸蕤風濕毒氣爲甚感之遂成瘴毒脚氣外臺叔要云第一忌嗔嗔則心煩煩則腳氣發又禁大語大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足當風冷水洗足雖夏月常須閉護慎之慎之發明曰第一凡酒及滻物勿使過度過度則損傷脾胃

下注於足經附腫遂成腳氣第一然不可縱嗜慾則腳氣發凡飲食之後宜緩行經云逸者行之又云病在脾忌溫食縮食濕地濡衣褐太受云脚氣之疾自古皆當踈下為疾壅故也然不可太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注為腳氣也又不可不及不及則使氣壅不得消散立方于後詳虛實而用之羌活導滯湯導水丸除濕丹此藥如脚氣在表在氣血之分而踈下隨宜而用之活人書云凡脚氣服補藥及用湯渫洗者皆醫之太禁也楊太史云脚氣是為雜疾當以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而盛者攻惡血而去其重勢經白斂則腫熱破射之也夫前代各人所論其脚氣所感不一有在表而得之有在氣血之分而得之或從風寒暑濕得之或因虛實而得之在乎醫者診視果失而治之

脚氣通治方

卷活導藥湯

治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便溺阻隔

先用北藥導之後用當歸枯痛湯

卷活

獨活

當歸已上各二錢防己一錢半

大黃四錢

枳實錢

右作一服水二錢煎至一錢食前服

神秘左經湯

治風寒暑濕流注足三陽經手足拘挛疼痛行

步艱難

增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛大小便

秘澀或腹痛嘔吐下利兩腿頑麻並皆治之

麻黃去節

乾葛

細辛

厚朴

去粗皮
當歸
桂枝

茯苓去皮

防己

羌活

枳殼

去瘀
桂枝

防風去蘿

麥門冬去心

黃芩已上各一錢

肉桂去皮

荊芥去蘿

半夏另泡

小草

白芷炮

甘草

炙已上各五分

右作一服水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服
自汗加壯歸白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熟甚無汗加
乾葛橘皮前胡腰痛吐利去黃芩加芍藥反炮附子大棗
秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇凡有此病參詳
逐一加減無不愈者

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上微熱赤腫寒熱如
瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

花胡桃蘆

前胡去蘆

枳殼

去殼炒

桔梗去蘆

人參去蘆

茯苓去皮

川芎

炒

甘草

炙七上

鐵蒼木

米泔水浸炒

大黃

二錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服皮膚搔癢
赤疹加鮮退煎服

五積散 治風濕流注兩脚酸疼

方見寒門

預麻散 治風濕脚氣疼痛踈通氣道

擣脚

木瓜錢

香附子

紫蘇絡三

陳皮

甘草絡一

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎至一鍾食前服
大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫痛不
可行大小便秘惡聞食氣喘滿自汗

大黃蒸

細辛去蘆

茯苓

杏仁去皮尖另研

羌活

前胡

黃芩

枳殼去紫川

厚朴炒製

甘草綻各一錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾空心服腹
痛加芍藥端急加桑白皮紫蘇小便秘加澤泻四肢瘡毒
加升麻並各等分

為藥平氣湯 治腳氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦氣
不和喘痛迫促並皆治之

為藥

茯神去皮

白芷

當歸去蘆

白术

五味子

川芎

紫蘇子

人參去黃

乾木瓜

甘草炙

赤芍藥

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

木通散

治脚氣小便不通淋閉脹痛

木通

當歸

施子仁

赤芍藥

赤茯苓

甘草生

調各

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

擴榔湯 治一切脚痛

擴榔

香附子去毛

陳皮去白

紫蘇葉

木瓜去皮

五加皮

甘草炙

赤芍藥

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服婦人脚氣
多由血虛加當歸一錢室女脚痛多由血實加芍藥一錢
半如大便秘結虛弱者加枳實壯盛者加大黃

麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽經腰脚痺痺關節重
痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈

麻黃

乾葛

茯苓

荳木

水浸日
火不見

防已

羌活

防風

桂心

火不見

細辛

甘草

炙各一
二分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服
自汗去麻黃加肉桂芍藥重着加白朮陳皮無汗減桂加
杏仁澤瀉等分

半夏左經湯 治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脚疼痛
嘔吐不食

半夏湯泡

乾薑

細辛

麥門冬法山

桂心去皮

白术

桔苓

乾薑毛

防風

貞芩

芷胡

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾空心服

熱渴加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

當歸拈痛湯

治濕熱為病肢節頑疼肩背沉重胃膈不利及遍身疼痛下注足胫腫痛不可忍

方見腰痛門

神鳥丸 治遠年近日乾濕脚氣

川烏

炮去皮研切作片炒令色變

虎胫骨

酥炙海桐皮

川草薢各

一兩各

川牛膝

去蓋酒浸

肉旋蓉

酒浸各一兩半

金毛狗脊

半兩

右為細末用木瓜膏子和丸如梧桐子大每服七十九空

心用溫酒送下

獨活寄生湯 治腎經虛弱坐卧當風著濕所得腰痛若不速治流入脚膝乃為漏枯冷痺緩弱重疼或腰痺疼痛脚重濕庠並宜服之

方見腰痛門

四蒸木瓜丸 治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡治療不痊丸遇六化更變七情不寧必至發動或腫滿或癩痺增寒壯熱嘔吐自汗

黃芪

與黃耆同入各半兩

蒼术

與瀉皮同入

威靈仙

去土與共芋藥同入

烏藥

與木藥同入各半兩

右以大木瓜四箇切去穰入前件藥仍以蓋簪定酒灑蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾為末。張木瓜為膏搜和搗千杵和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下世。

傳木瓜丸最多惟一有効當取之黃松節即茯苓中木

十全丹治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛朴慢不仁煩渴小便或祕或利關節掣疼神効不可盡述

肉旋參

酒浸狗脊茶去

草薢

茯苓去皮

牛膝

遠志去心

地膚子

石斛已上各

熟地黃

酒浸杜仲去皮炒三分

酒盃湯任下

右為細末陳蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前用溫

入味丸治少陰腎經腳氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水寇火之證

方見諸瘧門

神應養真丹治厥陰經為四氣進襲肝臟左癱右瘓延潮督
塞半身不遂手足頑麻語言蹇澁頭旋目眩牙關緊急氣

喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注腳膝榮衛凝
滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墜車落馬打
樸傷損瘀血在內並宜服之

當歸酒浸

天麻

川芎

白芍藥

羌活

熟地黃各等分

右為細末煉蜜和丸如鷄子黃大每服一丸木瓜兔絲子
浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下一方無恙
活有木瓜炒何膠

柴蘇子湯 治腳氣虛弱上攻陰陽交錯清濁不分上實下虛
宁浦喘急嘔吐自汗

紫蘇子

半夏

湯洗

前胡

厚朴

去皮薑
製桂

當歸

甘草

炙已下
錢一錢

桂心

不見

桔梗

錢半
錢半

右作一服水二盞生薑七片紅棗二枚煎至一盞食前服

益甚者加炮附子黃芪各一錢

秘方換腿丸

治腎經虛弱下注脚膝或當

筋脉寒痛不能屈伸脚心隱痛有妨

沉重少力移地大治乾澆腳氣赤腫痛楚發作無時呻吟^{桂枝}怒氣痛喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘微益皆治之

薏苡仁

石楠葉

肉桂

天麻去苗

當歸

附子皮去

羌活

防風去蘆

天南星湯

石斛去根

草薢去

川牛膝酒浸

黃芪

續斷巴上各四兩

檳榔半兩

荅木米泔浸

乾木瓜

四兩

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心用溫酒或木瓜湯送下日二三服常服舒筋輕足永無脚氣之患

木瓜牛膝丸

治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經虛弱

腰膝沉重腿腳腫急筋挛或時疼痛步履艱難大小便不利

日見倦乏

木瓜

川牛膝

去蓋
酒浸

當歸

去尾

石楠藤

烏藥

肉桂

酒浸
乾皮

杏仁

去皮

熟地黃

陳皮

去白

黑牽牛

炒

桑白皮

續斷

去蓋

赤芍藥

各等分

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服三十九空心用木瓜煎湯送下鹽湯亦可末効用羌活木瓜酒浸或加牛膝同浸溫煖一盞許送下

蒼朮散

治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫骨間作熱痛又

腰膝腎脾

大骨疼痛令人痿躄一切脚氣百用百効

蒼朮

用米泔水炒
日夜各一錢

黃蘖

去粗皮
酒浸一錢

右剉碎每服一兩水

一鍾煎至一鍾食前服日進二三服

通骨丹

專治脚氣

川烏

羌活

沉香

乳香另研

川芎

檳榔

木瓜

已上各

木香

半两

白茯苓

去皮
二两

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服六十丸食前用生薑湯送下

活絡丹

治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注筋骨腰

脚沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心

肝

一切痛風走

注並皆治之

川烏

炮去皮
六兩

草烏

去皮

地龍

去上

乳香

另研

峻藥

另研

南星

炮去皮
二錢

右為細末入另研藥和勻酒糊為丸如梧桐子火每服二十丸空心用冷酒送下

五斤九

治筋血不足腰脚緩弱行志艱難

一切寒濕腳氣

波藥

另研

川烏

皮去

鹿骨

酥灸令黃色

山茱

巴上各四兩

天麻

切片

牛膝

酒浸

肉苁蓉

酒浸

木瓜

巴上各五斤

右為細末將木瓜爛蒸研作糊和藥末如不就更用原浸牛膝酒疔糊搜和杵一二千下丸如梧桐子大每服五十丸食前用溫酒或益湯送下

竹瀝湯 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腰脹起如腫按之痛心中惡不欲食

竹瀝

秦艽

葛根

黃芩

麻黃

防已

細辛

桂心

乾薑

防風

升麻

杏仁

去皮尖

茯苓

附子

甘草

各一錢

右作一服水二鐘竹瀝半合煎至一鐘不拘時服取汗為

妙一方無茯苓杏仁有白朮

獨活湯 治腳痺

獨活 二錢 乾薑 銀花一錢半 大豆粒五十 附子皮燒去

當歸

防風

黃芪

葛根

人參

甘草 銀花一錢

右作一服水二鍾半酒半盞煎至一鍾食前服

風引湯 治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行

麻黃

石膏

獨活

茯苓 去皮

乾薑

杏仁

白朮

吳茱萸
一錢上等

附子

桂心

人參

秦艽
去薑

細辛

防風

川芎

防已

甘草

八分上各

右作一服水二盞煎至一鍾不拘時服取汗

木瓜湯 治腳氣

乾木瓜 大腹皮

紫蘇

木香

羌活

甘草炙各二錢

桔梗

陳皮各一錢半

右作一服水二鐘煎半一鐘空心服

四斤九 治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘挛掣痛不已發地銀

辛脚心隱痛及風寒濕痺並皆治之

木瓜去蕊

天麻去蘆

牛膝去根

肉蓯蓉各培一斤

已上四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日

取出搗乾再入

附子

炮去皮骨一兩

巴虎骨一兩

石同為細末用浸藥酒煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心煎木瓜酒益湯任下常服補虛除濕大壯筋骨四斤九 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨如

受風寒濕氣以致脚氣疼痛最宜服之

虎脰骨

酒浸一兩

肉

從蓉

酒浸半兩

乳膏

另研

沒藥

另研

巴豆半錢

川烏

酒浸一兩去皮

牛膝

角浸兩半

天麻

一斤

木瓜

蜜漬土

右為細末入木瓜膏和酒糊杵爛為丸如梧桐子大每服七十丸空心用溫酒或盞湯送下

經効立癱散 治風濕脚氣

僵蠶

酒浸去沙

麻黃

去節各二兩

丁香

一錢

乳膏

另研

沒藥

另研各半兩

右為細末和勻每服三錢用酒一盞溫熱調服取醉蓋覆得汗即愈

不老地仙丹 治腎臟風毒輕腳壯筋

牛膝

酒浸去皮

虎骨

酒炙

當歸

酒浸培

內旋蓉

酒浸培

蒺藜

酒浸去刺

川椒

酒浸去目沙

草薢

鹽水

川芎

上各一兩

赤小豆

木鳖子去油

地龍去上

茴香小

乳香另研

防風

血竭半兩上各

杜仲蜜汁炒

沒藥另研

羌活

獨活七錢上各

天南星炮

白附子切

何首烏

黃芪蜜炙各

七錢

瓜陳皮湯送下

導氣飲 治寒濕脚氣腫赤疼痛心腹膨脹頭面手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之

羌活

獨活

木瓜

薏苡仁

青皮

陳皮

枳殼

桑白皮

紫蘇

擗榔

木通

大腹皮

赤茯苓

大腹子

青木香

甘草

右作一服水二煉煎一鍾食前服熱加大黃寒加蒼朮

洗藥外應散

治脚氣

羌活

獨活

檜葉

石楠葉

藿香

藁本

大蓼

紫荆皮

杉木

白芷

荆芥

紫蘇葉

苦參

一兩上各花椒半兩

右用水一斗葱一株煎至七分置盆內令病者以足用厚
衣蓋覆薰蒸痛處候溫熱可下手令他人淋洗

脚氣止痛方

右用草麻子七粒去殼碾爛如泥同蘇合香丸和勻成膏
敷貼脚心其痛即止

搜風丸 治脚氣

大黃

搘榔

枳殼

半兩上各

黑牽牛

生取頭末二錢

右為細末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飯湯下

木香行氣散 治脚氣風氣走注風寒濕氣及腳生黃泡瘡形

如濕瘡此藥止痛去濕除風行氣

木香

半錢
二錢

黃芪

木通

桑白皮

白术

半兩
上各

黑牽牛

半兩
一兩

右為細末每服二錢更初酒調服作丸子服亦可

黑虎丹

治脚氣筋骨軟弱步履不隨

五加皮

肉桂

白术

羌活

半兩
上各

熟地黃

附子

烏藥

檳榔

半兩
上各

白茯苓

川烏

黃芪

桂沖

半兩
去

赤芍藥

牛膝

白蒺藜

虎胫骨

半兩
取多

當歸

半錢
上各

蒼术

半兩
上各

黑豆

半升
上各

右為細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心

用鹽酒送下

從蓼牛膝丸 治脚氣

肉從蓼

諸州牛膝

天麻

白者

乾

天

麻

頭者

洗

木瓜

五夏三秋七冬十日

各剉碎

用酒三升入

瓶內密封春

枸杞子

洗淨

黃芪

洗淨

蜜炙

虎骨

炙黃

酒浸

青蘚

另研

配巴

上

右為細末和勻以前浸藥酒煮麪糊和丸如梧桐子大倍
乾每服三五十丸食前溫酒白湯任下

枳實大黃湯

醫學發明云昔有人體充肥腳氣始發頭面浮腫

身支節微腫皆赤色足胫赤腫痛不可忍不敢扶策手近
皮膚其痛轉甚坐而復卧卧而復起晝夜苦楚難以名狀
乃北土高寒故多飲酒積火傷脾不能運化飲食下流之
疾致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉
除止有右手指微赤腫以三棱針刺手瓜甲端多出黑血
赤腫全去不數日因食濕麪肢體覺痛宜服此藥

枳實半錢

大黃三錢

羌活半錢

當歸身一錢

右㕮咀作一服水一盞半煎至一盞去滓空心溫服利下
兩行痛止

夫脚氣之疾皆水濕之為也麴滋其濕又添肢節煩疼內
經云風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以為主血流不
行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食故
以為臣大黃苦寒以道麴之濕熱治諸血留結取其駿驗
故以為使也

拔囊

治腳氣

僕丁酉歲在臨安約斐女親戚吳寬夫泛湖是時劇暑見
其用火膝上寘一布囊烘足巾其所以答云某舊有脚氣
之疾近得一方用川椒二三斤實於疎布囊中寘火踏上
跣足踏拔囊蓋椒氣性熱辟去寒濕氣言甚有理用之月

餘亦漸見効庚子歲在淳安寃夫經過因問其疾云愈之已久乃極囊之力也不特某用之効傳之數親之皆無恙矣真奇方也壬寅尋來臨安適於賓次中邂逅王成之時為都司見其用火踏亦有一布囊問之豈非極乎云又添破開擴擗并熱艾各三之一且云果是奇妙大抵足膝之病居下屬陰又加寒濕陰益甚矣血氣微冷凝結非至熱不可除今用川椒極性熱復加以火蒸之自然寒濕去矣信乎處方之効也

乳香木瓜丸 專治遠年近日肺氣

乳香另研 血竭另研各等分

右和勻用木瓜一箇竹刀去皮心批取頂蓋將藥末攬勻將繩却用批下頂蓋合續以麪裹之約半指厚於砂鍋內煮熟極爛為度連麪於石臼內杵如泥丸如梧桐子大每

服三十九漸加至四十九空心溫酒木瓜湯任下乾物壓之忌動氣生冷濕膩硬物

甘鼈散

治脚氣

連珠甘遂一兩

木鼈子

去殼一推一堵各用一箇好者

右為細末用獐猪腰子二箇批開以藥末一錢捲勻紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼末飲湯下如左脚患則用左腰子右脚患則用右腰子藥末只須一錢

昆陵有姓馬人鬻酒宿患腎誠風一足發腫如瓠自覆以
米飯下至夜已間下甚如水品者處外脚梢痛止薦過一月尚挂掛而行子舟以赤鳥散塗貼其方愈後十年過昆陵奉其子列拜以謝云向脚疾至今不復作獐年腎
今健步不若矣

神搜方 治脚氣神効

右用木鼈子每箇作兩邊炒畢切碎再炒用火燃燙

畫油為度每一兩用草桂一兩同爲末用熱酒調服以得
醉為度蓋覆得汗即愈一方夢中神授方

木瓜丹

治脚疼重不能遠行久立常服補腎氣調血脉

右用宣州木瓜一箇杜木瓜大者亦可用取去穰隔切去
蓋子用好艾填在木瓜內須滿實却用蓋子覆竹簽之飯
甑蒸爛次下入羌活一兩獨活二兩附子半兩炮同爲末
先搗木瓜今爛次下藥未搗成爲丸如梧桐子大每服三
五十丸食前用溫酒或盃湯送下

馬藥丸

治脚氣徹骨痛不能行履者不過三服見効

草烏

皮不去

白芍藥

威靈仙

北細辛

沒藥

木鼈子

油去殼紙搘去各等分

右爲細末薄糊爲丸如梧桐子大每服七丸至十九丸食後
臨卧木瓜湯下酒下亦可以身上覺麻痺即是効或未効

加至十五丸量虛實不可妄增丸數亦不可於食前服之
有草烏頭在其間最忌服藥後食熱物衝動烏頭之毒則
昏不知人矣

鷄鳴散 治肺氣第一品藥不問男女皆可服如人感風濕流
注脚足痛不可忍用索懸吊叫聲不絕筋脉腫大

擗榔

七枚

陳皮

木瓜各一兩

木瓜

二錢

吳茱萸

二錢

生薑

連皮一兩

桔梗

各半兩

紫蘇葉

三錢

右為粗末分作八服隔宿用水三大碗慢火煎至碗半去
滓再用水二碗煎取一小碗兩次以煎汁相和安頰末頭
次日五更分二三服只是冷服冬月略溫亦得服了用餅
餌壓下如服不盡留次日漸漸與亦可服此藥至天明大
便當下一碗許黑糞水即是原腎家感寒濕毒氣下來也
至早晚前後痛住腹消但即是放遲遲藥物候藥力過此

禁不足宜藥並無所忌

治脚氣風氣諸惡氣

右用鱧魚大者洗去泥開肚以猪末半兩切大蒜三兩顆
內魚腹中縫合并和小豆一升煮之臨熱下蘿蔔三五顆
如指大切葱一握煮熟空腹食之并豆等強飽盡食之至
夜即泄氣無痕三五日更一頓下一切惡氣

川膝前 治肝腎虛爲風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼痛如
錐刀鋸刺不可名狀

牛膝

二兩去皮頭根者叶被燒碎盛袋盛一斗同
蘆薈一斤同去皮尖爲妙不用去皮尖爲妙

右不要銅鐵器及大與日見於水臼搗碎牛膝再以石磨
中磨爲末酒糊和丸如梧桐子大每服四十丸用無灰酒
一病中様木瓜一箇切作片入瓶中煨木瓜爛爲度用此
酒下不拘時然肝氣惡鐵忌則有之不見久日此好等者

妄卷且如烏頭牛膝搽時蓋一向陰乾也

舒筋丸 治寒濕在經絡腰脚腫痛步行艱難

當歸酒洗

赤小豆生用

地龍去土

甜瓜子生用

木瓜去皮

威靈仙去土

白膠香另研骨碎補

去毛

海桐皮去粗皮

烏藥

草烏頭去皮

五靈脂炒

芸薹子酒各分

右件為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸空心用溫酒或盞湯送下日進二服

御寒忘秋丸 治乾濕脚氣

古文鐵

海金砂

虎骨酒炙

肉桂不見火配

班狗

足翼

乳香另研

沒藥另研

硃砂研爲衣上各半錢

右爲細末和勻酒煮糊為丸如棗豆大以硃砂爲衣每服七丸空心用麝香酒下三服見効

茺花散

治濕脚氣及腰腎膀胱宿水并瘀飲不下食

右用茺花陰乾量取一大升但隨虛痛不須按捺搗為散
紗離下之溫清酒和一服令盡通利為度空腹服之須臾
當轉可六七行但宿食不消化等物總渴盡若中間覺飢
虛用少許軟飯及糜粥補之極安穩不似轉藥虛人但覺
腰腳輕快使人蹀躍食味倍佳腳先腫者一宿頓消如橐
中貯物傾却相似又無毒意易將息惟忌葫蘆猪肉三月
內腹虛大都消慎生冷酸滑五辛酒麪及粘食肥膩四五
日外當食復常

桑白皮散

治腳氣上攻坐卧不得咽喉不利四肢煩疼

桑根白皮

赤茯苓

芷胡已上各
一兩

生乾地黃二兩半

天門冬

赤芍藥

貝母一兩

枳殼去穰

柏子

白前

檳榔

百合三錢

甘草酸牛

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

獨活酒

治腰脚筋弱兼頭眩氣滿

獨活

去蘆
石斛

去根
生薑

一
方用
乾薑者亦可

白茯苓

去皮者亦可

白术

三兩
已上各

牛膝

丹參

側子
去皮

草薢

二兩
已上各
薏苡仁

防風
去叉

桂心

皮去粗

當歸

切焙

山茱萸

人參

天維

皮去粗

秦艽

去土

甘菊花

芎藭

已上各

生地黃

四兩
半

黃芩

四兩

右細剉

用繒袋盛內淨磁瓶中以清酒三斗漬之密封春

夏五日秋冬七日取間量情飲之日五六服常令酒力不

絕如冷加蜀漆一兩去目赤合口者少出汗腳弱痛甚者

作散每服三錢酒調下

五獸三匱丹

治因氣血耗損肝腎不足兩腳癱軟

鹿茸

附子

鱗鰭

虎胫骨

鱗片

牛膝

酥油

酒膏

狗脊

等分

脩合

為末

即正藥

丹利也

辰砂

一兩

朱砂

一兩

附子

大者一枝生

去皮破

心空入

狼砂

於內

宣木瓜

一錢

朱砂

一錢

鱗

鱗

內重

湯蒸

十分

附子

白

為度

附子

口正坐於

右用三匱丹研成膏

調前五獸丹

末子

為丸如鷄頭大

以

木瓜酒

或降氣湯

下羹

傳責家多

効患不

再發若無脚氣

只手腳弱而無力

服之尤佳更以分脚氣

之要言之風寒

濕三毒各隨所喜

而入風喜入肝

病多在筋濕喜在脾

多在肉寒喜入腎

病多在骨推類治之

亦思過半矣吁願

為良醫力學者當在乎致知致知當在乎格物

上不格則

知不至若曰則循世俗

衆人耳聞目見謂之知君子謂之

不知也

松葉酒 治腳弱十二風痺不能行服更生散數劑交衆治不得力服此一劑便能行遠不過兩劑

右用松葉六十斤㕮咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發盪飲之取醉得此力者甚衆神妙

立効丹 治腳緩弱及膝弱甚者○紹興府戒珠等一僧病數十年不能行服此藥而愈享老亦傳此方

右以附子用麴裹煨熟去皮臍搗取葱自然叶和凡如梧桐子大每服五六十丸空心葱白煎酒下喫少蒸餅溫粥壓之一方用生附子以葱涎和丸溫酒鹽湯任下十五丸至二十九丸

又方 治久年脚氣或老年膝痺不能行步者可用局方木附湯倍加附子加木香一錢用冰三盞生薑五片木瓜三片

煎取一盞二分去滓送下局方石楠丸五十丸數服立愈

或元氣弱者煎前引子送下靈丹十粒

久患脚氣不曾寧

膝痛筋寒步履疼

木附木香加倍飲

石楠數服有神靈

辰砂丹 治足掌疼

辰砂

鐵稍去青苔二錢

名半

生麝錢半

右研為末用敍皮草烏去皮尖三錢為末一半入藥一半
以米醋調煮熟取起和丸如棗豆大每服五十九空心用
溫酒送下

五加皮丸 治脚氣皮膚不仁發歇不定

五加皮 判

人參 大薑

惡寒 夢

吳茱萸湯洗

官桂去粗皮

檳榔剉巴上各三分

茯苓 去皮

柏子仁別研

芳蕪巴上各兩

杜仲去皮

羌活巴上各兩

郁李仁湯浸安尖研

枳殼去殼炒

厚朴薑汁

牛膝

酒浸切焙已上各一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫

酒送下不飲酒者橘皮湯下

沉香丸

治風毒脚氣上攻臍腑散入四肢虛腫無力

雄黑豆

小者一升

附子

二兩炮去皮鹽

吳茱萸

炮炒

青橘皮

湯浸焙各八兩

生薑

四兩切碎已上五味用葛布袋盛內大綱中以水

一斗黃令水盞

盐乾取袋中黑豆研乾搗羅爲末

巴戟

去心切焙

肉蓯蓉

其餘四味不入後煎白附子炮

巴戟去心

肉蓯蓉

切焙

沉香

已上各二兩

牛膝

剉酒浸焙

獨活

去蘆切焙

羌活

去蘆

山芋

澤瀉

芎藭

生地黃

切焙已上各一兩

右除前四味不用外藥爲細末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒送下近晚再服

沉香大腹丸

散治腳氣腫滿沉重疼痛筋脉不利此證皆由

溫氣鬱滯經絡所致服之宣通經絡使上下無礙血氣和平腿脚輕利為效

沉香

檀榔

烏藥

桑白皮

炒

木通

茴香

甘草

紫蘇子

陳皮

燒焙

白茯苓

荆芥穗

紫蘇葉

巴上各一兩

連皮大腹子

三兩

枳殼

去皮微炒

半兩

乾木瓜

一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞生薑五片蘿蔔五大片同煎至七分去滓食前溫服日進二服十日後日進一服病愈即止如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎代之如煮大便乾燥即服加減神功丸

甘豆湯 治脚腫此乃脚氣

黑豆

一兩

甘草

半兩

右同煎湯服之郭鎮廷主知縣云昔年大李士人園中

多患脚腫至瘦則死前後如此者非一人後即施此方服之皆愈蓋神方也

旋覆花丸

治風毒脚氣壅熱生瘻頭項強痛

赤茯苓去黑

安

旋覆花

微炒蕪莎仁炒

地骨皮

赤茯苓去黑

升麻

一兩上各

白檳榔

五

麥門冬去心

火麻子仁

別研

如泥

前胡

去蘆

防風

去蘆

羌活去蘆

馬牙硝

別研

芍藥

一兩半

枳殼去穰

羚羊角

燙

白蒺藜

炒去角

黑參

三分上各

右為細末八別研藥相和凍蜜為丸如梧桐子大每服二十丸食後用溫漿水送下日二夜一

細辛散

治腳氣發熱心膈痰壅頭痛惡聞食氣宜服之

細辛

於羊角

旋覆花

枳殼去穰

炒

半夏湯泡

防風去蘆

蔓荆子

苦菊

黃芩

甘草

炙巴上各半兩

紫蘇葉

檳榔

巴上各二兩

石膏

二兩

赤茯苓

三分

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不
拘時溫服

立効散

療苦脚氣咬心此方甚散腫氣極驗及治一切暴腫

坎擲

大者七枚

生薑

仁兩

橘皮

一兩

吳茱萸

茶蘇

木爪

巴上各

右切碎以水三升煮取一升三合分再服忌如藥法

沉香湯

治腳氣衝心煩悶氣促腳痠疼

沉香

一兩

赤芍藥

二兩

木通

半兩

紫蘇葉

一兩

檳榔

七錢

吳茱萸

炒一分

右咬咀每服五錢水一盞半八生薑半分切碎煎至八分

去滓不拘時溫服

杉節湯

治脚氣心痛悶脹不能食

乾杉木節

青皮

陳皮

天台烏藥

鷄心檳榔

半夏製

枳殼製

宣木爪

赤茯苓

縮砂半兩上各

茴香微炒

大腹皮

紫蘇子

微炒

蘿蔔子

微炒

桔梗

丁香

甘草

炙上各一分

右剉碎每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓不

拘時溫服

高良薑丸

治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛

高良薑

威靈仙

當帰

檳榔

羌活

上各三分

陳皮

去白

桂心

半兩上各

蘿蔔子

牽牛

散炒各二兩

古爲細末凍蜜和搗

三百杵丸如梧桐子大每服三十

丸不拘時用溫酒送下以利為度

松節湯

治腳氣入腹心腹脹急煩躁腫滿

松節

細黃柏皮

桑根白皮

紫蘇葉

各一兩

檳榔

三分

甘草

炙半兩

右剉碎每腹三錢水一盞八分心二十莖生薑三片童子小便三分同煎至七分去滓食前溫服

吳茱萸湯

許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成腳氣飲

氣即水氣之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗脚溫氣不散亦成腳氣亦有腎氣既虛諸事不節有因居卑溫溫氣上衝亦成腳氣此諸腳氣皆令人脚脰大脚趺腫重悶甚則上衝心腹滿悶短氣中間有乾溫二腳氣溫者脚腫乾者脚不腫漸資枯燥皮膚甲錯須細察之若先資脚脰心腹刺痛胃背滿悶喫食之後此狀彌如時時氣短手

脚沉重骨髓疼多喝氣每食諸粘膩陳敗臭物即諸狀轉
劇此即飲氣下流而成脚氣有此候者自宜依前療飲將
成水氣細辛等八味湯等十五味丸療之若先無
前狀但奄脚腫疼間沉重有緩弱乍衡心腹滿悶小腹下
不仁有時急痛宜依後吳茱萸等五味湯桑根白皮等六
味丸側子等十味酒細細服之

吳茱萸

桂心各二兩

橘皮三兩

生薑五兩

檳榔

大者十枚
合子一枚

右剉碎以水七升煮取二升半去滓分溫三服相去如人
行七八里火一服斂諸狀可飲重合服亦佳服湯後將息
經三四日即服後桑根白皮等六味丸忌生葱

桑根白皮丸

桑根白皮

五兩

生薑

六兩

蜀椒炒出

五味子

桂心

升麻

各四兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大初服十五丸日再服稍
加至三十丸以飲送下覺熟食前服覺冷食後服忌生葱
側子酒至九月以後宜合側子等十味酒服之兼將下丸方

側子

牛膝

續斷

五兩

加白皮

丹參

六兩上各

細辛

桂心

四兩上各

桑根白皮

白术

生薑

八兩上各

右剉碎以綿袋盛用無灰酒五升浸五六日初服一鷄子
黃許日再服稍加之以知爲度必用前數法不覺可宜
依舊脚氣方用之忌猪肉冷水桃李雀肉生菜生葱

茯苓丸 治脚氣心腹脹急不思飲食

赤茯苓

去黑枳殼

人參

三分上各

訶黎勒皮

陳橘皮

去白皮

乾薑

炮

吳茱萸

乾炒

官桂去皮

木香

白术

半两上各

木瓜

半两切

右為細末先將木瓜飯上蒸熟研如膏次入諸藥末和勻
煉蜜為丸如梧桐子大每服三寸丸空心人參茯苓煎湯

送下兼治乾溫霍亂泄瀉轉筋

草豆蔻散

治腳氣發動嘔逆胃中癟悶不欲飲食

草豆蔻

去皮前胡

紫蘇葉

赤茯苓

續擗

木通

巴上各

枳實

炒去殼

半夏

湯泡三分

吳茱萸

岩砂一分湯泡

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓
不拘時服

降氣散

治風毒脚氣吐逆

蓬莪术

兩半蛤粉三分

延胡索

地

陳橘皮

去白一分

右為細末每服一錢用炒黑豆五十粒生薑三片以水一

蓋同煎至七分去滓調藥溫服不拘時候

止癰湯 合脚氣嘔逆泄瀉轉筋

右用宣木瓜細剉每服四錢新水煎服神効

大八風湯

治腳氣上攻心脾語言蹇澁

當歸

切焙

大豆

隔三

烏頭

炮去皮

黃芩

去皮黑

遠志

去心

芍藥

獨活

去蘿

五味子

防風

去蘿

芎藭

麻黃

去根節

乾薑

炮

秦艽

去苗

桂心

去粗皮

石斛

去根

杏仁

去皮尖

人參

白茯苓

去皮

黃芩

紫苑

去上

升麻

甘草

二兩

各

右剉如麻豆每服五錢水一盞酒半盞同煎至八分去滓

不拘時溫服

桂心湯

治風毒脚氣鮮麻不仁語言蹇澁

桂心

去桂皮三分

當歸切焙

麻黃一兩各

防風

去皮一兩各

檳榔

巴豆半兩各

黃芩去黑心

生犀角錢

赤茯苓

去皮一兩各

右剉如麻豆每服三錢水一盞裏二枚煎至七分去滓不
拘時溫服

大腹皮散

治諸證脚氣腫小便不利

大腹皮

三兩木瓜融

巴豆二

紫蘇子炒

荆芥穗

烏藥

檳榔

巴豆一兩各

蘿蔔子炒

紫蘇葉

橘紅

巴豆半兩各

沉香火不見

枳殼去穰炒

桑白皮

巴豆一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫
服予謂有熱者去沉香橘紅加大黃半兩不拘時服

麻仁湯 治腳氣大腸結滯不通

麻子仁

半兩蛤升麻

三兩

豉二兩

大黃炒

射干略

陳皮

去白芍

甘草

分半

右剉碎每服五錢水一盞半生薑

棗大煎至八分去滓

下芒硝末半錢七更煎一二沸空

心溫服

澤瀉散

治脚氣大小便祕淋膀胱氣雅上攻心腹妨悶

澤瀉

赤茯苓

枳殼

三分

去黑

猪苓

皮

木通

懷橘

上各

牽牛

二兩

新炒

右為細末每服二錢用生薑葱白煎湯調下不拘時服日

二三服以利為度

沉香羌活散

治脚氣大小便祕或入腹衝心疼痛腫滿

沉香

羌活

木香

白芍藥

懷榔

三錢

川芎

枳殼

青皮

甘草

二錢

紫蘇葉

紫蘇子

木瓜

二錢

右㕮咀每服四錢水二盞生薑三片煎至八分去滓食前

水

溫服

海蛤散 治脚氣成水腫小便不通喘息

海蛤

澤漆葉

新者防已

木通

百合

巴上各一兩

桑白皮

炒半兩

檳榔

牽牛

郁李仁

去皮大根各半兩

木通

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓日午溫服

猪苓湯 治腳氣成水氣脢氣通身腫滿氣急小便不通坐卧不得者服之

猪苓

赤茯苓

去皮防己

三分

桑根白皮

五兩

郁李仁

去皮澤瀉

木香

巴上各一兩

大腹皮

七錢

右㕮咀每服六錢以水二盞煎至七分去滓食前服當利小便立効日三服

蘇子丸 治腳氣成水腫兼上氣喘急咳嗽大小便苦澀所

服利水藥反利大便惟小便轉澁者

葶苈子

去皮
三兩
別研
如屑

防已

去心各
二兩半

甘草

一兩上各

右為細末入葶苈杏仁拌身以棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心用大棗桑白皮糯米煎飲下如小便水快即加至四十九丸

五加皮散 治江東嶺南春夏不免暑溫蕩蒸臟腑虛弱羸瘦
癰毒攻擊脚氣發動兩脚枯疼或即浮熱腫滿或即皮肉
焦燥不能久立筋急掣痛或氣衝心悶亂脅膈痰逆四肢
不仁腹脹壅悶目眩頭旋並宜服之

五加皮

麻黃

去根節
兩
防風
去蘆

枳殼

去殼
處外
三兩

獨活

丹參

桂心

上各半兩

石膏

三兩

川升麻

赤茯苓

牛膝

去首

防已

羚羊角

黃芩

三分

名薏苡仁

微炒半

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

知母

治療毒脚氣增寒壯熱頭痛腳膝煩寒腹中妨悶不

能飲食則無味口乾多渴

知母

川升麻

赤茯苓

瓜蔞根

黃芩

三分

名木香半兩

茈胡

三分

齧甲

醋炙

檳榔

已上各

兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

漏蘆丸

治腳氣腫盛生瘡久不瘥膿血止流疼痛發歇不常

漏蘆

三分

名

秦艽

三分

川大黃

三分

枳殼

三分

名檳榔

已上各

防風

三分

獨活

黃芩已上各半兩

赤芍藥

黃芪已上各三分

烏蛇

三兩酒浸去皮骨炙微黃

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時溫酒送下

治腳氣風毒壅盛生瘡腫痛不歇

牛蒡子

微炒取殼去少

檳榔

已上各一兩

防風

半兩去薑

獨活

一兩

赤芍藥

玄參

薏苡仁

已上各三分

烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙微黃

右剉碎每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時服

道氣除濕湯

淋渫脚氣內受濕氣不能外達此藥淋渫開導

泄越其邪

歲靈仙

防風

當歸

荆芥穗

地骨皮

升麻

白芍藥

蒴藋葉

右件等分剉細水二斗煮至一斗五升去滓熱薰洗無時
足踏丸 治脚氣腫滿痛連骨髓

烏頭

三兩生
諸物為細末

樟腦

二兩
研

右再研令勻醋為丸如彈子大置藥一丸於鹽子上中
心踏之衣被蓋覆汗出如涎為効

薰洗方

治脚氣

防風

半兩

牽牛子

黃芪

木通

半一兩

荆芥

莽草

各二
兩

右為粗末濃煎湯極滾沸閣腿在桶上薰令通手時即洗
之須是露出脚指不可洗

此鳥鵝藤散

鵝鵝藤

蘇方木

右件各等分㕮咀入定粉少許每用一兩木五錢煎微沸

先薰候通手即洗

沉香散 治脚氣春夏妨發或肝腎風虛脾氣之弱但資昏門
不欲飲食並宜服之

沉香

黃芪

牛膝

白茯苓

白术

三分上各羌活去蘆

防風去蘆

酸棗仁炒

羚羊角屑

人參去薑

桂心

甘草炙半兩

木瓜乾者

附子炮去皮臍

熟地黃

阿膠勑皮

石斛

去根箭已
各一兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六
分去滓不拘時溫服

枳殼散 治腳氣春夏妨發或稍心腹壅悶脚膝煩痺大便不
利小便赤少

枳殼

炒

紫蘇葉

赤茯苓

各三

川大黃

微

赤芍藥

廣柳

五加皮

羚羊角屑

木通

獨活

黃芩

甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓食前溫服

加味香蘇散 治腿腳疾疼足面赤腫步履艱辛

濕氣週遊脚腿疼

香蘇散煎鷄矢藤

木香方藥仍加入

功効如神喚得應

紫蘇散 治風毒腳氣脚重虛腫

紫蘇

桑白皮

茴香炒

木通一錢半

枳殼

羌活

獨活

荆芥

甘草炙

青皮

木瓜

七分半大腹皮二分

右咬咀分作二貼用冰二盞生薑三片葱白一莖煎至八

分去滓食遠服

桑白皮散 治脚氣盛發兩腳浮腫小便赤澁腰脹滿氣急坐卧不得

桑白皮 郁李仁
二錢 赤茯苓
四錢 大腹子

防風 木香
一錢 各紫蘇子炒 木通

檳榔 青皮
一錢半 各甘草
二錢半

右㕮咀分作二貼用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

獨活湯 治脚氣

獨活 麻黃
去節 川芎 熟附子

牛膝 黃芩
蜜炙 人參 生乾薑

木香 茴歸 白芍藥 白茯苓

陳桂 杜仲
薑炒 甘草
等分

右㕮咀每服三錢水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾去

滓食前溫服仍去活血定痛丸

活血定痛丸

治風濕客於腎經

血脉凝滯腰重疼不能轉

側皮膚不仁遍身麻木上功頭目虛浮耳內常鳴下注脚
膝重痛行步無力亦治項背拘急不得舒暢常服活血脉
杜筋骨使氣脈宣流

蒼术

炒兩

香附

炒并淨一兩

陳皮

半兩

沒藥

一兩

狗脊

燬去毛四兩

草烏頭

炮去皮兩

右爲細末稀麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫
酒熱水任下或用前獨活湯下兼治腎受風冷脚氣癰疽
及久痢登側風冷入于腸胃以致兩脚削小成鼓槌風而
病又不正用此藥主之

腫門

水根布云有水脹與膚脹破脹腸覃石瘕五者之分金匱
水有十者其名不同所感各異蓋水之始起也未嘗
不由心腎而作夫心與腎能生肺肺今心腎氣虧不能滋養肺
肺故土不能制水水漸妄行三焦不暢氣脈閉塞樞機不通喘
息奔急水氣盈溢滲漏經絡皮膚溢滿目窠微腫如卧蠶之狀
此其候也其膚脹鼓脹於脹漏別論其詳惟腸覃石瘕二證婦
人有此起自血分之疾各有治法難与水脹病同夫水腫病皆
中於臟腑諸書謂十水者一曰青水根於肝先從面腫漸行周
身二曰赤水根於心先從胸腫而起三曰黃水起於脾腫從腹
腎從四肢而起四曰白水起於肺先從腳腫而喘嗽上氣也五曰黑水起於

水起於胃先自四肢腫而至通身及腹脹滿入曰石水根於膀胱其狀起於脐下面腫獨大者是也九曰裏水起於小腸先小便而漸至腫也十曰氣水起於大腸其狀不疼下去不感乍虛此其候也皆因上下不通閑竅不利氣血居膈陰陽不調而致此也素問云面腫為風足腫為水然此當分陰水陽水少壯者弱而治之若陰水為腫脉來沉伏色多青白不煩渴小便澀而清大便自泄治宜安脾陽水為腫脉來沉數色多赤黃或煩渴小便赤而難去大便多秘治宜陳氣瀉滌凡膏水腫之病先要有其在何部分而得之必當以本經求之而用藥若腰以上腫者治宜癸汗其腰已下腫者當利小便大抵治法強健脾元土壯則能運化運化則血氣充血氣充則陰陽和和則水歸元矣若少壯充實患此脉來浮大有力當導去其水年老虛弱得此補中行溫為先若氣下陷者即當提之蓋脾者養命之本腎者

乃生氣之原也。不可不究。二臟之虛實，慎不可輕用大戟羌活。
甘遂巴豆牽牛之藥，大利其水，暫取其效，水去則脾土愈敗。名
則危殆。若五傷證見，則難治。之肝傷者，則脣黑；脾傷者，則脣凸。
肺傷者，則背平；心傷者，則缺盆；平腎傷，則足心平。此證若一二蹉
見，皆難治。察者，鑒之。

水腫通治方

牽牛水香散 治暑溫傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

草薢

菝葜

肉桂

猪苓

茯苓

肉桂

白朮

澤瀉

木通

二朮

木通

巴豆

甘草

石膏

大戟

右作一服水二鐘，前至一鐘食前服。

大戟皮湯 治溫內攻，心腹脹痛，并水腫小便不利，大便滑泄。

方見溫門。

華林丸

治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甘草

黃芩

木通

杏仁

桂仁

防己

各二

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五十九食前用

桑白皮煎湯送下

白术大青散 治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能卧小便

澀者宜服

白术

桔梗

橫榔

澤泻

各半

石膏三兩

官桂七分

木香

甘草

一兩

陳皮三兩

右作一服水二鐘生薑三片煎至一鐘食前服

水丸

治十種水氣四肢腫滿面目虛浮以手按之少時方

起喘急不得安卧小便赤澀

遠志去心

蕷蕡一寸九
節首

肉荳蔻

厚殼

毫浩去盡

大戟一刃上各
指箒去皮

甜葶苈

沙

白牽牛心

澤瀉半刀

前胡去頭

右鳴絨末

麌糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前用米

湯送下

分氣補心湯

治心氣靜結勞熱四肢浮腫上氣喘急

木通

川芎

前胡去頭

大腹皮

青皮

白朮

枳殼

甘草炙去核一錢

香附

白茯苓

桔梗

半錢細辛

木香

分令五

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服
杏蘇飲 治上氣喘嗽面目浮腫

方見喘門

蘿蔔子飲 治水病浮腫

蘿蔔子 半夏

川芎

青木香

商陸

青皮

草薢

赤茯苓

陳皮

牽牛末

檳榔

甘草

官桂

七分

右作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘食遠服

調榮飲

治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名血分

蓬术

川芎

當歸

延胡索

白芷

檳榔

陳皮

赤芍藥

桑白皮

大腹皮

赤茯苓

芩藶

翟麥

大黃

細辛

官桂

甘草

失五分

右作一服水二鐘生薑三斤紅棗二枚煎至一鐘食前服

神功散 又名算懶散 治十種水氣而目四肢浮腫以手按之隨

手而起痕散喘急不得安卧小便赤澁大便不利

黑牽牛

少承
陳澤各二

猪苓

目各二
半

茅慈

炒香

右作一服水二鐘葱白三根煎至一鐘入酒半盞絕早向
東立脈如人行十里又以漿水葱白煮稀粥候煮爛入酒
五合量人所飲多少須啜一升許自早至午當利小便三
四升或大便微利喘定腫減隔日再服忌鹽麴房土
五皮散 治風濕客邪於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢
腫滿心腹脹脹上氣喘促

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮

格半

右作一服水二鐘煎至一鐘食後服切忌生冷油腻堅硬

之物降竅方去五加皮地骨皮加陳皮桑白皮

當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝養心火心大不能澁養
脾土故土不制水上氣益盛氣脉閉塞遂迷經絡發為浮
腫之證 心腹堅脹喘漏不安

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

楡榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮

三分
水

赤芍藥

牡丹皮

右作一服水二鐘紫蘇五葉木瓜

一片前一鐘不拘時服

實脾散 治陰水外腫用此見實脾土

厚朴

去皮

木瓜

米香

附子

乾薑

草果仁

大腹皮

各半
甘草根一

右作一服水二鐘生薑五片棗一枚煎一鍾一拘時服

寒鑿子飲 治水氣通身肿腫喘呼氣急煩躁多渴大小便

不利服熱藥不得者

卷活去蓋

商陸

澤泻

赤小豆炒

秦艽去蘚

木通

摈榔

大腹皮

茯苓皮

椒目各二分

一

右作一服水二鐘生薑三片煎至一鍾不拘時服
太耆流氣飲 治面目虛浮四肢脛滿喘急水道赤瀉

方見氣門

消腫丸 治水腫喘滿小便不利

滑石

木通

白朮

黑牽牛炒

茯苓

茯神去木

半夏湯泡

通草

陳皮

已上各半

木香分半

二瞿麥

丁香各半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前用燈心麥門冬煎湯送下

榔李仁散

治小便不利浮腫

郁李仁

陳皮

楨柳

茯苓

白术

二錢半各
甘遂一寸

右作一服水二鐘生薑三片紅棗一枚煎至一鐘食遠服

烏鯉魚湯

治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

一箇

赤小豆

桑白皮

白术

陳皮

已上各
三錢半各

葱白五莖

右用水三塊同煮不可入鹽先喫魚後服藥不拘時候

無碍丸

治脾病洪流四肢浮腫

大腹皮

二錢半各
木香半錢

楨榔

郁李仁

蓬术

三錢半各

右為細末用炒麥蘖麩糲糊為丸如梧桐子大每服七八十九食前用生薑湯送下

導帶通經湯

治脾氣有餘氣不宣流面目手足浮腫

利水通便

桑白皮

茯苓

陳皮

去白各半

白朮三錢

木香半錢

霖兩時加澤瀉半錢

右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服

神功丸

舊名草薢丸

治十種水氣面目四肢偏身俱腫

十種水腫病證根源狀方法

一青水先從左邊膀胱起根在肝

大戟

二赤水舌根腫起

一云脚根腫起根在心

葶藶

三黃水腰腹腫起根在脾

甘遂微炒

四白水從腳腫起根在肺

桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎

連翹

六玄水從面腫起根在外腎

芫花

七風水從四肢腫起根在骨

澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱

案本

九蒿水從小腹腫起根在小腸

巴豆去油

十氣水或盛或衰根在腹

赤小豆

右十味用研主藥一兩餘者各半兩研為細末煉蜜為丸
如梧桐子大每服十九丸茯苓湯下一日三服忌益百日外
忌魚蝦發食一切毒房事病痊後便服

鳴頭丸

治瘧熱而目肢節悉腫腹脹喘急二便祕

症

鉢莖藤

根皮備芩

防已各

右為細末取綠鳴頭血和丸如梧桐子大每服七十九食
前白湯送下

三仁丸

治水腫喘急二便不通

郁李仁

去皮杏仁

去皮

薏苡仁各等分

石為細末米糊為丸如梧桐子大每服七十丸不拘時用

米湯遂下

海金砂散

治脾濕太過過身腫滿喘不得卧腹脹如鼓

海金砂

二分

甘遂

半分

黑牽牛

沙

一

半分

牛

取末

刀

右為細末每服二錢食前用倒流水煎湯調服

雄黃木香散

治男子婦人十種水氣取水法

大卿魚

一尾去腸

肚入

大雄黃

三分研

半分

黑牽牛

沙

一

半分

牛

取末

木香

各半

土狗

一隻研

右以大戟同甘遂一半入魚肚內煨令焦取出焙乾同衆

藥研為末每服二三錢冷水調下

半遇散

治諸般水腫

芫花

醋浸

大戟

甘遂

大黃

三分

各上各

土狗

七枚

取會

采狗

五月內

右先以蒸搗爛為餅摊新瓦上却將土狗安葱上焙乾去

翹足膏每箇剪作兩片分左右成對記之。再磨乾為末。欲退左邊腫即以左邊七片為末入前藥調服。右邊依前四味末每服二錢入土狗末和勻用淡竹葉天門冬煎湯調五更服。候左邊退至第四日服右邊如或未動只以大黃三錢煎至一半助至如更不動茶清助之。

雄黃神金散 治十種水腫證候

一從腳腫根在心

蕁薢以潔米同炒去米

二從肚腹腰腫根在腰

椒目

三從陰腫根在腎

澤瀉

四從膝腫根在肝

芫花醋炒

五從面腫根在肺

桑白皮

六從心腫根在肋

雄黃

七從四肢腫根在脾

甘遂

八物口腹根在小腸

巴戟去心

九從腰腫起根在腎

大戟

十從四肢腫起根在胃

茯苓

右為細末所主藥加倍餘各等分每服二三錢空心用井水調服以利為度量人虛實加減服食忌如法

逐瘀膏 治水腫小便澁少

地龍

猪苓

鍼砂

右等分為末葱涎調敷臍中于高京之

病水寒不得宣行成濕腫證脉來沉遲色多青白不煩不渴小便艱少而大便滑泄

一頭黃頭八鬚魚

綠豆同煎一合飲

熱作濃羹成頓服

自然水腫漸消除

追脾集資丸

治諸腫

商陸

猪苓

漢防已

苦葶藶

椒目

滑石

海金沙

黑金牛取末
二十七粒去油

大腹皮

續隨子去油
赤茯苓各一

巴豆

二十七粒去油

黃連

半斤

右為細末煨蒜搗爛為丸如梧桐子大每服二十五丸五更溫服兩日服一次初服商陸湯次服赤小豆湯三服用

木瓜湯下

木香分氣湯 治氣弱滯四肢腹急中滿胸膈脇肋膨脹虛氣上衝小便矢濁

木香

橘芩

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳殼

菝葜

燈心草

蘇子

各等量

右剉碎每服一兩大二盞煎入麝香末少許同服

沉香海金砂丸

治一切積聚脾腫脹肚大青筋羸瘦

沉香三錢

海金砂半錢輕粉一錢

牽牛末一兩

右研獨頭蒜九如梧桐子大每服三十九空心用燈心

木通湯送下

三白散

治膀胱虛熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二錢

桑白皮

微炒

白朮

木通

陳皮各半

刀

白朮

木通

右為細末每服二錢

空心薑湯調服小兒服半錢

治男子陰腫大如升核痛

右以馬鞭草搗爛塗之

治婦人陰腫硬

右用枳實半斤剉碎炒熟布包熨之冷即易之又復

蟬蛻散

治脬囊腫小兒坐地為風或蟻吹着

蟬蛻半斤

右用水一椀煎湯洗再溫再洗仍与五芩散加燈心煎服
神效木香散 治二十四種虛病

木香

沉香

各二

砂仁

若參藤炒

益智

連翹

三承

各

桑皮

白牽牛

半炒

椒目

枳殼

炒

木通

黑牽牛

半炒

陳皮

青皮

澤瀉

大黃

半斤

楨榔

胡椒

各一

甘遂

四分

右為細末米醋糊為丸如梧桐子大每服五承空心五更
初嚼葱白湯下消上次服橘皮湯下消中第三服桑白皮

湯下消下尚有餘腹沉香湯下忌鹽醬

導水茯苓湯 治水腫頭面手足偏身腫如爛瓜之狀手按而
塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得着床而

睡飲食不下小便秘滯澁出如割而絕少雖有而如黑豆
汁者服喘歎氣逆諸藥不效用此即愈亦嘗驗其病重之
人煎此藥時要如焚阿刺吉酒相似約水一斗止取藥一
盞服後小水必行時即漸添多直至小便變清白色為愈

赤茯苓

麥門冬

去心澤瀉

白朮

三兩上各

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

一兩上各

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

七錢半上各

右㕮咀每服半兩水二盞燈草二十五根煎至八分去滓
空心服如病重者可用藥五兩再加去心麥門冬二兩燈
草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小铫內煎
至一大盞五更空心服滓再煎服連進此三服自然利小
水

一日添如一日

沉香琥珀丸 治水腫一切急難證小便不通者

琥珀

杏仁去皮

紫蘇

赤茯苓

澤泻

半夏
各半

幹姜

郁李仁

去皮沉香

一兩半
上各三分

陳皮

去白

防已

七分半

大黃

一兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以麝香為衣每服二十五九加至五十九空心用人參煎湯送下量虛實加減。津慾丸治腹中湧熱氣自下微腫如新卧起之狀兩足胫微腫病在腎上火陰也標在肺上大陰也故喘氣急咳嗽喘息有音每就卧則右脇有氣上衝有脾與缺盆相牽引不快少思飲食。

鮮蓼根

另研

牽牛

半升
生

白朮

半升
上各

桑白皮

赤茯苓

漢防已

羌活

陳皮

澤泻

郁李仁

另研

皮去皮

黑色

別研

丸上各三分

右為細末研匀煉蜜和杵二三百下丸如梧桐子大初服

十九加至三十丸空心及晚食前用生薑橘皮湯送下日進二服以知為度

治氣虛水腫浮脹昔滁州公使酒肆積同陳通患此一病垂死醫者已不下藥偶一婦人云是醫人所投服之病自小便而下幾數桶遂愈

右用大蒜一箇爛研以蛤粉和可為丸即止丸如梧桐子大每服十九白湯送下若氣不升降即以大蒜一箇每瓣切開逐瓣內入茴香七粒濕紙裹煨香熟爛嚼白湯送下不以多少若臟腑不止即以丁香如茴香法煨服每瓣蒜用三粒煨服

治腹中水辟水腫

右用黃雌鷄一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫湯氣治冷氣

若瘦着亦漸漸食之良先患骨熱者不可食也

鯉魚方

右用大鯉魚一尾去頭尾及骨惟取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可取三升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服溫令緩服訖當下利利盡則瘥一方療水腫滿下氣用鯉魚白蘆食腹有宿瘕者不可食

大腹皮散 治風水身體浮腫發歇不定肢節疼痛上氣喘急
大腹皮 桑白皮 川芎 川芎已上各漢防己

羌活

青皮 去白

大黃 姜

檳榔

桂心

已上各
甘草
兩半

右㕮咀每服五錢水一大盃煎五分去滓不拘時溫服

褚白皮散

風水毒氣癩身腫滿

褚白皮

猪苓

去皮

木通

二升

各紫蘇莖葉

桑白皮 酒 三 陳皮 去霜

右㕮咀每服五錢水一大盃生薑三片煎至六分去滓不拘時溫服

海蛤丸 治石水四肢細瘦腹獨腫大

海蛤

研 研

防己

各一分

陳皮

去酒三分

郁李仁

去皮半兩

赤茯苓

去皮一分

桑白皮

一分

葶藶

隔火炒各一分

右為細末凍蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十丸米飲送下早晚各一服

慍榔散 治石水病腹光緊急如鼓大小便澀

慍榔

研末半兩

商陸

一分

生薑

酒各半兩

桑白皮

半兩

右除慍榔外用水二大盞煎至一大盞去滓五更初分作二服每服調慍榔末一分至平明當利如末利再服

漢防已散

治皮水腫如暴雨在皮膚中四處

習習然動

漢防已

桑白皮

黃芩

桂心

各一兩

赤茯苓

甘草酸半兩

右㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時溫服
木香丸 治皮水身體面自愈浮腫

木香

苦葫蘆子

炒乳香

一分

各一分

檳榔

二枚

炮一枚

甘遂

黃芩

令半兩

朱砂

細研各半兩

右為細末以爛飯和分作四十九丸用麪裹於銚子內以水煮熟令患人和汁吞之以盡為度從早晨服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

木香丸

治水癥腹內堅脹喘促大小便澁

木香

澤瀉各三錢

防已二分

巴豆

去心臍去油可

膩粉各一兩

甘遂生用

青皮去白

蘿蔔子

瞿麥

水銀

以少煮熟肉研
令星盞各半所

右為細朱橘米飯和丸如棗豆大每服三丸空心用木通

湯送下

人參木香散

治水氣病

人參

木香

淡芩

滑石

琥珀

檳榔

猪苓

甘草

分等

右為細末每服五錢生薑三片水一盞煎至七分不拘時

溫服日進三服

治水氣方

右用宣州木瓜一箇竹刀切下蓋子去子并穰入吳茱萸在內却將蓋子用竹簽簽定蒸熟各研細焙乾為末以紫蘇熟水調下不拘時候

治水氣方

右用商陸根白者去皮功如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上瀝却取粟米一大盞煮成粥空心服若一日兩度服即忍利多每日服一頓即微利不得食生冷一方取汁半合和酒半升服利下瘥不可雜食

治脾實受水喫轉乘了后服此藥以補之

白朮

巴戟去心

羌活

山茱萸

去核

陳皮

乾薑

草荳蔻

吳茱萸

水通

牽牛

搗黃培乾

肉荳蔻

枳榔

已上各一分

川芎

半兩

半夏

二錢

椒目

一錢

右為細末每服二錢水一盞煎至九分去滓空心服或煉蜜丸如梧桐子大每服四十九空心米湯送下
補脾藿香散 治脾實受水氣喫轉乘了便服此藥以補之

靈香

丁香

羌活

紅荳蔻

川芎

獨活

木香

草豆蔻去皮

甘草

一升

乾薑

三錢

陳皮

半兩

右為細末每服二錢水一盞煎二三沸空心和滓服

加味枳木湯

治氣為痰飲所膈心下堅脹名曰氣分歌云氣

分中滿并胸脾三者雖殊皆此類胸脾氣實中滿虛氣分

揆飲茲為異岐陽微遲寸遲璇兩處推求病端的陰氣不

通則骨疼陽氣不通身冷剝陰氣前通脾不仁陽氣前通

惡寒躁陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛

遺尿腹滿腸鳴何以療心下堅大似旋盤桂附木湯為最

妙

枳殼

瑟祕

白朮

竦桂

紫蘇莖葉

陳皮

檳榔

桔梗

五靈脂

妙

木香七分各半夏

茯苓

甘草二分各半

右㕮咀每服五錢水二盞生薑三片煎至一鍾去滓食前溫服

桃溪氣寶丸 治腰脅俱病如抱一塊肌骨堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰卧不能屈伸自頭至頸中癥瘕露骨一切氣積食積并脚氣走注大便秘結寒熱往来狀如傷寒悉皆治之

黑牽牛二兩

大黃二兩

青皮六分

檳榔二分

木香

羌活

川芎

陳皮

當歸

茴香炒熟半分

川芎

陳皮

石用細末用皂角膏為丸如梧桐子大每服五七十丸加至百九空心生薑燈心湯送下

大戟散 治男子脾元虛憊水氣腫滿

紅芽大戟

沙主脾

甜葶苈

研主肺

黑牽牛

半生半熟上腎

續隨子

生時去根

甘遂

炒主心

右各為一兩觀其五臟病證主其病之藥加一兩共二兩並為細末前燃心煩五更初面東方服一錢七日須相老子虛實加減至天明其水下三五次其腫即消却用生薑煮粥止之隔日服平胃散一貼如亂虛不堪再下者只用前藥麪糊為丸三日一服二十九謂之磨化丸發效食忘如後

茺花

茺花治女人入脾元虛憊水氣腫滿

茺花

醋浸毛

牽牛

半生半熟

右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十九相處實茶清熱下五更初面東方服天明其水即下用前法粥藥補之婦人止用二味用手捺有窓深者可醫忌生鹽油

醫效劑 醋羊羶等毒食生冷只可食精肉如欲食鹽炒鹽
食之以少為貴不食尤好服藥之日須忌以甘草
又方用鯉魚長一尺五寸以酒淹漬一宿平旦以木鎗從口貫
至尾微火炙令熟去皮隔宿勿食空腹頓服之不能者分
再服勿与鹽

沉附湯 治腫病大凡腫病因積而得先用積藥積既除而腫
再作小便不利到此束手矣若用利小便藥性寒而小便
愈不通故小便不利則中焦下焦不升降痞膈為寒氣所
結故水凝而不通但用沉附湯

附子

一瘦生用去皮
切作片

右用水三盞入生薑十數片同煎至八分次以沉香濃磨
二錢許加入藥再煎三五沸去滓空心服如此則小便自
通喘滿自去矣沉附湯一向喫三五十片附子無碍男子

婦人皆可服之

大半夏湯

治脾土受濕不能制水水漬於腸胃益於皮膚澀

澀有聲怔忡喘息多水脹

半夏

湯泡

陳皮

桔梗

檳榔

甘草

各等分

茯苓

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食

前溫服

鯉魚湯

治平身面浮腫小腸澼大便難上氣喘促

鯉魚

洗令無腥味二斤去腸肚

赤茯苓

桑白皮

澤漆

澤鴻

紫蘇

各一兩

杏仁

半兩去皮尖變仁炒

右剉細先用水五升煮魚取汁三升去魚內乘煮至二升去滓食前溫服一中盞魚亦食之

苦參丸

治平身面四肢浮腫腹脹氣脹滿小便不利

甜葶藶

少
鹽
水
煮
熟

津防已

赤茯苓

海蛤

細
研
椒
目
鹽
炒

芒硝

一
兩

右為細末煉蜜和搖二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸以後茶煎湯送下日三服

木通

桑皮

百合

一
兩
各

郁李仁

去
皮
尖
少
半
兩

右剉碎每服三錢水一大盞煎至六分去滓下前九藥治卒腫痛身面目浮大方

右用商陸根一斤刮其皮薄切之煮令爛去滓內羊肉一斤下鹽或鹽水食法隨意食之腫消後亦宜作此或常服商陸與米中蒸作餅子食之

防已渴治膜外氣水病不限年月深淺浮腫大喘

防已

大戟

木香

赤茯苓

去
皮

海蛤

胡椒

白朮

犀角膏

草薢

防風

木通

荊棘勒去核

陳皮

牽牛

檳榔

郁李仁

桑皮

紫蘇

大黃

麝香

少許麝盞
下不用研

右剉碎

分作二劑以水三升隔宿浸明日五更用文火煎

減去一升

候取飲可三盞平旦空心先飲一盞如人行五

里更服一盞

又如人行五里更服一盞至第三服如桑冷

用重湯浸之不可冷服若久病腹中虛服至第三盞即微

利三兩行若腹中实者至日午即轉瀉宜用益盛

驗之必有惡濁黃水或惡濁青黑物出三五升並氣化為之瀉若

不甚困慎勿止之必自住若覺力乏即服漿水粥補之後

隔三五日更服一劑还依此法服之按徒都先生云服第

一劑則病減半至第二劑則去根本前後懸試重者初服

一劑而瘧已瘥根本深者服漿當日腫消能起但覺小腹

內有塊結則須後剝其藥滓慎勿拋棄布囊盛懸於風中
他日或有微覺發動則更煎可更治兩人徒都先生云入
家有此藥滓懸於戶上一家終不患癆氣此飲不獨治水
氣凡有氣病皆治之若患肺氣不限年月深淺於此藥二
十末中減去大黃及芍藥勒加貝母人參以童子小便煎
每日空心服之當去病根有患肺氣因重者因逢患水氣
人服此藥偶得一盞服之便當永瘥有人一生患脚氣痔
痔衝心服此飲亦除根本以此推之但是氣皆治不獨治
水氣而已婦人有娠服之亦無妨小兒又老人隨意加減
服之皆瘥

甘遂餅 治膜外水氣

甘遂

大麥麪各半

右為末以水和作餅子燒熱熟食之如不利以熱飲投之

如利以冷水洗手面即止一方治十腫水氣為末空心以

葱白湯調二錢服之

炮腎散 治水氣腫滿

巴戟去心
炒

甘遂炒
黃

木香

苦葶藶炒

沉香剉

澤漆巴上各一分

膩粉一茶匙

檳榔一枚生
炒炮

陳皮去白

芫花水酒拌

麥蘖巴上各半錢

右為末每服二錢用猪腰子一枚以竹刀割開去筋膜切作三片。擦藥末在內用溫繼裹慢火煨令熟先煮葱白三莖令熟細切將葱白與粟米同煮粥一椀先食粥一半方食腰子藥後再食粥令盡臨卧時服至五更大小便下赤黃惡物是效

奪命丸 治水氣腫病

大戟去心
炒

甘遂炒各半分

苦葶藶半刀用一斤

生半株

右為細末煮熟內和丸如梧桐子大若四肢腫者名為順水溫裝水下三丸星月上時服至天曉利下惡物若四肢瘦腹腫者名為逆水以苦葫蘆子陳麴煎湯送下二丸小便頻快是效

商陸互方 治水氣腫滿

生商陸

切如麻丘赤小豆各等分

鯽魚肚二尾去頭有鱗

右將三味實裝魚腹中以線縛之用水三升慢火煮豆爛去魚只取一味空心食之就以魚汁送下甚者過二日再為之不過三劑瘥

楨榔散 治水氣腳膝浮腫大小便不利上氣喘急

楨榔

二兩

木香

桂心

各半

紫蘇葉

牽牛

微炒

陳皮去白

赤茯苓

木通七

上各各

郁李仁

一升半湯浸
去皮微炒

右為細末每服二錢空心煎桑白皮湯調下臨卧再服治腫癰脚起稍上遮者入腹則殺人亦治水腫

右用赤小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以瀆膝以下日日為之數日消盡若已入腹者不必瀆但煮小豆食之

莫雜喫飯及鯉魚鹽

甘草丸 治水腫腹脹

甘遂

半刀水黃

甘草

一升水黃

蘇子

及半細辛

大茴

一升半川椒

椒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸用白湯送下空心日午臨卧各一服

猪苓散 治水氣篤身浮腫宜利三焦通水道

猪苓

去皮水黃

甘草

水黃炒

大黃

水黃炒

赤茯苓

陳皮

去白水黃

狼毒

水黃炒

乾薑

水黃炮

五味子

大戟

根

漢防己

桂心

白术

漢防己

右為細末每服二钱食前用葱白湯調服大小便利為度
海蛤丸 治水氣偏身浮腫上喘小便不利

海蛤

細研

薜荔

炒炒

昆布

燒去

赤茯苓

各等分

海藻

燒去

澤漆

巴上各

木通

各等分

桑皮

各等分

漢防己

三錢

右為細末煉蜜和搗三百許丸如梧桐子大每服三十丸不拘時米湯送下

續隨子丸 治通身虛腫喘悶不快

續隨子

漢防己

赤茯苓

炮蒸

海金沙

各等分

人參

檳榔

木香

巴上各

苦葶藶

炒四

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服二三十丸食前

暴白皮煎湯送下

大沉香尊重丸 治盈脹腹滿水腫遍身腫滿氣逆嘔噦喘乏
小便赤澁大便不調 一切中滿下虛尤困之病其效如神

沉香 丁香

人參

車前子

草慈

檳榔

巴豆

青皮

白牽牛

海金沙砂

枳實

巴豆

木通

巴豆

胡椒

肉荳蔻

巴豆

白丁香

巴豆

蘿蔔子

巴豆

滑石

巴豆

郁李仁

巴豆

右為細末用生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用生薑湯送下日進三服忌鹽魚肉食

只可食米粥

無比丸 治水古通身腫滿

京三稜

牽牛

膽礬

研

芫花

醋拌

橫脚

已上一刃

升白附風粉

一分

硝砂

研

續隨子丸

大安

木香

半肉已上各

鐵粉

三分

大黃

三十枝削去皮

湯內累度過研取肉研糊

右除膽礬硝砂棗肉外同為細末用釀醋二大升於銀石器內先下膽礬硝砂棗肉煎五七沸次下諸藥末一處攪勻慢火熬候可丸如梧桐子大每服十九丸丈夫用溫酒下婦人醋湯下