

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇効良方卷之三

五膽丸 治心風狂走癲癇

鯉魚膽

鷄膽

狗膽

豬膽

羊膽各一箇

肝脾一兩研

蛇黃

膽汁五兩大根研

右爲末別以狗膽汗爲丸如菉豆大珠砂爲衣每服十五丸食後以磨刀汁吞下或只作末以磨刀水調服亦可抱膽丸 治男子婦人一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致者及婦人產後血虛驚氣入心室女月脉通行驚恐溫結

此方累曾經効本是忠懿王之子有疾忽得一僧授此服之即効本名靈砂觀音丹忠懿得之未敢輕信或有一風犬飼以此藥立効破犬腹而視乃抱犬膽因易今名

水銀二兩

研

硃砂一兩

研

黑鉛半兩

研

乳香一兩

細研

右將黑鉛入铫子內下水銀結成砂子次下硃砂滴乳香

熟有柳木搘研勻如鷄頭大每服一丸空心并花水吞  
下病者得嚙切莫驚動覺來即安再服一丸可除根本

奪命散

壓風癲癇

用青礞石好者一兩為末同硝一兩拌勻入甘鍋內炭  
大煅通紅湏化盡為度分色如金取研為末每服一錢用  
薄荷自然汁入蜜調微溫服良久其藥自舉痰遂下隨大  
便夾和稠粘如膠乃藥之功

牛黃丸 治風邪變成癲癇時時發動不知人事定心神風  
癲之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血  
氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入於陰經故也又以胞  
胎之初其母卒大驚精氣并居能令子發癲其證與風癲  
大率相似

牛黃另研

真珠另研

琥珀另研

鐵粉另研

大竺黃

另研

龍膽草

去土

麝香

另研

人參

去芦

龍膽草

去土

升麻

防風

去叉

黃芩

去黑心

釣藤

犀角

水銀

丹砂

各半兩

金箔

七十片

銀箔

七十片

金箔

四十片

銀丹

露蜂房

炙

全蝎

酒炒各半兩

知母

天門冬

去心

石菖蒲

米泔水炒

白芍藥

茯神

麥門冬

去心

甘草

炙各一分

右除另研藥外餘藥搗羅為細末却入另研藥再羅令勻  
練蜜拌和得所更搗千杵丸如梧桐子大夜卧及食後煎  
新竹葉湯下十五丸至二十九丸

治癲癇發熱急狂走

右以鐵器服之

鬱金丸 治癲癇可畏數年不愈多因驚憂得之乃痰涎留

於心竅

蟬肚薑金

真蜀也來者七兩

明礬

三兩

右爲末以薄糊丸如梧桐子大每服五十丸湯水任下初服覺心腎間有物脫去神氣酒然再服稍更多服此藥大能去痰一方治癇以生薑汁糊爲丸仍以生姜湯下

治諸癲風等疾

右用鯉魚一片製淨切成塊用明礬四兩爲末醃一兩日

煎其疾必愈

瓜蒂散

治風癩宜服此藥吐之

右用瓜蒂末一錢熟水調下吐痰如吐不止者以真麝香少許溫水服之一方名獨聖散治諸風癩實諸癇痰涎肺液漏溢雜病亦然瓜蒂一兩右剉如麻豆大炒令黃色為細末每服量虛實久新或三錢藥末茶一錢酸薑汁一盞調下若用心法天氣晴明陰晦無用如病卒暴者不拘於

此法吐時辰午巳前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景言大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣寅卯辰巳候也亥寅早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐每用熟鹽水送之如吐風癇病者如全蝎半錢微炒如有蟲者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐出蟲如濕廻浦者加赤小豆末一錢故此不可用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑

治邪癲狂大叫奔走

右用蝦蟆一枚大者去腸中滓令淨將腸胃却入腹中入瓶子中固齊以火燒通赤以土罨定隔日取出入麝香一錢同研令細每服一錢新汲水調下

守宮膏

治久年驚癇心血不足

守宮

一箇  
蜀蠶珍珠

麝香

片腦略一字  
細薄奇湯

右將守宮一箇以鐵鉗定剪子取去四足連血細研入珍珠麝香片腦各一字許研細薄奇湯調作一服先須用奪命散逐下來涎或用吐法吹服此藥大有神効蓋癇者皆心血不足此物可守宮其血與心之血類也取下如童女血服之於心故能補也心全則病痊也

治癇疾

右用凌霄花六七朵每服三錢空心用溫酒調下每服藥時解開頭髮用小梳不住手梳以冷水一大碗在側含水口中溫即換以一梳水盡則住梳如此法服四十九日永絕根本不以受冷淺深背愈百無所忌

來甦膏

治癇一日近風癇心恙風狂中風涎沫閉牙關

不開破傷風搐並皆治之

右用皂角一斤好肥實無虫蛀者去皮弦切碎用袋水一大碗春秋浸三四日冬浸七月夏浸二日擗取淨漿水浸透皂角汁入銀石器或砂鍋內以文武慢火熬用新柳條槐枝攪熟似膏藥取攤在夾紙上陰乾收頸如遇病人取手掌大一片用溫漿水化在盞內用竹筒兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左右鼻孔中內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌鷄魚生硬濕面等物

治癩疾

右用金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥令患者目中卧茶清調下仍且卧日中良久吐出鷄子大物永不發如不吐即以熱茶投之

大定心湯

治心虛中風驚悸恍惚多忘或夢寐驚魔志少

不足

人參

白茯苓去皮茯神去木

遠志去心

龍骨

乾姜炮

當歸切焙

甘草炙

白朮

芍藥

桂心

紫苑去苗土

防風

赤石脂各一

右㕮咀每服五錢七水二盞入棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服日三夜二

小定心湯

治心氣不足風邪所乘驚悸恍惚夢多魘

白茯苓

研末官桂法

細生

甘草炙

芍藥

乾姜炮

遠志去心

人參各一兩

右㕮咀每服五錢七水二盞棗二枚煎至一盞二分去滓

溫服日三夜一

秦艽竹瀝湯

治風狂亂走

秦艽去苗

竹瀝

一升

石膏三兩

白茯苓

龍齒各

玄參一兩

防風一兩

石膏三兩

白茯苓

生鐵

煮取二斗用木二斗  
取一斗去鐵

防風一兩

右為散入鐵汁中煮取五升去滓內竹瀝和勻不拘時候

溫服二合

防已湯

治入風邪入肝脾二經言語不轉

漢防已

防風

桂心

附子

麻黃各半

威靈仙三分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝荆瀝地  
黃汁各一盞生姜自然汁半盞和勻溫服之日三四

金箔十珍丸

治心神驚悸頭目不清

金箔五片

銀箔五片

丹砂一兩

琥珀全

琥珀別研

璫瑁鏹

珍珠別研

犀角鏹

蓬砂別研

龍腦別研各一  
分

牛黃別研

白茯苓去皮

人參各半兩

紫河車二兩

茯神去木半兩

甘草生一兩

右除別研藥外搗羅為末入別研藥和勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸嚼細用竹葉湯下食後臨卧服  
茯神丸 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘朝囉暮劇暮囉朝發發則狂眩加茯神名茯神丸不加茯神名定志丸

菖蒲

遠志

去心

茯苓各三分

人參三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服六七十丸食後白湯下日三亦得一方加茯神一兩半牛黃五錢為六物茯芩遠志菖蒲各一兩忌醃物羊肉餚

茯神散 治諸風恍惚心神煩亂忘意不安或卧驚恐

茯神一兩

石膏研

龍齒各二兩

麥門冬去心一兩半

黃耆一兩

甘草半兩

石菖蒲

人參去芦各一兩

防風三分

遠志半兩

熟乾地黃

羚羊角骨各一

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不拘時候溫服

石菖蒲丸

治風虛安寢寐鎮心神止恍惚化痰滯

石菖蒲一

遠志去心

鐵粉別研

丹砂二兩

白茯苓去皮入參各一

防風去苦

羚羊角分

金箔五十片

藥二十片爲末研

右爲末和勻練蜜爲丸如梧桐子大以金箔爲衣每服十五丸至二十丸煎入參湯下早晚食後服

虎骨散

治白虎風走注疼痛發歇不定積年不効者

虎骨黃芩

烏梅肉

赤茯苓去皮肉

桑白皮酒浸

人參

甘草

芍藥

鱉甲

醋浸糊

白朮

豆豉

慢火

紫菀

去土

黃蓍

培

常山

枳殼

去穰

犀角

銹

知母

已上各  
兩分

當歸

升麻

紫胡

桔梗

錢

前胡

桂心

木香

天靈蓋

酥炙各  
三分

桃仁

四兩  
湯浸去皮炒熟

桂心

去皮

右為細末每服二錢七溫酒調下空心臨卧各一若為丸  
即煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒下  
沒藥散 治白虎風流注筋骨疼痛

沒藥

一兩

獨活

晚蚕沙

微炒

芎芻

各一  
兩半

防風

去茅

蔓荆子

當歸

赤芍藥

桂心

一兩

虎脰骨

三兩  
炙熟

右搗羅為細末每服二錢食前熱酒調下

海桐皮散

治白虎歷節走注骨節疼痛

獨活

草薢

鹽水浸培

川芎

當歸各一分

麻黃

去節皮去

枳殼炒

海桐皮

白芍藥

辣椒桂

牛膝

川烏

皮去

松節

防風

杜仲姜製

甘草半兩各

麝香一分

虎脰骨

炙黃酒一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎六分食前

溫服

攝風酒

治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝

一切風疾

尋風藤

一兩五加皮

一兩

虎脰骨二錢

半

烏藥五錢

石楠葉

青木香

錢半

蒼朮五錢

半

骨碎補七錢

三角尖

上生者威靈仙

川續断

當歸

滴乳香

川羌活

北細辛

各二錢半青藤根一兩

川牛膝

四錢

防風

甘草節

蘇木五錢

南木香

半錢

石薛荔

一兩石生者佳

分作四分

上

生姜

半一兩

生姜

半一兩

蘇木

五錢

右剉碎用無灰酒一罈將藥盛於布袋內放酒罈中油紙封縛以鍋內盛水將酒罈坐於鍋內慢火自辰未至午未罈取出放今每日不拘時隨意溫服藥酒如夏恐停久作酸只作半料用小罈酒依上法煮服

治白虎歷節風痛者狀如虎咬骨節驚癲

白芥子

大戟

木鼈魚子

甘遂

乳香

川烏

右各等分為細末冰糊為丸如梧桐子大每服七八十九  
酒下

烏蛇浸酒方

治風及白癧紫癰

烏蛇

六兩酒浸去皮骨肉微黃

防風

去莖

桂心

天麻

半膝

去苗

枳殼

炒微黃

羌活

各二兩

熟乾地黃

四兩

右剉細以生絹袋盛藥以無灰酒二斗於磁甕中浸密封七日後開每日三度溫飲一小盞忌毒滑物猪鷄肉

四神散

治紫白癧風

稚黃

雌黃

硫黃

白礬

正用透明者

右各等分研爲末每用時先浴令通身汗出次以生姜蘸藥擦患處良久以熱湯淋洗當日色淡五日除根

硫黃方

詩曰赤癥白癥兩般風附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦

一擦之後更無蹤

白癩用白茄蒂

紫癩用紫茄蒂

如用藥時先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂蘸藥擦之

一方去附子加磨石專療白癩

一方用鷄子一枚醃醋浸過宿針刺小孔瀝取清液入砒霜一

菉豆許和勺將蓖布痛擦患處以指點藥揩之亦妙

一方治紫癩風再入胡粉一分膩粉少許同繫柳汁和勺脰卧

時揩三五遍並瘥

治白癩不拘遠近

用烏鵲卵一枚取清先用硫黃礮為末以鷄子清調勻用生布一片將藥刷在布上日中曝反覆刷三四次釘布子在板上令不皴候乾收起每遇浴罷或動作勞苦汗出之時將布子於患處擦之即愈

治白癩風

詩曰紫癰白癰一服風

水銀輕粉最成功

搗取生薑自然汁 只消一擦便無蹤

### 治白癰風

右平且以手掠取韭頭露水塗之極効

鰻鱺魚塗方

治頭項及面上白駁浸淫漸長如癬狀但即

無瘡者

右用鰻鱺魚一頭肥者矣令脂出先洗白駁用物揩拭之

令小痛然後用熟魚脂塗之一度便愈甚者不過三度

鷄膝風

又名鷄腿風

治兩大小眼痙如蘆柴止有擦蓋大

者行履不得用小續命湯料內加草薢川練子獨活乾木

瓜哎咀不用生姜用水煎熬於碗底先放麝香少許去滓

入於碗內服之服至數十貼後加五積散同煎服永瘥

一方用紫荊皮老酒煎候溫常服

菜耳散

治諸風

右於五月五日午時乾地刈取蒼耳葉洗曝燥搗下篩酒  
若漿服一方寸七日三作散若吐逆可蜜和為丸每服十  
丸準前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有  
風者皆作粟樣從肌膚出或如麻豆粒此為風毒出也可  
以鍼鍼刺潰出之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾  
貯大甕中稍取用之此草辟惡若欲看病省疾者便服之  
令人無所畏若時氣不和舉家取之若病胃脹滿心悶發  
熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周半服之佳打月七  
九月九皆可採用一方用子炒令香搗去刺使腹破漫酒  
服能去風補益一方取嫩蕷一石切搗和五升麥蘖園作  
塊放於高艾中盛二十日狀成麵取米一斗炒作飯看外  
緩入蒼耳麥蘖麵作三大升釀之封二十四日成熟取此

酒可兩重布不得金密則溢出又不可和馬肉食之空心  
緩服酒妙

治風何首烏丸

王半甫傳云其父禹王平生服此有効

何首烏

西京者才住來一宿用竹刀削去皮切片焙四兩倍

熟地黃四兩倍

懷州牛膝酒

宿一宿

右不得犯銅鐵器搗羅為末煉蜜為劑再入木柏內杵一千下丸如梧桐子大每日空心溫酒下四五十丸忌羊血生葱薑鴨不飲酒以飯飲下大有神効

療風

以丁公藤漬酒服

南史解叔謙爲門人母有疾夜於

庭中稽願祈告聞空中語云得丁公藤為酒即瘥訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐云是丁公藤能療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

魯王酒

治風眩心亂耳聾目指淚流鼻不聞畜臭口爛生

瘧

瘡風癰癧癰喉下生瘡煩熱厥逆上氣冒膈肩髀痛手不能上頭不能解衣帶腰脊不能俛仰脚脛不仁難以久立八風十二痺在緩六急半身不遂四肢偏枯筋掣不能屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利成如錐刀所刺行人皮膚中無有常處父久不治入人五臟或在心下或在督脈走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉皆治之

茵芋

烏頭

鄭躅

天雄

防己

石斛

細辛

牛黃

甘草

柏子仁

通草

桂心

秦艽

茵陳

山茱萸

去核

黃芩

切治作

當歸

附子

瞿苓

乾地黃

杜仲

澤鴻

石楠葉

防風

遠志去心

王不畱行

胡治作天門冬千金翼  
作王不留行止洛十八瓣

右㕮咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知爲度千金翼名此爲魯公酒有乾姜胡洽無防已以綃囊盛藥用水二斗法麵二斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米內汁釀之酒熟飲如鷄子大日二服稍稍飲之以知爲度治風疾

取消梨不限多少絞汁而飲昔有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄉州馬醫趙鄂者後診之言疾危與梁所說同矣曰只有一法可試喫消梨不限多少咀齶不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣亦以梨葉作煎服

搜風大九寶飲 治挾氣中風癥雖微去當先服此順氣併

開其閨竅不致枯發然後進以風藥或非重熱氣實者亦可服之

沉香

防風

南星

天雄

氣弱者以附子代

薄荷

地龍

去土

木香

不見火

全蝎

去毒者半分代

右㕮咀每服四錢水一盞生姜五片煎六分去滓入麝香

少許啜服不拘時

二香散

治風氣食三證通用調暢胃氣須兼服之

木香

藿香

白芷蔻

半夏

厚朴

姜製

陳皮

茯苓

蒼朮

甘草

炙各半錢

益智仁

縮砂仁

各一丁香二錢

右㕮咀每服二錢半水一盞生姜三片棗二枚煎五分去

滓不拘時溫服

黃耆羌活飲

治心脾受病精血虛少風氣乘之日益削消

黃耆

半兩

羌活

石斛

去根

防風

枳殼

麸炒

人參

附子

炮裂去皮

茯苓

去皮

牛膝

酒浸

五味子

牡蠣

煅各一兩

續斷

半兩

地骨皮

三分生地黃

培二兩

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服日三服

人參湯

治風寒忘意不樂身背疼痛多驚善欠噫氣

人參

川芎

枳殼

麸炒

芍藥

防風

細辛

附子

炮裂去皮

甘草

桂心

硝半

桔梗

炒炒

茯神

去木末

木香

各一分

右㕮咀每服五錢七水一盞半生薑半分煎至八分去滓溫服

溫服

茯神湯

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲

茯神去木獨活各四黃耆

遠志去心

防風各五生薑三兩甘草

人參

當歸牡蠣殼白朮

旋覆

附子各二兩治風眩耳聾

附子炮裂去皮

附子炮裂去皮  
細辛各一兩山芋半  
右咬咀以滌水一斗二升煮取三升服五合一日夜盡  
附子炮裂去皮  
細辛各一兩山芋半  
治風眩耳聾

防風去叉

山茱萸去核

右爲細末每服一錢七空心溫酒調下

六神散治風眩頭目運轉不止

川芎防風去叉甘草去叉

羌活各一兩

右爲細末每服一錢不拘時米飲調下

荆芥穗鷄蘇各一兩

半

伏龍肝湯

治風癱卒不能言口噤手足不隨而強直者

右用伏龍肝末五升水人糸和攬取汁飲之以盡為善

羚羊角散

治風癱筋脉緩弱舌語蹇澁

羚羊角屑 桂心

茯神

琳黃去筋根

葛根

附子炮裂去皮脐

當歸炒

酸棗仁

五加皮各一兩

枳殼炒

獨活各一兩半

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至五分去滓不拘時服

四生散

治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤庠痛不時羞明

多夜下注脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗若常多覺兩

耳中庠正宜服此無不取効

黃耆

羌活

沙苑蒺藜

白附子

生用各等分

右為細末每服二錢用薄荷酒調下如腎臟風下疰生瘡

以豬腰子批開以藥末二錢合定墨煨香熟空心細嚼以

鹽酒送下

羌活飲子 治風毒上攻頭面發熱頰赤唇焦眼濺鼻出熱

氣項背拘急兼治肝元虛風等疾

羌活

獨活

川芎

柴胡

去苗

前胡

細辛

白蒺藜

炒去刺

麥門冬

去心

山藥

紫蘇葉

黃耆

蜜炙

升麻

去上各

烏梅

去核

枳殼

炒

防風

蔓荆子

去梗

藁本

去土

荆芥穗

甘草

去毛

桑皮

去毛

乾葛

一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片薄荷五葉同煎至八分去粗食後溫服

麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液

耗少大便閉難或不通若年高氣弱及有風之人大便秘

滯者宜服

枳殼

炒熟

白朮

柳根半

菟絲子

酒浸

山藥

列研

山藥

防風

研各一

山茱萸

去核半

肉桂

去皮一

大黃

半錢一

車前子

各半

木香

研各四

羌活

研各一

郁李仁

去皮一

大黃

半錢一

車前子

各半

麻仁

研各四

右為細末入別研藥和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫水臨卧服之

搜風散

治風氣中脘不利大便閉

大黃

剝半兩

郁李仁

去皮半兩

川芎

兩

枳殼

炒熟一兩

麻子仁

一分

擗榔

一分枝

木香

一分

旋覆花

防風

各半兩

青皮

去白一分

牽牛

取頭末二兩

生用

一兩炒

右為細末每服二錢七

臨卧生姜茶調

老小加減服

大便閉

通利

大便祕

緩急

止痛

止渴

止血

止汗

聖秘丸

一名大聖丸

治風熱大腸秘盛不通心煩腹滿體

熟引飲

擗搘

木香

川芎

羌活

桂心

二兩

大黃

三兩紙裹

郁李仁

一兩

湯浸去皮

各四兩

右為細末陳密和丸如梧桐子大每服二十丸漿水下茶

湯亦得一方加枳殼

二兩

蜜丸一

方加枳殼

麻仁二兩

名如

名麻仁丸一方加甘菊

芍藥

梨勒生

地黃山芋

各二兩

名如

聖丸一方治熟毒風用溫酒或生姜湯空心服

枳殼飲

治老大便風秘不通塞澁妨悶或用蜜導之類

不能通者

右用枳殼水洗去穰炒為龕散每服一大錢入阿膠二

片生薑五片葱白五莖水一大盞煎至六分去滓入蜜少

許空心溫服次用葱白十莖爛研塗臍中却以手巾蘸葱

湯自內腎腰間浴熨至小腹下少頃氣透即通

通秘散

治風秘大便澁

香白芷不以多

少倍乾

右為細末每服二錢食前用蜜少許溫米飲調下連進二服即通

漢防已散

治賊風身體拘急舌強言手足不遂

漢防已

黃芩

各一兩

麻黃

去根

石膏

各一兩半

赤芍藥

川芎

防風

羌活

附子

生皮去

當歸

炒各三分

杏仁

炒慢去

白朮

各半兩

右㕮咀每服三錢以水一中盞入少薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

倉公酒

治賊風口噤角弓反張

當歸

防風

各三分

獨活

一兩半

麻黃

一兩

細辛半兩  
附子一箇

右咬咀每服四錢水酒各半煎服口不開者扶開納藥一服甦二服少汗三服大汗愈

白花蛇煎

治蠱風身痛如刀割

白花蛇

烏蛇

並用酒浸去皮骨搗乾各二兩

白蜜三十兩

生薑汁六兩

薄荷汁六兩

白礬蜜炒

乾蝎炒

苦參各一兩

白附子炮三分

右為末先下蜜并生薑汁薄荷汁次下諸藥末拌和勻銀器中重湯熬成煎以無灰酒調下半匙七夕服身體滑潤

乳香犀角丸

治東風遍身如針刺

乳香研

犀角镑

自然銅

醋燬附子

生去皮一錢附子生去皮一錢

沒藥研

木香

蔓荆子

草烏炮去皮尖

人參

丹砂研

鐵沙冰

內炒出烟火

每次用萬靈盞者

以

右爲末并同研築和勻用酒糊杵爲丸如梧桐子大每服十五丸米飲下臨用服

天麻散

治體虛腰理開爲風邪所中遍身澀澀如鍼刺

天麻

白花蛇

酒浸去皮骨炙

槐實子

炒

羌活

防風

去叉

蔓荆子

白鮮皮

晚蠶沙

枳殼

炒去皮

威靈仙

去苗

耳草

炙各一兩

右爲細末每服二錢七溫酒調下不拘時候

獐肝丸

治四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而

風癱爲酒使癱注骨節四肢不能運動服此有効

茯神木

白茯苓

去皮

薑黃

白术

黃耆

羌活

五加皮

川烏

炮去皮

薏苡仁

木瓜

半夏

神曲

天雄炮去皮

白芍藥

乳香別研

沒藥別研

防風

獨活

當歸

玄胡索

桑寄生

海桐皮去粗皮

木香

陳皮去白

枳殼炮炒

南星炮

地龍去土

荆芥穗各五錢

麝香一錢

木瓜湯送下

右用獐肝一具洗淨薑存性研爛同藥末酒糊爲劑搗十  
杵丸如梧桐子大每服三十丸用溫酒吞下如不飲酒用

木瓜湯送下

牡蠣白朮散

治風虛多汗少氣汗出如洗少者瘦劣

牡蠣三分

白朮二兩

防風

兩半錢

右爲細末每服二錢匕溫水調下不拘時服如惡風倍防

風少氣倍白朮汗多面腫倍牡蠣

姜蕤飲

治勞風項強急痛四肢煩熱

萎蕤

三两

羚羊角

鱗人參各二

右搗篩每服半兩入豆鼓三合葱白一握以水五盞煎取  
二盞去滓分溫空腹二服

附子湯

治夜寒惾中風惡風多汗汗出黏衣口乾上瀆不能  
勞事身體盡痛名曰內風

附子

生皮去  
一

人參

各半兩

茴香

炒

茯苓

山藥

各一  
分

甘草

炙

乾薑

炮各

右㕮咀每服四大錢水二鍾生薑三片鹽少許煎至七分

去滓食前服之

牛黃天南星丸

治風熱相搏肌肉瞤動頭目旋眩筋脉拘急

搐發精神昏昧舌強語齒肢節煩疼心腎不利凡  
病風氣悉皆治之

天南星

以牛膽製者用二兩如無即用  
紫水煮熟切作片子焙乾

天麻

二兩

獨活

白附子

僵蚕

人參

各一兩

當歸

先切倍

桑螵蛸

乾鰥

炒

各三分

桂心

一分

羚羊角

麝香

別研

各半兩

牛黃

別研

雄黃

別研

片腦

別研各半兩

右先以十三味

搗羅為細末

再入別研五味和勻

煉蜜為丸

如酸棗大每服一丸

不拘時細嚼溫酒下或鷄蘇湯下

苦參丸

治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

苦參

二兩取粉

丹參

去土

仙參

去土

人參

五加皮

防風

去叉

蒺藜

去刺

烏蛇

潤浸用方

蔓荆子

敗龜板

去皮肉

虎骨

別煮

玄參

蜜者各二兩

右為末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升挾取汁去滓於無油鐵器內煎熬成膏用煉蜜四兩拌和為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜卧共三服各用利

芥溥苛酒下

幕散

治面及項或生白駭狀如白癬名曰癰瘍

故炊幕

甑帶

履底

蛇蛇皮一具

右以月餘夜伺候正觸時都燒成灰研令細每服不拘時候以溫酒調服二錢仍以醋調藥如膏以金傳胶上節消治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡瘍狀如麻豆方

秦艽

一兩

防風

黃芩

麻黃去根

犀角屑

玄參

甘草

炙各半兩

枳殼熟炒

牛蒡子

黃耆

朴麻

各三分

右咬咀每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

毒御湯俗方 治皮膚風熱生瘡瘍或痒癟

倒垂柳

白礬

生用

杏仁

三兩

右咬咀以水一斗五升煎一斗去滓於無風處冷浴極妙

苦參散

治遍身風癩痒不可止

苦參

蒼耳苗

牡荆子

白蒺藜

炒去刺

玄參

胡麻子

晚蚕沙

鮀床子

天麻

葛一

乳香

各半

右爲細末每服二錢不拘時候以紫箋茶湯調下

療舉體痛痒如蟲觸皮上痒時搔則皮脫作瘡

蕘藜子

三升

蛇床子

二升

茺蔚子

一升

防風

五兩

大戟

一片

大黃

二兩

礬石

三兩

右㕮咀以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石三上火燒用帛拭身上瘥止一方無大黃

苦參丸

治肺風皮膚瘡痒或生瘻瘍疥癬寇宗奭云有人

病遍身風熱細癩痒痛不可任者連胷頸脅及近隱滑  
然從癢亦多夜不得寐

苦參一斤

皂莢

去皮并子搗碎二斤以水浸擣取藥汁應去滓熬膏

右搗苦參細末用皂莢膏和丸如梧桐子大每服三十丸荆芥薄荷酒下一方無荆芥薄荷唯酒調下治遍身風熱納疹痒痛亦可

卷柏散

治風皮膚癰疹及風熱毒瘡

卷柏

枳殼炒

羌活

五加皮

麻黃

各一兩去根節

犀角屑

天竺黃

赤箭

藁本

桑耳

防風

川芎

黃耆

各半

烏蛇

酒浸去皮骨炙黃二兩

右爲細末每服二錢食前薄荷湯調下忌熟麪鷄猪魚蒜

秦艽

治諸風瘡痒癰疹之愈甚

秦艽

防己

松脂

煉成者各一兩半

枳殼

炒

藜蘆

炒去角各二兩半

川芎

苦參

白术

防風去叉

附子

炮裂去皮

薑蘿

乾薑

一  
卷  
乃

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大。每二十服，用溫酒下，漸加至三十丸。早晚食前各一服。

鬼箭瘎

治風瘎累醫不効

鬼箭

白斂

白术

一  
作白  
姜蘿

礬石

一  
作  
硫

甘草

一  
冬  
兩

防風

去叉  
二  
兩

右㕮咀，每服五錢。七水一盞半，粟米粉二錢。七同煎至七分，去滓。食後溫服。兼用粉粉身一方，以溫水調藥服。

蒼耳散

治風瘎參瘻痒不止

右用蒼耳花、子葉各等分，爲細末。以黑豆炒微焦，浸酒在內。夫豆以酒調藥二錢，不拘時候服。此酒名豆淋酒。

清肌散

治風寒暑濕外博，肌膚發爲癰瘍，遍身瘻瘍或赤

或白口苦咽乾或作寒熱用敗毒散

一兩半

加天麻薄荷

各三錢

蟬退皮足黃

節

分作六服每服水一盞半生薑三片

煎溫服取効

五參散

治惡風

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

不通

蒺藜

炒去刺

烏鵲

酒浸去皮骨

乾蝎

去上脚

天麻

赤箭

陳皮

去白各一兩

黃芩

去黑心

原蚕蛾

一分

何首烏

去皮

右並生用搗羅爲細末每服三錢七熟茶湯調下服及半料即減服二錢七初服三日後先覺頭項脊背身上疼痛乃藥力與病相繫也當安引兩復時許即無事如或身上有瘡腫服藥一日後便漸漸減

硫黃酒

治惡風頭面肢體癰瘍胞癰

用透明鱗片硫黃上鐵乳鉢內研細入醇酒再研空心飲  
其清酒將滓又研細再入酒飲之連日如是硫黃能殺惡  
蟲自大便下

治諸般風腫及頭目面者宜服

人參

茯苓

甘草

前胡

芩窮

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

當歸

防風

荆芥

分杏等

右㕮咀每服五錢水一鍾半生薑一片煎一鍾不拘時服  
急風一字散 治破傷風

椎黃

川芎

雨星

川芎

白芷

各半

全蝎

白附子

各半辰砂一錢

麝香

許

右為細末每服半錢七溫酒調下忌熱物片時

太白散

治破傷風欲死者雖患人口已禁但心腹間擾者

薰藥

入口下咽喉即生

附子

炮去皮鹽另研

草烏

細末鹽水浸

天南星

炮

薰香

去土

人參

當歸各一錢

水銀一錢

銀半錢水銀依此子

麝香

一錢另研

右為細末每服半錢溫酒調下不拘時服惟忌令水如飲  
令水再發不可治矣一方無錫

治破傷風將欲死者

川烏頭

生

天南星

生

半夏

生

天麻

去芦各等分研

右剉碎每服一兩半

以童男子小便二升半隔夜浸藥明

日前取一大升空心溫服

分為三服次服調檳榔末三錢

如人行十里更進一服如丈夫病婦人病丈夫前

令藥時忌孝子孕婦病人及腥穢物鷄犬等仍忌油膩濕  
麵生令硬物服至一二劑即吐出蟲子或泄瀉更不須服  
餘藥若未吐利即當盡服病在上即吐病在下即利皆出  
蟲如馬尾人髮即瘥此藥能逐諸疾

守宮丸

治破傷風身如角弓反張及筋脉拘急口噤

七枚熟去

膩粉

半錢

天南星

一兩酒浸三日服

右搗研為細末以薄麵糊為丸如菉豆大每服幹開口以  
酒灌下七丸有項汗出得解更與一服再汗即瘥一方加  
白附子一兩煉蜜為丸守宮一名辟宮子

又方治破傷風

用蠅蠆二兩半切爛為泥入花椒一兩同酒炒熟再入酒  
二盞半溫熱去滓服之如重車行五里地通身汗出神効  
治破傷風欲死者

用蟻蛇碾爲細末擦牙吐出涎沫立瘥

白僵蚕散 治破傷風身腫牙關不開

用白僵蚕直者不拘多少生研爲末每用生薑自然汁調  
以鷄翎於瘡口掃之勿令乾斯湏腫塌皮皺爲効仍用生  
薑汁調半錢七服一方治癰疹及大腸風秘以酒調服之

一方治風癥生薑汁一茶匙溫水調灌之

羌活防風湯

治破傷風初得在表

羌活

防風

川芎

藁本

細辛

各一錢

芍藥

甘草

炙各二錢

地榆

石分作二貼每貼水二盞煎至八分熱服若大便閉加大

黃緩緩令過加黃芩

白木防風湯 若服前藥有自汗者

白术

四錢

防風八錢

黃耆四錢

右分作二貼每貼水二盞煎至八分食後服

蜈蚣散

蜈蚣一對

魚膘五分炒

左盤龍五分炒相盡

右為細末用防風湯調服

太醫院經驗奇効良方大全卷之三

太醫院經驗奇効良方大全卷之四

寒門附論

論曰夫中寒者寒為天地殺萬之氣人中之者其病速而危亡卒受邪生命暴絕蓋由胃氣大虛而又觸胃大寒胃虛則肺不觸生狂而皮毛之氣先絕氣弱則表失衛護而寒邪易於外入使周身陽氣遏絕而不行四肢厥逆禁固而僵直故口噤目瞪而色青白或自汗表絕或下痢內脫內外俱虛而寒邪獨盛治失稍緩脉散而死岐伯曰冬三月此為閉藏水冰地坼無擾乎陽早卧晚起必待日光乃去寒施溫之意寒者天地為殺厲之氣在天為寒在地為水在人臟為腎而寒喜中腎若中之者拘急掣痛昏不知人但言寒喜中腎者不言他臟中者且如辛苦之徒餓寒勞役不避風雪觸冒嚴寒之氣卒然病者以其五臟皆能有所中寒之證先頭痛身熱惡寒體病此是傷寒也當以

傷寒法內求之若卒然還倒懵然無所知覺而牙緊口噤與中  
風相類但脉弦緊或沉細者乃中寒也若素有血虛氣滯沉寒  
痛冷僵枯不仁拘掣一厥之證與夫虛寒者虛謂陽不足寒謂  
陰有餘陽不足則五虛生焉陰有餘則寒氣積矣五虛既生則  
脉細弱氣少泄利不食乃其證也此證非比傷寒為病邪氣攻  
亭稍經相傳表漸入裏熱雖甚不死夫人以腎為根本惟腎受  
寒傷腎腎氣一虛寒邪交併致生病焉大抵中寒脉必遲狹風  
脉必浮眩不仁兼濕則脉濡腫滿疼痛治療之法不可妄吐  
妄下則當補陽消陰峻丹田固真氣若嚴氏所論惟中寒時刻  
之間便有挾風兼濕脉證之轉戾相乘者經曰以身之虛而逢  
天之虛兩虛相感其氣着人則傷五臟醫工敵之不可妄悶緩  
急之勢明可見矣欲求捷効局方發揮論前人治以附子理中  
湯其議此藥用得之矣蓋謂溫經則寒散而陽復補上則氣和

而表實氣充形完神無餒而不病矣

寒證通治方

不換金正氣散

解散寒邪

蒼术

橘皮

半夏麴

厚朴薑製

藿香各二錢

甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾食前服

人參養胃湯

治外感風邪內傷生冷

蒼术

厚朴薑製

半夏

湯洗七次各二錢

人參

茯苓

草菓

藿香各一錢

橘皮

一分錢

甘草炙半錢

右作一服水二鍾生薑七片烏梅半箇煎一鍾不拘時服

理中丸

治中寒腹痛

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙二兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服八十丸米飲湯送下  
食前服一方加炮過附子一兩

生料五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼並治之

白芷七分陳皮一錢

厚朴八分

桔梗九分

枳殼去穰炒熟

川芎八分

甘草炙六分

茯苓八分

蒼朮米泔浸二錢

當歸八分

麻黃一錢

肉桂六分

芍藥八分

乾薑炮八分

半夏湯洗七分

右依一服水二鍾生薑三片葱白三莖煎一鍾不拘時服

理中湯治五臟中寒口禁失音四肢強直兼治胃脘停痰

冷氣刺痛

人參

乾薑炮

甘草炙

白朮各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

薑附湯

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

附子

炮三

乾薑

炮五

右作一服水二鐘煎至八分不拘時服

薑桂散

溫中散寒

乾薑

良薑

各一

辣桂

木香

半夏麴

甘草

炙各一

附子

炮去皮

附子理中湯

治中寒中濕嘔逆虛弱

人參

白朮

乾薑

炮

附子

炮去皮略  
各三

甘草

炙一

右作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘食前服如血少加

當歸一錢同煎服

沉附湯

治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子

皮去  
三分

乾薑

三分

沉香

一分

白术

各一  
分

甘草

三分

沉香

三分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

沉香桂附丸

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

沉香

附子

炮去皮  
三分

乾薑

炮三分

良薑

炒三分

官桂

去皮三分

茴香

炒三分

川烏頭

炮去皮三分

大

吳茱萸

湯浸洗炒

右各一兩爲細末用好醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五十九粒熟米飲送下空腹食前日進二服忌生冷硬物

燮法

治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽虛之證及

陰毒傷寒四肢厥冷脣脛滿面青黑諸虛冷證皆宜用之

汗脈沉細唇青面黑諸虛冷證皆宜用之

肥蔥

切三分

麥麸

各三分

滄益

二分

右三件入水一大盞同和拌勻濕分作二次於錦鍋內同炒極熱用重絹縫作二包將一包熟熨牕上冷更易一包葱包既冷再用盞水拌濕炒焦依前用之至燥爛不用別取葱熨日夜不住相續至身體溫熱脈壯陽氣復來而守

正氣養之和之

又方 治陰證傷寒腹痛吐利唇青面黑身背強四肢冷脉沉細咽喉不利

右用滄蓋一斤炒焦大熱布絹二重作囊包裹盛之熨陰脣間亦同葱熨法尤妙

溫中降氣丸 治中寒氣痞脾胃不和飲食進退脅腹虛冷及中酒吐逆脅膈不利

附子去皮脐切作半塊大一斤用生薑自然汗牛屎瓦器內慢火煑薑汁盡為度薄切燒

乾生薑二斤去皮白木人參陳皮去白

神麴炒黃

半夏燒次洗

白附子泡

當歸洗焙

天南星炮

高良薑燒切

丁香

木香

沉香

胡椒

肉桂

去龍皮各一刃

右為細末用生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時服

附子散

治陰證傷寒吞青面黑身背強痛四肢厥冷及諸

虛沉寒

附子炮

官桂

當歸

白朮

各二分半

乾薑炮

半夏炮各二分

右作一服水二鐘生薑五片紅棗二枚煎至一鐘食前服

太醫院經驗奇効良方大全卷之四

太醫院經驗奇効良方大全卷之五

暑門 附論

夏三月炎暑大行山澤爐燎林木流津正由火熱極甚薰蒸於物致之然也在人亦應之而多汗由火氣浮泄於表時於此際濕熱陰盛人多肢體困倦精神短少一或將理失宜輕則氣虛身熱頭重脚軟脾弱少食之證所謂疰夏病也暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心且暑之中人者先著於心伏為三焦腸胃之間凡中之者蓋熱傷氣而不傷形也乃六淫中無形之火大率以五行中有形之水制之輕則前證所感大同小異重則昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺丹溪以陰虛所致甚則瞀悶懊憊而死客氣旺而主氣弱為熱傷元氣古人立法夏月宜補者補天真元氣非補熱火也以用人參五味子麥門冬名生脉散蓋此藥能益金水以禦火土之旺又令人夏食寒以扶

陰氣養其陽也蓋謂陽亢於外陰微於內庚金受囚於上清肅之源竭於下也丹溪又辯云世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷者其悞甚矣或曰以手捫腹明知其冷而何曰人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛矣如子月一陽生寅月三陽生此氣之升也巳月六陽生陽盡出於地之上矣此氣之浮也經曰夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏孫絡皆盛內溢肌中又曰陽氣在孫絡長夏氣在肌肉所以養實者裏必虛又言春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也何以溫熱取其用此理固然且如涼臺水館當風取涼寒泉水菜之物所傷或吐或瀉或腹疼自內及外當用溫劑前哲又謂升降浮沉則順寒熱溫涼則逆夏月火令之時不可妄投溫燥之藥者其虛實不為患乎或曰巳月純陽五月一陰生六月二陰生陰氣既動豈無陰冷此陰之初動於地下

四 防薄於上燔灼炎流全燃石何冷之有且繫古治中暑之  
藥有中者傷暑之分若人或傷或中之意但言避暑納涼於深  
堂大廈謂靜而得之爲中暑其病必頭疼惡寒身形拘急肢節  
疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣  
不得伸越為陰證故治以大順散以取辛甘發散之意後人不  
察用溫熱之意又辨傷暑之證若人或農夫於日中勞役謂動  
而得之為傷暑真病必頭疼發躁熱捫之肌膚大蒲大熱大渴  
引飲汗大出無氣已動乃為大熱外傷肺氣以人參白虎湯為  
陽證熱傷元氣非筋體受病也夫白虎治熱傷氣謂元氣不甚  
虛也暑去氣清則安矣脾胃論中長夏濕熱胃困尤甚又有暑  
風一證因其夏月而病槁鶴故有此名非風也乃病暑孰先極  
火盛金衰木無以制正邪相拒汗閉於外痰鬱於內風勢妄行  
脾必受邪故手足陽爲動搖內擾神舍志識不清而瞀悶無所

知矣慎勿以風藥治之治以兼化但清時令之火則心經之熱亦泄金清氣行則木邪有制而風不作開鬱悶之疾則神識氣宣當用黃連香薷飲加羌活且如有人在途路中傷暑者湯藥皆無將人挽扶涼處就將當道上熱上包裹熨膀胱之上下或布蘸湯熨之冷即頻易待其甦醒用溫米飲湯徐徐灌之便不可用剛燥之劑可不畏哉

五物香薷湯

驅暑和中通用

香薷四錢

白扁豆

厚朴

一錢

甘草各

白茯苓一錢

甘草  
炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

香薷縮脾飲

驅暑和中除寒止渴

香薷三錢

縮砂二錢

草薢仁

乾葛根各一錢

烏梅肉

白扁豆

甘草  
炙

右作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘不拘時服

冷香飲子

治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服

服涼藥不得者

草藥仁

五分附子

橘紅

甘草一錢各

右作一服水二鐘生薑七片煎至一鐘去粗沉冷旋旋服

不拘時候

香薷剉散

解暑毒止霍亂

香薷

厚朴

薑製各二分

茯苓一錢半

甘草半錢

陳皮

良薑各一錢

右作一服水二鐘入盃些少煎至一鐘不拘時服

二氣丹

治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並

皆治之

硝石

硫黃各等分

右為末銀器內文武火炒令鵝黃色再碾細用糯米煮糊  
為丸如梧桐子大每服四十丸新汲水送下不拘時服

五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤色心神  
恍惚一方加辰砂名辰砂五苓散

澤瀉二兩半

肉桂一兩

赤茯苓

白朮

猪苓各一兩半

右為細末每服二錢白湯調下不拘時服

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛厚朴

薑製

陳皮

丁香各半兩

白茅根

麥門冬去心乾木瓜

甘草炙各一兩

香薷七克半

右為細末每服二錢生薑湯或冷水調下不拘時服

消暑丸

治伏暑引飲脾胃不和

半夏

醋煮一升

甘草 生用

茯苓

去皮一斤半

右為細末用生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸熱湯下不拘時服

桂苓甘露飲

治伏暑引飲過後肚腹膨脹霍亂吐瀉皆治

肉桂 半兩

白茯苓 去皮

白朮

猪苓

滑石 研各二錢

寒水石 研各一錢

甘草 炙

澤泻 各一兩

右為細末每服三錢入蜜些少熱湯冷水住調下

解暑三白散

治胃暑伏熱霍亂吐瀉小便不利頭目昏眩

桂苓

白茯苓

白朮 各五錢

右作一服水二鍾生薑五片燈心十莖煎一鍾不拘時服

十味香薷散

消暑氣和脾胃

香薷

人參

陳皮

白朮

黃蓍

白扁豆

甘草 炙

厚朴

木爪

枝条去皮名半两石

右為細末每服二錢熟湯冷水任調下不拘時服

香朴飲子

治大人小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂

人參

去蘆

茯苓去皮

甘草炙

紫蘇

澤鴟

香薷

半夏麪

白扁豆

烏梅肉

木爪

厚朴薑各

右作

一服水二鐘生薑三片紅棗一箇煎至一鍾食前服

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱

交作癰喘咳嗽胃脘痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠  
小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中

酒煩渴畏食並皆治之

縮砂

半夏湯洗七次

杏仁去皮

人參去蘆

赤茯苓

去皮蘆香去土

白扁豆薑製齊薷

厚朴

薑製

木瓜

絲

甘草

炙半

聖惠方

治絞腸沙痛不可忍甚轉在地或起或仆其腸絞

結在腹此是中毒之深湏更令人死

右用鹽一兩熱湯調灌病人口中鹽氣到腹其痛即定

竹葉石膏湯

治伏暑內外熱熾煩躁大渴

石膏

半兩

麥門冬

去心

人參

去蘿各二錢

甘草

炙半

半夏

湯洗七次半

至一鉗不拘時服

黃連香薷湯

治伏暑傷冷霍亂轉筋心腹撮痛四肢厥冷

香薷

三錢

厚朴

薑製

黃連

一錢

右先將厚朴黃連二味同生薑四錢一處搗細

於銀石器

內慢火同炒令紫色取起入香薷入水一盞酒一盞煎八分去粗用磁器盛於新汲水中沉令極冷服如中暑搐搦內加羌活二錢尋常感冒暑燥渴吐瀉不甚重者方中可去黃連只加白扁豆二錢微炒剉煎如前法服之如燒葵藥莫犯銅鐵器

瓦砂益原散

治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚

瓦砂三錢

滑石六兩  
甘草一兩

右為細末每服三錢不拘時白沸湯調下

芩香湯

治伏暑引飲躁渴過食生冷成霍亂

良薑

附子炮去皮磨  
甘草炙

檀香各二

乾薑

丁香三分  
草藥半錢

右咬咀作二貼用水二鐘煎至一鐘去滓貯瓶中沉井中待冷服之

御愛薑蘇丸

治中暑惡心頭疼煩燥生津止渴

紫蘇葉

擣淨

烏梅肉

切炒

甘草

生二分

桂心

去皮生

牛兩

香薷

半兩

生薑

切炮一分

紫木瓜

乾者二兩

如生皮

櫻桃

一兩

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼熱水送下

廣順散

治中暑煩渴

甘草

三分

肉桂

去皮一兩

乾薑

酒一兩

紫蘇葉

半兩

烏梅肉

半兩

右為細末每服二錢冷水調下沸湯調服亦得

龍鬚散

一名甘草散

治胃暑伏熱心膈燥悶飲水過度不知

人事及霍亂吐泄作渴衄血吐血小便下血頭旋目暈

五倍子

一作五味子二兩

烏梅

去仁二兩

甘草

一兩

飛羅麵

明月麵尤佳二兩一方用清

白礬

拈一兩方生用

右為細末每服二大錢新汲水調下一服即愈即解諸毒

物雖平日不飲冷者服之亦有奇効一方加詞子肉滴水  
為丸謂之龍涎丸仍似末調下翟公巽叅政易名灌熟飲  
子為丸彈子大陰乾細嚼水送下

地仙散

治傷寒後伏暑煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去木二兩

防風

去蘿一兩

甘草

炙半

右㕮咀每服四錢水

一盞半煎至七分去滓食遠溫服

治中暑不拘老少

右用不姓皂角不計多少刮去黑皮燒煙欲盡用盆合於  
地上周回勿令透煙每用皂角灰一兩用甘草末六錢和  
勻每服一錢新汲水調下氣虛人溫漿水調下昏迷不省  
者不過兩服是內輸備急用皂角五片去皮弦灸焦存性  
甘草玉兩蓋中暑人痰塞關竅皂角能踈利去痰故也

方用米飲下

治中暑甚妙

右用上等重羅細麵以蠶汁及水和成餅子曬乾却研末收之每服二三錢新汲水調服

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱燥渴督悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷

去梗

一兩

紫蘇

去梗

一兩

乾木瓜

一兩

藿香

洗去梗

一兩

丁香

剉

一

丁香

各二

半

右為細末煉蜜和丸每兩作二丸每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒每服半丸不拘時候

水瓢丸 治胃暑毒解煩渴

烏梅肉

四兩

甘草

一兩

青鹽

一兩

乾木瓜

一兩

白茯苓

一兩

白芷

一兩

半

半

右除麝香別碾餘並為細末煉蜜為丸每兩作三十丸每服一丸含化或新汲水溫水噙下不拘時候一方有人參

水葫蘆丸

治證同前

川百藥煎三兩

人參二錢

麥門冬

烏梅肉

白梅肉乾葛

甘草各半錢

右為細末麵糊為丸如雞頭大每服一丸含化夏月出

行一丸可度一日

瀉火散

治傷暑煩燥發渴口苦舌乾頭痛惡心不思飲食

昏迷不省人事欲死及治血崩婦人熱血崩

青皮去白

赤芍藥

黃連

去黃

地榆各等分

右為細末每服三錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加甘

草等分一方漿水調服治血崩水一盞煎服

通草散

治伏暑下血如火痢崇寧二年自太府出為發運臺

交秋患痢兩月一日一夜三四十次然血多白少名醫皆  
曰此痢也聞泗州青陽鎮李中和助教瞽醫即遣人召之  
中和至省脉即曰此非痢也始甚怒之徐叩之李曰血多  
白少小便澁少即非痢其言中余之病心已神之乃是舊  
因伏暑小便轉導入大腑由心經而過遂化為血大小便  
下故其狀似痢而非痢也但令大小便各歸本藏即安

通草

水通

各半

澤鴻

一分

竹茹

二分少用

或半

右剉如大米粒或為細末就剉時即每服秤三錢水一盞  
煎至七分溫服細末即每服抄二錢依前法煎食後并夜  
卧各一服便住信知天下有如此妙醫余家數婢久痢服

之皆安故記傳久

異功散

尤

治伏暑或吐或渴有効

黃連

一斤

陳倉米

二升水

燒作溫

二

右於鍋內如捲飯法米熟為度，麩乾為末，以水為丸，如梧桐子大，每服三五十丸，飯湯下，不以時。

檀香丸

解毒

檀香一兩

杏仁去皮二錢

烏梅肉二錢

紫蘇葉一錢

茴香三錢

百藥煎二錢

甘草一錢

右為細末，凍察為丸，如彈子大，非時含化。

白梅湯

治中熱，五心煩躁，霍亂，嘔吐，口乾煩渴，津液不通。

白梅九箇

檀香三錢

甘草四錢

鹽五錢

右為細末。

每服二錢，入生薑五片，青竹葉七片，粳米百粒，水煎服。

五聖湯

治暑病嘔惡，每遇夏月不進飲食，疲倦少力，見日色則頭目昏痛，惡心多嘔。

則

貫衆

黃連去殼

甘草半錢

吳茱萸七錢

白茯苓

去皮

已上五味並生用各半兩右咬咀平分三服每服用一  
枕半前至一枕去滓放冷候日午時先取香熟胡瓜一枚  
切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如  
前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡為度不  
損脾胃不動臟腑須是覺大煩時服之

蠟梅丸

止渴生津

蠟梅花末

乾薑末

甘草末

枇杷葉末

百藥煎末

烏梅肉末

已上各一兩

蠟五兩

右先熔蠟開投蜜一兩和上件藥末搗二三百下丸如鷄  
頭實大夏月長途一日含化一丸妙

治中暑迷悶欲死

右取蒜一瓣生嚼以新水送下或不能嚼水研灌之立可

効熱死人切勿便與冷水及卧冷地正如凍死人須先與  
冷水若逼近火即死一法行路渴死人惟得置日中或令  
近火以熱湯灌之即活一方以爛蒜嚼三兩辦溫水送下  
治時暫伏暑

右用香附子脊中搗去皮入薑汁炒香為末入砂糖丸龍  
眼大先呷麻油少許次嚼藥冷水送下當時便覺清涼  
春澤湯 治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽  
不分疑二之間最宜服此

澤瀉

三錢

猪苓

一錢

茯苓

二錢

白朮

二錢

桂心

一錢

人參

半錢

柴胡

一錢

麥門冬

一錢半

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

石臼咀每服七錢水一鍾半燈心二十根煎一鍾食遠服