

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方卷四十一

脹滿門

附論

活人書謂腹脹滿者由陰陽不和蓋天之陰陽寒暑也人之陰陽血氣也其有不和必致偏勝則寒暑不調人之偏勝則氣血乖和氣血乖和則變生百病夫脹滿者豈不由偏勝之所致乎六元正紀論云太陰所至為中滿又云濁氣在上則生腹脹又云諸溫腫滿皆屬脾土蓋心肺為陽居上腎肝為陰居下脾屬土居中州亦陰也為倉廩之官主納水穀灌漑四臟經曰飲食入胃游溢精氣上通於肺下輸膀胱水精四布五經並行陰陽自和心肺之陽降腎肝之陰升以成交泰而為无病或六淫七情之侵擾又飲食失節房勞致損俾脾王之陰傷胃雖納穀不能運化則陽自升而陰自降陰陽不和則為否隔矣遂使清濁相混氣道壅塞氣化濁血凝鬱為熱也留而久氣化成濕也熱

相搏遂成脹滿是曰鼓脹外雖堅滿而脹中空无物腹之虛大經曰腹脹大鼓之如鼓者此之義也又有單腹蠱脹者蠱之一字從虫似有虫食於內之義其謬因氣之盤結於腸間固難治也靈樞脹論云五臟六腑皆有其脹各不同然脹者皆因厥氣在下矣氣逆上榮氣留止真邪相攻兩氣相搏合而為脹或為臟腑之間或為氣血之分或為胸脇或為皮膚各有其病各有其狀蓋營氣循脉衛氣逆則為脉脹衛氣並脉循分則為膚脹此病皆由人之臟氣所致或四氣七情之所乘襲至於飲食飢飽致使三焦虛實而為脹者治法不同設冬感寒胸中痞滿脉來沉細為寒脹治宜溫解寒邪夏月傷熱胸腹堅滿脉來虛弱為暑脹治宜清熱除濕若飢飽傷脾七氣若虛運於克化少愈若其不升降痞結胸中三焦相混大小便不通卒然脹滿脉

未沉伏為三焦脹也。又有虛實之分。虛者皮膚鼓也。然而堅不
痛而氣滿。治以升降氣道。溫補脾元。即復矣。實者內挾宿食邪
實於內。按之堅痛。當以疎氣滌實可也。至以久病而脹。脾土已
敗。最為危證。治難取效。諸脹當推其原而療之。實者滌之。虛者
補之。寒者熱之。熱者清之。結者散之。留者行之。在血分則通其
血。在氣分則行其氣。始可萬全不致殆矣。

脹滿通治方

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥冷食入
反出下虛中滿腹中寒心下痞燥寒厥奔豚不收並治之

益智

半夏備炮

木香

茯苓

去皮

升麻

七上各

人參

去芦

青皮

川烏

炮去

當歸

訶胡

乾薑

華澄茄

黃連

六上各

黃芪

黃蘗

去皮

吳茱萸

草薺

厚朴

麻黃

澤瀉

已上各半斤

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服大忌房勞酒濕麪生冷硬物

消脹丸

治諸脹

木香

大黃

茯苓

去皮

厚朴

薑製

澤瀉已上各

黑牽牛

取末

滑石

各六

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九丸食前用生薑湯送下

陳氣丸

治諸痞塞閉格不通腹脹如鼓大便結秘小腸腎氣

等疾功效尤速

青皮

用水輕等分同炒赤去赤種

莪朮

用蜜等分同炒赤去蜜出

胡椒

去赤種

三棱

去赤種

檳榔

去赤種

赤芍藥

去赤種

川椒

去赤種

乾薑

去赤種

附子

去赤種

茱萸

去赤種

石菖蒲

去赤種

桃仁

去赤種

桃仁

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水煙等不用抵以青皮等十味為細末酒糊為丸如梧相子大每服五十九加至七十九空心用紫蘇湯送下

沉香散 治腹脹氣喘生即不得

沉香

本香

各二

枳殼

羅補子

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

順氣水香散 治氣不升降嘔逆惡心胃時痞問脇肋脹滿及

酒食所傷噎氣吞酸心脾刺痛人便不調面色萎黃肌肉

消瘦不思飲食兼治婦人血氣刺痛一功冷氣並皆治之

方見氣門

七物厚朴湯 治腹滿發熱陽盛陰虛陽盛則外熱陰虛則內

熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如

較致脹滿者為熱脹

厚朴

三錢

大黃

桂心

五分

枳實

二錢

甘草

錢一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

嘔者加半夏利者去大黃

中滿分消丸

治中滿熱脹鼓腹氣服

厚朴

一兩

半夏

湯

枳實

半兩

黃芩

去皮半兩

乾生薑

知母

四錢

茯苓

去皮

砂仁

去皮

澤瀉

練皮

三錢

猪苓

去皮

黃連

去皮

薑黃

白本

甘草

錢半

右為細末和自湯友蒸餅和丸如梧相子大每服一百丸

焙熟以熱水送下食遠服量病大小加減

廣茂瀆堅湯

治末滿腹脹內有精塊堅硬如石冷入坐卧不安大水使澀滯上端氣促面色痿黃通閉虛腫

安大水使澀滯上端氣促面色痿黃通閉虛腫

廣錢根黃連

訖胡去蘆

甘草生用

神麴

澤瀉已上各陳皮去白

吳茱萸湯泡

青皮去白

升麻已上各黃芩去黑

草薺根

厚朴薑製

當歸稍一益智已上各

紅花二分

半夏七分

乾葛二分

石一作服水二鍾先浸藥少時煎至一鍾食遠服忌酒濕麩中滿服後漸減積塊未遺再服後半夏厚朴湯

半夏厚朴湯

半夏一錢

厚朴八分

神麴六分

桃仁云皮尖十五箇

黃芩生用

澤瀉

紅花

白茯苓

橘紅

蘇木

青皮

吳茱萸

蒼朮

草薺莖

黃連已上各五分當歸稍

猪苓

京三稜

升麻已上各四分乾生薑

內桂

生甘草

訶胡

昆布

乾薑已上各三分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

三稜煎丸 治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞喘滿短氣常服

順氣消積滯除膨脹

京三稜生半斤為末以酒三升於銀石器內煮成膏

杏仁湯洗去皮尖炒黃色

乾漆炒煙 麥蘖炒已上 青皮去白

蘿蔔子炒

神麴炒已上 桐砂二兩

右為細末以三稜膏和丸如梧桐子大每服二十丸食後

溫米飲送下

木香凌氣飲 調榮衛利三焦行痞滯消脹滿

方見諸氣門

五膈寬中散 治七氣沉滯飲食不下氣滿膨脹

方見翻胃門

溫胃湯

治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣不平

脹滿上

衝欬食不下脉虛而緊瀉

附子

包去反絲

厚朴

去皮生用

當歸

白芍藥

人參

反絲

甘草

炙

橘皮

已上各

乾姜一分

川椒

去合口者炒出汗三分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

人參芎歸湯

治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤大便黑名血脹

人參

反絲

木香

去皮

陳桂

去皮

五靈脂炒

烏桑

反絲

蓬朮

炙

甘草

炙

縮砂仁已上各

川芎

二水半

當歸

炙

半夏

湯泡一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚紫蘇四葉煎至一

鍾食前服

木通飲 治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不利或浮腫

木通

陳皮

去白

紫蘇莖

甘草

炙各三分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚灯心十莖煎至一鍾不拘時服

參香散 治一切氣脾虛作脹痞氣

人參

官桂

甘草

炙各七分

桑白皮

桔梗

陳皮

枳實

炒

麥門冬

青皮

大腹皮

半夏

已上各一分

紫蘇子

茯苓

香附子

木香

各一分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

大半夏湯 治肝氣太盛勝剋於脾胃不運化結聚涎沫閉塞

臟氣胃冷中虛遂成脹滿之病其脉多弦逆

半夏

湯洗

附子

炮去

枳實

炒

厚朴

姜炒

桂心已杜各當歸

茯苓

川椒炒出

甘草各一升人參五分

右作一服水口鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭眩

樞逆脉來浮弦

防風去芦枳殼麸炒桔梗去芦

赤芍藥

桂枝已杜各木香灯見人參

檳榔

川芎 當歸 陳皮

甘草各八分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

紫蘇子湯 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

氣走鹿瀝有聲大小便不利脉虛緊瀉

方見喘門

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹滿疝妨

飲食甚則腹痛

人參

青皮去白

陳皮去白

丁香已上各

白朮半斤

附子炮去

草薹仁

乾薑炮已上

厚朴姜製

甘草炙各五分

大正氣散 治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹滿有

妨飲食

白朮

陳皮各二

半夏湯泡

藿香葉

厚朴姜製

桂枝不見

枳殼麩炒

檳榔

乾薑炮已上

甘草炙半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

枳實湯 治腹脹發熱大便祕實厥多洪數病名熱脹

枳實炙炒

大黃酒洗各

厚朴薑製炒

桂心去皮不見

甘草炙一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去滓不
拘時服嘔者加半夏一錢

沉香交泰丸

治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為疝脹

沉香

陳皮去白

白朮三斤上各

枳實幾炒

澤瀉

當歸洗

白茯苓去皮

吳茱萸湯泡

青皮去白

木香二斤上各

大黃酒浸

厚朴姜製

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十丸食
前用白湯送下微利為度

木香塌氣丸

治中滿腹脹下虛損者

木香

胡椒

草豆蔻麩裹

青皮去白上

蘿蔔子炒

陳皮去白各

全蠍稍去毒二

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸不拘時用
米飲送下小兒用桑白皮煎湯送下

大異香散 治失飢傷飽痞悶停酸且食不能暮食病名穀脹

三稜

蓬朮

青皮

半夏麴

陳皮

藿香

桔梗

枳殼 炒

香附 炒

益智 已紅各甘草炙半

右分作二貼每貼用水二盞生薑三片棗一枚煎至一鍾去滓食遠服

氣 九 治氣膨脹

薑黃

青皮半已上各全蠍去毒

肉苳蔻 麴 煨

木香

丁香

胡椒已上各蘿蔔子炒去皮

右為細末研勻用酒生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸紫蘇湯下陳皮湯亦可

萬金丸 治諸食積氣積血鼓脹之類

石菖蒲 炒

斑蝥四只去翅足一朱同炒 斑蝥焦黃色煨去絲 備不用

右用麤布袋盛起兩人牽掣去盡貓毒骨了却將高蒲為細末以醋煎糊和丸如梧桐子大每服三五丸溫酒或白湯送下如治蠱脹加香附子末一二錢為末調服此藥治腫脹尤妙

遇仙如意丸

治氣積氣脹痰癖水蠱宜服

白茯苓

青皮

陳皮已紅各

白芷各

石菖蒲

人參

丁香

三稜均

白朮

砂仁

官桂

蓬朮炮

遠志

木香已紅各 山藥半及

香附五及

牽牛八頭末

甘草五分

右為細末醋煎糊和丸如梧桐子大每服一百二十九臨睡溫白湯送下看老幼虛實加減服忌一切生冷硬物等鼓水蠱每服三百丸立消若風病加地骨皮一兩婦人月

事不調產後腹中有惡物並宜服之利後服水水一口即止住利後可服甘露散補之

甘露散

人參

白朮

茯苓

猪苓

各半及

滑石

六分

澤瀉

甘草

右為細末每服三錢食前白滾湯調下

撞關飲子

治關格不通氣不升降脹滿

丁香

不見

沉香

不見

砂仁

去殼

白豆蔻

去殼

三稜

去毛

香附

去毛

烏藥

已上各

甘草

各半

右作一服水二盞煎至七分食遠溫服

敷藥

治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻

各半

右為細末用醞醴胡麩和藥攤於綿紙上覆貼腫處仍以

軟綿裹住

華澄茄丸 治痞滿脹痛殺脹氣脹

華澄茄

砂仁

青皮

白豆蔻

羅蔔子

木香二已上各分

茴香油

肉豆蔻煨

辣桂

丁香二已上各分半 陳皮三分

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三十九空心用陳皮湯送下

十全九 治心腹痞悶脇肋脹滿食少多傷

丁香

木香略一

枳殼麩炒

京三稜去毛

蓬木

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁去殼

積榔二已上各兩

香附子炒四兩

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食前用米

飲送下

木香化滯散 破滯氣 治心腹痛悶

木香

薑黃

青皮 去白

縮砂仁 去殼

人參

檳榔

白木 已上各二錢

白豆蔻 去殼

藿香

橘皮

大腹子

白茯苓 去皮

白檀香

桔梗 五分 甘草 四分

右為細末每服三錢水一盞半煎至一盞食前稍熱服沸

湯點服亦可忌生冷硬物

治腹脹方

腹裏胃間久痞疼

多因氣食動脾經

縮砂三和煎服

調理中湯效最靈

治久患腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或並小腹脹急

用芍方三和散二貼縮砂仁二十粒搥碎用水三盞生薑

十片燈心十莖同煎至一盞半去滓分作三次每服用共

藥調理中湯半貼立効

治腹脹方

腹脹脾疼怎抵當

椒薑之外有丁香

三般等分羅較細

次入白鹽和白湯

脾疼之疾皆因寒氣停滯積於胃膈或時嘔吐酸水不思飲食用胡椒良薑丁香三味等分為細末每服一大錢或二錢入鹽少許不拘時白湯點服

消脹丸 治久患腹脹

丁香

木香

檳榔

蘿蔔子

牽牛

各等分

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服十九丸空心用紫蘇湯送下

又方九治腹脹經久患泄瀉數升晝夜不止服藥不驗者乃氣

脫也宜用此

右用益智子煎濃湯服立愈

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香

草豆蔻

蒼朮

米泔浸三分厚朴四分

當歸

五分

青皮

益智仁

白茯苓

去皮

陳皮

澤瀉

乾生薑

吳茱萸湯泡

半夏

乙上各二分

升麻

芫胡

各一分

內經曰留者行之結者散之以芫胡升麻之若平行少陽陽明二經發散清氣運行腸分為君以生薑半夏草豆蔻益智仁辛甘大熱消散中寒為臣以厚朴木香蒼朮青皮若辛大溫通順滯氣以當歸陳皮人參之辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降以若泄之吳茱萸之苦熱泄之者也氣之薄者為陽中之陰茯苓甘草澤瀉酸平氣薄引

溼濁陰之氣自天而下故以為佐氣味相合散之泄之上
之下之使清濁之氣各安其位也范天驥夫人先因勞役
飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則不能暮食
兩脇刺痛診其脉弦而細至夜濁陰之氣當降而不降臍
脹尤甚大抵陽主運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運
化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃
中生發之氣上行陽道又以前藥助之使濁陰之氣自此
而降矣

右件以咀都作一服用水二盞煎至一盞去滓食前溫服
忌食生冷硬物

鷄矢醴

治心腹脹滿且食不能暮食由脾元虛弱不能剋制

於水水氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣不宣流
上下痞塞故令人中滿且陽氣方長穀氣易消故能食暮

陰氣方健穀不得化故不能食其脉沉實滑病名穀脹
右用鷄矢白半升以好酒一斗漬七日每服一盞食後臨
卧時温服

奇効良方四十一卷

奇効良方卷之四十二

積聚門

附論

鍼經云夫積者蓋厥氣生足悒七生胫寒胫寒則血脉凝澁凝澁則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膈脹膈脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血澁於腸外有寒汁沫與血相搏則併合凝聚不得散而成積矣或外中於寒內傷於憂怒則氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裹不散津液凝滯滲著而不去而成積矣且如見於五臟者各有名焉肝之積曰肥氣以季夏戊巳日得之何以言之肝病傳於肝上當傳脾上季夏適王王者不受邪肝復欲還脾上不肯受故留結為積故謂之肥氣以季夏戊巳日得之心之積名曰伏梁脾之積名曰痞

氣肺之積名曰息賁腎之積名曰奔豚此其五積之名積者陰
氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣
之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成其始發者有
常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣
也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是
別知積聚也又有七癥八瘕又有石瘕腸覃陳無擇論癥瘕屬
肝部積聚屬肺部夫癥者證也瘕者假也假物以成形然有七
癥八瘕之名經論亦不詳出雖有鮫蛇血肉髮虱米等七證初
非定名偶因食物相感而致患尔若婦人癥瘕則由內外不內
外因動傷五臟氣血而成古人謂為疝疾以蛟蛇等為生瘕然
亦不必泥此並屬血病蛇髮等事皆出偶成但飲食間誤中之
留聚假血而成自有活性亦猶米微中僧病噎者腹中有一物
其狀如魚即生瘕也又有石瘕岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客

于子門子門閉塞惡血當瀉不瀉衄血留止日以益大狀如懷
子月事不以時下皆生於女子可導而下寶鑑曰夫膀胱為津
液之府氣化則能出矣今寒客於子門則必氣塞不通血壅不
流而衄血以止之結硬如石是名石瘕也此氣先病而血後病
故月事不來則可宣導而下出者也故雜經云任之為病其內
苦結男子為七疝女子為瘕聚此之謂也非大辛之藥不能已
又有腸覃岐伯曰此病寒氣客於腸外與胃相搏不得榮養因
有所繫聚而內著惡氣乃起瘕肉乃生其始生者大如鷄卵稍
以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月
事以時而下此其候也夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳道為
事乃肺之府肺主衛上為氣上得氣則泄寒則凝令寒氣客於
大腸故衛氣不榮有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是
名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣乃起瘕肉

乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也此氣病而血未
病故月事不斷以時下此非妊娠在乎脉辨原病式曰癥者腹
中堅硬按之應手謂之癥也聖惠方謂癥猶證也然水臌柔順
而今反堅硬如地者亢則害承乃制也癥者腹雖硬而忽聚忽
散無有常準故聖惠方云癥猶假也以其病癥未及癥也經曰
血不流而寒薄故血內凝而成癥也腹內結痛也經曰小腸移
熱於大腸為虛癥謂小腸熱移入大腸兩熱相搏則血溢而為
虛癥血溢不利則月事沉滯而不行故云虛癥為沉虛與伏同
若癥為証誤矣然則癥病亦有熱者或陽氣鬱結怫熱壅滯而
堅硬不消者非寒癥癥也以脉別之王氏謂脉沉伏者癥也駛
堅者癥也故難經乃言五積為病且如肝之積曰肥氣在左脇
下如覆杯久不已令人發欬逆痰癰連歲不已心之積曰伏梁
起臍上大如臂上至心下久不已令人病煩心脾之積曰痞氣

在胃脘覆大如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲冷不為肌
膚肺之積曰息賁在右脇下如覆杯久不已令人洒淅寒熱喘
嗽發肺癰腎之積曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或
下先時久不已令人喘逆骨痿少氣此五積之狀各隨五臟之
經發病故不同也東垣云且積之為病或因暴怒七情之氣或
六淫之邪其初甚微導引去之可也留而不去遂成五積治當
五辭之法經言積之注於陰者蓋憂思傷心重寒傷肺忿怒傷
肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出浴則傷腎
積之所成由自來矣有言積聚有言癥瘕有言痰癖雖名異而
病同東垣先生隨經用藥制立五方治五積各有所主論當察
其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉无逆天時詳
藏府高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削
之消者安之糜者鹹而更以苦瀉之全真氣節飲食慎起居和

其中外可使畢已君以大毒之劑攻之積不能除反傷其氣終
難治矣許季士解其要畧大抵治積以所惡者攻之以所善者
誘之則愈且如礪砂阿魏治肉積葛根麥蘖治酒積木香檳榔
治氣積桃仁紅花治血積南星半夏治痰積牽牛甘遂治水積
三稜蓬朮治癖積礞石巴豆治食積雄黃臙粉治涎積各從其
類而封證治之若用群藥之藥分其勢則難取効須是認得分
明是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不爾反有所損要
在臨時消息也脉經曰脉來細而附骨者積也寸口積在胃中
微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關下積在心下微下關
積在少腹尺中積在氣街脉出在右積在右脉出在左積在左
脉兩出積在中央各以其部處之脉來小沉而實者胃中有積
聚下食也即吐肺積脉浮而毛按之辟易心積脉沉而芤上下
先常處肝積脉弦而細腎積脉沉而急脉沉重而中散者因寒

食成癥瘕左轉而沉重者氣癥在胃中右轉出不至寸口者內
有肉癥也紫古云養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人
自無容地而出今其真氣實胃氣強積自消矣紫古之言豈欺
我哉內經曰大積大聚衰其大半而止痛實中有積氣大毒之
劑尚不可過况虛中有積者乎此乃治積之一端也邪正虛實
宜詳審焉此皆古人論脈病證治實後人之龜鑑為醫者能体
古人之心為心治證无不効矣

積聚通治方

散聚湯 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞
痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏

湯炮七次

檳榔

當歸

杏仁

湯炮去尖

附子

炮去皮

陳皮

茯苓

去皮

枳殼

去穢炒

厚朴

姜製

桂心

川芎

吳茱萸

湯泡

甘草炙各

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服大便不

利加大黃

息實湯 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒匕寒熱氣

逆喘欬發為肺癰其脉浮而毛

半夏湯炮

桂心

人參去芦

吳茱萸湯炮

桑白皮炙

葶藶

甘草炙各一

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服

奔豚湯 治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時

久不愈病喘逆骨疼少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙

川芎

當歸

白芍藥

黃芩

甘草炙各一

半夏湯炮七

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰涎口苦吞酸常服順氣寬中除痰癖消積聚

枳殼

益智

陳皮

京三棱

枳木

檳榔

肉桂一社各

肉苳蔻

厚朴

青皮

木香

乳蘆

甘草半各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服
大心氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

益智

陳皮去白

蓬朮

京三棱

青皮去白

桔梗去芦

香附炒去毛

藿香葉

肉桂一社各

甘草一

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

廣茂漬堅湯

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不

能大小便滯滯上气喘促面色痿黃通身虛腫

方見脹滿門

木香化滯湯

治因憂氣食濕凝結於中脘腹皮微痛心下痞

滿不思飲食食之不散常上痞氣

木香

芫胡

橘皮

草薺

一上各半

當歸

枳實

一錢各

半夏

二錢

紅花

甘草

炙各

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

溫白丸

治心腹積聚癥瘕積塊大如杯椀心膈脹滿如有所

礙十種水腫痞塞翻胃吐逆並皆治之

皂角

去皮

巴豆

去心

厚朴

去粗皮

吳茱萸

湯泡

紫苑

去葉

茯苓

去皮

人參

去芦

蜀椒

去目

出汁

肉桂去粗皮

乾薑炮

苤胡去芦

桔梗去芦

菖蒲各一

川烏炮去皮脐

右為細末入巴豆再研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸食前生薑湯送下

勝紅丸 治脾氣滯胃隔滿悶肚腹疼痛氣促不安嘔吐清

水丈夫酒積婦人血積小兒食積並皆治之

青皮

陳皮

三稜醋炙

蓬朮醋炙

乾薑炮

良薑炮 各二 香附炒 各二

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九食前用生薑湯送下一方用蘿蔔子一两炒

香稜丸 治五積破痰癖消癥瘕塊散積聚

木香不見

丁香不見

青皮夫白

川棟子

茴香各半

三稜炮 枳殼去穢

蓬木

必用去殼已豆三不用
已豆黃色去已豆不用

右為細末醋煮麩糊為丸如梧桐子大以硃砂末為衣每服五十丸不拘時用炒生薑鹽湯送下溫酒亦可

妙應丸

治老人虛人一切虛寒痲痺積塊攻脹痰痛

黑附子

二枚各重七錢去皮剉作釐子

硃砂三錢用水一盞化在
中炒上熱乳和

木香

七錢半不見火破故紙炒

草撥各一

右將飛過硃砂末入在附子罐內仍用附子末蓋口用麩和成裹約半指厚以慢炭火內煨令黃色去麩同木香等藥為細末却將厚裹附子墊麩為細末醋調煮糊為丸如菽豆大每服十五丸至二十九丸食後用生薑湯送下

肥氣丸

治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久不

愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸

各半

青皮一兩

蛇含石七錢半

三稜

蓬米

鐵孕粉

各三兩與三煨木同入醋煮一炷時久

右為細末醋煮米為丸如棗豆大每服四十九用當歸浸酒下食遠服

伏梁丸

治心積起臍上至心大如臂久不已病煩心身體脾

股皆腫環臍而痛其脉沉而芤

伏苓

去皮

厚朴

去皮姜人參去芦

枳殼

去穰

三稜

煨

半夏

錫炮

白朮

各等分

方為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食遠用米

飲湯送下

化氣湯

治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不

能取及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣痛

方見氣門

痞氣丸

治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不仁黃疸

飲食不為肌膚心痛徹心其脉浮大而長

赤石脂

火煨

川椒炒出

乾薑炮二兩桂心

附子

酪半

大烏頭

炮去皮臍

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十丸食遠用米湯送下

積氣丹

治一切新久沉積氣塊面黃羸瘦癥瘕積聚口吐酸

水並皆治孕婦勿服

檳榔二箇

芫花

三稜

樟柳根

牛膝

黃連

廣茂

已上各一兩

白牽牛

大戟

大黃

甘遂

青礞石

乾薑

乾漆已上各半

硃砂一兩

肉苳蔻二箇

巴豆

木香二兩

青皮

石菖蒲

陳皮已上各

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服一九臨卧用紅棗煎湯送下有積者肚內作声病退為度

木香通氣丸

治痰癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽此藥順氣消

痰進飲食散痞氣

木香

人參

兩半

陳皮

黑牽牛六分

兵部

丁香

各半

三稜炮

廣茂炮各

木通

半夏

姜製

茴香炒

神麩

麥蘖

青皮

二兩

玄胡索二兩

右為細末米糊為丸如小豆大每服三十四丸食後生

薑湯送下日進二服

天南星丸

去酒積酒毒

南星

一斤端正者淨洗先於淨地上掘窟窩五寸深一

淨以黃酒一斗燒之將南星置其中覆以瓦盆用所

土泥盆封縫勿令透氣一宿凍早取出用酒并水各二

升和洗淨切作片
子焙乾研為細末

硃砂一兩細研
木飛過

右研勻用生薑汁煮糊和丸如梧桐子大以硃砂為衣每
服五十丸至百丸不拘時生薑湯送下

妙功丸 專治榮衛失調將理飲食不節冷熱所傷或飲醉酒
狂陽流蕩強為傷損或大飽暴怒傷氣或憂驚而氣結不
升或悲痛而氣消不聚或鬱結而氣不散或傷重而力不
生或乘喜而氣散不斂七情所感衆事冗繁起居失常動
勞不一四時乖戾觸冒天地之司氣留積於榮衛之中胃
恆風寒濕氣疑滯經絡之間或五臟中各生蓄積之恙或
六腑中各長留結之聚或生癥瘕癖塊或留聚而為腫為
癰瘡瘍疥癬風痺痿厥及黃疸水濕蠱毒鼓脹等疾功効
不可俛述

大黃

滑石各四兩

黃連

鬱金

蓬朮

檳榔

黃芩

已上各

黑牽牛末

八分

輕粉

礞石

煨各

川芎

二分

白芷

三升

沉香

木香

各半

粉霜

半升或

右除輕粉礞石粉霜別研外為細末和勻滴水為丸或稀

糊和丸如梧桐子大量虛寒加減丸數食遠白湯送下

磨積丸

治腸胃虛寒氣癖流於兩脇氣逆喘急久則榮衛凝

滯積為癥脹多致不救

胡椒

十粒

五

木香

不見火

全蠍

去毒

右為細末粟米飲為丸如葶藶大每服三十九食遠用橘

皮湯送下

二香化積丸

治諸食積

丁香

木香

各一

胡椒

大者五

大烏梅

八分

去

巴豆

去

青皮

陳皮

砂仁

各半

右為細末用米醋煮糊為丸如梧桐子大每服九九食前
生薑湯送下

化鐵丹 治氣塊等疾

香附子

四及去毛通刺用口豆三十粒去殼膜研細
用冬十取出用水洗乾
只用一半香附知用換際

五冬十

取出用水洗乾

杏仁

去皮

高良薑 多年堅
土破

三稜

陽萎

蓬木

陽萎

半夏 陽萎
青皮 去白

陳皮

各一

丁香

半及

肉荳蔻 麩裹煨
半及

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸空心

用生薑湯送下

消痞丸 治心下痞滿及積年久不愈者

薑黃

白木

各一

枳實 炒半

半夏 洗

人參

橘皮

各一

黃連

黃芩 各六

縮砂

澤瀉

厚朴 各一

猪苓 各一

神麴炒

乾生薑

甘草炙各

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十九至

百丸食前用白湯送下

荆蓬煎丸 治癆瘵眩癉冷熱積聚宿食不消嘔吐辛酸久服

消積聚進飲食止嘔吐

荆三稜酒浸三日

蓬木

諸浸剉碎用去皮巴豆二十粒於石器內炒黃色去豆不用

木香

枳殼麩炒

茴香

一方用此中八巴豆二十粒同炒黃去去豆不用

青皮

檳榔略

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服五十九食

後用溫水送下生薑湯下亦可

鷄瓜

三稜丸

治五臟癉癉氣塊

鷄瓜

石三稜

荆三稜

木香

青皮

陳皮半斤

肉苳

檳榔略

硃砂

右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十三丸生薑湯下

二稜煎丸

消癥腹積聚化痰飲寬中順氣治心腹堅脹脇下

緊硬喘滿短氣不進飲食大便或泄或閉

荆三稜

生剉另為末以酒三升石器內熬膏神效

蘿蔔子

微炒

麥蘖

硃砂飛煎如青皮去白

乾漆

炒已上各二及

杏仁

去皮尖炒一及

右為細末以三稜膏和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前米飲下加阿魏半兩名阿魏丸

歸露丸 治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼

痛腹不得伸乃脹單結癥之候

荆三稜

蓬莪朮

二味各一及並用酒浸入已煎二十煎同炒黃

乾漆去

川烏半斤

研砂四斤

輕粉一斤

荷香生炒

青皮去白

雄黃另研

川山甲各三斤

麝香五分

右為細末研勻生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服二

十九生薑湯送下溫酒下亦可

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上搶心痛及繞臍腹痛不

可忍

大黃三兩新汲水浸一宿

乾薑一兩

大附子半斤去

鱉甲一兩半用醋炙

右為細末用三年米醋一升先煮去四五合後和藥丸如

梧桐子大每服二十九空心醋湯溫酒米湯皆可送下取

下積如魚腸爛肉膿血青泥是効

三聖丸 治積年癥瘕癖塊諸藥不瘥者用此至効

舶上硫黃

水銀各五

礪砂二升

右三味於乳鉢內研如粉却以生鐵銚內文武火溶成汁以火筋撻令勻停冷刀刻下以紙裹置地坑內一宿取出復研細次以

赤芍藥

當歸

蓬朮

紅花

荆三稜各二升

並細剉以好酒一升煎至一半漉出砂盆內研生布濾取汁再熬放冷入飛羅白麩煮糊為丸如粟豆大消磨癖塊空心溫酒吞下三九至五九婦人產後傷於飲食結伏腹脇間時發疼痛當歸浸酒下七九至十九

軟金丹

治血積食積及治婦人心腹胃脘急痛或淋秘產後

經病刺痛乾血氣勞性寒熱夜多盜汗

當歸

五升

乾漆

去酒各斑蝥去頭翅

調秋

輕粉

粉霜

各一

右研為末研棗肉膏旋丸如小豆大每服一九空心用新水送下

麴藥丸

治酒積癖不消心腹脹滿意酸呃逆不食脇肋疼痛

神麴

麥藥

黃連

半斤對同巴豆
三斤對黃連五斤

右為細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五十九食前用生薑湯送下

酒酸丸

治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇酒即吐久而成癖者宜服

癖者宜服

雄黃

如皂角子大

巴豆

不去油皮

蠟稍

各十五个同研
入白麴五斤半

右研細水和丸如豌豆大候稍乾入麴炒香將一九放水

中浮即去麴每服二九温酒下茶下亦可

狀元丸

治膈氣酒積涎嗽腹滿吐逆

方見隔壺明

破塊丸 治瘴氣結成氣塊腹中不消服之立効

華嚴

大黃

各一

麝香

以許

右為細末研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用冷酒送下冷湯下亦可

秘傳掌中金丸

凡真氣衰弱飲食多傷停於胃膈往往用感

應丸如聖膏理中丸之類又不能尅化任意取轉致傷真

元臟腑別生他疾惟此藥能消酒食化痰飲寬中利膈久

服永無胃膈不快之疾不動臟腑不損真元加檳榔木香

各一兩名檳榔丸又調氣

陳皮

一斤去白濕外生薑半斤先與陳皮對下切片如伏中仁味晒乾

白豆蔻

炒仁

各一

半夏

三升湯洗七次生薑汁和并伏中兩炒

麥麩

以

甘草

各二

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三四十九
食前生薑湯送下

法制積槲

治酒食過度胃膈膨滿口吐清水一切積聚

鷄心槲

一兩切

縮砂取仁

白荳蔻

取仁

丁香

切作細末

粉草

切作細末

橘皮

去白切

生薑

各半斤切

鹽

二兩

右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋內煮乾焙乾
入新瓶收每服一撮細嚼酒下或為細末湯調服亦可

流氣丸

治五積六聚癥瘕癖塊留飲已上此積皆係寒氣客

搏於腸胃之間久而停留不去變成諸疾此藥能消道滯
氣通和陰陽消宿飲雖年高氣弱者亦皆可服

木香

川茴香

微炒

蘿蔔子

補骨脂

微炒

青皮

去白

紅橘皮

去白

石薔蒲

蓬茂朮

炮

神麩微炒

華澄茄

縮砂仁

枳殼去穢炒

麥蘖微炒

檳榔已上各

牽牛微炒

一兩半

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服五十九食後細嚼
白芷寇一枚白湯送下

礪砂煎丸

治積聚久不消散腹脇脹滿面無顏色四肢不和

礪砂一兩不夾石者細研以微火炒

芫花一兩為細末

木香

桂心

蓬莪朮

川烏頭炮去

荆三稜

當歸已上各

川大黃剉少

一兩薑甲 各一兩

青橘皮焙

乾漆搗碎炒

右為細末以礪砂膏入少蒸餅和搗二三百杵丸如梧桐

子大每服十五丸食前溫酒送下

取積妙應丸

家傳經驗專取男子婦人小兒諸般積氣多因

茶酒生菓肉麩所傷又為悲憂喜怒之氣鬱結心懷積成

脾腹癥瘕大如杯碗不消諸種蟲積及治黃腫水腫遍身浮腫翻胃吐食九種心疼一切風證婦人血瘕淋帶經脈不通腹膨如懷胎孕及成鬼胎小兒脾疳積滯並皆治之此藥不動元陽真氣服後肚腹消平亦不疼痛雖年幼氣弱小兒加減服之有利無害

檳榔

大黃

各一斤

牽牛

二斤

蕪荑仁

貫衆

雷丸

各半斤

鶴虱

錫灰

各四兩

阿魏

二兩另以酒化開

右為細末用皂角去皮弦子淨一斤半熱水泡浸槎捺水汁瀝去滓與藥末皂角水再入糊為丸如桐梧子大每服秤四錢重作一服五更用葱白七根煎湯送下仍以棗三五枚食之壓藥吹早天明候臍腑一行後取下惡積之物如有積者去盡數行如止見稀水無積物却以溫薄米粥

補之

沉香海金砂丸

治一切積聚脾溫腫脹肚大筋青羸瘦惡證

沉香二錢

海金砂半錢

輕粉一錢

牽牛末一兩

右為細末研獨頭蒜如丸為泥如梧桐子大每服三十九
加至五十九煎百沸燈心湯通草湯空心服更量馬實加
減丸數取利是効

萬病無憂散

治諸般氣積腫脹

檳榔半兩

大黃一兩

甘草半錢

黑牽牛半兩

右為細末每服三錢不拘時茶清調服日進二服

治酒食積水病

石榴雙用又連皮

三棱巴豆五靈脂

瞿麥杏仁車前子

大戟羌花甘遂宜

石為細末醋糊為丸如菜豆大每服七十丸

前用溫白湯

送下

三稜丸 治五積六聚七癥八瘕破一切血下一切氣

三稜

大黃

乾漆

巴豆去皮

礪砂各兩

右為細末醋糊和丸如菽豆大每服三九至七九空心用

米湯送下量虛實加減服

剪紅丸 追蟲取積利五臟不損六腑遠年近日諸般蟲積及

血塊宿食不消滯人赤白痢疾並皆治之

檳榔

巴豆

土硫

白牽牛

蕪荑

雷丸

右為細末滴水為丸如梧桐子大硃砂為衣每服一九食

前密水送下取下病積為驗白粥補之

馬家五積丸 治諸般積聚

硝砂仁

紅豆

赤小豆

黑牽牛

蘿蔔子

丁皮

已上各一兩同炒

香附子

荆三棱

青皮

陳皮

乾漆

大戟

桔梗

枳殼

已上各一兩對大塊以慢火炒令變紫色黑色

右共為細末如碾刺得藥滓再炒令黑色再碾為末以好米醋煮麩糊和丸如菉豆大每服十五丸至二十九丸不拘時淡生薑湯送下

削堅丸

治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹脹滿瘦悴少

食宜服

鼈甲

醋浸兩宿去骨開再

沉香

細松煙墨燒去

乾漆

碎炒令烟出研末

荆三棱

如半棗大每醋浸

肉桂

去粗

乾薑

沒藥

另研

蘿蔔子

乾蠟

去毒

胡椒

檳榔

木香

阿砂通明者為末用湯內乳香另研

粉霜另研

輕粉已上各

右件為細末研勻用好醋煮薄糊為丸如小棗豆大每服二十九淡醋煎生薑湯送下日進二服夜間一服如未漸加丸數服微利即減

鼈甲丸 治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲黃一按可用重四兩淨洗以醋和

荆三稜炮三兩

川大黃二兩到炒枳殼二兩用麩炒

木香不見火

桃仁湯浸去皮尖雙仁用麩炒

右除鼈甲外搗為細末後泥一風瀝子上開口可安得鼈

甲取前藥末并桃仁膏內鼈甲中用好米醋二升時時旋

取入鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥

焙乾搗為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每服二

十九空心用溫酒送下晚食前再服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人

發欬逆嘔瘕連歲不已

厚朴

半兩

黃連

七錢

芫胡

二兩

川烏

炮去皮一錢二分

川椒

炒出汁四錢

巴豆霜

乾薑

炮各五分

皂角

去灰強子畏

茯苓

去皮各錢半

廣茂

炮

人參

去芦

昆布

洗

甘草

炙各二錢半

右為極細末入巴豆霜研勻煉蜜和丸如梧桐子大物服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便微澀再從兩

九加服周而復始積減大半勿服在後積藥依此法服春

夏秋冬另有加減法秋冬加厚朴半兩減黃連一錢半治

風癩於一料中加人參茯苓神萸蒲各三錢黃連即依春夏

用七錢雖秋冬不減空心用淡醋湯送下

半夏散 治伏梁積心下硬急滿悶不能食胃背疼痛

半夏湯洗去屑

鼈甲

醋炙各一兩半

川大黃

剉炒

訶梨勒皮

桂心

前胡

當歸

焙

青橘皮去白

檳榔

木香

荆三稜

炮已上各一兩

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時稍熱服

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下堅牢不散胃中連背多疼

乾漆搗碎炒烟盡

芫花

醋拌炒

鼈甲

醋塗炙去泥

硃砂研已上各一兩

桃仁去皮尖炒

木香

不見火

川烏頭

去皮臍剉鹽拌炒黃已上各半兩

雄黃細研

麝香

研各一分

右為細末入別研藥令勻醋煮麩糊為丸如菉豆大每服

十九食前用溫酒送下

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃心

去黃一兩半

厚朴

去粗皮

人參

各半

黃芩

三錢

桂心

去粗皮

扶神

去粗皮

丹參

炒已上

川烏

炮去

皮

巴豆霜

薑瀟

乾薑

炮已上

紅豆

二分

右為極細末入巴豆霜研勻煉蜜和丸如桐梧子大初服

二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便澹再從兩丸

加服食遠黃連湯送下周而復始積減太半勿服秋冬加

厚朴半兩減黃連半兩黃芩全不用

蘇紅丸

治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

丁香

木香

沉香

硝砂仁

青皮

陳皮

檳榔

蓬莪朮

草菓

去皮

牽牛

已上各

粉霜

肉苁蓉

各一錢

白茯苓

去皮

人參

各半

蒜

二百枚

一半火煨

生

脾之積痞氣丸

在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發

黃疸飲食不為肌膚

厚朴

去皮四錢半

黃連

去蘂八錢

吳茱萸

洗三錢

川烏頭

炮裂去

川椒

炒各半錢

白茯苓

去皮

澤瀉

各一錢

人參

已上各一錢

茵陳

酒炒

乾姜

炮

砂仁

已上各一錢半

巴豆霜

官桂

各四分

黃芩

各二錢

白朮

各二錢

右為細末入別研藥和勻煉密為丸如梧桐子大初服二
九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九加
服淡甘草湯送下食前周而復始積減大半勿服秋冬加

厚朴五錢半黃連一錢減黃芩一錢

半夏湯 治肺積息賁欬嗽

半夏

湯洗去

細辛

去苗

桑根白皮

炙

前胡

去芦已上各一兩半

桔梗

炒

貝母

去心

茈胡

去苗

訶梨勒

根去

人參

去芦

白朮

各

甘草

炙各一兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服食後夜卧各一服

枳實散

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利

枳實麩炒

木香

檳榔

甜葶藶

筒煎炒

赤茯苓

去皮

五味子

訶梨勒

去核

甘草

微炙已上各半兩

杏仁

一兩湯洗去尖雙仁麩炒黃色

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分同煎至六分去滓

不拘時溫服

右為細末以生熟蒜研如膏生絹紐取汁和藥為丸如梧桐子大每服五七九加至十五丸食後淡鹽湯送下忌鹹酸魚酢茶醬醃藏鷄鴨生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥一百日

此三行係前蒜紅丸尾的

氣滿

治脾積疔氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴

炒

麥蘖

炒

桂心

去粗皮

郁李仁

半生半炒

厚朴

去粗皮

白朮

已上各

大腹子

二枚

牽牛

生半炒

良薑

兩半

甘草

兩

石叻咀每服三錢水一盞生薑二片棗一枚擘破同煎至

七分去滓食遠稍熱服日三

鼈甲丸

治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散腹脇疼痛體瘦

成勞不能飲食

鼈甲

三兩去

兩去

以米醋

一小盞化

附子

炮去

皮

荆三稜

炮

乾漆

為碎

木香

已上各

吳茱萸

半兩湯

川大黃

二兩剉碎

乾

右為細末醋煮麩糊為丸如桐梧子大每服二十九空心

用溫酒送下

沉香飲子

治痞氣升降陰陽

沉香

木香

羌活

桑白皮微炒

人參

獨活

白茯苓

紫蘇葉各等分

右咬咀每服三大錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至

七分去滓食前溫服二滓又作一服

肺之積息責丸 治右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱

喘欬發肺壅

厚朴薑製

人參二錢

巴豆霜四分

黃連去鬚炒

乾薑炮

川椒炒出汗

白茯苓去皮

川烏頭炮裂去皮

紫苑去苗

陳皮

天門冬

白芷寇

桂心去皮

桔梗

三稜各一錢青皮五分

右為細末入已豆霜研勻煉蜜為丸如梧桐子大初服二

丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便溏再從二丸加

服淡生薑湯下食遠服周而復始積減大半勿服秋冬加

厚朴半兩咸黃連七錢

沉香石斛湯 治腎臟積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胃脇

沉香

石斛

陳麴

炒已上各一兩

赤茯苓

去皮

人參

巴戟

去心

桂心

去粗皮

五味子

微炒

白朮

芎藭

已上各三分

木香

肉苳蔻

各半兩

右吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至六分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上衝心胃令人喘

逆骨痿少力

木香

檳榔

煨

磁石

煨醋

訶梨勒

去核

沉香

牡蠣

煨

桂心

去粗皮

懷香子

炒

芎藭

白芷

已上各半兩

陳橘皮

湯浸去白三分

右為細末每服二錢炒生薑鹽湯下

沉香丸

治奔豚氣小腹積聚疼痛或時上衝心胃壅悶

沉香

檳榔

懷香子

桃仁

湯泡去皮微炒

阿魏

以少麩搜和作餅子

木香

一錢

胡椒

生用

硃砂

去滓取清內銀器中煎成霜研

吳茱萸

一分湯泡焙乾

青橘皮

去白焙

右為細末入硃砂研勻酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九食前生薑鹽湯送下

茴香金鈴丸

治奔豚氣

茴香

金鈴子

一兩每箇對作四片用鹽浸半兩炒熟去鹽

青皮

馬蘭花

石茱萸

吳茱萸

酒浸炒

山茱萸

去核

陳皮

各一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十九食前溫

酒鹽湯任下醫家發明名茴香練實丸有芫花一兩用醋

妙以糊丸量人虛實加減以利為度

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時
久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女子瘕
聚帶下

厚朴七錢

黃連

去心炒

石菖蒲

白茯苓

去皮

澤瀉二錢

附子

去皮

全蠍

去毒

獨活

一錢

川烏頭

丁香

各五錢

肉桂

二分

苦練實

三錢

巴豆霜

四分

玄胡索

半錢

右為細末入巴豆霜末研勻煉蜜和丸如梧桐子大初服
二九一日加一九二日加二九漸加至大便溏再從二九
加服淡鹽湯送下食前服周而復始病減大半勿服秋冬
加厚朴半兩如積勢堅大先服前藥不減於一料中如瘕
存性牡蠣三錢瀝石帶下病勿加

解鈴丸

治奔豚氣疼痛手足拳縮不可忍者

蠲稍去毒

茴香

一兩用青鹽一兩
細同炒和鹽用

蓬莪朮

用溫熱藥重煎
油內上燒過到

右為細末酒煮糊和丸如桐梧子大每服三十九空心用

溫酒或鹽湯送下

白芷薤散

治積聚心腹脹滿宿食不消氣刺疔痛泄瀉善噫

吞酸食即嘔吐手足逆冷

白芷

去皮三分

肉荳蔻

去殼一分

高良薑

木香

已上一各

桂心

去粗皮

附子

炮去

枳殼

陳橘皮

去白

人參

丁香

甘草

炙已上
各半兩

右為細末每服二錢食前用木瓜生薑煎湯調服

檳榔散

治積聚氣腹脇堅急心胃脹滿不能飲食

檳榔

荆三稜

桃仁

去皮尖

木香

已上一各

桂心

郁李仁

青橘皮

湯浸去白

各半兩

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

異香紅丸子

治一切積聚心腹疼痛婦人血氣攻注常服消

酒食破積氣

沉香

硃砂另研

史均子去殼蓬莪朮泔

硃砂另研

木香

荆三稜醋浸萆澄茄已上各

檳榔一枚

母丁香五粒

黑牽牛兩入炒熟取未半

巴豆者不去殼研肥

肉荳蔻一枚

右為細末研勻麩糊為丸如菉豆大以硃砂為衣每服三

丸食後用茴香湯送下欲微利加至五七丸

仙方內消丸 治酒食過傷脾胃等疾

青皮

陳皮去白

薑木米泔

百草霜

香附

三稜煨

芫花醋拌

破故紙

皂角

蓬木

乾漆

官桂

去尖已上各三兩

黑牽牛

半斤半生半炒

右為細末醋糊和丸如梧桐大每服三十九白湯子送下

一方有半夏三兩

七星丸

化氣消食

巴豆

一兩去皮心膜油煎令黃色

硃砂

細研肉苳蔻

檳榔

丁香

木香

乳香

已上各半兩

右為細末研勻以麩糊為丸如麻子大每服五丸用溫酒

或湯水下

鼈甲丸

治久積癥癖

鼈甲

大者一枚淨洗去筋膜麩累外面二三分厚上面用絲固濟泥一風炒安鼈甲在止兩別子入洗

半斤去尖雙仁研以米醋四升無灰酒三升研碎

兩同攪拌旋入向鼈甲中煎為膏取出盛於特用筆

甲去無腥青皮

麥蘖

肉苳蔻

沉香

剉

神翅

炒

大黃

生用

荆三稜

煨

檳榔

半生

丁香

木香

厚朴

去粗皮剉

桂心

已上各

芎藭

八兩

右為細末研勻用桃仁煎并煉蜜和丸如桐梧子大每服二十九空心用米飲送下

蓬莪朮散治久積癥瘕氣不消散脇下如覆杯多吐酸水面色痿黃或腹中疝痛

色痿黃或腹中疝痛

蓬莪朮

肉桂

去皮

枳殼

熟炒

荆三稜

煨

大黃

當歸

炒

檳榔

木香

已上各

芎藭

半兩

乾薑

炮半兩

鼈甲

二兩

赤芍藥

半兩

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時溫服

麝香丸 治久積癥瘕氣不羸或於脇肋作塊形大如杯或如

鷄子透隱皮膚或時疼痛堅硬如石宜服

麝香

別研

乾漆

炒烟

神翅

炒黃

麥蘗

炒黃

已上

鼈甲

醋炙

芫花

醋拌

蓬朮

煨

荆三稜

煨

萆薢

各二兩

右為細末研勻用醋煮糊為丸如梧桐子大每服十九食前用溫酒送下

三稜草煎方 治癥瘕及鼓脹

右用荆三稜一石細切以水五石煮至一石去滓更煎三斗汁於銅器中重釜煎如稠糖取出內密器中每服一匙七酒一盞溫服之日二服常令酒氣相續

檳榔湯 治癥瘕腹滿如鼓坐卧不安食即吐氣悶喘急

檳榔

二兩

赤茯苓

去皮

荆三稜

煨

陳皮

去白

芍藥

已上各一兩

食茱萸

三分

郁李仁

湯浸

去

兩

右吹咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓溫服空心于
後各一服

乾漆丸 破癥塊消積氣

乾漆

炒烟盡
四兩

附子

泡去
皮 青皮

去白
炒 懷香子

大黃

炒

芫花

陳皮

去白
炒 白牽牛

蓬朮

煨

木香

不見
火 檳榔

荆三稜

桂心

已上各
二兩

五靈脂

用瓦
火煨冷烟盡
取灰二兩

皂角

長五寸許以麻
縛定用泥
固脚灰煨烟
灰取灰二兩

右剉碎每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服空心日

午臨卧各進一服

取積一塊氣丸 治男子婦人氣積

檳榔末

杏仁末

羌活末

黃芩

神麴

麥蘖

雷丸

牽牛末

江子

去皮油取

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大硃砂為衣每服火
人十九三歲服三丸五歲服五丸臨睡時用溫白湯送下
以利為服

當歸黃散

治諸癥結痛起於脇下按之而堅防痛不能飲食

漸加贏瘦

當歸 切焙

桔梗 炒

木香

鼈甲 用醋頭

桂心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒

吳茱萸 水淘炒

右除桃仁外為末却入研勻每服三錢水一盞煎至七分
去滓溫服遂日空心日午夜各一服

麥蘖湯

治食癥燕酸吐津曾膈疼痛氣噎食飲進退

麥蘖 炒

神麴 炒

紫苑

去苗

厚朴

去粗皮生

大黃 剉

當歸 焙

鼈甲

醋炙

檳榔

各半

右剉碎每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服空心日
午臨卧各進一服

八靈丸

治食癥氣塊痰癖等疾

木香

荆三稜

石三稜

鷄爪三稜

檳榔已上各

兩

肉荳蔻半兩

巴豆去心

膜研各

砂一分

各

右為細末研勻醋糊為丸如小豆大每服五七丸丈夫生
薑湯下婦人醋湯下痰癖氣木香湯下