

太醫院經驗奇效良方大全

奇効良方卷之二十三

咳逆門 附論

內經云歲金太過咳嗽之發亥逆少陰二氣咳嗽人書云咳逆仲景所謂噦是也胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦難知云夫咳逆證活人斷為噦逆其說似是而非蓋噦者乾嘔也若有物直出則為吐也物旋出則為嘔也嘔無物出則為噦也亥逆者或水漬於肺而心下痞或連續不已而氣逆或喜笑過多而氣噎或然飲而錯喉而氣捨或急食乾物而氣塞皆能作咳逆之聲連續不絕俗謂之吃忒是也大抵亥逆者不順之義吃忒者差錯之義二者皆氣不得下為火熱托之而使上至咽喉中噎而止也人或以紙撲鼻噎而止或詎冤盜賊因恐而止或鼻熱悶食香而止皆抑之駁之而使氣下也千金以咳嗽上氣者為病肺脉散者死是心火刑於肺金也格致餘論云吃病

氣逆也氣自膀下直衝上出於口而作聲之名也書曰火炎上東垣謂火與元氣不兩立又謂元氣之賊古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等剝治之未審孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃而養胃土傷損則木氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此以為危證然亦有實者今以治驗略言之有一弱人暑月因大飢大怒得滯下疾渴飲蜜水滯下緩而吃作倦甚知其因下之而陰火盛以人參白朮煎湯調益原散與之數日而止又有膏梁老人久喘病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃你膠大棗以爲難以形瘦觀之尚可以人參白朮湯下大補丸以補血不數日獲安此二人虛之為也又一女子性躁味厚暑月因大怒而吃作每作則舉身跳動神昏不知問之乃暴病視其形氣俱實

遂以人參蘆煎湯飲一椀大吐頓瘥數椀大汗出一日而安
此暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火
侮肺故吃大作而神昏參蘆善吐痰盡氣降而火衰金氣復位
胃氣得和而解矣難知云治人以咳逆為歲謂可下之宜調胃
承氣陽是邪氣在胃故斷之為歲是則然矣抑不思咳逆者是
足陽明失下傳手太陰治人但言其火之本不言其火之標炎
上至極高之分而亥逆也合而觀之歲與咳逆同一熱也分而
言之歲為本為噎為胃為中寒逆為標為心為肺為上若標病
應見上當治標不必名歲若言依歲使後人只見噎胃本而不
見心肺標也三因云亥逆之病古人以為噫耳多因吐利之後
胃中虛寒遂成此疾亦有胃中虛膈上熱噦至八九聲相連收
氣不回者大抵傷寒久病後老人虛人及婦人產後多有此證
者皆病深之候也亦有歲而心下痞擣者有痰水所謂別無惡

候者也丹溪云吃病者氣逆也氣自脾下直衝上出於口而作聲也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於心朱奉議首論然降而已下豈無超韻之士而極言者孰不謂之熱而有此乎至於海藏深發前人所未發故猶有陰證發之說但形證少差耳大抵治法虛則補之補中須分寒熱或因汗吐下誤服寒涼過劑當以溫而補之如脾胃陰虛火逆衝上當以平而補之挾熱者涼而補之若夫實者如傷寒失下地道不通因而咳逆當以下之如痰飲停蓄心下暴怒氣逆痰厥此等必形氣俱實別無惡候皆當隨其邪之所在而涌之泄之利之也諸論具詳皆前人所述學者當守規矩以治之

咳逆通治方

橘皮竹茹湯

治吐利後胃虛膈熱而咳逆

橘皮

三錢

竹茹

三錢

人參

二錢

甘草

右作一服水二鍾生姜五片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

柿蒂湯 治胃膈痞滿咳逆

柿蒂五錢 丁香三錢

右作一服水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服

半夏生姜湯 治噫欲死

半夏六錢 生姜五錢

右作一服水二鍾煎至一鍾分作二服不拘時服

桂枝白朮丸 治痰涎止咳嗽散痞滿壅塞開堅結痛悶進飲食調和五臟

辣桂 乾生姜各二半夏湯泡半兩
生姜各七次

白朮 砂炒去白澤瀉各半兩

茯苓去皮各一兩

右為細末麪糊和丸如小豆大每服二三十丸生姜湯下日三服病在膈上食後服病在下食前服病在中不拘時

服一方用黃芩黃連各半兩水丸服効

小訖胡湯 治傷寒熱證咳逆嘔噦

方見傷寒門加柿蒂煎服

灸咳逆法

其法於患人乳下一指許正與乳相直骨間脂處如婦人即屈乳頭下乳頭齊處是穴灸之艾炷如小豆大灸三壯男左女右只灸一處火到肌即瘥如不瘥不可治也其穴當取乳下骨間動脈處是穴

丁香柿蒂散 治吐利及病後胃中虛寒咳逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 人參 茯苓

橘皮

良姜 炒

半夏一兩各生姜半兩

甘草三分

右為末每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此藥調蘇合香丸服之亦妙

治久嗽喉連咳四五十聲者

右用生姜自然汁半合入蜜一匙同煎令熟不拘時溫服如此三四服立効

治寒氣攻胃咳嗽

右用黑豆二合炒熟內於瓶中以熱醋沃之紙封開小孔子令患人以口吸其氣入咽喉中即定

橘皮乾薑湯 治胃中有寒咳嗽

橘皮

乾姜

通草

桂心

人參

甘草各等分

右為散每服四錢水一盞半煎六分溫服日三服

羌活附子散 止咳嗽

卷活

附子

炮去皮
各一兩

茴香

半錢各半兩

木香

丁香

乾姜

炮去皮
各一兩

右為末每服二錢水七分盞鹽少許煎數沸空心服一方無丁香一方用丁香不用木香

丁香散

治咳逆噎汗

丁香

柿蒂

錢各一

良姜

甘草

錢各半兩

右為末每服二錢不拘時用熱湯乘熱點服

丁香柿蒂散

治諸種吃噫嘔逆癥

丁香

柿蒂

青皮

陳皮

錢各一

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時溫服

治丈夫女子傷中絕脉筋急痛咳逆

右以鹿髓和熟酒服之良

治寒氣攻胃咳嗽

草荳蔻

去皮 益智

去皮名
酌

乾柿蒂

二兩

右咬咀每服三錢水一中盞入生姜半分煎至五分去滓

不拘時熱服

治咳逆

右以蘇合香丸用丁香柿蒂煎湯化下喫逆即咳逆也乃胃寒所致良姜為要藥入參白茯苓佐之蓋良姜能溫胃能解散胃中風邪

香飲子

治咳逆不止

右用乾柿蒂十五枚為末用水一盞加白鹽梅少許煎至六分不拘時溫服

葷澄茄散

治噫氣咳逆亦治傷寒咳逆日夜不定

葷澄茄

良姜各二

右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之

治諸吃噫

橘皮

三兩
去
橘
皮
浸

枳殼

一兩
去
枳
殼
炒

治寒氣攻胃咳噫

吳茱萸

半兩
沙培
鹽
浸
炒

青橘皮

半兩
去
白
皮
浸

右㕮咀每服三錢水一中盞入生姜半分同煎至五分去

滓不拘時熱服

硫黃

硫黃法 治亥逆服藥無効者

硫黃

乳香

右各等分為末用酒煎急令患人鼻之

支方

硫黃法

雄黃

二錢

右為末用酒一盞煎七分急令患人鼻其熱氣即止

奇効良方卷之二十三

商効良方卷之二十四

頭痛頭風大頭風門

附論

頭痛為病靈樞云厥頭痛取足六經手少陰真頭痛其腦盡痛
則名厥頭痛入連在腦者名真頭痛內經云寸口脈中短者曰
頭痛脉經云陽弦則頭痛又云寸口脉浮中風發熱頭痛脉緊
頭痛是傷寒脉緊上寸口者尻頭痛脉訣云頭痛短濶應須死
浮滑風寒皆易除內經云東風生於春病在肝俞在頭項故春
氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內
眎上額交顴上入絡腦还出別下項病衝頭痛又足少陽膽之
脉起於目鏡眎上抵頭角病在頭角額痛大風從上受之風寒
傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池
風府調其陰陽不足則補有餘汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛

耳鳴尤竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上而不下頭痛嶺疾者下虛上实也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽上明後取足少陽上明此偏頭痛也有真頭痛者甚則入連於腦手足寒至節者旦發夕死夕發且死有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓亡者以腦為至腦逆故令頭痛葛亦痛東垣云凡頭痛皆以風藥治之者撫其大体而言之也高嶺之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為多少陽頭痛脈弦緩壯寒熱踰胡為多陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為多太陰頭痛必有痰体重腹痛為癥瘕其脈沉緩蒼木半夏南星為多少陰頭痛三陰三陽經不流行兩足寒氣逆為

寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為多厥陰頭痛項痛或痰吐涎沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為多諸氣虛頭痛人參黃芪為多為多者主治實藥也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也氣血俱虛頭痛者用調中益氣湯中少加川芎蔓荆子細辛其效不可盡述半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治所論頭痛大法甚詳著矣世之方論又言頭風病名何以此不見發明請言其略凡邪令人頭痛者其邪一也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者為頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而施治之觀於試效方載梁古老人壯歲時病頭痛每發時兩頰青黃脣脳自不欲開懶於言語身體沉重兀上欲吐食數

日方過乃曰此太陰厥陰合而為病名曰風癘以水煮金花丸
更灸俠谿二穴各二七壯不旬日愈以是觀之豈非頭風乎於
此不言風者是言經之本也世言風者是言經之標乎何不明
少陽厥陰頭痛者令人偏頭痛其經肝膽風木為邪也後人遂
以此而名頭風可謂不求其本歟索古云夫大頭風證者是陽
明邪熱太甚資寒少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或
傳太陽視其腫勢在何部分隨經取之還熱為腫木盛為痛此
邪見於頭風在兩耳前後折主其病也治之大不宜藥速止則
適其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病自外支內者
是血病况頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先經
者謂邪氣在上着无形之分部既着无形无所不至若用重劑
速下過其病雖已雖用緩藥若急攻之或食前或須服皆失緩
脉則藥不能除病當徐上漫漬无形之邪也或藥性味形体不

離緩歸是也。且緩急者謂緩劑已鴟邪氣入於中是到陰部染
於有形質之所若不速去則損陰也此終治却為客邪當急去
之治客以急也。且治主病當緩者謂陽邪在上陰邪在下本家
病也。若急治之不能解分而益亂也。治客以急者謂陽分受陰
邪陰分受陽邪此客氣急除去之也。假令少陽上明為邪出於
耳之前後也。陽明為邪者首大腫也。先以黃芩黃連甘草湯通
炒煎少上不住服上畢不愈用新瓦上炒鼠粘子待香同大黃
煎去滓內芒硝俱各等分亦時上呷之無令飲食在前得微利
則邪氣去。若陽明行經之藥升麻葛根芍藥甘草大陽行經卷
洁防風之類是也。又以東垣治驗其所論製方自有來矣。天之
四時民多疫癘初竟增寒体重次傳頭面腫盛百不能開上喘
咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問慮其傳染
之故得此病者五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病

如故再下之又緩終莫能愈禁古謂之曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛以承氣下之瀉胃中之实熱是誅罰無過殊不知適其所至為故遂處方用藥黃芩黃連味苦寒瀉心肺熱以為多橘紅苦平玄參苦寒生甘草甘寒入參甘溫瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷味辛平板藍根苦寒馬勃白僵蠶味苦平散腫消毒以為佐升麻茈胡平行少陽上明二經不得仲桔梗味辛溫為舟楫不令下行其為細末一半用白沸湯調時上叩下一半用蜜為丸噙化之服盡良愈如大便硬者加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之是皆深得病機之道詳盡立論處方以為後人之規焉

芎木湯

頭痛頭風大頭風通治方
治濕頭痛眩痛極

川芎

附子

生去皮

白术

三钱

桂心

去皮

一錢

甘草

各二錢

右作一服水二鍾生姜七片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

小芎辛湯

治風寒在頭頭痛眩暉吐不止

川芎

三钱

細辛

半錢去土

白术

甘草

二錢

右作一服水二鍾生薑五片芽茶一撮煎至一鍾食後服
川芎散 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚生眵及

偏正頭痛

川芎

二錢

茈胡

二錢

細辛

半錢

半夏

炮

人參

一錢

前胡

少許

防風

二錢

甘菊

花

右作一服水二鍾生姜三片煎至一盞食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花

去梗旋覆花

去梗防風

去梗

枳殼

去殼

川羌活

去芳荳荆子

石膏

甘草

錢各半

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

通關散

治感風發熱頭痛鼻塞

桔梗

二刀半

川烏

白芷

薄荷

甘草

各一

川芎

一刃

細辛

半兩

右為細末每服二錢食後葱茶調下薄荷湯亦可

三生丸

治寒厥頭痛

天南星

白附子

半夏

各等分

右為細末用生姜自然汁浸蒸餅和丸如棗豆大每服五十丸食後生姜湯送下

天香散

治年久頭風不得愈者

天南星

半夏湯泡

川烏去皮

白芷各二

右作一服水二鐘入生姜自然汁小半盞煎一鐘食遠服

藿香散 治体虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏正頭疼又治

諸風牙證

草烏

炮去皮尖

藿香

流去土各半兩

川烏

炮去皮一兩

乳香

如皂角子大三塊

右為細末每服一錢食後薄荷湯調下

芎辛道痰湯

治癰厥頭痛

川芎

細辛

南星

陳皮

去白

茯苓

一斤半各半兩

半夏

二兩半兩

枳實

炒熒炒

甘草

各一兩

右作一服水二鐘生姜七片煎至一鐘食後服

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風

去芦

半夏

生用半兩

天麻

半兩半兩

南星

湯泡各二兩

川烏

去皮去滿

乾姜

炮各一兩

川芎

甘草

各二兩

右為細末滴水和捻作餅子每服三五餅食後同荆芥德

細嚼茶酒任下一方加細辛

加減三五七散 治風寒入腦太陽頭痛

方見風門

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞舌重

方見風門

普濟消毒飲 專治天行大頭累試神效

方見傷寒門

大川芎丸 治新沐感風名曰首風旋暉眩偏正頭疼

川芎四兩

天麻一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服一丸細嚼茶酒任

下不拘時服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻

頭目眩運心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚冷

面上遊風沈若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥
消風化癢清利頭目

川烏

炮去皮鹽炒

防風

川芎

荆芥

僵蚕

桑蠶去頭炒去身

石膏

煅

甘草

炙巴上各一兩

白附子

炮

全蝎

炒去毒

羌活

羌活去根各半錢

地龍

炒去土

南星

天麻

白芷

巴上各五分

乳香

研

沒藥

研

右為細末每服半錢臨睡用細茶湯調服

急風散

治男女偏正頭疼夾脇風太陽穴痛坐卧不安

川烏

生去皮附子

辰砂

研各一刀

南星

生用二兩

右為細末用酒調塗痛處小兒貼額門

清空膏

治偏正頭疼久不愈善療熱瘡目腦痛不止

羌活

防風

黃連

巴上各一兩

甘草

炙半錢

茈胡七分

川芎五分

黃芩

刮去皮三分半用酒炒

右為細末每服三錢用茶清少許調如膏抹口內少用白湯送下臨卧服頭疼甚加細辛二錢痰厥頭疼多加半夏偏頭疼不愈減羌活防風川芎一半加茈胡

神應散

治一切頭風

光草烏

炮裂

細辛

去上各好

茶半兩

右為細末每服半錢臨卧濃茶點服

星烏散

治諸般頭風二三十年不愈者只二三服効

天南星

川烏

生去皮失各等分

右為細末每服二錢入細茶二錢薄荷七葉鹽梅一个同

煎一二沸入生姜汁些少溫服

通頂煙

治諸頭風如斧劈痛不可忍者

川烏

一及

右為末燒煙薰槐內熱茶清泡槐內煙氣服之大効

點頭散 治偏正頭疼

川芎二兩 香附去毛炒四兩

右為細末每服二錢食後用茶清調服

石膏風粘子散 治偏正頭疼連睛疼

石膏 鼠粘子炒各等分

右為細末每服二錢食後用溫酒或茶清調服

又方

白芷湏經日曬香

草烏半分炒令黃

半錢細末葱茶點

此是頭疼快捷方

又方

若少頭風總一般

良薑細辛半分炒熟

白梅湯點三分許

經發之時服便安

芎犀丸

治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣

一陣服芎犀非藥不効者服此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎

硫

砂硝內石膏
兩兩各

片腦

巴上各四兩

人參

茯苓

甘草
炙各

細辛

巴上各二分

犀角生用

施子

各一
阿膠
炒半

麥門冬

去心三兩

右為細末，煉蜜和丸如彈子大。每服一丸或二丸，食後細

嚼茶酒任下。

青火金鍼

治頭風牙痛赤眼，腦鴻耳鳴。

硝

一兩

青黛

川芎

薄荷

右為細末，口噙水用此藥些，小瘡鼻。

赤火金鍼

治證同前。

盐硝一兩

雄黃

乳香

沒藥

川芎

石膏

一斤
全蝎一對

右為細末，依前法搐鼻，又治暴赤眼及治蜈蚣蛇蝎傷。

神聖餅子

治證同前。

玄胡索

猪牙皂角

煅存性取爭末各一升

青黛半升

右為細末滴水和搗作小餅子如前以水化開用竹筒吹

入鼻內男左女右吹之

白附散

治腦逆頭疼牙亦疼

白附子

一錢去皮

南星

川烏

巴上各半錢

蝎梢

五個

乾姜

炮

硃砂

各半錢

麝香

少許

右為細末每服二錢用溫酒調服去枕卧片時

葱附丸

治頭風寒痛

附子

去皮鹽炮

右為細末用葱涎和丸如梧桐子大每服五十丸食遠用

茶清送下

升蒼荷葉散

浩法機要云夫雷頭風者寰卦主之諸藥不効

與證不相對也宜用此方

升麻

蒼术

製各

荷葉

金者

右剉散每服五錢水一盞半食後煎服或燒荷葉一個研細煎調

上清散治頭痛肩骨痛眼痛不可忍者

川芎

麝金

芍藥

荆芥穗

芒硝已上各半兩

薄荷葉

乳香

片腦半兩

沒藥

巴豆半兩

右為細末每用一字鼻內搐之

麝香茶芽散治諸般頭疼百藥不効者

麝香少許

茶芽一兩

川芎

細辛

荆芥

川烏

甘草

已上各半兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

大芎辛湯治一切頭痛但發熱者不宜服其餘癱軟歛腰腎

氣氣厥等證偏正頭疼不可忍者只以此藥并如聖餅子
服之但多服自能作効如氣虛年高之人仁服養正丹黑
錫丹并用此藥調鍾乳粉間服諸證頭疼堅捷之法无以
踰此但頭疼多用石膏蓋取其能墮痰飲然恐性寒故以
鍾乳粉代之腎厥頭疼尤得其治或疑鍾乳粉煅煉之藥
則以軟石膏煅過為末服之亦驗

生附子

生烏頭

天南星

乾姜

細辛

川芎

一錢

甘草

三分

右咬咀每服四錢水二盞生姜七片茶芽少許煎至六分
去滓食前服

如中脘素寒者不用茶芽

若氣壅盛只用川芎一兩細辛半兩甘草二錢煎如前法
一方治頭疼細辛二錢川芎白芷各半為細末搐鼻

一方高良姜曬乾不見火礮為細末口含水少許搐鼻中
如此數次即愈久患頭疼尤能作効

一方治氣虛頭疼附子一隻生去皮臍切作片用生姜自
然汁一大盞浸一宿慢火炙乾再蘸再炙候滲盡姜汁為
度以高良姜等分為末臍茶調服名必効散

一方白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字茶清調服有
人患眼疼先令含水以此藥搗鼻其効尤驗

川芎羌活散 治頭痛

川芎

細辛

蔓荆子

藁本

上各二分

羌活

半分

防風

半分

白芷

半分

右㕮咀每服二兩水煎去滓臨卧旋服

烏翼散

治諸般頭疼不可忍者

川芎

半分

赤芍

半分

桑白皮

半分

甘草

半分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時溫服

又方治頭痛不止

丁香一粒 白芷半錢 水蔴一錢

右為細末每用半錢吹入鼻中即瘥

葫蘆巴丸 治氣攻頭痛如破

葫蘆巴炒 三稜炒 醋漫乾姜炒各一錢

右為細末每服二錢不拘時溫生姜湯或溫酒調服及治癰瘡瘻後頭痛服之即愈

韭根丸 治頭疼眼睛如刀刺

全蝎炒米 大川烏炒各等分

右為細末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄荷茶清送下

止痛太陽丹

天南星

川芎各等分

右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處治氣攻頭疼不可忍者

草麻子 乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方光乳香

治頭痛不可忍者

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧畫頭以銅筋點少許滴入鼻中急令滴入腦眼中決此癢

治頭痛

右用水調決明子末貼太陽穴一方作枕去頭風明目

芎芷丸 治頭痛面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目昏運百節疼痛

痛項背拘急

川芎

防風

獨活

羌活

桔梗

三刃

細辛

薄荷

荆芥

各半

右爲細末

煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後茶酒化下

龍珠丹

治頭痛目運及喉痺喉風

右於五月五日取長蛇頭不拘多少以片腦麝香各少許相和同研丸如麻子大每用一丸以生姜汁塗鼻中逐邊各內一丸立愈

黑錫丹

治真頭痛

茴香

炒

附子

製

葫蘆巴

破故紙

炒

川練子

巴戟

已上各兩

肉荳蔻

與

木香

沉香

桂心

已上各半

錫硫砂

四刃

右爲末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋

擦令光瑩每服四十九粒心姜鹽湯送下一方有陽起石
順氣和中湯

黃芪一錢半

人參一錢

白芍藥

當歸

使

陳皮佐

白朮

各五分

升麻引

茈胡

三分引各

細辛使

蔓荆子

使各

川芎

二分使各

炙甘草

七分佐

內經曰陽氣者衛外而爲固也今年高氣弱又加發汗衛
外之氣愈損故以黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫當
歸辛溫補氣補血芍藥酸寒收衛氣爲臣白朮陳皮多甘
草苦甘溫養胃氣生發陽氣上竅皮毛肥腠理爲佐茈胡
升麻苦平引少陽陽明之氣上升通百脉灌溉周身者也
川芎蔓荆子細辛溫體輕浮清利空竅爲使也

右剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服
服之減半再服而愈明年春赴詔至六盤出曹鄼中

以古風贈云東垣李明之嘗以能醫鳴易水得奧訣爲渴
黃金簾一燈靜室窮內經黃帝拊掌岐伯驚曰諸月積不
易售半世豈得三折肺所長用藥有活法祕方堆案白魚
生不聞李延同居且同病一汗一下得其平乃知古人一
證癥一方後世以方合證此理殊未明公心密是者誰子
直以異已喧謗聲先生飲恨卧黃壤門生賴汝卓卓醫中
英活人事業將與相一曰去已權非輕遠年應召天策府
廉臺草木皆欣榮好藏漆葉青粘散莫之樊阿獨植名
清上瀉火湯 燕京溫官人年小時氣弱常於氣海三里灸之
節次約五七千壯至年老添熱頭痛雖冬天大寒猶喜
寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年
不愈此皆矣之過也

羌活根

三錢

知母

酒浸

黃芩

酒浸各

黃蘖

酒浸

炙草

黃芪

防風

升麻

生地黃

茈胡根

甘草根

黃連

藁本

已上各五分

藁刑子

當歸身

蒼术

已上各三分

荆芥穗

川芎各二分

細辛

紅花

格少

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍熟食後服

中書左丞姚公茂年六十七宿有時蒸至元戌夜春因酒再發頭面赤腫而痛耳前後尤甚月中煩悶咽喉不利身半已下皆寒足筋尤甚由是以床炕相接身半已上卧於床身半之下卧於炕飲食減少精神困弱脉得浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫春氣者病在頭難經云熱在頭身宜砭刺之取其易散故也遂於腫上約五十餘刺其血紫黑如露珠之狀頃時腫痛消散又於氣海

穴中大父炷灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里
二穴中各灸三七壯治足骭冷亦引草熱氣下行故也遂
處方云熱者寒之然病有高下治有遠近先越度其側度
君以黃芩黃連苦寒酒炒亦為因用以馳其上熱倍梗井
草辛甘溫上升佐諸苦藥以治其熱茈胡升麻苦平味之
薄者陰中之陽發散上熱以為臣連翹苦辛平以散結消
腫當歸身辛溫和血止痛大黃苦寒酒煨引苦性上行至
巔驅熱而下以為使也投劑之後腫痛全減大便利再服
減大黃慎言語節飲食不旬日良愈

既濟解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胃膈煩悶不得安卧身
半已下皆寒足骭尤甚大便微秘

升麻去苗

茈胡去黃

當帰身

連翹

已上各
末

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

升草

大黃

酒炒大便
勿用

桔梗

二錢

蜜

右剉知麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服
忌酒溫麪大料物及生冷硬物

治偏頭痛不可忍方

草麻子

半錢

大棗

十五枚

桂枝

右共搗令細，盛於紙上用筋一隻捲之去筋內在鼻中良
久取下清涕即止

治偏頭疼方

麝金

一顆

苦葫蘆子

一合

右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向
患處鼻中得黃水出即瘥

神妙方

治偏頭風疼

右用生蘿蔔汁仰卧注鼻中左痛注右右痛注左治頭

兩鼻皆注數十年病者用之皆効

仙靈脾浸酒方

治偏頭風手足不遂皮膚不仁

右用仙靈脾一斤細剉以瓦灰酒二斗浸之春五夏三秋
七冬十日取出藥每日隨性啜酒飲之常令醺醺不得大
醉酒盡再合無不効合時忌鷄犬見之

一字散 治偏頭疼不可忍者

乳香

別研

延胡索

益硝

各一

川芎

二末

雄黃

別研

右為細末每用一字左疼搐左右疼搐右

飛虎散 治偏正頭疼

白附子

香白芷

荆芥穗

石膏

燒研

川芎

天麻

薄荷

防風

各半錢

蒼朮

浸米泔

兩頭尖

心者不

刃

右為細末每服一錢臨卧溫茶清調服忌食熱物

千金散 治偏正頭疼

川芎

細辛

防風

甘菊花

全蝎

藁本

羌茶

石膏蒲

青藤根

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分去滓
食後服滓再煎如眼目疼加貫仲一兩

毒藥湯 治偏正頭疼頭風

麻黃

去根節人參去芦

五分

陳皮

去皮大柏

甘草

八分

細米殼

去陽殼頭帶沙黃三分

右咬咀每服五錢水一盞半生姜七片同煎至七分去滓
食遠溫服

抽刀一字散 治偏正頭痛頭風

鳥頭

生去皮蓋水漫一月取出切作片再以生
薑汁炒宿勿乾如急用只炮去皮尖

細辛

蟬退

川芎

各半錢
鹽炒

右為細末每服一字食後茶清調下

一方有權黃半兩

蘆薈散

治頭風頭痛

蘆薈

防風去叉

丹砂研

龍腦研已上各半兩

天麻

白附子炮

白芷

白术已上各半兩

右為細末

每服半錢食後葱白薄荷茶清調下

沐頭方

治風頭痛或頭旋目眩四肢煩痛坐卧不安

蔓荆子

芎藭

玄參

已上各半兩
石膏半斤

甘菊花

葛根

兩三

右搗篩分作三度用每度以米泔水一斗二升煮取八升

去滓於暖室中稍熱沐頭如汗出宜避風

惡寒入篋中方 治風頭及腦掣痛不可忍者以此膏摩之

右用牛蒡莖搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙慢火
同令稠成膏以摩痛處其風毒自散亦治時行頭痛摩時
湏極力令熱乃速効冬月無苗以根代之亦可

都梁丸

一名芷彈丸

王定國因被風吹項背拘急頭目昏眩太

陽并腦俱痛自山陽擇舟至泗州求醫楊吉老即診脉即

與一丸便服王因歎詰經一時再作併進二丸病若失去

王甚喜問為何藥答云公如道得其中一味即傳此方王

思索良久自川芎防風之類凡舉數種皆非但一味白芷

耳王益神之此藥曰初無名王曰是藥處自都梁名人可

名都梁丸也大治諸風眩婦人產前產後乍傷風邪頭

目昏重反血風頭痛服之令人目明并沐浴後服一二丸

甚佳暴寒乍暖神思不清頭目昏暉並皆治之

香白芷

擇大塊白色新潔者先以發酵研末土用佛手泡洗四五次取用

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸多用荆芥點臘茶細嚼下食後常服無所忌只乾嚼亦可一方如熱風冷酒調冷風熱酒調下一方細嚼川芎葱白茶清送下

大蒜搐鼻法 治頭風痛不可忍亦可搐小兒驚風

右用蒜七箇先燒地通紅掃出次將蒜去皮逐箇於紅地上磨成膏子在地上却將蠶蚕一兩去嘴足安在蒜上用桃覆定四邊勿透氣來日取出只用蠶蚕為末先含水一口將藥末一豆許搐於鼻內立効

枕頭方 治風頭痛百藥不差者

右用食茱萸葉細判灑酒拌勻以絹袋盛之於瓶中蒸熟乘熱分作二包更換枕之取差為度

仙方如聖餅子

草烏

芎藺

半夏

天花粉

細辛

薄奇

荊芥

何首烏

防風

羌活

蒼朮

赤小豆

松香

甘松

藿香

晚蠶沙

菊花

白

甘草

赤芍藥

蔓荆子

各等分

白

石膏

右為細末用炒麪作糊和為餅赤土為衣每服一餅食後細嚼茶清送下

一字輕金散 治偏正頭風疼夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛并或生翳膜視物不明

藿香葉

荆芥穗

防風

石膏

如研水飛

旋覆花

香白芷

川芎

上半兩

各川烏

去皮尖

南星

各半錢

草烏

一錢半

右曬乾研為細末每服一字食後淡茶調下

清神散

麝香

片腦

雄黃

青黛

全蝎

乳香

沒藥

各等分

右為細末每用少許口含水滴入鼻中

一滴金丸

治首風及偏正頭痛

人中白

地龍

各一分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸用新汲水

一滴化開滴入兩鼻中

治頭風百藥不効者

右用天南星一兩以白礬湯泡去毒水五七次焙乾為末
分作三分每分水二盞入白梅三個同煎至一盞當發時
食後服

芎菊丸

治頭風化痰

川芎不拘多少以水洗淨
薄切作片或研或焙乾

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸不拘時細嚼用

茶清或酒送下

羌活散 治頭風

羌活防風旋覆花

獨活川芎細辛芽

蔓荆子停通七味

甘草石臂各半加

中風作剉煎為妙

尋常只得點清茶

大師留下羌活散

選盡仙方不及他

治雷頭風發

雷頭風發聽斯言

半錢將來不用錢

紳搗羅為極細末

溫酒調下便安然

通關散 治八般頭風

右用半夏為末同百草霜少許以紙一條入藥半錢作綫

撚子焙極乾每用藥時先含水一口將紙撚子燃着吹滅
就鼻中搐之如有涎即吐出再含水再搐如此用三五次
見効

太一麝香湯一名烏香散治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭
疼夾腦風連眉骨項頸上徹腮頰疼痛不可忍者

草烏生用一兩
切用盐炒

新茶芽

細辛去苗各二分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半入真麝香一捻同煎
八分去滓熱服一方無麝香為細末茶清調下食後服
必捷散 治腦風頭痛甚者

白芷

蛇去根消蜜三兩

蕤藜炒去角

草澄茄二十兩

白附子

云故酒浸一宿
勿作片炒乾

蔓荆子酒浸一分

焙去根

右為細末每服一錢用薄荷自然汁和溫酒半盞食後調
服忌發風之物

湖南抑衝頸思退傳頭風掣疼

黃蠅二斤

益半斤

右二味相和於錫羅中鎔令相入裡作一塊益熟可合腦
大小捲頭至額頭痛立止

全蝎散

治頭風攻注口眼不正

全蝎

二錢去毒刺炙赤足蜈蚣一條

麝香

一字別研

辰砂

一寸別研

右為細末同研勻每服一字食後溫酒調服
治眉心并肩梁骨疼者

右用二陳湯煎飲下青州白九子立驗

太醫院經驗奇効良方卷之二十四

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十五

眩暈門

附論

丹溪論曰、眩暈分之為二、皆由痰火為病、以此分為二哉、眩暈雖屬痰火、未嘗不由腎虛兼風邪所得、蓋痰者本沉動之物、又因火動而助其愈盛、火性炎上、得風則愈熾、風火兩動、痰之愈作、經云、諸風掉眩皆屬肝木、原病式云、風火皆屬乎陽、多為兼化、陽主乎動、而兩動相搏、則為旋轉也、若人患此頭旋目眩、卒然惡心欲吐、眼花視物不的、始屋旋轉起則運倒其病所苦、何經所受而致、此曰靜順清謐、水之化也、動亂撓擾、火之用也、腦者地氣之所生、故藏陰於目為瞳子、系腎水至陰所主、二者喜靜謐而惡動、擾靜謐則清明、內持動擾、則掉搖散亂、故腦轉目眩、此之謂也、靈樞經云、五臟六腑之精氣皆上注於目為之睛也、筋骨氣血之精與脉并系於目上、屬於腦、出於項中、故邪之

中項者乘其身形之虛深則隨目系以入於腦入於腦則腦轉
腦轉則目系急目系急則目眩也乃心腎不交風火兼化而致
然也夫風者有內外之分風從外入者則兼化也由內之散者
乃火之生風也醫者察審內傷外感之由脉浮自汗項強不仁
為傷風脉緊無汗筋牽掣痛為感寒脉虛煩悶者為暑脉沉滯
吐逆者為濕寸脉俱沈此為異耳至於七情內傷者使藏氣不
平鬱而生涎結而為飲隨氣上攻令人頭暈眉棗骨痛目不可
開其證婦人得之蓋婦人性多偏怒經曰天之氣曰風人之氣
曰怒則致傷肝木心動生風令人頭目旋連皆由此哉婦人
本陰血王之因產難崩漏虧損過極使陽氣無依為眩暈也男
子患此或因金瘡吐衄便利之損或酒醉行房勞傷精血腎氣
不能歸元而諸氣逆上是為頭目眩暈也學者於此當分標本
別其盛衰用藥施治如鼓應桴無不效矣

眩暈通治方

半夏白术天麻湯 治頭旋惡心煩悶氣喘短促心神顛倒兀
兀欲睡目不敢閉如在風雲中苦頭痛眩暈身重如山不
得安卧並皆治之

半夏一錢

白术二錢

天麻

茯苓去皮

橘皮

蒼朮

人参

神麴炒

麥蘖

各半錢

黃芪

澤鴻

上各一錢

乾薑

黃檗

各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

仙木芎散 治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明耳目清神

川芎

連翹

黃芩

山梔子

菊花

防風

大黃

藿香葉

當歸

芍藥

桔梗

上各七分

石膏

滑石

各一錢半

蒼术

各一錢

甘草

各一錢

薄荷葉

縮砂仁

荆芥

各四分

各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

芎木湯 治肩兩中濕眩暉嘔逆頭重不食

方見頭痛門

羚羊角散 治風邪乘於陽經上注頭目遂入於腦或痰水結聚脣上衝頭目一切眩暉並皆治之

羚羊角

各一錢

茯神

去皮水二錢

枳殼

炒熟

甘草

各一錢

芎窮

各一錢半

夏

湯泡

防已

白芷

各一錢半

附子

炮去皮半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三五七散 治陽虛風寒入腦頭痛目眩運轉如在舟車之上耳內蟬鳴風寒濕痺腳氣緩弱等疾並皆治之

天雄

細辛

山茱萸

防風

山藥

乾薑

右為細

末每服二錢食前用溫酒調服

小芳辛湯

治風寒在腦頭痛眩欲倒嘔吐不定

方見頭痛門

川芎散

治風眩頭暉

川芎

甘菊花

人參

茯神

山藥

半夏各一兩

一兩

右為細末每服二錢用溫酒調下不拘時服日三服

人參前胡湯

治風痰頭運目眩

人參

去蘆根

前胡

南星

湯炮

半夏麪

木香

枳殼

炒

橘紅

赤茯苓

紫蘇葉

甘草

炙甘草

半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

川芎散 治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝冒戰搖如在

舟車之上

川芎

白朮

錢三

北細辛

白茯苓

粉草

已上各一錢

桂枝

半錢

右作一服水二鍾生薑

三片煎至一鍾不拘時服

有痰兼

青州白丸子服之

加味二陳湯 治痰暈或因冷食所傷嘔吐不止

陳皮

白茯苓

半夏

已上各三錢

花椒

丁香

各一錢

甘草

炙半錢

右作一服水二鍾生薑

三片烏梅一箇煎

一鍾不拘時服

芩木除眩湯 治感濕感寒頭重眩暈

方見濕門

香橘飲 治氣虛眩暈

木香

橘皮去白

白术

半夏麪

白茯苓

縮砂已上各

丁香

甘草炙各五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

川芎石膏湯

治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

方見風門

蔓荆子散

治風頭旋運悶起則欹倒

蔓荆子

甘菊花

半夏湯泡

羚羊角屑

枳殼炒

茯神去木

芎藷

黃芩

防風已上各三分

麥門冬去心結

石膏兩

地骨皮

赤箭

細辛

甘草各半兩

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服忌熟麪飴糖羊肉

拘時溫服忌熟麪飴糖羊肉

漢防已散

治上焦風寒攻注頭目旋運心神煩亂

漢防已

麥門冬

去心培前胡各一兩

半夏

湯炮

旋覆花

防風

細辛

甘草

炙各半兩

赤茯苓

人參

芎藭

羚羊角

枳實

荆芥

各三兩上各

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服忌飴糖羊肉

芎藭散

治諸陽受風頭目旋運目視昏暗肝氣不清

芎藭

甘菊花

各二兩

白殼蠶

炒

細辛

去葉

防風

去叉

羌活

各三兩上各

旋覆花

草決明

蟬蛻

各一錢洗去皮

天麻

蜜蒙花

荆芥穗

甘草

炙各半兩上

右為細末每服二錢水一盞煎七分食後溫服湯點亦可

菊花丸

治風頭旋目運欲倒。腎中痰逆兼治筋骨疼痛。

甘菊花

天麻酒浸

羌活

赤茯苓去皮

枸杞子

防風去叉

獨活

天竺黃另研

蔓荆子

藁本去土

芎藭

木香各等分

右為細末。煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大。每服五七十丸。不拘時用荆芥湯送下。

療風邪氣未除。發即心腹滿急。頭旋眼運欲倒。

羚羊角屑

黃芩各一兩

杏仁去皮炒

枳實炒

芳翁

獨活

防風

白朮各二兩

茯神去木

生薑四兩

桂枝三兩

上各

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分作三服。日三次服之。

忌炮李雀肉并蒜大酢麪等。

羚羣湯 治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠。瘡瘍骨節疼痛。

羚羊角屑

旋覆花

紫苑

去苗

石膏

甘草

炙已上各一兩

細辛

去葉半兩

前胡

三分

犀角屑

一分

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去

滓食後溫服

人參丸

治風頭旋目眩痰逆惡心脅膈痞帶咳嗽痰涎喘涌

嘔逆不欲飲食

人參

白术

旋覆花

炒

甘草

炙已上各一兩

麥門冬

去心梢殼炒

前胡

二兩各

木香

半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食後

溫生薑湯送下

芎窮散

治風頭旋眼目昏痛眩運倦急心忪

芎窮

前胡

白僵蠶

炒

人參

已上各一兩

蔓荆子

天麻

酒浸培

防風

去叉已上各半兩

人參

已上各一兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下

白木飲 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白术

厚朴

大皮
醫灸

甘菊花

各半

防風

去叉
大義

白芷

人參

巴上
兩各

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞食前溫服
防風飲子 治風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風

人參

橘皮
巴上
兩各

白术

茯神

各三
兩

生薑

四兩
兩

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一日令盡忌

醋桃李雀肉蒜麪等物

祛痰丸 治風頭旋痰逆恶心脣瞼不利

南星

生
等分

半夏

生
等分

赤茯苓

去皮
去皮

陳皮

去白
去白

乾薑

炮
等分

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸不拘時用溫米飲送下

松花浸酒方 治風頭旋腦皮腫痺

右以松花并臺春三月取五六十粒如鼠尾者不拘多少蒸細切一升用生絹囊貯以酒三升浸五日每日空心暖飲五合晚食前再服

增損黑錫丹 治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暉病至危篤或燙上僭愈甚者

黑錫丹頭二兩 肉荳蔻一兩 附子泡去皮 破故紙炒

葫蘆巴

官桂

去皮

茴香

已上各一兩

青皮

炮

川練子

陽起石

木香

已上各半兩

烏藥

破石

火煅縮土研水各一分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服五七十丸濃煎

人參茯苓生薑棗湯送下空心服一方無砂石

羌活湯 治風頭眩筋脉拘急痰涎壅滯肢節煩疼

羌活

前胡去苗

石膏礬石、白石膏

白芍赤芍

芍藥

桔梗慈炒

黃芩去黑心

甘菊花

防風

細辛去葉

甘草炙剉

蔓荆子

麻黃

去根節黃精去沫

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片鷄蘇三葉同煎至七分去滓不拘時服

沉香磁石丸 治上盛下虛頭目眩運耳鳴耳聾

沉香

別碎

蔓荆子

青鹽別研

甘菊花

巴戟

去心

葫蘆巴

山藥炒

磁石火煅醋淬半兩

川椒去目

炒

山茱萸去核陽起石

火煅附子各一兩

研末水服

右為細末用酒煮米糊和丸如梧桐子大每服五十九丸

至七十九空心用益陽送下

菊花散 治一切風頭目昏眩面浮腫

菊花 旋覆花 牛蒡子

羌活

獨活 芎草炙各等分

右咬咀每服五錢水二鐘生薑三片煎至一鐘食遠服
人參湯 治風頭眩但覺地室俱轉目閉不開

人參

白朮

當歸酒洗

麥門冬去心

防風

已上各兩半

獨活

去苗

官桂

去皮

黃芩切焙

芍藥

已上各兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

守中丸 治風頭眩脳轉目急忽然倒仆

人參

白朮

茺蔚花

枸杞子

山芋

已上各二兩

白茯苓去皮

麥門冬去心

生地黃蜜炙

折

右為細末先用生地黃汁於銀器內入酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數十杵丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日或甲子日將合亦名五苓丸地仙金髓丸

瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭痛等疾

道人頭即蒼耳

瓜蒂

焰硝

雄黃

川芎

薄荷

藜蘆已上各分

天竺黃一錢半如無以麝金代之

右為細末口含水鼻中搐一字神驗

小三五七散 治頭風目眩耳聾

天雄三兩一方用附子

山茱萸去核五兩薯蕷七兩

右為細末每服五分不拘時溫酒調下如不見効稍加二
分或煎薑棗湯調服亦可

芎歸湯 治去血過多頭重目昏眩運不省舉頭欲倒惟脉獨
弱預見崩疾

大川芎

大當歸去尾各三兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服
治風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖
右以烏驥頭一枚擣洗如法蒸令極熟細切更於鼓汁內
煮着五味調點少酥食之効

天南星丸 治風虛痰頭目旋運肢節拘急

天南星

炮去皮

附子

炮去皮

白附子

炮

華陰細辛

旋覆花

半夏

炮去皮

芎藶各一兩

天麻一兩

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸加至五十

丸不拘時用荆芥薄荷煎湯送下

麝香天麻丸

治風痰氣厥頭疼目眩旋運四肢倦怠精神不

安睡卧不寧

麝香

研二錢酒浸

天麻

酒浸一兩上各

甘菊花

三分南星

一枚重一兩者先用白礬湯浸洗七次然後用水煮令熟切片焙乾

右為細末煉蜜和丸如鷄頭竇大每服一丸不拘時細嚼

荆芥湯送下

大芎辛湯 治氣虛痰飲腎虛諸厥頭痛及眩暉舉頭似屋宇

旋轉如在舟中此乃風痰虛三證宜服此藥

方見頭痛門

麝金散

治頭痛眩運

麝金

滑石

川芎各等

右為細末每服一二錢空心用蘿蔔汁調服此木麝達之之

法也若鼻中有宿痰宜瓜蒂散吐之

神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛

川芎

麝金

荆芥

薄荷

紅豆各等分

右為細末入盆研勻鼻內搐之力慢加藥

愈風餅子 治風眩運或先服止藥次服此藥

川芎

白芷

防風

甘菊花

細辛

羌活

天麻

荆芥穗

薄荷

甘草

炙已上一兩

川烏

炮去皮半兩

右為細末湯浸蒸餅和捏作餅子每服三五餅食後細嚼

用茶清或白湯送下

玉液湯 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩運心嘈

悸眉棱骨痛

半夏肥大者六錢
泡七次切作片

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去滓入沉香末少許不拘時溫服

芎藭散 治風頭眩發則心腹滿急眼運欲倒

芎藭

赤茯苓

去皮

枳殼

炒各三分

羚羊角屑

獨活

防風

白术

黃芩

杏仁湯漫去皮尖炒黃巴上各半兩雙仁

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天麻羌活丸 治頭目風眩邪氣鼓作時或旋運

天麻

羌活

白芷

藁本

去苗土

芎藭

芍藥

細辛

麻黃

去苗土各二兩

牛黃別研

麝香別研各一分

右為細末
煉蜜和丸如皂角子大
每服一二丸不拘時研
薄荷酒下

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十五