

太醫院經驗奇效良方大全

大醫院經驗奇效良方大全卷十

奪命獨參湯

治傷寒汗下後終日昏悶不省人事發熱發渴

渴似狂言一功危急之證宜服此藥服後額上鼻尖有微

汗是其應也

揀人參一兩

右咬咀作一服用水一升煎至七分去滓溫冷不拘時服

滓再煎服神效

附子

回陽散

治陰毒傷寒面青四逆及臍腹疔痛身軀如冰

并一切卒暴冷氣

右用附子二枚炮裂去皮以臍疔為細末每服三錢七取生

薑自然汁半盞冷酒撓勻共盞調服更以冷清酒一盞

送下相次更進一服良久臍下如火遍身和暖為度

廻生神膏

治男女陰毒傷寒外接法

牡蠣煨粉

乾薑

煨各

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出
愈女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈卵與
乳男女之根蒂坎離之分也陰證大小便不通及諸雜證
陰候大小便不通者並宜此外治法數日不通為急非急
者勿用

煮餅疔法

治氣虛陽脫躄冷無脈氣息欲絕不省人事及傷

寒陰厥百藥不効者

右用葱一束以索纏如餅餠大去根葉唯存白長二寸許
先以火煨一面令通熱勿至灼人乃以熱覆著病人臍下
上以餅斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四餅
過一餅壞不可熨即易一餅候病醒手足溫有汗乃差更
服四逆湯以溫其中昔曾有患傷寒冥冥不知人四肢堅

冷如石藥不可入用此遂差一方用醃醋拌麩炒熟注布袋中蒸熨比上法尤佳

霹靂散

治陰勝隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水是也

右用附子一枚燒為灰存性為末作一服蜜水調下而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

大羌活湯

解利兩感神方天之邪氣感則害人五臟以是知

內外兩感腑臟俱病欲表之則有裏欲下之則有表之裏既不能一治故云兩感者不治然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有救治而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此方以待疾者君子用之

羌活

獨活

防己

防風

黃芩

黃連

蒼朮製

白朮

甘草炒

川芎

細辛 歸三

生地黃

知母 各一

右咬咀每服秤半兩水二大盞煎至一盞半去滓得清藥
一大盞熱飲之不解再煎三四解之亦可病愈則止若有
餘證並依仲景實法

神効沃雪湯 治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服

之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮

堅者炮去皮乾薑炮製

甘草 炙各六兩

厚朴 去皮薑汁製

防風

嫩者

白芍藥 去皮

乾葛 各四兩

右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時
服少頃取生姜葱作羹或粥投之避風坐卧身體微潤即
愈如疫氣正相傳染清晨進一服為佳常服每用二錢水
一盞煎至八分服

桔梗枳殼湯 治結胸心下痛欲死者

桔梗炒

枳殼炒

甘草炙各

等分

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓服
或不用生薑亦可痰多加半夏生薑有熱加黃芩

治傷寒陽證結胸死無可藥者

右用蚯蚓十五條活者搗爛蜜半盞冷水半碗灌服若無

蜜砂糖亦妙

茵陳蒿大黃湯 治傷寒發黃面目悉黃小便赤宜服

茵陳蒿

山梔仁

柴胡

黃蘗蜜炙

龍膽草

各半

黃芩去蒸

共麻

大黃炒各

雙

右咬咀每服五錢水一盞半去心一盞去滓早晚食後溫服

茅根湯 治傷寒發黃遍身如金心者

茅根洗剉

山梔仁

茵陳蒿

地骨皮

甘草炙各

右咬咀每服五錢用水一盞半生薑三片豆豉六七粒同煎至一盞去滓早晚食遠服

茵陳五苓散

治傷寒溫濕熱病成胃後發為黃疸小便黑赤

煩渴發熱不得安眠此蓋汗下太早服藥不對證因感濕熱病以致遍身發黃予嘗用茵陳五苓散治之甚效

右用生料五苓散一兩加入茵陳半兩車前子一錢木通

一錢半柴胡一錢半酒後得證加乳葛二錢作咬咀并前

藥和勻分作二服每服水一椀燈草五十莖同煎八分去

滓食前服滓再煎連進數服小便清利為愈

百合知母湯

治百合傷寒已經汗後病人欲食復不能食常

默默欲卧復不能卧欲行復不能行有寒如無寒有熱如

無熱飲食或美不美如強健人而卧不能行口苦小便赤

藥入口即吐利此因虛勞大病之後不平復變成此疾名

百合病宜服

百合乾一枚

知母一兩

右先將百合擘碎用新汲水二盞浸一宿當有白沫出去却沫水了却用新汲水二盞煮百合取汁一盞去粗盛於淨器中又將知母亦用新汲水二盞煮取一盞去粗後將百合知母汁相和同煎取一盞不拘時分作二服

百合散

治傷寒百合病一月不解變如渴疾宜服

百合

蘇黃各一

牡蠣各一

麥門冬去心

山梔仁各三

甘草炙

右咬咀每服五錢水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

治傷寒百合病胸中滿痛宜服此方

右用百合一两炒令黄色為細末每服二錢不拘時米湯調下

雄黃丸 治傷寒狐惑微煩默坐少卧毒氣止攻咽軋声嗑下

雄黃 或便膿血

雄黃研

當歸各三分

蘆薈研

麝香研各一分

檳榔半刀

右搗研為末煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸至一十九丸食前溫粥飲下日三服

訶梨勒丸 治傷寒後膿血痢下部疼痛

訶梨勒炮去

人參各一分

白茯苓去皮當歸焙

木香

白芷各三分

牡丹皮半刀

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十九丸食前米飲下日再服

黃連丸 治傷寒熱病後熱毒下痢膿血

黃連分三

烏梅肉兩炒二

右為細末煉蜜入少蠟和搗五六百杵丸如梧桐子大每服二十九加至三十九空心米飲下

訶梨勒飲 治傷寒後氣不和自利無度

訶梨勒四枚二生二熟去皮

草豆蔻四枚二生二熟去皮

右以咀每服二錢七漿水一盞煎至六分去粗空心溫服
燥腸丸 治傷寒汗下後大小便自利腹中痛者

附子一枚

乾薑一兩 龍骨

吳茱萸

訶梨勒去核 米殼酥

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫水下痢
止勿服

治傷寒發汗吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難

原燒蠶 半斤 糯米 半升

右二味同炒令米色焦然後搗羅爲末每用半兩以米醋調如稀糊入銚子內煎攪令稠菜熟攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之

杜仲酒

治傷寒後體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲

去粗皮獨活半兩

附子炮製去皮臍 牛膝一

仙靈脾三分

右細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後開每日取三二合溫服日三服未差再浸服

二瀝湯

治傷寒失音不語

竹瀝

荆瀝

梨汁各二

右撻令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一服

入參湯

治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參二分

白茯苓

去皮二分

麥門冬

去心

黃芩各

半夏

洗七

陳皮

去白

白朮

各半

甘草

各一分

右咬咀每服五錢七水一盞半入生薑三片棗二枚擘破

同煎至八分去滓食前溫服

牡蠣散

治傷寒後虛損心多怔忡夜夢洩精

牡蠣

燒為粉

桂心

白芍藥

鹿茸

酥炙

龍骨

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分

去粗食前溫服

羚羊角丸

治傷寒夜夢精洩不禁身體枯燥瘦脊骨立者

羚羊角屑

犀角屑

石龍芮

葑子炒

龍骨

硃砂

細研

鹿茸

酒浸

澤瀉

各一分

桂心

木香

各一分

右爲細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

萎蕤湯 風溫之病脉陰陽俱浮手足心體重其息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此病者宜服

萎蕤

白薇

麻黃

獨活

杏仁

川芎

青木香

甘草

各一兩

石膏三兩

右咬咀以水八升煮取三升去粗分三服取汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品方云萎蕤湯治冬溫春月中風傷寒則發頭腦疼痛咽喉乾舌強肉疼心胃痞滿腰背強

柴胡石膏湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心

胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽喘滿痞

柴胡

石膏煨

赤芍藥

前胡

乾薑

各十
五兩

升麻

二兩
五兩

黃芩

桑皮

各三十
七兩

荊芥穗

三十
七兩

右咬咀每服五錢水一盞生薑三片豆豉十餘粒同煎七分去滓熱服小兒分作三服更量大小加減不拘時服

茯神散

治傷寒後虛羸心氣之力弱驚悸多忘

茯神

黃耆

葛蒲各一

白芍藥

人參

各半

遠志

去心
三分

右咬咀每服五錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

龍齒丸

治傷寒後伏熱在心心虛驚悸

龍齒

人參

生乾地黄

茯神各一

遠志 去心

鐵粉細研各半斤

連去積

馬牙硝細研

防風各三分

麝香細研各半斤

麥門冬一分

右為細末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

竹葉金銀湯下不拘時服

柴胡湯 治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能

飲食

柴胡

赤茯苓

龍甲去垢

黃芩各一分

秦艸

地骨皮

黃芩去黑心

枳殼去穢炒

葛根各半斤

甘草炙

人參各三分

右吹咀每服四錢水一盞半煎至七分不拘時溫服

鱉甲散

治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向晚增寒

鼈甲

醋炙黃附子

去襁爛

甘草

肉蓯蓉

酒浸去

人參

黃耆

熟地黄

桃仁

去皮炒

枳殼

去穢炒

杜仲

五味子

各三分

牡蠣

煨

柴胡

牛膝

蒼朮

炒

右咬咀每服五永水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分不狗時溫服

治傷寒後益羸日夜汗出不止心燥口乾烟喉不利

黃雌雞

一隻去腸肚

肉蓯蓉

一刀割浸一宿

牡蠣

煨

麻黃根

右先將鷄麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去鷄麻黃

根後下肉蓯蓉牡蠣煎取一銖半去滓分為三服空心午

前夜後臨卧時服

大病差後多虛汗

龍骨

牡蠣

麻黃根

右等分為末以粉身

紫苑散

治傷寒後肺痿勞嗽喘急血腥臭連連不止漸將羸

瘦

紫苑

洗去
苗土

天門冬

貝母

潤肺
各一

生乾地黃

桔梗

各半

百合

知母

各三

右咬咀每服四升水一鍾半煎六分去滓不拘時溫服

補肺散

治傷寒汗下後喘咳不止恐傳肺疾

人參一刃

五味子

款冬花

各半

桑白皮二刃

蛤蚧一對

右為細末每服五升沸湯一盞調服

韭根散

治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翁上氣劣者床不

能起動甚者手足拳仰腫疼痛

菹根

菹根各二青竹茹

乾薑炮冬

右細剉和勻分作八服每服用水一六盞煎至五分去滓入鼠糞末一字攪令勻不拘時服聖濟方搗篩五錢七用水一盞半煎至一盞去滓食前溫服一名豐本湯

治傷寒婦人得病雖瘥未滿百日不可與交合為陰陽之病必拘急手足拳攣死丈夫病名曰陰易婦人病名曰陽易速當汗之可痊滿四日不可療宜令服此藥其病躄重小腹急熱上衝霄頭重不能舉眼中生翳膝胫拘急

右以乾薑四兩為末沸湯調連進服以衣被覆出汗方解手足伸而愈

二灰散 治傷寒陰陽易

手足指甲二十片男病用女病用男者中衣襠一片男病用女病用男者

右並燒作灰研令極細分三服不拘時候用溫酒調下或

米湯調服

六均子湯 治傷寒汗下之後將見平復宜服此調理助脾進食辟邪氣大妙

人參

白朮

黃耆

白茯苓

山藥

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫服

蒼脾湯 治傷寒後脾胃虛弱可思飲食

茯苓

乾薑

炮各一兩

白朮 二兩

丁香

人參

甘草

各半兩

右如法事治一處掃羅為末每服三錢水一盞煎至六分溫服日進三服不拘時候

補脾湯 治傷寒汗後脾胃傷冷物胃痛不快尋常血氣不

人參

乳薑

白朮

陳皮去白

青橘皮

去白 甘草

各等

右為細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得又
記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寧
真勞復也予診曰勞心之所致未復其初而又勞其神榮
衛失度當補其子入其脾解發其勞庶幾得愈授以補脾
湯佐以小柴胡湯得解難經曰虛則補其母今補其子何
也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉
其子此虛當補其母人所共知也千金曰心勞甚者補脾
氣以益之脾王則感於心矣此勞則當補其子人所未聞
也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其
生我者與錦囊所謂本骸得氣遺牀受蔭同義方治其勞
則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧同義此治

虛與勞所以異也

建脾散

治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食縱食不能消化

訶梨勒皮 白朮

麥蘗微炒

人參各一

神麴炒

甘草炙

枳殼炒

大腹皮各半

乳薑三分

右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時稍熱服

助胃丸 治宿食不化

縮砂仁

茯苓去黑皮

白朮各一

紅豆

甘草炙

人參

枳殼各五

右搗羅為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服

十五丸空心溫酒送下米飲亦得

神仙百解散

治傷寒無問陰陽二證其間所用藥味各隨經絡治病如
傷寒在表未傳入經發熱惡寒腰痛連進二服汗出而愈
若已傳經絡骨痛短氣肢體煩疼目睛微痛耳聾口燥
乳或渴或不渴手足自溫或四肢厥逆自利或不利小便
反快服之調中順氣祛逐寒邪如頭面感寒傷腠理頭
痛項強發熱增寒鼻流清涕咳嗽痰涎及治氣溫相搏骨
節煩疼肢體沉重西浙惡風時自汗出此藥大能調順三
焦解表救裏溫潤肺經正四時之氣升降陰陽進羨飲食
不問傷風傷寒中暑中暈骨蒸頭疼氣逆胃滿失肌吐逆
眩暈惡心及已經汗後不解下之不當吐之不中此藥清
而不涼溫而不熱無問老人虛人丈夫婦人孕婦小兒並
宜服之如連進二服無不取効春常服免瘟疫之疾夏常
服不中暑暈之病秋服之下生瘡疾冬服之不感寒毒真

神仙衛生之藥也功效不可盡述

山茵陳

柴胡去芦

前胡

人參

羌活

獨活

蒼朮

米泔浸炒

甘草

乳膏

白芍藥

升麻

防風

藁本

藿香

半夏薑製

白朮

各一

立春以後不加減立夏以後一料內加

柴胡

赤茯苓

當歸各半片

立秋以後減柴胡一分

不用當歸赤茯苓只加

乾葛地

肉桂去粗皮 麻黃去節

立冬以後並無加減一方無當歸有黃芩去帶

右為細末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎一盞熟

服不拘時服併進二服如要表散加葱白三寸淡豆豉三

十粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈一方無山茵陳前胡

加減五苓散

藥中之寶五苓散

專治傷寒有大功

陽證見時須去桂

陰加附子水煎濃

狂言亂語辰砂末

頭目疼痛入川芎

咳嗽多加五味子

心氣不定麥門冬

胃中嘔逆人參妙

痰多半夏喜相逢

定喘馬兜零最好

蒼朮去溫腹中空

小便澀閉加瞿麥

黃芩能使大便通

腹中氣塊三稜朮

青皮能退熱如烘

麻黃用根除盜汗

下部赤腫使椒紅

飲水煩渴加乾薑

鼻衄烏桕葉却為功

眼中黃色茵陳妙

勞復枯梗有神功

目赤令添赤芍藥

茵陳退腫又相逢

眼中若赤石膏末

陳皮止渴又恭同

急醫水氣甜葶藶

伏暑燈心浸水中

二十四證真妙訣

專心盡救効無窮

太醫院聖驗奇效良方大全卷之十一

普濟消毒飲子

時毒治驗恭和二年先師以進納監濟源

稅時四月民多疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不能救張縣丞姪亦得此病至五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可請治之遂命診視具談其由先師曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其所至焉故遂處方用黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅味平玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味苦寒馬勃白僵蚕味苦平散

腫消毒定喘以為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明二經不
得伸拮梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末半用湯調
時時服之半用蜜為丸噲化之服盡良愈因嘆曰性者不
可追來者不可及凡他所有病者皆方書以貼之全活甚
衆時人皆曰此方天人所制遂刊於石以傳永久

黃芩

黃連各半

人參三升

橘紅

玄參

生甘草

柴胡

桔梗各二

連翹

鼠粘子

板藍根

馬勃各一

白僵蠶炒

升麻各七

右件為細末服餌如前法或加防風薄荷當歸身咬咀如
麻豆大每服秤五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱時時服
之食後服如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫
勢甚者宜破刺之

治熱病五六日壯熱狂語欲走

鷄子

取散

芒硝研細

寒水石

細研各

右先以新汲水一小盞調芒硝等末次下鷄子清攪令勻不拘時候分為二服

羚羊角散

治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發熱顛狂

羚羊角屑

犀角屑

茯神

黃芩

甘草炙

防風略半

龍齒

人參

鐵粉略一

地骨皮三分

右吹咀每服五錢水一大盞煎五分去滓不拘時溫服

鐵粉丸

治熱病心神恍惚悲喜不常發狂欲走

鐵粉細研

牛黃細研

遠志去心

丹參

茯神

升麻略半

金箔

三七片

銀箔

三七片

麝香細研

白僵蠶微炒

白附子炮

各馬牙硝三分

右為細末同研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大
每服二三十丸不拘時蘆荷湯下

含化犀角丸

治熱病心脾虛熱肺氣暴壅喉中腫痛口舌乾

燥燕津有防不下飲食宜服

犀角屑

黃藥子

子參

鬱金

大黃剉炒

玄參

甘草炙

升麻

各半兩

絡石葉

射干各三

天門冬

去心焙

馬牙硝

各一兩

右為細末入馬牙硝研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如小
彈子大每服不拘時常含化一丸燕津

生地黃煎

治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃宜服

生地黃汁

生瓜薑汁

生麥門冬根汁各五

蜜二合

酥一兩

生藕汁三合

右一處相和於鍋中熬令稍稠每服不拘時抄半匙服

刺刺飲子 治熱病頭痛壯熱鼻衄及吐血心中緊硬遍身寒

痛四肢煩悶宜服

刺刺

生地黄

生麥門冬

夫心各一兩

赤茯苓

鷄蘇

生薑醱半

青竹茹一分

右咬咀水三大盞煎一盞半去滓不拘時分溫三服

治熱病衄血日夜无度身面如金黃色

右以葢根一握搗絞取汁以罐盛索繫投於井中深处良

久急取出溼水同和滴二七滴於鼻中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服

右以好松煙墨二兩搗羅為細末用鷄子白和為丸如梧

桐子大每服二十九用生地黄汁下如人行五里再服以

瘞為度

龍膽煎 治熱病口瘡發渴痰痛不可忍宜塗

虎膽草

黃連

升麻

槐白皮

大青路一

薔薇

竹葉

各二兩

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢火

煎成膏塗於瘡上有涎吐之

青箱子丸

治熱病毒攻於眼內宜服

青箱子

防風

枳殼

各一兩

枸杞子

生地黃

石決明

澤瀉

各一兩

麥門冬

去心各二兩

羌蔚子

細辛

黃連

各三兩

車前子

兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

九以粥清飲下不拘時服

解毒犀角丸

治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服

犀角屑

黃芩

馬牙硝

大青

各一兩

梔子仁

半黃細研

天竺黃

細研

亦茯苓

甘草

生用

黃連

各半

麝香

一錢

麥門冬

去心

各半

右為細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調下

白鮮皮散

治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡

白鮮皮

升麻

黃芩

犀角屑

梔子仁

赤芍藥

大黃炒

甘草炙

玄參

杏仁

湯浸去皮尖

麥門冬

去心

右咬咀每服四錢水一中盞煎六分去粗不拘時溫服

藍葉散

治熱病熱毒盛疔瘡出頭黑者為難治

藍葉

玄參

瞿麥

犀角屑

升麻

各一

木香

一分

甘草

炙半

右咬咀每服五錢以水一大盞煎五分去粗不拘時溫服

茵陳散

治熱病黃疸月黃如金小便如血心煩躁悶口若頭

痛宜服

茵陳

梔子各三

木通

瓜蒌根

柴胡

秦艽各一

甘草炙半

麥門冬一兩半
去心

右以咀每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不拘時候溫服

承氣丸

治熱病若十餘日不大便者宜服

大黃炒

芒硝各二

枳實剉少

大麻仁研入

都李仁

湯浸去皮
研各一兩

右為細末和勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服

五十丸不拘時以溫水下未利再服

木通散

治熱病小便不通或淋瀝疼痛

木通

琥珀研各一兩

赤芍藥

枳實剉少

茅根

甘草炙各半及

右以咀每服四大錢水一中盞煎六分去滓不拘時候溫服

石薺散 治熱病小便不通

石薺 去毛

瞿麥 各一兩

木通

甘草 炙

子芩 各半兩

葵子 三合

右咬咀每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

太醫院經驗奇效良方大全卷之十一

奇效良方卷之十二

瘧門 附論

瘧之為病其名有五一日瘧瘧二曰寒瘧三曰濕瘧四曰牝瘧五曰牝瘧名雖不同其感皆由六淫七情所傷飢飽勞逸經云夏傷於暑秋必瘧瘧體虛之人易感發則呵欠寒熱頭疼或先寒後熱或先熱後寒或單熱單寒或熱多寒少或寒多熱少一日一發者易治又有二三日一發者難愈失瘧瘧陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒寒實不泄煩渴且嘔肌肉消瘦也寒瘧自感寒而得無汗惡寒鬱痛而慘先寒後熱也濕瘧胃襲兩濕汗出濕滲得之身體重肢節煩疼嘔逆脹滿也牝瘧久受陰濕陰勝陽虛不能制陰所以寒多不熱氣虛而泄溼慘振振也牝瘧飲食不節飽飢有傷表裏俱虛致使然也病由邪氣交爭陰陽二氣更相勝負邪正相搏而作焉衛氣與邪氣相離故汗而解衛

氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰則內搏故發於暮夜若邪氣內搏於五臟積連於募原其道遠不能與衛氣交併故有隔日發之又有三四日一發衛氣之行逆行速病作有發有晏甚者內外失守真邪不分陰陽失勝寒熱五起則休作無定時也素問論六經瘧足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴亡暍亡然熱止汗出難已足少陽瘧令人身體解休寒不甚熱不甚惡人見人心惕亡然熱多汗出甚足陽明瘧令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱亡去汗出喜見日月光文氣乃快然足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔亡已乃衰足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱亡多寒少紋閉戶牖而震其病難已足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿心便不利如癢狀非癢也數使意恐懼氣不足腹中怵亡鉅此之分皆是五藏之受病夫心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多

不甚熱肝瘡者令人色蒼上然太息其狀若死者脾瘡者令人
寒腹中痛熱則腸中鳴上已汗出肺病者令人心寒上甚熱上
間善驚如有所見腎瘡者令人洒上然腰脊痛宛搏大便難目
眵上然手足寒又有胃瘡者令人且病也善飢而不能食上而
支滿腹大上痺治法瘡脈多弦數則熱弦邊則寒風以散之寒
以溫之不虛不實以經取之痰以滌之停滯疎利之虛則補之
不可便用斷截之乘截之太早邪氣薄於五臟傳留日久變證
多端用藥次序無不効矣

瘡疾通治方

清脾湯 治瘡瘰脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾

小便赤澀

青皮

厚朴鹽製

白朮

半夏

柴胡

黃芩

茯苓

去皮

草薺

各一錢半

甘草

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

定齋草菓飲子

快脾治痛

草菓二錢

蒼朮

三錢水浸

厚朴

二錢薑製

半夏

陳皮

各一錢

甘草

半錢

右咬咀每服半兩水一盞半薑五片棗二枚煎至七分不

拘時服寒多者加乾薑附子熱甚者加芫胡疔疔加檳榔

所加者各等分一方加人參一方熱多者加石膏

草菓飲

治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草菓仁

紫蘇

良薑

川芎

青皮

白芷

甘草

各一錢

石作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

四獸丸

治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲

衛氣相搏發為瘡疾

人參

白朮

茯苓 去皮

橘紅

半夏

湯炮七次

草菓

各一錢半

烏梅 一錢

甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑七片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

人參養胃湯

治瘡疾寒多熱少者必須六服此藥

人參

去芦

厚朴

薑製

陳皮 各一錢半

蒼朮

二錢米泔水浸炒

茯苓

去皮

半夏

湯炮七次

草菓

藿香

甘草

炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

柴胡桂薑湯

治瘡疾寒多微熱但寒不熱并治勞瘵

柴胡 三錢

桂枝

乾薑

牡蠣

甘草 炙各一錢

黃芩 半錢

瓜蒌根 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

七寶飲

治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如

似瘡證

厚朴薑制

陳皮

草菓

常山鷄骨

檳榔

青皮

甘草炙各一錢半

右作一服水一鍾半酒半鍾煎至一鍾去粗露星月一宿

空心向東服

小柴胡湯

治瘡疾熱多寒少或單熱頭痛胃滿咽乾

方見傷寒門

白虎加桂湯

治瘡疾但熱不寒者

知母三錢

石膏五錢

粳米一撮

甘草一錢半

肉桂去皮

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

蠶甲飲子

治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡母

驚甲 諸灸

白朮

草菓

檳榔

川芎

白芍藥

厚朴 薑製

橘紅

甘草 炙各一錢

黃耆 半一錢

右作一服水二鍾生薑七片紅棗一枚烏梅少許煎至一

鍾不拘時服

老瘡疾

治久瘡結成癥痕落在胃脇諸藥不愈者

蒼朮

米泔水浸

草菓

猪梗

青皮

陳皮

良薑

半夏 湯泡

茯苓 各一錢

枳殼

麩炒

甘草 炙

乾薑

桂心

紫蘇

川芎

白芷 各半錢

右作一服水二鍾鹽少許煎至一鍾空心服

四將軍飲

治寒熱瀉疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此

雖一時急用之有驗

附子

泡去皮

訶子

半錢

陳皮

三錢

甘草

半錢

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不拘時服

勝金丸

治一切寒熱瘧疾胃膈停痰發散不愈者

檳榔

四兩

常山

一斤酒

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三十九當發前一

日臨卧時用涼酒吞下便睡至四更再吞一服一方用鷄

子清為丸

碧霞丹

治火瘧不愈者

東方甲乙木巴豆

別法研

南方丙丁火官桂

別法研

中方戊己土硫黃

別法研

西方庚辛金白礬

別法研

北方壬癸水青黛

別法研

右於五月一日備治了用紙各裹以盤盛依前方位排定

勿令猫犬及婦人見安在神佛前至端午日午時用五家

粽尖和前藥令勻丸如梧桐子大遇患者以綿裹一丸塞於鼻竅中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除一方塞於耳內

灸法

治癰疾久不愈不問男女皆治

其法於大椎中第一骨節盡處先鍼後灸三七壯立効或第三骨節亦可

桂枝黃芩湯

治墮三陽合病熱甚者

桂枝 一錢

黃芩

半夏 丸

人參 各二錢

柴胡 六錢

石膏 四錢

知母 半錢

甘草 各一錢

右次咀分作二貼用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

露薑飲

大治脾胃聚痰發為寒熱

生薑 四兩

右和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服或吐或利即安

芎歸鼈甲散

治勞瘵表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞

復來

川芎

當歸

鼈甲醋炙

茯苓

青皮

陳皮

半夏

芍藥

右咬咀各等分每帖二兩用水二鍾生薑五片棗二枚烏

梅一枚煎至一鍾食遠服熱加柴胡寒多加草菓

交加飲子

治久瘡不已山嵐瘴氣

肉苳菟

二箇一箇煑藥
煨一箇生用

草菓

二箇同
上法

厚朴

二十一寸生
一寸薑煎茶

甘草

生二寸一寸
寸炙

生薑

一塊半
煨半生

右咬咀作一服當發日用水二鍾煎八分服粗再煎服

虎頭骨丸

治一切瘡疾

虎頭骨

酥炙
二兩

川大黃

剉炒

乳香

甘草

桂心

知母

已上各
兩

硃砂

牡蠣粉

烏梅肉炒

附子炮

枳殼去穢

麝香別研

木香

常山已上各半兩

桃仁三七枚湯浸去皮尖雙仁炒

生薑

一塊如鴿子大半煨半生

右為末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃條湯下

剋効餅子

治一切瘡疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓

振頤頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胃中煩滿欲嘔或先熱後寒或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或一發後六七日再發皆治之

甘草搗

菘豆末

荷葉搗各五錢

定粉研

龍腦研

麝香研各半兩

金箔二十五片為衣 信砒醋煮二兩半

硃砂研飛一兩

右為細末煉蜜搜和每兩作二十九捏匾以金箔為衣每服一餅以新水磨化日發者未發前服之間日者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日者凌晨服

常山酒

治瘡

常山

鼈甲

醋炙黃各三兩

虎頭骨

炙半兩分

桃枝

一握

柳枝

一握

桃仁

三七枚去皮尖炒

乾棗

三枚去核

烏梅

炙七枚

右細剉以酒一升浸一宿明日入生姜五片煎取五合去滓空心分為二服

五行神驗丸

治一切瘡疾

靛花

二兩東方

桂心

一兩南方

乾姜

一兩西方

巴豆

一兩北方

硫黃

一兩中央

麝香

少許

右將五般藥於盤內攪五方安排定取四月二十八日夜

安車子上於中庭露以香一爐當處心如是露七夜至端
午日早脩合將巴豆去殼湯五十沸搗研餘藥為散入麝
香以薄糊調散花末為丸如櫻桃大各時忌女子等見丸
子焙乾於盒內盛發日淨手取以綿裹香火炙令熟男左
女右頸前帶安耳中便利時除却淨丰後再安耳中不得
女子捻觸女子患男子與安忌一切葷腥菓子一方無麝香

醉邪丹

治嵐瘴鬼瘧食瘧頭併者

雄黑豆

小豆一作

菘豆

各四十九粒

信硫

半錢另研

黃丹

為一錢

衣

右為末於端午日同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每
服一粒用東南桃心七枝研汁將井花水早晨日欲出未
出時吞之醋湯亦得其驗不具言三五月患者只一九服
後大段者只微寒若小可便絕去也當發日服忌葷腥三
日一服孕婦不可服一方有雄黃

神聖藥師餅

治瘡疾等證

人言

雄黃錢各半

白麩七錢

乾胭脂一錢

右各研極細和勻滴水和為餅子如棊子大每服三餅臨
卧細嚼冷水送下忌濕麪葷腥生硬冷物分作三十服虛
實大小加減服之

斷魔如聖丹

治瘡疾

人言一錢

蜘蛛大者三枚

雄黑豆四十九粒

右為末同研細滴水和丸如豌豆大米日發今夜北斗下
獻早晨紙裹一丸塞耳中一粒可治三人其効如神

白扁豆丸

治瘡疾

白扁豆炒一兩 菉豆炒一兩

好信五錢

右為末入白麩四兩水和充如梧桐子大臨發日五更用
涼水送下忌熱物

瞻仰丸

治一切瘡疾

常山四兩

草菜二兩

右為末薄糊為丸如梧桐子大臨卧冷酒下四十九五更時再服三十九忌熱物并羊肉

治瘡疾如神方

黃丹

大蒜亦可

右二味先將大蒜搗碎後入黃丹為丸朝東吞下一方去蒜皮再入大蒜五箇入辰砂末一錢宿蒸餅丸如梧桐子大空心井花水下十九十歲以下丸如麻子大忌生冷油膩熱物湯合藥時宜端午日

治瘡方

右用桃仁一百箇去皮尖大小於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧桐子大每服三九當

發日面北用溫酒吞下如不飲酒并花水下亦得須五月五日合忌鷄犬婦人見

龍華散

治諸瘡疾

右用蛇蛻一條或三五條用炭火燒存性研為細末每服一字無根水下未發前一時服忌鷄魚冷物一方用蛇皮塞兩耳中臨發服少許

瘡十二瘡 昔黃帝問岐伯曰瘡多方少愈者何岐伯荅曰瘡有十二種帝曰瘡鬼何可得聞乎岐伯曰但得瘡鬼字便愈不得其字百方不愈帝曰願聞之

寅時發者獄死鬼所為瘡之以瘡人著蜜上灰火一周莫令火滅即瘡

卯時發者鞭死鬼所為瘡之用五色衣燒作灰三指撮著酒中無酒用清水服之

辰時發者墮木死鬼所為療之令瘡人上木高處
巳時發者燒死鬼所為療之令瘡人坐地以周匝然火
午時發者餓死鬼所為療之令瘡人持脂火於田中無人
處燒脂香假拾薪去

未時發者溺死鬼所為療之令瘡人臨發時三渡東流水
申時發者自刺死鬼所為療之令瘡人欲發時以刀刺冢
上使得姓名字呪曰若瘡我與汝技却

酉時發者奴婢死鬼所為療之令瘡人碓碓稍上卧莫令人
道姓字

戌時發者自絞死鬼所為療之左索繩繫其手脚腰頭
亥時發者盜死鬼所為療之以刀子一口箭一枝灰一周
安瘡人腹上其箭橫著底下

子時發者寡婦死鬼所為療之令瘡人脫衣東廂床上卧

左手持刀右手持杖打令声不絕瓦盆盛水著路邊

丑時發者斬死鬼所為瘰之令瘡人當戶前卧頭向東

截瘡散

常山鷄骨柴 茯神去皮 肉桂去粗皮 甘草減半熬

右石槌不犯鐵器為齏散每服半兩用常酒大半碗浸一

宿於當發日早晨空心去滓冷服服後不可喫熱湯熱物

滓再浸或暑煎近發時再服一方不用肉桂茯神却用楮

榔烏梅要在人瘡損也凡瘡須是發作三五次後却用截

之為妙

知母散

治一切瘡疾不問先熱後寒先寒後熱熱多寒少

寒多熱少年久瘡者止一服取效鄆州羅監稅傳方大有

功效

知母直者

貝母

常山

楨榔五

右咬咀作一服水酒各一盞用綿蓋定露一宿五更望東
冷服直到巳時食乾物者喫水便吐煎時不得婦人見

大蒜平胃散

治一切瘡

右平胃散一貼大蒜一箇搗爛用一大碗井花水調蒜澄
清以半調平胃散飲盡又以餘蒜水再飲用厚被蓋卧汗
出即愈友人鄧瀛叟由赴監試感此遇道人授此方

一剪金

治瘡疾寒熱乃聖藥也

人言

硫黃各寺分

右同研末用緋紅絹子手捻一捻放絹上裹如豆大細絲
練繫纏數遭繫定用剪子剪下勿得不繫緊恐有藥失每
服一丸星全新水送空心服無得人知如服藥先一日夜
服至明正發日早勿令人知去無人知靜處避之或朝宇
內亦得

足厥陰肝瘡

夫經謂足厥陰肝瘡在經則令人腰痛小腹滿小便不利如癢
狀非瘡也數便意欲恐懼氣不足腹中悒悒在臟則令人色蒼
蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脈循陰器邪
氣客之則少腹滿小便不利也肝為將軍之官謀慮出焉故病
則恐懼不足也蒼上者肝之色也宜察其經絡腑臟而治之治
肝瘡顏色蒼蒼顛掉氣喘積年不瘥鼈甲丸等方主之

鼈甲丸

治肝瘡色蒼蒼顛掉氣喘久不瘥者或久熱勞微

動如瘡

鼈甲

去粗攔

蜀漆

烏梅

取肉

常山

知母

各一分

姜糖

甘草

微炙

苦參

石膏

各半

香豉

一合

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九未發前米飲

下臨發釋服

知母湯 治肝瘡上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦不

下食

知母

地骨皮

升麻

鼈甲

去裙襖

犀角

人參

麥門冬

去心

柴胡

石膏

甘草

虎頭骨

酥炙一兩半一方無此有赤茯苓三兩

右藥搗篩每服四錢水一火盞入香豉五十粒煎至六分

去滓不拘時溫服

木香犀角丸

治肝瘡

木香

羚羊角

燒屑

犀角

名

升麻

玄參

猪苓

檳榔

各二兩

鼈甲

酥炙

甘草

豉

右為細末煉蜜和丸如語桐子大每服三十九用溫酒或

未飲送下日再服體熱即去甘草檳榔加大黃五兩

手少陰心瘧

附論

夫心瘧者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺于少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故煩心其欲清水者以心火內熱故也其反寒多不甚熱者內熱而外寒故也治宜通心經利邪熱則愈

甘草湯

治心熱為瘧不止或止後熱不渴乍來乍去令人

煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者

甘草

一兩

蜀漆

三兩

常山

鼈甲

各四兩

石膏

五兩

香豉

一合

梔子

烏梅

各十枚

竹葉

切二升

右以水九升煮取三升分三服

瘧香

治心瘧

飛丹

黃丹色紫

砒霜各一 硃砂一兩

金箔三下

右細研令勻用棗水飯和丸如梧桐子大男左女右中指

節上用緞線最繫一丸發前以冷醋湯一丸忌食熱物

硃砂丸

治心瘡

光明砂辨兩常山一兩

杏仁仁炒湯浸去皮尖

右為末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未發前以

粥飲下十五丸欲發時再服

足太陰脾瘡

附論

夫足太陰之經脾之脈也脾經之瘡令人不樂好太息不嘗食
多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴
已汗出故謂太陰瘡又名脾瘡

摘皮甘草湯

治脾臟不和瀉利瘡疾腹痛下部無力體重

足痿腳下痛飲食中脘四肢不舉等病陸景淵方曾以治
瘡甚効

橘皮 生用

耳草 炙

厚朴 去皮薑汁制
已上各一兩

羌活

防風

肉豆蔻

茯苓 各二錢半

川芎 半兩

吳茱萸 一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去粗食

前服

人參飲

治脾瘵

人參

甘草 炙

陳橘皮 湯浸去白
焙半兩

烏梅 五枚
去核 草薹 寇仁
十枚
去皮

右剉為末每服五錢用濕紙裹煨熱用水二盞生薑一片
棗一枚擘碎煎至一盞未發前溫服

獨行丸

能截脾寒

石於五月五日用大蒜不以多少搗爛坎入礬紅餅勻蒸
九如圓眼大每服一丸大蒜湯嚥下

良薑丸

醒脾治瘧

良薑

二兩

右為末粥膽汁和丸如梧桐子大紫蘇湯空心下二十九

手太陰肺瘡

附論

夫肺瘡者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見刺
手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通故瘡邪于肺內
動於心則為寒熱善驚之候也

人參丸

治肺瘡心寒熱善驚如有所見

人參

鼈甲

去僂闕

桃仁

去皮尖及

常山

甘草

肉蓯蓉

酒浸

升麻

各三

桂心

去粗皮

烏梅肉

以

龍齒

研各

丹砂

研一

阿魏

研一

杏仁

去皮尖雙上

右為未煉蜜九如梧桐子大每服十五九空心用水飲下
未發時併二服

杏仁九

治肺癆

杏仁

四十枚湯洗去
皮尖雙上

常山

三分

丹砂

別研

甘草

一分

右為細末煉蜜和丸如菽豆大每服十五九未發米飲下

日再服之

足少陰腎癰

附論

內經謂足少陰腎癰在經則令人嘔吐甚多寒熱多寒少欲
閉戶牖而養其病難已在臟則令人洒洒然腰脊痛宛轉大便
難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰蓋腎脉入肺中肺脉環胃
口故使人嘔陰虛則陽氣偏故熱多若洒洒腰脊痛大便難目

响手足寒特以葭氣內壓機關不利故為此證也

烏梅丸

治腎瘡令人洒洒然腰脊痛大便難目响手足寒

及諸瘡久不瘳者

烏梅肉

一斤一分

豉一分

虎頭骨酥炙

附子

炮去

肉蓯蓉

酒浸切焙已

麝香別研

桂心

皮去

知母

切焙各

桃仁湯洗去皮去雙

右搗研為末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空

腹米飲下木發服一方無

菴零丸

治腎瘡

肉蓯蓉

酒浸切焙

桂心

甘草炙

升麻

各半

豉炒三

常山三分

桃仁

湯浸去皮炙

右搗研為末和勻煉蜜和丸如梧桐子大未發日空腹溫

酒下二十九未飲亦得至發時更服二十九

足少陽膽經

夫少陽膽之狀內經謂令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘡邪外中其氣不守故心常惕惕然邪盛故熱多有風故汗出

升麻湯

治足少陽瘧身體解休見人心惕惕然熱多汗出

升麻

鼈甲

去裙襖

淡竹葉

各一兩

常山

半兩

犀角屑

麥門冬

去心

知母

切各二兩

甘草

炙半兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓空

心日午溫服

犀角湯

犀角

甘草

炙各一兩

麥門冬

去心

升麻

知母

鼈甲

去裙襖

各一兩半

石膏

碎研

二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓於未發前溫服

足太陽膀胱瘧

附論

夫太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇上然熱止汗出難已刺郛中出血蓋膀胱經下抵腰中上巖絡腦故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒后熱也熱止汗出難已以真氣不勝邪故也

柴胡湯

治足太陽瘧寒熱

柴胡

常山

知母

鼈甲

去偽關

青蒿

甘草

枳殼

官桂

去粗皮

右爲搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再服

足陽明胃瘧

附論

夫足陽明胃瘡在經則令人先寒洒淅寒甚久乃熱去汗出
悉見日月光火氣怏然當刺足陽明跗上在胃則令人且病善
飢而不能食則支滿腹大當刺足陽明太陰橫墨出血蓋胃
圍冲氣為水穀之海邪氣客之則冲氣不和故善飢不能食
則支滿腹大傳於經者為寒熱陽不勝於陰故喜見日月光及
火氣也

順氣湯

治足陽明胃瘡支滿腹大

厚朴

去皮薑汁製

陳皮

湯浸去白

白朮

半夏

湯浸七次各一兩

乾薑

炮

柴胡

去苗

甘草

炙各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘破煎七分

去滓不拘時溫服

枳殼湯

治胃瘡心膈脹滿不食

枳殼

去皮炒三兩

厚朴

去皮製

人參

白朮

白茯苓略二

右倉枲篩每服四錢水一盞半入生薑二棗大切煎至一盞去滓溫服

紅丸子

專治食癪

荆三稜醋煮蓬木略二

胡椒一兩

青皮炒香三兩

阿魏醋化

右為細末別用陳倉米同阿魏醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因食生菜成瘡用麝香湯吞下一方炒土珠為衣以老瘡飲下古方雖有說甲煎等不特服不見効

神効方

治寒瘡

硃砂細研

白芥子

阿魏錢一

香墨五錢

砒礬

一刃酸漿水一碗於帶干日未出諸瘻火敷如稀糊便入後桑

右為末以硃霜前九如黍米大每於未發前冷醋湯下
一丸至二丸忌食熱物

分利順元散

治體虛之人患瘡寒多不可服截瘡藥者

川烏

附子各

南星二刀

木香五錢別到
臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟
合和咬咀每服四錢水一盞半生薑十片棗七枚煎至七
分發前一日及當發日早晨連進兩三服半生半熟能解
陰陽

菓附湯

治氣虛脾寒瘡疾不愈痕寒少熱面青或單寒者

或大便溼泄小便反多不下食

菓菓仁

附子炮

右各等分咬咀每服半兩水二盞生薑七片棗一枚煎至
七分去滓不拘時溫服

知母鱉甲湯

療溫瘧壯熱不能食

知母

鱉甲炙

地骨皮各

三竹葉物

石膏四兩

常山二兩

右切以水七升煮取一升半去滓分三服忌蒜猪肉菘菜

生葱生菜

藥餛飩

治證同前

良薑

吳茱萸

胡椒各一分

右為細末猪脾一條剉作臛加五分炒之一半衮藥一半不衮藥並作餛飩有藥者以墨點之遇點者吞下無藥者嚼下一服効

白朮丸

治瘴瘧

白朮

丹砂研

麝香研

丁香

訶梨勒皮

安息香入研

檀香研

華

華

犀角

鑄各半兩

薰陸香

蘇合香

龍腦

研各一兩

莎草根

石膏

木香

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十九空腹并花水下老
入小兒三九仍用紗絹袋盛藥帶於臂上辟鬼氣臘月合
以磁器盛勿令泄氣

却毒散

治山嵐瘴氣有黑霧起慶急服

麻黃

防風

去義

蜀椒

去目并合口者
妙出汗各一兩

烏頭

炮去

官桂

去麁

白朮

桔梗

妙各一兩

乾薑

炮一

右為細末每服一錢溫酒調下每日食前常服

一云嵐氣者嶺南青草黃芒瘴狀如嶺北傷寒也角地暖
故大陰行草木不黃而落伏蟄不閉而藏雜蟲因暖而生
則仲夏有青草瘴孟冬有黃芒瘴彼人失醫多成痘病即

為難治嶺南人得之亦如傷寒壯熱頭疼一日三日已上
在于皮膚前可汗而愈五日已上結于臟腑身重而腹痛
當下之得愈即不可先下下之亦為難療其或不解則春
秋作瘡痢而肌膚黃瘦

預固丸

治嶺南諸瘡

丹砂

雄黃各一两並研細
水飛過令乾

鬼臼半兩
為末

阿魏

一分用酒半
并熬成膏

右再研令勻以阿魏膏和丸如鷄頭大緋綃袋貯十九常
執手中頻嗅瘴氣內行不着人遇瘴氣病者并花水嚙下
三九五服瘥

香椿散

治瘴氣惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食增寒

壯熱發過引飲二廣八閩多山嵐烟霧蛇虺瘴毒之氣當
秋七八月之間芒華發時此時疾大作謂之黃芒瘴又謂

之黃茅瘡是也蓋人或因飢飽或由虛怯或衝烟霧或涉溪澗遂得此疾謂之黑脚瘡蝦蟆毒啞瘡其名不一並皆治之

香椿嫩葉

三兩酒
煨炒

南壁土

向日
甘草炙

臘茶

各一兩

右為細末每服四錢用酒調下如患久者更入甘遂柴胡各半兩空心臨卧服

鯨鯉甲酒 治山嵐瘴南方山嶺瘴氣令人寒熱發作無時

痿黃腫滿四肢痺弱

鯨鯉甲炙五錢鱉甲去裙關烏賊魚骨去附子炮裂去皮

常山半兩
方無一

右細剉以酒二升半煎漬一宿瘡發前稍稍服之勿絕藥味兼以酒塗身體服藥良久方可進食

山瘴癘酒

療乍寒乍熱乍有乍無及瘴疫滯發歇不定

不瘥者

常山 三兩

鼈甲 炙

升麻

魚賊魚骨

去甲

附子

各一兩

右並切絹袋盛以酒六升漬之以冷近火轉之一宿每服一合七發可數服或吐忌猪肉生蔥生菜菹菜

保安湯

治山嵐瘴癘寒熱久不瘥

常山 半兩

青蒿

知母 各一兩

桃仁

湯浸去尖尖

右叢搗篩每服二錢水一盞生薑半分同煎至六分去滓不拘時稍熱服

觀音丸

治取下暑毒瘴毒

圓白半夏

生烏梅肉

川巴豆

不去油

母丁香

每料各一枚

右為末薑汁煮麩糊丸如麻子大上下以厚紙蓋貼有油

聯又再易紙每張五九臨卧冷水下此方舟入於海角遇
白衣人授之

破塊丸

治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之効

葷撥

大黃各一兩
俱生用

右為細末入麝香少許煉蜜為丸如梧桐子大每服三十
丸空心冷酒下日三服

附子湯

治瘴瘡經久不瘥正氣羸弱身熱如火極寒極熱

連日方醒發時沈著枕簾不能搥身戰掉不堪便溺飲食
不便

附子

二枚一枚生去皮時一枚炮
熟去皮臍藍水浸各一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑七片紅棗七枚煎至七
分去滓攤令吞靈砂丹五十粒或百粒未効再以七棗湯
吞黃芽丹二十九仍服黑錫丹以墜痰亦可回元氣凡此

瘡但當守續真元沉屢熱為法

沃雪湯

治山嵐瘴氣

蒼朮

去麩皮炒

甘草

鹽煎炙

防風

紙切

白芍藥

去支

厚朴

去麩皮薑壓一宿後炒黑色

乾葛

各四兩

朴硝

半兩研

右劉散每服四錢水二盞煎至一盞去滓不拘時熱服服畢少時以薑葱作羹或作粥喫了避風坐卧身禮滋潤即愈兩滓又合煎服

茵陳蒿湯

治瘴癘發作有黃疸熱不寒頭痛不安通身俱

黑大腸秘熱小便黃赤

茵陳蒿

山梔子

去心

柴胡

黃芩

去黑

桔梗

牡丹皮

去心

貝母

荆芥穗

去梗

升麻

半夏

湯洗七次

羌活

杏仁

湯浸去皮尖

獨活

麻黃

去根節

已

細辛

一分

右竈搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎一沸急瀉出臨發熱頭痛去滓熱服不拘時候但此瘡止發熱并初發時先壯熱者可服熱多寒少食後喫此藥

大青飲

瘰癧積熱痰盛寒少熱多寒躁引飲

大青

一兩莖葉紫者是不藥即是遠志不可用也如無真者以青黛代之 大黃醋炒

赤芍藥

常山炒

龍膽去土

甘草炙各三兩

右兼搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫服氣盛熱多宜服得利或熱稍退即止人宿有冷疾年四十以上者雖有熱證不宜多服

常山飲

治瘰癧但熱不寒煩渴不止

常山

剉碎

甘草

剉碎

青蒿

分

烏梅

去核

燒

右篩却以小便一盞水一盞酒一盞煎至一盞去滓當

發日空心服

鬼哭散

治瘧瘧但熱不寒

右用黃丹煨過臨發時蜜湯調下稍大能飲酒用酒調下

神聖丸

治間日瘧

此藥錢一

大棗

三枚黃去核皮

黑豆

小者二十一粒水浸去皮

右須於重午七夕日備合研丸如豌豆大以丹砂為衣合時忌婦人鷄犬見於發日早晨將一九面北香上度過用冷茶清送下忌熱物一復時

治瘧或間日發或夜發者

常山

竹葉

各三

林米

一百

石膏八兩

右以咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀其上明日取藥病人房中以銅器緩火煎取三升分三服清旦一服未發前候一食頃一服臨發一服服訖靜室中卧莫共人語當日勿洗手面及漱口勿進食取過時不發

少頃乃澡洗進食并用藥汁塗五心官前頭面藥滓置頭

邊

常山酒

治間日瘧

常山一兩

糯米

黑豆

各一百粒

蒜

搗頭者一類去根並黃切

右咬咀以清酒一升病未發前一日以酒浸藥於碗中以白紙覆之碗上橫一刀欲發時三分飲一分知之吐更服一分得吐則瘧

半夏散

治瘧瘧發作有時熱多寒少頭痛額角并脅前此

肉潤動食繞入口即吐出面色帶赤宜服此

半夏

湯浸洗去滑為末生薑汁

羌活

芎藭

各一分 牽牛

各半

右為細末每服三錢食後白湯調下

蒜丹丸

截瘧消痰

鏡丹

穿山甲

煨火中飽 各一兩

土硫

半兩

右為末以獨蒜煨去皮研膏和丸如梧桐子大每服十九生薑烏梅紫蘇湯送下

龍甲清酒

治痰癯以時發

龍甲

半兩 鱗炙

烏賊魚骨

去常山 各二兩

附子

炮裂去

甘草

右剉如麻豆大每服五錢以酒一盞半清藥一宿明日以酒先塗五心遇發時癯斷若不斷可飲藥酒一二盞即癯

七棗湯

治五臟氣虛陰陽相勝作痰癯不問寒熱先後與

夫獨作癯作間日及痰痞塞不通發作無時或寒多熱少或單寒者悉皆治之

附子

一枚炮裂以鹽水泡 每片七次不浸 去皮腐一方以陳壁土為糊 浸七次

右咬咀分作二服水半碗生薑七片七棗七枚煎至八分盞

當發日去滓空心溫服川烏亦可一名冷附湯去棗煎
熱露一宿五更初冷服

凡患瘧疾無過是瘵實痞塞不通脾氣弱虛熱在上停於
胃膈不得入於臟腑所以五更冷服乃使藥下達壯脾胃
夫瘵實降虛熱養心氣屢試驗治瘵虛寒久不瘵者空心
服乃食棗三箇一方葱白七寸同煎

龍虎丹

治瘵久不瘵或止或發繼月連年諸藥無効者

狗頭骨

鼠頭骨

牛頭骨

虎頭骨

兔頭骨

狸頭骨

龍角

獼猴頭骨

馬頭骨

天靈蓋

鼈甲

龜甲

阿魏

細研

麝香

別研各

蛇頭

一枚

雄黃

細研

珠珀

細研

右為末入別研藥和令勻以軟飯和丸如鷄頭大以青絹

裘男左文石中指上繫一丸未定即以醋茶下一丸

鯪鯉甲酒

治久瘡不瘥

鯪鯉甲

酒釀

去_去醋_醋各_各半_半兩_兩

烏賊魚骨

去甲

常山

烏梅肉

竹葉

一怪

豉

一合

桃仁

去_去尖_尖各_各七_七錢_錢

葱白

七莖

右剉如麻豆大用生絹袋盛以酒三升浸經一宿每日空
腹溫服半盞良久取吐如不吐至巳午時再服三兩服如
不瘥喘日更依前服之

治久瘡

批莖

雄黃

阿魏

黃丹

硃砂

丁香

麝香

一分

石同研為細末醋煮麩糊為丸如雞頭實大以緋帛裹一
丸男左女右繫其臂上

實

治瘡久不瘥

蜘蛛

五枚大芥去
所如膏

蛇蜕皮

一條全
者燒天

蝙蝠

一枚炙
微焦

麝香

半兩
細研

鼈甲

一枚去君刺
踏塗炙黃

右為末研勻五月五日合以蜘蛛膏入煉蜜和丸如麻子

大每服五丸空心溫酒下小兒茶下二丸

久瘡丸

治瘡百方不瘥者宜服

批嘯

一錢

乳香

半兩
所

半夏

湯洗七遍
乾拌一兩

右為細末於重午日正午時用粽子尖和為丸如皂角子

大發時以醋湯下一丸更不再服如非重午日須兩服藥

祛瘡神應丸

右用三姓人家寒食日食用白麵每一家取一匙於五月

五日午時採青高播取自然汁和前麵為丸如粟豆大每

服一丸當發日早晨取無根井水送下一方用黃丹一匙

炒過與麩一處碾和勻

治勞瘵

治勞瘵

襪甲

炙雞黃著

牛膠酒化

天靈蓋酥炙

鬼絲子

酒浸別出續斷

羌活去芦

柴胡去苗

赤尖苓

去皮

生乾地黄焙

木香

陳橘皮湯浸去

芍藥

山茱萸

去核獨活 去芦

藿香各一

麝香研一

右為末每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分空心和水服或煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九亦得

烏梅丸

治勞瘵及瘴鬼等瘡悉皆治之

烏梅肉

微炒肉浸一宿刮

鼈甲去襖

桃仁

湯浸去尖雙仁

香豉炒

麝香研

常山

川升麻

人參去芦

甘草炙

知母

桂心各三錢

右為末入麝香研勻煉蜜和搗二三日杵丸如梧桐子大
每服未發前空心溫酒下三十九至發時又服三十九每
日服之以瘥為度

露星飲

治久疔成勞

白茯苓

檳榔

常山

秦艽

柴胡

黃芩

半夏

官桂

白朮

甘草各等分

右咬咀每服三錢水酒各半盞露一宿次早溫去滓服

神効手把丸

治鬼瘡

獬豸頭骨

虎頭骨

貓兒頭骨

砒礬細研

常山

硃砂細研

乳香細研

麝香細研

白芥子

阿魏各一分

蜈蚣一枚

右為未研令勻取五月五日干時煉蜜和搗三五百杵丸如皂角子大以緋絹裹一九男左女右臂上繫之發時於淨室內焚香恭信解下男左女右以手把之時時就鼻嗅之四五度効

治鬼瘡神効丸

砒霜細研

硃砂細研

乳香

細研各半兩

麝香

細研

阿魏細研

安息香

葶豆末

猢猻頭骨

虎糞中骨

各一分

右為未研勻以蒸餅和丸如梧桐子大未發前男左女右手把一丸便卧一炊時久便瘥

萬安丸

治鬼瘡

虎頭骨

酒炙三兩

藜蘆

六兩

雄黃

研

鬼臼

天雄

炮去皮

蕪荑

炒

皂莢

酥炙去皮

各一兩

右為細末入引研雄黃末令勻煉蜜和丸如彈子大令患者頭上戴一九立瘡若除伏屍於內四角燒四粒除度氣於床前燒一粒或熱甚男左女右腎上帶一粒則便愈矣

雄黃丸

治一切遠年瘡結成癥瘕

雄黃

研

丹砂

研

麝香

研各半兩

鼈甲

去裙爛醋炙

龜甲

醋炙

木香

虎頭骨

酒炙

羚羊角

銹屑

犀角

銹屑

白礬

玄參

當歸

切焙

知母

防風

去叉

麻黃

去節

龍膽

去苗

牡蠣

燒赤

猪苓

去黑皮

柴胡

去苗

茯神

去木

升麻

檳榔

剉

地骨皮

赤芍藥

梔子仁

黃連

去鬚

烏梅肉

阿魏

安息香

研

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒

養絲

龍齒

各三分

石除別研外餘藥為細末合研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十大白粥飲下末發前服

消癖丸

治瘡母停水結腹脇堅痛

芫花

兩分

硃砂

細研五錢

右為末煉蜜和丸如小豆大每服十九濃煎棗湯下去癖用芫花大戟破水之劑下後即愈

柴胡桔萸根湯

治瘡而發渴

柴胡

黃耆

人參

甘草

生薑

各三分

大棗

二十枚

桔萸根

四兩

右咬咀用水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日三

麥門冬湯

治瘡病發熱煩躁體黃小便不利令人多驚如

有所見

麥門冬焙

去心犀角屑

杏二

溫浸去皮尖雙
麩炒微黃

常山

甘草炙各

糯米

一八
粒

右藥搗篩以水五盞煎至三盞去滓分為五服於發前溫服之

茯苓湯

治瘡病發熱身黃小便不利

赤茯苓

去黑皮

白芍藥

瞿麥

各一兩

右藥搗節每服

碎同煎至七分去滓食前溫服

奇效良方十二卷終