

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方卷之四十八

積熱門

附論

張子和云李屏山素飲酒一日得病醫用酒癥丸熱藥後目觀
天地但見紅色遂成龍火之證卒不能救崇漢李濟之常病目
及君省搽每服補肝散以致睛脹但見窓檻橫排幾至喪明令
備泄五七次繼服涼劑方始如故丹霞朱僧人魯病三陽畜熱
常居靜室不敢見明明則頭疼如錐每置冰於頂上不能解其
熱歷諸醫莫能辨其病后治之七日而愈其用汗吐下三法而
已後用涼物清鎮之平復如故夫人陰平陽秘神氣以寧蓋味
者狗情縱慾因致積熱之證非一朝一日故也皆出於心熱甚
則能傷血故出於心積熱者熱毒蘊積於內也或有熱氣素實
一時感觸熱毒之氣鬱積臟腑之間或在心肺之內令人口苦
咽乾涎唾稠粘眼澁多淚心氣通於舌脾氣通於口熱燥相合

無所受制故口舌上生瘡小便秘澁非傷寒之熱非風證之熱此乃積聚之熱也又有酒麪煎煉雄附峻補皆能有熱謂之積熱也何哉一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾若偏者皆致成疾過於熱者積溫成熱蘊積於內遂成前證經云偏勝則有偏害偏害則有偏絕不可不察也王安道曰人之所賴以生者氣也氣者何陰陽是也夫陰與陽可以和平可以乖而否善攝與否吉凶於是乎不能善者故偏寒偏熱之病莫過乎乖否之餘雖然寒也熱也粗工為之不難設積熱良工猶弗能以為計且以積熱言之始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則枝窮矣王太僕故曰益火之源以消陰氣壯水之主以制陽光又曰取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒吁千言萬語之間殆猶扣璧之在璞也積熱之病由此來矣人處中和偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷暖得中而已

矯枉過正識者憂焉治法以三黃丸凡熱皆出於心熱甚則缺傷血或以洗心散四順清涼散予之類此皆前人立論處方後之學者不可將陰陽虛盛之熱又有血分氣分之熱陰盛格陽之熱一例作積熱證治之反誤多矣今開積熱之方條具于後

積熱通治方

涼膈散 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並皆治之

方見火門

洗心散 治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澀

白朮 一錢

麻黃

當歸

荆芥穗

大黃 錢

芍藥

甘草 二錢

右作一服用水二鍾生薑三片薄荷少許同煎至一鍾不

拘時溫服

三黃湯

治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃蓮

去鬚

黃芩

去蘆

大黃

三錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

甘露飲

治胃中客熱牙宣齩腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經

受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼

麩炒

石斛

去蘆

枇杷葉

去毛

熟地黄

黃芩

麥門冬

去心

山茵陳

生地黄

天門冬

去心

甘草

炙

錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

消毒犀角飲

治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮頰結核

遍生瘡癩已潰未潰並宜服之

防風

去苗

鼠粘子

炒

荆芥穗

二錢

甘草

錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

八正散 治大人小兒心經熱咽乾口燥目赤睛痛臍滿秘
結小便赤澀

方見淋門

荆黃湯 治風熱結滯或生瘡癩

荆芥 四錢 大黃 二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

清氣散 治風壅痰涎上膈煩熱

枳殼 川芎 羌活 前胡

茯苓 羌活 獨活 青皮

白朮 人參 甘草 各一

右作一服用水一鍾煎至一鍾不拘時服

黃連解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚諸藥不能退

方見火門

人參瀉肺湯 治肺經積熱上喘咳嗽胃腸脹滿痰多大便澀

人參

黃芩

梔子

枳殼炒

薄荷

連翹

杏仁炒去

桑白皮炒

大黃

桔梗炒

甘草炙各

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後通口服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠臥心躁

天門冬

大黃

升麻

桑白皮

枳殼

甘草

各一錢二分 荆芥二分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

四順清涼飲子 治血熱蘊結壅滯

方見火門

茯苓湯 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利

黃芩

澤瀉

桃子仁

生乾地黄

木通

黃蓮

麥門冬

甘草

右作一服用水二鐘生薑五片煎至一鐘食前溫服

利膈湯 治脾肺有熱壅煩上壅咽喉生瘡

鷄蘇葉

荆芥穗

防風

桔梗

牛蒡子

人參

甘草

右為細末每服二錢不拘時沸湯點服如咽痛口瘡甚者

加殭蠶一兩

防風通聖散 治一切風熱疥癩等疾

方見風門

三黃丸 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤

澀大便秘結

黃蓮

黃芩

文黃

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九熱水送下
一方以腦麝為衣丸如大豆夜間含化一二丸亦可

薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷末一斤取頭

縮砂末半兩取 川芎末半兩取

片腦半錢

甘草半兩取末

右為細末和勻煉蜜成劑不拘時任意嚼嚥和劑和無片
腦有桔梗

天竺黃散 治臟腑積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子去殼 連翹各三錢

瓜蒌根一兩 鷄冠雄黃半錢

鬱金用皂角水煮切

甘草三兩

右為細末每服一錢食後臨卧新汲水調服

龍腦鷄蘇丸 消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽吐血

鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腫脾疸口甜膈疽

口若並宜服之

此胡

錄州者二兩和木通以湯半升浸一宿取汁後入膏

生地黃六兩別

黃芪

去蘆

麥門冬

去心木通同此

人參

去蘆

蒲黃

炒

阿膠

炒已上鷄蘇淨葉一斤即

甘草

炙一兩半

右除別破藥外餘藥爲細末用好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪令勻取木通此胡汁慢火熬成膏勿令焦然後入餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十丸嚼破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽嘔血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟諸淋車前子煎湯下

喻化三黃丸

大黃

黃芩

黃連

各二兩半

黃藥子

白藥子

各一兩半黃蘗

苦參

山豆根

礪砂各一

京墨三錢

片腦一錢

麝香少許

右爲細末用猪膽汁調勻攤在椀內既上蒸三次露一宿後入腦麝礪砂爲丸如豆大每服一九食後噙化冬加知母一方有甘草

大金花丸

治中外諸熱瘦汗咬牙聾語驚悸溺血淋閉咳衄

血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又名既濟解毒丸

方見火門

神芩丸

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癤咽膈不

利大小便閉澀一切風熱之證並宜服之

大黃

生用

黃芩各二

牽牛生用

滑石各四

黃連

薄荷葉

川芎各半

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九食後用溫

水送下

牛黃涼膈丸

治上焦壅熱口乾咽痛煩躁涎潮

牛黃

片腦

麝香

各一分

紫石英

半兩研飛

馬牙硝

寒水石

煨

硬石膏

各二兩

牛膽南星

三分

甘草

一兩橫炙

右爲細末煉蜜爲丸每兩作四十九每服一九食後溫薄

荷人參湯下

酒蒸黃連丸

治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連

半斤淨用酒二斤浸以瓦器蒸乾上累蒸至爛取出曬乾

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五十九食前用溫

水送下

碧雪

治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩燥噉物妨悶

或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發強昏憤並皆治之

芒硝

青黛

石膏

煨過

寒水石

研飛

朴硝

硝石

馬牙硝

甘草

各等分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消燼得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中即愈頻吹効既濟清神散 益腎水降心火清上竅下

桔梗

黃芩

川芎

山梔子

當歸

羌活

白朮

茯苓七上各一兩

知母

甘草

薄荷

各半兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調服
玄明粉 治邪熱所干腸上氣滯五臟秘澀

右用朴硝煎過澄濾五七遍至夜於月下露至天明自

然結成青白塊子用礪礪子按實於炭火內從慢至紫自
然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上
倒下用金子合蓋了以去火毒然後研爲細末每二斤入
生熟甘草末二兩一處攪勻臨卧斟量用之或一錢二錢
以桃花煎湯或葱白湯下此藥本性寒燒過性溫無毒只
諸般魚及毒物等

地黃煎

治積熱

地黃汁

四升茯神

知母

姜蕤配兩

桔萸根

五兩生薑汁

生地骨皮

生麥門冬汁

白蜜格二

石膏兩

竹瀝三合一方

右咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝

地黃麥門冬汁慢火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取六

升初服四合日三夜一加至五七合四五五月作散服之

海仙丸

治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取水之

十七

精積於船板木中累見風日久則日炙變為青色以取太陽之氣而煨曝中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之令陰陽去邪熱調臟腑聖人屢治以度物之氣味所用且如東壁墻土取之以新水調化取清衣服之治臟腑不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾藉太陽真火之氣以除去濕而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖燒灰乾搗瘡上立已此聖人取其物類相感故也且船板青與上同意

船板青

五兩 酥油餅末

半兩

一兩

右為細末稀麩糊和丸如梧桐子大每服四五十丸不拘時溫酒送下

硃砂膏 治心臍驚熱至甚不省人事

硃砂

礞砂

硃砂各二

金銀箔各五

腦子一字

寒水石

石膏各半

粉草三錢

右爲細末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

丸醫院經驗奇效良方卷之四十八

太醫院經驗奇方良方卷之四十九

痢冷門 附論

夫痢冷者痢為年久長回者也冷為寒極至甚者也不因方云
入以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方中有
痢必積熱之說痢冷者中寒也多因真氣既微胃氣不實復啖
生冷冰壹之屬致腸胃虛寒陰既停礙陽不能正大便秘泄小
便頻數鼻多清涕嘔吐涎沫水谷不化腸胃絞痛肚腹如冰於
酒酒泔泔皆陽虛陰盛之所為也張長沙有陰毒痢雖不為
痢冷即冷寒所傷令人為手足冷腰背強臍腹築痛咽喉不利
嘔吐下利身如被挾脈細欲絕此由腎氣虛寒外傷風冷或因
冷物傷脾蓋脾為太陰內外皆陰則陽氣不守遂成陰毒四肢
逆冷額上手背冷而汗出不上或眼痛不堪任唇口手足爪甲
俱青黑氣止衝心而厥沉細伏匿者或多煩渴者精神如矢故

曰陰勝則身寒汗出身必鼓慄而寒也則厥宜溫藥以復其陽
氣或於氣海關元灸之醫律云冷者陰之至盛陽之至衰陰過
曰寒經曰寒者熱之服以熱劑乃治冷之正法內則飲以至燥
至剛之藥外則灼以數百艾炷逐其陰而助其陽斯又治冷夾
攻之道也大抵人身貴乎陰陽升降平和無偏則無疾矣若有
偏勝是即有沈寒痼冷之證乃真陽耗散脾胃虛弱失於調理
以致胃寒食啖冷物粘膩難化生硬之類經年累月久積而成
痼冷慄被其傷脾胃因而積積成疴以成痼疾矣但有寒冷等
輩觸犯速然而作以致手足厥逆畏冷增寒飲食不化或嘔吐
涎沫或大便洩泄米穀不消或小便頻數或肚腹絞痛或遠寒
咳嗽或癩疔大作是其證也內經曰寒淫所勝平以辛熱又內
經舉痛篇云經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而
不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛岐伯

曰寒氣客於脉外則脉寒脉寒則縮蹙縮蹙則脉絀急絀急則外引小絡故卒然而痛得炆則痛立止因重中於寒則痛久矣寒氣客於經脉之中與炆氣相薄得脉滿滿則病而不可按也寒氣稽留炆氣徙上則脉充大而血氣亂故痛甚不可按也寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣客於俠脊之脉則深按之不能及故按之無益也寒氣客於衝脉衝脉起於關元隨腹直上寒氣客則脉不通脉不通則氣因之故喘動應手矣寒氣客於脊俞之脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣寒氣客於厥陰之脉厥陰之脉者絡陰器於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少腹相引痛矣厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛引陰股寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注

於大經血氣枯則不得行故宿昔而成積矣寒氣客於五臟取
逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣
寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也寒氣客於小腸小腸不
得成聚故後泄腹痛矣然寒則腠理閉則氣道不行故氣收欬
冷精於中遂為痼冷之疾也直精方云人之處世飲食為上湯
藥次之惟其口饑不充嗜慾無節所以腸中停寒而為之沉痾
也故有沈寒痼冷之名耶男子遺精女子帶下骨寒腦冷氣乏
血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法在乎溫補不可
用剛劑惟於滋血養氣之中或佐以薑桂則可古人所謂精不
足者補之以味若執剛燥之劑亟欲陽氣頹回猶恐腎水易涸
心火獨盛亢則害氣乃制也內經曰陰氣有餘多汗身寒陰陽
應象云陰盛則身寒汗出身常清數燥而寒寒而亟調經篇云
陰盛生內寒岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胃中而不可瀉瀉則

溫氣去寒獨留故爲寒中東垣解云此脾胃不足勞役形體中
焦不能營運病傳爲寒中宜補陽以附子理中湯爲末用葱白
煎羊肉湯取清汁調進數服而愈前人立論至詳凡爲醫者深
探其意依經用藥則無天關之禍也

痢冷通治方

附子理中湯 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂轉筋體
冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不
進一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去
皮臍

人參

去蘆

乾薑

炮

白朮

甘草

炙各
三兩

右爲細末煉蜜爲丸每兩作十九每服一九用水一鍾化
開煎至七分空心服

三建湯

治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠

因自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風逆潮不省人事
傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

方見諸虛門

薑附湯 治證同前

方見寒門

沉附湯 治上盛下虛氣不升降陰陽不和胃脘痞滿飲食不
進肢節倦痛

沉香二錢

附子炮去步

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾食前服

芪附湯 治氣血陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪

去黃芪 炙五錢 附子 炮去步 四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈但是陽

虛氣弱之證並宜服之

人參

去蘆五錢

附子

炮去皮三錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

茸附湯

治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦

乏但是一切虛弱之證並皆治之

鹿茸

去毛酒炙

附子

炮去皮臍各四錢

右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

桂附湯

治虛汗不止及體虛失血大効

官桂

去粗皮三錢

附子

炮去皮臍四錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服

訶子四柱散

治元臟氣虛寒陽耗散兩目常鳴臍腹冷痛頭

旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止並皆治之

方見泄瀉門

沉香華澄茄散

治內挾積冷臍腹弦痛引腰背面色痿黃臍

腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

沉香

華澄茄

附子

炮去皮臍

葫蘆巴

炒

肉桂

去粗皮

補骨脂

炒

川練子

去核

巴戟

去心

茴香

炒

木香

已上各

桃仁

去皮尖

川烏

炮去皮臍

右作一服水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

附子茴香散

治氣虛積冷心腹絞痛

一附子

大者一枚炮去皮臍三錢

茴香

炒

肉苳菴

煨

乾薑

炮

人參

白朮

白茯苓

去皮

木香

已上各

丁香

甘草

炙各

右作一服水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

黑錫丹

治元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛

鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦

人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷
不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調
治榮衛升降陰陽補虛損益元陽返陰

方見頭痛門

十補湯

治諸虛百損

人參

去蘆

白朮

肉桂

去粗皮

白茯苓

去皮

黃芪

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

甘草

炙各錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾空心服
加熟附子溫之

八味丸

治下元冷憊腰脚痠重虛勞消渴

方見諸虛門

金鎖正元丹

治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠疼頭

目眩痛目暗耳鳴面色黃黑髮髮脫落頭皮腫癢精神昏困手足多冷心胃痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不能久立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俯仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元臟虛冷並皆治之

方見泄瀉門

來復丹 此藥配類二氣均調陰陽奪天地中和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎氣不升降上竅下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補換扶虛救陰助陽為効殊勝

舶上硫黃用時不夾少石者

硝石各一兩同硫黃並為末入定煉向火假火煨炒

用柳籠子不以手籠令陰陽氣相入
不可用太過恐傷藥力再服令極細
青皮 去白

陳皮 去白

五靈脂 須擇五臺山者研細用水洗
去沙石曬乾已上各二錢

太陰玄精石 一兩另

右將五靈脂青皮陳皮為細末入玄精石末及硝石硫黃末拌勻以好酒醋煮麪糊和丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒碾碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血迷上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腸脇冷痛立効諸疾不辨陰陽證者並宜服之

灸法

腎與膀胱俱虛灸腎俞百壯穴在對臍兩邊向後夾脊相

去各一寸五分兼治便濁失精五臟虛勞痲冷小腹弦急
夢遺泄精三陰交穴灸七壯在內踝上大腓並四指是
諸虛極灸膏肓俞氣海穴壯數愈多愈妙

保无丹 治老弱諸沉寒痲冷小便滑數大便時泄腰腿臍腹

疼痛困倦瘦虛食減

附子炮去
皮臍

白朮

山藥

肉苁蓉

赤石脂

乾薑各一

肉桂半兩

右爲細末麩糊爲丸如梧桐子大每服二三丸九空心用

溫酒送下

浴體法 治下元虛寒腰腹冷痛崩漏帶下一切冷病

椒目

川烏

細辛

乾薑

官桂各等

右爲粗末水煮漂洗下部爲妙

洞陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脈細羸瘦傷寒陰

證並皆治之

川烏

炮去皮

天雄

炮去皮

附子

炮去

鍾乳粉

各二

陽起石

火煨

硃砂

另研各

右為細末酒煮神麴丸如梧桐子大每服五十九空心

用溫酒或鹽湯送下

接真湯 治陰病手足厥冷腰腹疼痛真氣不足衰憊欲絕

沉香

丁香

藿香

附子

炮去皮

右剉碎用水二鍾生薑七片棗二枚去核煎至七分去滓

空心溫服

太醫院經驗奇效良方卷之四十九

大醫院經驗奇效良方卷之五十

諸血門 附論

內經曰諸血者皆屬於心又云肝藏血夫血錯經妄行者豈無因而致哉又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血濕淫汗出衄衄脾移熱於肝則為驚衄陽氣者大怒則形色絕而血菀於上使人薄厥怒則氣逆甚則嘔血肺欬之狀欬而喘息有音甚則嘔血暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口可於手太陰經內求穴以瀉之足少陰腎之脈從腎貫肝入肺中循咽喉其病則衄不欲食而黑欲唾則有血金匱要略曰夫酒客欬者心至吐血此因極飲過度所致也原病式曰衄者陽熱拂鬱干於足陽明而上熱則血妄行鼻衄也又云血溢者上出也血有餘而妄行也局方發揮論口鼻出血皆係陰虛陽盛有升無降血隨氣上竅法當補陰益陽氣降則血歸經東垣云雜病見血者多責其熱也

夫血者陰也氣者陽也氣主煦之血主濡之今血妄行上出於口鼻者皆氣逆也分之則各有所屬治之則各有所主如衄血出於肺嘔吐血出於胃其經有虛實之分當以脈理究治唾血出於胃血證上行或衄或吐或嘔或唾者皆逆也若血下行者為順內經又云榮者水穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑乃能入於脈也心主之肺藏之脾裹之肺營之腎泄之生化於脾總上於心藏諸於肝宣布於肺隨氣運行灌溉一身夫人目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也寒則凝澁暑則氣流澤熱則生通為脈滿則血少充則血實血虛常以飲食滋胃乃中焦受氣所汁變化而赤為血也故經云水入於經其血乃成又曰血者神氣也持之則存失之則亡且人身皆藉氣血所養可不謹哉諸經有

云陽道實陰道虛陽易亢陰易乏陽道常饒陰道常之陽常有餘陰常不足可見人之生也故氣常有餘血常不足年至四十陰氣自半起君衰矣男子十六歲而精通至六十四歲而精絕女子十四歲而經行至四十九歲而經斷而陰血之難成易虧也如此陰氣一傷最難調治以其陽虛陰虧妄行於上則吐衄衰涸於中則虛勞忘返於下則便紅移熱於膀胱則癰溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中濕蒸熱痰則為滯下熱極腐化則為膿血熱極色紫黑者熱勝於陰發於瘡瘍濕滯於血則為脾痛癰疹蓄之在上別人喜妄蓄之在下則人喜狂前證諸論至詳其脉沈細者順洪大弦數者逆治法病在何經何病隨經而治之對證之方條具于後且如長沙公言少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻耳目中出是名下厥上竭為難治又不可不知也

諸血通治方

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩

熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓

去皮

人參

去蘆

前胡

去蘆

半夏

陳皮

枳殼

去穢

紫蘇

白芍藥

桔梗

乾葛

當歸

熟地黃

川芎

甘草

炙

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食前服

必勝散

治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並皆治之

小蘄

并根

人參

去蘆

蒲黃

熟地黃

當歸

去蘆

烏梅

去核

川芎

炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

茜根散

治鼻衄不止

苦根

黃芩

側柏葉

阿膠

給粉

生地黃

絡二甘草

一

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

天門冬湯

治思慮傷心吐血衄血

天門冬

去心

遠志

去心并草

黃芪

去蘆

白芍藥

麥門冬

去心

藕節

阿膠

給粉

生地黃

當歸

去蘆

人參

沒藥

甘草

炙各

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大煎散

治食啖辛物傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大薊根

洗

犀角

升麻

桑白皮

去皮

蒲黃

炒

杏仁

去皮

甘草

炙各

桔梗

炒各

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

鷄蘇散

治勞傷肺經唾內有血咽喉不利

鷄蘇葉

黃芪去蘆

阿膠炒

生地黄洗

白茅根

貝母

桔梗

麥門冬去心

蒲黃炒

甘草炙各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

犀角地黄湯 治主脉浮客脉芤浮芤相合血積胃中熱之甚

血在上焦此藥主之

犀角

大黃各一錢

黃芩

黃連各二錢

生地黄四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子一名清肺飲子 治衄血吐血久不愈

麥門冬

去心

五味子三十 當歸身

人參各半錢

黃芪

去蘆

生地黄二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以三稜針於氣衝

出血立愈

人參飲子 治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血吐血

人參去蘆
二錢

五味子二十錢 黃芪去蘆

麥門冬去心

白芍藥

當歸身各一錢半 甘草炙一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲酒過度負重傷胃而

吐血者最宜服之忌濕麪煎燻之物

白朮三錢

白茯苓 黃芪蜜浸

人參去蘆各一錢半

百合去心

芫胡 山藥

前胡去蘆各一錢

甘草炙七分

右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾食遠服

龍腦雞蘇丸 治膈熱咳嗽或吐血衄血

方見積熱門

黃芪為藥湯

治衄血多噦面黃眼澁多眩手麻木

黃芪

三錢

芍藥

半一錢

升麻

羌活

葛根

各一錢

甘草

二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

人參救肺散

治咳吐血

人參

黃芪

當歸尾

熟地黃

已二錢

上各

蒼朮

升麻

白芍藥

訛胡

已一錢

上各

蘇木

陳皮

甘草

各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

升陽去熱和血湯

治腸癖下血作瓜其血唧出有力而射四

散腹大作癆乃陽明氣衝熱毒作也當去濕

白芍藥

二錢

生地黃

牡丹皮

生甘草

橘皮

各一錢

炙甘草

黃芪

各半錢

當歸身

熱地黃

蒼朮

秦艽

肉桂

升麻各半

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

犀角地黃湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣涌溢為衄血
或清道閉寒流入胃腕吐血如鼻勿吐血不盡餘血停留
致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角镑

生地黃

白芍藥

牡丹皮去木冬

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服如潮熱發狂加黃芩
大黃

涼血地黃湯 治飲食不節起居不時陰受之則入五臟填滿

閉塞下為瀉泄久為腸癰水穀與血作一瓜啣出

熱地黃

青皮

槐花炒

當歸各二

黃蘗去皮

知母各二

右作一服水二鐘煎至一鐘食遠服

雞蘇丸 治虛熱昏胃倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉八兩 黃芩

防風去蘆

荆芥各一

菊花三錢

片腦半錢

川芎

生地黄

桔梗

甘草各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

圓參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參

黃芪

飛羅麩

百合五錢

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五丸用茅根湯下食遠服

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水

過喘欬

當歸

川芎

芍藥

黃藥子

白朮

槐花

茯苓 去皮

生地黃

黃芩

白龍骨

甘草 各半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

生地黃湯 治上熱衄血

生地黃 四錢 阿膠 炒 二

川芎

桔梗

蒲黃 炒

甘草 各一錢

右作一服水二鍾入生薑汁二匙煎至一鍾食後服

麥門冬散 治鼻血

麥門冬 去心 生地黃 各一 白芍藥

蒲黃 各二

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

藕汁飲 治吐血衄血不止

生藕汁 生地黄汁 大煎汁各三 生蜜半匙

犀角湯 治吐血酒客溫疫中熱毒乾嘔心煩者

犀角 蒲黃 瓜蒌根 甘草各二

葛根 桑寄生各三

右以咀以水七升煮取三升分三服不拘時

天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬二兩 貝母 杏仁炒各七 白茯苓

阿膠 甘草各半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸含化嚥津

綠雲散 治吐血

栢葉 百合 人參 阿膠炙令燥

右爲細末每服二錢不拘時糯米飲調下

雲雪散 治吐血

雲雪

食即寒

蒲黃

各一兩

右俱生研勻每服二錢冷水調下

地黃煎 治吐血憂恚絕傷胃膈疼痛及虛勞唾血

右用生地黃五斤絞取汁於銀鍋內微火煎一二沸投白蜜一升再煎至三升每服半升日三服主胃痛百病久服佳一方治吐血不止用生蜜和調服之一方用生地黃汁一升生薑汁一合相和溫服日四五服一方治虛勞吐血生地黃五升搗酒一升煮去滓服

掌中金 治吐血

真蒲黃

黃蘗子

各等分

右爲細末用生芝麻油於手心內調以舌舐之

人參湯 治吐血咯血

右用人參一兩爲細末五更時用雞子清調如稀糊匙抄服若服人參末盡甚效或服半兩亦可服訖却卧一方用烏雞子清以手磨成水須磨千百次自然化成水然後以人參末二錢調勻約五更服服藥時不得語仰啜自下自然覺心肺俱涼滿口津液

治傷方吐血方

右用猪肝煮熟蘸白芨末服之

四生丸 治吐血

生地黃

栢葉

艾葉

荷葉各等

右四味俱生爛搗團成雞子大每服一九水三盞煎至一盞去滓不拘時服

生乾地黃散

治卒吐血皆因心經暴熱毒入胃致吐不止

生地黃

阿膠炒令

甘草各二

黃芩

犀角屑

栝葉

刺薊各一

右剉碎每服三錢水一中盞入青竹茹如雞子大同煎至

六分去滓不拘時溫服

雙荷湯

治卒吐血

藕節七箇

荷葉真七箇

右以蜜少許搗細用水二鍾煎至八分去滓溫服或爲細

末調服亦可

松花散

治吐血久不止

松花半兩

生地黃

鹿角膠

炒黃 薯蕷已上各

艾葉一分

茜草根

白茯苓

紫苑去苗

人參

百合

刺薊

甘草炙赤各

右爲細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎

治吐血不止咳嗽補肺

生地黄汁

藕汁各一

黃牛乳半升

胡桃仁

十枚研

生薑汁半升

乾柿

五枚細切

大棗

二十枚去步核

研如

清酒

一升特已上七味一處同酒

黃明膠

炙燥

秦光

各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒研

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐々著火養成煎後

入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

又方

治丈夫婦人吐血連日不止粥食湯藥不能下者

右用五靈脂不夾土石揀好精者不拘多少研為末以狗

膽汁和丸如鷄頭大每服一九煎生薑酒磨令極細更以

少生薑酒化以湯盪藥令極熱湏足先做下粥溫熱得所

左手與患人藥與不得漱口右手急將粥與患人與不可

太多

石青散

治心青煩熱吐血不止口若乾燥頭疼

石膏

麥門冬略二

黃芩

生地黃

升麻

青竹茹

葛根

瓜蒌根一兩

甘草

炙半兩

右吹咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

杏仁散

治心肺客熱吐血唇口乾燥

杏仁

去皮尖雙仁

赤茯苓

黃連

梔子仁

黃芩

大黃外各一兩

桂心半兩

瓜蒌根三分

右吹咀每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

加味理中湯 治飲酒傷胃遂成吐血

人參

乾薑炮

白朮

已上各一兩

乾葛

甘草

各半兩

右吹咀每服三錢水一大盞煎六分去滓不拘時溫服去

乾葛加川芎治鼻衄理中脘分利陰陽安定血脈

白朮丸 治傷胃吐血

白朮十兩 乾薑

黃芪

伏龍肝

人參各三

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九不拘時用米飲送下

鷄子白丸 治吐血衄血

鷄子白三箇 好香墨二分

右和丸如梧桐子大每服十九不拘時生地黄汁送下

茅花湯 治吐血衄血

右用茅花煎湯服之

蘿蔔飲 治諸血熱吐血衄血

右用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立効如無生蘿

葡萄只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉荜菆半分對碎用煎亦効

一方用蘿蔔汁滴入鼻中

門冬飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬

當歸身

人參

已上各五分

紫苑

一錢半

不用

芍藥

甘草

黃芪

已上各一錢

五味子

五箇

右咬咀作二服每服水二盞去滓食後稍熱服

三奇散

治衄血不止

亂髮灰

一錢人中白半錢麝香一字

右爲細末鼻內噴少許立止一方不用麝香髮灰垂困者

焙乾爲末湯調服即止

白芨散

治鼻衄及嘔血咯血肺損或食飽負重者服之愈

右用白芨爲細末用冷水調紙花貼鼻竅中効一方用雪

水調如無以新汲水調兩眉際傳至鼻上以綿子緊緊

摺紙扱令緊時蘸冷水把藥上飯須即止去藥

吹鼻方 治鼻衄吐血

右用栝葉石榴花爲細末每用少許吹鼻中亦用花瓣塞鼻內立止

刺薊散 治鼻衄出血經日不止

刺薊

苦參

黃連

梔子仁

生地黃

側栝葉

大蘘炒各一兩

右咬咀每服五錢水一大盞入青竹茹半鷄子大煎至五分去滓不拘時服

千針散 治鼻衄不止

刺薊

木賊炒

白麩一錢

右爲細末每服一錢研青蒿心七枚新汲水調下併二服

三花散 治鼻衄不止

酸石榴花一分

黃蜀葵花一錢

右剉每服一錢水一盞煎至六分不拘時溫服

山梔散 治鼻衄不止昏悶欲死

右用山梔子不拘多少燒存性爲末每用少許吹入鼻中
立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裹煨令熟一邊
生用同研爲末酒調服一方會服燒煉藥方致鼻血者生
用煎湯解之蔡子涯云同宮無錫監酒趙無疵凡衄血甚
多至危殆血尚未止一醫人過其門聞其家哭詢問其由
醫人云曾服丹或燒煉藥予有藥用之即活囊間出藥半
錢七吹入鼻中立止良久得活

扎指法 治鼻衄不止

右用線緊扎中指中節如左鼻孔出血扎左手中指中節
右鼻孔出血扎右手中指中節兩鼻出血左右俱扎之

大蒜貼足方

治鼻衄不止諸瘰不驗者

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一厘許若左竅出血貼於左脚心下以帛繫定右竅出血即貼左脚心下兩竅出血俱貼之止即以溫水洗脚心令去蒜氣一方以摩手心亦効

刺薊湯

治熱氣上行衄血汗血

刺薊

雞蘇葉各二兩

黃連

生地黄

犀角一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因熱損發或因酒發悉皆治之

當歸

乾薑炮

黃蘗

熟地黄

小薊

羚羊角一兩

阿膠各三錢

白朮

芍藥各半

黃芩

甘草一分

右咬咀每服三錢水二盞入竹茹如指大煎至八分去滓
入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半錢再煎至七分不拘時溫服
一方無白朮

竹茹散

治嘔血久不瘥心神煩悶臟腑勞傷

竹茹和藶子大

白芍藥

生地黄

當歸各半

茜根二兩

羚羊角燒

麥門冬去心

鹿角膠各半

芍藥一

右咬咀每服三錢以水一中盞生薑三片煎至六分去滓
不拘時溫服

麥門冬汁

治嘔血吐血及鼻衄血

麥門冬生取

生地黄生取

生藕取汁

冷熱水各一

白藥各末

右和令勺每服二匙略煎沸不拘時溫服

治衄血方

黃蘗以蜜塗

右爲細末每服三錢不拘時用麥門冬煎湯調下

治咯血方

趙君猷云屢用効

右以薏苡仁不拘多少爲末熟煮猪胰切片蘸藥食後微空時取食之蓋薏苡能補肺以猪胰導入經給耳陳敏捷云治肺癰唾膿血薏苡仁爲末米飲調下一方搗碎用水煎服亦効

聖餅子 治咯血

青黛一錢

杏仁

四十粒去皮尖以黃明

右同研勻却以所煎蠟少許燉開和之捏作錢大餅子每服用乾柿一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裹慢火烘

熟取出以糯米粥嚼下

黑散子 治諸竅出血

蓮蓬卽年

敗椶櫚

頭髮

生等分

右爲細末每服二錢用南木香煎湯調下或只用棕櫚燒灰用米湯調下亦可

治九竅出血方

右用刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青汁只搗乾者爲末冷水調三錢服

南天竺飲 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草

生薑麥是如押

生薑

一兩如山梔子三升

燈草

如小把大棗

甘草

炙半

右別入磁器中水一大碗煎至半碗去滓不拘時溫服

神白散 治血汗從膚腠出及鼻衄五七日不止

右用人中白不以多少刮在新瓦上用火逼乾研令極細
每服二錢入麝香少許溫酒調下一方治鼻衄不止不用
麝香每用少許吹入鼻孔立瘥

生血地黃百花丸 治諸虛不足下血咯血衄血腸澀內痔虛
勞寒熱肌肉枯瘦

生地黃

一斤生薑

藕四斤

白沙蜜四兩

無灰酒一升

已上五味用銀器或砂鍋內熬至二梳許漸成膏一半磁
器收之一半入乾山藥末三兩再熬一二十沸以入後藥

當歸

熟地黃

肉蓯蓉

破故紙

阿膠

黃芪

石斛

覆盆子

遠志

麥門冬

茯苓

枸杞子

右爲細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每服五十九丸

溫酒調地黃膏子送下空心食前日進三服

蓮心散

治勞心吐血

蓮心

五十分

糯米

五十分

右研爲末用溫酒調服不拘時候

側柏散

治內損吐血下血或飲酒太過勞傷於內其血妄行

出如涌泉口鼻皆流須臾不救即死

側柏葉

一兩半

荆芥穗

燒灰

人參

各一兩

右爲細末入飛羅麩一錢新汲水調如稀糊不拘時候服

三地黃飲子

治諸吐血下血瀉血勿血

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃芪

芍藥

黃芩

甘草

各等分

右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後溫服如脈微身涼

惡風加桂半錢吐血者多有此證

大薊飲 治吐嘔血

大薊汁

地黃汁

生薑汁

麥門冬汁

刺薊汁

各三合

右用白蜜半匙相和勻冷服

麝香散 治鼻衄不止

麝香

半字

明礬

各五分

龍骨

另研各五分

右知為每用一字先以水水洗淨鼻內血涕然後吹入鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻中亦可

凡九竅出血皆可用

搗頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴

火燒蓮房用水調

搗底黑煤可以喫

石榴花片可以塞

生薑薑汁可以滴

火燒龍骨可以吹 水煎茅花可以喫

卷之三

太醫院經驗奇效良方卷之五十一

腸痔痔漏門

附論

經曰風客淫氣其精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脈橫解腸辟
為痔蓋緣風氣通於肝肝生風火生熱風客則滯氣傷精亡
則邪熱傷肝因飽食行房則筋脈橫解而腸辟痔漏生焉夫痔
者而巢氏病源論有五曰牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也及古諸
方又有因痔氣痔虫痔番花蠟蛄等痔之名不一且痔於肛門
生癰或在外而或在內有似鼠乳者有似櫻桃者其形不一其
病有痛有癢有硬有軟有膿潰者有不潰者有腫痛便難者有
隨大便下清血不止者有穿竅血出如線者至於失治而成漏
者成漏而穿竅者又有穿腸成孔糞從孔中出者或肛門四圍
生瘡敷枚膿血浸淫若蓮花者詳此諸證大凡肛邊生乳鼠痔
出膿血者為牡痔肛邊生瘡腫齧出血者為牝痔肛邊生瘡且

疾且瘵者為疝痔肛內結核寒熱出血者為腸痔肛門腫大
便難強力則肛出不收者為氣痔肛門瘡腫流血飲酒即發者
為酒痔肛邊有竅血出如射線者為血痔肛門浸淫濕爛內有
蟻虫蝕腸穿穴遂成漏者為虫痔也然此諸證皆本之於大腸
也大腸者庚金也本性燥清肅殺之氣本位主收所司主行津
液以從足陽明中州土之所化若旺則能生化万物而衰則損
傷万物故云万物生於土而歸於土此之謂也然手足之陽明
同司其化焉若人醉飽淫極而後忍泄或用藥固其精弗能泄越等
積於脉歸注大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便
閉而痔漏作矣治宜苦寒瀉火辛溫和血潤燥疎風止瀉之劑
也靈樞經云足太陽膀胱之脉乃筋皆抵腰中入絡腎其支者
貫腎足故主筋為病則生此疾由是推之足厥陰之脉環繞前

後二陰故亦能爲痔矣每見人患痔其發則色青痛甚蓋謂肝
苦急而然也且夫痔與漏初致之由雖同然甚之病實異初生
肛邊成癰不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫林瀝久不止
者曰漏也原此受病者燥氣也爲病者濕者也胃行大腸則化
燥火以乘濕熱之實也若夫腸頭成塊者濕也作痛者風也膿
血潰出者熱勝血腐也潰成黃水者濕熱風燥也大便秘閉作大
痛者風熱鬱滯弗能通泄氣逼大腸而作也大腸結燥者主病
兼受火邪也凡此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而致也而腸
澀者爲大便下血也蓋因人之不避風毒恣飲醇酒炙博之物
縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格
壅滯熱毒下注血滲大腸其腸澀痔漏不可得而無矣經云筋
脈橫解腸澀爲痔者此也至於臟毒腸風痔漏而名雖殊其源
實一大抵腸澀之病有可治不可治者若便血身寒則可治身

熱則不治腸澼下白沫脉沉者生脉浮者死如下膿血脉滑大者生脉懸絕則死腸澼脾脉外鼓沉久自已而肝脉小緩則易治腎脉搏沉身熱則死也醫療之法惟宜祛風消毒解熱涼臟和血潤燥隨宜施治無不瘥矣

腸澼痔漏通治方

秦元白木丸 治痔疾并漏有膿血大便燥硬作疼痛不可忍

秦元 去蘆

桃仁去皮尖 皂角仁去尖 酥一 礞石存

枳實麩炒

當歸尾酒製 澤瀉

白木把上各

地榆三錢

右爲細末與桃仁泥礞石湯煮麩糊和丸如梧桐子大令藥光滑焙乾每服一百丸白陽送下空心服待少時以羹膳壓之心生冷硬物冷水菜之類并濕麩酒及五辛辣熱大料物之類犯之則藥無驗矣數服而愈

秦元蒼木湯

秦元 去苗

蒼米

皂角仁

燒青 桃仁 去反 各

黃蘗 去粗皮 酒製

澤瀉

當歸尾

防風 已上各

檳榔 半斤

大黃 少許

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服待少時美膳壓之忌

生冷硬物冷菜之類及酒溫麪乾薑之類如有膿加白蔘

花五朵去萼青皮半錢同煎去滓入木香末三分服

秦元防風湯 治痔漏每日大便特發疼痛如無疼痛非痔漏

也此藥主之

秦元

防風

當歸

白木 各一斤

黃蘗

橘皮

芫胡

大黃 畧

澤瀉 各一斤

紅花

桃仁

升麻 各五

甘草 各六

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服避風寒忌房事及酒

濕麩辛熱之物

當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜多血苦痛不能

忍者

當歸尾

郁李仁

澤瀉

生地黃

煨大黃

枳實

蒼朮

秦艽

已上各一條

麻子仁

半一

皂角仁

一各另為細末煎成調服

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服忌風寒麩大小便

秦艽羌活湯 治痔疾成塊下垂疣瘡其痒難忍

秦艽

羌活

黃芪

各一條

麻黃

防風

升麻

芫胡

各一條

甘草

各一條

藥本

細辛

紅花

各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

紅花桃仁湯 治痔疾經年因飽食筋脈橫解腸澀為痔常去

其筋脈橫解破血結是也治法當補北方瀉中央

紅花

桃仁

麻黃各半

生地黃

黃蘗

各半

猪苓

漢防已

當歸尾

澤瀉

蒼朮

防風各

一方作一服水二鍾煎至一鍾空心服

秦尤當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛

秦尤

枳實各半

當歸

皂角仁

去皮燒

桃仁

澤瀉

白朮各

大黃

煨五

紅花半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活各一

白朮

蜂房炒焦

甘草炙各半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

槐角丸

治諸痔及腸風下血脫肛

槐角去梗

防風

地榆

枳殼麩炒

當歸

黃芩各半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

飲送下

釣腸丸

治久新諸痔肛邊腫痛或時瘡痒有膿血

瓜蒌二个燒

蛻皮二个燒

白礬煨

綠礬煨

白附子生用

天南星

鷄冠花剉炒

半夏各五

胡桃仁十五个不油者

枳殼炒

附子皮去

訶子去核各

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三五十九臨卧用
溫酒送下遠年不瘥者服十日効久服除根

皂刺丸

治痔漏而復瘥

皂莢刺

二刀燒煙
盡存性

防風

槐花

各七
分半

蛇床子

白礬煨

枳殼

白蒺藜

炒去
刺

兔活略半

蜂房炒焦

五倍子各半

右爲細末醋調菜豆粉糞糊爲丸如梧桐子大每服五十
丸食前以苦練椒煎湯送下仍用童子熱尿入白礬末淋

洗肛門

皂角煎丸

治內痔腸頭囊面生核寒熱往來

蒲尺皂角

三錢去強
質醃炙

白礬煨

刺蝟皮多黃

薏苡仁

白芷各
一斤各 桃仁去皮

甜葶藶炒

川芎

桔梗各
一斤各 豬後蹄垂甲

十枚燒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用桑白皮煎湯送下

芎歸丸 治痔下血不止

川芎

當歸

神麴炒

槐花于炒

黃芪

地榆半斤 荆芥穗

頭髮燒存

木賊

阿膠炒各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米飲送下

乾葛湯 治酒痔

乾葛

枳殼炒

半夏薑製

生地黃

茯苓

杏仁炒

黃芩

甘草炙各

右作一服水二鍾黑豆一百粒生薑五片白梅十個同煎

至一鍾食前服

橘皮湯 治氣痔

橘皮

枳殼炒

槐花炒

川芎絡

桃仁炒

木香

檳榔

紫蘇莖葉

香附

甘草一分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食前服

荆枳湯 治氣滯發痔

荆芥穗

枳殼炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘草一分

右爲細末每服二錢空心用米湯調下

神功散 治洗痔凡富貴之人多因嗜慾酒色過度喜怒不常

致生痔漏或如鼠乳連珠或糞門腸頭腫流膿瀝血其痛

如割不可忍者但是諸腫瘡痔漏及腸風漏血此藥治之

苦參

川椒

苦葫荈

芫荽子

槐花

枳殼

荊芥

金銀花

白芷

連翹

獨活

小茴香

麻黃

牡蠣煨

威靈仙

椿樹皮略二

右攻咀每用五升水六七椀葱白二莖煎五七沸去滓以
盆盛藥水上坐先蒸後以葦驗加黃老茄子二箇尤妙
異九子 專治久年痔漏下血用之屢驗

百草霜

白薑略

木鱉頭三 烏梅

敗櫻

栝棗

亂髮肥上各一又二升半

桂心三升

白芷五升

右爲細末研勻醋糊爲丸如梧桐子大每服三五十九空
心用米飲送下

逐瘀湯

通利大小腸取下惡物凡痔漏熱証用之有瘀血作

痛脈之見効

川芎

白芷

赤芍藥

乾地黄

枳殼

阿膠

茯苓

五靈脂

蓬朮

茯神

木通

甘草生

桃仁去皮

大黃各半

右作二服每服用水二鍾生薑三片蜜三匙同煎食前服

以利為度

蝮牛高唐敷痔瘡極効

蝮牛一枚片腦

麝香各小

右同研爛用磁盒盛次早取汁傳瘡上

蝮皮丸

治諸痔出血裏急疼痛

蝮皮一刃

槐花微炒

艾葉炒黃

白芍藥

枳殼炒

地榆

川芎

當歸

白礬炒

黃芪

貫衆各半

頭髮三錢

猪後懸蹄垂甲

一枚

盈尺皂角

一枚去核

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用未

飲送下

蛻皮散 治五痔

蛻皮炙

鼈甲 醋炙

當歸 剉碎

各半 大黃 三

槐炭 炒

黃芪 二

蛇皮 炙

露蜂房 炙

桑本 去節

桂心 各一分

猪後懸蹄甲 十

枚炙

右爲細末每服三錢七空心煮白粥飲調服日三服

拔毒散 敷疔腫毒處

大黃

黃蘗

白芷

右高

黃芩

黃連

白歛

梔子

朴硝

右爲末用井花水調塗

洗諸痔方

黃連

黃芩

荊芥

乾床子略一

鏡面草

何彼草

槐條略一

側柏葉略一

右用新汲水煎傾盆內乘熱先薰後洗

七物湯

薑痔

皂莢

三挺

艾一握

鼈甲

二枚

乾蝦蟆略一

樹黃

一

麝香一

草烏

二枚

右搗篩拌勻穿地坑內看熱大一升方搗一片中心鑽一

孔蓋坑口放入藥一撮披衣坐上熏

加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪耳鳴却弱氣乏

口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆

黃芪

甘草

各等

右為細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草

重洗方

槐花

半斤

蓮房

一个

荆芥

五文

五倍子

三升

地榆

半斤

去

右爲末每用半刃水一煎以瓦器煎了入白

錢乘熱先煎後洗

五聖丹

治痔

雄黃

綠礬

朴硝

葉子雌黃

明白礬

各半

右件各礱碎以銀鍋一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入
綠礬五入白礬圓瓦片蓋之炭火煨一日夜看青煙出不
有紅煙方可候冷取出紙精頓地上用盆服出火毒一日
夜入乳香沒藥末各一水同研極細每抄一匙煎甘草湯
調敷外用鷄羽搗藥末蓋之日二次夜一次自然乾硬而

脫逐日須用葱白煎湯入朴硝流洗軟烏試乾然後傳藥
治痔猪膽膏

右用猪膽七枚取汁以建盞盛炭火熬成膏用單紙攤傳
須先用槐根白皮溫洗後傳藥

寬腸丸 治內外痔

枳殼

黃連

百藥煎各等

右爲細末水糊爲丸如梧桐子大每服三十九食前用米
湯送下

熊膽膏 治痔極切

熊膽

片腦

右各等分研細用井花水調以鷄羽搗痔上

治痔穀道中虫痒不止及正發疼痛

水銀

棗膏各二

右研和檢如棗核狀薄綿片裹內下部明日虫出若痛加
韶粉三大分作丸內之

熏洗方

右用韭菜不以多少先燒熱湯以盆盛湯在內以器具蓋
之止留一竅却以韭菜於湯內泡之以谷道坐竅上令湯
氣熏蒸候湯溫冷却引韭菜輕上洗瘡上數次自然可
又方

右用韭菜汁一椀蒼耳子葉汁一椀調勻日曬溫洗絕根
半夏散 治諸痔疾初生急以此藥治之

右以半夏生為末先以生薑自然汁浴殺道後以半夏末
泡湯洗之不週三兩日即自消

九腦散 治痔瘡熱痛

鯽魚一枚破開去腸肚入
鯽魚一枚破開去腸肚入

右爲細末入麝腦少許用蜜調傳之

厚朴煎

本方云腸胃本無血緣氣虛腸弱榮衛滲入

厚朴

石及用生薑五兩湯燂
味相并漬沙黃色

水

神麩

麥蘖

三末各一
及同炒黃

右爲細末水糊爲丸如梧桐子大疾作空心米飲下百丸
平時服三五丸厚朴厚腸胃麩蘖消酒食白朮導水血
自不作也五痔諸下血論不及此是亦以脾胃爲主也

治痔方

右以鰻鱺魚燒熏下部痔虫尽死

鷄峯烏金散

治痔漏

黃牛角心

猪牙皂角

刺蝟皮

穿山甲

上同
炮焦黑

皂角刺

槐子

枳殼

黃芩

阿膠

炒各分

方爲細末每服一錢半用胡桃肉研爛伊酒調食前服大腸有熱荆芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下

臭穢皮散

治痔漏下血及膿不止

臭穢皮

微炒

酸石榴皮

黃連

去鬚

地榆

何膠

各一兩

艾葉

三分

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

蕙菁散

治痔漏

右用蕙菁內刮涎對停入蜜調勻先以木鼈子煎湯熏洗然後傳藥其冷如冰唐仲奉云常有一吏人苦此渠族弟親令與之早飯前傳午後來謝拜於庭下云疾已安矣

双金散

黃連

麝金

各等分

右爲細末蜜調敷之痔將好用欬口龙骨散

龍骨散

龍骨煨

白芷

黃丹

寒水石煨各一分

右為細末摻瘡口上小便赤色服導赤散

導赤散

生地黃

木通

甘草各等分

右為細末每服三錢白湯調下

枳殼散 熏洗痔漏

枳殼炒

貫衆各二兩

荊芥

大栢皮各一分

黃連

蛇床子

地骨皮

無名異

乾薑炮各半兩

蒼耳根

冬青葉

薤頭

栢枝各一把

黑豆半升

右以咀每用一大合用水三大椀煎至二椀先熏後洗日

三五次

能消丸 治痔疾疼痛如錐刀刺不可忍

威靈仙

一名威消去苗吐四及

卷栢去根

蛭皮燒灰存性

防風

去又

阿膠

炙燥各糯米炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九加至二十九不拘時用人參湯送下日二服

試虫散 治五痔痛甚

臭椿皮

景天

陰乾即換火草

地骨皮名二馬牙硝一及

右為細末用精猪肉一大片摻藥末三錢七在肉上就上坐一二時起看有虫即出無即已

烟熏方 治痔漏痛

白鱧魚骨

熟艾各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟尽即止

白金散 治久新痔瘡如神

右用海螵蛸去鳧皮為細末每用二三錢生麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久瘡自消

乳香散 治牡痔生瘡

乳香

猪牙皂角

鯪鯉甲

各二

荻葉

去頭在根對四及

黃牛角尖

長二寸者一對對

蛇蛻

一條頭尾俱全者

右入砂礮內蓋口鹽泥固濟曬乾用十斤炭火煨候碧焰出去火放冷取出細研每服二錢匕以胡桃一箇取肉細研拌藥空心酒調下五服見効

猪蹄灰丸

治牡痔生鼠乳肛門癢痛觸着有膿血出不絕

猪懸蹄甲

火燒存性研一及

水銀

三大

右先取水銀用熬棗肉二枚研勻次入猪蹄灰和為丸如鷄頭實大先以鹽湯洗下部內一丸夜卧再用以瘡為度

積柳散

治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫痛

積柳剉炒

澤瀉酒浸

瞿麥

甜葶藶隔紙炒

防已

藁本去苗

陳皮去白

郁李仁與陳皮同炒

滑石半斤及

羌花醋拌炒

木香各一

乾漆炒烟尽

右為細末每服二錢匕不拘時溫酒調下日三服

搗藤散

治痔下血不止生瘡腫痛

搗藤子取仁

龜甲醋炙

黃芪

槐子炒

川大黃炒

蛇蛻燒灰各一分

藁本

桂心各半

當歸剉炒

蜂房炙各三分

猪後玄蹄甲七枚炙

石為細末每服二錢食前用粥飲調服

赤小豆散

治酒痔大腸中久積熱毒下血疼痛

赤小豆炒熱

黃芪各

赤芍藥

白欬

桂心各半

當歸微炒

黃芩各三

右為細末每服二錢食前用梔子煎湯調服

麝香散

治乳疔及一切內外疔瘡疼痛不可忍者

右用瓜蒞新黃大者一枝以刀開下頂子不去穢選不蛀
皂莢子填滿却取開下頂子蓋別用紙筋泥固濟約三指
厚以炭火簇合燒令紅放一坩內出火毒一宿取出入
麝香末一錢研令極細以磁盒盛每服一錢七米飲調下
溫酒亦可服一劑永除根本

桑木耳散

治疔疾疔邊疼痛

桑木耳

槐木耳

蝟皮

羌活

當歸

各一兩

枳殼

炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

神效方

治疔疾下血日夜不止

白礬

綠礬

黃丹

伏龍肝

蝟皮各二兩

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡為度候冷取出研如粉以麩糊為丸如梧桐子大每服十九食前用米飲送下

地榆散 治血痔

右用地榆為細末每服二錢七食前米湯調下日三服

治血箭痔

右用苦練子肉為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九空心蒼耳子煎湯送下日三服

止血方 治痔瘡血出不止

右用明血竭為末傅之

治痔疾便血方

右用活鱗魚一箇八兩重者洗淨鱗毛腸肚皆不去用搜

步二兩洗淨寸截先將樓一兩鋪在瓦罐子內次安魚上面却將樓一兩蓋之即閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐子開一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用熟炭火六七斤燒煨候烟絕取罐子於淨地以瓦盆合定淨土攤勿令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌動風之物

威靈仙丸

治氣疔大便澀

威靈仙

去土乳香另研

枳殼麥炒各一兩

右爲細末以粟米飯和爲丸如梧桐子大每服十五丸食前用米飲送下日三服

熏熨方

治氣疔脫肛

枳殼麥炒

防風去叉各一兩

白礬枯一分另研

右咬咀拌勻水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯

製之通手即淋洗

洗藥 治痔瘡久不愈者

桃條

柳條

槐條

萱草根

桑條

艾葉

荆芥

蒼耳根

茄根各三兩

右咬咀水五碗煎三十沸去滓溫洗次貼後藥

香白芷

輕粉各二錢

黃丹三錢

五倍子五箇炭

麝香少許

右為細末研勻瘡乾葱白汁調搽濕則乾貼之

神驗熏藥方 治痔漏積年不愈者

鱧魚半斤五月五日 蟻三枚研

右件藥取成熟艾和藥末以青布捲之交磁瓶中着火燒

坐向瓶上熏之其虫及惡汁並出不復再發

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角二兩

枳殼

當歸

蒼朮

陳皮

厚朴

製各一兩

烏梅

甘草

各半

右咬咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

結陰丹 治腸風臟毒大便下血

枳殼

去穢

威靈仙

何首烏

椿根白皮

陳皮

去白

荆芥穗

黃芪

各等分

右為細末酒煮糊同蜜少許和丸如梧桐子大每服五十丸加七十九食前用米飲送下一方不用蜜以醋少許同

陳米飲煎湯下

治腸風臟毒方

一兩茱萸半兩蓮

二味同炒不同研

糞前茶葉調酒下

糞後却用酒調蓮

猪臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不

急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊草煎湯調下

服之三日後効

黃連

二斤

嫩猪臟

二斤

右以黃連塞蒲猪臟繫兩頭煮十分爛研細添糕糊丸如

梧桐子大每服三五十九食前米飲送下

鯽魚方

治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色痿黃

大活鯽魚

一箇不去鱗肚不穿

白礬一塊如

右用敗椶皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗

內燒帶生存性為細末每服一錢空心溫米飲調下一方

瓦瓶內蓋定炭火燒為灰軟飯和丸如梧桐子大每服二

十九食前粥飲下

治腸風及脫肛不收有血下部腫悶疼痛

右用不蛀皂角五莖，搥碎，水一椀，揉令皂角消盡，縮二重，
纏過，取十分清汁，將脫肛腸浸在藥水中，其腸自收，不用
手按，如大腸收了，更用湯澀其腰腹上下，令皂角氣行，則
不再作。一方皂角去黑皮，塗酥炙為末，東肉和丸，如梧桐
子大，每服十五丸，食前粥飲下。

勝金丸

一名百藥散

治腸風下血，瀉血不止，及臟毒或便血。

百藥煎

三兩一兩生用一兩炒熟一兩燒存性

右為細末，軟飯和丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用米
飲送下。一方為細末，米湯調二錢服。

四季側柏散

治腸風臟毒下血不止。

側柏燒

存性，春採，夏採，秋採，冬採，此

右為細末，每服二錢，糯米飲調下。一方用菜一斤，洗炙為
末，每服二錢，食前枳殼湯調下。

腸風黑散 治臟毒下血

荊芥 燒

枳殼 炒各二兩

亂髮

槐花

槐角

蠟皮 炙

甘草 炙各一兩半

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣同枳殼炙木饅頭為末每服二錢食前溫酒調服水煎亦可

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連

貫衆

鷄冠花

烏梅肉

大黃 兩各一

甘草 炙三

右為細末每服二錢不拘時米湯調下

神應丸 治腸風臟毒

黃連

去藥八兩分作二分一分同薑切片同炒

右為細末糯糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用米

湯送下

蘇蓮丸 治腸風臌毒

黃連研為獨蒜煨熟

香挑丸 治腸風臌毒
右同搗為丸如梧桐子大每服五十九空心陳米飲送下

香白芷 烏梅燒存性 百藥煎將有性

右等為末米糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米飲送下

羨皮丸 治痔漏下血疼痛

東行椿根白皮

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十九空心用米湯送下

猪臟丸 治痔瘻下血

猪臟一條洗槐花炒為末填入腸內兩頭

右搗和丸如梧桐子大每服五十九丸食前當歸酒下

卷栢丸 治臟毒神効

卷栢

生石上高四五寸根黃如系
如上有黃點子取後治用

黃芪各等分

右為細末每服二錢空心米飲調服

治腸風膿毒方

山裏果曬乾

右為細末每服二錢空心米飲調服

太醫院經驗奇効良方卷之五十一