

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方卷之五十二

脫肛門 附論

脫肛之證難經云虛實出焉出者為虛入者為實肛門之脫非虛無故然哉蓋實則溫溫則內氣充有所蓄則寒則內氣餒而不能收况大腸有稟薄與肺為表裏肺藏蘊熱則閉虛則脫三因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因久利大腸虛冷所為也肛門為大腸之候大腸傷於寒利而用力努軀其氣下衝肛門脫出也用香附子荆芥等分煎湯洗之或以五倍子煨為細末放於紙上托入肛緩緩揉入若或長久男子變成腸疝痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子朴硝等分煎湯洗之亦用木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便秘貼少許効又有久痢臟虛皆能令入肛門突出有腸頭作瘻即腹中有虫丈夫由此酒色過度大腸者傳道之官腎者作強之

官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治无不愈矣

脫肛通治方

蝟皮散

治肛門脫出不收

蝟皮

一斤
令其黃存性

磁石

半兩
內醋
煎七次

辣桂三錢

鼈頭

一枚
炙令焦黃

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底炙熱熨肛

上托入

文蛤散

治大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒

疝久疝后皆脫肛

文蛤

一斤
不炙
多炒

右為細末水煎汁浸洗更入白礬蛇床丸佳洗後用赤石脂為末少許搽在芭蕉葉上頻用托入或脫出有長尺許

者以兩礬相並中空一尺以磁瓶盛藥水滿與礬相平令病人仰卧所脫浸在瓶中逐日換藥水如此浸縮為度

槐花散

治脫肛

槐花

槐角各等分

右為細末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

縮砂湯

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊各等分

右為細末每服二錢空心用米飲調下

乳香丸

治脫肛腸出

乳香另研

白丁香各二枳殼去穢

芫青去頭足

大黃蒸焙

鶴虱草炒萼澄茄

牡蠣煅各

右為細末粟米糊為丸如梧桐子大每服三十丸腸風膿

茶清送下諸痔前並白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

磁石散 治脫肛

磁石半兩火煨
醋淬七次

右為細末每服一錢空心米湯調下

香荆散 治脫肛

香附子

荆芥穗略半縮砂半錢

右為細末每服三錢食前用白湯調下

治腸頭挺出

右用蝦蟆皮一片燒付患處一方瓶內燒熏

治脫肛歷年不愈

右用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再無不
瘥并燒礬石粉之則亦良

木賊散 治脫肛不熱

右用木賊燒存性為末搽肛門上按之

蟻娘丸

治肛門癢或出膿血有虫傍生孔竅內

蟻娘

七粒 王胡五日 收

新牛糞半斤 肥羊肉令兩斤

右共如膏丸如蓮子大炙令熟以新綿薄裹內下部中半日少喫飯即大便中虫出三五度永瘥

治穀道腫赤腫又痒方

右用杏仁搗作膏傅之一方黎令黃搗以綿蘸塗穀道中治肛門腫痛

右用木弊子去殼取肉四五枚研如泥安新瓦器或木盆以沸湯衝動洗了另用少許塗患處

太醫院經驗奇效良方卷之五十二

太醫院經驗奇效良方卷之五十三

癘風門 附論

內經云風氣與太陽行諸脉俞散於肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉臃脹而有癘衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癘潰風寒客於脉而不去名曰癘風以其酷熱暴悍可畏耳夫

人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳屯於穀道中出然此邪毒藥雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疣瘡與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經也

是以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受甚重非醫之神

手能起此病者鮮矣有或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見其病勢緩多怒之若能攝養保和得宜鮮有不愈者也若不能絕滋味遠色慾皆不免再發則終於不能救矣前人曾治五人中間惟一婦人得免而疾安以其貧甚無物可喫欲啖無從所覓餘四人不能禁忌妄作者三二年後皆再發而危孫真人云吾常治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此一婦人本病外因又服三五百貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈若人患此鼻柱壞爛肌肉癆潰者是知陽明經分受風木之邪也明矣不可泥於風寒而已內有臭涎惡血陳虫惡物之類者又何為而致然也蓋謂厥陰主生五虫其相火熱甚而制金金衰故木來侮肺受熱而氣不清矣况血隨氣運涎隨氣降氣既不能施化則血聚而涎積矣血聚久則所惡涎積久則臭濁濕涎熱血相為

熏蒸久則肌肉潰爛而生虫治之使邪出於蕙蕪大腸之間者
乃是陽明經之道路也蓋其土敗木賊之證宜乎况又不能守
戒忌者欵此卅漢先生所以痛言之深也大風病是受天地間
殺物之風右為厲風可不畏哉三因方之所載此其惡疾者是
也雖名曰風未必因風所得大抵多嗜色慾勞動氣血熱發汗
泄不避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉皮膚瘍潰鼻梁
塌壞千金方云所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心
灸可藥也然亦有傳染者原其所因皆夫婦不知禁忌因而不
避風寒暑濕之氣因虛邪入經絡久則漸成斯疾又有勞役飲
食涎結於胃疏入經絡風涎相搏致使風痺不可一例作厲風
治之則誤矣內經云脉風成為癘俗云癘病也先禪皮散從少
至多服三五七日灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈三灸之後
服二聖散泄熱祛血中之風邪戒房室三年病愈藥灸同止述

頰右形此治肺風之法也靈樞云厲風數刺其腫上已刺以銳
針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食以犯其
病且頰病古今以為難治之證前人救生民之病苦置諸方論
詳備于象後之學者誠心鑒諸

癘風通治方

通天再造散 治大風惡疾

欬金

半一兩

大黃

一兩

白牽牛

取頭末六分
半生半炒

皂角刺

一兩炮
經年者

右為細末每服五錢日末出而東以無灰酒調下盡量為
度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌食發
毒之物半年但食稠粥軟飯漸止調理自然頭尾皮膚如
常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得
食牛馬騾驢等肉犯者死不可救矣

神功追命散 治大風

北大黃七斤 川礬金半兩 大皂莢刺一升

右為細末每服二錢用真大蠟子油入好酒溫調臨睡服
隔兩日再服宜候瀉下無虫方瘥

皂辣湯 治大風

皂莢刺一斤半

北大黃一斤 輕粉半斤

右為細末每服二錢空心酒調服取下惡物服藥數日齒
出毒血甚臭

皂角丸 治大風諸癩

肥長皂角二十條先炙透後去皮弦其核自落

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘瀝去清者候冷入雪
糕杵為丸如梧桐子大每服五十九不問飢飽酒送下

硫黃酒 殺癩風虫

硫黃研細

右酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前服或添

大桐子油更好

治大風諸癩惡虫內蝕形骸變壞

天靈蓋三兩 蝦蟆二筒云須足 桃仁去尖

人中白二兩 麝香一兩 硫黃各一

穿山甲燒灰 老皂莢刺名半兩 輕粉半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸月初五更

米飲湯送下連日取虫盡則愈殺瘵虫通用

烏蛇丸 治風癩殺虫

烏蛇肉酒浸 蜂房各一兩半 桃仁浸去皮 白羨藜炒并

皂角刺炒焦 貫仲 獨活 檳榔

苦參炒 蕪荑 雷丸 雄黃

硫黃各半 珠砂二錢 胡麻子四兩 蝦蟆二箇去頭
右為細末以長皂角十條水三升煎成膏和藥末丸如梧
桐子大每服三十九空心溫酒送下

治大風

右用烏蛇三條葦箔令淨熬熟去骨取肉焙乾為細末
用宿蒸餅丸如米粒大以喂烏鷄其鷄食盡烏蛇三條後
却烹鷄取肉為末或為丸或作散酒服之丸時仍用宿蒸
餅每服三五十九甚者不過三五鷄即愈

雷丸散 風癩取虫

雷丸

阿魏

貫衆末

各二錢

麝香

半

水銀

硫黃

雄黃

各二錢

同環

令盡為度

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

蝦蟆丸 治大風殺五虫

乾蝦蟆

一兩肥長皂角

一錢先炙香後去灰洗淨煎百沸去

右為細末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪饒內置麩上蒸熟去麩入麝香半錢同搗丸如梧梧子大每服二十一丸空心溫酒送下

蔓荊丸

治大風

蔓荊子

蒼耳子

枸杞子

牛蒡子炒

黑牽牛炒

胡麻子

香白芷

何首烏

威靈仙

荊芥穗

白茯苓

炒去

直隴蜈蚣

炒去

細辛

皂角刺

苦參

大草烏

去皮生用

獨活

各一兩

右為細末大風油和丸如梧桐子大每服二十四丸食前

用茶清送下

胡麻散

解風熱毒氣癰疹瘙癢

方見風門

行効第一方 治癘風即大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗出不避邪風使淫氣相干則肌肉不仁勞氣泣濁則肘熱不利故色敗皮膚癢潰鼻梁塌壞或自作不仁極張之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蟻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菘豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分爲細末滴水爲丸不拘時溫水下三七粒日三服

仙方

治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如苔藓勢若不可救此方特効

右用皂角刺三斤炭火熬久曬乾爲末濃煎大黃湯下一

七服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

浴洗 治大風頑麻癩風紫癩白癩

麻黃根

地骨皮

草烏頭各二兩

右剉碎礬朴硝二兩和勻每用藥一兩水一桶瓶一合葱三十根艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上如珠出更坐室中或臚片時尤佳汗解方著衣避風而出五日再浴如此浴二次浴罷便服換骨丹

換骨丹

九肋鼈甲

大蜈蚣細切各

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性爲末巴豆半兩去皮膜順手殘青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中大燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆碾爛如泥入煎二味末碾勻

醋艾糊和丸如菴豆大每服七丸虛人四五丸用溫薑汁下候利惡物如膿血爛腸即住三兩服未利更加三丸次服遇仙丹

遇仙丹

人參

紫參各一兩

苦參

白殭蠶去紫各二兩

右為細末麪糊和丸如梧子大每服三十九食前溫鹽湯送下日二服次服疎風散

疎風散

山梔仁半兩 大黃

滑石

熟地黄各一兩

右為細末入朴硝半兩研令勻每服一錢食後淡茶清調下次用佛手膏

佛手膏 去黑紫瘡核

丹猫七枚去 巴豆

杏仁二十枚

紅娘子二十枚

帆霜八研

韶粉

黃蠟各半

槐角三條

菘豆

盆硝

瀝青

膩粉炒

亂髮各一

研黃

黃丹各二

清油四兩

右先將油煎令亂髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味下焦者濾出方下硫黃盆硝丹粉蠟等以簞子不住手攪令勻滴水中成珠不散為度以磁器貯之用時先將針刺瘡核用藥一粟米大故針處次日擠瘡有惡臭黑膿血出三兩日血漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥

白石

甘草各半

朴硝

大黃各一

巴豆各一

黑牽牛二兩半

右為細末麪糊為丸如菘豆人每服十大丸加至三十九

臨臥時用金錢薄荷

甘草散

甘草

滑石各半

大黃一分

山豆根一兩

右為細末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒丸

解毒丸

瓜蒌根三兩

大黃二兩

朴硝二兩

甘草半斤

右為細末麩糊為丸如棗豆大每服二十九加至三十九

白湯下次服黑神丹

黑神丹

訶子四箇

黑牽牛生

巴戟炒各半兩

甘遂一分

赤小豆

王四下

右為細末麩糊和丸如棗豆大每服十九加至十五丸不

勻時用薄背湯送下次用水膏藥

傳貼破處交面脚上瘡令生肉

陳米

半升

馬蹄香

藿香

各一

麝香

二分

陳皮

去灰土半斤

右為細末入麝香用冷水調搗付瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方迺秘傳有驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

三濟丸

治大風惡疾

川芎

當歸

熟地黃

荆芥穗

細辛去葉

防風

各一

桂心

半兩

各剉碎先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一斤搗汁浸一宿焙乾再以酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁浸蒸餅為丸如梧桐子大陰乾收貯後用好烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫熱下藥五十九食遠服

八葉湯 淋瀝大風瘡

桑葉

荷葉

地黃葉

皂角葉

藟葉

蒼耳葉

葛蒲葉

何首烏葉

右等分曬乾燒存性為細末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡癩茶毒膿汁淋漓眉髮墮落手足指脫頑痺痛痒顏色枯碎鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之惡無越於斯負此病者百無一生

接肌散

治大風疾年深久不能愈以至毛髮墮落鼻梁崩壞

額顛腫破不至踰月取効如神

白花蛇

酒浸一宿

黑烏蛇

酒浸一宿

地龍

去土

蔓荊子

威靈仙

荆芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

天門冬

木賊

不灰木

赤芍藥

石菖蒲

川芎

定風草

何首烏

胡麻子炒

草烏去皮

蒼朮去灰米

木鱉子

甘草炙各

當歸

細辛

香白芷各一

天麻二兩

右為細末每服五錢七酒調下食後服酒多為妙

如聖散 治大風疾洗瘡藥大有神効

苦參

玄參

紫參

荆芥穗

沙參

陳皮

厚朴

頑荆子

麻黃去節各

防風

白芷

蔓荆子

威靈仙各二

右為細末每用三錢桃柳枝各一把水五升同煎臨睡

時熱洗忌五辛物

黃精煎 治大風癩病面赤疹起手足攣急身發瘡癢及諸脚

已落者

黃精

生者十斤

白蜜五斤

生地黃

生者

右先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研入水三斗絞取汁置銀器中和蜜攪勻煎之成稠煎為度每用溫酒調化二錢匕或三錢匕三夜一久服風癩痊平而如童子知年不老

治大風瘡

右用楓木子不以多少燒存性灰研研與輕粉等分用麻油調敷瘡上極妙如濕則乾搽之經驗方云昔章貢有鼓角匠生肉瘰因詰之云曰害大風得道人傳此藥今遂愈

蒿艾酒

治癩疾

右取白艾蒿十束如升大煮取汁以麴糯米亦如護酒法疾軀稍稍飲之但是惡疾徧體面目有瘡皆可服

治大風

桂黃

硃砂

滑石

阿魏

雌黃

雷丸炒

藜蘆炒

生犀角屑

硫黃

各二錢
斑貓

芫青

各去翅足糯米炒各用
二十箇

黑皂角刺 焙七錢半

右爲極細末每服一錢天用溫酒調下明日再服

白花蛇造酒方 治大風

每白花蛇一條熬米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之類於麴上然後槩和勻類於蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨爲末每服酒一盞溫服蛇末少許仍將酒脚并糟做餅食之尤佳

治身上癩瘡

右以蒼耳子葉煎湯洗之

大醫院經驗奇効良方卷之五十三

外科奇效良方卷之五十四

醫門

附論

夫醫之用藥如將之用兵諺云千軍易得一將難求決勝者良將也決勝者良醫也知兵之勝出於良將之機謀知人之病出於良醫之診視有軍無將則軍不能自勝有方無醫則藥不能自効蓋醫者人之司命也脉者人之大要也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣人生其間雖病萬有不齊究其所以莫非運氣之所為也故醫之運氣猶儒之論理工之規矩鑑之光衡之權舍之將何以焉蓋其道博其旨玄其法精其機妙知其要則一言而盡不知其要則流散無窮且如醫之十三科其中大方脉婦人科小兒科風科必先診脉後對證康藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診於瘡科之輩甘當淺漏之名噫其小哉夫瘡腫之生皆有

陰陽不和血氣壅滯若不診視何以知陰陽勇怯氣血聚散耶
由是觀之治瘰癧腫診候之道不可闕也是以素問難經靈樞
甲乙及扁鵲仲景華陀叔和千金外臺聖惠總錄古今各醫諸
家方論中診候瘡科之詳至矣盡矣今遵前人之書略其瘡科
之脈開列于後

浮脈之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太
過警警然見於皮膚之間其主表證或為風或為虛浮而
大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脈
應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脈之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之
洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脈洪大者瘡疽
之病進也如瘡疔結膿未成者宜下之膿潰之後脈見洪
大則難治若自利者不可救治也

滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其
主或為熱或為虛此陽脈也瘡疽之病膿未潰者宜內消
也膿潰之後宜托裏也

數脈之診按之則呼吸之間及六至其狀似滑而數也若浮
而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數為熱仲景曰
數脈不時見則生惡瘡也又曰肺脈俱數則生瘡也診諸
瘡洪數者裏欲有膿結也

散脈之診似浮而散按之即散而欲去舉之則大而無力其
主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊
退者診其脈洪滑龐散難治也以其正氣虛而邪氣實也
又曰肢體沉肺脈大即整謂散者也

乳脈之診似浮而軟按之中央空兩邊實其主血虛或為尖
血瘡腫之病診得乳脈潰膿後易治以其脈病相應也

長脈之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脈也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脈之診按之則實而弦且沉且浮而有牢堅之意若癰癧結腫診得牢脈者不可內消也

實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實又病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與腑府俱實故也

弦脈之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而不移緊如繩而轉動以此為異春脈浮弦而平不時見則為飲為痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也緊脈之診似弦而緊按之如切繩而轉動其至切痛積聚也

瘰癧之氣血沉滯也亦主痛也

縵脈之診按之散而後來率之則細而不足肺滿則氣滿也亦主血虛落腫漬后得之坑好也

短脈之診按率則不及本位內經曰短則氣病以其无胃氣也諸病脈短皆難治也瘡腫脈短其氣短也

細脈之診按之則芤如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微主亡陽衰也瘡腫之脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也

微脈之診按之則軟小而微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病漬後微而勻舉自瘥也

疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之漬後自瘥緩脈之診按率似遲而稍駛於遲仲景曰陽脈浮大而濡陰脈浮大而濇陰脈同等謂之緩脈見長緩百疾自瘥凡諸

瘡腫潰后其脉滿遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣者也若芤則瀉血滿堅大實按之不減而有力者中焦有結伏在胃也微浮者積不消動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脉浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也軟者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛而疝瘕穀不化也細者溇泄而下冷也芤者小便澀而下半也牢而小者足膝寒痺脚下隱也而痛也細者急者筋攣不能行也來而絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

瘡瘍當分歲所

經曰諸痛痒瘡皆屬心火又云營氣不能通於肉理乃生癰

腫以云膏梁之變足生大疔又云熱勝血則為癰膿又云地之
溫氣感則害入皮肉筋脉東垣謂溫氣外傷則營氣不行榮衛
者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也營氣為本此逆
不行為濕氣所壞而為瘡瘍也但瘡瘍論中多言二熱相搏熱
化為膿有言熱化為膿者有言濕氣生瘡寒化為熱而為膿者
此皆瘡疽之源也當者是何部分所發所用之藥引經為先兼
見次之以脉別之是陰是陽用藥在乎王治宜以先滿其榮治
者當分而治之且如一歲之中火熱無過四五月之間是時諸
物皆不壞爛者六七月之間濕令大行之際近取諸身濕熱在
身豈不敗壞肌肉此理明矣大抵瘡瘍之疾經云六腑不和而
結為癰要分臟腑之屬經絡之異六陰六陽之經有多氣少血
者有多血少氣者有多氣多血者不可一槩論之經言癰者榮

衛精留於經脈之中則凝而不行則衛從之而不通壅遏而不得行故熱天熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然此不能陷骨髓不為焦枯五臟不為傷故曰癰疽者熱氣純盛下陷肌膚筋骨髓枯內運五臟血氣竭其毒下陷筋骨及良肉故曰疽疽者皮堅上如牛領之皮癰者皮薄上以澤之是知癰者壅也六府不和之所生淺而大也疽者沮也五臟不調之所致深而惡也六府主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮厚而腫壅皆滲着厥府見於肌肉營氣不從氣血壅沮而生也其所出之道有異者邪毒從虛而出也假令太陽經虛從背出少陰經虛從鬚出陽明經虛從髕出督脈經虛從腦出餘者從經所出取焉今富貴之人不知其節以飲食炙煖高粱厚味醇酒辛辣之物日久大過其氣味俱厚乃陽中之陽不能走空竅先行動道反行隊隊適於肉理則溫氣六勝則令子母實火乃

大旺打火一虛必尅腎水腎既受尅積久水乏水乏則從溫熱
之化而上行其瘡爰出背出腦此為大疔之最重者也若毒氣
見於肺部之分或脾胃之分次也或見於他經又其次也或患
溫毒流注止處無不潰爛故經曰高梁之變足生大疔受如持
虛如持虛器以受物也無不受治大疔之法必當瀉其營氣以
標本言之先受病為本非苦寒之劑為多則不能除其苦楚疼
痛也諸瘡瘍性性多以乳香沒藥加以熱劑治之此理未為穩
當若使經絡流通去其蔽府之壅滯佐以寒涼之劑其瘡自愈
是以河間論瘡毒昔火之屬須分內外以治其本若其脉沉實
當先疎其內以截其源也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也
有內外之中者邪氣至盛遏截經絡故發癰腫此因火於托裏
及失疎通又失和其榮衛治瘡之要須以疎利為先次以托裏
和其榮衛此三法乃內外之攻也若脉沉實發熱煩躁外无瘡

赤疹痛其邪在內氣以深矣當疎其肱府以絕其源又胡嘔嘔
心煩脉沉而實腫硬不問而皮肉不変根深而病大邪亦在內
若肱府秘澁急當疎利宜以黃連內疎湯加大黃服後以次序
調理若脉浮數瘡腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托
裏宜以復煎散此為治法

一療癰馬刀經同證吳丹溪云夫癰疽初發必起於少陽經不
守禁戒延及陽明經大抵食味之厚營氣之積曰毒曰風曰熱
皆此三端招引變換治之須分虛實若實者依法調治速厚味
發氣之物亦有愈者虛者誠為可慮以其屬膽經主決斷有相
火而且氣爰血少婦人若患此疾月經不調便作寒熱粉久交
為潮熱其證漸危自非斷怒息氣遠滋味神仙不能治本草言
夏枯草大治癰癧散結氣有補養厥陰血脉之功能退寒熱佐
之以行散之藥加之以艾灸取其隨經之穴自然取效若疔癰

之論瘰癧者經謂結核者是也或在耳前後連及頤頰下連缺
盆背為瘰癧或在胃及胃之側下連兩脇皆為馬刀手足少陽
主之此經受氣少血故多堅而少軟膿白而稀如米泔狀世俗
治馬刀求其水清者可治殊不知此經多氣少血之故在乎診
其虛實以調治之是以東垣治瘰癧馬刀以救若化堅湯或散
腫潰堅湯主之外以臨泣穴灸二七壯此證並屬手足少陽經
也惟瘰癧延及陽明之經故用藥有出入加減不同耳詳載於
試效方中瘰癧馬刀皆形質發於部分而命名也巢氏病源載
之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風熱氣之三
毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風
熱邪氣內搏於肝肝主筋故令筋畜結而腫或見於是何部分
先以五香連翹湯或牡蛎大黃湯疎下兩三行後服前藥調治
外用十香膏烏犀膏貼之如或將痊求瘰其將護忌慎治療之

法無造次焉

一肺癰肺痿內經云肺之癰喘而兩胛滿金匱要略又以肺癰肺痿並論辨之所謂熱在上焦者因熱為肺痿肺癰之病何從得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便秘又被陳利之藥重亡津液故得之若寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者為肺痿之病共口中辟辟燥欬又胸中隱上痛脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰夫肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷血氣膜理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胃胸脹滿久久不瘥遂成前證輕則痿甚則癰聖惠曰中府隱隱而微痛者肺直也止肉微起肺瘡也中府者穴也在雲門下一寸六分乳肋間動脈應手陷中也是以候始萌則可救膿成則多死若欲知有膿者但診其脈若微緊而數者未有膿也

緊甚而數者已有膿也內經又曰血熱則肉改染衛不行必將
為膿大凡肺癆當咳嗽短氣骨痛時唾膿血又及如粳米粥者
難治若嘔膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其
脉短而濇者自痊浮大者難治面色當白而反赤者此火之尅
金皆逆為不治治法此證不得卧者葶藶大棗瀉肺湯千金方
黃芪湯並皆主之全在脉理分之若毫釐之差千里之遠慎之
慎之

一湯癰胃脫癰孫真人云卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之
結則殺人腸癰之為病小腹腫而強抑之則痛小便澁似淋時
時汗出後惡寒其身皮甲聳然腹皮急大如腫狀其脉數者小
有膿也其脉遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或透
脐生瘡或膿從脐中出或大便如膿血故治之以大黃牡丹皮
之類選而用之或外以灸法此腸癰之形證蓋可知矣胃脫癰

者何以別之內經云人病胃脘癰者診當何如當胃脘沉細沉
細者氣逆逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰
也諸書少論此病惟孫真人言此後學以此論乃胃熱為邪治
之初以疎利為先次以消毒托裏退胃熱此為良法不識病者
誤人不淺可不慎之

一乳核失治必成癰疽丹溪云乳房所屬陽明乳頭厥陰所屬
乳子之母或忿怒或厚味以致氣不流行竅不得通汗不得出
則結為腫為痛陽明之經血熱則化為膿又有兒之口氣吹而
吹熱次結成核初起時便須忍痛搽散令軟血脉通和自然消
散失此不治則成癰癰精要以神効瓜蒞散治乳癰蚶勞固是
效捷村落之靈藥恐未易得用蒲公英此草在蒙田野路側有
之三月開花黃似菊味甘解毒散滯氣入陽明太陰二經洗
淨細碾以忍冬藤濃煎入少酒佐之服之即効若疎厥陰之滯

氣以青皮清陽明之熱以石膏行瀉火以生甘草消腫毒以瓜
蒞子或加青橘皮皂角刺金銀花當歸頭或湯或隨宜加煨佐
以少酒仍加艾火兩三壯於腫處甚効切勿妄用針刀引惹拙
病又有婦人積憂結成隱核有如驚棋子大不痛不痒或一年
二年三五年者爲瘡破陷名曰妳癆以其凹似癩穴也不可治
矣若初起之時便須消釋病根更宜清心遠慮薄滋味全要息
怒調理自有可安之理若婦人經行得此輕若六十歲左右味
羶鬱結而形實七情所干性急不調結核前證自覺神思不佳
不知食味便可用人參湯調青皮甘草末等分少入生薑汁細
細呷之一日夜五七次其核自消若不早治隱至經年以後如
勢不痛不痒必於乳下潰一穴出膿或經三五年雖飲食如舊
洞見五內乃死惟無夫婦人生者多若有夫婦人生者蓋積氣
之所流滯也故婦人夫乃婦之天得夫則陰陽和此證雖有而

治自愈無夫婦人得其瘕者以其穴之嵌深其可畏哉慮此者
必須早治必經歲月九死一生有一初嫁之婦患此只以青皮
并草煎湯常服立安又一婦人十八歲得此證者性急脈實所
難者姑且與青皮一味煎湯與之間以加減四物湯服之不月
而安學者前人用青皮乃廢陰之藥四物湯行血分之功信有
理哉又有五發及諸瘡十三疔痔漏陰瘡時毒等證精義備載
其詳今略癰疽治醫之法條列于後

瘡科通治方

內托羌活湯 治疔瘰生癰堅硬腫痛大作

羌活 黃蘗酒製各 防風 當歸尾

藜蘆 連翹 蒼朮 陳皮

甘草炙 肉桂三分 黃芪五分

右作一服水一鍾酒半鍾煎至八分食前服

白芷升麻湯 治臂上生癰

白芷 一分

升麻

桔梗 錢一

生黃芩 三錢

酒黃芩 四錢

紅花

甘草 各半錢

當歸枯痛湯

治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝

生瘡赤腫裏外糜瘡膿水不絕或痒或痛

方見脚氣門

內托升麻湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼并

乳癰初起亦治

升麻

葛根

連翹

當歸身

黃蘗 各二錢

黃芪 三錢

肉桂 五分

牛旁子

甘草 各一錢

右作一服水一鍾酒半鍾煎至一鍾食後服

菟胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

芫胡

當歸尾

生甘草

連翹

黃芩

牛旁子

京三稜

桔梗

各半

黃連

一錢

紅花

少許

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服亦治瘰癧此是攻裏

內消之劑

郭氏升麻牛旁子散

治時毒瘡發於頭面胃膈之際

升麻

牛旁子

桔梗

葛根

玄參

麻黃

甘草

各一錢半

連翹

二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

中和湯

治時毒瘡腫

羌活

川芎

葛蒲

牛旁子

防風

荆芥

漏蘆

麥門冬

前胡

甘草

各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

升麻和氣飲

治瘡腫癰疥痒痛

升麻

桔梗

蒼朮

乾葛

甘草

大黃

煨各一錢

陳皮

二錢

當歸

半夏

茯苓

白芷

乾薑

枳殼

各五分

芍藥

半一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

防風

白蒺藜

荊芥

各一錢半

何首烏

黃芪

甘草

各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服或爲末亦可

托裏十補散

治瘡腫托裏

人參

當歸

黃芪各二錢

厚朴

川芎

桔梗

防風

桂心

白芷

甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

十六味流氣飲

治無名惡瘡癰疽等證

川芎

常歸

芍藥

防風

人參

木香

黃芪

官桂

桔梗

白芷

檳榔

厚朴

烏藥

紫蘇

枳殼

甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

神効烏金散

治癰疽疔腫疔毒附骨疽及諸惡瘡若瘡黑

陷如石堅煩渴危篤者服此發汗瘡起

火麻頭煨

木賊去節

蝦蟆草頭

小草烏頭

樺皮節 酥炙

酥黃

蒼耳頭

五月五日午時採

右曬乾各等分同入磁器內盪泥固濟炭火內從早煨至申分如黑煤色為度碾為末每服二錢症重者三錢用熱酒調下如修合此藥必擇天晴好日於靜室中勿令鷄犬除人見又名首功玄黑散

奪命丹

治諸般腫毒疽疔惡瘡

蟾酥

輕粉 各半錢

白礬 花

寒水石

銅綠

乳香

沒藥

麝香 各一錢

硃砂 三錢

蝸牛 二十箇

右為細末將蝸牛別碾爛入藥末同搗勻為丸如菉豆大如丸不乾入酒糊些小每服一丸生葱白三五寸病者自嚼爛吐於手心男左女右包丸藥在內用熱酒和葱送下如重車行五七里汗出為効重者再服一二丸

蟾酥丸

治疥腫一切惡瘡

蟾酥

輕粉

乳香

沒藥

各一錢

蓮花藥

川烏

硃砂

各二錢半

麝香

半錢

右為細末麪糊為丸如豌豆大每服一丸病重者服二丸
依前法服之取汗

托裏榮衛湯

治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝 七分

人參

黃芪

紅花

蒼朮

羌胡

連翹

當歸身

羌活

黃芩

防風

甘草

各一錢

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服

托裏溫中湯

治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心

下痞滿腸鳴切痛大便微澀食則嘔氣短吃逆不絕不得

安臥時發昏憤

附子

炮去皮
二錢

乾薑

地

羌活

錢各半

益智

丁香

沉香

木香

茴香

陳皮

甘草

炙各
錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

內疎黃連湯

以瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脈洪實者

黃連

當歸

芍藥

檳榔

木香

六苓

枳子

薄荷

桔梗

甘草

錢各一

連翹

大黃

錢二

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪弦實數腫

甚欲作膿者

大黃

三錢

當歸

二錢

瓜蒌根

皂角刺

牡蠣

朴硝

連翹

錢各半

金銀花

赤芍藥

黃芩 銹

右作一服水酒各一鍾煎至一鍾食遠服

破棺丹

治諸熱腫一切風熱瘡證發熱多汗大渴便閉證

語結陽之證

大黃

生一兩半熟芒硝

甘草 各一兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服半丸病重者一丸至二丸食後童便入酒化服或白湯入酒化服亦可

瀉心湯

治瘡毒癰腫發燥煩渴脈實洪數者

大黃

四錢

黃連

山梔

漏蘆

澤蘭

連翹

黃芩

蘇木

犀角

一錢

各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆寒發寒熱

乳香

木通

大黃錢各半

連翹

沉香

木香

獨活

桑寄生

丁香

射干

升麻

麝香

甘草炙各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

清涼膏 治初患癰腫瘡癤熱焮疼痛消腫毒

大黃不拘

右為細末用漿水調攤貼之醋摩亦得

三香湯 治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

丁香

木香

沉香

乳香各二錢

麝香三分

右作粗末作一服水一鍾半煎至七分空心服若嘔者去

麝香加藜香一錢渴者加入參一錢

托裏護心散

治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐

而痛可服二三服

乳香

明淨者一兩

真萊豆粉

四兩

右研細和勻每三錢不拘時甘草湯調服

定痛托裏散

治一切瘡腫疼痛不可忍如年少氣實先用疎

利後服藥

粟殼

去筋膜炒二錢

川芎

當歸

白芍藥

乳香

沒藥各一錢半

官桂一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

乳香止痛散

治一切瘡腫疼痛不止

乳香

沒藥各一錢

丁香五分

粟殼

白芷

陳皮

甘草炙各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

黃芪人參湯 治諸瘡破後食少無味及有虛熱穢氣所觸者

黃芪 二錢

人參

白朮

麥門冬

蒼朮

陳皮

升麻

五味子

當歸身

黃柏 炒

甘草 各一錢

炒麵 五八分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

竹葉黃芪湯

治疔腫諸瘡發熱而渴

淡竹葉

黃芪

人參

麥門冬

生地黃

川芎

當歸

芍藥

黃芩

石膏

半夏

甘草 各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

聖愈湯

治諸瘡血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也

川芎

當歸身

生地黃

熟地黃

人參

黃芪 各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

內補黃芪湯

治諸瘡腫發背已破後虛弱無力體倦懶言語

食無味少睡脉潛自汗口乾並宜服之

黃芪

人參

茯苓

麥門冬

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃

官桂

遠志

甘草炙各錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食遠服

羌活散

治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白蘚皮

硫黃

狼毒各一兩

輕粉二錢

白附子

黃丹

蛇床子各半兩

右爲細末油調成膏搽之

烏蛇丸

治一切風癬多年不瘥者

烏蛇

酒浸
天骨

白附子炮

附子小隻
一宿

天麻各二

全蠍炒

羌活

乳香

僵蠍各一

苦參十兩

槐花半斤

右為細末用生薑汁一斤蜜一斤二味同熬成膏入藥和
凡如梧桐子大每服三四十九空心用溫酒送下夜晚荆
芥湯送下

內托升麻湯

治婦人乳中結核

升麻

連翹

青皮

甘草節各二錢

瓜蒌仁三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後細細呷之

連翹飲子 治乳癰

連翹

川芎

瓜蒌仁

皂角刺

橘葉

青皮

甘草節

桃仁各二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

牡丹湯 治腸癰小腹腫痞按之即痛小便如淋時時發熱自汗惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血洪數者已成不可下

牡丹皮

瓜蒌仁各一錢 芒硝

桃仁去皮尖各二錢

大黃 五錢

右作一服水二鍾煎一鍾去滓入硝再煎數沸不拘時服
薏苡仁湯 治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀
婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏苡仁

瓜蒌仁各三錢 牡丹皮

桃仁各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

神仙鏡鑿丸 治腸癰內托神妙此藥不問老幼皆可服之無

不作効最止疼痛不動臟腑

黃蠟

半兩要黃色者
一方用七錢

白礬者初研

右熔化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服二十九漸加至
三十九食遠用溫白湯送下

雙解散

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

川大黃

三錢澤瀉

牽牛

白芍藥

桃仁

去尖
各二錢 辣桂

甘草各

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食前服

復原通氣散

便毒初發用此

南木香

延胡索

天花粉

酒浸
舶上茴香炒

白牽牛

炒
白芷

當歸

甘草各一兩

青木香

半兩
穿山甲酒浸炙
焦二兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服木香湯亦可

敷藥方

治便毒腫痛

椎黃

乳香各二兩

黃柏一兩

右爲細末用新汲水調敷腫處自消

牡丹散 治肺癰胃乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭

牡丹皮

赤芍藥

地榆

若梗

薏苡仁

川升麻

黃芩

生甘草

各一分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

排膿散 治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺

嫩黃芪

川白芷

北五味炒

人參各等分

右爲細末每服二錢食後蜜湯調服

二香白木散 寬中和氣滋益脾土生肺金進羹飲食

沉香

木香

乳香

丁香

藿香各五

人參

白朮

白茯苓

薏苡仁

山藥

桔梗

白扁豆

蓮肉

縮砂

粉草 各一錢

右爲細末每服一錢空心用紫蘇鹽湯調服或淡亦可有汗加浮麥煎湯調服

單方

治面自身體生斑或痒或癢子僅起不即治甚殺人

右用羚羊角燒爲灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙

治諸瘡腫不散者

右取白藥根爛搗傅貼乾則易之無生者用末新水調塗之亦得

牛旁粥方 治瘡腫

右用牛旁根三莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋膜汁中即下米煮粥鹹淡任性服一椀甚良無忌

將軍鐵箍膏

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋

蔓走疔毒氣

南星

大黃

蒼耳根

鹽霜白梅各一

白芨

白欬

防風

川芎各半

草烏

雄黃各三

右為細末先以蒼耳根霜梅爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以鷄羽蘸水掃之日換二三次大妙

治諸瘡腫馬毒瘡

右以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡止治濕癬白禿以馬齒莧和灰塗之効治緊唇面腫搗汁塗之各用乾末水調塗治丹毒發背腫搗傳之不住者以藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傳之尤良治三十六種風結瘡取馬齒莧一石水二石一盆煮之澄清內蠟三兩重煎之成膏塗瘡上

并服之

加味當歸飲子

治諸瘡瘍諸痛瘡皆為心火火鬱則發之

當歸

生地黄

升麻各五錢

防風二錢

荆芥穗

何首烏各二錢

羌活

黃芪各三錢

紅花

川芎

甘草各一錢

蘇木

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分食遠服沐

浴取微汗効速使血氣通和服之應効

麝香輕粉散

治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆治

麝香

輕粉各半錢

乳香

沒藥

白礬

飛過各一兩

右為細末量瘡乾貼

葵花散

治一切瘡

葵花

鬱金

黃連

黃蘗

蛇子仁各等分

右為細末冷水調成膏貼瘡痛處神效

神秘方 治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去膿

右用地黃汁一升松脂二兩薰陸香一兩羊腎脂及牛酥各如鷄子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥更用蠟半鷄子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

當歸和血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產後腹痛

後腹痛

當歸 二錢

乳香 半錢

沒藥 半錢

白芍藥 三錢

右為細末每服一錢水一中盞煎七分和滓溫服日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加

赤芍藥

百合散 治頤頰瘡一名揭背瘡

百合

黃葉

各一

白芨 一分

草麻子

五升

右為末用朴消水和作餅貼之日三五次

迴瘡金銀花散

治瘡瘍疔毒甚色變紫黑者

金銀花

連枝葉俱用
剉碎二兩

黃芪 四兩

甘草 一兩

右吹咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時取
出去滓頓服之一方無黃芪

二金散 治大人小兒蝕透頤頰初生如末豆名含頤瘡

鷄內金

鬱金

右等分為末先用鹽菜鹽嗽了貼之

芙蓉傳方 治頤頰腫痛或破成瘡

芙蓉葉

不少

右鳩爛傳之以帛繫定日一換

治蛇纏瘡

右用雄黃研為末以醋調塗仍用酒調服凡為蛇傷及倅
蠶蜈蚣毒虫頭大所傷皆可用之

鷄內金散

治穀道邊生瘡久不愈者

右用鷄胞脰不拘多少即是鷄胞內去下黃皮燒灰存性
研為極細末每用乾貼之如神

捨時從證

至元壬午有人王伯祿年五十有七右臂膊腫盛

上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈證俱寒

舉瘍瘍醫彥和視之曰此乃附骨癰開勢已遲以燻起之

膿清稀解待日肘下再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿

蒂湯兩服稍緩待日咳逆尤甚自利臍腹疼痛滿飲食

減少時登脊憤於左乳下黑蒸露灸二七壯艾麝以乾姜

附子木香沉香茴香羌活類藥吹咀一兩半欲與服或者
曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎
予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前
後飲食不入此謂五噎吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆
屬心火是定理也此證內外相反須當捨時從證非大方
幸熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食進
蒼勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常
者安人之見知變者大事知常而不知變細事因而取敗
者亦多矣况醫乎守常知變豈可同日而語哉

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下
痞滿腸鳴切痛大便微溼食則嘔氣短促吃逆不絕不得
安卧時有昏憤

丁香

沉香

茴香

蒼智仁

陳皮

木香

羌活

乾薑

甘草

黑附子

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾薑大辛

熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活苦辛溫透關節

炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不

下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣

聚而為滿木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也

右吹咀作一服水三盞生薑五片煎至一鐘去滓不拘時

溫服心一切冷物

連翹散聖湯 治耳下至缺盆或至有上生瘡堅硬如石動之

無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脇或已流

膿作瘡未破者並皆治之

連翹

黃芩

生用

為藥

當歸尾

京三稜

切對

廣茂

切對

三稜

氣製一

草龍膽

酒製四

次二兩

兩

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

蒼朮

酒炒

土瓜根

酒炒

兩

兩

此胡

二錢

甘草

錢三

石件一半為末煉蜜和丸如粟豆大每服一百丸或百五

十九一半咬咀每服半兩水一盞八分浸半日煎至一盞

去滓臨睡熱服頭下脚高去枕而卧每口作十次嚥留一

口送下丸藥畢如常

此胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡

此胡

連翹

知母

酒製

黃芩

各半兩

兩

黃蘗

酒製

生地黃

甘草

各三錢

當歸尾

半錢

半

錢

中桂

三分

牛勞子

二錢

瞿麥穗

六錢

右劉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎至一盞去

滓食後稍熱持服之

消腫湯 治馬刀瘡

芫胡

黃芩

生用各二錢

黃連

牛旁子

炒各半錢

黃芪

瓜蒌根

各一錢半

連翹

三錢

當歸尾

甘草

各一錢

紅花

少許

右八咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓食後稍熱服

忌酒濕麪

重洗方

凡諸發及癰疽瘰癧瘡湯鹽火燒等疾或有別作

一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤一椀搗細用無灰酒濾汁服之以俾傳瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之上埃其瘡出膿便以穢猪蹄湯等十分淨洗久洗為妙洗一二時辰不妨次用後桑葉薰之

好降真香末

楓香末

右二末於鉢中攪熔丸如彈子大却取瓷盤一枚依爐口
造紙煙筒一箇如燒龍涎香樣慢火燒之蓋以煙筒口熏
瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更熏未出膿者即出已出
膿者即乾直候生肌合口然後止向後有赤腫脚處又再
熏大槩欲屏去穢氣也

四生散 治風氣上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下
症陰濕四肢燥癢遍體生瘡及婦人血風瘡

羌活

黃芪

白附子

沙苑蒺藜

右等分為細末用猪腰子一枚切開去筋膜入藥少許於
內濕紙裹炮熟再入藥三錢浸酒調藥并腰子嚼碎令盡
服三五服後只用益酒調亦可或腰子一枚分兩次用羊
腰猪腰皆可惟猪羊者為妙

千金托裏散

治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪

半一兩

厚朴

防風

桔梗

各二錢

連翹

二錢

木香

沒藥

各三錢

乳香

二錢

當歸

半兩

川芎

白芷

芍藥

官桂

人參

甘草

各一兩

右為細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

治疥瘡

黃連

羌活

青皮

白殭蠶

防風

獨活

蟬蛻

細辛

赤芍藥

甘草

節各等分

右咬咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑十錢重同搗爛熟酒和服然後用酒水各半盞薑三片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服略下一二行蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔去根脚

返魂丹 治十三種疔瘡

珠砂

膽礬各一兩半

血竭

銅綠

蝸牛生用各一兩

雄黃

白礬各一兩

沒藥

蟾酥各半兩

麝香少許

輕粉半

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥研為細末同研和丸如鷄頭實大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心內將藥丸裹在葱內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘡如不能嚼將葱研爛裹藥服之極有功效

破棺丹 治疔黃走肌不止

當歸

赤芍藥

山梔子

牽牛已上各二兩半

連翹

牡蠣

金銀花

紫花地丁各一兩半

京三稜

甘草各二兩

加大黃三兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用童子小

便化開服忌酒生冷硬物

內托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不動身發

寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如

瘡黃於黃上用針刺仍服內托散自然消散

連翹

白芷

生地黃

赤芍藥各一兩

大黃

去皮

黃芩

去頭

薄荷葉

各七錢

朴硝

二兩

黃芩

去心

甘草

一兩

右為粗末每服一兩水一椀燈心竹葉煎七分其人喘加

人參少許大病只三四服愈如服了心煩嘔用不二散止

不二散

右以甘草半兩豆粉一兩分作二服酸澀水下

立馬回疔丹

治疔瘡走亂不止

金脚信

蟾酥

血竭

硃砂

改藥記各經粉

龍腦

蘇香一上各

右為細末用生草為頭汁和作錠如麥子大用時將瘡頂刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫是効

走馬赴蓮丹 治疔瘡

沒藥 乳香

蓮砂

硃砂

雄黃 輕粉三錢上各 片腦

分 麝香 少許

右為細末蟾酥汁和為丸如黃米大每服一丸溫酒送下
奪命返魂散 治一切疔瘡增寒發熱昏悶不語腫遍皮膚不

思飲食並皆治之

大黃 連翹

山梔子已上各二錢

巴豆 杏仁各二錢黑色為細末 牽牛頭末

苦丁香各一錢 一人言五錢用大蒜五箇去心填入

右為細末研勻每服半錢病重者服一錢用新汲井花水

朝下一服見効如病重無脈者與下藥約一頓飯時吐了藥便醫不得吐不了藥即活

滴滴金 治疔瘡

硃砂

輕粉

人言

雄黃

硃砂各一錢

麝香少許

右為細末每用些少先以針刺開瘡頭貼藥黃水出効

疔瘡錠子

硃砂一錢

白芷

雄黃

蒼耳子

甘草各半錢

右為細末用蟾酥汁和作錠子如前法用須五月五日合

回瘡錠子 治疔瘡大効

草烏頭一兩 蟾酥七粒

巴豆七箇 麝香一字

右為細末麪糊和就捻作錠子如有惡瘡透丁不痛無血

者用針深刺至痛處有血出以此鏡子紐之上用膏藥貼之疔瘡四畔紐之其疔三二日自然拔出此藥最宜緊用此證大抵與傷寒頗類其中亦有可針鍊砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也

日本國傳治疔瘡塗方

巴豆十粒 半夏一枚 附子半枚 蟻蛭一枚

右各研爲末以人糞相和者瘡大小作紙圈子圍瘡口以藥泥瘡上綸貼之一日三易

五聖散 治疔瘡

皂角針二兩 瓜蒌一箇 大黃 金銀花

生薑 甘草各一

右咬咀用好酒二升同煎至八分去滓不拘時溫服又方以織衣末用人乳汁和傳之立可

玉山韓光方

治疔腫

右以艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和石
灰如麩漿以針刺瘡中至痛即點之點三次其根自拔亦
大神效正觀中用治三十餘人得瘥

蟾酥膏

治疔瘡

右取蟾酥以白麩黃丹搜作劑丸如麥顆狀用指甲搗動
瘡上挿入重者針破患者以一粒內之仍以水沉膏貼之
水沉膏

右以白芨末半錢水盞內沉下澄去水却於皮紙上攤開
貼在瘡上

治一切疔腫懸癰

右用蒼耳根莖苗但取一束燒爲灰醋泔藍靛和如泥先
以針刺瘡上及四邊數下令血出度藥氣可以入針孔中

即去血傳藥乾即易之不過數度即拔根出其未結膿者即內消也已結膿破潰者再不用針刺只以藥塗之餘以葱口角上生疔腫造其子板家母為貼藥經十日不瘥餘以此藥塗之得愈常作此藥以救人無有不瘥者故特以傳後嗣丁腫方殆有十首皆不及此雖齊州萊姥方亦不能勝此物造次易得也

治一切疔腫

右用蒼耳草又名羊負來草只用根紅嫩者搗爛無灰白酒調勻服次用鹽梅肉研爛以猪膽汁和塗瘡頂上其毒即散又先用好京墨以薑汁研爛用薑片蘸墨塗四圍腫熱處即効一方用蒼耳根菜童子小便絞取汁令服一升日三或燒灰和臘月猪脂傳一方用苗葉梅汁飲之一方川子或葉或根研爛以米醋調塗腫處立散仍研汁服

以瘡爲度

治疔瘡

右於九月九日採芙蓉花葉陰乾研細用時以井花水調銀錢打成膏厚紙攤貼瘡上次日用蚰蜒螺即鬼丁螺一箇用銀器盛打破依前調藥却將蚰蜒螺放在瘡上貼待過週日揭起其疔自出立効其藥不要攤潤

治疔瘡

右用多年牆內或泥土中秀釘洗淨以炭火內煨紅醋淬待冷用刀刮釘秀又入火內煨紅入醋淬仍前刮末再煨再淬再刮下末研爲細末用時將瘡口撥開挑藥末在內以湯藥貼之少時如病深取疔如病淺即取出黑紫色血其瘡自愈

飛龍奪命丹 治一切惡疔瘡

半夏洗淨

珠砂

商星

洗淨

名

人言

二末

黃丹

血竭

乳香

沒藥

蓬砂

硃砂各二

巴豆

去殼

二粒

斑蝥

去翅

麝香半分

右為細末用酒陳汁和為丸如紅豆大五分中一分加碎
猶二箇人言少許為成錠子如半粒小麥大凡遇瘡針破
見血下錠子一粒以飯粘白紙封護用藥一丸窩在舌上
覺麻冷水吞下忌熱物片時重者隨服藥不必盡劑衝痛
即止一伏時黃水流為病源先奔後疾先寒後熱如傷
寒病狀忌房事并諸毒物魚腥凡病人眼見紅火光者
治如蟾酥乾用些兒乳汁化開為度

立馬回疔奪命散

治疔瘡及喉痺乳鴉腫痛大効

杜蠟

當歸

牛勞子

白蠟

各半

大黃 一兩

右咬咀每服半兩用青石磨刀水酒各一盞煎去滓連進
二服疔瘡服後出汗者生無汗者死

治疔走了黃疔衰將死者

牡蠣

大黃

山梔子

金銀花

木通

連翹

牛勞子

地骨皮

乳香

沒藥

皂角刺

瓜蒌

右各等分剉碎每服半兩氣壯者加朴硝用水一椀酒半
椀煎一服定愈救命仙方也

芫花根膏

治魚臍疔瘡久治不瘥者

芫花根

二兩

黑豆 三合

猪牙皂角

五根

白礬

三兩 研細

右用醋一斗將前三味先浸三日於釜中以火煎至二升
去滓却入鍋中煎至一升入白礬末攪令勻去火成膏但

是魚臍丹惡瘡，雄於帛上貼，日二易之。

治魚臍疔瘡

韭菜

連翹葱

絲瓜葉

右八石鉢內搗爛，如泥以酒和服，以滓貼臍下。如病在左手，貼左腋，右手貼右腋，下在左腳貼左臍，右腳貼右臍。如在中貼心臍，通用布帛縛住，臍內下紅線處皆白，則可。如有潮熱，亦用此法，却用人拖住，恐其顛倒，則難救。

治疔瘡陰證，脉沉四肢冷，瘡不發。

右用五香散，去大黃，加蒼耳、蓮肉、酸棗仁、藿香、茯苓、黃芪、肉桂、當歸、防風、白芷、附子、生薑、半水、半酒煎服，以發藥性。如潮熱皮膚受毒，加生大黃、莖胡、地骨皮。

如嘔逆脾胃受毒，加丁香。

如喘嗽肺經受毒，加杏仁。

去皮

知母、桑兌、紫苑。

如眼花心經受毒加硃砂雄黃麝香

如脚冷腎經受毒加木瓜牽牛炒

如身渴自汗肝經受毒加黃芩山梔

如大小便秘腹脹滿加枳殼炒木通苦葶藶大黃生用

治疔瘡陽盛潮熱心間霍亂或瀉語六脈洪大

右用五香散熱不退而渴用不二散蛇床子大黃生為末

以冷酒或冷水調二錢止二服便微利

救生丹 治諸種疔瘡服內火光出昏迷不醒

右於三月辰日採桑葉葉葉用竹針穿成孔用紙裹風內

陰乾至端午日研為細末用蠶酥和為丸如小豆大用時

再以雄黃同藥一九研細放右中汗出効

腫脂散 治疔花瘡

腫脂 具

胡粉各一 蓬砂

沒藥各半

右研細先以溫漿水洗拭後傳藥

甘草塗傳方 治反花瘡

甘草半生

礬石灰

人中白

蜜陀僧各半

右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篾攪成膏
取塗瘡上日五次

惡實根塗傳方 治反花瘡並諸瘡積年不瘥者

惡實根

研末四兩猪脂二兩

右調和如糊塗瘡上日三四次

升麻湯 治心有風熱生浸滂瘡偏體

升麻

大黃剉微

黃芩去黑心

枳實麸炒

芍藥各一

當歸切焙

甘草炙各半兩

右剉碎每服五錢七水一盞半燈心一握煎至一盞去滓

空心溫服

香攤瘡方

治面上耳邊生浸漉瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荆芥

乾棗去核各

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油調塗先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効亦治大人小兒兩吻生瘡

鷄冠

血塗方

治卒得浸漉瘡不早治則透身周匝能殺人外

蓋云浸漉瘡轉廣有汁多起於心

右以雄鷄冠上刺血塗傅日三五度

猪骨膏

治諸瘡口氣冷不瘥

猪筒骨

二箇取髓

松脂

二錢通乳香

另研

黃連

去鬚

白芨

研末各

鉛丹

別研

黃蠟

各半

右搗研熔蠟和爲膏不拘時傅之

乳香膏

治諸瘡痛久不瘥

乳香

另研

食鹽

松脂

杏仁

去皮尖研

黃蠟

三兩

生地黄

取汁

白羊腎

脂

半斤

右先熬脂令沸下杏仁地黄汁蠟煎候蠟熔盡八香鹽松脂煎以柳單攪令勻稀稠得所礪盒盛傳瘡上日三二度

雄黃散

治冷瘡暖瘡口

雄黃

研

百合

乳香

黃蘗

灸去

墙上爛白蠅子

小蜂蝎子是各一合

右爲紙末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭乾傳之

附子散

治冷瘡日夜發歇疼痛

附子

半兩炮

去皮麻川椒

去目

雄黃

細研各一分

白礬

三分火

膩粉

二錢

右爲細末研勻每用清麻油調傳瘡上日二換

黃芪湯 治諸瘡退風熱

黃芪 剉

黃芩 去黑心

麥門冬 焙去心

芍藥

甘草 炙剉各

生地黄 四兩

半夏 薑製半兩

當歸 切焙

大黃 剉炒

石膏 碎

芫花

人參 各一兩

右剉如麻豆每服五錢七用水一盞半竹葉七片煎至一

盞去滓空心溫服日兩拜服

白羨藜散

治熱毒瘡癩痒心神墮躁

白羨藜 剉去

白蘚皮

方虱 去蘆

川大黃 剉炒

赤芍藥

梔子仁

子芩

麥門冬 焙去心

玄參

桔梗 去蘆

前胡 去蘆

甘草 炙赤剉各一兩

右爲細末每服二錢食後用薄荷湯調服

家陀僧散

治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

家陀僧

雄黃

雌黃

定粉 各半兩

膩粉 三錢

右研為細末先用柳枝一握生甘草一两槌碎以漿二升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之

白金散

治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼癢出黃水

右用桂府滑石為細末先用虎杖甘草詭豆各等分約半兩許二椀煎上項藥至一椀去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上搽滑石末令通身便睡至明決愈

玉粉散

治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉 一兩

蛤粉 九兩

白石脂

白龍骨

石膏 各半

滑石 八兩

寒水石

燒通赤於淨地上故冷出火毒一兩

粟米粉 二兩

右為細末研勻每用此少乾察患處

七寶散

治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荊芥穗

地骨皮

木通 醑二

白礬 一兩

右為齏末每用藥一兩水三大椀煎五六沸瀝去滓稍熱淋滌患處拭乾避風少時束垣老人云此方城北獨柳店之客舍有推江軸者皮膚皴裂不任痛兩手不能執棘足不能履地而輒止宿因製此藥與傳之即効明日遂行自此累用屢効

赤石脂散

治瘡子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂

細研

黃蘗

去粗皮剉

臘茶末

各半兩

白麩

二兩

龍腦

半錢

右為細末研勻每用時綿搥撲之

龍腦粉方

治瘡瘡痒痛

龍腦

一錢

粟米粉

五兩

右研細末先用棗葉湯洗後以綿搵撲之

玉女英

治癩瘡痒痛

滑石

半兩

研

棗豆粉

四兩

微炒

右研勻以綿搵撲之一方有棗葉一两

棟花粉傳方

治癩子癢痒

右用若棟花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許

研勻日頻傳之

治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡

右以膩雪水和蛤粉傳之立瘥

皂子散

治水毒入瘡腫痛或刺入骨者

皂莢子

七枚

大蝦蟆

乾者一枚

胡椒

十五枚

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每

用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾搽藥次以別膏藥貼之良

又水盡出有刺者即自見

鉛丹散 治破傷入水腫潰不愈

鉛丹

蛤粉等分

右同炒令變色搽瘡口上水即出漸愈

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血血風斑圓

點開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹

當歸

瓜蒌根

主乾地黃

荆芥

黃芩

赤芍藥

麥門冬

瞿麥

木通

牛旁子炒

山梔子

防風

川芎

粉草各等

右咬咀每服四錢水一盞半燈心二十莖煎至八分去滓

不拘時服

秦繅蛸散 治諸惡瘡

桑螺蛸

地龍

貝母

黃蘗各一兩

號丹一兩

乳香一分

粳米粉二錢
麝香半錢

雄黃

輕粉各一

右為細末以新汲井水和沙糖調傅

洗瘡藥 治諸般惡瘡

貫衆

川芎

茵陳

地骨皮

荆芥

獨活

防風

地扁蓄

甘草各二

當歸三錢

右以咀水三椀煎三沸去滓通手洗之

故苦黃芪散 治諸惡瘡癰疔

黃芪

當歸

芍藥

瓜蒌根

甘草各一兩

瓜蒌一兩

金銀花二兩

熟地黃不拘

皂角棘為引

右吹咀每服半兩無灰好酒一升同引子裝入磁瓶內瓶
頭用筍葉封將瓶坐於鍋內上以火盆覆鍋口盆外以黃
泥封之勿令出氣煮三外開藥香為度取出瓶澄定飲清
將藥滓再添酒一升依前煮服若酒少者酒水各半煮服
瘡在上食後臨卧服在下空心服此藥治病萬無一失神
驗如谷應聲常於五月五日脩合

托裏金銀地丁散 治諸惡瘡腫毒疼痛服之如神

金銀花

黃連

當歸

紫花地丁

赤芍藥

黃芪

人參

甘草節

桔梗

大黃各半

乳香

白檀香

沒藥

連翹各三

子芩

梔子仁

玄參各二

麥門冬

去心前胡

甘草各一兩

右吹咀每服五錢水一盞酒一盞煎至八分去滓隨病上

下溫服

紫花地丁散 治諸惡毒瘡腫疼如神

紫花地丁 當歸 大黃 赤芍藥

金銀花 黃芪各半 甘草節二錢

右咬咀每服一兩用水一盞酒一盞同煎至一大盞去滓

隨病上下服

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨 虎骨 龍骨各一 寒水石半斤

白石脂 赤石脂 白欬各半 黃丹少許

右入白芨半兩同為細末量瘡大小敷貼

洗藥

白芷 荆芥 姜蕤 何首烏

茯苓 苦參 川芎 白牽牛

防風

薑荊子各一

右為細末用漿水四椀煎五七沸臨卧時洗淨塗後藥

塗藥

輕粉

白礬

舶上硫黃各等

右為細末用酥油銅臨睡塗三次

增益四物湯 治一切惡瘡

川芎

當歸

芍藥

地黃

防風

荊芥

甘草各等

鳳尾草各一

右剉碎每服三大錢水一盞半煎八分去滓食前溫服

龍葵散 治諸惡瘡多出膿水不乾

龍葵各一

景天各一

黃連去麩

天靈蓋各一

龍骨

木鼈子

乳香

黃蜀葵花各半

右為細末入膩粉少許蜜調隨瘡大小紙攤貼之

萬寶代針膏 治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用針刺膿此藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏藥膿即自潰此秘妙良方

蓬砂

血竭

輕粉各一錢半

金頭蜈蚣一箇

蟾酥半錢

雄黃一錢

片腦少許

麝香一字

右為細末用蜜和為膏者瘡有頭處用小針挑破以藥些小在紙花上封貼次早其膿自出如腋下有要核見各暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌鷄羊魚酒麪等物喫白粥三日為妙

神效方 治一切惡瘡醫所不識者

水銀

黃藥

黃連

松脂黃明

威粉

土蜂窠

青壁土者南方多有之或云關嶺窠甘草各等分

右將水銀放掌中以唾津熬為泥入磁器中以生麻油和

研生絹濾如棉錫和藥末再研如稠錫先溫水洗瘡帛拭
乾塗之一切無名瘡塗一次即瘳有黃水者塗之隨手便
乾痒不堪忍若塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳
破傳藥

拔毒散 治諸惡瘡消腫去毒

天花粉

無名異

黃蘗

黃芩

木鼈子

大黃

杜蠟各等分

右為細末好醋調敷貼立効

烏金膏 治一切惡瘡

桑枝

槐枝

榆枝

枸杞枝

桃枝

柳枝

右各長一尺粗如小指俱一寸截劈四破用油四兩炒令
焦黑濾去滓入鉛丹半兩蠟一兩復熬令黑色傾在磁合

內候冷以新汲水浸出火毒用塗瘡

熊膽膏

治一切惡瘡

熊膽

研一錢

膩粉

半分

雄黃

研

麝香

研各半錢

續柳

研一

右研勻於蠟日用續柳脂一箇取汁和藥仍入在膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑燭熏過黑掛於陰處如惡瘡有指面大者用如黍米大貼之如錢大者用如菜豆大貼之恐藥乾難貼薄以唾調如稀糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不可多用

錢子

治惡瘡透不覺疼痛

銅綠

一兩

桐砂

二錢

煨酥

一錢

右為細末軟米飯一盞攪勻操作錢子如粳米樣每用針刺之不覺痛者但有血出紐一錢子在內以膏藥貼之或

作散以紙擦藥紙之

治蛇頭瘡 其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇口之狀痛而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蠍各一

右為細末者瘡濕癢開入藥搽在瘡上却以小油抹裁帛栓住如乾小油調搽

一切惡瘡及沙虱水弩甲疽疼痛不可忍者

右用蟻蛭十枚端午日收搗為細末以油調傳之即易一方取末以益水調塗四圍如進葉潤一方用蟻蛭二枚取腸肚安在紙中心四面以醋糊貼瘡上

乳香散 治遠年惡瘡

乳香

膩粉各半

黃蘗皮去粗

龍骨

大黃各

膏香一字

右為細末先以若竹漚洗盡拭乾

上

水銀膏

治月蝕

多在兩耳上及巖傍隨月盈虛

黃連去鬚為末

水銀一分

胡粉研

松脂

各半兩

右先熬猪脂令沸下松脂諸藥末及水銀槐令勻磁盆盛

先以盞湯洗淨

治臙瘡方

鼠糞

苦參

桃枝

杉樹刺

柳枝

松枝

麩醬

鷄子殼

皂角

雀糞

芍藥

木綿子

芝蔴

桑枝

蛇殼

鍋底煤

必當歸類

松明不拘多少

右件各四錢俱為細末先將松明槌碎和諸藥於瓦銚中

掘一地坑將藥銼安坑中四圍用火焚焙取出再研令勻
傳者自然痊可忌一切發熱物

隔紙膏 治內外癰瘡

當歸

白芷

黃連

五倍子

雄黃

沒藥

血竭

海螵蛸

白芨

白欬

黃蘗

厚朴半斤 杜松

黃丹

六分

乳香二分

輕粉一分

右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥傳瘡上鋪帛

縛定有膿水解開刮去不緊再貼藥如此數次即愈須先

用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾然後貼藥

治膿瘡久不愈

龙骨二分

輕粉少許

檳榔半兩

乳香

沒藥各一分

乾猪糞半兩

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清油調傅瘡
濕則乾搽之

治瘰癧下注

白石脂

龍骨

各半

白礬

一斤

五倍子

二斤

黃丹

三斤

雄黃

少許

右為細末先將葱薑湯洗瘡見赤肉然後將前藥傅瘡上
用藥如法厚者却用帛子包縛看不要動直候乾自脫去

瘡皮

治瘰癧

黃丹

輕粉

白芨

樟腦

敗船灰

各等分

右研細末以桐油調成膏攤在油紙袋內先煎溫葱湯洗
淨以帛拭乾將藥置瘡上扎住用了一面番轉如前洗貼

一方無輕粉若用糞船灰亦妙

治膿瘡方 唐武子年三十歲時曾患此用之屢効

白芨

白欬

黃藥

黃丹

另研各等分

右為極細末入輕粉些少研勻以煉蜜和成劑捏作餅貼瘡上脈者填滿以帛片包扎一日一換后来瘡漸乾或有裂處只須乾搽以瘡為度

驅蹄散

治腎歲風毒下注生瘡

驅蹄

二十片燒灰

蜜佗僧

一分

輕粉

七

麝香

半

右研極細末以帛拭去膿用些少乾搽日三四次瘡

翠玉膏

治膿瘡

瀝青

一兩

銅綠

研

黃蠟

各二

乳香

研

沒藥

研各

右將銅綠以油調勻將瀝青火上熔開下紙燒勻次入乳

沒末仍攪勻傾在河水盆內拌勻以油紙裹口嚼旋捏作餅子貼瘡以緋絹包直候瘡好其藥自脫

治血注脚

桑樹蕨

牛屎蕨

又名石灰蕨生地上如有石成塊者碎其中有灰起

肥棟樹蕨

胎髮

男用男女用三箇

右將三蕨焙乾各五錢胎髮燒灰存性三錢並為細末研勻濕則乾搽乾則清麻油調塗

治膿瘡方

冬青葉

臘猪膽

百草霜

二柴和勻

右將冬青葉與本人嚼爛先以葱椒湯洗淨瘡口以膽霜傳後却傳嚼藥在上三四次即可

奇妙抱子散

治逐年日久內外膿瘡

山梔子

不拘多少麩作灰研極細末

乳香

另研各輕粉

少許

石研勻以磁器盛每用時先以葱白花椒煎湯洗淨瘡指
歇再以溫漿水又洗一次候惡水去盡再將白水煎石沸
候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又用粉帛片拭
乾然後傳藥如乾者香油調溼者乾摻但將瘡口實滿
軟絹帛護之堅硬不作膿者未可用腫如軟有膿者依前
法再洗後傳貼之三二次即愈乃一藥二洗之功也

治足瘡方

趙子固母劉氏年八十左足兩一瘡下連大指上

延林蹠以至膝骨每歲輒數發發必兼旬累月昏暮痺甚
抓搔獲時出血如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已
明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十
餘年淳熙甲辰仲冬之末先生為太府丞一夕母病大作
相鑿悲泣無計因極就睡夢四神僧默坐一室傍有二長
榻子固亦坐因而發嘆一僧問其故子固答之以實僧云

可服牛黃金虎丹又一僧云硃砂亦好既覺頗驚異錢取藥半粒強服之良久大痛舉家相相泣且悔俄而下福硃物如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成痂自此速愈硃砂之說竟不復試先生因圖僧像如坊夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞所用牛黃龍腦麝粉金箔之類皆非老人所宜今乃取奇効意熱積臟腑而發於皮膚藏久根深未易洗滌故假涼劑以攻之不可以常論也神僧之夢蓋孝感云

牛黃金虎丹

牛黃

兩半

研二

龍腦

五兩

研

膩粉

五兩

研二十

雄黃

五兩

研一百

白礬

括過二

金箔

八十片

天雄

炮去皮

研

研

研

研

研

天南星

湯洗焙二

子焙乾如無牛膽

即用酒蒸七

宣

研

研

研

研

研

天竺黃

五兩

研二十

研

研

研

研

研

研

研

石鹽細末煉製搜和每一兩半作十九以金箔為衣每服
一丸新汲水化下有孕婦人不可服

治腫瘡方

右用鱈魚數條黃色者尤佳打死先用油塗其腹下置瘡
上盤屈令過帛子繫定食頃覺瘡痛不可忍然後取鱈魚
看接下有針眼大竅子皆虫也如米盡再以數條依上再
縛待虫去盡却用死人脛骨燒灰麻油調傅瘡上或以骨
灰一兩入好茶末二錢同調亦可

治腫瘡方

右先以蔥白菜水燙洗淨瘡口絹布拭乾徐以輕粉末
搽上瘡口却用五靈脂黃蘗各等分碾為細末凉水調貼
敷瘡上紙蓋定二五次即平復

治湯火傷

大黃

黃芩

黃連

山梔子

黃蘗

知母

貝母

蜜陀僧

乳香

沒藥

輕粉

甘草各等分

右為細末用鷄子清加蜜調不住手時、掃之

清涼膏

治湯液火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁

黃連去鬚

白芷各一分

生地黃二兩

葱白對葷

黃蠟半兩

清麻油四兩

右細剉於油鑪中煎地黃焦黑色綿濾去滓澄清却於鑪

內入蠟漫火熬候蠟消傾於磁盆內用時以鷄羽搨少許

塗瘡上以麩為度

磨子膏

治火燒人肉爛壞

麻子仁一合

相白皮

柳白皮

山梔子

白芷

甘草各二

右剉細以猪脂一斤煎三上三下去滓以塗瘡上日三
黃蘗散 治湯火傷

黃蘗

大黃

朴硝

鷄子殼

寒水石各等分

右為細末用水調塗極效

止痛膏 治炎瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅癢

松脂

羊脂

猪膏

黃蠟各一分

右取松脂破鉢中切脂嚼蠟膏松明上坐瓊鉢內燒諸物
皆消以杯盛汁傅之松明是肥松節也

神效當歸膏 治湯火瘡初起癩癧熱毒侵展焮赤痛毒氣壅

盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止痛

當歸

黃蠟各一兩

麻油四兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化放冷以

磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白朮

栢葉散

治湯火傷

栢葉

梔子仁各一兩胡粉研半兩

右為細末以羊髓五大合熔化和藥以木椎研三五百遍一日三次塗之差

蛤粉散

治湯火傷

右以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生油調如膏傳之如水仍無痕一方以蜜水調傳之瘡方止不膿不瘳吳內翰居卿中隣家釜翻一小兒自頭至踵皆傷急以傳之啼立止遂無恙唯綿傷隨手用即効少緩即不及當預先合以備用耳

紫雪

治湯火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡

右用松樹皮燒灰二錢澄青一分研為細末清油調傳濕

則乾糝忌冷水洗日三一方不用溼青以松樹皮陰乾為
細末入輕粉少許生油調傅如傅不住細帛縛定即生痂
治湯火燒瘡

右以側柏葉入臼中溫搗令極爛如泥冷水調作膏傅傷
處以帛子繫定三二日瘡當斂仍臧殼一方燒灰存性為
末以鷄子清調傅如乾再上或蜜調亦可或搗末以脂調
塗瘡上乾即易一方以山栢子葉爛搗塗傅

治湯火傷

右用霜后芙蓉葉桑葉等分陰乾研為細末用蜜調塗傅
之溫則乾瘡

鷄黃油 治湯火傷

右用鷄子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒直待都
化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙為末香油調傅

原缺

川大黃 二兩 慎火 草 五兩

右各搗空之乾即再換

治遊腫流漏身赤色入腹即死方

右用生猪肉傅上數數換之其肉虫烏俱不食矣惡甚也

玄參散 治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢疼痛

玄參

甘草 半兩 生劉各 石膏 二兩

麥門冬 三分

前胡 去蘆

枳實 麩炒

人參 去蘆

赤芍藥

黃芪

赤茯苓

芎藭

生乾地黃

黃芩 酪一

右咬咀每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥一百粒

煎六分去滓不拘時溫服

生地黃散 治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生地黃 二兩

川大黃 劉 川升麻

地骨皮

當歸剉碎

黃芩

木通

赤芍藥

黃芪

玄參

甘草生

赤茯苓一兩

右為散每服四升水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

連翹飲

治癰腫瘡痂疥癩

連翹

防風三兩

蒼朮

白芍藥

黃芩

去黑心

玄參各二兩

人參

白茯苓去黑皮

桔梗

剉碎

前胡去蘆

甘草炙

黃芪剉碎

桑根

白皮剉碎

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日二

內消散

治癰腫結硬疼痛

人參去蘆

瞿麥

白欬

川升麻

當歸剉碎

黃芩

防風

黃芪剉碎

沉香

甘草 生剉各一兩 赤小豆 剉一合

右為細末每服二錢不拘時溫水調服

解毒散

治癰瘡始竟便宜服

犀角屑

川升麻

川朴硝

赤芍藥

木通 剉各一兩

石膏 二兩

玄參

麥門冬 去心

甘草 生剉各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

水澄膏

治癰腫

雄黃 水飛

麝香 各二

黃連

黃丹 水飛

黃蘗

大黃 各半兩

右為細末量所腫處用藥多少以新汲水半盞抄藥在內須臾藥沉澄去其滓者水盡然后用槐柳枝燒藥數百餘轉如麩糊相似勻以小紙花攤藥貼腫處更以鷄翎擦赤

水不住掃之

天南星膏

治風毒癰瘡

大天南星一兩

厚黃蘗

半兩

赤小豆一分

皂角

一挺不蛀者
燒灰存性

右為細末以新汲水調成膏皮紙貼之已結即破未結即

散之豈効

牡丹散

治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

牡丹皮

人參

天麻

白茯苓

黃芪

木香

當歸

川芎

官桂

桃仁去皮炒
各三分

薏苡仁

甘草

二分

右為細末每服三錢用水一鍾煎至七分食前溫服

梅仁湯

治腸癰裏急隱痛大便閉結

梅核仁四十九箇
去皮尖

大黃二兩

牡丹皮三分

冬瓜仁四兩
芒硝半兩

犀角半兩

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服以
利下膿血三兩行為度

大黃湯 治腸癰少腹堅硬腫大如掌而熱按之則痛其上色
或赤或白小便稠數汗出增寒其脉遲緊者未成膿如脉
數則膿已成

大黃剉炒 牡丹皮

硝石研

芥子

桃仁湯浸去皮尖雙
仁各半兩

右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利
下膿血為度未利再服

四聖散一名神效瓜蒌散

治腸癰疔疽生於腦鬚背腋乳便

毒服之神効

生黃瓜

去皮

粉草

浸藥

乳香

研末

右用好紅酒二大椀慢火煎至一椀分作兩服兩日服盡

大便順導惡物妙若乾瓜萋則用兩枚一方若病在上食後服病在下食前服毒已結成即膿化爲水毒未成即於小便中出痰甚再合服以退爲妙

桔梗湯 治男子婦人欬而胃膈隱痛兩脚腫蒲咽乾口燥煩

悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澁

桔梗

具母

當歸酒浸

瓜萋仁

枳殼

薏苡仁

桑白皮

甘草

防己

百合

黃芪

北五味子

甜葶藶

地骨皮

知母

杏仁各半兩

右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘時溫服咳者加百藥煎熟加黃芩大便秘不利加煨大黃少許小便澀甚加木通車前子煎煩躁加白茅根煎咳而疼甚加人參白芷煎

四順湯 治肺腑吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心

紫苑去苗

桔梗炒各一兩

甘草

炙剉半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去滓不拘時稍冷月如咳救甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減

治肺癰方

右用薏苡米爲末糯米飲調下或入粥內煮喫亦可一方

用水煎服當下腹血便愈

瓜蒌散

治便難等惡瘡

瓜蒌

一箇
去皮

金銀花

牛旁子炒各

生薑

甘草各半兩

右將藥不犯銅鈔器搥碎用酒一大升煎數沸空心溫服

微利為度

三物湯

治便難

牡蠣

大黃

山梔子各等分

右為末酒水一大盞煎七分露一宿空心溫服

治外腎癰瘡

抱鵝卵殼

鴛瓜黃連

輕粉各等分

右為細末用煎過清油調塗

治子癰

右用石解熱水磨服

有草膏 治水數道前後生癰謂之懸癰乃肛門及膀胱處生核子如橄欖樣或如梅李狀初不作痛至旬月漸熱不早治瘡潰膿血出日數碗有至腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李即破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣故兩服亦無害林院判京朝嘗患此疾已破服此藥兩服瘡即合甚妙

右用粉草半斤內用無節者四兩如筭子樣劈破取泉石間長流水以甘草入水中浸透以炭火將甘草蘸水焙炙以一椀水盡為度不可急性劈開却將所炙甘草另用泉水三盞無灰好酒五盞用瓦罐煎至三之一如膏一起服

之立愈另用有節甘草四兩仍用泉水隨罐大小煎湯
洗患處三遍其効如神水冷再溫洗

貫衆湯 治附骨癰生股上伏肉間淋滌方

貫衆

地骨皮

藪精草

枇杷葉

拭去毛

荆芥

去梗

蜀椒

去目并合口
者谷一兩

右搗篩以水三升煮取二升和滓淋滌蘸布帛搨之

當歸散

治附骨癰及一切惡瘡

當歸

半兩
甘草二兩

山梔子

十二

木鼈子

一枚
去皮

右為細末每三錢冷酒調服

密陀僧散

密陀僧

自然銅

各半

杏仁

去皮尖雙
七枚

右用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨候筒黃色
取出研極細者塞大小用藥以新汲水調勻用鷄翎掃塗

癱上甚者不過二七日効

內托黃芪柴胡湯 治附骨癱

黃芪 二升

柴胡 一升

羌活 半升

逆翹 三分

官桂 三分

黃藥 二分

生地黃 一分
土瓜根 一分
酒製

當歸尾 七分

右咬咀作一服水三盞酒一盞同煎至一盞去滓熱服宿食消盡服一服而愈昔賈德茂男年十歲丁未四月十一日於左腿近膝股內出附骨癱不辦肉色漫腫皮濇木硬瘡勢甚大其左脚乃肝之脾土也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左三部細而弦按之緩而微有力一方無黃藥

內托黃芪酒煎湯 治附骨癱

黃芪

當歸尾 各二

柴胡 半升

升麻 七分

連翹

肉桂

黍粘子

黃蘗

甘草半條

右咬咀好糯米酒一盞半水一大盞半同煎至一大盞去
滓溫服空心宿食消盡服之待少時以早饑壓之使不令
大熱上攻中上二焦也丁未季春二十二日蒲虔主老羊
七十因寒濕地氣得骨痿於左腿外側足少陽膽經之
分微侵足陽明分闊六七寸長一尺堅硬漫腫不辨肉色
皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一服立止再
日堅硬腫消

犀角湯 治石癰熱毒三盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角鎊

木香分三

連翹

梔子仁

射干

當歸切焙

升麻

赤芍藥

玄參

枳殼炙炒

甘草分三

大黃二

右劉碎每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服
黃連散 治石癰結硬發熱紫赤色毒氣攻衝未定日夜疼痛

宜用此消腫化毒止痛

黃連

川大黃 生

白欬

馬牙硝

黃蘗 各一

麒麟竭

青蘘 各半

赤小豆 炒熟

杏仁

四十九粒湯
浸去皮尖新

右為細末蜜水調塗乾即易之

大黃散

治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣腸

川大黃

一兩

川芒硝

黑豆皮

枳殼 去穢炒

牛蒡子

微炒 當歸

芫花 各一

甘草 生剉

右劉碎分作三服每服水半盞煎至五分去滓不拘時溫

服以利為度

治石癰堅如石未作膿者

右用生商陸根不拘多少熟搗傳之乾即易取軟為變及
治溫漏諸癰癤羊城人用此方取効者多

芍藥湯 治胃皖積熱結聚為癰

赤芍藥

石膏

犀角 各

麥門冬

蒼朮

木通 各二

朴硝

升麻

玄參

甘草 生 各

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓不拘時溫服

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黃 細研

黃蘗

檳榔

川大黃

麒麟竭 各三

麝香 研

黃連 各一

白芷 二分

木香

芍藥

桂心 各半

當歸 三分

右為細末用臘猪脂調令勻塗於綿上貼臍處候膿潰后

即用膏藥搜膿生肌

玄參散 治癰腫成腫水不能下食心煩口乾煩渴飲水多四

脈羸瘦

玄參

黃連

去鬚

五瓜根

麥門冬

去心

赤芍藥

白芍皮

各一兩

升麻

三分 川大黃

剉炒

火麻仁

川朴

各一兩半

右剉碎每服三錢水一中盞入生地黃一分細切同煎至

六分去滓不拘時溫服

葛根散

治癰腫熱盛口乾煩渴或時乾嘔

葛根

黃芩

升麻

麥門冬

去心

瓜蒌根

赤芍藥

梔子仁

生地黃

剉

黃芩

三分

甘草

生用 半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

沉香散

治癰膿潰已絕肌肉內腫尚有餘熱

沉香剉

柴胡去苗

黃芪

麥門冬去心

白朮二分

熟地黃二兩

黃芩

瓜蒌根

甘草

生剉各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五十粒煎至六分去滓不拘時溫服

人參散 治癰疽內虛不足

人參

白朮

白茯苓

枸杞子略

熟地黃

黃芪剉各

桂心

白芍藥

當歸微炒

甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

黃芪散 治癰潰后補虛去客熱

黃芪

石膏略

知母

麥門冬去心

白芍藥

白茯苓

桂心

熟地黃

人參去蘆

川升麻各一兩

甘草炙

各半兩

右判碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日三四服

猪蹄湯 治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用此湯洗

香白芷

不見火

黃芩去心

赤芍藥

露蜂房

取有蜂窠者

當歸去蘆

羌活

生甘草

各等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將豬蹄前蹄

兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次盞去面上

油花盡下面滓肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火

煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫上徐薄攤瘡上死肉惡

血隨洗而下淨洗訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有

狐臭人并月經見行婦人猫犬並不許入病人房洗瘡切

勿以手觸着此疽之方所傳甚多唯此方極効其用露蜂房有理蓋以毒驅毒也

去水膏 治癰疽破穴后誤入皂角水及諸毒水以致寒痛

糯米粉 砂糖各三 甘草一分

右為膏攤在絹上貼毒水而出驢馬及尿糞一切毒水並

皆治之

麥門冬湯 治癰疽潰后膿水不絕

麥門冬 去心 黃芪 剉 五味子 炒 白茯苓 去黑皮

人參 去蘆 官桂 去粗皮 當歸 切 遠志 去心

芍藥 各一 甘草 炙三

右攷咀每服五錢水一盞半入生薑半分劈碎大棗二枚

穿破同煎至一盞去滓空心溫服

清水膏 治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔潰腫抽熱

毒散腫氣

羊桃根

川大黃

黃芩

豇豆粉

黃蘗

各一兩

赤小豆

右為細末用芸薑菜取自然汁入蜜少許相和調藥令稀稠得所即看四畔腫赤處大小煎生絹上勻攤可厚一錢貼之乾即易

水調膏

治癰疽毒熱赤嫩疼痛

川大黃

生用未研杏仁去皮

藍花各三分

方為細末研勻以新汲水和令稀稠得所旋即塗腫上乾即易之

乳香丸

治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍

乳香

別研

沒藥

別研

五靈脂

獨活

各三錢

川芎

當歸

真桑豆粉

交趾桂

川白芷

白膠香各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯送
下手足損痛不能起者加草烏用木瓜盞湯細嚼下

隔薑湯

治疔作後二日服此退毒下膿可與五香連翹湯相

間連日服之

漏蘆

有白者

連翹

大黃微炒

黃芪

去蘆生用

沉香

各一兩

甘草

生用半兩

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚煎湯食

前調服

四虎散

治發疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星

草烏頭

半夏

生用

狼毒

各等分

右為細末醋蜜調傅留頭出氣

沉香湯

治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不得卧

沉香

防風去叉

水香烙三

麥門冬去心

當歸切焙

枳殼麩炒

獨活去塵

羚羊角屑

升麻

玄參

地骨皮

赤芍藥

甘草

生剉各一兩

大黃剉炒

右剉碎每服四錢水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

漏蘆湯 治附骨疽

漏蘆去蘆

升麻

連翹

麻黃

去根節各一兩

防己

木香

白斂

沉香

各二

大黃

剉炒一兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七斤煎至七分入芒

硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服

應痛丸 治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮去皮

當歸

黑牽牛

草烏頭炮各一兩

右為細末醋糊為丸如小豆大每服三十丸空心醋湯下
丹砂膏 治療疽

丹砂細研

射干

天黃剉炒

犀角屑

前胡去蘆

升麻

芎藭

黃芩去黑心

沉香

木香各一兩

生地黄二兩 麝香研分

猪脂半斤

右除丹砂麝香猪脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬
脂令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿絞去滓入丹砂
麝香末以枚抄心攪勻玆盒盛傳急處日三五上又取棗大
以溫酒調空心日午服一方溫水調下半匙

枳實湯 治療疽

枳實

升麻

射干

熟地黄

黃芩

甘草

前胡三分

大黃一錢

犀角六分 麝香二分

右咬咀每服以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝香分三服

射干散 治瘰疬皮肉中忽生點子如麻豆大或如桃李腫痛

不可忍

射干

川升麻

枳實炒

川大黃剉微

甘草

生用各一兩

麝香細研一分

前胡去蘆一兩半

羚羊角屑三分

右剉碎入麝香令勻每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服

防風湯 治風毒中人留血脈不散與榮衛相搏結成風疽身

體煩熱昏冒腫痛

防風去叉

柴胡去苗

白芷

麻黃去根節煎

木通剉

當歸切焙

羌活去蘆

附子炮去

桔梗炒

甘草炙 各兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後
臨卧各一服如欲出汗空心併兩段後以熱薑稀粥投蓋
覆取汗慎外風

海桐皮散浸酒方

治熱毒風結成疽腫痛不得安

海桐皮剉

五加皮剉

獨活去蘆

薏苡仁炒

防風去叉

乾蝎炒

杜仲去粗皮

牛膝去苗酒浸

生地黃三

右咬咀生絹囊貯以好酒一斗五升浸於磁瓶中密封秋
夏三日春冬七日取食前溫酒三合或四五合不拘時甚
者常氣相續

松脂膏

治頭瘡經年不瘥

松脂

黃連去鬚各

黃芩

苦參各

蛇床子

一分

大黃

白礬

各半兩

水銀

半兩

一兩

胡粉

半兩合水昆入山水

右為細末

研勻用臘猪脂調傳瘡上大効

貝母膏

治頭禿瘡

貝母

半夏生

南星

五倍子

白芷

黃蘗

苦參各二

鞣丹各半

雄黃

一兩

右為細末先以蜂房白芷若參大腹皮荆芥煎湯熏洗拭

乾即用蜜水調傳兩三次後乾慘藥

加味平胃散

治一切惡瘡頭上瘡

右平胃散入臙粉清油調傳之甚妙

鱧蛸散

治頭上生瘡俗曰粘瘡絕妙方

海鱧蛸

二兩

白膠香

輕粉各半

右為細末研勻先用清油潤磨后搽藥只一上可

沿頭極痒不痛生瘡方

鷄鳴膏五合

右以好醋和膏煮三兩沸日二三次塗之

搗礬散 治脚爛瘡

竹蛀屑 搗燒灰

紅棗燒存性

黃丹

白礬燒 韶粉

右等分為細末搽之

龍骨散 治脚疽并久遠惡瘡他藥不効者

白龍骨二斤半研 輕粉半斤 檳榔研一錢

獾猪糞不以多少新瓦上焙乾入火中燒令紅取出研為細末五字

右研和勻先以口含蘆水或溫盪湯洗令瘡淨凡肉却以

真麻油調藥隨瘡大小傅之未愈再傅三五日可

百草膏 治脚面惡瘡如相油浸透延漫及治一切惡瘡不問
乾濕痛痒日近年深百藥不瘥者

右用羊糞二三十粒留瓦上四畔炭火燒烟住火筋餅於
地上以盞覆存性羅城白灰研細以紗片篩去沙土麻油
調敷瘡入輕粉痛入麝香少許即効

神應散 治足大指角急為甲所入肉便刺作瘡不可着履靴
脚指濕爛婦人有此

右用礬石一物燒汁盡取末着瘡中令惡肉生好肉細細
割去甲角旬日即差一方加加黃少許同研搽之

治脚指縫爛瘡

右用鴉掌皮燒灰存性為末傳之

治男子兩足癢痒生瘡連年累月俗為腎風瘡宜服此藥

黃芪

牛膝各半

羌活

獨活

川芎

防風

木香

白附子洗一

白蔘煎一兩
去刺

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯

送下仍以後方藥傳之

搗搗

木香

防風

白芷一

白芨一錢

龍骨五分
另研麝香一分
另研

蛇退燒灰

臘粉計五

右為細末研勻先以鱧魚一條搥碎百部一兩切碎南椒

三銖油一兩煎令得所去藥只以油搽瘡口却傳末藥上

以油紙裹之三日一換每上藥時先用柳枝茸草煎湯洗

瘡淨拭乾傳藥

雄腦膏

治諸凍瘡久不瘥年年發歇先痒后痛然右腫破出

黃水及血出不止

雄雞腦

一兩

黃蠟

各等分

清油

燒半

右同於慢火上熬成膏去滓磁器盛每用塗瘡上

栢葉膏

治凍瘡手足指

欲墮

以耳欲落

栢葉

乾為末

杏仁

去皮研

頭髮

一握

食鹽

半兩

乳香

研分

黃蠟

一兩

油

一升

右先煎油沸次下煎五味藥待髮盡再下黃蠟撈勻磁盒

收先以熱小便洗瘡以綿拖乾後以藥塗即以軟帛裹勿

令寒氣侵入每日一換如瘡漸痊三四日一換

橄欖散

治脚凍瘡

右用橄欖核燒灰存性為末入輕粉油調塗

拔毒散

治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為發指撒骨疼痛

不可忍者

乳香

少許

泥蜂窠

壁間採

右爲末用醋調塗乾則以醋潤之痛立止

治惡指諺云天蛇頭

蜈蚣一條火

右以烟熏病指一二次即安

松脂膏 治肉刺

松脂 白膠香各一 黃蠟半兩

右於火上燃成膏冷貼用物繫定

無食膏 治肉刺

無食子 三枚 肥皂莢 一枚

右燒令烟盡細研以醋醋於砂盆內別磨皂莢如糊和末
傳之立効

薰硫散 治肉刺

薰陸香 石硫黃

蟾酥膏

右等分研勻塗肉刺上以燒釵烙之効
治肉刺

蟾酥

五牛湯

膩粉

一分

右將蟾酥於盆子中以膩粉同和令勻先用針撥破頭邊
然後塗藥裏裹之

蝦蟆散

治甲疽皮厚腫痛

蝦蟆灰

半兩

黃連

研末

膩粉

各半

蚌蛇膽

麝香

研

雄黃

研

白礬

各五分

鹿角

七寸燒令

熟細研

杏仁

七枚沙

黑

右研勻用臘猪脂調先以針刺破
取梔白皮煎湯洗瘡拭

乾傳藥以油紙外裹更以綿帛裹之三日其刺肉刺甲皆

當自落三日一換

白礬散

治男子婦人血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不瘥

苦勞肉暴疳疔疼痛出血不定用此藥肉乾瘡

白礬

石膽各半

麝香

麒麟竭

朱紅各分

右將白礬石膽於鐵器內以炭火煨過入後三味同研令細每用少許乾瘡瘡上以帛子纏定日兩三更換之

蛇黃散

治甲疽腫爛脚指甲邊勞肉出時瘡疔發又治嵌甲生入肉常出血疼痛

雄黃

生用

蛇蛻皮

燒灰存性一分

右同研細先以溫泔洗瘡上敷以尖刀割去甲角拭乾傳藥以軟帛裹半日許藥濕即易一日即除痛便止一方用漿水洗淨以棉刺撥破患處藥淋洗貼藥

雄蟬散

治瘡疔

雄黃通明

蟬退

三箇煎炙各為細末

右研勻濕者乾捺乾者用津入輕粉少許調塗
黃蠟膏 治冬月手足析裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎熔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘乾即用葉傳以紙貼之其痛立止入水亦不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火灸動桃棹不妨一方無五倍子治脚跟皸裂痛不可忍

右用五倍子為末同牛骨髓調破器盛埋地中七日取出填縫中即安

遇仙無比丸 專治瘰癧

白朮

檳榔

防風

黑牽牛半生半炒

密陀僧

郁李仁

湯泡斑蝥同炒去米不用

甘草五

上各

右為細末，麩糊為丸，如梧桐子大，每服二十九，早晚煎甘草橫柳湯送下，服至一月，覺腹中微疼，於小便中取下癥子毒物，有如魚目狀，已破者自合，未破者自消。

連翹湯 治馬刀瘡

連翹

瞿麥

大黃 三兩

甘草 二兩

右剉碎，每服五錢，煎服十餘日，可於鹽泥穴灸二十七壯，服五六十日，効一方加。

大黃

水通

貝母 各五兩

雄黃 七兩

檳榔 五兩

不用甘草

右為細末，每服二錢，食遠調服。

蝙蝠散

治瘰癧多年不瘥

蝙蝠 一箇

貓頭 一箇

右同燒作灰，撒上黑豆煨，其灰骨化碎，為細末，濕即乾，搽。

乾則油調停內服五香連翹湯効

白花蛇散

治九漏瘰癧發於項腋之間或痛或不痛

白花蛇

酒浸去皮
骨焙二兩

生犀角 二兩

牽牛 生一兩
半炒半

青皮

五兩

右為細末每服一匙入臍粉半匙研勻五更糯米飲調服

已時下惡物乃瘰癧之根也更候十日再服一服忌發風

熱毒物已成瘡者一日可効

四聖散

治瘰癧服白花蛇散轉利后服此調之末去其根

海藻

洗 石決明 煨

羌活

瞿麥穗 各等分

右為細末每服二錢米湯調下清水盡為度

螺灰散

大田螺

連殼燒
存性

右為細末破者乾貼末破者香油調停

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至

肩上或於肋下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頰或至頰
車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破乃流膿水
並皆治之即時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以煮料
之則可

知母

酒浸

黃柏

酒炒

瓜蒌根

酒洗

昆布

桔梗

半兩

上各

廣茂

洗炒

京三稜

酒洗

連翹

已上各

升麻

六分

黃連

白芍藥

葛根

已上各

當歸稍

柴胡

甘草

已上各

草龍膽

四兩酒

黃芩稍

一兩

半一兩

半生

右咬咀每服六錢水二盞先浸多半日煎至一盞去滓熟
服於臥處伸足在高處頭微低每噲一口作十次嚥至服
畢依常安臥取藥仕胃中停畜也

另攢半料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服一百丸或百五十丸此藥湯留一口送下更加海藻半兩炒

荔枝膏

治瘰癧

荔枝肉

兩輕粉

麝香

白豆蔻

川芎

砂仁各半

硃砂

龍骨

白竭

乳香各一

全蠍五分

右將荔枝肉搗爛軟米飯和為膏者瘡大小攤貼如有三五箇者止去點為頭者妙

治瘰癧

右先於瘡上灸三壯然後用藥漬作瘡口用新活鱧魚截長一指大批開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚鯢魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡蟲子后用欬瘡口藥

龍腦

乳香各一

麝香

粉雲

雄黃

輕粉各半

右為細末水糊為丸如小麥大每用一九二丸紐在瘡口
內覺腫痛是効

瞿麥飲子 治瘰癧馬刀並治

瞿麥穗半斤連翹一斤

右為粗末水煎臨卧服此藥經効多不能速驗宜持歲月
之久除也

治鼠瘻

猫兒頭一箇麝香一水

右為細末清油調傳

海菜丸 治瘰癧生於頭項上交接各蛇盤瘻宜早治之

海藻菜蒿麥白蠟蠶蘇蘇蘇蘇

右等分為細末海藻菜旋炒研篩湯包白梅取肉減半用
所泡湯為丸每服六七十丸食后服外米飲送下其毒自
大便內泄去若與淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦
治此病忌豆腐鷄羊酒麪日五六服

治瘰癧不問有頭無頭者

右用大蜘蛛五箇曬乾細研酥調如面脂日二度傅之蜘蛛
絲用屋簷頭結網者其他不可用

又方

用黃鰐魚破開入草麻子二三十粒在肚內以綿線定
於廁坑內放冬三月春秋二月夏一月取出洗淨用黃泥
固濟文武火煨帶性爛研為末香油調傅及治瘰癧

治瘰癧結核

黃芪七分

玄參八分

苦參

牛旁子

各九分

枳實

大黃

羚羊角屑

麥門冬

去皮各五分

連翹

人參

青木香

蒼耳子

升麻

茯苓

甘草炙

桂心

朴硝各四

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大以酒下十九日夜三四漸加至二三十九以知爲度忌生冷猪肉海藻菘菜生葱酢蒜陳臭等物

琥珀膏

治頸項瘰癧初發如梅子腫結硬強漸若連珠或穿

穴膿潰肌汁不絕經久難瘥漸成瘻疾並皆治之

琥珀

細研

丁香

木香各三

桂心半兩

硃砂

細研

白芷

當歸

木鱉子去殼

防風

去蘆

木通

各半

黃丹

七兩

垂柳枝

三升

松脂

二兩

麻油

一斤

去除琥珀丁香桂心硃砂木香爲細末餘藥細剉以油浸

一宿入鍋中以慢火煎候白芷焦黃漚出次下松脂末漚去滓再澄清油却入鍋中慢火熬下黃州以柳木篋不住手攪令黑色滴水中成珠不散者軟硬得所入琥珀等末攪勻磁器盛用時膏大小用火燻紙上勻攤貼

蜂房膏

治熱毒氣毒結成瘰癧

露蜂房灸

蛇退灸

女參

蛇床子

黃芪劉各三分

杏仁半一兩

亂髮鷄子

聖丹

蠟各二兩

右先將前五味劉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即綿濾更下蠟中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉出於磁盆中盛取此膏上一日一換

鷄鳴散

治氣癱疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者

牽牛一兩

胡粉一兩

大黃二兩

朴硝三兩

右為細末每服三次鷄鴨時并花水調服以利為度如未
利再服

祛風丸 一名何首烏丸

治風毒瘰癧

何首烏

乾薄荷葉

玄參

精羊肉半斤

皂角

三十餅用十根火燒發骨十挺塗
酥灸去皮十漚水投取汁去滓

右以皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服
二十九空心溫酒或薄荷湯送下 一方煉蜜丸無羊肉食

后溫水下

檳榔散 治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食

檳榔

前胡去蘆

赤茯苓

牛旁子炒各一

人參去蘆

枳殼去白

沉香

防風去蘆各

甘草剉分

右剉碎每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓
空心及晚食煎溫服

水紅花飲 治瘰癧腫核結硬不消及膿汁傍穿不瘥

右用水紅花不以多少一半炒一半生用粗槲篩每服二
錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨卧日三好酒調亦可

又方 治瘰癧已破未破或膿血淋漓其効如神

牡蠣不以多少用灰解焙上以三斤
火煨候炭盡取半斤為細末 甘草取末
二兩

右研勻每服二錢食后以建茗同煎日二服忌魚酒鮮醬
油薑海味等物

若下連翹湯 治瘰癧寒熱

射干 連翹 玄參 赤芍藥

木香 升麻 前胡 山梔仁

當歸 甘草炙略 大黃炒二

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓入芒硝少許食后
溫服日再服

瓜蒌子散

治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

瓜蒌子

微炒連翹

何首烏

皂莢子仁

微炒

牛蒡子

微炒 大黃 微炒

白螺殼

旋子仁

漏蘆

牽牛 微炒

甘草 生

右為細末每服二錢已食後溫酒調下

黑靈散

治漏瘡

牡蠣粉

號丹

硫黃 研各一分

露蜂房 別二分

右同炒令烟盡為細末入髮灰一分麝香少許和勻傅之

馬齒莧膏

治一切瘡

馬齒莧

陰莖 臘月燭燼

各等分一作臘月黑灰

右為細末以臘猪脂和先以溫酒清洗淨拭乾然后以藥

傳之日三

治漏瘡

右以五倍子末和血竭末塞之

治腸下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以益少許安白牛耳內然後取耳中垢以傳瘡上即瘥如不用益即牛耳不痒雜取垢

海藻丸 治癭瘤通用

海藻洗晒

川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白欬

昆布洗晒

明礬煨各

海蛤煨

松蘿各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後含嚥下

守瘻丸 治癭瘤結硬

通草二兩

杏仁去尖

牛旁子各一

昆布洗

射干

訶梨勒

海藻陸各四兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後嚥化日三

海藻酒方

治頸下卒結核漸大欲成瘰癧

右用海藻洗去鹹一斤酒二升漬一宿取一二合飲之酒盡將海藻曝干搗末酒調一錢七日三服差如浸用縮袋盛了漬春夏二日秋冬三日

木通散

治頸下卒生結囊欲成瘰

木通

松蘿

桂心

蛤蚧酥炙

白歛

琥珀

海藻洗

昆布洗各一兩

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

治忽生瘰疾及一二年

右用萬州黃藥子三斤頂緊重者為上如輕盃卽是他州者力心須加一倍以無灰酒一斗投藥在內固濟瓶口以

燉火燒一伏時待酒冷即令患者時時飲一盞勿令絕酒氣經三五日常把鏡自照覺消則停飲不尔令人項細也用火時不可多惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待經宿也已醱如神忌毒食

五寶元

菖蒲 二兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏 各一

神麴 三兩

羊靨 百枚

右搗細末以牛羊脂髓為丸如芡實大每服一丸食后及臨卧為化服

白頭翁丸 治氣瘕氣瘕

白頭翁

半兩 昆布 十分

通草

海藻 十分

連翹

玄參 各八

桂心 三分

白欬 六分

右為細末煉蜜和瓦如梧桐子大每服五丸用酒送下忌
蒜麪生葱猪肉

針砂方 治氣癭

右用針砂浸於水缸中一日飲食皆用此水十日一換針
砂服之半年自然消散

昆布散 治瘰氣結腫胃膈不利宜服

昆布洗

海藻洗

松蘿

半夏湯炮

細辛

海蛤細研

白欬

甘草炙各

龍膽草

土瓜根

檳榔酥二

右為細末每服二錢食后溫酒調下

治逆氣胃膈壅塞頸項漸癭宜服此方

商陸

昆布洗各

射干

羚羊角鎊

木通

海藻洗

杏仁湯浸去皮尖雙

牛勞子

一枚半

右吹咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時溫服

治瘰氣神驗方

琥珀

桔梗

各半

烏賊魚骨

昆布

洗各

赤小豆

酒煮

小麥

酒煮各

三分

右為細末煉蜜和丸如小彈大綿裹一丸常嚙燕津

水黃散

圓腫毒

羣角屑

大黃

白芨

草烏皮尖

白欬

麝香

朴硝

各等分

右為細末蜜醋調薄攤油紙上貼之稍乾揭下再添潤溫

貼之即消

外用潰毒藥

治諸腫毒堅硬不消

芥蘇

薑根

黍粘子

地骨皮

金銀花

黃花地丁

甘草各等分

若為瘡末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四畔熱用

冷則再煖

加沫消毒飲子

治疔腮腫

防風

荆芥

連翹

牛旁子

羌活

甘草各等分

右為瘡末水煎三兩服散毒然後用藥塗臃腫處切不可
便用藥塗毒氣入喉中不救

圓腫方

草烏

白芨

白欬

黃栢

朴硝各等

右為末用藥醋調圓腫外即便收起

丙托散 治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃

牡蠣各半

瓜蒌二箇山煎亦可

甘草三錢

右剉碎每服三錢水一大椀煎七分去滓溫服

無名腫毒或背疽治法腫圍定名鐵井欄

芙蓉葉

重陽前收

蒼耳

端午前收燒灰存性

右為末以蜜水調敷之

神効方 治疔腮及癰疽發背癰疔等證並皆治之

右以赤小豆為細末以新汲水調敷瘡上及四邊亦腫處

乾則再傳之

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫痛及鼻

額間連頭痛不可開口雖言語飲食亦相妨

犀角七錢

川升麻半兩

黃芩各三錢半

香白芷

白附子

川芎各半

羌活三錢

生甘草一錢

右以咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作三服一日一服訖其證必減如臟腑有些澹不妨足陽明胃經也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中脘羶五味無所不納如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熱飲食之毒聚於胃故此方以犀角為主飲食之毒陽明經絡環唇挾口起於鼻交頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙昔王公患此一經亦以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經故用有効

如水散 治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫血溢膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝焮赤熱痛

朴硝五兩

寒水石

蛤粉各三

白芷一兩

片腦

另研

右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以鷄翎塗掃不
令藥乾

治一切赤腫但癰毒結未成者並可消

右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得所將絹
帕子裹定旋把所餘汁撲腫所四畔數撲之

犀角飲

治諸風腫

犀角一錢

玄參

連翹

柴胡

去苗各半兩

升麻

木通

芒硝

生用

麥門冬

去心各一兩

沉香

檀香

射干

甘草

炙各一分

右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服
及夜食後各一服利多即減一名犀角湯無檀香

發風散

治諸瘡因風致腫

羌活

防風

白芷

吳茱萸

細辛

當歸

芍藥

羌花

官桂

各等分

右為愈末作二劑赤皮蔥連鬚細切半斤同醋醋拌勻炒令極熟帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止

蠶沙熨方 治風腫

蠶沙

鹽各不拘
多少

右相和炒熱布裹熨之冷即再炒或入醋少許尤佳

拔毒散 治熱毒丹腫遊走不定

石膏

生用
四兩

寒水石

生用
四兩

黃藥

右為細末以新水調搗之或紙花子小貼尤妙凉水潤之

水澄膏

治熱腫痛大効

大黃

黃藥

麝香

天南星

白芨

朴硝

黃蜀葵

右爲細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候涎底者去浮水以紙花子攤於腫處貼之如急燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

十二件單方

治丹毒或得一物瘡

水荅

生地黃

生松葉

葫蘆葉

慎火草

浮萍草

豆豉水和

大黃水和

梔子水和

黃芩水和

硝石

豆葉

右一十二味但得一味搗以貼之即瘡赤小豆末和鷄子塗之無鷄子水和用之

瘡竈丹從兩脚亦如火燒

右用五加葉燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

治丹毒瘡

蜈蚣乾者

白礬炒大

雷丸一箇

百部二錢

右為細末醋調塗之

除濕散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荊子

薄荷兩

白芷

天麻

川芎

防風並生

烏蛇酒浸一宿

右為細末每服三錢茶酒調下無時日進三服六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故

苦參丸

治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參四兩

玄參

黃連去鬚

大黃剉碎

獨活去蘆

枳殼炒

防風去叉各

黃芩去黑心

梔子

菊花略

右為細末煉蜜為丸搗千餘下丸必括桐子大每服三十

丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

八仙散

治遊風腫痒疥癬或因洗頭遊風癢痒生瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

地骨皮

甘草各等分

右爲粗末每用藥二兩水二椀煎十沸去滓熱湯患處

一掃散 治疥癬

防風

荆芥

苦參

地骨皮

薄荷

甘草各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五七十九空心用
茶清送下或爲散涼蜜水調下不過三五服即痊可大人

用每服三錢

治遊身癢痒明目爽神

威靈甘草石菖蒲

苦參胡麻何首烏

藥末二錢酒一椀

渾身癢痒一時無

四生散

治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不明

白附子

下注生瘡用黑附子

黃芪

沙苑蒺藜

羌活略二

右爲細末每服二錢空心盪酒調下若於猪腰子切開夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患赤眼睛痛不可忍臨睡一服目及大痛至二鼓時乃得睡更三四服太愈再有頑癬經年照藥貼藥俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑癬無不効

芥藥神効散

治乾濕膿瘻諸種疥癬等證有効

檳榔

蛇床子略一

全蠍半兩

倭硫黃半兩

右化開硫黃入荆芥末三錢滾數沸候冷加輕粉二錢冷再碾末加三柰半兩妙右寫細末先將小油滾過候冷調

上藥擦磨上仍以兩手搓藥聞藥氣神効

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃明手熟硫黃

黑狗脊

蛇床子各半兩

寒水石

六錢斑猫足研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去茄油調手中擦熱鼻中嗅三四次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯盪者加硫黃只喫不止亦可愈

治一切男子人女人渾身疥癬一家染易經年瘡痒不効者

百部碎切亂髮

木香碎切檳榔

苦參碎切各川椒三錢

鯽魚一錢不要見水紅成片

右以油五兩煎藥得所去藥却用麝香一分膩粉十錢
硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉
出礬器盛之非時使也

五龍膏 治疥癬

硫黃

白礬

白芷

吳茱萸

川椒各等分

右為細末煎油調塗之

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆

三合杜乾內醋
干如此七次

升麻

薏苡仁

黃芪

三合

人參

白朮

瞿麥穗

當歸切剉

黃芩去黑

猪苓去黑

防風去叉

甘草炙

右為細末每服三錢七空心粥飲調下日二夜一

當歸飲子

治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或痒

或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡痛

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

防風

白蒺藜

荆芥穗

各一

何首烏

黃芪

甘草

右為細末每服四錢水一盞半生薑五片煎八分去滓不

拘時溫服若於浴室內服此藥就用胡桃七箇去皮細嚼

下飲酒一盞出汗神驗

一笑散 治渾身疥癩癢痒生惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

五倍子

白膠香

各等分

右為細末濕者乾傳乾者香油調傳如頭上瘡便搽上不

用刺甚者不過三五次平復如故

神捷散 治諸疥瘡

吳茱萸

白蒺藜各一兩

白無名仁

輕粉各半兩

赤小豆

九粒石硫黃研

右爲細末研勻每用半錢匕生油調於手心內摩熱後偏指周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根

生切

兩草烏頭

一箇

硫黃

一錢

白礬半錢

生薑

一分

右以米泔淹一宿研極細入醞醋和勻入浴時抓破瘡傳之選頃以溫湯洗去絕妙

治疥神効

張毒

細辛

水銀各一

輕粉半錢

右爲細末油蠟和劑作兩凡綿裹兩手將於周身亦多處

擦之

備急葛氏療疥瘡方

右取棟根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下篩脂膏
和搗疥去痂以塗之謹風勿使女人小兒鷄犬見

蒸疥方

明信

雄黃錢半

礞末一錢

右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錢瓦兩口合
紙捲于火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油塗眼耳目鼻小
兒只空衣蓋被卧亦効宜淨室溫床牢擁衾被無令透烟
以熏至其人口鼻為効

丁香散 治一切癬

丁香 研

蝦蟆灰 各一分

白礬 研令汁

五倍子 研

膩粉

右研勻乾傅癬上以麝為度

胡粉散

治一切癬瘡瘙癢甚者

胡粉別研

雄黃別研

硫黃別研各一分

大草烏一箇生用

斑猫一隻

砒半

蠹猪七枚

麝香少許

右為細末先用羊蹄根煎醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散

治一切頑癬

輕粉

黃丹

瀝青

白膠香各等分

右為細末麻油調拭淨或搨破竹篋挑搨二次便乾數次

剥去殼也治牛皮癬如神

水銀膏

治一切癬

水銀一分

蘇莢仁研末

薑黃

研末各一分 酥二兩

右先煎酥和水銀以柳椎研攪候水銀散印下蘇莢薑黃

末攪勻破盒盛旋取塗癬上日三兩次

三神丸 治一切癬

蒺藜炒

海桐皮剉

草烏頭

鹽炒熟去鹽不用名一兩

右為細末麪糊和丸如菽豆大每服十九至十五丸溫酒
鹽湯任下

治癬神効

藜蘆根半兩 輕粉二錢

右為細末凉水調搽癬上

治癬積年不瘥者

右用斑猫一箇去頭翅足以針割燈焰上燒米醋內淬如
此三兩次就燒成存性黑灰研為細末用紅棗一枚湯泡
剥去皮核與斑猫一處同研爛先以手搽或立布條動癬
然後搽藥不可侵好肉恐有毒

半夏散 治一切癬

右以半夏三兩搗為末以陳醬汁調和如糊摩塗癬上日
兩三度即瘥

治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡可治

右以鯢鱧魚脂傳之先拭剝上則使燥痛後以魚脂傳之
一度便愈甚者不過三度

東坡先生家藏方

決明子不以多少
為細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研為膏散以物擦破癬上
用藥傳之立瘥

一林散 治乾癬不瘥

天南星 單為頭
空用

右為細末用辛路根搗絞取汁調塗不過三上瘥

治乾癬積年生茄樓之黃水出每逢陰雨即痒方

巴豆十枚

右於炭上燒之令油出盡即於乳鉢內以少許酥和研如
再薄塗之不過一二度愈

治濕癬方

黃連

明礬

煨各半兩

胡粉

黃丹

水銀各二

右為細末用猪脂油一两夾研令水銀星盡散磁盒收用

螺殼散

治濕癬痒不可忍

螺殼一兩

亂髮灰

龍腦

胡粉

研各半兩

右為細末研勻以油旋和塗之

荆芥散

治多年濕癬

荆芥穗

不拘多少以老罐子盛鹽泥固濟尺許一藥用
炭火燒候出清煙便去吹用溫紙塞了候子

故苓取

出研

麝香

一錢

膩粉

五斤

右研勻先以口含鹽漿水拭洗瘡令破帛子搵乾了以生油調藥傳之

八寶散

治風癩松皮頑癬久不瘥者神効子一鄉人患此疾

數年不愈後忽有舊親傳此方試用有効

麝香

破故紙

攪柳

大腹皮

雄黃

輕粉

硫黃

白礬括各一兩

右為細末小油調擦日上三五次瘁則擦之

定粉膏

治乾濕癬風癬不拘年月

定粉

水銀

蕪蔑

胭脂各一

右同研勻用陳猪脂一两同研成膏先用湯洗後以膏于臨臥塗之一上便瘥本法猪脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

棟實

半升如無突以概皮代之

棟葉及嫩枝

細剉

麥雪花及藤對細各

枳殼去穢

蛇床子

地榆丹參

皂莢

苦參對各三兩

右同煎濃汁熱洗患處

五倍子散 治癬久不瘥

五倍子一兩火燒令烟盡

黃蘗對

當歸對炒

膩粉 漏蘆

白礬對各

右為細末先用盞漿水洗拭乾傳之

黃連膏 治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱赤

黑痒不可忍搔之出血

黃連去須 黃蘗去粗

豉細研

蔓菁子

杏仁湯浸去皮尖

水銀一錢

右先以水銀於掌中嚼研如泥次入乳鉢內下生油一合

和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

浴毒湯 治小腸風陰瘡痒痛

木通

葉本

枳殼

貫衆

白芷

荆芥

甘松

薄荷

右剉碎用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升去滓熱洗浴瘡

陰瘡膏 治男女陰瘡

米粉一握

芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷各十

右以咀以不入水猪膏一斤微火上煎三上三下候白芷黃膏成絞滓去肉白粉和傅瘡上

七寶損御散 治下元玉莖上或陰頭上有痒瘡漸至食透久

不愈者

損御

雄黃

輕粉

蜜作傅

黃連

黃蘗

朴硝

右為細末和勻先以蔥白漿水洗淨軟帛掩乾如瘡濕乾
摻如乾小油調塗

玉粉散 治下陰瘡疼不止

滑石

密佗僧

寒水石各半兩膩粉

麝香各少許

右為細末油調傅或乾貼患處

全蠍散 治腎臟風發瘡痒

全蠍三枚

明硫黃二錢

生虢丹一錢輕粉半錢

鷄心檳榔

大箇破開以好黃丹
一錢合在內濕熱畏展

麝香少許

右為細末研勻磁盒收每用少許麻油調抹兩掌先以鼻
嗅男以兩掌揜外腎女以兩掌揜兩乳各睡至醒次日依

前再用藥發効

牡蠣散 治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出其痒甚苦夜則拭之
無足後必自痛或兩脚汗脚板心汗濕無可奈何此藥主
之予親得此證受苦數十年得此方隨用二三日如法擦
之二十年餘不發實為神効

牡蠣 黃丹抄各 枯白礬四兩

右為細末遇夜睡時用手捏藥於陰痒處痛搽之不一時
又搽之三四次後頻減次夜再搽雖大減又搽後自然平
復如腋汗亦有頻搽方可脚汗先搽後裝菜靴或鞋底上
脚板上塗藥纏脚裹之亦可

蝨剗散 治陰莖瘡

蝨剗一分 豆粉一分

右用水研塗上乾又傅之一方用豉一分

石灰散 治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水者如魚口能致命

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地火毒砂盆內研細末不犯銅鐵乾糝瘡上五七次可

丹胞散 治玉莖上生瘡臭爛者

右以猪肚一箇連尿去一半留一半用新磚兩口炭火煨新磚將猪胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩口磚上輪流不歇莫與火煨過胞以尿乾為度研為末入黃丹一錢先用葱湯以鵝毛抹洗以舊綿帛溲乾此藥糝三五次立見効

地連散 治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性為不乾糝

川連散 治不部注瘡

右以宣連為細末漿水調成餅攤於梳面上內用艾及穿山甲三片燒烟覆碗熏成黑色再取下如是者五次以黃

遠餅黑色為度地上出烟毒再研細濕則乾塗乾則清油
調塗三四次先用黃柏蘆香茵陳煎湯濕洗

神妙方 治頭三五孔小漏瘡出血微膿

右用油髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳仍以米
湯調髮灰食前服

治穀道中瘡

右以水中苧葉細搗綿裹內下部日三

小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡

川椒 苦參

蛇床子各一兩半 香附子

白礬 白芷

狗脊 細辛各一兩

桂心 三分

右喫咀每用藥一兩以水三升煎至二升去滓傾入盆子
內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身便洗患處甚者不

過三兩度

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則

喜住之則痛或癢流水為害甚苦此藥見初及治婦人下

部陰濕胎元火冷

牡蠣

蛇床子

破故紙

紫稍花

官桂

乾荷葉

右咬咀每用一两半水一小鍋入葱白數莖煎至八分去

滓先熏後洗却用後藥

枯礬 一两

黃丹

鉛粉 各半

右研細末熏洗後以手捏藥末擦濕痒處

銅綠散

治男子婦人陰部濕癢瘡

銅絲 少許

白礬 一錢

乳香 半錢

輕粉 一字

五倍子 細研

右為細末洗淨搽之

青黛散 治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澀食亦減身

面微腫因多食魚鰕發風熱物得之

右用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神
効仍服八正散日三服

麝香散 治妬精瘡痒而濕者

麝香

黃礬

青礬各等分

右為細末小便後用些少傳之

治陰濕生瘡黃水流注

白礬

不以多少

右研為末先以冷水洗瘡淨然後傳之

津調散 治妬精瘡膿汗淋漓臭爛

黃連

款花各等分

麝香少許不用

右爲細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津調傅之忌生湯洗

洗毒湯 治陰蝕瘡

苦參

防風

露蜂房

甘草

各分

右以水煎濃汁洗瘡

胭脂散 治陰瘡

坯子胭脂 真菜豆粉各等

右同研勻傅之

蝦蟆散 治陰濕欲盡瘡痛甚者

蝦蟆一枚 燒灰 兔糞一兩

右同研細每用少許傅瘡上日三四度

截疳散 治年深疳瘻瘡大効

白芨

白欬

黃丹

密佗僧各一

黃連

半兩

輕粉

一錢

片腦

麝香

各半

右為細末和勻每用或摻或絛瘡中以膏藥貼之

甘石散

治下部疔瘡

煨甘石

密陀僧

錢各半

輕粉

一分

橡斗子

燒灰存

龍骨

半錢

麝香

少許

右為細末先用荆芥杜仲川椒煎湯放溫浴洗罷然後用

藥一檢乾貼

金銀花散

治下疳瘡

金銀花

荆芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

檳榔

各一

右吹咀每用五錢水五握加葱白二根同煎數沸盆盛水

先熏後洗却上藥

梳子散

治下疳瘡

右用梔子十箇去穢裝入明礬末麪糊合口火燒存性為末洗淨乾摻上隨効

銀粉散

治下疳陰頭生瘡

右用牆上白螺蛸不以多少火內煨酥為末於水內飛過去土不食者次用輕粉隨分兩入在藥內每用少許乾貼在瘡上

治下疳瘡

右以孩兒茶研為細末先洗淨乾則小油調傅濕則乾摻之神効

消毒膏

治五發惡瘡消腫散毒

黃芪

當歸

川芎

杏仁

白芷

白欵

零陵香

槐白皮

柳枝嫩者

木鼈子仁

甘松各半兩

乳香

沒藥各三

麝香

朱紅

硃砂各半

黃丹炒紫

黃蠟各半

芝麻油一斤輕一錢

右將藥剉碎油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去滓下黃蠟候熔開出火下丹急攪百十轉下乳沒麝等六味不住手攪至凝磁器內收貯白光絹攤貼之

烏龍德生膏 治一切惡瘡腫毒及治小兒脾癰堅硬等疾

黃芪

青木香

連翹

木龍子油

玄參

生地黃

桃仁去皮

金銀花

防風

川芎

白芷

羌活

白芨

白欬各二

亂髮及兩

草麻子三百枚

桂花頭半兩

五香連翹散

人參敗毒散

復元通氣散

十奇內補珠璣散各半兩

右將前藥吹咀用小油三斤半入鐵鍋內先浸五日却用

慢火煎至藥黃黑色以槐柳條一握不生手攪再用鹽瀉
瀉去滓細淨油三斤先將黃丹一斤半炒黑色下小油一
處於慢火上再熬得所滴入水中不散成珠下後藥

雄黃

血竭

乳香

蜜佗僧

沒藥

輕粉

龍骨

楓香

各半兩

麝香 一錢

加蘇合油

半兩 甚妙

右研爲細末入煎膏內化開攪千餘遍令勻又拭水中得
所成膏藥可攤爲度如堅少加小油如軟加黃丹須要攪
勻成膏切忌鷄犬婦人孝子見須誠心靜意脩合如小兒
諸癰脾疔等證量病堅硬大小用紙或緋絹攤貼候藥力
盡自脫下再換小兒疳瀉痢證貼在肚上咳嗽貼脊梁中
心其病自愈

摩風膏

摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌肉裂破

紫歸 去毒

白芷

杏仁 去皮

桃仁 去皮

藿香 去土

檀香

零陵香

川芎 各三錢

沉香

木香

白附子

天麻

獨活

白芫

白欬 各一錢半

黃芪 去粗皮 兩一錢

防風

茅香

白芍藥

甘草 各二錢半

木通 一錢

瓜蒌 穰割 一百

龍腦 四錢

黃蠟 夏十二兩 半冬九兩半

右劉藥用清油二斤二兩浸七日淨石器銀器中慢火煎

候白芷微黃綿瀝去滓於淨磁罐內密封澄一宿再瀝過

於磁椀中慢火再輕溫熬動次下黃蠟攪勻放溫次下研

細龍腦摻固於磁盒內盛每用少許摩擦患處

大乙靈應膏 治諸般惡毒惡瘡並不外貼內服一九如櫻桃

大給粉為衣各隨後項飲子服之亦治杖瘡

玄參

大黃

官桂

生地黃

白芷

赤芍藥

血竭

乳香乳香

紅花

黃藥

地榆

防風

沒藥三錢

槐花

黃芩二錢

猪牙皂角三錢

羌活四錢

劉寄奴四錢
杏仁二錢
法皮一錢

當歸尾一兩

右剉碎以香油一斤浸春五夏三秋七冬十日浸畢用文武火熬藥枯焦如炭然後退火令其自冷將蠶布一幅濾去滓將油再入鍋內熬先以黃丹十兩新瓦上炒丹紫色研細每熬油一沸入丹二兩熬至五沸入丹畢前後俱用柳條攪之待油水中凝而不散方成膏待藥溫用磁器盛貯下用水浸三兩日去火毒然後攤貼患處內服藥引子見神仙太乙膏下

神仙太乙膏

治八發腫疽及一切惡瘡軟癰不開年月深淺

已未成膿並宜治之蛇虎傷蠍螫犬咬傷湯火刀斧所傷
皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡淨軟帛拭乾却用
緋帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白
帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置
口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服以
山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者
患處貼之內服益湯送下唾血者桑白皮湯下諸漏先以
益湯洗淨諸瘡並量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大
蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧
同上瘻瘡益湯洗貼酒下一丸婦人血脈不通甘草湯下
一切瘡癩并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參

白芷

當歸

赤芍藥

肉桂
桂枝

大黃

生地黃
熟地

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色
濾去滓入黃丹一斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不
粘手為度傾入磁器中以磚蓋口掘窖子埋陰樹下以土
覆三日日出火毒欲服丸如鷄頭大

透骨金絲萬應膏

木鼈子

牛膝研各一兩

自然銅

紫花地丁切

白龍研

當歸各半兩

川烏二枚切破

葶麻子二兩切碎

金剛骨九錢如錢

已上藥用小油一斤浸一宿慢火煎復入桃柳槐枝同熬
葉焦綿濾去滓入黃丹六兩熬二沸次入

白膠香半兩乳香研

雄黃

白丁香

密佗僧 沒藥各

右研細同熬勻再以綿濾過看硬軟取之收貯用時隨瘡

大小紙上攤貼

青龍五生膏 治癰疽疔瘻惡瘡膿血出者

生桑白皮 生青竹茹 生栢白皮 生梧桐白皮

生龍膽草各五兩 碎 蜂房 蝮皮

蛇蛻皮 雄黃 雌黃各一兩 附子

芎藭 蜀椒各五

右吹咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上炙乾搗篩以

猪脂一升半微火煎攪令相得如飴著冷水中新白磁器

盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服棗核大日一服

白龍膏 治五發惡瘡及湯浚火燒凍破潰爛上痛生肌清血

狀消毒散腫通氣脉如神可無般痕

白薇 白欬 白芷 桑白皮

黃芪 商陸根 柳白皮各一 乳香各二

輕粉半兩

定粉半斤

黃蠟半斤

杏子油一斤如元孫泗代之

右藥出油內操浸三日於木炭火上煎白並黃色瀝去滓於油內下黃蠟乳香俟熔開出火再瀝俟微冷下輕粉急撻至冷磁器收每用緋絹攤貼

膏藥方 治諸瘡腫毒

一丹二油巴三五

輕粉麝香加沒乳

琥珀珠砂石腦油

七味將來同少許

文武火上用心熬

若杖撻來如狼虎

不問諸瘡并腫毒

貼上如同神鬼取

膏藥方

桃柳冬青淡竹黃

枸杞松槐更及桑

當歸柴胡香白芷

二十四氣為正量

黃丹二兩油加倍

湯火之中要相當

乳香沒藥加此子

切莫輕信亂傳方

神異膏

治癸背癰疽諸般惡毒瘡癤其効如神治疔疾先以

麥飯石膏塗付俟其瘡相附漸收止於徑寸大却用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取効合時不可與婦人鷄犬猫豚穢物見之

玄參

半兩

綿黃耆

三分

杏仁

去皮尖

全蛇

焙鹽水洗半兩

男子亂髮

統半兩

露蜂房

半兩到一兩用有

黃丹

五兩

真麻油

一斤

右將麻油同髮入銀鈔中文武火熬候髮焦燉盡以杏仁投入候變黑色用好綿纒去滓再將所熬清油入鈔內然後入玄參黃芪慢火熬一二時取出鈔子安冷爐上半時又火方稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪却移鈔於火上不住手攪慢火熬至紫黃色用綿濾過後入清油

在鉢內乘冷放黃丹急攪半時又移鉢於火上以文武慢火熬不住手柳枝攪十餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器內收封待用或恐偶然熬火太過稍硬難於用却少將蠟熬麻油在內以磁器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪調收用膏藥熬成了須連所乘磁器置淨水中出火毒一晝夜歇三日方可用日換兩次夜換一次熬此膏藥極難於火候須奈煩者火緊慢火猛則藥中火癸不特失藥性又傷人面目救助不及千方謹戒膏藥方甚多不下數十治疔之時神効無出於此方千金不換杖瘡尤妙

白玉膏

治縮收癰疽不令延蔓切忌用涼藥

杏仁

二十一粒
尖尖別研去

川椒

炒四十九粒
去目
此汗為末

清油

一兩

酒蠟

半兩

右用整至紫黑新綿濾過用無灰薄紙看瘡大小剪作梳
樣攤藥在上於瘡暈裏兩邊圍繞貼之候暈漸收近裏
即別剪差小者再攤藥圍貼暈又收即又再移近裏貼仍
頻換候暈已收見瘡根脚成瘡口即用次方凡貼大惡瘡
毒氣方盛不可以藥當上貼恐起散毒氣瘡益大此藥能
收暈見瘡其法大妙

水晶膏 治疔瘡背疽疔疔癰疽丹毒杖瘡等疾

好白油單紙

十張每張剪作八片

黃連

一兩去

右用水兩碗砂鍋內以黃連煎至一椀半先下油單紙五
張又續下五張同煎五七百沸湯耗旋添不得犯鐵器液
起擦去黃連滓屑焙乾如瘡破有膿將藥花旋鬆貼如狀
瘡約度大小恰好剪貼不可太大先將周回剪下油紙燒
灰熟酒調膏生薑送下此貼藥不得犯女人手

十香膏 治風毒瘡腫癰疽疔瘡癩癭

沉香 剉

檀香 剉

鬱金 剉

松香

丁香 剉

不香 研

龍齒 研

蘇合香

白膠香 研

薰陸香 各半

麝香 一分

黃丹 六兩

麻油 一斤

右先將沉香檀鬱金丁香五味油內浸七日入鍋中以少炭火溫發五日右民武火煎二三十沸瀝去香綿濾過淨拭鍋却下油於內下丹以柳木枝不住手於火上攪候色黑滾水中如珠軟硬得所去火入后木香等末六味入膏中攪三五百遍膏成安磁盒內以軟帛攤貼日二換之

止痛膏

治一切癰疽癰疽背潰后日夜疼痛排膿

當歸

鹿角膠 各五

白芷 密佗僧 研

益花

硃砂 研各

川芎

葉本 各二

挂心

細辛

黃蠟

膩粉

乳香研各

麝香炒一分

黃丹五兩

麻油一斤

右將油安鍋內鍊沸下當歸等煎候白芷赤焦色綿漚去滓淨拭鍋仍下藥油依前慢火熬下蠟丹不住手以柳木枝撓候色黑次下密陀僧鹿角膠益花次下膩粉次下乳香次下麝香研砂等慢火熬撓候藥黑色即滴水內如軟硬得所藥成入銅罐中待凝於淨地上安一宿以物蓋之出火毒亦用故帛上攤貼日再換

生肌膏 治一切癰疽發背潰后肌肉不生

亂髮

松脂

薰陸香各半

故緋帛燒灰

故青帛燒灰 黃蠟一兩

黃丹六兩

右以油一斤先煎一兩沸內髮煎令消盡然後下蠟松脂量陸香着緋帛灰煎撓令泮以綿漚去滓却入鍋中下丹

以火煎撓令黑色軟硬得所貯磁器中少許塗於椒葉上
貼日二易之

梳毒膏

治腫瘡漏瘡一切惡瘡

右用黃丹不拘多少以苦竹園中地龍泥裹包火煨令紅
取出放冷去泥細研和以輕粉麻油調如膏藥攤在油紙
上貼之李中父傳屢用効

太乙膏

治癰疽瘡神効

沒藥四升

麝香三升

乳香

輕粉各二

片腦一升

黃丹五兩

清油一斤

右先將油丹焚以柳枝撓又用葱七根先焚一根令焦
再下一根葱蓋為度下火不住手撓看冷熟入腦等攪勻
磁器盛用時旋攤貼

騏驎膏

治入癰疽一切惡瘡軟癰不問年月深淺已未成

膿者貼之即効及湯火傷皆可內服外貼神効

白芷

白欬

川芎

甘草

四兩

上各

當歸 二兩

丁香

乾蟾

各半

木鼈

子

二十

沒藥

別研

一兩五

乳香

別研

二兩半

片腦

一兩

杏仁

九十

十

鼠頭

二個

麟

麟

竭

研

真

緋

縮

燒

灰

清麻油

二斤

室女油

頭髮

大

如拳

右剉細以好酒拌濕一宿入鐺內用油煎候藥深赤黑色
濾去滓別入淨鐺慢火煎少頃即入別研者及黃丹蠟以
柳枝不住手撓時時滴入水試看軟硬得所即是成膏矣
背未膿者半入銀石器慢火熬及半盞許去滓次入乳香
碾碎先入又熬之候如一茶脚拈先將蜜熬去滓放冷却
入前熬者骨子及麝末撓勻再熬候金漆狀乃成入不犯
水礮器內收之每用少許點大効

五枝膏 治一切惡瘡腫毒等疾

香油 一斤

黃丹 五兩

槐枝

梧桐枝

柳枝

桑枝

桃枝

各長一寸
各一兩

右先將油同枝入鍋內文武火煎藥黑色濾去滓次下黃丹不住手攪候黑色收磁器內綸帛攤貼

司馬溫公解毒膏

治諸瘡久不收斂宜貼之

杏仁 八箇

葶麻子 四箇

巴豆 四箇

水蠶子 箇

去殼

槐枝 四兩

長

柳枝 二兩

桃枝 三兩

乳香 三分

黃丹

春秋用三兩
夏冬用四兩

酥油 半斤

右將油入鍋內下藥熬焦黃色綿濾去滓再熬滴水成

珠不散為度下乳香木攪勻每用紙攤貼

神效回生膏

治癰疽疔毒遠近腫瘡打撲損傷腫毒發背力

斧所傷箭頭在內蛇犬所傷並皆治之

槐枝

桃枝

榆枝

桑枝

狗胆枝

已上各物者二十條者剝取皮者各

白

白芨

白欬

當歸

六一

黃蘗

杏仁

赤芍藥

草麻子

去殼一兩半

血竭半兩

輕粉三錢

黃丹

耐二沒藥半兩

乳香半兩

椎黃半兩

右先將六枝皮用清油三斤於砂鍋內文武火煎令滓液

盡扁度濾過却將白芷等九味剉碎下油內浸透又用慢

火煎焦去滓再濾過却將黃丹分作三次下熬令黑色滴

水中不散為度却將血竭等末待油微溫下於油內磁罐

盛之蓋口埋土內三日出火毒任意攤貼

萬金膏

治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚膝生

瘡逐年膿瘡五般痔漏一切惡瘡又云專治發背神妙不

可具言右初覺或做瘡用牛皮膠熨令稀稠得所如藥化攤在毛頭紙上於初覺處或有做瘡處貼次用軟布帕子二條於醋末醋內煮令熟漉出互相於膠紙上乘熱蒸熨不可令布帕冷布帕二條不可都齊漉出常留一條在醋內煮候蒸熨得一條冷却於醋內取熱布蒸冷布却入醋內煮候幾常得熱布替換熨蒸即易見効若瘡痒乃是藥攻其病頑忍痒不止蒸熨直候膿出將盡即濃煎貫衆湯候溫洗去膠紙次日依前更洗若尚有膿又如前法蒸熨雖連數日蒸熨不妨但要瘡中膿盡瘡乾為度然後用生肌紅玉散搽在瘡上即以萬金膏貼每日一上或兩上每用再蒸熨並如前先鋪膠紙於瘡上熨了亦如前用貫衆湯洗去膠紙

龍骨

龜甲

苦參

馬賊魚骨

黃蘗

草烏

黃連

猪牙皂角

黃芩

白朮

白欬

木鼈子

當歸

白芷

川芎

厚朴去粗皮

槐枝

柳枝

俱剉碎 各一分 乳香 一錢

沒藥別研

黃丹半兩

清麻油肉兩冬月半斤

右除乳沒丹外餘藥入油內慢火煎候白芷焦色去滓入

黃丹一半不住手攪令微黑色更入黃丹仍攪待滴入水

中成珠不粘手為度攪溫下乳沒末亦攪勻磁器盛用符

量瘡大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅肉桂各一分

方無當歸

活絡內炙膏 治閃肺筋骨但是一切無名腫毒疼痛

當歸

黃芪

白芷

芍藥

半夏

木鼈子

銅青酪

白膠香半斤

乳香

沒藥各一

麻油二斤

右將前六味剉碎入油內熬至白芷焦色瀝去滓下白膠香煎至黑色次下乳沒銅青末撈勻用時隨病大小厚紙攤貼患處

金絲萬應膏

治搨撲傷損手足有背并寒濕脚氣疼痺不可

忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青

三斤半

威靈仙

二斤

草麻子

二百枚去皮殼研

黃蠟

二斤

木鼈子

二十八枚去殼切片研

沒藥

乳香

各一斤

麻油

夏二月冬四月

三月

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝撈候焦黑色

重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤三斤淨再下

銅鎔開下麻油黃蠟草麻木鼈子泥不住手槐柳枝撈勻

頭慢火滴入水中不粘手扯拔如金絲狀方可如硬再流

加油少許如軟如漚青拭得如法却下乳沒末起鍋在灰
火上再用槐柳條撓數百次又以簾布灑膏在水盆內杜
被如金絲頻換水浸二日却用小釧盛頭如落馬墜車於
被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉為驗連換熱水數次烙
之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽
貼背心上

無比神應膏

治諸般惡毒瘡腫發背癰疽瘰癧瘡瘡脚氣打

撲傷損刀斧傷湯燒火燒馬犬蛇虫蜈蚣蜂蠍多年咳嗽
口內吐血貼背取毒愈心疼腹痛小腸疝氣赤白痢瀉不
止於臍下貼即痊牙疼貼腮上止肉潰流膿頑癬腰痛疥
癬癰瘡杖瘡重者再貼即安

白芨

白欬

白芷

木鼈子仁

官桂

杏仁

當歸

桂花

乳香

沒藥各一

蘇合香二九黃丹二斤

真麻油五斤槐柳枝各半

右剉碎除乳香沒藥黃丹蘇合香九另研外其餘藥於酒內浸春秋五日夏三日冬十日遇冬減黃丹二兩新鐵鍋內浸至日期用文武火熬一順撻槐柳枝黑色去滓待溫下乳沒蘇合香九再熬不住手撻微滾三兩沸放溫一而撻一面下黃丹文武火熬滾起火再滾如此五七次不住手撻至數千次煙盡黑色為度滴水不聚不散方可切不可用火辰日熬忌鷄犬婦人見

飛丹法

凡膏藥中鮮有不用號丹其貨賣者多用硝與鹽雜

和在內重秤若不飛過而用反有害方法于後

右用號丹即黃丹先以冷水漂過去其鹽硝水再用水漂再丟其水澄乾微火炒紫色將紙攤地上出火毒用時再

研至無聲紙用

熬膏藥法

凡用乳香沒藥須用燈心同於乳鉢內研細不然難為研細候藥成膏提起藥鉢仍撓無烟起去燈心篩末入油內不住手撓勻

右熬藥用磁器或銅鐵鉢內盛油浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛瀝去滓留下一兩重藥油復將所瀝油於慢火上再熬却將芫丹入油內用長槐柳枝不住手撓候有微烟即提起藥鉢就柳條點藥油滴在水面上凝結成珠不散方成膏美如油散珠不成再熬直待成膏提起藥鉢撓無烟出却入乳香沒藥撓勻傾出磁器內將原留下油洗鉢一件收拾器內用新汲水一日一換將藥器坐水內浸三日出火每方可用如膏藥硬約量加芫蠟清油入膏內撓勻得所其芫蠟等油減半用

熬膏藥極難於火候須耐煩者火緊慢火猛則藥中火發
不特失藥性且燥傷製藥人面目