

太醫院經驗奇效良方大全

太上經院細繢奇効良方卷之五十五

鍼灸門

附論

鍼灸去火欲治病莫如用鍼巧運神機之妙攻開聖理之深外
而安內鍼益邪而扶正中含水火善回陽以剝陰又云觀夫九
鍼之法毫鍼最微然是一寸六分包含妙理雖細擬於毫髮洞
貫多歧可平五臟之寒熱能調六腑之虛實是以岐伯分九鍼
九鍼者天地之大數也始於一而終於九故曰一以法天二以
法地三以法人四以法時五以法音六以法律七以法星八以
法風九以法野素問曰以鍼應九之野九而九之九九八十一
以起黃鐘數焉以鍼應數也一者天也天者陽也五歲之應天
者肺肺者五臟之華蓋也皮者肺之合也人之陽也故爲之治
針必以大其頭而銳其末令無得深入而陽氣出二者地也人
之所生土者肉也故爲之治鍼必肅其身故貞其末令無得

傷肉

湯則氣畢竭

三者人也人之所以生成者血脉也故爲

之治針必大其刃貪其末令可以按脉勿陷以致其氣令邪氣
獨出四者時也時者四時八風之客於經絡之中爲癆病者也
故爲之治針必竊其身而鋒其末令可以窩熱出血而痼病竭
五者音也冬夏之分分於子午陰與陽別寒與熱爭兩氣相博
合爲癰膿者也故爲之治鍼必令其末如劍鋒可以治大膿六
者律也律者調陰陽四時而合十二經脈虛邪客於經絡而爲
暴痺者也故爲之治鍼必令尖如鑿且直且銳中身微大以取
暴氣七者星也星者人之七竅邪之所客於經而爲痛痺舍於
經絡者也故爲之治鍼令尖如蚊虻啄靜以徐徃微以久留正
氣因之真邪俱往出鍼而養者也八者風也風者人之股肱八
節也八正之虛風八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間爲
深痺也故爲之治鍼長其身鋒其末可以取深邪遠痺九者對

也野者人之節解皮膚之間也溼邪流溢於身如風水之狀而
浸大能過於關節大節於關節者也岐伯又云九鍼之長短一
白鍼鍼長一寸六分主熱在頭身也二曰食鍼其鋒長一寸六
分主治分間氣三曰錐鍼長三寸半主按脈取氣令邪出四曰
鋒鍼其身鋒其末長一寸六分主癰熱出血五曰鉗鍼黃三分
半長四寸主大癰膿兩熱爭者長一寸六分主取癰膿者也七
曰毫鍼法於毫毛長一寸六分主寒熱痛婢在絡者也八曰長
鍼長七寸主深邪遠婢者也九曰大鍼其鋒微直長四寸主取
大氣不出關節者也岐伯又云身形之應九野左足應立春左
肱應春分左手應立夏膺喉首頭應夏至右手應立秋右脇應
秋分右足應立冬腰尻下竅應冬至穴腑臟下三歲應中州凡
形苦志病生於筋洽之以熨引形樂志疾病生於肉洽之以

鍼石形苦志苦病生於咽膈治之以其藥形數驚恐經脉不通
病生於不仁治之以按摩醪藥是謂形志為病又有人之五勞
久視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋此五久亦
所病也治當隨經而取之且如前人勦權刺肩井曲池臂痛而
復射華陀刺懸鍾環跳蹙足而立行秋夫刺腰俞而鬼死沉疴
王纂鍼交俞而妖精立出徐文伯鴻死胎補手陽明合谷鴻足
三陰交應鍼而殞因前人仁術之妙載清名而不朽今已去聖
道遠此道罕明後之學者當究古人之心施以惠生之術明經
終識虛實行子午之術且如左有病右畔取非交經繒刺用進
氣之法使鍼之氣安能到於病所若不明經絡妄以悞鍼其禍
豈小小哉今將前人立法各經治癆之穴并用鍼之法鍼經備
載其詳所有缺略者開列于後

動者如氣不行得鍼動伸提而已伸提者即非鍼出入引氣也
搖者凡行赤鳳搖頭之法即搖之撥動其經以愈疾詳見本法
進者行鴻法進鍼至穴得分寸令病人呼氣一口即用鍼進至
入一丘許停鍼少時得氣即退鍼行鴻法

退者行補法之時進鍼至穴得分寸令病吸氣一口即用鍼退
出一丘許停鍼少時得氣却行補法

撓者凡鍼要寒熱者以爲撓之或外或內如撓線之貌勿轉之
大緊怒入肉纏鍼難進退左撓則熱右撓則寒亦出入之理
慎當忌之

彈者凡鴻時用指輕彈使其氣速行則氣至也易至也補則不
用氣實自至者不用此法

努者凡用大指以指撫鍼名曰飛鍼引其氣至也如氣不至令
病人閉氣一口着力努之外以飛鍼引之則氣至矣氣自至

者不用此法

循者凡下鍼於所部分經絡用手上下循按之使氣往來推之則行引之則止

捫者如痛癢未除即於痛之處捫摩使痛散也復以飛鍼引之除其痛也

攝者如鍼下氣滯滯隨經絡上下用瓜甲攝之其氣自通攝與捺者同

按者如補出鍼時令病人吸氣一口急用手指按閉其穴上此補法也如鴻出鍼時令病人呼氣一口則勿按鍼孔此乃鴻法也

瓜者以手瓜甲搗穴令氣血散也方下其鍼刺入也切者以手瓜甲極搗其穴氣血散開方下針切與瓜同撫者以手大指次指撫針來去上下即飛鍼之法也

行鍼法

黃帝金鍼法最奇 短長肥瘦在臨時 但將他手橫紋攬
分寸尋來審用之 身體心胷或是短 身體心胷或是長
求穴看紋還有理 醫工此理要推詳 定穴行鍼須細認
瘦肥短小豈同群 肥人鍼入三分半 瘦體須當用二分
不肥不瘦不相同 如此之人但看中 只在二三分內取
用之無失且收功 大飢大飽宜避忌 大風大雨亦須容
飢傷禁氣飽傷腑 更看人神俱避之 妙鍼之法世間稀
多少醫工不得知 寸寸人身皆是穴 但開筋骨莫胡疑
有筋有骨傍鍼法 無骨無筋湏透之 見病行鍼宜子細
必明升降闔關時 邪入五經隨早遏 崇侵六脉浪翻飛
鳥鳥後櫻空中墮 靜意冥冥起發機 先補真陽元氣足
次滻餘邪九度噓 同身遂穴歌中取 捷法昭然逕不迷

百會三陽項之中

五會天淵字相同

前項之上寸五取

百病能祛理中風

灸後大燥衝雙目

四畔刺血令宣通

井泉要洗原鍼穴

鍼刺無如灸有功

前項寸五三陽前

甄權曾云一寸言

鍼鍼出血頭風愈

益油揩根疾自痊

顙會頂前寸五深

八歲兒童不可鍼

顙門未合那堪灸

二者須當記在心

上星會前一寸斟

神庭星前髮際尋

諸風灸庭爲最妙

庭星宜灸不宜鍼

印堂穴並兩眉攢

素髎面正鼻柱端

動脈之中定禁火

若燃此穴鼻齶廢

水溝鼻下名人中

兌端張口上唇宮

斷交二斷中間取

承浆下唇內踪

姓父分半懸樑灸

大則陽明脉不降

廉泉腕上定結喉

一名舌本立重樓

同身捷法須當記

他日聲名播九州

春夏刺淺秋冬刺深

內經曰病有浮沉刺有淺深各正其理然春夏為陽其氣在外入氣亦浮凡刺者故浅取之秋冬為陰其氣在內人氣在藏凡刺者故當深取之又言春夏各致一陰秋冬各致一陽秋冬各致一陽者謂春夏為陽謂陰所養故刺之各致一陽春夏溫少致一陰謂下鍼深刺至腎肝之部得其氣鍼便出之是以引特之陰也秋冬寒必致一陽致一陽者謂下鍼淺則刺至心肺之部得氣推而內之良久出鍼是推內之陽也素問曰春夏養陽秋冬養陰故也

三才法

凡欲下鍼先以左手大指搘於穴上指令多時令患人呼息然後用右手持鍼用力揜之取穴則有進入穴既定撒手停鍼十息號曰天才持少待再進鍼五分依前停鍼住手十息號曰地才不可便起少待一二時方可出鍼號曰人才乃

可篤也

赤鳳搖頭

凡下鍼待氣要上行閉其下要下行閉其上進鍼從辰至巳退鍼巳至午未進鍼則左撚退鍼則右撚動也

歌曰
一下水船中之櫓

猶如赤鳳搖頭

別辨迎隨順

休時慢法徒求

蒼龍擺尾

先下鍼邪氣至閑要去處回撥者將鍼散慢伏之如船中之舵左右隨其氣輕而撥其氣自交週身遍體周流不失其所矣如氣不行將鍼動伸動提

歌曰
蒼龍擺尾氣交流

血氣奪流遍體周

在他身上千般病

一掃教他即便瘳

龍虎交戰

夫用鍼時先行龍左行右燃尤得九數却行虎右行左燃得六數乃先龍後虎而轉之得氣補之故陽中有陰陰中有陽乃得反之道使邪氣和其正

龍虎升騰

夫用鍼法以手大指自前撚入左大指向後撚入經得氣向前推轉以大指彈其鍼引其陽氣按而提之其氣自行如氣不應依前再施

手午鴻臼

天下鍼時調氣得勻以鍼上下九入六出之數按陰陽其病自愈矣

陽中陰陰

夫用鍼之時先入五分之中乃得九陽之數如兼熱便進入一寸行六陰之數以得氣為候夫如是可治先寒後熱之病

陰中隱陽

夫用鍼之時先進入一寸之中行六陰之數如患人自竄微涼即返鍼漸出五分之中却行九陽之數故得陰中隱陽可治先熟後寒之病

燒山火

夫用鍼時先行九陽之數入於五分中得氣便進之漸進一寸之內三慢出三緊入如刺熱緊閉其穴即時熟氣復生其冷病自除如不効依前再施

透天涼

夫用鍼時先進入分寸之內行六陰之數若得氣便進伸漸退至五分之中三慢入三緊出其鍼自緊徐徐牽之得冷氣漸至其熱自愈不効再施

留氣法

夫用鍼之時先進七分之中行純陽之數若得氣便深刻微伸提之却退之至原處又得氣依前法可治痃癖癰瘕之病

進氣法

夫用鍼之時先行純陽之數若資鍼下氣滿便倒卧其鍼令患人吸氣五口其鍼氣上行此乃進鍼之法也可治肘臂腰脚身疼走注之病

提鍼法

夫用鍼之時先行陰數自資氣來撲轉輕提其氣即行可治冷麻之病

鍼解法

凡刺手足欲使氣上行以指下抑之使氣下行以指上抑之用鍼頭按住少時其氣自然行也此即赤鳳搖頭之法

盤鍼法

盤鍼法 且如鍼中腕關元之穴先刺入二寸五分退出一寸
只留一寸五分在內盤之 且如要取上焦胞中之病用鍼頭
迎向上刺入二分補之使氣攻上若臍下有病退出二分
逐日人神所在不宜鍼灸

足大鼻柱手小指 外踝髮際外踝求 股內牙齒肝及足
五口通穿足陽明 六手胷中在胷遊 內踝氣衝七膝上
在腕股內八陰收 九尻足趺及膝脰 腰背內踝足趺休

尻神

一歲叉踝坤

二歲齒牙喘

三與頭口乳

四中眉尾尻

五乾背面耳

六手膊兌川

七艮腰項上

八膝肋禹轄

九坎肘腳肚

尻神上下傳

且如人年十歲除九不算零一歲便起叉踝坤餘皆倣此

人身血忌不宜鍼灸出血

正丑二未三在寅

四申五卯酉六親

七辰八戌九巳上

十亥一子二午真

凡醫者若不能知此諸般禁忌趋吉避凶妄亂鍼灸非惟不能愈疾甚者或致患人傷生喪命爲害非輕若逢病人年命危會聚男女氣怯下手致難通人連士若是卒急暴患何暇選擇避忌即不可拘此若是悞犯禁穴諸般醫療不瘥以意詳之

鍼灸瘡瘍神

正羊二戌三居辰

四寅五午六蛇行

七酉八猴九在亥

十子十一丑中行

十二月當居卯位

犯着瘡瘍必殺人

午時補寫歌曰

每日午前皮上搗

有似燒湯煎涌熱

若要寒時皮底尋

不詎交人皮破裂

午時前後歌曰

午前要知寒與熱

左搗爲補右爲瀉

提鍼是熱挿鍼寒

此是先賢真妙訣

午後右補左爲瀉

忘生此法寒與熱

挿鍼爲熱提鍼寒

婦人反此要分別

順入爲左逆爲右

不是知人休與說

補法凡用九陽數行四九三十六也

寫法行六陰數也行三六一十八也

補寫提鍼此法用之大有驗

補法

假令此六合鍼五分先鍼入二分候得氣再入二分至四分

候得氣便鍼

一分盡五分止然後急出其鍼便以左手六指

按其鍼穴勿令出血是為補法

瀉法

假令此穴合鍼五分便鍼入五分候得氣便起鍼二分少停
又起二分少停候得氣又起鍼慢出不用左手閉鍼孔令其
氣出是為瀉法

禁鍼穴法

禁鍼穴俞古今留

頤會神庭腦戶由

神道靈臺膻中穴

石門神闕水分休

氣穴陰會手五里

陽絡青靈承泣收

橫骨承筋若有病

禁鍼用灸疾湏瘳

孕婦休鍼合谷穴

三陰交鍼墮胎憂

閉元胎死不能出

子母俱亡切莫投

禁灸火法

瘻門風府及承光

攢竹晴明與少商

天樞頭維下閔穴

益室天府及迎香

素髎鳩尾陽關定

心俞經渠陰市當

淵液白環井五會

當陽伏虎脊中藏

禁灸人迎條口穴

乳中殷門脾闕姆

避灸尻中二十九

用鍼補瀉即安康

禁衛回避八法

風 凡用鍼刺天氣風盛令病人避風之處刺之無傷也

穴 凡用鍼刺天氣寒冷令病人向溫暖處先飲湯液體

暑 凡用鍼夏月熱感血淖而多脫其血以新水洗其面於風
涼處堅而然後刺

濕 凡用鍼刺令病人致於高涼之處先服辛燥之物然

後刺

陰 凡用鍼刺遇陰風重氣血不行先服溫補之藥然後刺
燥 凡用鍼刺遇夏月煩燥令病人於風涼處先服宣通氣血
之藥然後刺之

車 凡用鍼刺若病人乘車而來其人經絡解㑊不可便刺氣
血定後後刺之

馬 凡用鍼刺若病人乘馬而來必血氣亂而困於身候氣足
然後刺之

八證勿刺鍼之無功

便黑 不拘傷寒雜病若大便黑色皆是真氣絕矣俗云脾勝
死 證勿刺之

吐異 其病臨食之間吐出異色之物後日必死勿刺之
失聽 不拘傷寒雜病暴然耳聾失音不語乃腎氣絕也必死
勿刺之

失明 其目暴然而不見者乃是肝氣絕也必死慎勿刺之
失志 經云便志安寧詩云在心為志心無所存俗言改志後

日必死慎勿刺之

失便 病人不竟大小便自出者乃是大小腸無氣也後日必
死慎勿刺之

失神 老子云氣來人身謂之生神去於身謂之死所謂不離
其身自遺其咎得神者昌失神者亡

失溺 病人不竟小便自出者乃是小腸經無氣也後日必死
慎勿刺之

醫與病者作用

悅愉 樂也和也病者發其信心所刺之處

祝由 自言已病之過從今鍼後再不敢犯也

正已 醫流臨病之處目無邪視心無邪念

敷神 醫與病者各自正已之神

視服 視婦人室女之病度其究愈方寸然後隔衣而刺之

嚴禮 凡請命醫流志誠信意如待賓客

睂目 醫凡用鍼之時心專務一目無他視靜意觀適之變

呪語 凡用鍼之時醫人默默誦其呪語曰大哉乾元成統成

天神鍼到處萬病如拈急急如律令勑鑑

停鍼待氣病人作用

起居 停鍼待氣之間令病人平直坐卧而已

存想 凡用鍼刺病人心無邪念其邪氣易除耳取穴之時令

病人坐卧平直其用鍼順快矣

調嗔 凡停鍼待氣之間令病人忘憂絕慮勿暴喜怒動其心

絕慮 若停鍼待氣之間令病人忘其憂絕其慮者也

鍼畢病人禁忌八法

喜

凡病人鍼畢數日切忌暴喜。則傷神。神既有傷。舊疾不

除。新病又生矣。

怒

凡病人鍼畢數日勿令暴怒。怒則傷肝。其魂無定。血無所歸。何疾不生。

憂

凡病人鍼畢數日勿令暴憂。憂則傷心。心既有傷。則勞倦損於脾。脾損則精粕不化。真氣日衰。榮衛之道滯矣。

恐

凡病人鍼畢數日勿令暴恐。恐則傷腎。腎既傷。則損其志。志損則無養生之道矣。

思

凡病人鍼畢數日勿令苦思。思則傷氣。氣竭血泣。則肌肉不滑澤矣。

勞

凡病人鍼畢數日勿令勞役。勞役則傷氣。氣耗則舊疾不除。新病又生矣。

醉

凡病人鍼畢數日忌大醉。醉則血氣盛。衛氣竭。氣竭則榮

血必脫矣

飽則病人鍼畢數日忌大飽飽則傷筋脈橫解血溢脉滿也

定尺寸法

岐伯明堂經云以八寸爲一尺以八分爲一寸緣人有長短肥瘦不同取穴不準扁鵲明堂云取男左女右手中指第二節爲一寸爲緣人有身長手短身短手長取穴不準孫思邈明堂云取患人男左手右手大拇指指節橫文爲一寸以意消詳巧拙在人亦有差互今取男左手右手中指第二節內度兩橫紋相去爲一寸自依此寸法與人著灸療病已來其病多得獲愈此法有準今以爲定

定灸多少法

凡灸頭與四肢皆不令多灸緣人身有三百六十五絡皆歸於頭頭者諸陽之會也若灸多令人頭旋目眩遠視不明緣頭與

四肢肌肉薄若併灸則氣血滯絕於注下宜歇火氣少時令氣血遂通再使火氣流行候炷數足自然除病宜詳察之

點灸法

凡點灸時須要身體平直四肢勿令拳縮坐默勿令俛仰立點勿令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒好內虛忍痛楚之苦有病先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多宜詳審之

發灸瘡法

凡著灸療病歷春夏秋冬不較者灸炷雖然數足得瘡發膿壞所患即瘥如不得瘡發膿壞其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者故覆底灸令熱熨之三日即發膿出自心愈疾今用赤皮葱三五莖去其葱青於糖灰中煨熟拍破熱敷灸瘡十餘遍其瘡二日自發立壞膿出疾愈

奇穴

內迎香二穴在鼻孔中治目熱暴痛用蘆管子摘出惡血効
鼻準一穴在鼻柱尖上是穴專治鼻上生酒醉風宜用三棱鍼
止血立効

耳尖二穴在耳尖上捲耳取之尖上是穴治眼生翳膜宜灸七
壯不宜灸多

聚泉一穴在舌上當舌中吐舌出直者有縫陷中是穴治噤喘
咳嗽反久嗽不愈苦灸則不過七壯灸法用生薑薄切一片
搭於舌上穴中然後灸之如熱嗽用雄黃末少許和於艾炷
中灸之如冷嗽用款冬花為末和於艾炷中灸之灸畢以茶
清運生薑細嚼嚥下又治舌胎舌強亦可治用小鍼出血穴
在舌上當舌中吐舌出有直縫陷中是穴也

左金津右玉液二穴在舌下兩傍紫脉上是穴捲舌取之治重
舌腫痛喉間用白湯煮入三棱鍼出血

海泉一穴在舌下中央脉上是穴治消渴用三棱鍼出血
魚腰二穴在眉中間是穴治眼生垂廉醫膜鍼入一分沿皮何
兩傍是也

大陽二穴在眉後陷中太陽紫脈上是穴治眼紅腫及頭宜用
三棱鍼出血出血之法用帛一條緊繩其項紫脈即見刺見
血立愈又法以手緊扭其領今紫脈見却於紫脈上刺見血
立愈

大骨空二穴在手大指中節上屈指當骨空陷中是穴治目久
痛及生翳膜內障可灸七壯

中豌二穴在中指第二節骨尖屈指得之治五噎反胃吐食可
灸七壯宜瀉之

八邪八穴在手五指歧骨間左右手各四穴其一大都二穴在
手大指次指虎口赤白肉際握拳取之可灸七壯鍼入一分

治頭風牙痛其二上都二穴在手食指中指本節岐骨間
拳取之治手臂紅腫鍼入一分可灸五壯其三中都二穴在
手中指無名指本節岐骨間又名液門也治手臂紅腫鍼入
一分可灸五壯其四下都二穴在手無名指小指本節岐骨
間一名中渚也中渚之穴本在液門下五分治手背紅腫鍼
入一分可灸五壯兩手共八穴故名八邪

八風八穴在足五指岐骨間兩足共八穴故名八風治腳背紅
腫鍼入一分可灸五壯

十宣十穴在手十指頭上去爪甲角一分每一指各一穴两手
指共十穴故名十宣治乳蛾用三棱鍼出血則大効矣

五虎四穴在手食指及無名指第二節骨尖搘拳得之治五指
拘攣可灸五壯兩手共四穴也

肘尖二穴在手肘骨尖上是穴屈肘得之治癰瘡可灸七壯

肩柱骨二穴在肩端起骨尖上是穴大治癰疘及治手不能舉動可灸七壯

二白四穴即郗門也在掌後橫紋中直上四寸一手有二穴一穴在筋內兩筋間即間使後一寸一穴在筋外與筋內之穴相並治久痔脫肛

獨陰二穴在足第二趾下橫紋中是穴治小腸疝氣又治死胎胎衣不下可灸五壯又治女人乾癥嘔吐又治經血不時

內踝尖二穴在足內踝骨尖上是穴可灸七壯治下片牙疼及

脚內廉轉筋

外踝尖二穴在足外踝骨尖上是穴可灸七壯治脚外廉轉筋及治寒熱脚氣宜用三棱鍼出血

囊底一穴在陰囊十字紋中治腎臟風瘡及小腸疝氣腎家一

切證候參看治之可灸七壯父姓如鼠矢大

鬼照四穴在手大拇指去爪甲角如二葉兩指並起用帛綴之
當兩指歧縫中是穴又二穴在足大趾取穴亦如在手者同
治五癆等證當正發時灸之大効矣

髓骨四穴在梁立兩傍各開一寸五分兩足共四穴治腿疼可

灸二壯

四縫四穴在手四指內中節是穴用三棱鍼出血治小兒猢猻
勞瘵證

中泉二穴在手背腕中在陽谿陽池中間陷中是穴可灸二七
壯治心痛及腹中諸氣痛不可忍者

四開四穴合谷並行間是穴手足共四穴

奇効良方卷之五十五

大醫院經驗奇効良方卷之五十六

正骨兼金鍼門

附論

內經云人有所墮墜惡血留內腹中脹滿不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝下然谷之前出血刺足肘上動脈不已刺三毛各一瘡見血立已左刺右右刺左靈樞云有所墮墜惡血留於內若有所大怒氣上而不下積於脇下則傷肝又中風及有所擊打若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取於肺有所擊墜惡血惡血在於內痛不已可側刺不可遠取之也內經又云肝脉搏堅而長色不青當病墮若搏因血在脇下令人嘔逆金匱云寸口脉浮微而澁皆當亡血設不出汗者其身有瘡亡血故也子和云諸落馬墜井打僕傷損門脣傷折杖瘡腫散瘀痛不止者可峻下之痛止腫消宜以通經散等藥治之此墮墜之病內經靈樞金匱子和所論其詳

獨正骨兼金鍼科惟危氏言其整頓手法折傷手足各有六出
印四折骨背脊骨折法十不治并用藥法則至矣盡矣後田馬
騎啓發前人之書補其闕略經義大同小異此科之書當重危
氏今之學者專攻治外不行診視不明其脉焉知內傷輕重因
此之悞不淺淺哉若能識折傷出血曰瘀插入其窠折傷瘀
依法灰縛明脉理的在何經受證用後項次序之藥終無失誤
之獨可不謹乎今將人之周身總三百六十五骨節開列于後
人身總下三百六十五骨節以一百六十五字都閱次之百
自鎖骨之上為頭左右前後至轄骨以四十九字共閱七十
二骨者中為節顎骨者一有勢筋一無勢筋及有筋次顎為體骨者一有筋
隨體前為項威骨者一無筋人無此骨體後為膺骨者一有筋
膺左為枕骨者一無筋枕就之中附下為天蓋骨者一有筋下物
之本蓋骨之後為天柱骨者一無筋蓋前為木骨者一有筋

後合於腦骨

言下爲舌本骨者左右共二

有勢塞前無隙

爲脣

者一

無勢無隙

額下爲伏委骨者一

骨是半無勢屬伏委之下為

俊骨者一

附下即眉之分也無勢屬

眉上左爲天賢骨者一

無勢屬眉

上右爲天貴骨者一

自晴上直

左晴之上爲智宮骨者一

無勢屬

右晴之上爲命門骨者一

兩精之下中為鼻之分也無勢屬

鼻之前爲梁骨者一

無勢屬

篠梁之左爲顴骨者一

有勢無隙

篠梁之左爲糾骨者一

無隙屬

梁之端爲嵩柱骨者一

無勢屬

左耳爲司正骨者一

無隙屬

爲納邪骨者一

同上

正邪之後爲完骨者左右共二

無隙屬

邪之上附內爲噬骨者一

少陰屬

噬後之上爲通骨者左右前

後共四

有勢屬

噬上爲喙骨者一

熱勢屬

領爲乘骨者一

多液屬

右領爲車骨者一

同上

乘車之後爲轍

骨者左右共二

有勢屬

乘車上下出齒牙三十六事

無勢屬齧

不齧復次鉏骨之下爲體中左右前後至襟以四十字闡允

則

卷之六

鎗中之後爲脊，竈骨者共二十二

上後天
卦有

脊竈次下爲大幼

骨者一

上通天在井二十四推

大動之端爲歸下骨者一

之後爲纂骨者一

此骨起限精微歸

歸下之前襟骨者一

道家謂歸下

次缺盆之下左右至襯以二十五字閏六十骨

此下止分兩半骨

則至貧前支缺盆爲飛動骨左右共二

支其缺盆之後爲區甲骨者左右共二

有勢無流歸

區甲之端爲甲

隱骨者左右共二

生骨長前

則至貧前支缺盆爲飛動骨左右共二

消病解次飛動之左爲龍膚骨者一

有勢無流次飛動之右爲虎

衡骨者一

同上

龍膚之下爲龍本骨者一虎衝之下爲虎端

骨者一

並有勢有流

本端之下爲膀也龍本上內爲進賢骨者一

男子此骨名臣虎端上內爲及爵骨者一

敵人牛骨高為命婦

膀前左右爲

上力骨者共八

多流次上力為駐骨者一

同上

骨爲搦骨者左右共十

次上力為助勢骨者左右共十

無勢復次駐骨者一

骨爲搦骨者左右共十

次上力為助勢骨者左右共十

無勢復次駐骨者一

外為山右助骨為甲爪甲之下各有腕骨左右共十

無勢復次駐骨者一

無勢復次駐骨者一

下左右前後至初步以五十一字開

一百三十六骨此下至

兩乳下分左右自兩足心衆骨所會屬也鶻鶻之下爲心腋

骨者一無筋鶻鶻之左爲腸骨者上下共十二

君外陽之分也

左脇

之端各有脇隱骨者分次亦十二無筋腸骨之下爲心腋

者共二多筋季脇之端爲季隱骨者共二無筋鶻鶻之右爲

肋骨者共十二

屬大陽之分也

肋骨之下爲眇肋骨者共二

賂無筋有之

右肋之端爲肋隱骨者共十二無筋橫骨之前爲白環骨者

一少筋橫骨之前爲白環骨者共二有筋白環之前爲內輔

骨者左右共二有筋內輔之後爲骸關骨者左右共二

同上

骸關之下爲捷骨者左右共二同上捷骨之下爲髀樞骨者

左右共二有筋髀樞下端爲膝蓋骨者左右共二無筋膝蓋

左右各有俠升骨者共二有筋髀樞之下爲蹠骨者左右共

二多筋蹠骨之外爲外輔骨者左右共二有筋蹠骨之

有筋外輔骨之

立骨者左右共二

同上

立骨左右各有內外踝骨者共四

少許踝骨之前各有下力骨者

左右共十

有勢少許踝骨之後各

有京骨者左右共二

有勢少許下力之前各有釋欹之前各有起

仆骨者共十

有勢

仆骨者共十

有勢少許起仆之前各有平肋骨者左右共十

有勢少許平肋之前各有腕甲骨者左右共十

骨者左右共二

有勢多寡起仆之下各有初指骨者左右共二

有勢少許人則無此骨

無舊有後文凡此三百六十五骨也天地相乘惟人至靈其

女人則無預感左洞右棚及初步等五骨止有三百六十骨

又男子女人一百九十九骨或隱或觀或無體勢餘二百五十

六骨益有髓液以藏諸筋以會諸脉谿谷相需而成身形謂

之四大此骨度之常也

論手有四折骨六出曰凡手臂出曰此骨上段骨是曰下段骨足杆四邊筋脉鎖定或出曰亦剗損筋所以出白此骨湏拽子

直一人拽頭用手把定此間骨搘教歸窠看骨出那邊用
片夾定一逢一邊不用次須在屈直處夾纏服藥後不可放定
或時又用拽屈拽直此處筋多喫藥後若不屈直則恐成疾日
後曲直不得

肩胛上出旧只是手骨出旧歸下身骨出旧歸上或出左或出
右須用脊杆一枚矮凳一箇令患者立凳上用杆擰在於出旧
之處或低用物墊起杆長則墊凳起令一人把住手拽去凳一
人把住脊杆令一人助患人放身從上坐落骨節已歸窠矣神
効若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩梯股中過用手把
住木棒正後在出白腋下骨節蹉跌之處放身從上墜骨節自
然歸回矣

脚六出句四折骨或脚板上交所露出的須用一人拽去自用
手摸其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拽歸外或骨突

向外湏用力搘歸內則偏窠苦只拽不用手整入窠內設成坎
腳膝出白與手臂肘出白同或出內出外亦用一達灰定此處
筋脉最多服藥後特上用石直不可定放又恐再出窠時上看
顧不可疎慢

正骨金瘡項看脈很如傷筋脉致命處一觀其脈虛促危矣傷
處淺命脈虛促亦為後慮傷至重命脈和緩亦無慮也脈有虛
有實有去來有踴脈或被傷截脈不犯者必閑脈實重則無慮
或傷至死處其閑脈無別脉以大則難醫如用兩半藥後脉不
轉動急急住藥若脉漸上隨藥轉此則可治無慮或血出甚者
脉不要洪大只要平正重實其血不會出者亦無惡血在內其
脉欲洪大不要疎密亦不要進退來去恐其變故看傷脉每與
內科脉不同或傷內或致命或難醫處被傷者命脉便已去矣
此等切勿治之

中不治證

獺犧損傷或被傷入於肺者縫米即死二三日難過 左脇下傷透內者 脣傷斷一半可醫全斷者不可治 小腹下傷內者 蓋混繁多者 脉不實重者 老人左股壓碎者 傷破陰子者 血出盡者 有內耳後傷透於內者皆不必用藥

腸肚傷治法

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷破而不斷者 皆可治療 脣及肚皮破者用花乳石散傳線上輕用手從上縱之莫待糞出倩油擦活於入肚內 肚皮裂開者用麻縷為線或鵝糞白為線亦用花乳石散傳線上須用從裏重縫肚皮不可縫外重皮留外皮間用藥捻待生肉

用藥加減法

凡瘍若不折骨不碎骨則不可用自然銅於藥內除去無灰粉

不用半夏

老人有傷者骨脉冷每用加當歸川芎川烏

一、脊人參半兩去白芍藥生地黃此亦是二十五味藥內加減

老人服此

或傷臟腑者不問老少如有血并癥從口中出者

黑滑心藥加

丁皮川芎半夏入二十五味內同服

或皮膚熱

方黃柏皮皂角半兩入二十五味藥內同煎服

用麻藥法

頭項拘急骨肉疼痛整頓不得先用麻藥服待其不譏痛處方

可下手或服後麻不倒可加蔓陀羅花及草烏五錢用好酒調

些少與服若其人如酒醉即不可加藥

被傷有老有幼無力有血出甚者此藥逐時相變入用不可過

多亦有重者若見麻不倒者又旋添些更未倒又添酒調服少

許已倒便住藥切不可過多

用檸檬法

瘡口血出不止則用方中止血藥傳之如洗開後瘡孔大其且先用降真膏龍骨後藥粉之內即生瘡孔上以用油龜貼特膿血汗出莫待敵塞如夏月用藥以薦荷葉貼瘡孔一日一度煖洗又用藥粉如肉上爾瘡口用手搗不痛如好肉一般即用收瘡口藥傅上却莫貼特風稍瘡口立收若未生實肉切不可先收瘡口裏面恐為患也

傷破肚皮用藥法

如傷破大肚腸與脂膏俱出放入內則縫如孔小只有膏出先用清心藥与服用手擘去膏不用綿此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍只須擘去不妨此是腸肉但放心去之肚肉破傷者專用退利大小腸不可待秘恐成重患

打擗及樹木壓傷身痛者

打擗樹木壓或自高處擗下者此傷皆驚動四肢五藏必有

惡血在內專怕惡心先用清藥打血藥及通大小腸藥次第先服臨服加童子小便入藥內立効專用大小腸洗利恐作隘塞利害之甚清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無閼煩無惡血污心以次用止痛藥服之即止

去惡血法

擗撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清小便三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口出或結在內用藥打入大腸時即泄或被打被擗破木僵惡血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上膈者打後口中吐出或歸中膈打人六腸泄出先用此急投次服止痛藥即二十五味藥中加減用

用藥湯使法

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後用童便二盞同服或止痛重傷者則用姜湯燈心湯調二十五味藥服之薄荷湯

亦可

凡傷或刀傷及損內臟腑恐作煩悶崩血之患如折骨者用姜酒服接骨藥傳之如骨碎被重打重擗重木及石壓者皆用先服湯使法並未用酒服如輕擗撲損傷則用姜湯調下二十五味藥立効

正骨通治方

傷寒活血湯 治從高墜下惡血流於脇下疼痛不可忍

大黃

酒浸五分

柴胡

當歸各二分

桃仁五十箇研如泥

紅花

半分

天花粉

川山甲炮

甘草各一分

右作一服用水一鐘酒半鐘煎至八分食前服

補損當歸散 治墜馬落車及打傷折傷

當歸

芎藭各七分

附子去皮鹽炙各二分

澤蘭炒各一兩

桂心

四分

蜀椒三分

甘草炒五分

右為細末每服一錢食前用溫酒調服日三服忌海藻芩

菜生葱冷水

沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍者

沒藥

別研

乳香

別研

內桂

去皮

當歸

焙

白芷

甘草

各一兩

白木

炒五

右為細末研匀每服二錢不拘時溫酒調服

二十五味藥 治撲跌損傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並

皆治之

香白芷

醋炒

紫金皮

醋炒

劉寄奴

川當歸

鹽炒

赤芍藥

米泔水浸

黑牽牛

川牛膝

蘇木

生地黃

鹽水浸炒

川芎

乳香

沒藥

破故紙

醋炒

木通

自然銅

骨不碎多用

鈎藤

好用

草烏

醋炒孕漏不用

木香

川烏

火燒孕漏不用

蘆香

骨碎補

木賊

官桂

羌活

獨活

一兩上各

熟地黃

益水炒
杜牛膝各半兩

金刀傷挫臼者去自然銅骨碎骨折者用之然須於此方內去自然銅臨好時却入用之如早服以成他疾同研為末用蜜為丸如彈子大用黃丹為衣或披瀝搘損傷金刀箭鏃不問輕重每服一丸溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刀傷全斷內損重者以薄荷湯或木瓜湯姜湯燈心湯皆可服病在上食後病在下食前在中者不拘時服

凌霄降聖丹 治打撲傷損筋斷骨折擊急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛有拘急身體倦怠四肢少力

凌霄

別研

當歸酒浸

白芍藥

骨碎補

去毛炒

川烏頭

生去皮

自然胡

火燄

乳母十二次研末

飛過

各一

兩

生地黃

川芎

各一
兩半

右為細末以生姜自然汁與煉蜜和丸每一兩作四丸每
服一丸搗碎用酒水各半鍾入蘇木少許煎至八分去蘇
木空心服

花蕊石散 治一切金刀折傷打撲身體血出急於傷處摻藥
如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調二錢服
之立効若牛船腸出不損者急送腸入用細絲或柔白皮
為線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用麻線
縫之亦可並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤
之然後摻藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不
下並用童子小便調服

花蕊石

一兩
為細末

硫黃

上色明者
兩半
為末

右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟罐子一箇候乾入藥

於內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字
用炭一杆籠疊周匝於巳午時從下着火令漸漸上徹直
至經宿火冷炭消又拔經宿罐冷取出細研磁瓶內盛依
前法

加味芎窮湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血如豆汁

芎窮

當歸

白芍藥

百合水浸日

荆芥

各二

右作一服水一鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

導滯散 治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止或瘀血

在內脅腹脹滿喘促氣短

當歸

大黃

各二

右為細末每服三錢不拘時溫酒調服

木紫金皮散 治打撲傷折內損肺肝

紫金皮

降真香

補骨脂

無名異

燒紅酒
半七步

川續斷

琥珀另研

牛膝酒浸

槐仁去皮

當歸洗

蒲黃醋一

大黃溫性

朴硝另研各

右為細末每服二錢食前淡酒蘇水當歸酒調服

沒藥丸

治打撲內損筋骨疼痛

沒藥

乳香

川芎

川椒去目及
合口者

芍藥

當歸各半

自然銅

一半火燒
碎七次

右為細末用黃連二兩研開入藥末不住手搗勿丸如彈子大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨有瘀血速服二三丸立効

活血散 治打撲傷折手足

右用菜豆粉新鐵銚內炒令紫色用熱酒同熱醋調令成膏傅貼瘀處用紙花蓋貼將杉木一片或二片傅定其效

如神

萬金膏 治癰疽發背諸般瘡癥從高墜下打撲傷損脚膝生
瘡年年癰瘍五般痔漏一切惡瘡並皆治之

龍骨

鼈甲

苦參

烏賊魚骨

黃柏

黃芩

黃連

猪牙皂角

白芨

白欵

厚朴

木鼈子仁

草烏

川芎

當歸洗焙

香白芷

淡藥另研

乳香另研各

槐枝

柳枝各四寸長

黃丹炒過半斤

清油四斤

右除乳沒丹外將諸藥於油內慢火煎紫赤色去滓秤淨
油三斤放鍋內下丹不住手攪令黑色滴入水不散及不
粘手下乳沒末再攪匀如硬入油少以不粘手為度
洗藥荆葉散 治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛

頑荆葉一兩

白芷

細辛去苗

蔓荊子

桂心

川芎

丁皮

防風去芦

羌活各半

右作一服入鹽半匙連根葱五莖水五升煎取二升去
滓通手淋洗痛處冷即再易避風處洗之

玉真散

治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者

防風

南星各二

右為細末每服三錢童子小便一大鍾煎熱調不拘時服

急風散 治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折口噤不語
手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之

麝香另研

砂砂一兩

生黑豆半

草烏三兩半

燒存性

右為細末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出箭頭

先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼术大兩 川烏炮去皮 二頭尖四兩草烏炮去皮

防風

細辛各二兩半

白术

川芎

白芷各一兩半

蝎梢僵少

雄黃各半

一字散

治破傷風

金頭蜈蚣

一隻去頭足

草烏

大麻酺半

全蠍一隻

脊白芷三錢

右為細末每服一錢不拘時酒調下如損骨折乳香五錢

拘時服

聖金皮散

治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮鴉頭

南星

半夏

川當歸

黃柏炒

草烏炮

川烏炮

杜當歸

川芎

烏藥

破故紙

川白芷

鹽水

劉寄奴

川牛膝

桑白皮

芍

右為細末生姜薄荷汁兼水調傅腫處或傷處皮熟甚加
稍皮生地黃半兩有瘡口者勿封瘡口四邊傅之
草烏散 治傷骨節不歸窠者用此麻之然後下手整頓

白芷

川芎

木鼈子

猪牙皂角

烏藥

半夏

紫金皮

杜當歸

川烏

船上茴香

草烏

芍一兩半兩

右為細末諸骨碎骨折出臼者每服一錢好酒調下麻倒
不知疼處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋
歸元端正用夾板夾縛定然後醫治或箭鑽入骨不出亦
可用此藥麻之或鐵鉗拽出或用鑿開取出若人昏沉後
用鹽湯或鹽水與服立醒

川芎
烏藥
破故紙
川白芷
鹽水

芍

劉寄奴
川牛膝
桑白皮

川牛膝
桑白皮

桑白皮

芍

白芷
川芎
木鼈子
猪牙皂角

半夏
紫金皮
杜當歸

木鼈子
猪牙皂角

杜當歸

烏藥
船上茴香
草烏

川烏
船上茴香
草烏

紫金皮
杜當歸

杜當歸

川烏

船上茴香

草烏

芍一兩半兩

川芎
烏藥
破故紙
川白芷
鹽水

芍

劉寄奴
川牛膝
桑白皮

川牛膝
桑白皮

桑白皮

芍

白芷
川芎
木鼈子
猪牙皂角

半夏
紫金皮
杜當歸

木鼈子
猪牙皂角

杜當歸

烏藥
船上茴香
草烏

川烏
船上茴香
草烏

紫金皮
杜當歸

杜當歸

川烏

船上茴香

草烏

芍一兩半兩

白膠香散

治皮破筋斷

右用白膠香為末傳之又方金沸草根搗汁塗筋封口便可相續止痛

應痛丸 治折傷後為四氣所侵手足疼者

破故紙

骨碎補

去毛蒼术

生用

草烏各半

川山甲

去膜桑柴灰炒泡

船上茴香

炒各六兩

右除草烏半斤用生姜一片搗爛同草烏一處捲兩兩宿乾為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸用酒或米湯送下忌熱物

乳香散 治打傷損手足疼痛不可忍者

乳香

另研

沒藥

另研各

白芷

二分

肉桂

五分

白术

炒

當歸

炒

粉草

各五分

右為細末研勻每服二錢不拘時酒調下

破血散

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼若楚不

可轉側

羌活

防風

肉桂
錢一錢另

水蛭

炒研半錢另

柴胡

當歸稍

連翹
錢二錢另

麝香

少許另研

右作一服水一鍾酒一鍾前至一鍾去滓入水蛭麝香末
調勻不拘時溫熱服

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下留在太陽經中令人

腰脊或腫脹臂腰中痛不可忍

地龍

官桂
各九分

蘇木
各九分

麻黃
七分

黃柏

當歸稍

甘草
錢一半

桃仁
元龜

右作一服水二鍾前至一鍾食前服

調經散

治趺撲損傷疎利後用此藥調理

川芎

當歸

芍藥

黃芪

錢半

青皮

烏藥

陳皮

熟地黃

乳香

另研

茴香

錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

治金瘡白藥

黃柏

黃芩

當歸

赤芍藥

黃芪

牡丹皮

生地黃

木鼈子去殼

黃連

地骨皮

桑白皮

甘草

錢半

白芷

馬蓼

稍葉

生者一錢

火燄過

右用桐油二兩煎黃色濾去滓再煎油稍熟入細白板松
香一片慢火煎湧頻上柳枝攪勻却入乳香沒藥綃丹各
七錢煎數沸出火頭時以少綿鋪於前瀝藥滓布上瀝過
先用瓦鉢滿盛清水八分却瀝藥於鉢水中將去清水中
如綑麪狀綑三二百度愈綑愈白故名白藥常以清水浸

傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧一
寒金傷量傷孔大小取一塊填於傷孔中以白紙護之隨
手不疼一日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同
前收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打搣只敷於油紙
上貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑

定痛乳香散 專治金傷並折骨打撲傷損

乳香

沒藥各二錢

敗龜板一兩紫金皮二兩

當歸鬚

骨碎補

虎骨 鹰鵰各穿山甲炒炮

半兩錢

五箇如無以自然
火煅醋淬代之

右爲細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服搣上者
食後服搣下者食前服

生肌止血立効方

治全瘡辟一切風冷續筋骨

石灰

二升和作
生地黃清萬計
火煅赤如研

狗頭灰細研

芎藾

父葉

地松

蜜陀僧
兩半

黃丹一兩

麒麟竭細研三分

右爲細末研勻密封之每遇金瘡傅之

太乙膏

治金瘡箭鏃不問輕重并癰疽毒用此傅之

白芷

蒼术

石膏醋炒

白膠香

乳香

沒香

黃丹錢五

右爲末用真麻油四兩桐油亦可以黃蠟一兩先煎油柳枝搗次入白芷等煎少頃却入白膠香石膏得同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布瀝過瓦器收藏用油單紙攤之損傷傅瘡口自然肉不痛速愈

百草散

治金瘡

右五月五日一旦使四人出四方各於五里內採一方草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切瓦礫

并石灰極令燭熱一石草齧一斗石灰先置大寶中桑
令可受藥取藥納孔中實禁令堅仍以桑樹皮蔽之用麻
油搗石灰極粘密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使堅牢
至九月九日午時取出陰乾百日藥成搗之日曬令乾更
搗紩篩貯放凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹治使
牢勿令動轉不過一日不差不腫不膿不畏風若傷後數
日始得藥湏暖水洗令血出然後傅此藥大驗平時無事
宜多合以備倉卒金瘡之要無出於此一方云採時不得
回顧住意摘取方回入杵臼內爛搗如泥量藥多少以意
入石灰和勻取出拍成膏日中曝乾遇用旋取撲碎若刀
斧傷乾傅取血止為度湯火傷冷水調開塗傅蛇蝎大鼠
咬傷先以溫水洗以津液調傅疥瘡先狐瘡以藥末乾貼
濕瘡以醋調傅其効如神

凡殺傷不透膜者

右用乳香沒藥各一皂子大研爛以小便半盞好酒半盞同藥通口服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨為末傳瘡口上立止

殺傷氣偶未絕

右取葱白熱鍋炒熱遍傳傷處須即再易其膏自止但青葉亦可

灰彈散 治刀斧傷血出不止及多年惡瘡

右用多年石灰細研鷄子清調成團煅過候冷再研細若刀斧傷摻之患癩若多年惡瘡以薑汁調傳一方單用石灰摻患癩定並瘥

神仙刀箭藥

右取桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾為末傳之一方用

新桑葉研取白汁塗之能合金瘡

治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者

右用平胃散以薑汁調傅若急卒只以生薑和皮燭搗捲患處止痛截血且無疤痕

又方

用海螵縫內久年油灰研碎摻之佳

藥蛆方 治金瘡內爛生蛆者

右以皂礬飛過乾貼其中即死

池渝絹煎 治刀刃所傷內損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神効餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作燼子引散藥入瘡裏面

候長肉出外其痕即有合

地榆

入兩洗淨
搗為細末

絳一斤小
薄者

右用清水洗净絳糊以炭灰淋清汁二斗煮絳灰汁盡為度絳以爛熟擘得成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水二斗入地榆末煎煮熟爛以手撲看不作絳片取入砂盆研之如麪糊得所分為二服片白粳米粥飲調空心服之服了仰卧不得驚動轉側言語忌一切毒食熟爛黃雌鷄白米軟飯餘物不可食之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其特養一月內切須慎護如是產後所傷服一疋分作四服每服粥飲一中盞調服日一服

治刀傷及竹木刺出血

右急以自己小便淋洗三二次立止不妨入水

治金瘡

右以牛蒡葉貼之永不畏風亦不潰膿及搗傅之

麒麟竭散 治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風

麒麟竭

白芨各半

黃柏

家陀僧

白芷

白斂

當歸炒

甘草炙各兩

敗努筋散

治金刃弓努所中筋急不得屈伸

敗努筋

燒作

藜蕘去苗

杜仲去皮

熟地黃

炮炙各兩

附子炮

當歸切

大棗三枚

肉桂取

右爲細末每服二錢七溫酒調下空心日午夜卧各一服
一方有續斷無大棗

治傷筋骨續筋方

右取旋伏根搗汁滴瘡中仍用滓傅瘡上封之二十日即

筋骨便續更不用易

磁石散 治金瘡腸出宜用之

磁石散研

滑石研

鐵精各三兩

右為細末研勻每服一錢七溫酒調下空心日午晚間各一服仍以鉗砂塗腸上其腸自收入一方用白米飲調服

一方無鐵精

治破傷腸出不斷腸出欲燥而草土着腸者

右作大麥粥取汁洗腸內之常研米粥飲之二十日始
稍作強糜百日後可瘥草土當取在皮外

治金瘡中腸出不能入者

右以小麥三升用水九升煮取五升綿瀝過候冷舍噴瘡
上漸入以冷水資其背不宜多令人見亦不欲令他人語
又不可令病人知或尚未入取病人卧席四角令病人舉

身搘湏臾腸自入十日內食不可飽頻食而少勿使病人驚匕則殺人

治金瘡勝出者

右以桑白皮作線縫之更以熱鷄血塗上立愈瘡藏剖勝用此法効

雄黃散

治藥毒箭頭在身未出

雄黃

細研
一分

粉霜

細研
半两

姚娘

四錢研
未生用

巴豆

三粒去皮細別
研末用

右同研勻以銅筋頭取乳汁塗金點瘡上頻頻用之七日瘡熱箭頭自出

藍汁飲 治毒箭折中

右搗藍汁一升飲之滓傅瘡上若無藍取青布清絞汗服之并淋瘡中鏟不出搗鼠肝塗之鼠腦亦可此

自此

貝子散

治毒箭

右以貝子搗爲末每服一錢七溫酒調下拘時日三四服此方治中毐并金瘡止痛

紅散子

摩金瘡上

草烏尖

麒麟竭

茄子花

蔓陀羅子

蓖麻子

去殼細研
名半酒

右爲細末好酒調如膏瘡口上塗摩之箭頭自出

牡舟散

治金瘡箭頭在骨遂年不出

牡丹皮

去心

白欽酒

一

桑白皮

二兩藿香葉
研一分

丁香

麝香

研一分

右爲細末每服二錢七溫酒調下日三服淺者十月深者

二十日箭頭自出

蟾蜍丸

治金瘡箭簇在骨中遂年不冰者

蟾蜍

五枚乾者

蛤蚧

三枚乾者

赤小豆

一分

赤鱗魚

二两

硇砂

一钱

紅花

末三錢

石研細以蘇研和丸如芥豆大丸有瘻口只於瘻口內結一丸如無瘻口以針撥破內藥不過三丸至五丸箭頭自動輕搖即出

出箭頭方

蟻娘

自死者十箇

土狗子

三箇

婦人髮灰

少許

右將蟻娘去殼取白肉與二味同研如泥用生金中箭處如膏塗後內微牽即以兩手摩之其箭頭自出

解骨丸

治箭鐵不出

雄黃

研

蟻娘

研

象牙末

名等分

右爲細末煉蜜和丸如黍米大內瘻口內後細嘴羊腎脂

貼之覺牽箭頭自出

治箭鏃入骨取不出疼痛宜用此方

巴豆三粒 蟻蠅三粒

右研金所傷瘡候痛定微痒忍之極痒不可忍即懾動拔出次用生膏藥傳之以黃蓮貫眾湯洗畢以牛膽製風化石灰傳之兼治惡瘡

夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傳之說者云兼治瘡鄆得方後至洪州旅舍主人妻患瘡呻吟鄭遂用此方試之愈

治箭頭不出方

礞石生蠅研雄黃三粒

右同研勻每服二錢七空心菉豆汁調服十日後輕撥便出手足上用此藥貼之自出

取箭鏃方

右用天水牛一箇獨角小者尤妙用小瓶盛之用硼砂一
錢研細用水少少滴在內浸自然化水以藥水滴在傷處
箭頭自然出也

淮西總管趙領衛名萬鈞巖密之子云仇防禦方張循王
憂求不得因奏知德壽宣取以賜之有奇効與楊氏方中
用巴豆燒娘者大率相似

治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸癥不出者

右用鼠肝五具細切爛研傳之兼以鼠腦或鼠頭血塗
之並良亦治人針折在肉不出并刀刃傷

牛膝膏 治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸癥不出者

右搗牛膝不拘多少為末以熱水調塗箭頭即出若火瘡
灸瘡不癒者塗之亦効

治箭頭在肉不出方

右以白項蠅十四條內銅器中次入鹽一兩於日中曝並化作汁塗有箭鏃并刀傷處須臾則出

又方 治箭頭及諸刀刃在咽喉胃膈諸處不出者
右嚼杏仁不限多少塗之一方研杏仁細傳之

又方 治箭鏃中傷在咽喉胸膈不出及針刺不出者
右用蠍姑即土狗魚乾者濃煎汁滴上三五度箭頭自出

一方以蠍姑腦十枝細研塗瘡上亦出

胤油膏 出箭頭

胤取
一枝燒熟

蠍姑

皂角 燒灰

定粉

龍骨

鑠

乳香另研

右爲細末以胤內和成膏點薄在瘡口內其上更用磁石
末蓋之箭頭自出

神聖膏 取針浸入皮膚

車脂鈎妙

右成膏子者好攤在紙上如鐵許二日一換三五次其針
自出大有神効

附醫散

一名內補散
一名葵蕊散

治金瘡去血多虛竭此藥內補

內補散

川椒味炒出汗并合

當歸散

微炒

川芎

桂心

黃芩

桑白皮

吳茱萸

湯浸炮炒

白芍藥

甘草

炙各半兩、肉桂各四兩酒浸一宿去皮炒乾

寧朴

去粗皮薑汁炙各二兩

人參

黃芪

去粗皮薑汁炙各二兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服一方有白

芨無黃芩桑白皮

附醫散

治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱內補

黃芪

當歸

白芷

苦窮

乾薑

黃芩

芍藥

續斷

北二兩上名

附子半兩

細辛一兩

鹿茸三兩

右為細末每服五分以食前酒調下日三服稍增至方寸

七一方無芍藥

蒲黃散

治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃

生地黃各半兩

續斷

巴上冬草

當歸

三錢

芎藭

白芷

續斷一兩

甘草

三分

右為細末每服三錢七空心酒調下日三四服血化為水而下若口噤幹開口與之仍加大黃一兩半

如神散

治一切刀斧所傷血出不止并久患惡瘡

虎骨炙研

鉛丹火硝各半兩

龍骨研各半兩

乳香大者另研

膩粉研

丹砂研各半兩

麝香少許另研

右研極細匂一切瘡以黃連湯或益湯洗拭乾擦藥在瘡上不得衣粘著瘡口

金傷散

治金刀箭鐵所傷血出不止及落馬打傷內綻血出

白芨

黃欽

乳香

一兩

各石灰半錢

龍骨

牛二兩

黃丹

少許

右為細末入黃丹研如淡紅色每用乾擦患處上用軟紙

更以綃帛裹護忌風水乾痂急妙

定血散

治一切刀傷血出不止收斂瘡口

南星生

梔花

麝金

四分

各半夏

生用二兩

乳香研

沒藥

另研各二錢半

右為細末

研勻每用乾擦患處忌水洗

神仙止血散

龍骨

五色緊者

阿子

去核各

苧麻葉

酒用五分五

日午

白石脂

半

右為細末每服一錢半食遠水調服之如修合時忌婦人

鶴大見

治金刃或打傷血出不止

降真香末 五倍子末

銅末是削下鏡面銅於
乳鉢內研細等分

右拌勻傅損處昔安豐李擊朱嵩碎首用此而愈

治金瘡傷損血出

右用生牛膽入石灰末候乾摻上即止以臘月牛膽入風化石灰懸當風處候乾用

五倍散

治金瘡血出不止亦治痈瘡

右以五倍子生研為末乾貼血立止

神奇散

治刀斧傷并箭傷血出不能止者

麒麟竭研

沒藥研

自然銅研

南星炮

乾薑燒灰

鉛丹炒黑

膩粉

瓦礬各一

麝香少許

右為細末和匀先以鹽湯洗瘡却以燒葱搗汁塗之然後
捲瘡上三二次

軍中一捻金散

金櫻葉、

嫩苧芽各二

桑葉一

兩

一

酒

右搗爛傳若欲致遠陰乾作末用線傅上血止口合名草
蠅經進方以五月五日或閏日收藥良

治金瘡出血內漏

右用蝙蝠二枚燒煙盡為末以水調服方才七令一日服
盡當下如水血自消也

治諸傷瘀血不散

右於五六月收野苧葉搗爛盦金瘡上如瘀血在腹用順
流水搗爛服即通血皆化水以死豬血試之可驗吹日久
無棄可早收之

生乾地黃散

治金瘡煩悶

生乾地黃

白芷

當歸

丸

桃仁

去皮尖
上熟炒

續斷

黃芩

赤芍藥

分

甘草

炙各

芎藭

桂心

各三

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

白薇散

治金瘡煩悶不得眠卧疼痛

白薇

枳實

炒

辛夷仁

瓜蔞根

赤芍藥

甘草

炙各

酸棗仁

微炒

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

琥珀散

治金瘡弓弩箭中悶絕無所識

右用琥珀研如粉以童子小便調一錢服三服

高祖時

寧州貢琥珀枕碎以勝軍十全金瘡

蒲黃方 治金瘡中風寒水露腫痛入腹

右用蒲黃并麝青布內在小口瓶中燒取煙薰發汗出愈
虎骨散 治金瘡中風痙肢節筋脉拘急

虎胚骨酥多當歸微少 賓龜板酥少桃仁去皮尖少仁尖少黑豆一兩各黑豆五合松脂二兩

桂心三分

右先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥搗為末每服二錢
不拘時溫酒調下

豆淋酒 治因金瘡中風反強者

大豆六合 鷄矢白一合

右炒令大豆焦黑次入鷄矢白同炒乘熱瀉於三升酒中
塞蓋良久瀝去滓每服五合如人行五里更一服汗出佳
末瘥即更作服之汗出為度服後宜喫熱生薑粥投之
靈封方 治金瘡中風角弓反張

生鷄子一枚烏麻油三兩

右先將鷄子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗刮瘡上
文方 治金瘡中風痙厥死者及諸大脉皆血出多不可止血
令則殺人

右用生葛根一斤剉碎以水五升煮取三升去滓每服熟
飲一小盞日三四服若乾者搗為末每服二錢溫酒調服
若口噤不開但多服竹瀝即止

葫蘆方 治金瘡得風身體痙強口噤不能語或因打破而得
及刀斧所傷得風暗死眼此並瘥

右取末開葫蘆一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡
大小相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔取麻子
油燭兩條並燃以葫蘆口向下薰之燭盡更續之不過半
日即瘥若不止亦可經一二日薰之以瘥為度若燭長不

得內葫蘆可中折用之

必効酒 治金瘡中風角弓反張者

右用蒜四破去心頂一升以瓦灭酒四升煮蒜令極爛并
滓每服五令頓服之須臾得汗瘥

豆淋酒 治金刃傷破見骨中風口噤

右用大豆炒去腥半熟勿使太熟五升粗搗篩蒸一餚頃
傾出金中以酒一斗五升淋之絞去滓每溫服五合至七
合日二夜一衣蓋覆微汗出別研生杏仁膏傅於瘡上若
膿竈出者難救

治金瘡因風水腫

右取蠅不以多少熔化入鹽少許滴在瘡上或先以鹽罨
瘡上後熔蠅令熱得所灌瘡中亦可

艾葉方 治金瘡中風掣痛并手足不仁

右用文葉生熟者令揉圓得所內瓦甌中塞諸孔燭留
目以通氣無蒸患處良久身體自知立愈

龍骨散

治金刃箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡歎口

龍骨

滑石

枯礬

寒水石

乳香

沒藥

黃丹半兩各

輕粉

右為細末每用乾擦外用膏藥貼之効

金傷散

治刀斧傷碎風生肌止痛

白芨

黃丹

陳石灰

風化桑白皮各二兩

龍骨

南星

白附子

兩

右為細末每用乾貼之

完肌散

治金瘡

陳石灰

二兩黃芩半兩

龍骨

密陀僧

桑白皮

四

麝香另研

右為細末乾掺禹心處

生肌膏 治金瘡又一切打仗瘡

胡粉 白芍藥 黃耆

黃連香

乾薑炮酒

油四兩 黃耆三兩

右為細末以油蠟相和前如膏用貼瘡上日二換之

劉寄奴散 欽金瘡止疼痛

右取劉寄奴為末患瘡一方治湯火瘡以劉寄奴為末先以糯米將鷄翅掃傷瘡後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡傷著急用炒鹽末捲之護肉不壞然後藥傅之

朱氏集驗方云宋高祖劉裕徵時伐狄見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼聲往視之見青衣童子數人於榛中揭藥問其故答曰我王為劉寄奴所射合藥傅之帝曰吾神何不死答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆崩

收藥而反每遇金瘡傳之良驗寄奴高祖小字也

治金瘡生肌肉

右生楊粧白以火封之更以火就灸令熱氣徹瘡中乾即易之白色者好亦治金瘡中風水腫痛

止血收瘡口方

右以鷄內金焙為末傅之立止

蠶殼散

治刀斧傷止血定痛生肌

右用晚蠶殼不以多少為細末每用乾貼於瘡口上以綿裹不須再動一止便可

定血散

治刀斧傷止血定痛生肌

蜜陀僧

半斤烏賊魚骨

龍骨

白礬若硝

桑白皮

一斤黃丹

一兩

右為細末每用乾捲患處定血如神

綠礬散

治竹草刺瘡發腫作疼傷時不曾出血盡被惡毒氣注痛不止夜卧不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三五重皮是也

濕礬

半兩小便燒熱放礬丹參二錢

麝香一字

馬兜鈴根

半錢

右為細末漿水洗淨瘡口上敷貼立効

又方

治被刺入肉或鍼棘竹木等多日不出疼痛

人參

一兩

龍葵根

一把淨

醋少

臘月猪脂

二兩

右為末和搗令勻每用少許傅瘡上其刺旬出

治手足卒中刺中水毒方

薑

藍青

右搗置瘡上以火炙熟微即愈

又方

右嚼取不以多少塗之良若治狐采刺人者當者破中有毛為度如無再傳之

治竹刺不出者

右爛研草麻以紺帛裹傷處然後傅藥時時看視若覺刺出即拔恐糞太繁并好肉努出也一方不用紺織

牛蒡葉散 治一切金木竹折傷

右用牛蒡葉搗實是六七月收者風乾為末每用乾摻不得犯別藥如經暑月蠅虫下蛆在瘡上或因肌肉生合有成竅子者即用杏仁研成膏手撲作條子入在竅內其蛆虫自出

治刺傷中風水疼腫

右用鰣魚目燒灰研傅患處計出即愈諸魚日皆用鰣

魚目丸佳

松脂方

治刺入肉疼悶百理不瘥

右以松脂傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落甚良

治針入肉方

右刮指甲末同酸棗仁搗爛噙調塗上次日定出一方用酸棗核燒為末服之

又方

治烏雞鷄刺在肉中不出者及治竹木針刺

右用烏雞毛翎二七莖燒作灰以乳男子妳汁和封瘡口其刺即出

桂蠟丸

治惡刺入肉

右用桂去粗皮搗為末熔黃蠟丸看病大小置瘡內是底三五重搭蓋以火燬候藥丸熔入肉其刺自出如無刺所

傷者尤見愈速

乳香膏 治金瘡杖瘍神効

乳香 没藥

川芎

自然銅已上各
七錢

當歸 茉活

獨活

川牛膝

石膏 劉寄奴

黑牽牛

黃柏皮

破故紙 白膠香

生地黃

熟地黃

赤芍藥 白芍藥

紫金皮

黃丹

白芷生者各 黃蠟一兩

清油四兩

右除膠香卅錢外餘藥為末入油內煎以柳枝不住手搘試將成膏却入三味更試成膏以生布瀝淨以瓦器盛水傾在水中用革攤開貼瘡孔深者撲成膏條穿入孔中不間淺深放瘡上如作熱加輕粉片腦朴硝入膏內貼之

片腦

麝香各五

龍骨

寧陀僧

胭脂

輕粉

乳香

沒藥

寒水石一錢

鐵鎗

龍骨

寧陀僧

貼之

乳香散

治杖瘡腫痛

大黃

黃蓮

黃柏

黃芩三錢各少許

乳香另研

沒藥另研

片腦

右為細末研勻冷水調攤紺上貼之

治杖瘡

血竭

輕粉

乾胭脂

寧陀僧

乳香

沒藥另研

右為細末先以冷水洗淨拭乾以豬脂調搽紅紙貼之愈

龍腦潤肌散

治狂瘡熱毒疼痛

龍腦一字

輕粉半錢

麝香半錢

密陀僧二錢

黃丹一兩

右為細末每用乾摻上用青帛貼之內留一孔

生肌桃花散

輕粉

血竭

密陀僧

乾胭脂各一錢

乳香二錢

右研細每用乾摻仍以膏藥貼之

靈異膏

治杖瘡金瘡癩搘皮破湯火傷久年惡瘡

川藥金

三兩生地黃二兩

粉草一兩

臘豬板脂一斤

右剉細入脂內煎焦黑色瀝去滓入明淨黃蠟四兩熬化
攬勻以磁器貯之水浸久去水收用時先以冷水洗瘡拭

乾却敷藥在瘡上外以白紙貼之止血定疼且無癢痕湯

燙火燒不湏水洗治凍瘡尤妙

園藥 治腫末破用此消腫定疼

無名異炒

木耳去土

大黃
生者
熟者

右為極細末用蜜水調園凹邊腫處

松皮散 治金刀箭鎗傷用此生肌

老松皮一兩

石灰二兩

燒者以瓦盛之上用火
四時上下燒一夜至曉

右為細末和勻傅之止血收瘡口立効