

成
方
切
用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十上

經帶門

正方二十一
附方七

溫經湯

東垣升陽舉經湯

附見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經物

湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

湯

東垣升陽舉經湯

四物加芩連湯

氣六合湯

熱六合湯

正氣天物

香散

調經飲

毓麟珠

啟宮丸

抑氣散

五物煎

牡丹皮散

芎歸六君子湯

逍遙飲

如聖散

人參荆芥散

固下丸

白芷散

成方切用
卷十一
當歸煎丸

婦寶丹

見理血門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯 門人周蘭九生庭 殷豫龍浩如 同較

成方切用

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異者則唯經帶胎產之屬不得不另詳

方論

此外雜證但與男子相同者自有各門方治故不以男女分而資贍于此○凡行經

之際大忌寒涼

諸藥飲食亦然

溫經湯

金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中

去血或月水來過多及至期不來金匱曰婦人年五十所病

下利數十日不止。暮卽發熱，少腹裏急，腹滿手掌煩熱，唇口乾燥，何也？曰：此病屬帶下，何以故？曾經半產瘀血在少腹不去，何以知之？其唇口乾燥，故知之。當以溫經湯主之。徐忠可註曰：此段言歷年血寒積結胞門而甚焉者也。故就婦人之年暮經水斷絕者，而亦必據證斷之。以立法也。謂婦人年五十，其天癸已絕，應不從經血起見矣。然而病證下利數十日不止，知非偶感矣。暮卽發熱，病屬陰矣。少腹裏急，明乎病屬下焦矣。因而腹滿，是雖脾病而根于下焦矣。手掌煩熱，掌屬心，心主血，血鬱則煩熱也。唇口必得脾家營氣而津潤，營氣鬱則陰火從之。故乾燥非渴也。渴則爲胸中熱，胸無熱而但陰分有鬱火，故不渴而乾燥也。然皆非相因的對之證，故陰利而發熱。陰虛者有之，因而少腹裏急，下多溏泄者有之。腹滿者有之，手掌煩熱，陰虛者

有之若唇口乃營氣所主下利之病不應見此
然而有是證又合之少腹裏急手掌煩熱明是
血瘀而火鬱所以心得之而掌熱脾得之而唇
口燥故曰其證唇口乾燥故知之藥用溫經湯
者因半產之虛而積冷氣結血乃瘀而不去故
以歸芍芍調血吳茱桂枝以溫其血分之氣而
行其瘀肺爲氣主麥冬阿膠以補其本土以統
血參甘以補其虛丹皮以去標熱然下利已久
脾氣有傷故以薑半正脾氣名曰溫經湯治其
本也惟溫經故凡血分虛寒而不能調者皆主之

吳茱萸

當歸

芍藥

芍藥

人參

桂枝

阿膠

丹皮

生薑

甘草

麥冬

心去

半夏

升一

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服

艾湯

治婦人陷經漏下黑不解或損傷衝

膠艾湯

金匱

成方切用經

卷二十一 膜艾湯

上

任月水過多淋瀝不斷

方見下卷胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期。今曰漏下是無期也。所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經。陷者有降無升久則爲黑色故以膠艾湯主之。四物通調肝血加甘膠峻補之病本于寒故以艾溫而行之也。

丹溪謂婦

人之經淡爲有水紫爲熱黑爲熱極故兼水化假令其人素從熱病來者容有之然而仲景之言道其常也

柏子仁丸

方

治經行復止血少神衰

女子善懷

憂多則傷心心傷則不能生血而血少則肝無所藏而衝任之脈枯故經閉不行也。經日月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于

胞中今氣上逼肺心氣不得下降故月事不來

柏子仁

去油

牛膝酒浸

卷柏五錢

澤蘭

續斷二錢

熟地

黃一兩

蜜丸米飲下

柏子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任卷柏澤蘭活血脉而通經閉。

升陽舉經湯

東垣

治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶

食此由勞傷所致。

補中益氣湯

見氣門

加白芍黑山梔薑棗煎

補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以斂陰

黑梔以清熱

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當歸白朮

各三錢羌活防風藁本

各二錢

獨活附子

炮甘草

炙各一錢

人參熟地川芎

各二錢

細辛

分六錢

桃仁

皮尖研十箇去

紅

花肉桂芍藥

各五分

每服三錢漸加五錢治經水

不

止原文曰如右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕手其脈微疾舉指弦緊或濤

皆陽脫之證陰火亦凶見熱證于白鼻眼或渴躁陽欲先升也當溫之舉之升之躁之

此皆陰躁陽欲先升也當溫之舉之升之躁之

當大升浮氣血切
補命門之下脫也

固經丸

良方

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊

衝任爲經脈之海若無損傷則陰陽和平氣血調適矣若勞動過度損傷臟腑衝任之氣虛不能約制經血故經多暴下或由陰虛陽搏爲熱所乘攻傷衝任血得熱則妄行也脈數疾小爲順大者爲逆紫黑成塊者熱甚而反兼水化非寒也玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板

灸四兩半

芍藥

酒炒

黃檗

酒炒三兩

黃芩

二兩

香附

童便浸炒

樗皮

兩半

酒丸

經多不止者陰氣不足以制胞絡之火故越其

常度也崩中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者
火極似水也黃芩清上焦之火黃檗瀉下焦之
火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制陽光也
香附辛以散鬱樗皮濬以止脫

通瘀煎 治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按
及產後瘀血實痛并男婦血逆血結等證

歸尾

三五錢

山楂

香附

紅花

新者炒黃二錢

木香

烏藥

一錢

青皮

澤瀉

一分一錢

水煎加酒一二

小鍾

兼寒滯者加肉桂一錢或吳茱萸五分

火盛內熱血燥不行者加炒梔子一二錢
微熱血虛者加芍藥二錢 血虛濇滯加牛膝
血瘀不行者加桃仁二十粒去皮尖或加蘇木
延胡之類 瘡極而大便結燥者加大黃一二
三錢或朴硝蓬术亦可

連附四物湯

丹溪

治經水過期紫黑成塊

紫血熱也。黑熱

甚也適期而成塊氣滯也或風冷乘之也若淡白者虛也或挾痰停水以混之也如煙塵豆汁

屋漏水混濁模糊者溼痰也。

四物湯

血門

加香附黃連

四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以行

變氣

四物加芩术湯

亦名溫六合丸

黃芩抑陽
白朮補脾

治經水過多

脾能統血四物加芩連湯

如豆汁者熱兼溼也芩連苦燥溼而寒勝熱治經水適斷五心煩熱經

來色黑或如豆汁

如豆汁者熱兼溼也芩連苦燥溼而寒勝熱四物

加梔連爲熱六合湯加薑附名寒六合湯加陳

朴名氣六合湯加羌芍爲風六合湯皆經產通

用之藥也

調經飲 治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸

錢三五

牛膝

山楂

錢二

香附

青皮

茯苓

五
分
錢

茱萸之類如因不思生冷而寒滯子內加肉桂吳可氣滯者加厚朴一錢或砂仁亦商香一錢五分

正氣天香散

紺珠

治一切諸氣氣上湊心心胸攻

築腸肋刺痛

月水不調

婦人多憂鬱故氣病爲多氣爲血帥氣滯則血

月候不能行故亦不謂

六錢前

香附

八錢

烏藥

二錢

陳皮

蘇葉

一錢

乾薑

五分

每五

鳥藥陳皮專入氣分而理氣。香附紫蘇能入血分而行氣。引以乾薑使入氣分，兼入血分。用諸辛溫以解鬱散肝。令氣調而血和，則經行有常，自無痛癰之患矣。

毓麟珠 治婦人血氣俱虛，經脈不調，或斷續或帶濁，或腹痛，或腰痠，或飲食不甘，瘦弱不孕。服一二劑，即可受胎。凡種子諸方，無以加此。

甘草 川芎一兩熟地蒸 茄絲子製 當歸四兩 杜仲炒
酒人參 白朮土炒 天門冬炒 菖蒲酒炒 鹿角霜 川

椒二兩

兩

爲末蜜丸彈子大空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或爲小丸吞服亦可。如經遲

腹痛宜加破故紙

酒炒

肉桂各一兩甚者再加吳

茱萸五錢或加龍骨一兩

醋煅

如子官寒甚或

泄或痛加製附子或炮薑

隨宜

有鬱怒氣不順

而爲脹爲滯者宜加香附

酒炒

二兩或甚者再加

沉香五錢

血熱多火經桑內熱者加川斷地

骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此

或以湯引送下亦可。男子製服宜加枸杞胡

桃肉鹿角膠山茱萸巴戟肉各二兩

啟宮丸

治子宮脂滿不能孕育

婦人肥盛不孕往往因此

芳窮

白朮

半夏麵

香附

一兩茯苓

神麴

五錢橘紅

甘草

二錢

粥丸

橘半白朮燥溼以除其痰

肥而不孕多由痰盛故以二陳爲君而加藥也。

香附神麴理氣以消其滯川芳散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣茯苓甘草用以去溼和中也

抑氣散

歲氏

治婦人氣盛于血變生諸證頭暈

滿

凡人血氣和平則無諸疾。苟血少氣多壅于胸膈則滿上攻于頭則運。

香附

四兩陳皮

二兩甘草

炙一兩茯神

每服二錢。

經曰高者抑之。香附能散鬱氣。陳皮能調諸氣。茯神能安心氣。甘草能緩逆氣。氣得其平則無亢害之患矣。

氣盛于血固當抑氣。若過用行氣之藥。則真氣耗散。陰火愈盛。而氣

血兩虛矣。是方雖和平。祇可暫用。須用滋血之藥。使陰血充足。則陽火自平。乃正治之法。蓋補其不足。卽所以制其有餘也。

五物煎

治婦人血虛凝滯蓄積不行。小腹急痛。

產難經滯等證。此卽四物湯加肉桂也。

當歸

三五錢熟地

三四錢

白芍

二錢酒炒

川芎

一錢

肉桂

二

三錢

如兼胃寒或嘔惡者加乾薑

水道不利

者加澤瀉或茯苓

水道不利

香砂仁烏藥

陰虛疝痛者加小茴香

血瘀

不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒

紅花

牡丹皮散

良方

治血瘕

瘀血凝聚而成伏于陰篋

之處盤結膠固須破血活

血

解

血之品治之

丹皮

桂心

歸尾

延胡索

三分

牛膝

秦艽

藥 菓遜

分六

三稜

分四

水酒各半煎

丹皮桂心赤芍牛膝以行其血三稜莪遜歸尾
延胡以行其血中氣滯氣中血滯氣血週流則
結者散矣

芎歸六君子湯 治經水後期其來濇少形體肥

盛

體肥而氣虛

而經水後期

清少春

於經絡也。

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

甘草

橘紅

半夏

加薑煎

二陳治其痰滯參木補其氣虛

氣行則痰行。

芎歸活

其經血

逍遙飲 治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源
血氣日枯漸至經脈不調者

當歸

二三錢

熟地

三五錢

棗仁

二錢

芍藥

茯神

一錢五分

甘草

炙一錢

陳皮

八分

遠志

三分製

如氣虛者加人

參一二錢

經水過期兼痛滯者加酒炒香附

一二錢

如聖散

治崩漏不止

凡非時血行淋漓不已謂之崩漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有色以應五藏。

櫻櫚

燒

烏梅

一兩

黑薑

半

每服二錢烏梅湯下

濇能止血故用櫻櫚酸能收斂

故用乾薑黑能止血故並煅用

人參荆芥散

婦實

治血風勞

血風勞者血脈空疎感受風邪寒熱盜汗

展轉不已乃成勞也

人參

白术

熟地

棗仁

炒鱉甲

童便灸

羚羊

角

枳殼

柴胡

荆芥

五分

防風

甘草

炙

薺

當歸

桂心

三分

加薑煎

陳來章曰血中之風荆芥防風散之木盛生風

羚角柴胡平之。陰虛發熱地黃鱉甲滋之。血氣痛滯月水不調。芎藭當歸桂心枳殼調之。倦怠食少盜汗心忡人參白朮炙草棗仁補而收之。

固下丸

子和

治赤白帶下

帶下起于風寒溼熱所傷。入藏腑陰虛陽竭。營氣不升。衛氣下陷。滯于下焦。奇經之分。因帶脈而得名。故曰帶。赤者屬血。白者屬氣。其狀如涕。相連而下。言帶者。亦病形也。有溼熱流滯下焦者。有肝腎陰滯。溼勝者。有驚恐而木乘土位。濁液下流者。或思想無窮而爲白滯者。或餘經溼熱。滯于小腹之下者。病本雖殊。皆爲氣血虛。

損營衛累滯而成也。

半

兩

五

錢

黑

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

下

陳來章曰。樗皮苦燥溼寒勝熱。澑固下。故赤白帶因于溼熱者。用之爲君。古方有蒼榮樗皮。側柏葉。樗皮。杏木樗皮等藥。蓋芷及星夏等藥。芍藥之酸斂陰氣。收下酒爲臣。貢薑之熱以散寒溼。黃檗之寒以祛熱溼。並炒黑以止血。收脫爲佐使也。

白芷散

良方

治赤白帶滑脫不禁。

良方曰。帶下由於風寒、溼熱所

傷。傷肝經者。色青如泥。傷心經者。色赤如津。傷肺經者。色白如涕。傷脾經者。黃如爛瓜。傷腎經者。黑如漆。

白芷一兩

海螵蛸二兩

胎髮五錢

酒調二錢

白芷辛溫燥溼而祛風。烏鵲鹹溫收溼而和血。髮者血之餘。補陰消瘀。煅黑又能止血也。

當歸煎丸

嚴氏

治赤白帶下。腹中痛。不飲食。羸瘦。

此血虛有熱之證。法當涼補。脈訣云。崩中日久爲白帶漏下。多時骨本枯。言崩久則血少。復因其陽。故自消之。物下漏不止。

當歸熟地

阿膠炒續斷

白芍

炒牡蠣粉

兩地榆炒黑

醋糊丸米飲下

歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎。以治血虛牡蠣

地榆清熱收脫。以止帶下。赤芍酸寒。能散惡血。
去瘀。所以生新散之。亦以收之也。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十下

胎產門

正方三十七
附方二十一

膠艾湯

又方
膠艾湯

當歸芍藥散

桂枝茯苓丸

乾薑人參半夏丸

橘皮湯

半夏茯苓湯

鈎

藤湯

當歸貝母苦參丸

羚羊角散

天仙藤

散

紫蘇飲

白朮散

鯉魚湯

竹葉湯

苑湯

安榮散

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

參木飲

表實六合湯

表虛六合湯
升麻六合湯

風溼六合
柴胡

人月

人月

一

六合湯

大黃六合湯

人參六合湯

朴實六

湯

梔子

六合湯

石膏

六合湯

茯苓

六合

湯

膠艾

四物湯

附子

當歸散

達生散

東胎

丸

散

枳殼

殿胞煎

豬蹄湯

當歸補血湯

加葱白方

參木膏

黑神散

九蜜煎

古黑神散

清化飲

失笑散

散

靈

清魂散

當歸羊肉湯

當歸生薑

羊肉湯

返魂丹

免懷湯

艾附緩宮丸

見理

血門

佛手散

見理

歸芳湯

見理

血門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯 門人

周蘭九生庭 殷豫龍浩如 同較

成方切用

胎產門

王節齋曰。調理妊娠。在于清熱養血。
白朮補脾。爲安胎君藥。條實黃芩。安

胎聖藥。清熱故也。朱丹溪曰。產後當大補氣
血。雖有雜證。從末治之。此二說雖若近理。而
實未可奉爲定訓也。蓋人之氣秉萬有不齊。
而胎前產後之虛實寒熱。人人各殊。是以用
藥之難。當如盤珠。不可膠柱而鼓瑟。今女科
每執方以槩治諸病。其爲害不知若干人矣。

膠艾湯

金匱

仲景云。婦人有漏下者。有半產後因

續下血都不絕者。有妊娠忽下血者。假令妊娠

腹中痛爲胞阻。膠艾湯主之。

此藥言婦人下血宜以膠艾湯溫補

其血而妊娠亦其一。但致病有不同。無端漏下者。因此平日血虛而加客邪。半產後續下血不絕者。固有之而兼腹中痛。則是因胞阻。阻者。阻其欲行之血而氣不相順。非癥瘕害也。故同以膠艾湯主之。養陰補血。莫如四物。血妄行。必挾風而爲痰濁。膠以驟皮爲主。能去風。以濟水煎成。能澄濁。艾性溫而善行。能導血歸經。甘草以和之。使四物不偏于陰。三味之力也。而運用之巧實在膠艾。

乾地黃六

兩

艾葉

當歸三

兩

芎藭

阿膠

芍藥

兩四

甘草

二

水五升

清酒三升

合煮取一升

去

渣內膠令消盡溫服一升。日三服不差更作一

方加乾薑二兩。

胡氏治胎動無乾薑。

嚴氏治胎動經漏腰

痛腹滿捨心短氣加黃耆。

千金翼治從高墜下損傷五臟吐血及金瘡經肉絕者加乾薑。

又方阿膠一觔蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯

良方治胎動不安腰腹疼痛或胎上捨心去血腹

痛指迷方加秦艽。

當歸芍藥散

金匱

治婦人懷妊腹中疼痛

疗音鴻又音綏

急痛也。

芍藥

一兩

澤瀉

半兩

茯苓

四兩

白朮

四兩

當歸

三兩

芎藭

三兩

六味杜爲散取方寸七酒和日三服

疼痛者正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而求伸土氣不調則急痛矣故以歸芍養血芩术扶脾澤瀉瀉其有餘之舊水芎藭暢其欲遂之血氣不用黃芩疼痛因虛則稍挾寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自去爾

桂枝茯苓丸 金匱云婦人宿有癥病經斷未及

三月而得漏下不止胎動在臍上者此爲癥瘕
害妊娠六月動者前三月經水利時胎動也下
血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去
故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

徐忠可曰婦人行經時遇

冷則餘血畱而爲癥瘕者謂有形爲徵然癥病
女人恒有之或不在子宮則仍行經而受孕經
血斷卽是孕矣未及三月將三月也既孕而仍見
血謂之漏下今未三月而漏下不止則養胎之
傷故胎動也假使胎在臍下則真欲落矣今
漏下實非胎病故曰癥瘕害宿疾難愈日瘤無
端而累之日害至六月胎動此宜動之時矣但
較前三月經水利時胎動下血則已斷血三月
不行乃復血不止是前之漏下新血去而癥反

堅牢不去故須
下之爲安耳

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁去皮尖熬芍藥 等分末之煉蜜丸如免屎大每日食前服一丸不知加至三丸

桂枝芍藥一陽一陰茯苓丹皮一氣一血調其寒溫扶其正氣桃仁以之破惡血消癰癧而不嫌于傷胎血者所謂有病則病當之也且癰之初必因寒桂能化氣而消本寒癰之成必挾溼熱爲窠囊苓滲溼氣丹清血熱芍藥斂肝血而

扶脾使能統血則養正卽所以去邪耳然消癥
方甚多一舉而兩得莫有若此方之巧矣每服
甚少而頻更巧要知癥不礙胎其結原微故以
漸磨之

乾薑人參半夏丸金匱 治妊娠嘔吐不止

乾薑一兩 人參一兩 半夏二兩 末之以生薑汁糊爲
丸如梧子大每服十九日三服

諸嘔吐酸皆屬於火此言胃氣不清暫作嘔吐
者也若妊娠嘔吐不止則因寒而吐上出爲嘔

不。止。則。虛。矣。故。以。半。夏。治。嘔。人。參。補。虛。而。以。生。
薑。汁。協。半。夏。以。下。其。所。逆。之。飲。

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食

惡阻以聞食而嘔責之脾虛嘔吐以

食入復吐責之有火所謂諸逆衝上屬於火也乃厥陰之血既養其胎少陽之火虛而上逆也

橘皮

竹節 人參 白术

珠十八

生薑兩 厚朴

銖十二

竹筍能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人參白术所以益脾開胃益脾欲其安穀云爾

半夏茯苓湯

治孕娠惡阻

惡阻者惡心而妨阻飲食也此是下部氣

血不足復盜脾胃之氣以固養胎元故令

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

脾腎之氣以固養胎元故令

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

治孕娠惡阻

惡阻者惡心而妨阻飲食也此是下部氣

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

脾腎之氣以固養胎元故令

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

脾腎之氣以固養胎元故令

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

脾腎之氣以固養胎元故令

脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

脾腎之氣以固養胎元故令

半夏

生薑

三十銖

乾地黃

十八銖

旋覆花

八銖

白芍

八銖

甘草

八銖

桔梗

十二銖

藥

人參

芍藥

細辛

橘皮

八銖

甘草

八銖

桔梗

十二銖

梗

十二銖

半夏生薑能開胃而醒脾地黃芍藥能養陰而益血人參甘草能和中而益氣橘皮桔梗旋覆細辛皆辛甘調氣之品可以平惡逆之氣而進飲食者也

半夏爲妊娠所忌以其燥陰液也若惡阻之證則有當用者故孫真人養

腦之劑用半夏
者蓋五方焉

鈎藤湯

良方

治癲癇胎動不安

癲癇手足抽掣也。熱爲陽風主動。肝

鈎藤鈎

當歸

茯神

人參

二錢

桔梗

錢

桑寄

生分五

風熱加黃芩梔子柴胡白朮風痰加半

夏南星竹瀝風勝加全蠍僵蠶

鈎藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩梔子之苦寒以平少陽厥陰之風熱風熱去則癲癇止矣人參茯神以益氣而寧神

當歸寄生以養血而安胎也

當歸貝母苦參丸

金匱

治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母 苦參

等分煉蜜丸如小豆大

飲服三丸加至十九

從來小便難傷寒熱邪傳裏則有之必先見表證或化源鬱熱者有之上必見渴中氣不化者有之飲食必不調中氣下陷者有之必先見脾胃證下焦鬱熱有之必不渴而飲食如故今妊娠飲食如故然小便難必因便溺時得風冷鬱

於下焦而爲熱致耗膀胱之水故以苦參能入
陰治大風開結氣除伏熱爲君當歸辛溫能入
陰利氣善治衝帶之病爲臣其證雖不由肺然
膀胱者氣化之門下竅難則上必不利故以貝
母開肺氣之鬱爲佐全不用利水藥病不因水
鬱也

羚羊角散

本事方

治妊娠中風涎潮忽仆目弔口

噤角弓反張名子癇

陰主靜陽主動風陽邪也諸風眩掉皆屬肝木故有

搖搖眩冒
反張之譖

羚羊角

屑錢

獨活

防風

芎藶

當歸

棗

仁

炒茯神

杏仁

薏仁

五分

木香

甘草

二分半

加薑煎一方有五加皮

羚羊角之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以散風邪茯神酸棗以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草以調脾也

扶土所以
拘木故薏

紫蘇飲

嚴氏

治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心

腹腰脇痛名子懸

由下焦氣實相火旺盛舉胎而上逼心胸也

蘇葉

錢一

當歸

七分

芍藥

人參

陳皮

大腹皮

五分

甘草

二分

加薑煎空心服心腹痛甚

者加木香延胡索

芍歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順
血和則胎安矣既利其氣復以參甘養其氣者
順則順其邪逆之氣養則養其冲和之氣也

天仙藤散

陳景初

治子氣

婦人衝任素受血風因

妊娠而足腫喘悶妨食

甚則腳指出黃水病名子氣非水也

天仙藤

蘇微炒即青木香

香附炒烏藥

陳皮

甘草

灸

等分加紫蘇三葉木瓜生薑各三片空心煎服或爲末鹽湯調下日三

天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩以和正氣少加木瓜以除溼熱利筋骨調營衛也

白木散

全生

治子腫面目肢體虛附如水狀

胎中挾水

水與血搏溼氣流溢面目肢體浮腫亦名胎水
原因煩渴引飲過多或泄濁損傷脾胃脾胃不
能制水五六箇月多有之

白术

錢一

薑皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

五分

爲末

米飲下

指迷方

有桑白皮無白术

此卽五皮飲

丹溪除薑皮腹皮加川芎木通

水病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從毛竅出腹皮芩皮淡而能泄使水從溺竅出水盛由于土衰故用白术之甘溫以扶脾土而
隄防之不致汎溢也

鯉魚湯

金千

治妊娠腹大胎閒有水氣

白术

五兩

茯苓

四兩

當歸

三兩

白芍

三兩

石細剉片

以

鯉魚一尾修事如食法煮取汁去魚不用每服
四錢入魚汁一盞半生薑七片橘皮少許煎至
七分去滓空心服或服鯉魚粥亦可

按此方用歸芍以養血芩术以實脾薑橘以和
胃止用鯉魚汁以利水絕不雜用利水之藥走
氣傷陰暗損胎元且制小其服以緩治之深爲
有見

竹葉湯

治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩胎

四五箇月相火用事或盛夏君火大行俱能乘
肺以致煩躁胎動不安亦有停痰積飲滯於胸

方之七
風躁者
屬致令

麥冬

錢半

茯苓

黃芩

錢一

人參

分五

淡竹葉

片十

如

有痰者加竹瀝少許

竹葉

清煩

黃芩消熱

麥冬

涼肺

心火乘脾故

茯

躁出於肺

苓寧

心人參補虛妊娠心煩固多虛也

紫苑湯

良方

治子嗽

紫苑

天冬

錢一

桔梗

分五

甘草

炙

桑白皮

杏仁

三分

竹節

二分

入蜜溫服

子嗽

由於

火邪當以清火潤肺爲務桔梗桑皮

之涼以瀉之天冬竹茹之寒以清之紫苑炙草
之溫杏仁白蜜之澤以潤之也。

安榮散

本事

治子淋心煩悶亂

子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制

水熱則不得通利故淋心與小腸相表裏故煩悶亦有因房勞內傷胞門衝任虛者宜入珍湯

或腎氣
九等方

人參

細辛一
兩

當歸

甘草

五錢

燈草

錢

木通

滑石

麥冬三
錢

爲末每二錢

麥冬湯調下

陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘淋悶
宜通故用木通燈草之滲滑石之滑肺燥則天

氣不降而麥冬能清之。腎燥則地氣不升而細辛能潤之。經曰地氣上爲雲。天氣下爲雨。血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也。

胎元飲 治婦人衝任失守。胎元不安不固者。隨證加減用之。或間日。或二三日。常服一二劑。脾兩虧而胎不固者。此方最宜。蓋胎元不固。皆因脾虛。而因腎虛者爲尤多。

人參

隨宜

當歸

芍藥

二錢

熟地

一錢

白术

錢半

炙甘草一錢

陳皮七分

無滌者不用

錢半

如

下元不固而

多遺濁者。加山藥五味子補骨脂之屬。

氣分

虛甚者倍白朮加黃耆但朮氣浮能滯胃口
倘胸膈有飽悶不快者須慎用之 倘虛而多

寒兼嘔者加炮薑七八分或一二錢 或虛而

兼熱者加黃芩一錢五分或加生地二錢去杜

仲 陰虛小腹作痛加枸杞子二錢 多怒氣

逆者加香附無妨或砂仁亦妙 有所觸而動

血者加川斷阿膠各一二錢 嘔吐不止加霞

天麵二錢煨薑二三片

固胎煎 治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩

二錢

白术

一錢

當歸

一錢

砂仁

五分

陳皮

一分

芍

藥

五分

一錢

涼胎飲

治胎氣內熱不安等證

生地

芍藥

二錢

黃芩

當歸

一錢

枳殼

石斛

茯苓

一錢

甘草

七分

生用

如熱甚者加黃檗一
二錢

參术飲

丹溪

治妊娠轉胞

轉胞者胎逼及胸膈在
一邊胞系轉戾臍不急
痛溲數或閉也因氣血
虛弱痰飲壅滯以致之

當歸

熟地黃

芎藭

芍藥

人參

白术

陳皮

甘草

加薑煎空心服

此卽

入珍湯去茯苓加陳半夏以除痰也。

陳皮白半夏血虛補以四君。血虛補以四物。痰飲消以二陳。使氣得升舉而胞自通也。

丹溪曰轉胞之病婦之稟受弱者。憂鬱多

者性躁急者食厚味者多有之。古方用滑利藥鮮效。因思胞不自轉爲胎所壓。胎若舉起。胞系自疏。水道自通矣。近吳宅寵人患此。脈似濇重。則引予曰此得之憂患濇爲血少氣虛弦爲有飲。血少則胎弱不能舉。氣虛有飲中焦不清而隨。則胎知所避而就下。乃以上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候氣定。又與之八貼而安。此恐偶中後治數人皆効。仲景云婦人本肥盛。今反羸瘦。胞系了戾。但利小便則愈。宜服腎氣丸。以中有茯苓故也。地黃爲君功在補胞。

又法將孕婦倒竪胎轉而小便自通矣

表實六合湯

海藏

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈

緊太陽經病

四物湯

每味一兩

麻黃

細辛

錢五

凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎爲主藥中有犯胎者則不可用也海藏皆以四物爲君養血安胎餘同傷寒例分證而治麻黃細辛發汗解表故功用之治表實無汗者四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合

湯治妊娠傷寒表虛自汗

地骨皮涼血故能退熱止汗

身熱

惡寒頭痛項強脈浮而弱四物四兩加大黃

术名七錢名風溼六合湯治妊娠傷寒中風溼氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻

連翹各七錢名升麻六合湯治妊娠傷寒下後

過經不愈溼毒發斑如錦紋者四物四兩加柴

胡黃芩各七錢名柴胡六合湯治妊娠傷寒胸

脇滿痛而脈弦少陽經證四物四兩加大黃五

錢桃仁十枚炒熟名大黃六合湯治妊娠傷寒大

便閉小便赤氣滿而脈沉數太陽陽明本病也。

急下之

大黃桃仁姪娠所忌然傷寒間有用之
之何如岐伯曰有故無
殞亦無殞也此之謂與

四物四兩加人參五味

各五錢名人參六合湯治姪娠傷寒汗下後咳

嗽不止四物四兩加厚朴枳實

炒

各五錢名朴

實六合湯治姪娠傷寒虛痞脹滿陽明本虛者

本胃
府也

四物四兩加梔子黃芩各五錢名梔子六

合湯治姪娠傷寒汗下後不得眠四物四兩加

石膏知母各五錢名石膏六合湯治姪娠傷寒

大渴而煩廝長而大四物四兩加茯苓澤瀉各
五錢名茯苓六合湯治姪娠傷寒小便不利太
陽本病本膀胱府也四物四兩加阿膠艾葉各五錢
名膠艾四物湯一方加甘草一方加甘草黃耆乾薑治姪娠傷寒
汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附
子肉桂各五錢名附子六合湯治姪娠傷寒四肢
拘急身涼微汗腹中痛脈沉遲者少陰病也
桂附雖辛熱動胎之藥然寒證用之適所以安胎
大黃各五錢名四物大黃湯治姪娠傷寒畜血

證

歌曰婦人妊娠若畜血。抵當桃仁莫妄施要教母子俱無損。大黃四物對分之。

當歸散

匱金

妊娠有宜常服者。

婦人血少。有熱胎動不安。及難牛產

難產者並宜服之。胎無疾苦歸

易產。產後百病悉皆主之。

當歸

芍藥

芍藥

黃芩

一

白朮

半

爲末

酒調服日二

衝任血盛則能養胎而胎安。歸芍芍藥能養血而益衝任又懷妊宜清熱涼血。血不妄行則胎安。黃芩養陰退陽能除胃熱。白朮補脾燥溼亦除胃熱。胎氣係於脾。脾虛則帶無所附。故易落。 脾胃健則能運化。

精微取汁爲血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣。
易簡方加山茱萸治經三四月不行或一月再
至數月不行者血少也滋之以芍歸芍藥補之
以白术山茱萸一月再至者脾虛有熱也白术能補脾黃芩能涼血山茱萸能固經

達生散

亦名束胎散丹溪

妊娠八九月服數十劑易生

有力

詩曰誕彌厥月先生如達達小羊也其生甚易產難多因氣血虛弱督衛滯澀服此

則易生如達矣

當歸

酒洗亦名束胎散丹溪

人參

白术

土炒

紫蘇

錢

甘草

錢大腹

洗酒炒亦名束胎散丹溪

陳皮

錢一

葱五葉黃楊腦子七箇煎

黃楊木主產難。或加枳殼砂仁。或春加川芎。夏加黃芩。冬如本方。或有別證。以意消息。

當歸芍藥。以益其血。人參白朮。以益其氣。腹皮陳皮紫蘇。葱葉。以疏其壅。氣血不虛。不滯。則臨產自無畱難之患矣。

丹溪曰。產難往往見於鬱悶安逸之人。富貴奉養之家。若貧賤者鮮有之。古方有瘦胎飲。爲湖陽公

主而作恐。非至到之言。予族妹苦於難產。遇胎則觸而去之。予甚憫焉。視其形肥而勤於女工。知其氣血久坐不運。兒因母氣虛。亦不能自運。爾當補母氣。則兒健易產。令其有孕五六月。以大全良方紫蘇飲。加補氣藥與之。數十貼。得男甚快。因以其方隨母之性。稟與時令加減。服無不應。因名曰達生散云。○昔湖陽公主難產方

士進瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩炙五月後
日服一錢潔古改以枳木名束胎丸寇宗奭明
其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎
黃治胎肥難產臨月服之張氏加香附行氣寬膈
湯下。凡臨產坐草產母用力須待兒子順
逼過門戶穀道挺進漿破血下方可用力一
兒下生若用力太早并妄服催生藥多致
死。生不必催也催之則摘方苞之孽振宋
苗爾非唯無益而反害之矣古方有用兔
脂者有用牛乳榆皮滑石者有用油蜜葱白者
有用葵子者有用金屬子者有用葵子
枝者有用牛乳榆皮滑石者有用油蜜葱白者
有用金屬子者有用葵子者有用金屬子者
伏龍肝者有用萬年青子者大都取其滑澤之義
退灰者有用筆頭灰者有用百草霜者有用
心者有手握石燕者雖曰各有深意但燒灰而

服者徒劫燥其津液手握足貼者勿驗爾。噫平時失於將理。至于臨產艱難。頻以雜藥催之。皆惑也。又聞生丹方書中大誇其催生之效。並產後種種功能。然不過破瘀之効爾。今世執面用之者。爲害甚多。所以不錄。

殿胞煎一治產後兒枕疼痛等證如神

當歸五七錢或一兩川芎 炙甘草 茯苓一錢肉桂二錢

三錢或五七分

水煎熱服

如脈細而寒或嘔者加

炒黃乾薑一二錢如脈弱陰虛者加熟地三五錢如氣滯者加香附一二錢或烏藥亦可

腰痛加杜仲二三錢如血熱多火者去肉

桂加酒炒芍藥

一二錢

張景岳曰丹溪云芍藥性酸大伐發生之氣產

後忌用之此亦言之過也。夫芍藥之寒不過于
生血藥中。稍覺其清爾。非若芩連輩之大苦大
寒者也。使芍藥猶忌。則他之更寒者尤爲不可
用矣。余每見產家過慎者。或因太緩。或因年力
方壯。而飲食藥餌大補過度。以致產後動火者。
病熱極多。若盡以產後爲虛。必須皆補。豈盡然
哉。且芍藥性清味酸而收。最宜于陰氣散失。
之。謗豈不爲產後之要藥乎。不可不辨也。

豬蹄湯

靈苑

治乳少

豬蹄

一隻

通草

兩

豬蹄鹹能潤下

通草淡能通竅

當歸補血湯加葱白方

治產後無乳

乳者血氣之所成也

故氣血充盛之婦，未嘗無乳。凡見無乳者，皆氣體怯弱之婦也。古方中用穿山甲、王不留行及漏蘆等物，雖氣血有餘而兼壅滯者，宜之。虛弱者，當禁之矣。

當歸錢二
黃耆兩

葱白枝十

當歸黃耆大補其氣血，此養乳汁之源也。葱白辛溫，直走陽明，以達于乳房，故用之爲使。此通乳汁之渠也。

參术膏丹溪 治產後胞損成淋瀝證或遺尿

人參

二錢五分

白朮

二錢五分

黃耆

錢半

茯苓

陳皮

桃仁

一
炙甘草

五分

用豬羊胞煮湯入藥煎服

產後胞損必令氣血驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功故以參耆术草以補之加陳皮以宣其滯桃仁以活其血茯苓以助其下行用豬羊胞煮湯入藥煎服取其以胞補胞之義不特引經也

丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋瀝有月可補完胞雖在內自亦可治。胎其脈虛甚因日難產之人多是氣虛難產之後氣血尤虛極餓時與之每劑一兩一月而安。

黑神散方 治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中

出血滯不行也

熟地黃

歸尾

赤芍

蒲黃

桂心

乾薑

炒

甘草四兩

黑豆半升炒去皮

半煎便產須知有生地黃

每服一錢酒童便各

前證皆因血瘀不行熟地歸芍之潤以濡血蒲黃黑豆之滑以行血桂心乾薑之熱以破血

乾薑

辛熱能去惡生新故

產後發熱多用之

用甘草者緩其正氣用童

便者散其瘀逆加酒者引入血分以助藥力也

產後惡露不行坐蓐勞傷者以前四味從輕治之若挾宿冷氣滯血凝胞胎不下則宜全用快行之也寒多及秋冬宜之若性急

形瘦有火之人及夏月均宜審用

去蒲黃黑豆加茯苓錢半吳萸五分當歸全用熟

地各三錢芍藥

白者酒炒
焦錢半

炙甘草炒乾薑肉桂

北細辛各一錢水煎名九蜜煎治產後陽氣虛

寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四肢厥冷

古黑神散百草霜白芷等分每二錢煎入童便

醋少許和服治橫生逆產及肺前產後虛損崩

漏等證

清化飲 治產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸

火不清等證

白芍

麥冬

丹皮

茯苓

生地

石斛

三

黃芩

一錢

骨蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢
內熱便濇者加木通一二錢或黃檗梔子皆可隨證
用之如兼外邪發熱加柴胡一二錢

失笑散

局方

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛

惡血阻而不行上衝于包絡

下阻于腹中皆閼而作痛

蒲黃

五靈脂

等分爲末煎膏醋調服

生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血氣脹入腹

皆能入厥陰而活血止痛故活血痛如神。
本方各一兩加木通赤芍各五錢每四錢入鹽
少許服名通靈散治九種心痛

清魂散

嚴氏

治產後惡露已盡忽昏運不知人

產後

氣血虛弱又感風寒也

澤蘭葉

炙甘草

人參

川芎

分

荆芥一錢

爲末溫酒調下更宜燒漆器粹醋炭于牀前使聞其氣

氣血虛弱故以人參甘草補其氣外感風邪故

以荆芥疏其風荆芥最散血中之風故以爲君澤蘭川芎以去其未下之瘀血風邪去餘血下氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰
蓐勞

黃耆

一兩人參

當歸

七錢

生薑

五錢

用羊肉一斤

煮汁去肉入前藥煎服如惡露未盡加桂

辛熱行血

有寒加吳茱萸有熱加生地汁有氣加細辛

參耆補氣而固衛當歸養血而調營生薑辛溫

引氣藥入氣分而生新血。羊肉甘熱用氣血之屬以補虛勞。熱退而汗收矣。

吳綬曰。產後不可

輕易發汗。蓋有產

時傷力發熱。有去血過多發熱。有惡露不盡發熱。有三日乳蒸發熱。或早起勞動飲食停滯亦皆發熱。狀類傷寒。要須詳辨。

大抵產後大血空虛。若汗之則變筋惕肉瞞。或昏迷不醒。或搐搦不定。或大便閉滯。其害匪輕。凡有發熱。且與四物湯。芽歸爲君。白芍須炒過。酒蒸熟地黃。佐之

加軟苗柴胡乾薑人參主之。蓋乾薑辛熱能引藥入血分。氣藥入氣分且能去惡生新。有陽

不生陰長之道。以熱治熱深合內經之旨。如惡露盡者。益母丸。黑神丸必兼用之。胃虛食少。加

術茯苓。嘔逆者。加陳皮半夏。其餘六經治例皆同。

必以四物湯爲主。乃養血務本之要也。劉河間曰。大抵產病天行從增損。柴胡雜證從增損。四物宜詳脈證而治之。

除人參黃耆用羊肉

一
筋

生薑

五
兩

當歸

三
兩

名當歸

生薑羊肉湯

金
匱

治產後腹中疼痛及寒疝腹痛

虛勞不足

返魂丹

卽益母草膏丸產寶

治胎前產後一切諸病及月

經不調赤白帶下

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時連根採收陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁于砂鍋內文武火熬成膏服忌鐵如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不

下炒鹽湯下產後血運口渴狂言產後中風失音口噤及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑口乾並童便和酒下產後喘嗽恶心吐酸脇痛無力酒下產後漏血棗湯下產後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產後帶下膠艾湯下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化服一丸能調經絡破血痛

益母草功擅消水行血去瘀生新利大小便故爲經產所需然其性辛散寒滑唯血滯血熱者

宜之稍挾虛寒者服之爲害不淺今人以其有益母之名而濫用之誤矣觀其能消疔腫散乳癰可知其性之全無補益矣時珍曰益母草根莖花葉實皆可用若治血分風熱明日調經用子爲良若胎產瘡腫消水行血則可並用蓋根莖花實順于行子則行中行中有補也

免懷湯

欲摘乳者此方主之

婦人之血上則爲乳下則爲經欲摘

乳者通其月竈則乳汁下行免乳脹之苦矣

當歸尾

赤芍藥

酒紅花

酒牛膝

各五錢

四味皆下行導血之品故以用之名曰免懷者

子生三年然後免于父母之懷也