

痧

脹

玉

衡

書

痧脹玉衡書卷之下

樵李郭志遠右陶著

霍亂痧

痛而不吐瀉者名乾霍亂。毒入血分宜放痧。新食宜吐。久食宜消。食消下結宜攻。痛而吐瀉者毒入氣分宜刮痧。不愈視有痧筋則放。宜調其陰陽之氣爲主。須知腸胃食積宜驅。不宜止。止則益痛。若吐瀉而後痛者。此因瀉糞穢氣所觸。治宜畧用藿香。冷飲正氣。然必須防食積血滯。或消或攻。或活血。山藥茯苓不

可亂施燥濕之劑。俱在所禁。溫煖之藥未可亂投。

治驗

一沈篆玉九月間。乾霍亂。腹中盤腸大痛。放痧三十餘針。又王君先爲之刮痧。不愈。余用寶花散加大黃丸清茶稍冷飲之而痊。

一彭君明晚間腹中大痛吐瀉數十次。痛益甚。延余診之。左脈乳而滑。右脈弦細而澀。此宿食已從吐瀉而盡。乃毒入血分。血瘀作痛也。放痧不愈。用獨活紅花湯。調紅散微瀉飲之。吐瀉腹痛少愈。次

日服前藥吐瀉腹痛俱已

一童敬橋內室吐瀉腹痛自利痧服陰陽水痛益甚余用三香丸微冷飲之而安

絞痛痧

心腹絞絞大痛或如板硬或如繩轉或如筋吊或如  
錐觸或如刀割痛極難忍輕者亦微微絞痛脹悶非  
常放痧可愈若不愈必審脈症何因辨暑穢食積痰  
血所阻施治須連進數服俟其少安方可漸爲調理  
此症世多放痧數次不愈聽命於天不肯服藥遂至

痧毒攻壞臟腑。惟死而已。惜哉。

治驗

一廉齋朱先生夫人。夏月痧痛危急。刮痧放痧不愈。更易三醫。莫敢任事。舉家無措。宋臣王兄邀余往視。六脈微伏。治之未愈。其晚絞痛如前。明晨賢郎宗伊兄復邀余。右手脈伏。更放痧三十二針。兼刮痧。訖用寶花散沉香丸清茶。稍冷飲之。併用散痧解毒活血順氣之劑。親友尚恐無救。留余俟飯後。坦君雲夏王兄曰。睡矣。何如。余曰。睡則神情已

定氣血漸和。始將安。越翼日乃瘳。

一賈公清作瀉。腹痛如繩絞。延余脈洪大數實。放  
痧不愈。用烏藥順氣湯加大黃。下積而痊。

一故友麓庵朱兄夫人公範母也。口吐痰涎。腹中  
絞痛。醫治沉重。六日不愈。延余診之。左脈微伏。余  
曰。痧也。令刮之。少安。用藥不服。次日復昏沉。大痛。  
舉家驚惶。親戚填門。復延余刺左中筋。一針出毒  
血。兼令刮痧不愈。用降香。桃花散。衝砂仁湯。微冷  
送下。併用防風散痧湯。加山荳根。茜草。丹參。金銀

花山查。葛子稍冷服而安。

一何君雅子。正月盤腸絞痛。延余脈伏。令刮痧。用沉香鬱金散。稜木湯。冷飲之。稍愈。黃昏時復絞痛。非常叫喊不已。復邀余用細辛大黃丸。清茶微冷飲之。又用紫朴湯而痊。

腸疝症

痧症不思食物。痧毒裹食。結成痧塊。於脇而痛。其痧塊變症甚多。故爲難治。且治痧惟在初發。若不識。或飲熱湯。毒血凝結。即慢痧。不至脹急。傷人亦成脇痛。

疹之日久勢必難散。

治驗

一朱子佩夫人。身熱吐痰。脇痛。飲園湯。益喘。嘔不  
已。延余。左脈洪數。右脈似伏。余曰。疹也。子佩刺其  
腿灣。疹筋二針。不愈。服童便。喘嘔稍減。余用阿魏  
丸。大黃丸。白湯微冷下。身熱吐痰俱已。又用必勝  
湯微冷下。三服而痊。

一王養初。子佩母舅也。吐痰。脇痛。悞吃園肉。放痧  
數次。日久不愈。延余診之。余辭不治。以痧毒裹圓。



結成痧塊不可解耳。况日久攻壞臟腑。雖藥無益。後易數醫。變喉旁發腫而歿。

痧痢

夏傷於暑。秋必瘧痢。痢疾初發。必先泄瀉。腸胃泄瀉。必致空虛。內虛則易感觸穢惡之氣。卽成痧痛。或大氣炎熱時。行疫癘。感動腸胃。因積而發。亦致痧痛。夫痢不兼痧。積去之後。便可得痊。卽甚凶極。藥無不效。若一兼痧。勢必絞痛異常。止治其痢。用藥無效。或變痢如猪肝色。或變痢如屋漏水。或變痢惟面紅水。或

變噤口不食嘔噦凶危。或變休息久痢。歲月綿延。常苦痢患。余惟先治其痧。兼治其積。則痧消而積易去。積去而痧可清。凡遇痢疾。如此治之。無不奏功。誠爲良法。

治驗

一曾奉先七月間發熱。下痢血水。日百餘次。肛門急迫。腹痛異常。嘔噦不食。延余治之。六脈遲數。非常。或時歇。指此痧痢也。刮痧放痧。訖痛乃減。半用沉香阿魏丸。砂仁湯。稍冷飲之。用當歸山查紅花。

枳實赤芍澤蘭青皮。荀子。檳榔各一錢。熟大黃五分。加童便一鍾。稍冷飲二服。痢下赤白甚多。諸症俱愈。

一。余弟驥武下赤白痢。日數十餘次。腹中大痛。大便窘迫。余診之。六脈微細。放痧二十針。又刮痧不愈。用寶花散沉香阿魏丸。稍冷湯飲之。腹痛漸寧。用當歸山查陳皮檳榔紅花烏藥各一錢。熟大黃八分。加童便飲之。赤白俱下。痛亦漸安。後用當歸一兩山查二錢服之。赤白痢全愈。

一奚仲嘉內室。腹中絞痛。喘急氣逆。余診六脈無根。此痧脈也。放痧不愈。用沉香阿魏丸。砂仁煎湯。稍冷飲之。痛遂止。次日小腹痛。類下痢。赤白。用當歸。金銀花。青皮。陳皮。烏藥。山查。薄荷。加童便。稍冷飲之。漸希。用當歸一兩。服四劑而愈。

一吳瑞雲發熱。脹悶沉重。放痧後。痢下紫血。他醫以痧氣已清。但治其痢。勢在危篤。舉家驚惶。延余六脈洪大不勻。此痧氣未清。痧毒尚盛也。令刮痧。訖。用當歸。槲殼湯入童便。冷飲之。次以蘇木。紅花。

五靈脂茜草烏藥香附當歸赤芍以熯其痧乃安  
後發餘毒於肛門邊出膿而愈

### 蛔結痧

痧毒攻胃故蛔死入於大腸與宿糞相結腹中大痛  
是爲蛔結

### 治驗

一朱子佩女。痧發痛極。頭汗如雨。延余診之。脈乳  
而洪實。放痧不出。刮痧不起。用細辛大黃丸微冷  
服。又用荆芥銀花湯稍冷服。又三日。痧筋乃現。放

之服藥如前。腹痛不止。至十九日。日用藥加大黃。大便下死。痢三條。結糞亦下。痛尤不止。又現痧筋。放之。服前藥乃愈。

頭痛痧

痧毒中於臟腑之氣。閉塞不通。上攻三陽。巔頂。故痛入腦髓。發暈沉重。不省人事。名真頭痛。朝發夕死。夕發旦死。急刺破巔頂。出毒血。以泄其氣。藥惟破其毒氣。清其臟腑。爲主。痧毒中於臟腑之血。壅滯不流。上衝三陽。頭面肌肉。故肌肉腫脹。目閉耳塞。心胸煩悶。

癸卯三月復書  
急刺破顛頂及諸青筋出毒血藥宜清其血分破其  
壅阻爲要

治驗

一張顯如頭痛發暈沉重六脈俱伏刺顛頂一針  
餘痧筋俱刺少甦復診其脈沉寒而上魚際用清  
氣化痰飲冷服而安

一汪路真內室頭面紅腫發熱頭痛心胸逆悶診  
脈乳而疾刺左腿灣三針血流如注冷服紅花膏  
子半盃用蒲黃飲三劑而痊

心痛痧

痧毒衝心。屬之於氣。則時痛時止。痰涎壅盛。昏迷煩悶。此其候也。治宜刺手臂。服順氣之劑爲主。痧毒攻心。屬之於血。則大痛不已。昏沉不醒。此其候也。治宜刺腿灣。服活血之劑爲主。遲則難救。

治驗

一鄭延旦次子。心中暴痛。口吐痰涎。迷悶不能出聲。延余兩寸沉而伏。關尺洪而緊。刺痧筋二十針。用烏桑順氣湯。冷飲四劑而安。



一嚴瑞宇三女飯時心中暴痛昏沉不醒日暮延  
余六脈已絕辭之次日而列

腰痛痧

痧毒入腎則腰痛不能俯仰若悞飲熱湯熱酒必然  
煩躁昏迷手足攣搖舌短耳聾垂斃而已

治驗

一黃敬宇內宰腰中大痛強硬如板悞飲熱酒發  
熱煩躁昏沉痰湧延余左尺虛微右尺洪實脈兼  
歇指痧中於腎也刺腿灣痧筋俾有紫黑血點不

流川降香桃花散微冷服。痧筋腿灣復現刺二針。血流如注又服二散。痧退痛減調理而痊。

一伍恒生子腰痛放痧四次不痊。沉重大痛連及胸脇。延余左手無脈辭之。六日而殞。

### 小腹痛痧

痧毒入大小腸則小腹大痛不止。形如板推絞絞不已。治之須分左右二股屈伸爲驗。

### 治驗

一盛成均子小腹大痛每每左臥左足不能屈伸。

太陽小腸經痧也。痧筋不現。用木通湯微冷服。四劑方見左腿灣痧筋刺出紫黑毒血二針。用紅花湯冷下。痧退後調理而愈。

一范季廉小腹大痛。每每右臥。右足不能屈伸。陽明大腸經痧也。刺腿灣青筋四針。毒血成流。不愈。用枳實大黃湯冷服。半夜痧退。少安。後調理而愈。一鍾孟芳小腹大痛。放痧三次不愈。延余治之。脈數而疾。余曰。痧毒已攻壞臟腑矣。辭之。半月而亡。

痧塊

痧毒留於氣分。成氣痞痛。留於血分。成血塊痛。壅於食積阻滯。成食積塊痛。蓋因刮痧放痧稍愈。痧毒未盡。不用藥以消之之故。施治之法。在氣分者。用沉香砂仁之類治之。在血分者。用桃仁紅花之類治之。食積阻滯者。用荀子楨榔之類治之。或氣血二分俱有餘毒者。當兼治之。若更兼食積所阻。有餘毒者。當併合治之。

治驗

一王介甫內室。腹痛放痧二次。忽左脇有塊。屢痛。

不止坐臥不安。延余脈芤而沉微。此毒留滯不行之故。用蘇木散併三香散。合桃仁紅花湯。微溫服。塊消痛減而痊。

一陳奉山腹中絞痛。放痧三次。變右脇下塊。大痛不止。臥不能起。延余脈沉實而弦緊。此食積爲患。用阿魏丸併發水湯加牛膝治之而痊。

一夏少溪內室腹中放痧稍愈。左脇下變成塊痛。口吐痰涎。臥床不起。延余脈沉而微滑。用沉香阿魏丸加貝母白芥子治之而痊。

一。張弘先痧脹變爲胸前左乳之上有一點痛。辭  
之。半年後吐血而殞。

痧變吐血鼻衄便紅

痧毒冲心則昏迷。痧毒冲肺則氣喘痰壅。甚則鼻衄。  
痧毒入肝則胸膈疼痛不能轉動。甚則血湧山吐而  
出。痧毒流於大腸則大便秘。流於膀胱則小便血。治  
宜先清其痧毒之氣。順其所出之路。則氣自順而血  
自寧矣。若不知治。緊則變在頃刻。遲則變成勞弱。或  
時時便血。溺血難愈。

治驗

一孫盛元痧脹。放痧不服藥。變筋骨疼痛。十日後吐血甚多。疼痛不愈。延余診其脈。芤。此痧氣已退。尚存痧血。用桃仁紅花活血之劑。因服而痊。

一潘國安痧脹。鼻衄。是痧氣由衄而泄。用清涼至寶飲而痊。

一周瑞亭子六歲。痧痛。大便紅。延余令放痧。服散痧消痧活血之劑而痊。

一何君叔女。痧痛。瀉血甚多。延余令放痧。不愈。用

荆芥薄荷湯加益母金銀花牛膝連翹治之而痊

吐蛔瀉蛔痧

痧毒入胃。胃必熱脹。熱脹之極。蛔不能存。因而上湧。乘吐而出。或蛔結腹痛不大便。或蛔入大腸。由大便而出。與傷寒吐蛔伏陰在內者不同。治宜清其痧脹爲主。

治驗

一蔣公尚次女發熱心痛。日多痰涎。吐蛔二條。延余右關沉細而疾。餘脈洪數。刮痧刺腿灣一針。微



有紫黑血點。服連翹薄荷飲三劑。痧退。服小柴胡湯。身涼而愈。

一沈存原。痧脹吐不止。延余脈洪而緊。何痧訖。用藥加熟大黃一錢。微冷飲之。吐止。脹消。後二日復痧。脹吐。蛔一條。脈復洪緊。更用熟大黃一錢。微冷飲之。痧退而安。

一湯仲文。腹脹大痛。延余診之。脈散亂無根。此蛔結也。痧實始之。放痧後。用散痧去分之二劑。加大黃二錢。微冷飲之。大便下死蛔二條。併宿糞而愈。

痧變腫毒

痧毒不盡留滯肌肉腠理之間。卽成腫毒。宜先放痧。用散痧解毒之藥。以除其根。然後審其毒之所發。照十二經絡臟腑分陰陽寒熱處治。輕則消之。重則拓之。虛則補之。實則瀉之。若紅腫甚者。屬陽。用忍冬解毒湯加引經藥以治之。白色不紅。平腫不易起。發者屬陰。用參歸化毒湯加引經藥以托之。毒有半陰半陽。用活絡透毒飲加引經藥透之。穿破之後。皆用神仙太乙膏貼之。若腫毒無膿。止有毒水流。出或膿少。

血多用飛龍奪命丹研碎些須填太乙膏中拔去毒  
水血膿後單用太乙膏貼之毒口難收用紅肉散搽  
之內黑者用代刀散以棉花絮微搽之卽變紅色貼  
膏自愈

治驗

一姜雲徧徧身疼痛背發一毒黑爛痛苦求余視  
診之脈沉微指頭黑色面惡熱飲此毒變惡毒用  
冷圍藥而成背疽也令去其圍藥放痧訖俟痧氣  
已絕用參芪姜桂熟附子溫托之外敷以代刀散

黑變紅色貼太乙膏而痊。

一蘇成中長子暑月吐瀉腹中絞痛刮痧痛止兩  
臂紅腫且痒求余一方用香薷飲一劑而痊。

一葛弘先內室痧痛不止不瀉盤腸絞絞疼痛難  
忍放痧後頭頂生毒出膿而愈。

一趙公琰寒熱頭眩心胸煩悶刮痧而愈肛門邊  
發餘毒出膿成漏爲終身之疾。

玉衡備用要方

防風散痧湯

痧有因於風者此方主之

防風

陳皮

細辛

金銀花

荊芥

枳殼

等分

頭面腫

加薄荷 甘菊

腹脹

加大腹皮 厚朴

手足腫

加薤白 仙牛膝  
倍金銀花

內熱

加蓮藕 知母

痰多

加貝母 瓜蒌 薤白

寒熱

加柴胡 獨活

吐不止

加童便

小腹痛

加青皮

血滯

加茜草 丹參

咽喉腫

加山豆根 射干

食積腹痛

加山查 薔子

心痛

加玄胡 索蓬 木

赤白痢

加檳榔

口渴

加花粉

面黑

血瘀也 加蘇木 紅花

放痧不出

倍細辛 蘇木 桃仁 荆芥

穢觸

加藿香 薄荷

水二鍾煎七分稍冷服

荆芥得

痧有鬱氣不通者此方主之

荆芥

防風

各一分 川芎

三分 陳皮

青皮

連翹

各八分

食不消

加山查 薔子

心煩熱

去川芎 加黑山梔

有積

加枳實

痰多

加貝母白果

氣壅

加烏藥香附

血壅

加桃仁紅花

鬱悶不舒

加細辛

食積

加山楂蓬朮

大便不通

加枳實大黃

暑熱

加香豨紫朴

小便不通

加木通澤瀉

喉痛

去川芎加薄荷射干

咳嗽

加桑皮堯苓

水二鍾煎七分稍冷服

陳皮厚朴湯

痧有因於氣阻者此方主之

陳皮

紫朴

山查

烏藥

青皮 等分

痰多 加白芥子貝母 痧筋不現 加細辛荆芥

血瘀

加玄胡索香附桃仁

頭汗 加枳實大黃

口渴

加薄荷花粉

水二鍾煎七分稍冷服

稜木湯

痧有因於食積者此方主之

山稜

藟子

蓬朮

青皮

烏藥

枳櫛

枳實

各一錢

水三鍾煎七分稍冷服



藿香湯

痧有因於穢氣者此方主之

藿香

香附

各四分

薄荷

七分

枳殼

山查

連翹

各一分

水二鍾煎七分冷服

薄荷湯

痧有因於暑者此方主之

薄荷

香薷

連翹

各一錢

紫朴

金銀花

木通

各七分

水二鍾煎七分冷服

紫蘇厚朴湯

痧有暑脹不已者此方主之

紫蘇

香薷

紫朴

枳殼

紅花

青皮

陳皮

茴子

山查

等分

水二鍾煎七分冷服

防風勝金湯

痧有因於食積血滯者此方主之

防風

烏藥

玄胡索

枳梗

枳殼

各七分

茴子

二錢

檳榔

金銀花

山查

連翹

赤芍

各錢

水二鍾煎七分稍冷服

必勝湯

痰有因於血實者此方主之

紅花

香附

各四分

桃仁

去皮尖

大黃

貝母

山查

赤芍

青皮

五靈脂

各一錢

水二鍾煎七分微溫服

紫朴湯

痧有食氣壅盛者此方主之

紫朴

山查

芎藭

山稜

蓬朮

枳實

逆翹

青皮

陳皮

細辛

等分

水二鍾煎七分稍冷服

獨活紅花湯 痧有因於血鬱者此方主之

獨活

紅花

桃仁

去皮

蒲黃

玄胡索

白蒺藜

炒爲末

烏藥

各一錢

香附

二分

枳殼

七分

水二鍾煎七分微溫服

射干兜苓湯

治痧似傷風咳嗽

射干

桑皮

兜苓

桔梗

薄荷

玄參

花粉

貝母

杉殼

甘菊

金銀花

等分

水一鍾煎七分稍冷服 嗽甚加童便飲

當歸枳殼湯

此養血和中之劑

歸身

山查

枳殼

紅花

赤芍

青皮

茜草

連翹

丹參

續斷

各一錢

水二鍾煎七分微溫服

荆芥銀花湯

此治血滯之劑

荆芥

紅花

茜草

丹皮

金銀花

赤芍

各一錢

香附

三分

烏藥

五分

白蒺藜

去刺搗末八分

水二鍾煎七分微溫服

桃仁紅花湯

此治血結不散之劑

桃仁

去皮尖

紅花

蘇木

各一錢

青皮

八分

烏藥

四分

獨活

六分

白蒺藜

去刺搗末

一錢二分

水二鍾煎七分微溫服

清涼至寶飲

此清痧熱之劑

薄荷

地骨皮

丹皮

黑山梔

玄參

花粉

等分  
細辛

倍加

水二鍾煎七分稍冷服

紅花湯

此治血痰之劑

紅花

蒲黃

青皮

各一錢

香附

四分

貝母

二分

枳殼

六分

水二鍾煎七分微溫服

如聖散

治痧咽喉腫痛此方主之

牛蒡子

蘇梗

薄荷

甘菊

金銀花

川貝母

連翹

枳殼

各一錢

桔梗 五分 烏藥 四分

水煎微温加童便冲服

寶花散 此治痧之仙劑

鬱金 一錢 凡方中用此味後 細辛 二兩

降香 三錢 荆芥 四錢

共爲細末每服三匙清茶消令服

沉香鬱金散 此治痧氣寒凝之劑

沉香 木香 鬱金 各一錢 烏藥 三錢

降香 二錢 細辛 五錢



共爲細末每服三分砂仁湯稍冷服

圓紅散

治血鬱不散

沒藥

置箬內放瓦上炭火炙去油爲末三錢

細辛 四錢

桃仁

去皮尖

玄胡索

降香

三錢

白蒺藜

搗去刺各一兩

共爲末每服一錢紫荆皮湯溫服

化毒丹

治痧痰氣壅盛

金銀花

薄荷

各一兩

細辛

枳殼

各五錢

川貝母

二兩

共爲細末每服六分細茶稍冷下

三香散

治過飲冷水痧不愈者

木香

沉香

檀香

等分

共爲細末每服五分砂仁湯微冷下

三香丸

治過服冷水痞悶者

木香

沉香

檀香

各五錢

砂仁

藟子

各八錢

五靈脂

六錢

共末水發爲丸微溫白湯下

救苦用

此治痧氣鬱悶之劑

枳實

藟子

各一錢

鬱金

二錢

烏藥

連翹 各八錢

共末清茶稍冷下

冰硼散 治痧咽喉腫痛

硼砂 天竹黃 各二錢 珠砂 分

玄明粉 八厘 冰片 一分

共末吹入喉中

牛黃丸 治痰涎喘急

胆星 天竹黃 各三錢 雄黃 五分

硃砂 五分 牛黃 麝香 各四分

易月二卷言  
共末甘草水爲丸如梧桐子大每服二九淡生  
薑湯稍冷下

細辛大黃丸 治痧大便乾結氣血不通煩悶壅  
盛昏沉者

細辛 大黃 枳實 紫朴

麻仁 青皮 桃仁去皮尖

其末水發爲丸每服一錢重者二錢再重三錢  
淡薑湯下稍冷服之

和脾宣化飲 治痧氣食結胸中飽悶腹內絞痛

此湯主之

廣皮

苟子

細辛

煎胡

大腹皮

去黑驢黑  
荳湯泡洗

麥芽

各一錢

山查

二兩煎  
湯代水

先濃煎山查湯煎六味稍冷飲之

消疳解毒散

治痧後牙疳

人中白

三錢

兒茶

天花粉

官礪

青黛

水磨各一錢

薄荷

甘草

黃連

各五分

冰片

牛黃

珠子

各一分

雨前茶

五分

研細以無聲爲度先用濃茶拭淨去其腐肉吹之

牛黃八寶丹

善化癰後諸般惡毒惡瘡此丹有

靈氣

雄黃

透明者

玄參

各五錢瓦上焙

薄荷

炒

川黃連

土炒

羚羊角

犀角

川貝母

炒淨

乳香

出汗

沒藥

各三錢

琥珀

青黛

水浴各二錢

珍珠

四分

劈砂

水飛五錢

牛黃

冰片

各二分

右十五味如法製爲細末聽川外將揀淨金銀

花

二兩甘菊

一兩甘草

五錢胡椒

肉

一兩

紫花

地丁

二兩

長流水五碗砂鍋內慢火煎至及半

取汁將渣絞乾以綿濾清桑柴火熬膏人煉熟  
老蜜蓋許再熬至粘筋將前末和丸每丸三分  
年幼者一九年長者二丸每日蜜調服

活絡透毒飲

治痧後熱毒流連餘毒在所不免

却不易來者以此湯預活之

羌活

紅花

荆芥

牛蒡子

木通

當歸

牛膝

蟬蛻

青皮

連翹

等分

水煎溫服

忍冬解毒湯

治痧後餘毒竊發者以此消之

金銀花

土貝母

甘菊

荆芥穗

牛蒡子

紅花

甘草

木通

連翹

紫花地丁

等分

胡桃肉

一枚

水煎溫服

撥雲散

治痧後餘毒在肝兩目赤腫甚至起障



生疔者以此散主之

生地

黃連

木通

荆芥穗

穀精草

甘草

赤芍

羚羊角

大黃

二分至  
六分

木賊草

甘菊

羌活

金銀花

望月砂

加燈心白芙蓉葉水煎溫服

養金化毒散

治痧後熱毒流連疼痛不已發癰

發疔者

乳香

沒藥

各出  
汗

川貝母

去心  
炒

雄黃

黃連

天花粉

各一錢  
生用

大黃

二錢半  
炒半晒

甘草

七分  
生

赤芍

二錢  
炒

牛黃

二分

冰片

分半

珠子

照分研細  
無聲爲度

共爲極細末用蜜湯調服

加味活命飲

治一切痧後留滯熱毒發爲腫毒

疔疽以此方消之

穿山甲

上炒

金銀花

大黃

各三錢

歸尾

陳皮

各一錢  
五分

花粉

薄荷

赤芍

甘草節

生地

白芷

防風

貝母

乳香

各一錢

皂角刺

五分

沒藥

五分

毒在背

加皂刺一錢五分

毒在面

加白芷一錢五分

毒在胸

加瓜蒌仁二錢

毒在頭面手足

加金銀花五錢

水二大鍾煎八分空心溫服忌醋併諸毒物大

人切禁房事

參歸化毒湯

治痧後餘毒流連氣血虛不能即

潰以此化毒托出之

人參

當歸

黃芪

甘草

金銀花

牛膝

紅花

貝母

山查

皂角刺

白芷

等分

水二鍾加胡桃肉一個煎七分空心溫服

奏凱和解飲

痧退之後調理和解者此湯主之

金銀花

土貝母

牛蒡子

山藥

白扁豆

山查

荆芥

當歸

各一錢

人參

四分

甘草

三分

水二鍾加核桃肉一個蓮肉六粒煎七分空心

溫服

參苓歸朮散

痧退之後痧氣已絕氣血虛弱者

以此補之

人參

白茯苓

當歸

白朮

白芍藥

陳皮

黃芪

川芎

熟地黃

甘草

水煎空心涵服

沉香丸

治痧氣急胸腹脹痛迷悶昏沉

沉香

檳榔

各五錢

藟子

枳實

厚朴

各七錢

山稜

蓬朮

廣皮

妙張玉衡書

天仙子

卽朱蓼子  
各六錢

白豆仁

烏藥

各四錢

木香

三錢  
薑黃 五錢

水發爲丸如棗荳大每服三十丸砂仁湯稍冷

下

沉香阿魏丸

治痧氣壅血阻昏迷不醒遍身沉

重不能轉側

五靈脂

廣皮

各一兩

青皮

天仙子

薑黃

蓬朮

山稜 各七錢

枳實

六錢

白豆仁

烏藥

各五錢

木香

沉香

各二錢

阿魏 一錢

如前溫  
冷湯下

丁香阿魏丸

治痧食積成塊痛而不已推上移

下日夕叫喊病久不愈者

荀子 五靈脂 查肉 神麴

青皮

枳實

各一兩

蓬木

厚朴

各八錢

山稜

檳榔

各七錢

白豆仁

烏藥

薑黃

各五錢

木香

沉香

各三錢

阿魏

二錢

丁香 一錢

水發爲丸如棗荳大每服十九紫糊皮溫湯下

阿魏丸

治食積壅阻痧毒氣滯血凝疼痛難忍

頭面黑色手足俱腫胸腹脹悶

玄胡索

蘇木

五靈脂

天仙子

各一兩

蓬朮

廣皮

枳實

山稜

厚朴

檳榔

薑黃

各七錢

烏藥

五錢

降香

沉香

各三錢

阿魏

二錢

香附

四錢

荀子

一兩

水發爲丸如菘荳大每服十五丸砂仁湯稍冷

下



蘇木散

治痧毒血瘀成塊堅硬突起不移者

蘇木

二兩

白蒺藜

搗去刺

紅花

玄胡索

桃仁

去皮尖各一兩

獨活

三錢

五靈脂

七錢

降香

薑黃

赤芍藥

各六錢

大黃

五錢

烏藥

山稜

蓬朮

陳皮

青皮

皂角刺

香附

酒炒各四錢

共爲細末每服二錢溫酒下

蒺藜散

治食積瘀血痧毒凝滯成塊日久不愈

者

白蒺藜

搗去刺  
二兩

澤蘭

薑黃

藟子

查肉

茜草

土貝母

淨各  
一兩

玄胡索

五靈脂

各一兩  
五錢

楨柳

七錢

金銀花

八錢

烏藥

青皮

各六  
錢

桃仁

去皮尖一  
兩二錢

共末每服一錢溫酒下

探吐法

用藟湯或礬湯稍冷服令吐去新食以

解痧毒所阻必須多飲則吐

當歸枳殼湯

消食順氣和血之劑

歸尾

枳殼

赤芍

各一錢

山楂

藟子

各二錢

紫朴

八分

水煎微冷服

清氣化痰飲

治痧痰氣壅塞之劑

貝母

二錢

薑黃

一錢

細辛

橘紅

各八分

青皮

紫朴

各七分

荆芥

六分

烏藥

五分

水煎冲砂仁末五分微冷服

蒲黃飲

治痧毒散瘀引火下行之劑

牛膝 三錢

獨活

枳殼

連翹

桃仁

去皮尖

澤蘭

赤芍

山查

薑黃

蒲黃

各一錢

水煎微冷服

烏藥順氣湯

治痧氣內攻之劑

山稜

蓬木

葡萄子

白芥子

玄胡索

各一錢

枳殼

青皮

烏藥

各八分

紅花

七分

香附

四分

水煎稍冷服

降香桃花散

治痧毒中腎之劑

降香 五錢

牛膝

槐花

紅花

大紅鳳仙花 各七錢

白蒺藜

一兩

共末黑砂糖調童便煎服

木通湯

治痧毒結于膀胱之劑

牛膝 三錢

丹皮

細辛

連翹

金銀花

澤蘭

白芨

蒲黃

木通

玄胡索

各一錢

水煎加童便微溫服

枳實大黃湯

治痧毒結於大腸之劑

赤芍

青皮

枳實

桃仁

去皮尖

金銀花

槐花

黃芩

酒洗

大麻仁

連翹

各一錢

大黃

三錢

水煎微溫服

荆芥薄荷湯

治痧氣血阻寒之劑

白茯苓

楊大劑  
厚末

荆芥

炒黑

赤芍

薄荷

青皮

陳皮

等分

水煎微冷服

連翹薄荷飲

治痧入積氣阻之劑

香附

菖子

檳榔

山查

陳皮

連翹

薄荷

等分

木香

二分  
磨沖

水煎加砂仁五分稍冷服

失笑散

治痧後毒氣退盡尚留瘀血在胸膈間

積血作痛

蒲黃

五靈脂

等分

共爲末每服二錢

酒下

便用七方

一方 用井水河水各一半同服治痧痛

一方 用泥漿水服之治痧痛

一方 用白沙糖攪糖水服治痧痛

一方 用細辛爲末同砂仁湯冷服治痧痛

一方 用晚蠶沙爲末白滾湯冷服治痧痛

已上五方治痧症無食積阻滯者

一方 用明礬四分白湯一碗冷服治痧痛

一方 用食鹽一撮白湯一碗冷服治痧痛

已上二方乃吐新食阻痧毒之味必多飲方吐



少則不效

絕痧方

治數患痧症必痧症已愈然後可服以

絕其根否則稍有痧氣未除斷不可服恐甘者作脹熱者助邪反害之矣

甘草

明礬

食鹽

各一兩

川烏

一錢

乾薑

三錢

共爲細末米飯搗爲丸每服五分白湯溫下新犯痧者一二服卽愈久犯痧者十服全愈不復發矣蓋用甘草以助胃用乾薑川烏以充胃用

明礬以解毒用食鹽以斷痧誠爲良方但烏薑性熱恐人有宜有不宜故每服止用五分爲則惟取其能絕痧根焉爾若人屬虛寒者必加倍多服方能有效

藥性便覽

荊芥 透肌解表散痧毒痧筋隱隱不發者非此不現用四分至八分

防風 透肌發表爲臣使之助寒熱往來痧毒壅

滯鬱遏不發者非此不清用三分至七分

止

羌活

痧症忌其發表太過若頭痛或又因受寒而起更兼痧症欲用之引太陽經止許用半分至二分

連翹

消痧毒解諸經火邪清熱而不滯治痧之要藥也用七分至一錢

陳皮青皮

陳行痧氣青伐肝氣痧氣壅阻鬱結不行者非此不利用六分至一錢

枳殼枳實

破痧氣驅毒氣除脹氣下食氣積滯

痧脹玉衡書

卷下

三十四

壅塞者非此不開但枳殼性緩枳實

性速各有所宜用五分至一錢五分

桃仁

破瘀活血痧爲血阻非此不流痧爲血滯

非此不順去皮而用爲皮味澀而阻血路

也用七分至一錢六分

秦艽

活血驅風消痧毒筋骨疼痛壯熱不清者

非此不解用三分至六分

川芎

上行頭目頭角骨痛者必需下通血海肝

臟不華者當用用一分至三分止恐提彰

氣上騰也

桔梗

入肺經爲諸藥之舟楫其性上而復下故能引枳殼破胸中至高之氣用六分至八分

香附

行血中之氣恐其香燥須用便製欲其行血必要酒炒取其斂血在乎醋炒用三分至八分

木香

行滯氣燥濕氣驅寒氣開鬱氣散結氣痧後腹痛不解者此要藥也用一分至三分

止

檀香

癩後心腹疼痛不休胸脇脹悶寒凝氣滯  
得此而抒若癩之始發當知忌用一分  
至三分

砂仁

順氣開鬱散癩消食此始終可用之要藥  
也川三分至一錢

穿山甲

土炒爲末透癩消痰破癩托毒善走經  
絡之神劑也故經絡有諸藥所不到者  
非此不達用一分至五分

童便

解痧毒消痰降火最速定痛治血痢痢下  
血水諸藥莫及

天蟲

能治血分之痰症山甲透經絡以破痧毒  
用須炒末自一分至二分

烏藥

善行周身之氣凡痧氣阻滯者得此無處  
不到用三分至五分

紅花金銀花茜草

活血解痧毒用六分至一錢

山查荀子麥芽神麴

痧爲食壅取其善消而不

暴也

大黃 大便不通痧氣閉塞非此不能攻而下之

用五分至一錢五分

木通車前澤瀉

痧氣鬱阻小便不利在所當求

若熱鬱太重不因小水更在所

禁用二分至五分

黃連黃芩

冷性凝滯 忌用須酒炒或薑

汁製

生地

涼血血瘀者非其

熟地白芍

補血斂血瘀

八忌



參芪白朮

用之恐補毒氣痧所大禁

甘草

用之恐成痧塊難治在所忌用

白茯苓

恐其滲濕實其痧氣俱在禁例

細辛

透竅破血散痧之要藥也用七分至一錢

薑黃

其性雖溫善能消痰下氣破惡血用二分

至四分

貝母

川者專消熱痰土者兼破瘀血用一錢至

一錢五分

白芥子

脇下之痰非此不達用四分至六分

半夏白芷蒼朮

性燥忌用

竹瀝

性寒忌用用須薑汁方走經絡

雄黃牛黃膽星天竹黃

消痰丸中宜用

麝香

開竅散痧功亦甚大

當歸

頭身尾各有所宜用須斟酌

柴胡

和解表裏專治少陽膽經寒熱往來用六

分至一錢

乾葛

散陽明胃經之邪兼能解渴用六分至八

分

前胡 疏風消痰治嗽表熱者宜用厚六分至八

分

桑皮 治嗽瀉肺用四分至八分

兜苓 瀉肺嗽用三分至五分

杏仁 瀉肺潤腸胃利氣消痰涎去皮尖用用四

分至一錢

麥冬天冬 潤肺消痰一治其本一治其標去心

用之用七分至一錢五分

山稜蓬朮 食積心疼癰毒阻滯痞悶者宜用六

分至八分

五靈脂

善消宿血血塊凝滯不散非此不破用

五分至八分

龜甲

去兩肋酥炙爲末破宿血勝於靈脂在胸

者用上半截在下者用下半截

蘇木

敗惡血新瘀者莫及用五分至一錢五分

玄胡索

活血行氣氣血凝滯作痛用五分至一

錢五分

奔瀉

通上 祇下利水氣治暑氣之要藥用五分

至一錢

紫朴

寬中治嘔消痰下氣用六分至八分

牛膝

活血引痧氣下行用八分至二錢

木瓜五味子

酸斂忌用

升麻

禁用恐提痧氣上升而難遏也

肉桂附子吳茱萸

禁用恐助痧毒立刻有變也

乾薑

過服寒冷之水宜少用之善散寒氣也若

用之不當亦能助熱毒當忌

麻黃

發表太過禁用

薄荷

辛涼利竅消腫解毒清氣清喉用五分至

一錢

紫蘇

疏風順氣身熱當用三分至六分

明礬

解痧毒消痰定痛用之探吐宿食甚妙

玄參

清氣消痰滋陰潤肺但色黑止血痧有痧

血忌用

花粉

性沉寒止渴痧毒未清者忌用恐凝滯痧

氣也

角刺

透毒能引諸藥至於痧毒血痧之所立奏

其功

牛蒡子

解痧毒清喉痧中要藥用七分至一錢

乳香

消瘀血而不傷新血痧症用之以治血結

用五分至一錢

黑砂糖

活瘀血解痧毒故瘀血作痛者得此則

安

沒藥

痧痛用之破瘀血用四分至一錢

食鹽

解痧毒定痛用之吐去新食

芋艿

治痧熱解毒有痧患者食之甘美

晚蠶沙

解痧毒治熱

阿魏

破積聚逐惡血其功甚大

大麻仁

潤大腸腸胃燥結者宜用

其中分數如遇西北強壯人當加一二三倍  
不可執一

痧方餘議

鬱金價貴時有換之以薑黃者其二味溫涼之性雖  
有不同然以之治痧下氣消痧薑黃未爲無效若  
欲人心經散鬱消痧則痧毒攻心者非鬱金不能



立春其功。薑黃有所不及。故方中所載。鏹金。切勿以薑黃代之。

穿山甲上炒用。凡疔毒。瘀血壅塞。阻而不通。得此透入經絡。引諸藥所不能到者。卽到。所犯經絡血分之所識者。其留意焉。

黑丑通上徹下。痧毒脹滿。必須用此。於丸散中救人立功。凡破氣之味。俱莫能及。但耗散真氣。恐人有宜有不宜。故方中不載。

大黃治食積阻滯。毒余爲丸。以備急用。其功莫大。若

痧脹之極。必須急服此以攻之。恐病有宜有不宜。故方中雖載不及細加。惟審病症緩急。輕重而行之。

丑黃毒分粥丸

三分精甘湯下

評半夏藿香止吐

凡治吐症用半夏藿香。獨痧症作吐。半夏性燥。須防益助火邪。斷不可用。若藿香惟取其正氣以治穢觸。然亦必痧毒無阻。乃可俟冷飲之。倘或痧氣有害於中。驟用此以止吐。反有閉門逐盜之憂。如腸胃中有食積血瘀。留滯痧毒。用藿香香燥止吐。適長其毒。是

宜知忌

下通痧許  
其吐自止

評荆芥細辛防風獨活

痧症寒熱不由外感。往往毒從鼻吸而入。搏激肌表。羌活麻黃俱在所禁。若用荆芥細辛。善能透竅。蓋惡毒之氣由竅而入。故用之以治痧脹。亦由竅而泄。若防風乃臣使之味。僅取爲透竅之佐。不比麻黃羌活。專主發表。反有升宣火毒之慮也。至如獨活發散治熱。其性至預而還。力不能過發。且可活血解痧毒。是痧症最要之味與。

痧脹玉衡書

卷下

四十五

痧脹玉衡書卷之下終

續敘

害稽古今醫學。備悉萬病。獨不明痧。因而人鮮其傳。無奈世之患者比比也。既有此病。不可不求有以治之。余因以治之所驗。悉其症之所由。於甲寅歲著玉衡一書。偕同人互相參訂。急而行之。亦濟生之念。所不得已也。書中凡敘痧說。似已具詳。而年來痧之變幻。更有隱伏於別病中者。傷人最多。非惟世所罕識。猶余前書之所未及。因又有痧刻之續。凡以因時所犯。略採異驗爲集。夫亦謀諸同人。非敢以自矜也。幸

燕張玉衡書

天下不以多贅而忽諸

大清康熙十七年戊午歲季秋吉旦郭志遠右陶父

載識