血證論

血證論五卷

四川彭縣容川唐宗海著

瘀血

吐衄便溺其血無不離經凡係離經之血與榮養周身之血已睽絕而不合其已入胃中者聽其吐下可也其在經脈中而未入於胃者急宜用藥消除或化從小便出或逐從大便出務使不留則無餘邪為患此血在身不能加於好血而反阻新血之化機故凡血證總以去瘀為要世謂血塊為瘀清血非瘀黑色

為瘀鮮血非瘀此論不確蓋血初離經清血也鮮血也然既是離經之血雖清血鮮血亦是瘀血離經既久則其血變作紫血譬如皮膚被杖血初被傷其色紅腫可知血初離經仍是鮮血被杖數日色變青黑可知離經既久其血變作紫黑也此血在經絡之中雖已紫黑仍是清血非血塊也是以能隨氣運行走入腸胃吐下而出設在經絡之中即是血塊如何能走入腸胃耶至於血塊乃血入腸胃停留片時立即凝結觀宰割猪羊滴血盆中即時凝結便可知矣故凡吐衄無論清凝鮮黑總以去瘀為先且既有瘀血便有瘀血之證醫者按證治之無庸畏阻

瘀血攻心。心痛頭暈。神氣昏迷。不省人事。無論產婦。及吐衄家。有此證者乃為危候。急降其血而保其心。用歸芎失笑散加琥珀硃砂射香治之。或歸芎湯調血竭乳香末亦佳。

瘀血乘肺。頸逆喘促。鼻起烟煤。口目黑色。用參蘇引。保肺去瘀。此皆危急之候。凡吐血即時斃命者。多是瘀血乘肺。壅塞氣道。肺虛氣促者。此方最穩。若肺實氣塞者。不須再補其肺。但去其瘀。使氣不阻塞。斯得生矣。葶藶大棗湯加蘇木、藕、黃五靈脂、童便、治之。

瘀血在經絡臟腑之間。則周身作痛。以其堵塞氣之往來。故滯

碍而痛所謂痛則不通也佛手散加桃仁紅花血通續斷秦艽柴胡竹茹甘草酒引或用小柴胡加歸芍丹皮桃仁荆芥尤通治內外之瘀方義較穩

瘀血在上焦或髮脫不生或背膊胸膈頑硬刺痛目不了了通竅活血湯治之小柴胡湯加歸芍桃仁紅花大蒜亦治之

瘀血在中焦則腹痛脇痛腰臍間刺痛着滯血府逐瘀湯治之小柴胡湯加香附薑黃桃仁酒軍亦治之

瘀血在下焦則季脇少腹脹滿刺痛大便黑色失笑散加醋軍桃仁治之膈下逐瘀湯亦穩

瘀血在裡則口渴所以然者血與氣本不相離內有瘀血故氣不得通不能載水津上升是以發渴名曰血渴瘀血去則不渴矣四物湯加桃仁、丹皮蒲黃、三七、花粉、雲苓、枳殼、甘草、小柴胡湯加桃仁、丹皮、牛膝、皆治之溫經湯以溫藥去瘀乃能治積久之瘀數方皆在酌宜而用

瘀血在腠理則榮衛不和發熱惡寒腠理在半表半裏之間為氣血往來之路瘀血在此傷榮氣則惡寒傷衛氣則惡熱是以寒熱如瘧之狀小柴胡湯加桃仁、紅花、當歸、荊芥、治之

瘀血在肌肉則翕翕發熱自汗盜汗肌肉為陽明所主以陽明

之燥氣而瘀血相蒸鬱故其證象白虎犀骨地黃湯加桃仁、紅花、治之血府逐瘀湯加醋炒大黃、亦治之

瘀血在經絡臟腑之間則結為癥瘕瘕者或聚或散氣為血滯則聚而成形血隨氣散則沒而不見方其既聚宜以散氣為解血之法九氣丸主之在胸膈上者加桔梗、枳殼、瓜蔞、生薑、甘草在右者加蘇子、桑皮、陳皮在左者加青皮、牡蠣、當歸在中焦大腹者加厚朴、枳殼、防己、白芍、甘草在小腹下者加橘核、小茴、荔核、檳榔、川楝子、靈脂氣散則血隨而散自不至於結聚矣至其既散之後則又恐其復聚宜以調血為和氣之法此時瘕氣既

散處於血分之中。但一調血。則氣自和。而不復聚矣。逍遥散加丹皮、香附、治之歸脾湯加柴胡、鬱金子亦治之。癥者常聚不散。血多氣少。氣不勝血。故不散。或純是血質。或血中裹水。或血積既久。亦能化為痰水。水即氣也。癥之為病。總是氣與血轇轕而成。須破血行氣。以推除之。元惡大憝。萬無姑容。即虛人久積。不便攻治者。亦宜攻補兼施。以求克敵。攻血質。宜抵當湯下瘀血湯。代抵當丸。攻痰水。宜十棗湯。若水血兼攻。則宜大黃甘遂湯。或秘方化滯丸。外治法貼觀音救苦膏。

瘀血在經絡臟腑之間。與氣相戰鬬。則鬱蒸腐化而變為膿。另

詳吐膿便膿瘡膿門茲不再贅

瘀血在經絡臟腑之間被氣火煎熬則為乾血氣者腎中之陽陰虛陽亢則其氣上合心火是以氣盛即是火盛瘀血凝滯為火氣所薰則為乾血其證必見骨蒸勞熱肌膚甲錯皮起麵屑名為乾血勞病至此者十治二三仲景大黃䗪蟲丸治之蓋既係乾血便與氣化隔絕非尋常行血之品所能治也故用諸蟲嚙血之物以銷蝕乾血瘀血不去新血且無生機況是乾血不去則新血斷無生理故此時雖諸虛畢見總以去乾血為主也如膽識不及可以滋補之藥送下此丸亦調停之一術

瘀血在經絡臟腑之間被風氣變化則生癆蟲氣者腎水之所化也故氣動即為濕風者肝陽之所生也故風動即為熱濕蒸熱煽將瘀血變化為蟲是為癆蟲此猶之草腐為螢穀飛為蠹也其辨法面色不赤白不青不黃唇口生瘡聲嗄咽癢煩憂不寧遺精白濁髮焦舌燥寒熱盜汗口出穢氣不知香味喜見人過常懷忿怒夢見亡先驚悸欬逆或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或食豆而香又用乳香薰其手背帕覆手心須臾毛長至寸許每日乎旦精神尚好日午向後四支微熱面無顏毛皆是癆蟲之候也月華丸主之多食鰻魚肉既有滋補又善殺

癆蟲或用鰻魚骨燒黑鱉甲炒為末煎人參當歸白芍白薇湯送下補虛殺蟲相輔而行若專事殺蟲金蟾丸亦可間服金線蛙燒服亦妙黑猫殺取肝焙乾為末月初五更空心服大能殺除癆蟲可代獺肝獺爪為末酒下癆蟲居肺葉間咯血聲嘶者皆能治之

癆蟲乃血化之蟲最為靈異其人死後蟲為妖孽傳染家人為傳尸癆殺三八者其蟲不治傳尸之證與其所感之病人無異金鑑謂宜服傳尸將軍丸方載丹溪心法中今查丹溪心法不載此方然以將軍名丸其主用大黃可知夫傳尸蟲孽襲染人

身亟宜除去故主攻下亦如仲景攻乾血法以免留邪為患也此蟲一傳人身便能聚積人身之血以為窠囊食息生育變化無窮吾謂可用移尸滅怪湯殺其蟲而奪其血斯無遺留之邪矣

以上二證大便不溏泄者尚可攻治溏泄者不能任藥必死

蓄血

蓄血者或傷寒傳經之邪或瘟疫時氣之邪傳於血室之中致周身之血皆為邪所拍致而蓄聚胞中小腹脹痛其人或寒或熱晝日明了夜則譫語甚則發狂呼叫打罵內經所謂血在上喜忘血在下如狂是也癲犬咬傷毒聚胞中故令發狂皆屬蓄血之證仲景抵當湯治之桃仁承氣湯亦治之若膽識不及可用膈下逐瘀湯加大黃若血猶未結但是熱入血室夜則譫語用小柴胡湯加桃仁丹皮治之

血臌 血腫

血臌之證。脇滿小腹脹滿。身上有血絲縷。煩燥漱水。小便赤。大便黑。腹上青筋是也。醫書俱云。是婦人之病。惟喻嘉言謂男子恒有之。面色痿黃。有蟹爪紋路。脈雖虛極。而步履如故。多怒善忘。口燥便秘。脇脹腹疼。迨脹之既成。腹大如箕。遂不可救。東南最多。所以然者。東海饒魚鹽。魚者甘美之味。多食令人熱中。鹽者鹹苦之味。其性偏於走血。血為陰象。初與熱合。不覺其病。日久月增。中焦沖和之氣。亦漸為熱矣。氣熱則結。而血不流矣。於

是氣居血中。血裹氣外。一似婦人受孕者然。至彌月時。腹如抱甕。推而言之。凡五方之膏粱厚味。椒薑桂糈成熱中者。皆其類也。治之之法。以六君子湯加乾薑、川芎、防己、為末。陳米荷葉煎湯。泛丸。白湯下。執中央以運四旁法也。

謹按喻氏之論。其言血臌之原。最為詳確。惟所主之方。與氣熱則結。而血不流之說。未能脗合。蓋六君子與所加之藥。於治痰臌為宜。且須寒飲方為切合。如論所謂應用清和理氣之品。攻劑代抵。當凡主之和劑。丹梔逍遙散加薑黃香附治之。諸書皆用桃奴散。或琥珀散治之。第兩方用溫藥。亦血因寒凝之劑。與

喻氏所論。又有不同。醫者審證擇用可也。

又有石瘕腸覃。狀如懷子。腹日以大。月事以時下者為腸覃。以寒客於腸外。氣病而血不病也。宜橘核丸主之。月事不以時下者為石瘕。乃寒氣客於子門。子門閉塞。惡血當下不下。衄以留止。故成石瘕。是氣病而血亦病也。宜琥珀散。桃奴散。治之。後服溫經湯。

單腹脹者為血臌。若四肢皆脹。或先從四肢腫起。其色紅者。謂之血腫。亦有不紅者。血從水化而為水。故不紅也。或得於吐衄之後。瘀血化水而腫。或得於婦人經水不行。血化為水而腫。既

化為水。則兼治水。五皮飲。加當歸、白芍、蒲黃、丹皮、桃仁治之或用乾漆、雄黃、醋丸。麥芽湯下亦可。

又凡臌脹浮腫。俱要分陰證陽證。陰證脈沉澀弦緊。必有寒痰諸證。宜中滿分消湯。加桃仁。陽證脈數口渴。便短氣逆等證。宜小柴胡湯加知母、石膏、防己、丹皮、桃仁、豬苓、茯苓、車前子治之。

另詳六卷腫脹門。

經閉

婦女經閉有四。一寒證。一熱證。一實證。一虛證。

寒閉者積冷結氣。經水斷絕。至有歷年胞門為寒所傷。經終凝堅。陰中掣痛少腹惡寒。上引腰脊。繞臍寒疝。或瘀血不行。留為石瘕。皆霜凝氷結之象也。用溫經湯主之。或用溫藥下之。附子理中湯加當歸、桃仁、大黃、細辛、牛膝、肉桂。生化湯下之。尤穩。經通之後。再服腎氣丸收功。

熱證者。胞為血室。血室為肝之所司。肝火橫逆。從胞脈上迫於

心肺心肺之氣不得下通則發寒熱頭暈耳鳴煩躁多怒咳逆氣上治宜平其肝火使肺氣得下降心血得下注斯經通矣當歸蘆薈丸加桃仁以攻之丹梔逍遥散加桃仁以和之又曰衝任兩脈起於胞中上屬陽明若胞中火逆隨衝任兩脈上冲頭暈煩赤咽喉不利發熱口渴欬逆喘息此乃胞氣上逆合於陽明之氣而為燥動之證法宜從陽明以折衝逆使火下降斯經通矣玉燭散治之如脾胃素虛不便攻治者玉女煎加桃仁、丹皮、治之金匱麥門冬湯尤能逆折衝氣數方皆從陽明降氣使氣下達胞中則經自通又有從腎中引氣下行以通經之法用

六味地黃湯。加知柏牛膝前仁。此又引衝氣下行。隔治之法。

實證經閉者。婦人少腹如敷狀。小便微難而不渴。此為水與血結在血室也。大黃甘遂湯主之。又仲景曰。婦人傷寒。仲風經水適斷。胸脇滿如結胸之狀。譫語者。此為熱入血室也。小柴胡湯主之。婦人經閉。藏堅癖不止者。中有乾血。濕熱腐變化出白物。礬石丸納入陰戶。吾謂可用土瓜根湯。加黃柏、防己、治之。又或小腹結痛。大便黑色。小便不利。明知血欲行而不肯利下。宜抵當湯主之。時方可用隔下逐瘀湯。

虛證經閉者。或因失血過多。面與爪甲之色。俱淺淡黃白。血既

從上而脫。更何從再注胞中。以為經水哉。治法宜止其吐衄之血。使其下行。再補其虛。則血生而氣順。下注胞中。斯經得通矣。四物湯加牛膝、枳殼、降香、玉京、血餘、童便、茯苓、甘草、阿膠。或因過淫精竭。腎中天癸之水不至胞中。則不能引動衝脈之血。是為陽不倡。陰水不化。血宜滋補其水。以益天癸。左歸飲主之。三才湯亦主之。或因生產過多。傷血血枯。聖愈湯主之。或室女血枯。名為童癆。室女正當血盛之時。而乃經少血枯。以致骨蒸飢熱。面色枯白。兩顴發赤。懶於飲食。皮乾消瘦。咳嗽喘息。此宜大滋其血之化源。使血驟生。而諸病乃退。炙甘草湯主之。又或婦

人女子。不得隱曲。心念不遂。脾氣抑鬱。以致胃病。不思飲食。倦怠少神。怔忡健忘。脾不化汗。心不化赤。是血虛而無經水。血虛則生內熱。肌肉乾瘦。如風之消物。故又名風消。其證難治。宜歸脾湯主之。血虛則火盛無制。心乘肺金。金氣不行。不能運布水津。留於胸中。津液盡化為痰。欬嗽不已。日久成勞。經所謂傳為息賁。則不能治。謂喘息也。都氣丸加人參、麥冬、棗仁、五味、鍾乳石治之。天王補心丹亦治之。保和丸清燥救肺湯皆可借治。息賁葉氏養胃湯加熟地五味雲苓亦佳。

經血原委已於四卷詳言之。茲特就經閉大畧出其證治。化裁

通變則存其人。

末段所論生血之法。男女畧同。治血證者。須切究之。

胎氣

婦人以血養胎血或不足或不和於是有胎氣諸證此與本書血證不涉然皆血分中事不類而類因并論以啟人之悟

孕婦胎中止有水血二者而已水即是氣故生產時水衣先至後下血衣行經時亦先下聚水後下鮮血水者氣之所化氣屬陽血屬陰水先乎血是為陽先乎陰也故行經也必天癸之水至於胞中而後衝任之血應之亦至胞中於是月事乃下其受胎也亦必天癸先交而衝血後聚故不曰男女搆血而曰男女

搆精精者、水與血混合之名也既成胎後腎中之陽氣則化水以養胎胃中之水穀則取汁化血從衝任兩脈下注胞中以養胎胎中水足則血不燥胎中血足則氣不亢水血調和則胎孕無病所以有病者皆水與血不和之故胎病多端吾且斬斷葛藤但就水血二者立法可以通一畢萬矣

惡阻者何也胎中之水火上逆入胃故也衝任乃胞脈皆上屬於陽明陽明之氣下行為順今因有胎子宮收閉衝氣不得下洩轉而上逆挾胞中之水以干胃土則為痰水上溢因而嘔吐治宜調胃利痰二陳湯加枳殼砂仁生薑藿香治之香砂六君

子湯亦治之。水降則氣降。胃得安而不嘔吐矣。又或胞氣上冲上合陽明燥氣而為火。亦致吐逆。嘔苦嘔酸。噦氣拒食。胎塞於下。氣逆於上。多生火證。故世謂胎前不宜熱藥。以此之故。法宜清胃降火。小柴胡湯主之。麥門冬湯亦治之。

子嗜者何也。胎中之水火上干於肺故也。養胎全賴水與血二者。若水不足以濡血。則血燥。血不足以濟水。則氣熱燥熱相合。是為胎火。胎火循衝脈而上干犯肺金。則欬喘交作。兩頰發赤。咽喉不利。氣嗆欬嗽。故名子嗜。仲景麥門冬湯治之。時方玉女煎加五味亦妙。方中牛膝正取其降衝逆。半夏降衝逆降水也

牛膝降衝逆降火也皆以墮胎之藥安胎用之得宜正無畏縮又有胎中之水上泛為痰衝肺作欬以致子嗆者於法又宜去水蘇子降氣湯六君子湯加五味細辛炮薑治之若是水火兼動而致欬嗽宜瀉白散加杏仁瓜霜白前枯芩枳殼甘草或葶藶大棗瀉肺湯治之但葶藶猛不可多用

孕婦少腹痛仍分水分血分兩端在水分者膀胱之氣不能化水則子臟脹滿水不得泄必見小便短澀脹喘諸證審係熱結不行者導赤散加山梔防己以清之審係寒結而陽氣不化者五苓散治之取其水利則少腹之痛自止橘核丸加茯苓亦治

之在血分者胞為肝腎所司肝陽不達於胞中則胞血凝滯而痛四物湯加艾葉香附阿膠小茴腎陽不達於胞室則胎冷痛上連腰脊四物湯加杜仲故紙台烏艾葉此名胞阻謂胞中陰血與陽氣阻隔也重則用腎氣丸輕則用膠艾四物湯

血與水皆陰也水為先天陽氣所化之陰液血為後天胃氣所化之陰汁腎陰又轉賴胃之水津而生胃氣又實藉腎之生陽而旺今有腎中之生陽不足者脈弦發熱愈脹而下墜腹痛惡寒子宮欲開仲景用附子湯治之保腎之陽以扶胃氣此補陽法也又有胃中之水津不足者則子臟乾燥悲傷欲哭象如神

靈所憑數欠伸所以然者以腎水不足衝血不足無所潤養腎水在下則為胞中之天癸在上則為口中之津液臟燥則肺金不得津液之潤養故肺主悲傷欠伸者明係腎病如神所憑者血燥則心不化液而神無守也甘麥大棗湯滋腎之陰從衝任以輸水於腎而腎陰因藉以生此補陰法也觀此二條一切資陰補陽之法可以貫通

胎漏亦分水與血二證下血者屬血熱因其火甚故逼血妄行宜四物湯加阿膠炒梔側柏葉黃芩下水者或如豆汁下至升許名曰孤漿去水太多則胎乾枯必倚而墜水即氣也惟其氣

泄。是以水。泓黃芪糯米濃煎。補而滋之。茅根白术人參鹿角霜桑鰾蛸白銀酒水煎服亦佳。

再按血統於脾而藏於肝肝主疎泄故漏血治以歸脾湯加柴胡、山梔、阿膠於法尤合水生於腎而制於肺肺氣不納故漏水今觀肺中虛寒不能制下則小便遺溺可知肺氣不納所以漏水之理矣宜用白术人參、海鰾蛸、龍骨、牡蠣、百合、訶子、苧根、白銀。

子淋者。小便淋瀝。亦分水淋血淋二者。水淋病在膀胱。脹閉溢滯宜五淋散加木通、澤瀉、血淋者病在血室陰中割痛下滴血

點四物湯加蓯蓉茅根藕節條芩赤苓草稍

子懸者胎氣上逼懸塞心胸亦分水分血分二者水分之病由於氣虛水泛為痰壅湊其胎濁氣上逆脈必沉滑遲弱六君子湯加枳殼紫蘇腹毛川芎香附治之血分之病由於血虛胎中厥陰肝經相火上僭舉胎上逼宜小柴胡合四物湯再加雲苓黃連黃柏六味丸加牛膝麥冬以引之使下亦高者抑之之義母畏牛膝之墮胎也又按子懸之證有孕七八月產母血虛胎無所養上行求食者但用下降之藥不能治也宜大補其血炙甘草湯去桂枝加淮藥棗仁治之聖愈湯加白朮雲苓甘草亦

治之。甘麥大棗湯皆宜。又當美其飲食。用當芪參、山藥、白芷、茯實、豬蹄炖服、最佳。

子氣者。水腫也。胞與膀胱。並域而居。胞宮為胎所站。侵逼膀胱。以致膀胱之水。不能化行。亦由膀胱之氣。化先有不足。故能為胎所用。五苓散主之。若是胎火乘肺。化源不清。以致便短水腫者。去桂枝。加知母、麥冬、黃芩、杏仁、防己治之。

子煩者。血虛也。血者、心之所生。血足則心火不煩。胎既耗血。胎中之火。又上與心火相合。火擾其心。是以虛煩不得眠。酸棗仁湯治之。硃砂安神丸亦治之。

子眩者氣分之痰也其證目眩頭暈皆由胎水上逆隔痰之所致二陳湯加紫蘇枳殼杏仁薑汁竹瀝治之

子癇者血分之風也其證忽然昏冒卒倒無知手足抽掣過時則醒口噤反張乃孕婦血虛風邪入肝之所致法宜補血驅風四物湯加鈎刺防風茯神桑寄生獨活羚羊角逍遙散小柴胡皆可借治

小便不通者氣不足也氣化則水能出今小便點滴不通是胞係下壓其溺竅故也究其所以下壓溺竅之故則因腎氣不足不能舉胎而上此名轉胞宜腎氣丸主之又或胃氣不足不能

升提其胎補中益氣湯主之。

大便不通者血不足也孕婦之血足則無病血既不足則供胎猶未能給更何能分給諸藏是以必現口渴、欬逆、發熱、大便不通等證治宜滋生其血血足則大便自通四物湯加杏仁、麻仁、蓯蓉、兎絲子治之逍遥散加麻仁、枳殼、厚朴亦治之

總而論之胎氣不和者皆是水分之病調水則氣自和胎火太旺者皆是血分之病調血則火自熄能知水火血氣之故則治胎不難治失血之證亦不難即治雜證更無所難

此書為失血說法胎氣一門皆連類而及之者然胎病之發尤

水火血氣之顯然者能參透此條則於水火血氣四字自無隱慝之情其他胎病有未備錄者另有胎產之書可查

血證論六卷

四川彭縣容川唐宗海著

癆瘵

癆瘵之證。咯血痰嗽。遺精瀉泄。潮熱盜汗。瘦削疲倦。夢與鬼交。或夢亡先。喜見人過。常懷忿怨。平旦尚好。午後病便加增。發熱心煩。口燥鼻乾。臉紅唇赤。骨蒸肺痿。咽痛失音。若渴不止。則不治矣。其原得於酒色傷損。以及失血之後。瘵血鬱熱化生癆蟲。蝕人臟腑之精血。變生諸般怪證。病人死後。蟲氣傳染家人。名

曰傳尸又名尸疰謂其自上注下見證與前死之人相似故也辨蟲之法或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或用乳香薰手背以帛覆手心良久手上出毛長寸許白黃者可治紅者稍難青黑者死若薰手無毛非癆蟲證也又或用真安息香燒烟吸之不嗽者非傳尸烟入即嗽真傳尸也癆蟲之形或似蜣螂或似紅絲馬尾或似蝦蟆蝟鼠或似鞠麪或有足無頭或有頭無足或化精血歸於元氣之內若傳至三人者其蟲靈怪不可治凡用藥治蟲勿令病者知之恐蟲覺悟難取下也

夫癆蟲何由而生哉木必先腐而後蟲生之人身亦必先有瘀

血虛熱鬱蒸乃生癆蟲蟲者風木之氣所化人身肝主風木又主藏血肝臟之血若有瘀積是猶木之先腐也於是肝臟之風氣鬱遏蒸煽將瘀血化生為蟲既化為蟲即從蟲治之宜天靈蓋散治之然天靈蓋不易得且不宜用可用川椒代之或金蟾丸亦可余每用乾漆、明雄、川椒、楝根皮、白頸蚯蚓、升麻、鬱金、共為末白湯五更時服其蟲不吐即下義固取於殺蟲而尤在乾漆鬱金兼治瘀血以癆蟲是瘀血所化殺蟲是治其標去瘀是治其本也諸書但言殺蟲而不知蟲之所自生宜乎未得其治也吾為指出癆蟲是瘀血所化治瘀血是治其本也辨證錄用

移尸滅怪湯治痨蟲傳尸方以去瘀為主故效

痨蟲之生由瘀血所化而痨蟲既生蝕人精血人之正氣日以消耗不治其虛但殺其蟲病終不能愈也月華丸主之義取補虛而去瘀殺蟲兼施其治乃萬全之策鰻魚肉常食亦佳或鰻魚骨、鼈甲、知母、棗皮、柴胡、當歸、青黛、桃梟為丸人參湯下亦攻補兼行之術

又凡濕熱積痰皆能生蟲與小兒疳蟲無異用金蟾丸即愈不比血化之蟲靈怪難治也

既殺蟲後但當滋補其虛陰虛者十居八九瓊玉膏主之加黃

柏知母紫河車更佳。陽虛者十之二三。六君子湯主之。

欬嗽

雜病欬嗽。另有方書可查。未及備論。茲所論者虛癆失血之欬嗽也。失血家十有九欬所以然者肺為華蓋肺中常有津液則肺葉腴潤覆垂向下將氣斂抑使其氣下行氣下則津液隨之而降是以水津四布水道通調肝氣不逆腎氣不浮自無欬嗽之病矣血者火化之陰汁津者氣化之水液二者本相濟相養水不濟火則血傷血不養氣則水竭水竭則津不潤肺血傷則

火來剋金金被火剋不能行其制節於是在下之氣始得逆上氣既逆上則水津不能隨氣下布凝結為痰在下之水邪又得隨氣而升泛為水飲皆致欬嗽吾於欬血門已詳論之茲復條列如左以便查核

一肺臟津虛火氣乘之致成燥欬氣嗆痰澀或帶血絲久成肺痿清燥救肺湯治之

一痰火凝結欬逆發渴喉中痰滯者由於津液不散阻塞氣道治宜清利其痰滋養其津紫菀散主之

一水飲沖肺欬逆倚息不得卧者由於失血之人肝經風火太

盛激動其水上衝肺。卧則肺葉張水飲愈衝是以不得卧息。葶藶大棗瀉肺湯治之瀉白散亦治之吾每用二陳湯治飲加蘇子、柴胡、白芥、枯芩、石膏、杏仁、荆芥、薄荷、枇杷葉、風火兼治尤效。此與雜病欬嗽。因寒動水者有異。因寒動水以致水飲衝肺者。宜小青龍及真武湯。血證欬嗽多是内動風火激水而上。青龍真武等。又其所忌。醫者辨之。

夫虚痨欬嗽。原於火剋金水乘肺。而切究其故。則病皆在於胃。胃為水穀之海。化生津血。血不足則火旺。津不生則肺燥。水氣不化。則飲邪上干。治胃火宜白虎湯加生地、百合、五味。或玉女

煎。治胃痰宜滚痰丸。指迷茯苓丸。輕者用豁痰丸。治胃中水飲。宜二陳湯加蘇子白芥、防己枳殼杏仁生薑若水飲挾火者加柴胡、枯芩、當歸、白芍。

內經云五臟六腑皆有欬嗽。而無不聚於胃關於肺上條分肺胃治已詳。茲有一方可以統治肺胃者則莫如小柴胡湯。肺火盛加寸冬心火盛加黃連、當歸。肝火盛加當歸、胡黃連黃昏欬嗽。為火浮於肺。加五倍子、五味子、以斂之。五更欬嗽為食積之火至寅時流入肺經。加萊菔子。痰凝氣滯者加瓜霜、旋覆、杏仁、桔梗、射干、尖貝。水飲上衝者加葶藶、桑皮、細辛、五味。有寒加乾

薑雲苓若兼外感發熱惡寒鼻塞頭痛而欬嗽者宜小柴胡湯加荆芥紫蘇杏仁薄荷蓋小柴胡能通水津散鬱火升清降濁左宜右有加減合法則曲盡其妙

又有瘀血作欬其證欬逆倚息而不能卧與水飲衝肺之證相似蓋人身氣道不可有塞滯內有瘀血則阻碍氣道不得升降是以壅而為欬氣壅即水壅氣即是水故也水壅即為痰飲痰飲為瘀血所阻則益衝犯肺經坐立則肺覆瘀血亦下墜其氣道尚無大碍故欬亦不甚卧則瘀血翻轉更為阻塞肺葉又張愈難斂戢是以倚息不得卧也若仍照水飲衝肺用葶藶大棗

湯是得治飲之法而未得治瘀之法矣須知痰水之壅由瘀血使然但去瘀血則痰水自消宜代抵當丸加雲苓、法夏輕則用血府逐瘀湯加葶藶、蘇子又有欬嗽側卧一邊翻身則欬益甚者諸書皆言側卧一邊乃失血欬嗽不治之證而不知仍是瘀血為病蓋瘀血偏著一邊以一邊氣道通一邊氣道塞氣道通之半邊可以側卧氣道塞之半邊側卧則更閉塞是以翻身則愈加欬逆也宜血府逐瘀湯加杏仁、五味主之側卧左邊者以左邊有瘀血故不得右卧也右卧則瘀血翻動益加壅塞宜加青皮、龜甲、莪朮以去左邊之瘀血側卧右邊者以右邊有瘀血

故不得左卧也宜加鬱金桑皮薑黄以去右邊之瘀血凡此瘀血欬嗽之證諸書少言及者朱丹溪略引其端亦未申明吾於臨證有悟不惜大聲疾呼者正欲起死人而肉白骨豈敢祕而不傳哉

又有衝氣欬逆者以衝脈起於血海循行而上麗於陽明血海受傷則衝脈氣逆上合陽明而為火逆燥欬之證麥門冬湯主之王女煎亦治之二方皆從陽明以抑衝氣之顛使不逆也

又有衝氣挾肝經相火上乘肺金者其證目眩口苦嗆欬數十聲不止欬牽小腹作痛發熱頰赤宜四物湯合左金丸再加人

尿猪膽汁、牡蠣、五味、治之蓋血室為肝之所司衝脈起於血室故肝經之火得緣衝氣而上小柴胡湯加五味、青皮、龍骨、牡蠣、丹皮、地骨皮、亦治之重者加胡黃連

衝脈本屬肝經然其標在陽明而其根則在於腎蓋衝脈起胞中而腎氣即寄在胞中腎中之氣上於肺而為呼吸亦借衝脈之路以上循入肺是以臍旁衝脈之穴謂之氣街內經又明言衝為氣街衝脈之與腎經交合者如是是以衝脈每挾腎中之虛火上逆而欬喘促咽乾兩顴發赤宜猪苓湯加五味、知母、牛膝、黃柏、熟地、龜版或麥味地黃湯以安之三才湯加鐵落以鎮

之或大補陰丸合磁硃丸加五味以吸衝氣使歸於腎則不欬逆矣又有胞中之水內動衝氣挾水上逆而欬者其證上熱下寒龍雷火升面赤浮腫頭暈咽痛發熱心悸大便反滑腰痛遺溺桂苓甘草五味湯治之腎氣丸亦治之參看吐血欬血門更詳

欬嗽之病其標在肺其本在腎血家欬嗽尤多生於腎虛腎者氣之根也腎經陰虛則陽無所附氣不歸根故浮喘欬逆宜三才湯加五味子、沉香、陳脩園用二加龍骨牡蠣湯加阿膠、麥冬、五味其附子須少用只作引導耳余每用知柏地黃湯少加五

味、肉桂、以為報使。常服都氣丸亦佳。又有腎經陽虛不能化水腰痛便短。氣喘欬逆者。腎氣丸加五味治之。更有腎水泛上脾土不制。而為水飲欬嗽者。乃屬五飲雜病。非失血家應有之證。自有各書可查。茲不贅及。

發熱

吐血家脉靜身涼。不藥可愈。以陰虛虧而陽猶不亢。陰與陽尚得其和。故易愈也。或身有微熱。皮毛似汗。此為陽來求陰。水來就血。亦可自愈。所謂發熱者。與身有微熱不同。

失血家陽氣鬱於血分之中則身熱鬱冒但頭汗出身熱者火閉於內而不得達於外故也但頭汗出者火性炎上外有所束則火不能四達故愈炎上而頭汗也治法宜解其鬱使徧身微汗則氣達於外而陽不乘陰熱止血亦治矣此如盛暑過熱得雨而解小柴胡湯主之

又有瘀血發熱者瘀血在肌肉則翕翕發熱證象白虎口渴心煩支體刺痛宜當歸補血湯合甲巳化土湯加桃仁、紅花、柴胡、防風、知母、石膏血府逐瘀湯亦治之瘀血在肌腠則寒熱往來以肌腠為半表半裡內陰外陽互相勝復也宜小柴胡湯加當

歸、白芍、丹皮、桃仁、荆芥、紅花、治之。桃奴散。加黄芩、柴胡、亦治之。瘀血在腑則血室主之證見日晡潮熱晝日明了暮則譫語以衝為血海其脈麗於陽明故肯陽明燥熱之證桃仁承氣湯治之。小柴胡湯加桃仁、丹皮、白芍、亦治之。瘀血在臟則肝主之以肝司血故也證見骨蒸痨熱手足心燒眼目青黑毛髮摧折世以為難治之證而不知瘀血在肝臟使然宜柴胡清骨散加桃奴、琥珀、乾漆、丹皮治之

以上所論皆屬血家發熱之實證也又有發熱之虛證分血虛水虛兩類另條如左

血虛者。發熱汗出。以血不配氣。則氣盛而外泄也。或夜則發熱以夜主血分故也。或寅卯時即發熱。以寅卯屬少陽肝血既虛則少陽之相火。當寅卯旺時而發熱。地骨皮散。加柴胡、青蒿、胡黃連、雲苓、甘草、治之。又或胞中之火因血不足上合陽明燥氣日晡潮熱者。犀角地黃湯治之。

水虛者。水為氣之所化。水津不足。則氣熱。皮毛枯燥。口咽生瘡。遺精淋秘。午後發熱。大補陰丸。以補水濟火。或清燥救肺湯。從肺胃以生水津。水足以濡血。則陽氣不亢。燥熱自除。五蒸湯亦統治之。

復有陰虛於內陽浮於外而發熱者須大補其陰而復納其陽故產後發熱用四物湯加黑薑失血發熱亦可用之火重者再加芩連若腎陰不足真陽外浮發熱喘促者是為陰不戀陽陽不入陰宜從陰引陽用二加龍骨湯加五味寸冬阿膠或三才湯加鹽炒肉桂少許桑葉雲苓白芍蟲草棗皮牛膝五味知母沉香龜版

此外又有食積發熱者手足心腹熱胸滿噦呃大便不調日晡及夜發煩宜枳殼厚朴大黃消去之則不壅熱矣勿謂虛人無實證也

厥冷

雜病四支厥冷。為脾腎陽虛。不能達於四末。四逆湯主之。若失血之人。而亦間有發厥者。則多是熱邪內陷伏匿在裡。外見假寒身如冷水。目昏神暗。脈伏不見。或冷一陣反而發熱。或厥數日反發熱數日。其厥多熱少者。是陽極似陰。熱之至也。厥少熱多者。是伏熱猶得發洩。熱尚淺也。此即傷寒論厥陰篇所謂熱深厥亦深。熱微厥亦微。是矣。蓋厥陰肝經內寄膽火。病則火伏陰中而為厥。火出陽分則反熱。發熱固是火甚。發厥則火伏於

內而更盛矣。先宜治其伏火。使火得發。轉厥為熱。次乃更清其熱。斯可愈耳。若誤認為雜病發厥。而用熱藥。是促其命也。其辨法。雜病之厥。吐利不止。脈脫氣微。有寒無熱。伏火之厥。則厥後微露熱形。口不和。便不溏。小便不清。心中疼熱煩躁不寧。惡明喜暗。渴欲得飲。吐衄隨厥而發。皆現真熱假寒之象。先以清化湯。合升降散。攻其伏熱。或當歸蘆薈丸攻之。次以五蒸湯清之。厥止熱不退者。再用大補陰丸。地黃湯以滋陰。

發厥之證。又有寒閉於外而火不得發者。用仲景四逆散加荊芥、老連、枯芩。審其陽陷於內而不出者。白頭翁湯以清達之。升

陽散火湯以溫發之二方酌宜而行

血家發熱固多是真熱假寒然亦有真寒者去血太多氣隨血洩以致中氣怯而不旺元氣損而不足四支厥冷不思飲食大便溏瀉此乃虛則生寒之證法宜溫補十全大補湯參附湯養榮湯隨宜用之

寒熱

發熱惡寒多是外感傷其榮衛傷榮則寒傷衛則熱平人治法須用麻桂發散失血皆陰血大虧不可再汗以耗其氣分之水

液只可用小柴胡湯加荆防紫蘇杏仁薄荷前胡粉葛等以和散之免犯仲景血家忌汗之戒也若不關外感係本身榮衛不和發為寒熱似瘧非瘧者不可作瘧治之只用小柴胡或逍遥散和其榮衛而愈又有瘀血作寒熱者其身必有刺痛之處血府逐瘀湯治之此與雜病寒熱有異醫者須知

出汗

汗者氣分之水也血虛則氣熱蒸發其水而出為汗但頭汗出身不得汗者乃陽氣內鬱冒於上而為汗以小柴胡湯解其

鬱。則通身得汗、而愈。蒸蒸汗出者。乃血虛氣盛。沸溢為汗。宜用白虎湯。加當歸、蒲黃、蟲退、治之。手足濈濈汗出者。以胃中或有瘀血食積。四支為中洲之應。火熱中結。故應手足汗出也。宜玉燭散。加枳殼、厚朴、以攻之。結去而汗自止矣。睡中盜汗者。睡則氣歸血分。血不足則氣無所歸。故氣泄而汗出。宜當歸六黃湯治之。或地骨皮散。加棗仁、知母、茯苓、五味、黃芪、黃柏。

以上所論。皆失血家。陰血內虛。陽氣過發之病。亦有陰陽兩虛。自汗盜汗者。宜歸脾湯。加麥冬、五味。或當歸六黃湯。加附子。

又有大汗亡陽者。在雜病亡陽。則單屬陽虛。失血家大汗亡陽。

則兼是陰虛。陽無所附。非大劑參附湯。不能回陽。維用獨參湯養之而愈。

此論血家出汗。與雜證出汗有別。參看汗血發熱門更詳。

發渴

血虛則發渴。有瘀血則發渴。水虛亦發渴。

血虛發渴者。血為陰。氣為陽。血少則氣多。陽亢無陰汁以濡之。故欲飲水也。法宜補血。血足則氣不熱矣。聖愈湯加天冬、花粉、沿之。或當歸補血湯加花粉、苧麻根、玉竹、寸冬。

瘀血發渴者。以津液之生。其根出於腎水。水與血交會。轉運。皆在胞中。胞中有瘀血。則氣為血阻。不得上升。水津因不能隨氣上布。但去下焦之瘀。則水津上布而渴自止。小柴胡加丹皮、桃仁、治之。血府逐瘀湯亦治之。挾熱蓄血者。桃仁承氣湯治之。夫寒瘀滯者、溫經湯治之。

水虛發渴者。以肺胃之水津不足。是以引水自救。水津雖由水穀所化。而其氣實發源於腎中。腎中天癸之水。至於胞中。循氣衝。隨呼吸。而上於肺部。肺金司之。布達其氣。是以水津四布口舌胃咽。皆有津液。而不渴也。若腎中之水不足。則不能升達上

焦是以渴欲引水宜啟下焦之陰以滋津液地黃湯加人參麥冬訶子或左歸引加兒茶人參玉竹三才湯加知母治之夫水津雖生於腎而實布於肺又有腎中之水津本足而肺金鬱滯不能散布以致水結為痰咽乾口渴宜小柴胡湯通上焦之滯使肺氣通調則水津四布矣又曰津液雖生於腎布於肺而實賴胃中水穀以滋其化源胃中燥結則津不生三一承氣湯治之胃中蘊熱則津不生玉泉散治之胃經肌熱則津液被灼人參白虎湯治之胃中虛熱則津不生麥冬養榮湯治之

上分三條皆失血多有之證與雜證消渴不同參看可也

心煩

煩者、心不安也。心為火臟。化生血液。轉賴血液以養其火。故心字篆文即是倒火。火降則心甯也。失血家亡血過多。心火失其滋養。故多發煩。火太甚者。舌上黑胎。夜不能寐。黃連阿膠湯主之。心中懊憹者。以火不得宣。故鬱而不樂也。宜梔子豉湯。加連翹、桔梗、大力、生地、遠志、老連、草稍治之。若火不甚而血太虛者。心中了戾不得。是為虛煩。歸脾湯加硃砂、麥冬、炒梔、治之。逍遥散。加龍骨、棗仁、亦治之。仲景酸棗仁湯。尤為治煩要藥。若煩而

兼躁。手足妄動。此為虛中夾實。內有燥屎。必見二便不調。發熱口渴。脈數有力等證。在傷寒為承氣證。在失血家須兼顧其虛。宜玉燭散。或用玉女煎加元明粉。煩躁之極。循衣撲牀。小便利者。陰尚未盡。猶可救一二。小便不利。死不治矣。此與陰躁不同。陰躁不煩而但躁。且必現陰寒可據之證。須細辨之。

又有產後血虛。心煩短氣者。雖同是心煩。然產血下行。氣多崩脫。其血之虛。皆由於氣虛。故心煩而必兼短氣。宜歸脾湯。當歸補血湯。養榮湯等。以補氣者生血。而心煩自愈。至吐血家。則其氣上逆。多是氣實血虛。證見心煩。尤血不養心之甚者也。若再

補其氣則氣益甚而血益虛心愈不得其安矣治宜補血清火。
硃砂安神丸治之。須參看卧寐怔忡驚悸門。

卧寐 夢寤附

卧者身着席頭就枕之謂也。寐者神返舍息歸根之謂也。不得卧寐之證。雜病猶少。失血家往往有之。
不得卧有二證。一是胃病。一是肺病。
胃病不得卧者陰虛則邪併於陽煩躁不卧。此與傷寒論陽明篇微熱喘冒不得卧者為胃有燥屎之義同。三一承氣湯治之。

若無燥結但係煩熱者竹葉石膏湯白虎湯治之兼理血分則宜用玉燭散玉女煎又有胃中宿食脹悶不得卧者越鞠丸加山查麥牙萊菔子蓋陽明主闔和其胃氣使得還其主闔之令斯能卧矣

肺病不得卧者肺為華蓋立則葉垂卧則葉張水飲衝肺面目浮腫欬逆倚息卧則肺葉舉而氣益上故欬而不得卧葶藶大棗瀉肺湯攻去其水則得卧矣或二陳湯加乾薑細辛五味溫利水飲亦可若是火逆之氣挾痰上衝者則又宜水火兼瀉痰甚者消化丸主之火甚者滚痰丸主之平劑則宜二陳湯加

柴胡瓜蔞枯芩旋覆杏仁薑汁竹瀝保和湯亦治之若無痰飲但是火氣上衝者其人晝日不欬卧則欬逆氣不得息乃肺痿葉焦卧則肺葉翹舉氣隨上衝喘欬不已宜清燥救肺湯加生地花粉百合五味以斂之再加鍾乳石以鎮降之且肺之津生於腎中如腎水不能上濟上焦衝氣逆上欬不得卧者當從腎治之六味丸加參麥散再加牛膝以引氣下行加磁石以吸金氣使歸於根

不眠之證有二一是心病一是肝病

心病不寐者心藏神血虛火妄動則神不安煩而不寐仲景黃

連阿膠湯主之。陰虛痰擾。神不安者。猪苓湯治之。一清火。一利水。蓋以心神不安。非痰即火。余每用硃砂安神丸。加茯苓、琥珀。或用天王補心丹。

肝病不寐者。肝藏魂。人寤則魂游於目。寐則魂返於肝。若陽浮於外。魂不入肝。則不寐。其證並不煩躁。清睡而不得寐。宜斂其陽魂。使入於肝。二加龍骨湯。加五味、棗仁、阿膠、治之。又或肝經有痰。擾其魂而不得寐者。溫膽湯。加棗仁、治之。肝經有火。多夢難寐者。酸棗仁湯治之。或滑氏補肝散。去獨活加巴戟。四物湯加法夏、棗仁、蟲草、龍骨、夜合皮、亦佳。

又按魂雖藏於肝。而晝遊於目。目在面部。乃肺胃之所司。肺胃之氣擾而不靜。亦能格魂於外。使不得返也。宜生地、白合、麥冬、知母、枳殼、五味、白芍、甘草、棗仁、花粉、茯苓治之。人參清肺湯亦治之。又有虛悸恐怖不寐之證。仁熟散治之。思慮終夜不寐者。歸脾湯加五味治之。須參看怔忡煩悸門。

又有昏沉多睡之證。在雜病為邪入陰分。在失血虛癆。乃血脫之後。元氣不支。是以昏睡。如汗出氣喘。危急之候也。參附湯救之。寤屬陽。故不寤為陽虛。人參養榮湯亦治之。若身體沉重。倦怠嗜卧者。乃脾經有溼。平胃散加猪苓、澤瀉治之。六君子湯加

防已芪仁補中益氣湯亦治之此論多睡多是陽虛然亦有膽經火甚而多昏睡者龍膽瀉肝湯治之

夢乃魂魄役物恍有所見之故也魂為病則夢女子花草神仙歡喜之事酸棗仁湯治之魄為病則夢驚怪鬼物爭鬬之事人參清肺湯加琥珀治之夢中所見即是魂魄魂善魄惡故魂夢多善魄夢多惡然魂魄之所主者神也故安神為治夢要訣益氣安神湯治之又有痨蟲生夢照痨蟲法治之又有夢而遺精詳遺精門

再按睡而惡明喜暗者火邪也側卧不得轉身者少陽之樞機

不利也。側卧一邊者。詳欬嗽門。

喘息

人不喘息。則氣平靜。血何由隨之吐出哉。故失血家未有不喘息者。有實喘有虛喘

實喘之證有二。一是鬱閉。一是奔迫。鬱閉者氣不達於外。而壅鬱於內也。失血家陽來乘陰。此證維多傷寒喘息者。用麻桂發之。血家忌汗。又忌升發。以動其血。與傷寒開鬱閉之法不同。宜小柴胡湯加杏仁。以轉樞外達。使腠理通榮衛和。斯達氣於外。

不壅於內而為喘矣如果有外感閉束不得不疎解者宜香蘇引加杏仁、桔梗、甘草或千金麥門冬湯借麻黃以解外而兼用清裏之藥不致過汗亡陰乃為調劑得宜

奔迫者上氣喘急由於氣盛於下而逆於上失血家火盛逼血往往其氣粗賁宜大瀉其火火平則氣平用厚樸枳殼大黃使地道通氣下瀉則不上逆矣若內有瘀血氣道阻塞不得升降而喘者亦宜上三味加當歸、白芍、桃仁、丹皮治之若是痰氣阻塞者清化丸主之若小便閉者下竅塞故上竅壅也宜五淋散加防己、只殼、杏仁、桑皮、葶藶

虛喘亦有二證一是肺虛一是腎虛肺虛作喘者以肺居上焦制節五臟開竅於鼻以通外氣以斂內氣血虛則火盛津傷肺葉痿而不下垂故氣不得降喘息鼻張甚則鼻煽若無闔闢乃肺痿之重證也生津補肺宜清燥救肺湯兼治鬱火痰滯者宜保和湯或太平丸吾謂肺葉下墜宜兼用鎮斂之法三才湯合生脈散再加百合五倍子白芨花粉杏仁尖貝鍾乳石治之又有喘息由於鼻窒不通者以肺中之火鬱閉鼻管故氣并於口而為喘也太平丸加射香即是上通鼻竅之妙藥與傷寒鼻塞有異毋誤治也

腎虛喘息者。以氣之根原於腎。失血家火甚水枯。不能化氣。是以氣短而喘。欬逆喘息。頻赤咽乾。宜大補陰丸。加牛膝、五味、以潛降之。若是陰虛陽無所附。氣不歸根者。地黃湯合生脈散。加磁石、牛膝、沉香、以滋納之。若小水不化。兼腰痛者。乃是腎中之陽不能化氣。宜腎氣丸治之。

上係肺腎分治之法。如欲兼而治之。即從諸方化裁可也。此外如蘇子降香湯。四磨湯。皆肺腎兼治。但未能照顧血證。用者須知加減。

又曰、中宮虛則氣少。人參主之。中宮實則氣粗。大黃主之。

呃噦

久病聞呃為胃絕須審脈證斷之不得但據呃逆遂斷其死也失血家氣不順利多有呃逆新病形實者為伏熱攻發火性炎上氣逆而呃清熱導氣宜三物湯或柴胡梅連散加枳殼檳榔若膈間有痰閉滯者宜滚痰丸指迷茯苓丸又有瘀血阻滯而發呃者必見刺痛逆滿之證大柴胡湯加桃仁丹皮蘇木治之血府逐瘀湯亦治之若久病發呃形虛氣弱者為胃中空虛客氣動膈所謂客即痰火氣也治痰氣宜旋覆代赭石湯或二陳

湯加丁香枳殼治火氣宜玉女煎加旋覆赭石柿蒂或用梅連散加柿蒂枳殼五味俗治呃逆但用丁香柿蒂丁香性温降痰柿蒂性寒清火二物騎牆之見故多不效須分寒熱用之

噦者吐氣也血家氣盛此證最多其治法與呃逆同惟有傷食胃中壅塞而發噦者宜越鞠丸加旋覆枳殼萊菔子

以上皆治胃之法而心氣不舒亦有發呃噦者常見人有抑鬱心氣不暢則胸中喉間常如有物哽塞時發噦呃不得快利治法當清其心調其氣宜二陳湯加黃連連翹大力桔梗瓜霜當歸光貝治之餘詳痰飲門

痰飲

痰飲之證。已詳於欬血咯血欬嗽諸條。茲因失血諸人。無不兼痰飲者。故更言之。不憚煩複。

痰飲者。水之所聚也。人身飲食之水。由口入。由膀胱出。肺氣布散之。脾氣滲利之。腎氣蒸化之。是以瀉而不留也。此水不留則無飲邪矣。人身津液之水。生於腎中。寄居胞室。隨氣而上布於肺經。是為津液。津液散布則不凝結而為痰矣。

上焦血虛火盛。則煉結津液。凝聚成痰。肺為之枯。欬逆發熱。稠

粘滯塞此由血虛不能養心則心火亢甚剋制肺金津液不得散布因凝結而為痰也豁痰丸治之二陳湯加黃連黃芩柴胡瓜霜亦治之玉女煎加茯苓白前旋覆或保和丸以滋肺胃為燥土燥氣甚則津結為痰指迷茯苓丸主之頑痰壅塞者滚痰丸治之

痰粘喉中哽塞不下者名梅核氣證仲景用七氣湯理氣除痰血家病此多兼鬱火宜指迷茯苓丸加甘草桔梗紫蘇香附旋覆薄荷射干瓜霜大力余按咽中乃少陰脈所繞心經火甚往往結聚成痰發為梅核宜甘桔湯加射干山梔茯神連翹薄荷

再用生半夏一大枚。切片醋煮三沸。去半夏。入射香少許。沖前藥服。又衝脈亦挾咽中。若是衝氣上逆。壅於咽中。而為梅核。必見頰赤氣喘等證。審其挾水飲而上者。桂苓甘草五味湯治之。審其挾痰火而上者。猪苓湯加海粉、瓜蔞霜、旋覆花、治之。

夫痰為津液所凝。而津液之生。原於腎。下焦血虛氣熱。津液不升。火沸為痰。猪苓湯。地黃湯。隨加尖貝、五味、寸冬、旋覆、冬花、海粉、牛膝、白前、龍骨、牡蠣、黃柏、知母等藥。

飲由水氣停蓄。其責在於膀胱。若膀胱之水。因寒上泛。胸腹漉漉有聲。喉中潮響。欬嗽哮吼等。此為土不治水。肺受其憊。通用

二陳湯治之。六君子湯。真武湯。小青龍湯治之。

按失血之人。由於陰虛火旺。少病寒飲者即或咳吐痰水。審其脉滑數。心煩熱者。仍是火盛水溢。火逆之至是以水逆之甚也。其治法清火瀉水兼而行之。宜葶藶大棗瀉肺湯。消化丸及二陳湯加芩連柴胡白前根參看欬嗽諸條乃詳。

痞滿

積聚　癥瘕

心下為陽明之部分。乃心火宣布其化之地。君火之氣化血下行隨衝脈以藏於肝。即從心下而起。腎水之陽化氣上行隨衝

脹以交於肺由肺散布以達肌膚亦從心下而出蓋此地為陽明中土乃水火血氣上下往來之都會也火降血下氣升水布則此地廓然設若火不降則血不下而滯於此矣設若氣不布則水不散而結於此矣觀傷寒論治心下痞滿之證用瀉心湯以瀉火用十棗湯以瀉水甘草瀉心湯生薑瀉心湯水火兼瀉五苓散解水結柴胡湯解火結可知此地須水升火降斯為既濟之形設上火下水阻於中宮遂成天地否象故名曰痞血家火浮於上與水不交往往見痞滿之象審係火氣不得下降者瀉心湯治之或加生附子以開其痞審係膀胱水中之陽逆於

心下。不得外出者。以小柴胡湯轉其樞機。而水火皆通達矣。如水火交結。輕者為結胸小結胸湯主之。重者為陷胸大陷胸湯治之。若單是水氣結聚者。二陳湯。枳朮丸治之。若是食積胃中。脹痛噯腐者。平胃散加山查、神曲、麥芽、治之。今醫但知停食痞滿。而不知痞滿之證。不一而足。此外尚有胸痺等證。皆未論列。茲所論者。乃失血家間有之證也。凡遇以上諸證。再能酌加歸、地、芎、赤芍、丹皮等以照顧血證。斯為面面俱到。

又有積聚之證。或橫亘心下。或盤踞腹中。此非凝痰即是衰血。通以化滯丸主之。凝痰用清茶送下。衰血用醋酒送下。無論臍

上臍下左右兼治又凡在臍下多是血積抵當丸治之

又有癥瘕見於臍下或見或沒為瘕常見不沒為癥癥宜膈下逐瘀湯抵當丸瘕宜橘核丸

按痞滿者胸膈間病積聚者大腹之病微瘕者下焦之病統以真人化鐵湯加吳萸治之統以逍遥散和之另詳瘀血門

腫脹

腫脹者水病也氣病也失血家往往水腫氣腫抑又何哉蓋以血之與氣水之與火互相倚伏是二是一吾於水火血氣論及

調經去痰諸條已言之茲復不憚煩勞曰氣即水也血中有氣即有水故肌肉中有汗口鼻中有津胞中有水是水與血原并行不悖失血家其血既病則亦累及於水水蓄胞中則為尿結水淫脾胃則為脹滿水浸皮膚則為水腫治法皮膚水腫者宜從肺治之以肺主皮毛故也肺為水之上原肺氣行則水行宜瀉白散加杏仁桔梗紫蘇茯苓五皮飲亦治之大腹脹滿者宜從脾治之補土利水則水行而土敦胃苓湯主之六君子湯加茯仁防己亦主之胞中水結小腹脹滿者五苓散治之猪苓湯亦治之諸水又皆腎之所主腎氣化則上下內外之水俱化宜

六味地黃丸。

以上所舉之方。皆平劑也。醫者又須審別陰陽。隨加寒熱之品。乃能奏效。審其口渴溺赤喜涼脉數者。為陽水。則知柏、芩、連、山梔、石膏、天冬、麥冬、可加入。審其口和溺清喜熱脉濡。為陰水。則桂、附、乾薑、吳茱萸、細辛、可加入。失血家陽水居多。陰水最少。醫者須臨時細審。

又有瘀血流注。亦發腫脹者。乃血變成水之證。此如女子胞水之變血。男子胞血之變精。瘡科血積之變膿也。血既變水。即從水治之。宜照上所舉諸方。分寒熱加減。再加琥珀、三七、當歸、川

芎桃奴蒲黃以兼理其血斯水與血源流俱治矣古稱婦人錯經而腫者為水化為血名曰水分經水閉絕而腫者為血化為水名曰血分其實治法總宜從水治之方證加減舉不外此也觀於婦人水分血分之說則知血家所以多腫脹者亦是水分血分之病也此與雜證水腫有別勿妄用舟車丸及消水聖愈湯等另詳血臌門

怔忡

俗名心跳心為火臟無血以養之則火氣衝動是以心跳安神

丸清之。歸脾湯加麥冬、五味、以補之。凡思慮過度。及失血家去血過多者。乃有此等虛證。否則多挾痰瘀。宜細辨之。

心中有痰者。痰入心中。阻其心氣。是以心跳動不安。宜指迷茯苓丸。加遠志、菖蒲、老連、尖貝、棗仁、當歸、治之。硃砂安神丸。加龍骨、遠志、金箔、牛黃、射香、治之。

心中有瘀血者。其人健忘。瘀血下墜。阻其心氣。不得升遂。是以跳踊。血府逐瘀湯治之。硃砂安神丸。加菖蒲、鬱金、丹皮、乾漆、亦治之。

又有胃火強梁。上攻於心。而跳躍者。其心下如築牆然。聽之有

聲。以手按其心下。復有氣來抵拒。此為心下有動氣。治宜大瀉心胃之火。火平則氣平也。瀉心湯主之。或玉女煎加枳殼、厚朴、赭石、旋覆花、以降之。再加鬱金、莪朮、以攻之。使血氣火三者皆平。自不强梁矣。

此證須參看驚悸健忘門。

驚悸

悸者、懼怯之謂。心為君火。君火宣明。則不憂不懼。何悸之有。心火不足。則氣虛而悸。血不養心。則神浮而悸。仲景建中湯治心

氣虛悸。炙甘草湯治心血不足而悸。今則以養榮湯代建中。以歸脾湯代炙甘草湯。一治氣虛。一治血虛。又有飲邪上干水氣凌心。火畏水尅而悸者。桂苓甘朮湯治之。失血家多是氣血虛悸。水氣凌心者絕少。又曰正虛者邪必湊之。凡是怔忡驚悸健忘恍忽一切。多是痰火沃心擾其神明所致。統用金箔鎮心丸主之。

驚者。猝然恐惕之謂。肝與膽連。司相火。君火虛則悸。相火虛則驚。蓋人之膽壯則不驚。膽氣不壯。故發驚惕。桂枝龍骨牡蠣甘草湯治之。恐畏不敢獨卧者。虛之甚也。仁熟散治之。又凡膽經

有痰則膽火上越此膽氣不得內守所以驚也溫膽湯加龍骨、牛黃棗仁琥珀、柴胡、白芍、治之復有陽明火盛惡聞人聲聞木音則驚者此內經所謂氣并於陽故發驚狂者也乃肝膽木火來剋脾土法宜大瀉陽明之火大柴胡湯治之當歸蘆荟丸亦治之血家病驚多是陽明火盛病虛驚者亦復不少用以上諸方又須兼顧血證以盡其化裁勿執桂甘龍牡等湯而不知宜忌也

健忘

健忘者適然而忘其事盡心力思量不來凡所言行往往不知首尾病主心脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由思慮過多心血耗散而神不守舍脾氣衰憊而意不强二者皆令人恍然忘事也治法必先養其心血理其脾氣以凝神定志之劑補之亦當處以幽閒之地使絕其思慮則日漸以安也歸脾湯主之若心經火旺者是火邪擾其心神治宜清火甯心天王補心丹治之亦有痰滯留於心包沃塞心竅以致精神慌惚凡事多不記憶者宜溫膽湯合金箔鎮心丸治之硃砂安神丸加龍骨遠志菖蒲茯神炒黃丹亦治之失血家心脾血虛每易動痰

生火健忘之證尤多

又凡心有瘀血亦令健忘內經所謂血在下如狂血在上喜忘是也夫人之所以不忘者神清故也神為何物即心中一點血液湛然朗潤故能照物以為明血在上則濁蔽而不明矣凡失血家猝得健忘者每有瘀血血府逐瘀湯加鬱金菖蒲或硃砂安神丸加桃仁丹皮鬱金遠志

慌惚

癲狂　見鬼

大病傷寒之後欲食不食欲卧不卧欲行不行精神慌惚若有

鬼神附其體中者名曰百合病謂百脉一宗合致其病肺主百脉肺魄不甯故病如此諸多慌惚未盡名狀必見溺赤脉數之證乃肺金受尅之驗也仲景用生地百合滑石治之此專言雜病餘邪為患者也失血家陰脉受傷凡是慌惚不甯皆百合病之類總宜清金定魄為主清燥救肺湯加百合茯神琥珀滑石生地金箔治之地魄湯亦治之或瓊玉膏加龍骨羚羊角百合或入參清肺湯加百合滑石

大凡夜夢不甯者魂不安也魂為陽夜則魂藏而不用魂不能藏故夜夢不甯寤時恍惚者魄不安也魄為陰寤時而陰氣不

足故恍惚不定治魂以肝為主治魄以肺為主二者對勘自明然慌惚驚悸惑亂怔忡癲狂皆是神不清明之證且人身有魂魄二者而所以主是魂魄者則神也故凡諸證總以安神為主安神丸金箔鎮心丸治之

語言錯亂為癲多由喪心失魄痰迷心竅所致統以金箔鎮心丹治之怒罵飛走為狂由於火邪逼迫心神迷亂四肢躁擾滾痰丸主之

見鬼者癲狂之類也陽明病胃有燥屎則目中見鬼宜三一承氣湯下之失血家瘀血在內亦譫語見鬼以其同為實邪故俱

能擾日之明也。桃仁承氣湯治之。

暈痛

傷寒雜病。頭暈痛者。風寒也。血家暈痛則多是痰火。誤用發散藥。鮮不增劇。

痰氣上攻。頭目沉重昏花。兀兀欲吐。首如裹物。右手脈實。陰雨增痛。是痰候也。二陳湯加防風、川芎、酒芩、薄荷、細辛、石膏治之。

病重者消化丸治之。

火逆暈痛者。煩渴引飲。見火增劇。掉頭更痛。口苦嗌乾。溺赤便

閉左手脉數是火診也大柴胡湯治之當歸蘆薈丸亦治之輕則小柴胡湯加菊花

以上所論皆暈痛之實證又有暈痛之虛證須分暈與痛之兩門而後施治有別也

肝虛則頭暈內經云諸風掉眩皆屬於肝肝血不足則生風風主動故掉眩失血之人血虛生風者多逍遙散加川芎青葙子夏枯草治之或但滋肝臟以為息風之本左歸飲加牛膝巴戟杞菊細辛枸杞

腎虛則頭痛內經所謂頭痛顛疾下虛上實過在少陰是也

味地黃丸。加細辛、葱白、射香、治之。若是腎厥頭痛。乃腎中濁陰上逆於頭上實下虛。手足厥冷。宜腎氣丸。加細辛、葱白。此證之痛連齒入腦。與尋常微痛者不同。血家頭痛。似此者少。宜用六味丸者多。

又曰、頭暈痛雖是兩病。失血之人。往往兼見二證。由於血虛則風動而暈。火動而痛。吾謂不分暈痛。亦不分治肝治腎。總以四物湯加元參、枸杞、蓯蓉、玉竹、天麻、細辛、知母、黃柏、泰皮、牛膝。

眼目

目黃　出火　見鬼　昏花

眼為肝竅。又陽明脈絡所繞。故其為病皆肝胃兩經之咎。

眼珠黃者。在胃經屬濕熱。甚則通身皆黃。小便必然不利。宜五苓散加茵陳、梔子、秦皮、黃柏、知母、治之。在肝經是瘀熱。仲景云衄家目黃者。衄未止。是血中有熱故也。凡是血熱者。其目多黃。四物湯加柴胡、枯芩、丹皮、蘇木、茵陳、紅花、治之。目珠紅亦是瘀血。治與上同。

目中出火者。一是胃火亢甚。必兼口渴身熱等證。犀角地黃湯加石膏、花粉、銀花、枳殼、治之。一是肝火外越。必兼口苦耳鳴等證。當歸蘆薈丸治之。

目中見鬼者。一是胃有燥屎。目神昏花三一承氣湯治之。一是肝經血虛。蓄有瘀熱。夜則譫語。大柴胡湯加桃仁、丹皮、治之。目運者。肝之風火也。觀羊角風可悟。宜小柴胡湯加當歸、白芍、防風、菊花、治之。眼花者。腎之陰虛。瞳神屬腎。客熱犯之。時見黑花或成五色。宜地黃湯加枸杞、硃砂、磁石、蓯蓉、石決明、元參、知母、細辛治之。

以上所舉。皆血家間有之病。其餘目疾。非血家兼有者不贅。

耳病

陳脩園曰。腎開竅於耳。而腎脉却不上頭。腎與心交。假道於心脉小腸之脉。以入耳中。名曰聽宮。為司聽之神所居。其形如珠。皮膜包裹真水。若真水破。而耳立聾。有為大聲所震而聾者。皮膜破也。或聾或不聾者。心腎不交也。宜磁硃丸以交心腎。有先耳鳴而後聾者。腎虛不能閉藏陰氣。窒塞於陽竅也。宜六味丸去丹皮加磁石、五味、龜板。令陰氣自盛。於本宮不觸於陽竅而愈。若外感暴聾。總不外少陽一經。足少陽膽脉繞耳輪。手少陽三焦脉入於耳。邪氣壅塞聽宮。為其所掩。宜逍遥散去白术加黃芩、半夏、生薑、竹黃、羚羊、玉竹、治之。風火交煽。宜防風通聖散。

肝火熾甚。宜當歸蘆薈丸。尺脈弱者。宜桂附地黃丸。尺脈數者。宜大補陰丸。俱加磁石、菖蒲、菟絲神而明之。存乎其人。非筆楮所能盡。

按上陳脩園說最明。但又有久病之人。以及產婦。中宮大虛。不能堵塞肝腎之氣。以致虛火上衝。而發耳鳴者。雖係膽與腎中之火。却要填補脾胃。以堵塞之。歸脾湯加柴胡、山梔、魚鰾、蓮米、五味、治之。四君湯加蓮米、芡實、苡仁、黃精、白芍、淮藥、亦治之。

口舌

五臟六腑。皆秉氣於胃。五臟六腑之氣。亦皆發見於胃。口者胃之門戶。故五臟六腑之氣。皆見於此。口苦是膽熱。小柴胡湯加黃連、治之。口甘是脾熱。甲己化土湯加花粉、茵陳、炒梔、茯苓、枳殼、厚朴、枯芩、石膏、治之。口酸是濕熱。觀炎天糞肉過夜則酸。便知酸是濕熱所化。葛根黃連黃芩湯加防己、茵陳、木通、滑石、花粉、雲苓、治之。或蒼朮、黃柏、老連、吳萸、亦治之。口鹹是脾濕潤下作鹹。脾不化水故鹹也。二陳湯加旋覆、藿香、白芍、檀香、吳萸、治之。胃苓湯亦治之。或六味地黃湯加旋覆、牛膝、白前、從腎中化水納之下行以隔治之。口淡是胃虛。六君湯隨寒熱加減治之。

口涩是風熱。通聖散去芒硝大黃治之。口麻是血虛。聖愈湯加薄荷治之。口臭是食積之火。平胃散加山查、神曲、麥牙、枯芩、石膏治之。口中糜爛。是膀胱遺熱於小腸。熱氣不得下泄。故糜及於口。導赤散加花粉、二冬、銀花、燈心、前仁、梔子治之。喉腥是肺火痰滯瀉白散。合甘桔湯。再加射干、兜鈴、枯芩、杏仁、尖貝、二冬、百合、瓜霜治之。總而論之。口乃胃之門戶。總以治胃為主。宜分寒熱。用甘露飲平胃散加減治之。

舌為心之苗。而居口中。臟腑之氣。發見於口者。多着於舌。故即舌胎可以診知臟腑諸病。傷寒邪在表者舌無胎。在半表半裏

者舌乃有胎。入裏則胎結矣。故凡有胎。皆係內證。胎白為濕熱。小柴胡湯。加花粉、石膏、滑石、木通、治之。胎黃為燥熱。犀角地黃湯。加知母、石膏、花粉、酒軍、枳殼、治之。黑胎芒刺為實熱。大承氣湯治之。若胎黑而舌滑潤者。乃水極似火。真寒假熱之證。四逆湯加膽汁、人尿、葱白、治之。血家虛火。又宜地黃湯加肉桂、牛夕、五味、龍骨、以引導之。

又凡舌腫舌裂痛瘡等證。均是心脾火毒。瀉心湯治之。大清涼散亦治之。若舌根木強。或舌短縮者。皆是少陰經風邪內動。陰火上騰之候。地黃飲子。加羚羊角治之。

上所論口舌諸證。血家間亦有之。要宜以血證為主。參以上各法。斯為本末兼權之術。

咽喉

咽喉為肺之關。胃之門。少陰心脈之所絡。肝經衝脈之所夾。凡此四經。皆血之所司也。故失血家。往往有咽痛之證。凡咽痛而聲不清利者。為肺火。肺主氣。氣管中痛。故聲不清利。甘桔湯加兜鈴、枯苓、杏仁、尖貝、老連、寸冬、百合、薄荷治之。凡咽痛而飲食不利者。胃火也。胃上口為食管。食管痛。故飲食不利。白虎湯加

銀花酒軍桔梗枳殼治之咽喉作痛而上氣頰赤者肝經衝脈逆上之火也宜玉女煎加旋覆射干再用鹽炒安桂少許以引火下行喉中塞腫及潰爛皆是少陰心經之火宜瀉心湯加豆根大力桔梗甘草薄荷細辛膽星牛黃治之腫塞者外用人爪甲雞內金急性子全蝎合巴豆炒過去巴豆再加火硝硼砂水片膽礬青黛老連枯礬吹上吐痰血即愈潰爛者外用雄黃老連珍珠桑螵蛸寒水石牛黃硼砂射香吹之又有梅核證在痰飲門參看

再按血家咽痛多是肺胃虛火及衝脈火逆吾於欬嗽諸條言

之甚詳。痨蟲蝕咽。見聲音門。宜參滙。

聲音

失血家。初病失音。多是風火聲音者肺之所主。肺金清朗。則聲音顯明。失血家肺金陰虛為火所剋。肺竅不通。鼻塞聲閉。若係外感閉其氣者。宜小柴胡湯加杏仁、桔梗、荆芥、薄荷治之。若是肺中實熱壅遏其竅而聲音閉者。人參瀉肺湯治之。又有津液乾枯肺痿葉焦聲音嘶小者。乃失血之虛弱證。人參清肺湯清燥救肺湯治之。常用白密、尖貝、人參、胡桃、百合蒸服。又有痨蟲

居於肺間。嚙壞肺臟。金蝕不鳴。喉中癢欬。喘熱難已。此為癆瘵難治之證。宜百部、人參、明雄、獺爪、白芨、百合、蠶砂、射香、桔梗、甘草、獺肝、鰻魚骨治之。又凡癆瘵而咽喉破爛者。均在不治。總宜上方外用珍珠、人參、牛黃、明雄、吹之。

夫聲音者。氣所從出也。氣根於腎。故聲音之出。實由腎生。氣不歸元。則欬愈甚。氣愈乏。而聲愈乾。宜以都氣丸主之。加人參、沉香、訶子。腎氣丸亦治之。

腹痛

血家腹痛。多是瘀血。另詳瘀血門。然亦有氣痛者。以失血之人。氣先不和。是以血不平而吐衄。但血家氣痛與雜病氣痛有別。雜病氣痛則痛之甚。血家氣痛痛不大甚。但覺胸腹之中不得和暢。有鬱滯結聚之形。宜逍遙散加薑黃香附、槟郎台烏治之。再參瘀血痞滿門更詳。

痺痛

身體不仁。四支疼痛。今名痛風。古曰痺證。虛人感受外風。客於脈分。則為血痺。仲景用黃芪五物湯。以桂枝入血分行風。最效

失血家血脈既虛。往往感受外風。發為痺痛。或游走不定。或滯着一處。宜黃芪五物湯重加當歸、丹皮、紅花。如血虛火旺之人。風中兼火。外見痺證。內見便短脈數口渴等證。則不宜桂枝之辛溫。宜四物湯加防風、柴胡、枯芩、丹皮、血通、秦艽、續斷、羚羊角、桑寄生、玉竹、寸冬、治之。血虛生風。往往而然。當歸、紅花、荊芥、酒水煎服。

瘀血竄走四支。亦發疼痛。證似血痺。惟瘀血之痛。多如錐刺。脈不浮不拘急。此畧不同。另詳瘀血門。

又有周痺脚氣。疫濕走注者。皆係雜證。此不具論。

痿廢

痿者。足廢不能行之謂。分五痿治之。心氣熱則脉痿。筋縱而不任地。天王補心丹。加丹皮治之。肝氣熱為筋痿。則筋急而攣。四物湯加羚羊角、續斷、棗皮、黃柏、地骨皮治之。脾氣熱為肉痿。胃乾而渴。肌肉不仁。四物湯加人參、山藥、枯芩、黃柏、澤瀉、雲苓治之。腎氣熱則骨痿。腰脊不舉。地黃湯及大補陰丸治之。肺氣熱則津痿。不能灌溉於足。痠苶不行。清燥救肺湯治之。以上治法。雖分五臟。而總係陰虛熱灼。筋骨不用之所致。欲熱之退。莫如

滋陰。欲陰之生。莫如獨。取陽。明陽明者。五臟六府。之海。主潤。宗。筋宗筋主束骨而利機關陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也。宜瓊玉膏。加玉竹、煆石膏、石斛、花粉、珍珠、竹茹治之。玉女煎加犀角、亦治之。然痿廢之原。雖在於胃。而其病之發見。則在於筋骨。凡虎骨、龜版、鹿筋、豬脊髓、牛骨髓、狗脊、骨碎補、牛膝、苁仁、枸杞、兎絲子、續斷、皆可加入。以為嚮導。痿證與腳氣有異。切不可誤用風藥。

遺精

世謂上吐血下遺精其病不治謂其上逆下竭立見消耗也然病此者但未況久猶可圖治蓋遺精失血雖是兩病其實一而已矣精者腎中陽氣所化乃天一所生之癸水也女子十四則癸水至於胞中而衝任兩脈即通將心火所化之血轉輸入胞與癸水交合水從血化是為月信男子十六則癸水亦至於胞中而衝任兩脈亦輸血入胞與癸水合血從水化是之謂精胞者精之舍即血之室也吐衄者是胞中血分之病遺精者是胞中水分之病血與水上下內外皆相濟而行吾已言之屢矣故病血者未嘗不病水病水者亦未嘗不病血也是以吐血多兼

痰飲瘀血亦變水腫淋秘亦有下鮮血者以血與水原相依伏耳精者水之所化遺精者水病也而又吐衄是血亦病也先吐衄而後遺精是血病累及於水先遺精而後吐衄是水病累及於血治法無論先後總以治肝為主胞宮乃肝之所司精與血皆藏於此治血者必治胞治精者亦必治胞胞為肝所司故皆以治肝為主肝寄相火氣主疎泄火熾氣盛則上吐血而下遺精地骨皮散加柴胡胡黃連知母黃柏牡蠣龍骨茯苓蒲黃血餘炭治之丹梔逍遙散加阿膠龍骨牡蠣蒲黃以平之吐血甚而遺精輕者以治吐血為主生地黃散加金櫻子牡蠣治之遺

精甚而吐血輕者。以遺精為主。地黃湯。加血餘灰龍骨牡蠣治之。

什景治遺精。有用天雄附子法。腎氣不納。心火不下交於腎。有用肉桂法皆陽虛之證也。若失血家則多是火遺。即心腎不交。亦是水不濟火。其為夢遺十之八九。蓋肝經火旺。則魂不內守。恍惚有見。亦有無夢而遺。仍屬相火之甚者。火甚則神不清。是以昏沉迷悶。不覺精之走失。此較有夢而遺者。其火更甚。毋得誤認為陽虛之證也。大補陰丸。加生棗仁牡蠣龍骨茯神治之。若氣不攝精者。其人必見虛寒之狀。不徒以有夢無夢為別也。

淋濁

淋者小便短數淋瀝不通之謂也單病此者自有諸書可考血家病此特其兼見者耳然二便為消息之門戶若一開塞則上中焦不得消息故傷寒論有言急下者有言當利其小便者有言有小便則生無小便則死者無一不吃緊於此此水病也水與血相為倚伏吾已言之屢屢單病血不病水者易愈以水調則其血雖病猶有水以濡之也若病血而又累及於水則上而喘欬外而腫熱下而淋濁均不能免水病則無以濡血而血證

亦因以難愈矣。吾於尿血腫欬諸條。已詳言之。可以參看

血家病淋。多是肺痿。肺主制節。下調水道。肺痿則津液不流。氣不得下。而制節不達於洲都。是以小便不利。宜生地百合花粉知母杏仁桑皮滑石桔梗猪苓阿膠草梢治之。

血家、血虛火旺。心遺熱於小腸。不能泌別清濁。則小便赤短淋瀝。導赤飲加炒梔前仁老連白芍燈心。

脾土不化。亦能壅溼。使小水不利。五苓散治之。濕中挾熱者。去桂尖加茵陳防己黃柏炒梔。

前陰屬肝。肝火怒動。莖中不利。甚則割痛。或兼血淋。宜龍膽瀉

肝湯加肉蓯蓉或地黃湯加蓯蓉黃柏前仁治之若血淋則加地榆蒲黃

腎為水臟膀胱為水府腎中陰虛水源枯竭則小便不化知柏地黃湯少加肉桂以反佐之若是陽虛不能化水者金匱腎氣丸治之

以上分別臟腑施治即陳脩園以三焦為決瀆之義也脩園用五淋散統治三焦吾謂不如分別上中下而又各區臟腑以施治尤為精細

濁者小水不清或白或黃或青或赤此如暑天洪水泥潦之類

乃溼熱為之也。溼甚用胃苓湯。加黃芩黃連黃柏白芍治之。熱甚用茵陳梔子黃柏秦皮木通前仁防己草稍治之。

又有敗精為濁者。或由思淫不遂。或由淫而精停。宜萆薢分清飲。加鹿角屑。桑螵蛸白芍肉蓯蓉治之。

又有中氣虛弱。小便滴在地上。即變色者。宜六君子歸脾湯治之。

便閉

二便皆脾胃之出路。小便是清道屬氣。大腸是濁道屬血。失血

家血虛便燥。尤其應得。四物湯加麻仁主之。血燥者加桃仁酒軍氣燥者加杏仁枳殼。風燥者加皂角仁白芷防風。火燥者宜加枳殼厚朴大黃芒硝。

大腸乃胃之關門。胃為燥土。若胃有燥尿而不下者。其責不在大腸而在胃。其證口渴手足潮熱。或發譫語。三一承氣湯下之。或四物湯加麻仁枳殼厚朴酒軍以滋降之。

又小便數而不禁。大便反閉者。名為脾約。謂脾津下泄無以潤腸故也。仲景用脾約丸治之。丹溪謂宜清肺燥。肺清則小水有制。而脾得灌溉。宜用清燥救肺湯治之。

腎開竅於二陰。腎虛陰不足。無以潤腸者。宜左歸飲。加黑芝麻肉蓯蓉治之。

肺與大腸相表裏。肺遺熱於大腸則便結。肺津不潤則便結。肺氣不降則便結。肺遺熱者人參瀉肺湯治之。肺津不潤者清燥救肺湯治之。肺氣不降者清燥救肺湯。合四磨湯再重加杏仁或少加葶藶以治之。與便血條合看自明。

此外又有瘀血閉結之證。或失血之後。血積未去。或跌打損傷。內有瘀血停積不行。大便閉結。或時通利。仍不多下。所下之糞。又帶黑色。腹中時時刺痛。口渴發熱。脈帶澀象。宜用桃仁承氣

湯治之或失笑散加杏仁桃仁當歸白芍

瀉泄

失血虛癆最忌瀉泄以脾胃敗壞不能任藥且少納穀胃氣將絕故也雜病瀉泄用參朮薑苓應手取效此則薑朮補脾轉傷其陰下咽之後立見喘熱竟成枯骨矣然使用滋陰之藥則脾已瀉泄益陰則愈動其瀉勢必土崩不救矣病至此者吾莫如之何也已擬用黃土湯作調停之計效否不敢必也

以上所論乃虛極胃將絕之瀉也如非胃氣將絕之瀉便當按

證治之。毋得誤斷其死。以恐駭病人。

濕瀉者如水傾下。腸鳴身重其腹不痛。胃苓湯主之。

風泄者大便不聚。或帶清血。八珍湯加粉葛丹皮防風白芷。

寒泄者腹中切痛。雷鳴。鴨溏下利清白色。附子理中湯主之。六君子湯加薑附亦治之。

暑泄者煩渴尿赤。暴瀉如水。越鞠丸加香茹粉葛連翹前仁大力白芍黃連扁豆枳殼厚朴生薑合香。

飧泄者米穀不化。香砂六君子治之。此與暴注完穀為肺氣迫下者不同。暴注則水與穀食入即下。為熱迫三一承氣湯。

食積泄者。瀉後痛減。臭如抱壞雞子。噫氣作酸。失血虛人。停食作瀉者尤多。宜逍遙散。或小柴胡湯。均加山查神曲麥牙萊菔子治之。越鞠丸平胃散皆治之。

又有泄血泄痢者。另詳便血門。

又有腎泄。五更作泄。一名晨泄。乃色慾過度。足冷氣虛所致。宜四君子湯。加熟地枸杞兎絲子。巴戟杜仲。故紙肉叩五味棗皮治之。豬腎一枚。加故紙小茴青鹽燒服亦可。

飲食

水穀入胃其濁者為渣滓下出幽門達大小腸而為糞以出於穀道其清者倏然而化依脾氣而上升於肺其至清而至精者由肺而灌溉乎四體為汗液津唾助血脈益氣力為生生不息之運用也其清中之濁者下入膀胱而為溺此虞天民醫學正傳所論其言水穀消化之道甚明故全錄之故凡食不化者責之於脾六君子湯主之水不化者責之於肺二陳湯加防已桑皮桔梗木通治之消渴者肺火也甘露飲加花粉治之消穀者

胃火也白虎湯加老連人參枳殼厚朴生地治之飲一溲二為下消腎虛也腎氣丸主之食入即吐為火逆瀉心湯加生薑竹瀝治之但用水漱口而不欲飲者多是經脈中有瘀血宜四物湯加紅花血通乾漆氷片葱白桃仁治之食入良久翻胃吐出或不化而飧泄者為脾不磨食六君子湯加肉叩故紙吳萸五味治之

夫人之所以能化食思食者全賴胃中之津液吾於總論已詳言之有津液則能化食能納食無津液則食停不化觀膈食病食入反吐糞如羊屎可知無津液則食不能化之故矣觀噤口

痢咽乾津竭食不得下可知無津液則食不能納之故矣痢證噤口者另詳便血門膈食不化以及血虛津枯不思飲食者宜用左歸飲加花粉人參玉竹黨參蓮米白芍芝麻治之或葉氏養胃湯加人參芝麻花粉當歸淮藥黃精杏仁治之

一凡平人內傷飲食多是中寒洞泄治宜理中湯平胃散以溫燥之若失血之人內傷飲食則反多壅實生熱之證往往手足潮熱口乾氣逆衝脈作熱若用溫燥之藥不惟飲食不化且更加壅熱矣用小柴胡湯加枳殼厚朴大黃輕則加萊菔子麥芽越鞠丸加減亦治之

感冒

血家最忌感冒。以陰血受傷。不可發汗故也。然血家又易感冒。以人身衛外之氣。生於太陽膀胱。而布散於肺。血家肺陰不足。壯火食氣。不能散達於外。故衛氣虛索。易召外邪。偶有感冒。即為頭痛寒熱身痛等證。若照常人治法而用麻桂羌獨。愈傷肺津。肺氣益索而不能達。不惟涸血分之陰。愈以助氣分之邪矣。治惟和解一法。為能補正祛邪。宜先生其津。使津足而火不食氣。則肺氣能達於皮毛。而衛氣充矣。次宜疎理其血。使血分和

則不留邪為患。而外邪自解矣。宜小柴胡湯加杏仁荊芥防風紫蘇主之。口渴加花粉。去半夏。身痛加粉葛。內動痰火者。再加茯苓旋覆花。內動寒水者。另用蘇子降氣湯治之。

外感風寒。客於肺中。外證已退。久欬不愈者。失血家往往有之。宜千金麥門冬湯。其麻黃搗茸蜜炙。變峻為緩。以搜陳寒。寒客肺中。久則變而為熱。故用此方。或小柴胡加蘇子薄荷細辛。亦與麥門冬湯彷彿。

感冒甚重。傳變為熱者。宜照傷寒法治之。清熱攻裏。可以任量。惟失血家不得輕用。吐法戒之。

失血之人有狀似感冒而實非感冒者由於肺痿氣虛時時洒淅惡寒鼻塞流清涕乃金被火尅內壅外閉衛氣不布之故只宜清養肺金毋得妄用發散以張火燄也太平丸補散兼行以治之千金麥門冬湯小柴胡湯皆宜小柴胡湯通上焦之津液以調和榮衛尤平穩而神奇

痙掣 拘急

痙者角弓反張掣者手足抽扯拘急者頭勾足局肘膝相攝傷寒中風凡遇此等分三面治之失血家亦宜分三面施治而用

藥晷有不同。眉列如左。

角弓反張者。太陽經病也。無汗用葛根湯。有汗用桂枝加葛根湯。血家病此多是血燥生風。筋灼而攣。麻桂皆其所忌。前方不中與也。宜四物湯加粉葛防風荊芥獨活羚羊角桑寄生續斷杏仁治之。

手足抽搐口目斜引者。少陽經病也。傷寒中風。用大秦艽湯。此方風藥雖多。尚兼滋補血家病此亦可借用。再加阿膠羚羊角人參花粉以柔潤熄風。則與血家更宜。

面前拘急屬陽明經。傷寒中風得此者。三一承氣湯治之。血家

得此為陽明津液大虛筋為之縮法宜大生津液玉女煎加花粉玉竹粉葛竹茹人參寸冬白芍枳殼治之

又曰肝主筋肝病則驚駭筋攣今且不必縷分總以治肝為主四物湯加羚羊角枣仁木瓜荊芥枯芩治之

此乃血家發痙之治法非通治諸痙之法讀者須知

暑疫

暑者濕熱合氣之謂也熱蒸則濕動濕鬱則熱逼濕熱合化是為暑氣月令所謂土潤溽暑此之謂矣熱甚則心煩口渴脈數

溺赤濕甚則泄痢腫滿喘急閉悶病狀不一總係濕熱二氣而已血家陰虛濕熱之邪尤易感受宜統以大清涼飲治之濕甚者再加防己雖不能盡暑之治法然本此方以推廣之可以得變通之妙

又有陰暑實非暑也乃夏月伏陰內動之寒症毋循名而失實

疫者四時不正惡戾臭穢之氣觸人為病病氣又能傳染是名曰疫沉冬則無夏秋常有其氣觸人皆從口鼻而入內伏臟腑之中發作則狀熱頭痛變瘧動痢狂躁腫急不一其形雖有外證不得發表但解其裏則表氣自和清瘟敗毒飲加酒軍治之

血家陰虛疫邪易發故並言之另有瘟疫專書詳明者多宜細查閱此第舉其大意耳

食復

失血家胃氣清和津液自生火自降痰自順而病亦自愈矣若傷飲食則中宮壅滯氣與火不得順利上衝於肺則為欬嗽外蒸肌肉則發熱內鬱於心則為煩由是血不得甯因之復發名為食復宜甲巳化土湯加枳殼厚朴炒梔麥芽為主欬者加柴苑寸冬五味杏仁發熱者加石膏知母心煩者加老連當歸腹

痛者加酒軍。已動血者加桃仁蘇木。或用逍遥散照上加減法。亦調和胃氣之善方。小柴胡湯亦可。

仲景治食復。言有宿食者。皆主芍藥大黃。義取二物。力能推盪。蓋宿食不去。不獨阻新食之進。且傷氣壅邪。轉生諸疾。故主大黃以速去之。以免傷其正氣。勝查麴之功千萬。醫者須知此理。臨證庶有膽識。

夫失血之人。所以易於停食者。多是胃中有熱。貪多飲食。既食之後。脾津枯少。不能糜爛消化。是以易於停食。宜四君子湯加黃精淮藥。玉竹花粉。麥牙白芍。生地甘杞。當歸。寸冬查肉。蘿蔔

汁煎服此等治法但讀東垣脾胃論者斷不能知

勞復 怒復

靜則氣平而生陰動則氣躁而生陽煩熱喘欬隨之而作失血病因勞動而復發者十之五六亟宜調息瞑目以收斂浮動之氣使陰生陽秘而血乃不復動矣人參固本湯加蒲黃蘇木治之煩熱甚者宜用地骨皮散加炒梔蒲黃喘欬甚者宜人參清肺湯治之或三才湯加五味雲苓沉香甘草清燥救肺湯亦治之血復止後多飲獨參湯乾睡以息之

怒復者。怒氣傷肝。相火暴發。而血因奮興。當歸蘆薈丸以瀉之。龍膽瀉肝湯以清之。丹梔逍遥散以和之。小柴胡湯加牡蠣青皮以抑之。血潮不止者。瀉心湯加當歸白芍沉香香附降香以止之。十灰散用香附檳榔童便醋調服以止之。去血過多則陰愈傷。火愈亢。怒氣愈不能平。宜當歸人參沉香香附生地五味以大補之。少與之食以消息之。

總之失血之人。戒勞更要戒怒。醫學考辨有戒怒詩云。病家誤。戒忿怒。忿怒無非些小故。血隨氣上要循經。猶如輕車就熟路。吾臨血證多矣。每有十劑之功。敗於一怒。病家自誤。醫士徒勞。

堪發一歎。

時復

時復者謂血家春夏得病至次年春夏復發秋冬得病至次年秋冬其病復發值其時而仍病故曰時復夫人身五臟六腑與天之氣運呼吸相通原是一體故天之陰陽能媾人之疾病其實非天病人也乃人身氣血先有偏盛故感天氣之偏盛而病遂作焉

血家病得於春者乃肝經血虛火旺春木之氣內通於肝肝經

感木氣而風動火發。故值春時。舊病復作。其已發吐衄者。宜地骨皮散。加蒲黃枯芩膽草杏仁柴胡荊芥醋炒大黃治之。尚未發作者。預服丹梔逍遙散。加牡蠣阿膠龍骨香附五味。或用左歸飲加阿膠龜板牡蠣五味以滋養之。使肝腎陰足。則火伏而不動矣。凡冬日春時得血病者。均宜用此法以養肝腎。使陽氣封謐而不洩。斯病不發矣。又凡肝經火動者。必先有熱蒸口苦魂夢不寧諸證。柴胡清骨散亦治之。

失血之病。得於夏者。乃心經火旺。次逢夏月復發。宜瀉心湯。加丹皮蒲黃生地木通。草稍降香牛膝。其未發時。若見煩熱。即宜

預服生地黃散以遏止之或天王補心丹以養之又按夏月暑盛病多發於陽明以陽明主燥熱暑熱相合故多屬陽明病在陽明者口渴身熱煩燥便閉惡聞人聲脈勢洪大以此為辨其吐出之血亦必甚多宜犀角地黃湯加粉葛銀花知母蒲黃酒軍枳殼若尚未動血初覺發熱口渴者玉女煎加虫退秦皮茵陳枳殼或先服甘露飲以養胃陰免動燥氣

秋乃金令肺氣主之凡失血家至秋時皮毛收斂未能秘密往往外合風氣內壅熱邪發欬動血尤為容易病家醫家皆須善為調理庶可補天再造也若是秋時得病是病本得於肺次逢

秋月。本臟不潤。復發痿燥。而欬血者。清燥救肺湯。加生地蒲黃治之。人參清肺湯加紫苑當歸蒲黃亦可。葛可久太平丸。既滋肺陰兼清風痰。尤治肺良方。若肺氣鬱而不布。衛陽不外達。津液不下降。皮毛洒淅。寒熱作欬者。宜小柴胡加荊芥防風桔梗杏仁蒲黃蘇木花粉。寸冬桑皮全皮枇杷葉治之。風寒客於肺中。久欬不止者。宜千金麥門冬湯。其麻黃擣茸炙過。以搜陳寒。或重用太平丸。重加薄荷。亦和散之法。

冬令屬水。腎氣主之。此時陰氣堅凝。則陽氣潛藏。龍雷不作。若陰氣不足。則陽氣不潛。況此時陽氣皆入於內。人身陰虛者。既

多內熱加以陽氣入內兩熱相合令失冬令寒凝之象此與冬行夏令無異是以火迫血動而復發也治法宜滋腎陰泄內熱使其陰凝陽秘復成為大冬之令斯病愈矣已動血者玉女煎加蒲黃丹皮蘇木繼服大補陰丸六味丸以收功乘其未發先用麥味地黃湯滋之火之不藏如三冬不雪臘月鳴雷潛納陽氣皆可加龍骨牡蠣吾於衝脈言之甚詳須參看

凡物有根者逢時必發失血何根瘀血即其根也故凡復發者其中多伏瘀血以及遇節氣遇陰雨而即蒸熱發動者均是瘀血為病宜血府逐瘀湯加乾漆桃奴治之或用仲景大黃䗪蟲

丸少少與之此理須知方不為血證所瞞

房勞復

血之運行聽命於氣氣乃先天腎水之中一點生陽靜而復動化生精血若以房勞傷其精血則水虛而火發氣動而血升烏在其病之不發乎宜都氣丸加麥冬龜鹿膠治之火盛者大補陰丸加鹿膠桑螵蛸海螵蛸治之或加味虎潛丸脾腎兼治或三才湯加桑螵蛸秋石海粉黃柏紫梢花治之失血之人以養息為第一若不忌房勞是自促命期於醫何咎

附抱兒癆論

世謂婦人有胎復得欬嗽發熱骨蒸或吐血或夢交名為抱兒癆其胎不能孕滿十月或七八月或五六月胎便萎墮兒不長成其母坐產之後不得滿月定然廢命古書不見名論俗醫又無治法世皆以死證目之而死者果相接踵良可哀也夫婦人懷孕其氣血既給養胞胎又加以病再耗其氣血一身之氣血無多那堪兩件消耗是以其胎不能長養而母被胎困又受病侵雙斧伐枯樹不死何待顧其受病之重誠如所云而果得治

法何難起死回生哉吾妻病此親手調治竟得保全始知抱兒
癆之所以不起者失治之咎耳夫婦人血和然後有子血病於
是胎病治之之法總視其證有時以安胎為主胎安則母自安
有時以治病為主病去則胎自固據其見證照病用藥自無不
愈者也大旨此病世皆謂為極虛之證而不知此病多是實邪
何以言之蓋人身除腸胃中皆不可有物塞碍是以針砭刺穴
停住片時即能堵塞其氣況胎乃頑然一大物塞於下部則氣
實而喘氣逆而嘔氣盛而為火皆以其壅塞故也夫人之懷孕
不啻藏珍而胎之病人有如積塊是以懷孕之脈沉分搏指亦

與下焦積塊之脈相似第積塊攻而通之則實邪去而人安胎則無攻通之法是以不便施治然有逆實之證亦須消息以補兼攻斯不至留病為患蓋必擺脫一切拘禁而後可救皆不能救之死證內經云有故無殞亦無殞也則知不拘禁例一意治病為安胎最上之法故抱兒癆吐血逆滿不須顧胎直宜涼血泄瘀丹皮桃仁皆所不忌瘀血既去則不壅熱去舊生新胎反得新血之養若氣逆火甚非尋常杏仁枳殼枯芩等藥所能治者酒炒大黃亦間可用又凡此病皆胎氣壅於下部反而上薰肺金直當其氣故治抱兒癆以保養肺金為第一要法清燥救

肺湯紫菀散主之痰凝氣阻欬逆不休者豁痰丸治之水飲冲肺肺脹欬嗽不得卧息者葶藶大棗瀉肺湯主之桔梗甯肺湯補瀉兼行保和湯多補少瀉皆宜酌用此病發於胞中其本在下清理肺金不過治標之法耳然胎在下部既不能攻治其本則不得不重治其標保助肺金以敵病氣雖病氣上薰亦無碍也且肺為華蓋位雖居上而通調水道下輸膀胱又主制節下達大腸肺調則大腸不滯氣得從大腸而泄則胎雖阻之而上薰之勢亦稍殺矣肺調則小水通利氣得從小水而洩則胞中之氣亦得從小水泄下蓋膀胱者胞之室膀胱暢則胞氣可借

之得舒而上薰之勢亦少殺矣若大便燥結者急宜用清燥救肺湯加火麻仁白芍肉蓯蓉枳殼厚朴當歸治之若小便不利者急宜用清燥救肺湯加草稍生地木通防已知母桑皮治之且小便出膀胱屬太陽經主皮毛大便出大腸屬陽明經主肌肉二經調達則肌肉皮毛之氣皆清理而不滯自不發寒蒸熱矣第皮毛肌肉之熱屬氣分者既可以免而腠理之熱屬血分者並不關於二經人身腠理之氣乃三焦所司三焦屬相火內寄於肝膽而下藏於胞室今胞室既為胎所站則相火上壅而為嘔吐失血者往往而然相火之氣循經外達壅於腠理則生

寒熱甚則骨蒸推原其故以胞室為胎所坫相火不得任意游行是以壅遏此時不能奪去其胎只得清泄胞中之氣使相火有所洩斯不致大壅耳宜四物湯加黃柏知母赤苓澤瀉枣皮草梢肉蓯蓉此是治胞室以滋相火之本也外用小柴胡湯以和其腠理蒸熱之甚者可用清骨散以瀉之此是治少陽以清相火之標也是時胞宮不便重治只合多清少陽以重治其標即不全愈而亦殺其病氣矣如欲胞室腠理面面兼治則宜四物湯合柴胡清骨散治之夫抱兒癆之病根雖在胞而其受病則在於肺惟其肺金津虛無以轉輸於下是以胞中之水火皆

得泛上而為病無論欬熱諸證總宜大滋其肺使肺津得調肺氣得降則胞中之水火雖欲上逆而亦不為害救肺湯紫菀散太平丸保和湯人參清肺湯阿膠瀉白散可常服之第胞宮之水火上逆則病見於肺而水火之根又實根於腎中胞宮之相火腎中之陽也胞宮之水陰天癸之水也須極力滋補其腎使水化則不為痰陰足則不動火此為正本清源之治腎中陰虛而火動者則水結為痰為欬為腫為淋閉骨蒸地黃湯加杏仁五味寸冬桑皮黃柏知母以清之腎中陽虛不化水者則水停為飲為欬為腫為淋閉清穀不化宜地黃湯加故紙杜仲艾葉

附片台烏沉香木通以溫其陽。若腎中痰火上逆之至。喘欬不止。胎亦上逼。照上用六味地黃湯加龍骨牡蠣鍾乳石牛膝半夏五味寸冬失貝治之。此等墜降之藥。各書俱云墮胎。然無病之胎。固忌此等。今既有腎氣逆上之病。高者抑之。有病病受墜而下之。乃適當其胎之正位。胎反其位而不上逼。何墮之有。至於氣逆之極。發動吐血。嘔欬呃噦。諸般上逆之證。宜降氣者枳殼厚朴葶藶檳榔任量而施。宜降火者酒軍胡黃連知柏膽草隨宜取用。亦所不妨。況乎胎中吐衄。多因素有瘀血阻滯胎氣兩不相容。是以動血欲去瘀血。凡桃仁丹皮靈脂紅花元胡等

皆宜用之若徒守拘禁與養癰成患無異醫者果能破除俗見而參透其所以然於治抱兒癆何難起死回生哉

又曰用藥雖不必徒守拘禁然亦須審病中病而止勿毫無顧忌而不知輕重也慎之

夫胎之所以病產母者以其衝脈為病也衝脈起胞中上屬陽明至胸中而散胎氣循衝脈入胃上肺其病產母凡一切嘔欬吐衄發熱骨蒸皆衝脈之咎治衝之法吾於吐血欬血產血胎血經血欬嗽諸門言之甚詳能熟查之自有活法

產母之所以繫胎者帶脈也帶脈解則胎墜矣若見腰痛之證

則早用當歸白术熟地淮藥杜仲故紙枸杞皮龜膠黃柏黃芪知母兔絲甘杞續斷雲苓治之其餘帶脈治法詳經血產血門產母既病抱兒癆困憊之極胎不能保則亦無須存胎但以安保產母為急歸芎湯加人參糯米苧根阿膠聽其安可也墮亦可也胎既下後但照正產按法治之去瘀生新自無不愈

再按抱兒癆產前已大虛耗一旦產後必見險危之證較之尋常正產更宜預防一汗出不止獨參湯救之浮熱脈大者加附子以引陽入陰此雖胎前常病火燥而至是陽氣欲脫不得仍照火燥治法四物湯加黑薑亦是從陰引陽之法皆可審用一

喘促為氣脫之候。參附湯加五味沉香治之。一血崩為血脫之候。歸脾湯加血餘灰棕灰海鰾蛸魚膠治之。亦有怒動肝火而血崩者。歸脾湯加柴胡山梔治之。此三危證正產有之病抱兒癆者在所必有。醫家病家皆宜預防。

夫胎前屬實熱。產後屬虛寒。平人大抵然也。至於病抱兒癆者胎前之病。無一非熱。至於產後則不盡虛寒。蓋胎前已病陰虛而產後去血過多。其陰愈虛。發熱發熱。尤屬痿燥之極。若徒守產後宜溫補之說。鮮不促命。宜左歸飲加阿膠花粉百部人參寸冬玉竹五味治之。骨蒸欬逆者。團魚丸治之。陰虛火動挾水

飲而上干者。四物湯合二陳湯。再加柴胡枯芩薑汁竹瀝竹黃膽星金箔牛黃治之。其餘雜證。均照產科治法。自無不愈。茲所論者。乃抱兒癆產後之治法。與正產畧異。然亦第舉其端。尚待醫士擴而充之。

一凡治抱兒癆。必先熟吾書中經血胎血產血諸門。而於各女科又有參酌。庶克有濟。

一凡抱兒癆。須在初病時。即行調治。治或未愈。而用藥不錯。庶幾產後可以治愈。如不知治法。則產後必亡。醫家病家。兩宜慎之。

以上所論抱兒癆治法。已具大畧。而內中又或加外感。則雖照血家感冒之法。加減治之。或加內傷。則雖照血證飲食諸法。加減治之。或添怒氣而病增。則宜照怒復條內所用諸藥治之。或加房勞而病劇。則宜照房勞復條內所用諸藥治之。法外有法。難以筆傳。