

女  
科  
百  
問

婦科百問目下

第五十一問男女受形之始何以別之

第五十二問何以謂之有娠

第五十三問何以謂之居經

第五十四問婦人居經之後心中積悶不欲執

作惡聞食氣

第五十五問居經之後或復有漏下

第五十六問胎在腹中時時撞動不安

第五十七問何以謂之子滿

第五十八問妊娠三月曾經墮胎至其月復墮

第五十九問大小便不通

第六十問妊娠傷寒與常人傷寒治法同異

第六十一問妊娠傷寒差後復發熱

第六十二問時氣溫病皆能損胎

第六十三問妊娠傷熱或因暑氣有不因暑氣而得之

第六十四問下痢與滯痢何以辨之

第六十五問喘病何以得之

第六十六問妊娠多痰者緣何而生

第六十七問妊娠霍亂

第七十八問何謂子煩

第七十九問何謂子嗽

第七十問何謂胸痺

第七十一問何謂子癰

第七十二問胎痿過年不產又兩胎一生一死

第七十三問妊娠墮胎或血出不止或血不出

第七十四問何以謂之子淋

第七十五問小便或有利或不通

第七十六問大便或痢或秘

第七十七問妊娠至八九箇月兩脚俱腫

第七十八問妊娠十月難產之法

之法

第七十九問橫生逆產

第八十問熱疾胎死腹中

第八十一問胎衣不下

第八十二問難生

第八十三問產後血暈

第八十四問產後口乾痞悶

第八十五問產後乍寒乍熱

第八十六問產後四肢虛暈

第八十七問產後乍見

神

第八十八問產後不語

第八十九問產後腹痛又瀉痢

第九十問產後遍身疼痛

第九十一問產後大便祕澀

第九十二問產後血崩

第九十三問產後腹脹滿嘔吐不定

第九十四問產後口鼻黑氣起及鼻衄

第九十五問產後喉中氣息喘

第九十六問產後中風

第九十七問產後心痛

第九十八問產後熱悶氣上轉爲腳氣

第九十九問產後汗出多而變虛羸

第一百問產後前下過多虛羸在氣

女科百問卷下

○第五十一問男女受形之始何以別之

答曰男女之合。二情交暢。陰血先至。陽精後備。血  
開。裹精。精入爲骨。而男形成矣。陽精先入。陰血後  
滲。精開。裹血。血入爲本。而女形成矣。陽氣聚面。故  
男子面重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺  
死者必仰。鳥獸溺死者伏背皆然。陰陽均至。非男  
非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產  
女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良士也者。首察  
乎此氣。受偏疾。與之補之。補羸女。則養血壯脾。補



弱男則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本。不可不察也。

○第五十二問何以謂之有娠

答曰。經云。經候一月。日後覺不通。診其脈理平和。婦無他疾。欲作胎也。脈經云。有一婦人來診。自道經斷不來。師言一月爲衃。二月爲始膏。三月爲居經。今既居經。正是爲作胎也。

人參九。養陰生血。補虛。

人參

鹿角膠

熟地

川芎

白芍

當歸

白朮

各二兩

右爲細末蜜丸桐子大每服三十九丸空心

飲下

○第五十三問何以謂之居經

答曰陽施則別陽者氣也陰化則搏陰者血也二情交暢血氣和調故令有子也經云肝主藏血故一月謂之血凝陰氣方始凝結足厥陰肝經養之肝與膽合二月爲之胚兆未成器猶之胚也足少陰膽經養之三月陽神爲魂乎心主胞經絡養之且經者常也天真之氣與之流通故三旬一見今既三月不行所以謂之居經也

白朮散調補衝任扶養胎氣。治妊娠宿風有冷胎痿不長。或失於調理動傷胎氣多致損墮。懷妊常服壯氣益血保護胎藏。

牡蠣

三分

白朮

四分

芎藭

四分

蜀椒

去目及閉口者

炒出汗三分

右爲細末。每服二錢。溫酒空心調服。

內補當歸丸

熟地

酒浸洗丸

丸

當歸

去蘆洗切焙

微炒

兩

右爲細末。蜜丸。桐子大。每服五十丸。溫酒下。

予嘗觀許學士論枳殼散四物湯內補當歸

丸此三方皆載之在人用之何如耳。大率妊  
娠惟在抑陽助陰。素問云陰搏陽別爲之有  
子。蓋關前爲陽關後爲陰。尺中之脈按之搏  
手而不絕者妊子也。婦人平居陽氣微盛無  
害。及其妊子則方閉經遂以養胎。若陽盛搏  
之則經脈妄行胎乃不固。素問所謂陰虛陽  
搏謂之崩也。抑陽助陰之方甚多。然胎前藥  
唯惡羣隊。若陰陽交雜別生他病。惟是枳殼  
散所以抑陽。四物湯所以助陰。故爾。枳殼散  
差寒若單服之恐有胎寒腹痛之病。以內補

丸佐之。則陽不致強。陰不致弱。陰陽調和。有益胎嗣。此前人未嘗論及也。

四物湯

當歸

熟地

白芍

川芎

各等分

右咬咀。每服四錢。水二盞。煎八分。去滓。溫服。不拘時。

枳殼散

枳殼

兩

甘草

一兩

右爲細末。每服二錢。白沸湯點服。空心食前。

三服

○第五十四問婦人居經之後心中憤悶不欲飲食作惡聞食氣者何也

答曰。妊娠心中憤悶頭暈四肢煩痛懈墮不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多睡少起者世云惡食又云惡字是也乃至三四月以上大劇者不能自勝舉也此繇婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱兼當風飲冷太過心下有痰水水漬於臟故心煩憤悶氣挾而嘔吐也挾風則頭目暈此名惡阻所謂阻者經血既閉痰水積於中阻其臟氣不得宣通也

竹茹湯。治初有妊擇食嘔逆。頭痛顛倒。寒熱煩悶。

陳皮

人參

白朮

麥門冬

各一兩

甘草

炙一錢

厚朴

茯苓

各半兩

淡竹茹

先刮下臨煎旋入一本有淡竹一錢

右咬咀每服四錢。水盞半入薑竹茹各一塊。

如粟大拍破同煎八分。頻服。去滓溫服。

茯苓丸。治妊娠阻病。心中煩憤。頭目眩重。惡聞

食氣。嘔逆吐悶。

葛根

根殼

木

甘草

炙各一兩

赤茯苓

人參

乾薑

肉桂

陳皮

半夏

各一兩

右爲細末蜜丸。桐子大。每服五十丸。溫米飲空心送下。

小地黃丸。治妊娠酸心吐清水。腹痛不能飲食。

人參

乾薑

炮各等分

右爲末用生地黃汁丸。桐子大。每服五十丸。食前服。

半夏茯苓湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。頭目眩暈。四肢怠惰。百節煩疼。痰逆嘔吐。嫌聞食氣。好噉。



酸鹹多臥少起不進飲食

半夏

白茯苓

熟地

酒浸各一兩八錢

陳皮

細辛

人參

芍藥

川芎

紫蘇

桔梗

甘草

以上各二兩二錢

右每服四錢。水二盞。薑七片煎七分。空腹服。有熱煩渴。口生瘡者。去陳皮細辛。加前胡知母。腹冷下痢者。去地黃。入桂心。胃中虛熱。大小便秘澀者。加大黃一兩八錢。素地黃加黃芩。

四七湯。治同前方。見二十八問中。

二陳湯治妊娠惡阻產後飲食不進

半夏

陳皮

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

二兩

右哎咀每服四錢水盞半薑七片烏梅一枚煎六分去滓熱服不拘時

白朮散治妊婦宿風冷胎痿不長或失於腠理動傷胎氣多致損胎等疾

牡蠣

二錢

蜀椒

去目炒出汗三分

白朮

芎藭

各四錢

右爲細末每二錢溫酒空心服腹痛加白芍藥心毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一兩半夏五十粒消渴者以大麥汁調服兼治室女

帶下諸疾常服則保護胎藏

人參散治初妊惡食嘔吐痰逆

人參

兩

枳殼

炒三錢

厚朴

兩半

甘草

兩半

右爲細末每服二錢白沸湯調下空心食前

日三服

嚴氏第十三問妊娠頭目眩視物不見腮項結核者何也曰蓋因胎氣有傷肝臟熱上攻太陽穴痛嘔逆背項拘急致令頭暈生花若加涎壅危在片時宜急服消風散主之

消風散

石膏

甘菊花

防風

荆芥穗

羌活

熟羊角

川芎

大豆黃卷

當歸

白芷

甘草

各一兩

右咬咀每服四錢水盞半入好茶半錢煎八分通口服食前

○第五十五問居經之後或復有滯下者何也

答曰衝任二脈爲經血之海皆起於胞中手太陽小腸手少陰心經互爲表裏作胞之際壅之以養胎既產之後積之爲乳汁或衝任氣虛不能制其經血故妊娠數月經水不調時下者此名漏胞漏

九不子月  
不止則整

止漏散  
姪娠漏胞

熟地

兩四

乾薑

兩二

右爲細末每服二錢空心米飲調下

又方益智不拘多少爲細末米飲下次用香附  
甘草爲末醋糊丸用四物湯去地黃理中湯去  
乾薑煎吞下二三十丸甚妙

阿膠散治胎動不安及漏胎腹中痛

阿膠

兩蛤粉  
令黃

熟地

桑寄生

各一兩半

龍骨

兩

當歸

兩

甘草

兩

白茯苓

錢三

白木

一兩

芎藭

三錢

乾薑

半兩炮製

右咬咀每服四錢水盞半棗三枚煎六分去滓熱服不拘時

佛手散治婦人妊娠五七月因事築磕着胎或子死腹中惡漏下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則疼止子母俱安若胎損立便逐下安胎者不用酒

當歸

六兩

川芎

三兩

右爲麤末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞半止一沸去滓溫服口噤灌之如

女科百問

人行 七里再進，不過兩三服，服之便生。  
膠艾湯 娠不問深淺，月數因頓，什胎動不安。  
腰腹中 暈血，或從口出，或有所下，或胎奔上。  
刺心短氣，安胎。

熟地

白艾 炒

當歸

甘草 炙

芍藥

川芎

阿膠

炒 各一斤

右咬咀，每服水一盞，半煎七分，去滓，熱服，漸中逆冷，加生薑五片，棗三枚，煎服，食前。若虛人，加黃芪一兩。

桂枝茯苓湯 治宿有癥瘕，妊娠經斷，未及三月。

卽動此瘕也經斷三月而漏下不止胎動在臍  
上者爲瘕痼害當去其瘕又論云妊娠六月胎  
動者前三月經水利時胎下血者後斷三月卽  
也所以下血不止瘕不去故也

桂心

白茯苓

牡丹皮

桃仁

炒

白芍藥

石爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒  
或米飲湯食前細嚼下

嚴氏第三問胎漏經血妄行者何也答曰妊娠或  
成形胎息未定或因房室驚觸勞力過度動傷胎



胎或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治  
敗血湊心子母難保月漸胎乾危亾不久

桑寄生散治妊娠胎動不安下血不止

桑寄生

當歸

酒浸

川續斷

酒浸

茯神

去木

芎藭

香附

阿膠

蛤粉炒

白木

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎七分熱

服不拘時

○第五十六問胎在腹中時時撞動不安者何也  
答曰懷則以身依也娠則以時動也若腹中不時

撞動者謂之胎動也多因勞役氣力觸冒冷熱飲食不適居處失宜輕者止轉動不安重者便致墮墜若母有疾以疾動胎者治母則胎安若胎不固動致母病者治胎則母差若胎不牢固其胎必致損也

保安散治妊娠胎氣不安心腹疼痛胎動安胎

當歸

一兩半

人參

一兩

阿膠

半兩蛤粉炒成珠

甘草

半兩炙

右咬咀每服三錢水盞半蔥白一莖拍破煎

八分去滓溫服食前未定再服

安胎飲治妊娠偶因所觸或從高墮下致胎動不安腰中疼痛服此藥後覺胎動處熱卽胎已安

縮砂

不拘多少慢火炒令熱透後去皮取仁

右爲細末每服三錢熱酒調下不飲酒者煎鹽豉湯調下食前

摩氏第一問妊娠兩三月胎動不安者何也曰男女陰陽會通血氣調勻乃成其孕設若下血腹痛蓋緣子宮久虛致令胎墮其危甚於正產若妊娠會受此苦可預服杜仲丸

杜仲

去皮剉薑汁  
浸炒去絲

川續斷

酒浸各  
三兩

右爲細末棗肉丸桐子大每服七十丸空心  
米飲下一日三服

○第五十七問何謂子滿

答曰妊娠之人經血擁閉以養其胎或掩水氣血  
水相搏以致體腫皆緣脾胃虛弱臟腑之間宿有  
停水之所掩也謂之子滿若水停不去浸漬於胎  
則令胎壞診其脉浮腹滿兼喘者其胎必墮也  
澤瀉散治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘息促急  
大小便秘澀

澤瀉

桑白皮

枳殼

黃芩炒

檳榔

赤茯苓

木通

各一兩

右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎八分去滓溫服食前稍稍爲度效

木通散治好娠身體浮腫心腹脹滿小水不通

木通

一兩

木香

三分

訶梨勒皮

三分

香薷

一兩本

枳殼

半兩炒

檳榔

半兩

桑根皮

一兩

赤茯苓

三分

雞蘇

莖葉一兩

右咬咀每

服四錢水盞半薑五片煎六分去

滓溫服食前

商陸赤小豆湯

赤小豆

乾商陸

各等分

右咬咀每服一兩水一盞煎七分去滓溫服  
嚴氏第五問論胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷  
痛欲泄小便頻數大便虛滑者何也曰胎氣既全  
子形成質或食瓜果甘飮冷不時之物當風取  
涼受不時之氣則令胎冷子身不能安處皮毛疼  
痛筋骨拘急手足攣拳致使母有危證急宜服安  
胎和氣散

訶子

煨

白朮

各一兩

陳皮

良薑

炒

木香煨

白芍藥 陳米炒

甘草炙各半兩

右咬咀每四錢水盞半薑五片煎七分去滓  
溫服不拘時忌生冷

○第五十八問妊娠三月曾經墮胎至其月日復墮者何也

答曰陽施陰化則有胎也若血氣和調胎氣乃成若血氣虛損子臟爲風冷所乘致虧榮衛不能陰養其胎故數墮也假令妊娠三月當手心主包絡經養之不善攝生傷經則胎墮後雖再有妊至其月日仍前犯之所以復墮也又有因墜墮驚恐或

吐血下血者。皆能損胎。若妊娠常腰疼者。喜寧也。也。蓋腰爲腎府。女子以繫胎也。

地榆散。治妊娠損動胎胞下血不止。

地榆

三錢

乾薑

二分

當歸

三錢

龍骨

三錢

芎藭

三錢

艾葉

半兩

阿膠

三錢

蒲黃

半兩

熟地

兩

黃牛骨

腮

一兩

燒灰

烏髀骨

二錢

燒灰

白朮

半兩

右爲細末。每服二錢。以粥飲調下。不拘時。

卷栢丸。治妊娠數墮胎。皆因血氣虛損。子臟受風冷。致令胎不堅固。故類有傷。



卷栢

鍾乳粉

鹿角膠

搗碎炒令黃燥

紫石英

火煨研細木飛過

陽起石

火煨研細

桑螵蛸

炒熟地

禹餘糧

燒醋淬七次各一兩

杜仲

芎藭

當歸

剉炒桂心

牛膝

桑寄生

五味子

蛇床子

牡丹皮

各三分

玄及

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九空心

溫酒送下

嚴氏第二論胎動腹滿者何也曰胎動腹痛其理

蓋緣飲食冷熱動風母物或因再交搖動骨節傷

犯鹿茸其候多嘔氣不調勻。或服執藥太過血氣相干。急服順氣藥安胎。不然變成漏胎。則難療矣。如聖湯

鯉魚皮

當歸

熟地

阿膠

白芍藥

川芎

續斷

酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢。水盞半入苧根少許。薑五片煎七分。去滓空心服。

○第五十九問大小二便秘結不通者何也

答曰。陽虛不能運陰。故氣無陰以清其陽。則陽獨治而爲熱。陰虛不能運陽。故氣無陽以和其陰。則

陰獨治而爲厥。是以二氣和則氣道平。二便順則氣道通。今二便秘結。明陽氣之獨治也。未人有腑臟氣實而生熱者。隨其停積之處而成病也。若熱結大腸則大便不通。熱結小腸則小便不通。若大小便俱爲熱所結。故煩滿而二便結閉。熱盛則腸胃氣逆。冷則變爲嘔也。

檳榔散治產後大小便秘。心腹脹滿氣促。

檳榔

一兩

車前子

三分

冬瓜子

三分

川太黃

一兩

木通

一兩

桂心

兩

甘草

兩

當歸

兩

滑石

一兩

川朴

硝

一兩

秘甚

者入硝

者入硝

右咬咀每服三錢水盞半煎半盞去滓溫服  
不拘時

木通散治產後大小便秘澀

木通

大麻仁

葵子

一木冬瓜子

滑石

檳榔

各一兩

枳實

半兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服三錢水盞半煎八分去滓溫服  
不拘時

嚴氏第四論。妊娠而赤口苦舌乾。心煩腹脹者。何  
曰。蓋緣恣情飲酒。因食桃李羊肉雞麩魚腥羶毒  
物等。致令百節痠疼。大小便結秘。可服歸涼節命

散

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬

去心

當歸

白朮

各兩

糯米

半合

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水盞半煎九分去滓溫服

不拘時

大腹皮散治妊娠大小便不通

枳殼

大腹皮

甘草

炙各兩

赤茯苓

去皮三錢

右爲細末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘

時服

冬葵子散治難娠小便不利身惡重寒起則眩

暈及水腫

冬葵

錢三

赤茯苓

錢二

右爲細末每服三錢米飲調下不拘時若利則歇服不通以是轉胞加髮灰心許神效曾有妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等藥服之反吐藥食不內轉加脹滿揆心驗之胎死腹中又服諸下胎藥不能解舉家驚惶因得鯉魚湯論曰脚腫俗呼爲皸脚亦有通身腫滿心胸急脹名曰胎水遂去妊婦心前衣服看之胸肚不分急以鯉

魚湯四五服。大小便皆下惡水。腫消脹去。方  
得分免死胎。可謂生之幸也。此證蓋緣懷身  
腹大。妊婦不自知覺。人人皆以爲身娠如此。  
終不以爲胎水病。醫人何以得知。故書此論。  
病家當自覺察。

### 鯉魚湯

當歸

白芍藥

去皮各四錢

白朮

半兩

右咬咀。每服四錢。用鯉魚一尾。不拘大小。破  
洗去鱗腸白水。煮熟去魚。每服魚汁一盞。半  
薑五片。橋皮少許。煎一盞。空心服。如胎水去。

未盡絕再服

⑥第六十問妊娠傷寒與常人治法同異何如

答曰四時有不正之氣如春夏亦有寒溫時秋冬亦有晴暑時是故一歲之中病無長幼率相似者此則時行之氣俗謂之天行若春溫煖而清氣折之則責邪在肝夏應暑而寒氣折之則責邪在心秋應涼而反大熱折之則責邪在肺冬應寒而反大溫抑之則責邪在腎仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者因冒寒而作也其候發熱惡寒頭疼腰脊痛其脈浮緊無汗者可發汗宜服麻黃湯



脈浮緩而有汗者。可解肌。宜服桂枝湯。切詳麻黃  
桂枝皆能墮胎。以此言之。則妊娠傷寒。常人之治  
法。大不相同也。

十全散。卽敗毒散。又名人參羌活散。治傷寒。癰  
瘕。

人參

白茯苓

羌活

獨活

甘草炙

川芎

枳殼

柴胡

白朮

桔梗

各等分

右咬咀。每服三錢。水盞半。薑五片。薄荷七葉。  
煎七分。熱服。如頭疼發熱。連二服。汗出卽愈。

阿膠散治妊娠婦傷寒安胎

阿膠

桑寄生

吳白朮

人參

各等分

右爲細末每服二錢煎糯米飲調下不拘時  
單胎散

捲荷葉

一兩焙乾

蚌粉花

右爲細末每服二錢入蜜少許新汲水調下  
食前服

嚴氏第十問妊娠婦外感風寒渾身壯熱眼暈頭眩者何曰蓋因風寒客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增寒發熱甚致心

胸煩悶大抵產前二命。所以不可輕易妄投湯劑。感冒之初。止宜進芎蘇飲以發散表邪。其病自愈。芎蘇飲

川芎

紫蘇葉

白芍藥

白朮

麥門冬

陳皮

乾薑

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢。水盞半薑三片葱白一寸煎八分。溫服不拘時。

○第六十一問。妊娠傷寒。差後復發熱者。何也。答曰。傷寒差後發熱者。何。此名勞食復也。內經云。多食則復。食肉則復。緣病差後。氣尚虛。津液未復。

因勞動生熱氣既還復入經絡名曰傷寒差後更發熱者小柴胡湯主之解脉沉者以下解又傷寒差後勞傷湯主之千金方勞復起死人參麥門復者大病新差脾胃尚弱穀氣未復食過多停積不化因爾發熱名曰食實梔子湯證云若有宿食內加大黃五六枚服之愈

枳實梔子湯

枳實一枚去穰

梔子三枚肥者

半豉一兩

右以清漿水二盞半煎九分下豉再煎五六沸去滓溫服覆令汗出若有宿食加內大黃如博棊子大五六枚服之日煎服之

○第六十二問時氣溫病皆能損胎者何也

答曰陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒若傷於寒者凡名傷寒耳其一歲之中長幼之病多相似者故各時行之氣也其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最盛殺厲之氣中而卽病者名曰傷寒不

節病寒毒藏於肌膚。至春變而爲溫病。至夏變而爲暑病。暑病者熱極重於溫也。詳此三證皆因寒氣而受邪。寒極生熱。熱氣薰蒸其胎。故損也。

單胎散

見六十問中

人參羌活湯治妊娠感冒發熱頭疼身體痛

白茯苓

羌活

獨活

前胡

芎藭

枳殼炒

桔梗

人參

各一兩

甘草

炙半兩

乾葛

陳皮

各一兩

右爲細末每服三錢水一盞薑五片棗一枚

煎七分去滓溫服

黃龍湯。治妊娠瘟疫。寒熱頭痛。嘔不飲飲食。脇下痛。嘔逆痰氣。及產後傷風熱。入胞宮。寒熱如瘧。

柴胡

黃芩

甘草

人參

各一兩

右剉如麻豆大。每服五錢。水煎。半煎。八分去滓。溫服。不拘時。

治妊娠患時疾

黃芩尖者。出錐鬱金。

右爲細末。每服一錢。板藍根抽。黃水調下。汗出効。未愈再服。卽愈。

論妊娠患時疾

雞子

隆井底泥上隔宿取  
出吞之必無虞矣

○第六十三問妊娠寒熱或因暑氣者有不因傷暑而得之者何也

答曰瘧者寒熱之疾皆繇風寒入中也夫風爲陽邪陽化氣而爲熱寒爲陰邪陰化氣而爲寒陰陽上下交爭虛實邪正更作或陰併於陽則陰實而陽虛若陽併於陰則陽實而陰虛或先傷於寒而後傷於風其爲候也則先寒而後熱或先傷於風而後傷於寒其爲證也則先熱而後寒休作有時



與傷寒頗異者故名爲瘧也。經曰夏傷於暑秋必病瘧者此因暑氣之所傷也。若妊娠寒熱者皆繇血氣虛損風邪乘之致陰陽關隔寒熱互見也。經云陽微惡寒陰弱發熱若此之類皆繇虛之所致。此不因暑氣之作也。若熱極不已則傷胎。

大安散治脾寒如瘧發熱無時

草豆蔻

七箇和皮細切

厚朴

半兩

烏梅

十箇去核仁

甘草

人參

各一分

大棗

十枚

肥薑

一分

陳皮

七箇全者洗淨切

良薑

一分

右共剉拌勻分作五裹先以鹽水蘸紙濕裹

煨香熟。第一服一棗。水一盃煎一盞溫服。第二服用二棗并煎滓。以水二盃煎一盞溫服。第三服用三棗并煎滓。以水三盃煎一盞作兩服。並空心食前溫服。

妊娠患瘧熱者可服

常山

竹葉

各半

人參

石膏

各一兩

糯米

一百粒

右爲哎咀。每服三錢。水盞半煎八分。去滓通口服。不拘時。

地黃丸。治寒熱類瘧。久之爲勞。

生地二兩

柴胡洗

秦艽

黃芩各半兩

赤芍

右爲細末蜜丸桐子大每服三十丸烏梅湯下不拘時

清肌湯治頭目昏重不悅頰赤口燥咽乾發熱盜汗飲食減少

甘草

炙半兩

草果仁

錢五分當歸微炒

白朮

一兩

白茯苓

芍藥

柴胡

各一兩

川芎

半兩

右咬咀每服三錢水一盞半煨薑一塊切碎薄荷少許煎七分去滓熱服不拘時

○第六十四問下利與滯利何以別之

答曰春傷於風邪氣運留遇腸胃虛弱風邪因時傷之腸虛則泄故爲水穀之痢也或腸虛受熱氣者下痢則赤受冷氣者下痢則白冷熱相交其痢如魚腦鼻涕相雜連滯不已者謂之滯痢也

香連丸治泄痢不止

木香

黃連

吳茱萸

白芍

各等分

右爲細末麵糊丸桐子大每服二十九丸濃煎米飲湯下空心日三服

妊娠下痢不止

黃蘗

乾薑

赤石脂

各二兩

酸榴皮

具一

右爲麤末每服五錢水盞半煎六分去滓食前溫服

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草

各二兩

肉豆蔻仁

十兩

砂仁

五兩

右爲細末每服二錢溫粟米飲湯下食前歸連丸治一切下痢無以新久及冷熱膿血腸滑裏急日夜無度臍腹絞痛不可忍

阿膠

搗碎妙如珠三兩以醋四升煮成膏

黃連

當歸

各二兩

乾薑

二兩

木香

一兩五錢

右共爲末。用阿膠膏丸桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

當歸芍藥散。治妊娠腹中絞痛。心下急脹。及產血暈。內虛氣乏。崩中久痢。常服通暢血脈。不生癥瘕。消痰養胃。明目益津。

白芍

八兩

當歸

各四兩

白茯苓

白朮

各二兩

澤瀉

川芎

各四兩

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。食前。元和紀用經云。本六氣經絡。能補虛勞。養真陽。還邪。

熱緩中。和神志。潤澤顏色。散邪寒。溫瘴時疫。  
安期先生賜君少久餌之藥。後仲景增減爲  
婦人懷妊腹痛本方。用芍藥四兩。澤瀉茯苓  
用芎一兩。當歸白朮二兩。亦可以蜜丸服。又  
方等分。每服三錢。溫酒米飲任下。

雞黃散治懷妊下痢赤白絞刺疼痛

雞子

一箇。烏者爲妙。乾者作二箇。傾出清留

以厚紙裝。蓋泥固。燒取出焙乾。

右爲末。每服二錢。米飲調下。一服愈者是男。  
二服愈者是女。

虛氏第九論妊娠下痢赤白者何曰蓋因冷物停  
脾辛酸損胃冷熱不調胎氣不安凝滯下痢頻頻  
時有時無或赤或白腸鳴後重穀道疼痛急服黃  
連丸不問冷熱二證皆可服之

蒙薑黃連丸

乾薑炮

黃連

川芎

砂仁微炒

阿膠

蛤粉炒  
各一兩

白朮

一兩乳香

三錢  
另研枳殼

半兩

右爲細末同鹽梅三箇取肉入少醋糊用杵  
勻丸如桐子大每服四十九白痢乾薑湯下  
赤痢甘草湯赤白痢乾薑甘草湯下



○第六十五問喘病何以得之

答曰喘急之病皆繇榮衛之氣流行失度氣經於臟而臟不能受諸氣上併於肺肺管隘而氣爭故令喘急其始得之或因墜墮恐懼則精神疾疾上焦閉而氣不行氣不行則流於肝肝氣乘肺此喘出於肝或因驚恐驚則心無所倚神無所歸氣亂於中。心乘於肺此喘出於心或因渡水跌仆腎氣暴傷而不通行氣流於腎腎氣上乘於脾此喘出於脾或因飲食過傷動作用力穀氣不行脾氣逆而凝肺此喘出於肺凡諸臟相乘而喘其證各不

也

神秘湯。治夜不得臥。臥則喘。此錄水氣逆行。上乘於肺。肺得水則浮。而開。使氣不得通流。其脈沉大。

陳橘皮

湯洗

生薑

紫蘇葉

人參

桑白皮

各半

右爲咬咀。每服三錢。水盞半煎八分。去滓溫服。

平肺湯。治喘急。

天門冬

法心

馬兜苓

百部

各半

右爲麤末每服五錢。水盞半煎八分去滓溫服。

○第六十六問妊娠多痰者緣何而生

答曰痰因飲生也。氣道壅滯津液不通。水飲氣滯。停在胸臆結而成痰。人皆有之。少則不能爲害。多則成病。乃至嘔吐。妊娠嘔吐甚者。多傷胎也。

細辛五味子湯治痰飲壅滯

細辛兩一 五味子三二 白茯苓 人參

白朮 甘草炙 乾薑炮

右爲飲子。每服三錢。水盞半煎八分去滓溫

藥食後

赤茯苓湯治妊娠嘔噦心下滿胸膈閉宿食停  
水停水心悸

赤茯苓

人參

陳皮

各一兩

芎藭

白朮

半夏

各半兩

右爲飲子每服四錢水盞半盞五片煎七分  
去滓溫服不拘時

○第六十七問妊娠霍亂者何也

答曰陰陽不順清濁相干氣射中焦名曰霍亂本  
因飽食豚膾復啖生冷或飲寒漿眠臥冷席風冷

之氣傷於脾胃。諸食結而不消。陰陽二氣壅而不  
交。錯於中。變成吐痢。邪在於上者。先心痛而吐。  
邪在於下者。先腹痛而痢。心腹俱痛。吐痢並發。挾  
風者。身熱頭痛。冒暑者。吐痢冷飲。若不已。則百脉  
皆亂。榮衛俱虛。冷搏於筋。令人轉筋。邪干於胎。其  
胎必損。揮霍之間。便成繚亂。故名霍亂也。

白朮散。治產後霍亂。吐痢腹痛。煩渴。手足逆冷。

白朮

麥門冬

陳皮

乾薑

炮

人參

各一兩

甘草

炙半兩

右爲麤散。每服四錢。水盞半。薑五片。煎六分。

去滓溫服不徇時

寒者理中湯治裏寒外熱霍亂吐痢手足厥冷  
胸脾心痛逆氣結氣

丁香兩一

人參

甘草

白朮

乾薑炮各三兩

右爲飲子每服三錢水盞半煎八分去滓空  
心稍熱服

丁香散治霍亂吐痢不止

丁香

桂心

白朮

訶梨勒

厚朴

高良薑

附子

木瓜乾者

陳皮

各一兩

右爲細末每服二錢米飲調下不拘時

渴者五苓散治霍亂吐痢躁渴引飲

澤瀉

五兩

白朮

猪苓

各三兩

肉桂

二兩

赤茯苓

三兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖

多飲熱湯有汗卽愈

參苓白朮散治胃氣不順吐痢止後躁渴不解

乾薑

一兩

人參

白茯苓

各一兩

木香

一分

甘草

炙一分

藿香

一分

右爲麤末每服二錢水盞半煎七分去渣  
服不拘時

香薷飲治清濁相干霍亂吐痢

香薷

半一兩

厚朴

黃連

各二兩

右爲飲子每服三錢水盞半煎七分去滓用  
新汲水頻頻頓極冷服之藥冷則効速也

○第六十八問何謂子煩

答曰煩有四證有心中煩有胸中煩有虛煩有子  
煩諸如此者皆熱也若藏虛而熱氣乘心則冷心  
煩但煩熱而已別無他證者名曰虛煩若積痰飲



而嘔吐涎沫者謂之胸中煩或血飲停積虛熱相搏以其妊娠而煩故謂之子煩也

犀角散治妊娠心煩熱悶

犀角屑

地骨皮

黃芩

麥門冬

赤茯苓

各一兩

甘草

炙半兩

右爲飲子每服四錢水盞半煎八分去滓入竹瀝一合更煎數沸溫服不拘時

當歸飲子治妊娠胎動心煩熱悶

當歸

芎藭

阿膠

豆豉

桑寄生

各半兩

葱白

七莖

右爲飲子每服三錢水二盞煎八分去滓溫服不拘時

竹瀝湯療妊娠常苦煩悶此子煩也

竹瀝

合二

防風

兩三

黃芩

兩三

茯苓

兩四

麥門冬

兩三

右爲飲子水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差重作

○第六十九問何謂子嗽

答曰肺主氣外合皮毛風寒外感入射於肺故爲咳也有涎者謂之嗽無痰者名曰咳夫五臟六腑

女科百問

下三

俱受氣於肺各以其時感於寒而爲病也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之長夏則脾受之長夏者夏末秋初也諸藏不已各傳於  
臟出妊娠而嗽者謂之子嗽久而不已則傷胎  
天門冬湯治惡熱咽燥脉數咳嗽甚則咯血

天門冬

半兩

紫苑

知母

各一兩

桑白皮

五味子

桔梗

右爲飲子每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服有血者如阿膠半兩大便澀而喘者加葶藶半兩

百合散治妊娠咳嗽心胸不利煩悶不欲飲食

百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮

各兩

甘草

美半兩

右爲艾咀每服四錢水盞半入竹茹一分煎八分去滓入蜜半匙更煎三四沸方可不拘時候溫服

緩息丹治肺氣不調痰壅咳嗽上氣喘滿咳嗽唾痰沫日夕不安止

半夏曲

二兩半夏湯洗七次研成末薑汁和候乾再爲末薑汁再和共七八次

橘紅

五錢

天門冬

半兩

杏仁

二兩去皮尖別研成霜

喫之不辣爲度

右三味爲末。次拌研細杏仁霜。煉蜜和。每兩分十五丸。每服一丸。隨津調之。食後服。

○第七十問何謂胸痺

答曰。胸痺者。絲寒氣客於臟腑。氣上衝心。胸下幅滿。如滿。噎塞。習習痺痛。飲食不下。謂之胸痺也。脾胃漸弱。乃至斃人。妊婦爲患。亦損傷胎也。

枳實埋中湯丸。治結胸欲絕。心膈高起。手不可近。

白茯苓

人參

各二兩

枳實

片十六

乾薑

炮

白朮

各二兩

甘草

炙二兩

右爲細末。覆瓦如雞子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。胸中豁然。而開瀉者。加括

蒞根二兩。下痢者。加牡蠣二兩。

桔梗枳殼湯。

治痞氣胸滿欲絕。

枳殼湯洗去穢

右剉麻豆大。分二服。水二盞煎一盞。去滓溫

服不拘時。

沈香理氣湯。治氣滯不和。胸膈虛痞。

丁香

檀香

木香

各半兩

藿香

二兩

甘草二兩

砂仁半兩

白豆蔻

一兩

用仁

沉香

烏藥

人參

各一兩

右爲末每服一錢。人鹽一字。沸湯點服不拘時。

調氣丸治氣道不順胸膈壅塞

青皮

炒

陳皮

炒

木香

各一兩不見火

右各剉碎用牽牛末四兩炒牽牛末焦黃篩去不用以三味爲細末蜜丸桐子大每服五十丸空心薑湯送下

○第七十一問何謂子癰

答曰風是四時八方之氣常以冬至日候之風從

其方來者。長養萬物。不從其方來者。乃名虛邪。其  
風體虛之人中之者。隨其虛而爲病也。夫五臟六  
腑之俞。皆在於背。臟腑既虛。則邪乘虛而入。其  
其臟腑所感而發。時能言者可治。不能言者難治。  
若傷太陽之經。復遇寒濕相搏。口噤背強。名之曰  
瘖。故妊娠而發者。悶冒不識人。須臾則醒。醒而復  
發。名曰子癰。又名子冒。久則成變瘖。妊娠忽悶。眼  
直不識人。須臾醒。醒復發。似不醒者。名曰瘖病。亦  
號子癰。亦號子冒。以葛根湯。若有竹近。可速辦。當  
先作竹瀝湯。其竹遠。不可卽辦者。當先辦葛湯。此



二物偏療諸瘧。絕可以起死也。小兒忽癩瘧。與金瘡療之亦驗。作竹瀝法于後。

取新伐青淡竹。斷之。除兩頭節。作片。以塼竝側。令竹兩頭虛。布列其上。燒中央兩頭。汁出。以器盛之。取服。

葛根湯。療妊娠臨月。因發風瘧。忽悶憤不識人。吐逆。睡少醒復發。名爲子癩。

貝母

葛根

牡丹皮

去心防已

防風

當歸

芎藭

肉桂

取麝

白茯苓

澤瀉

甘草

各二兩獨活

石膏

人參

右件以水六升。煮取三升。分三服。其具母人。人易產。若未臨月者。以升麻代之。忌海藻。菜鮮物。

○第七十二問胎痿過年不產。又兩胎一死一者何也。

答曰。陽施陰化。精盛有餘者。則成兩胎。脉經云。左右脉俱疾。爲二子。又云。俱沉實。猥生二男。俱浮大。猥生二女。且胎之在胞。以氣血滋養。若寒溫節適。血氣強盛。則無傷。若冷熱失宜。氣血損弱。則胎痿。

燥而不育。或過年久而不產。若雙胎遇寒。經養不周。故偏天傷。候其胎上冷。是胎已死。如雞乳子。熱者爲祿。寒者爲湯。正謂此也。

乾地黃丸。治妊娠氣血虛弱。胎氣不長。

熟地黃

一兩 芎藭

白茯苓

人參

當歸

各三兩

柴胡

半兩

刺薊

桑寄生

各半兩

厚朴

乙兩

龍骨

阿膠

各三兩

白石脂

三兩

黃芪

半兩

甘草

一分

右爲細末。蜜和搗。二三百杵。丸如桐子大。每服三十九。清粥飲湯送下。不拘時。

雄黃丸。冷妊娠是鬼胎。致腹中黑血數下。腹痛。

雄黃

細研

累白

去毛一本  
累白去心

莽草

丹砂

細研

巴豆

去皮  
心油

獺肝

炙黃各  
半兩

蜈蚣

炙黃一枚

蜥蜴

炙黃一枚

右爲細末。煉蜜和搗三百杵。丸如桐子大。空

腹溫酒下二丸。日進二服。服後當下痢。如不

痢。加至三丸。初下清水。次下蟲。如馬尾狀。無

數病極者。下蛇蟲。或如蝦卵。雞子。或如白膏。

或如豆汁。其病悉愈。

白朮散。調補衝任。扶養胎氣。治妊娠宿有風寒。

胎痿不長。或失於將理。動傷胎氣。多致損墮。懷

妊常服壯氣益血保護胎臟

牡蠣

三分

白朮

四分

芎藭

四分

川椒

去目炒三分

療妊娠兩兒腹中一死一活令死者出生者安  
此方神驗萬不失一

蟹爪

一枚

甘草

二尺炙

阿膠

三兩

右以棗流水一斗先煮二味取三升內阿膠  
令烊頓服不能頓服分再服若人困拘開口  
下藥入即活煎藥宜向東以茅葦薪煮之

○第七十三問妊娠墮胎或血出不止或血不出  
者何也

名曰血寒則凝。溫則散。墮胎損經血出不止有二。一則因熱而流散。二則血氣虛而不斂。瀉血多者必煩悶而死。或因風冷墮胎者。血冷相搏。氣虛逆上。則血結不出。搶上攻心。則煩悶亦多。致死當溫經逐寒。其血自行也。

膠艾湯治勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋漓漏下。連日不斷。臍腹疼痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。或勞傷胞絡。胞阻漏血。腰痛悶亂。或因損動胎上。搶心奔衝短氣。及因產乳衝任氣虛。不能約制經血。淋漓不斷。延引日月。

漸成羸瘦

阿膠

芎藭

甘草

二兩

當歸

艾葉

微炒各三兩

熟地

白芍

各四兩

右咬咀每服三錢水一盞酒六分煎八分去

滓稍熱服空心日服三次甚者連夜併服

伏龍肝散治血氣勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或成豆汁或成片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝

一兩

熟地

二兩

甘草

炙

芎藭

二兩

肉桂

半兩

當歸

炒

三兩

乾薑

炒

三兩

分

艾葉

微炒

二兩

赤石脂

兩

麥門冬

一兩

冬

兩

兩

右爲麤散每服四錢水盞半棗三枚煎八分去渣溫服食前

當歸散治妊娠猝驚奔走或從高墜下腹痛下血不止

當歸

一兩

半炒

阿膠

二兩

搗碎

黃色

艾葉

炒

一兩

兩

芎藭

一兩

右爲飲子每服四錢水盞半煎至六分次入生薑汁一匙地黃汁半合馬通汁半合更煎



三兩沸去渣溫服不拘時

○第七十四問何以謂之子淋

答曰腎者作彊之官伎巧出焉與膀胱爲合男子以藏精女子以繫胞啓玄子云彊於作用故曰作彊造化形容故曰伎巧在女則當伎巧在男則正當作彊夫淋者腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也客熱乘膀胱則水行澁澁而且數淋瀝不宜妊娠之人繫胞於腎腎患虛熱成淋故謂子淋也

治療妊娠患子淋小便數而少或熱痛酸疼

地膚草

二兩以水四升煮取二升半分三次服

療妊娠患子淋宜地膚湯

地膚草

車前子

各三兩

知母

黃芩

赤茯苓

赤芍

枳實

炙

升麻

通草

甘草

炙各二兩

右咬咀每服四錢水盞半煎八分去滓空心

溫服或無地膚葵根汁亦妙

石葦散治產後小便淋瀝溺血

石葦

去毛

榆白皮

木通

各一兩

黃芩

三錢

赤芍

葵子

各半兩

右爲麤散每服三錢水盞半入生地黃一分

煎六分去滓日三四服

○第七十五問小便或有利者或有不通者何也  
答曰小腸爲盛受之府膀胱乃州都之官啓玄子  
云位當孤府故謂都官居下內空故藏津液若得  
氣海之氣則能泄注也或受熱滲於脬脬屈辨而  
系轉故使小便不通利也或腎胞有冷不能溫制  
於水道故小便日夜十數行甚者至於亂夢恍惚  
寒者宜大建中湯從蓉丸熱者琥珀散方見指迷  
方

葶藶丸 益腎固氣 小便頻數

葶藶

青鹽三銖 水半 益 煑 熟 拌 取 半 兩

金毛狗脊

三銖

益智子

搗碎 鹽 炒 半 兩

肉苁蓉

一兩 切 焙

兔絲子

半兩 酒 浸 研

巴戟

半兩

杜仲

半兩 炒

黃芪

一錢

右爲細末酒糊丸如桐子大每服四十九空心淡鹽湯米湯下

冬葵子散 治妊娠胎不安小便淋瀝小肚疼痛

冬葵子

炒

柴胡

桑白皮

赤茯苓

赤芍

當歸

各等分

右爲吹咀每服四錢。水盞半。薑五片。葱白七寸。煎七分去滓。溫服。

車前子散。除下焦留熱。小便不通。淋瀝作痛。

車前子 檳榔 木通 陳皮

赤芍 赤茯苓 當歸 滑石

石薑 各一兩

右吹咀。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。以利

爲度。未利再服。食前。

忘憂散。治心經蓄熱。小便赤澀。不通。淋瀝作痛。

琥珀 不拘多少

本為細末每服五分濃煎宜草根湯調下

第七十六問大便或利或秘者何也

答曰大腸者傳導之官變化出焉獨受陰陽之濁化其糟粕傳不潔之道若三焦不調臟腑不和受熱則津液竭燥腸胃否滯大便不通有寒則腹痛瀉焉水穀併下故熱則宜清而通之寒則宜溫而通之

建中散治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰涎逆噫氣吞

酸腸鳴泄痢。水穀不化。肢體倦怠。不思飲食。

青皮

一本無  
青皮

棗子

一

厚朴

一

甘草

半夏

湯泡洗  
浸五兩

陳皮

八兩

乾薑

炮  
五兩

已上六味用水三斗煮。令水盡焙乾。

人參

去蘆  
兩

藿香

一兩

訶子

炮取  
二兩

白朮

兩

草豆蔻

去皮  
兩

白茯苓

一兩

右爲飲子。每服二錢。水二盞。薑三片。煎六分。去渣溫服。食前。

四味換腸丸。治便下覺臟腑疼痛。泄痢飲食不美。因多思所致。或寒氣積。遂成其痢。一名息痢

白朮

三分

訶子

炮去核取肉三分

肉豆蔻

三分

鍾乳粉

兩一

右爲細末入鍾乳粉拌麩糊爲丸。桐子大每服五十九。空心熱水送下。止進三兩服便効。熱者服四順飲子。治大便不通而赤身熱。

大黃

白芍

甘草

當歸

各等分

右爲麤散每服五錢水盞半煎一盞去滓溫服不拘時。

麻仁丸。治腸中受風津液燥少。往往大便秘。

麻仁

去皮研二兩

枳實

四兩

白芍

四兩



大黃

四兩炮

厚朴

二兩

杏仁

二兩

右爲細末蜜丸梧桐子大。米飲下二十九。未通加至三十九。

寒者理中湯。治腸胃冷熱濕泄瀉。注下。水穀不分。腹中雷鳴。及傷時氣。裏寒外熱。霍亂吐痢。手足厥冷。胸痺心疼。逆氣結氣。並皆治之。

人參

甘草

白朮

乾薑

炮各二兩

肉豆蔻

砂仁

各二兩

右爲飲子。每服三錢。水盞半煎一盞。去滓熱服。食前。

煮朴丸治臟寒泄痢

北棗

半觔

川芎

四兩

生薑

切片四兩

已上三味水三椀煎乾。將生薑厚杵爛入棗肉一處再杵令細。以麻油塗手。担如小錢。慢火焙乾。入後藥。

蒼朮

米泔浸

茴香

炒

甘草

炙

官桂

去皮新者

神曲

麥蘖

炒淨

蓬朮

煨各四兩

砂仁

良薑

炒各二兩

肉豆蔻

煨二兩

丁香

一兩

川薑

二兩

右爲細末水煮薄糊爲丸。梧桐子入。每服百粒。米飲湯下。不拘時。

豆蔻橘紅散 溫脾養胃消穀嗜食

丁香

木香兩

白豆蔻仁

人參

白朮

厚朴

神麴

乾薑炮

半夏曲炒

陳皮去白

藿香葉去土

甘草炙各半兩

右爲細末每服三錢水一盞薑三片棗一個

煎七分去滓空心溫服

○第七十七問妊娠至八九箇月兩脚俱腫何也  
答曰妊娠至八九月腿脚腫者不可爲水病治之  
恐導其真氣見此狀者則知其易產也蓋胞藏水  
血俱多不致胎燥故云易產也當服順氣滑胎之

身者初起而蘆者是水氣過多兒未成體恐壞胎

枳殼散養胎氣安和子臟治胎中一切惡疾

令胎滑易產

枳殼

去穢炒  
四兩

甘草

炙一兩

右爲細末每服二錢沸湯調服空心入日日  
進三服

榆白皮湯滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血臨  
產驚動太早產未至穢露先下致胎胞乾燥臨  
產艱難

冬葵子

兩一木通

兩半榆白皮

兩一瞿麥

牛膝

去蒲酒浸  
焙三分

大麻仁

去殼  
三分

右爲麤末每服三錢水盞半煎八分去滓溫服不拘時

### 救生散安胎益氣易產

人參

呵子

濕紙裹煨熟  
去核

陳皮

炒

白朮

炒

大麥肉

炒

神曲

炒各  
半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎六分去滓人月加一倍用水二盞煎一盞空心溫服服之能令兒繫小乳母無患

第七十八問妊娠十月將養之法何如

答曰陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也所謂妊者陽既授始陰妊之也娠則以時而動故曰妊娠也

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂正才

妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主於筋及血一月之時血行否溢不爲力事寢心安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多猝驚

舉重腰疼。腹滿飽急。猝有所下。當預安之。宜服

烏雌雞湯

烏雌雞

一隻炙如常法食

茯苓

二兩

吳茱萸

一升

芍藥

人參

白朮

各三兩

麥門冬

五合

阿膠

二兩

甘草

一兩

右十味。㕮咀。水一斗二升。煮雞取汁六升。去雞下藥。煎取三升。內酒三升。并膠烱盡。取三升。開放。溫每服一升。日三服。

妊娠曾於第一箇月墮胎者。入月預服此藥。治之補胎湯。

人參

防風

細辛

烏梅肉

白朮

各一兩

大麥

合

熟地

兩

吳茱萸

牛兩  
洗七次

右爲飲子每服三錢水盞半薑三片煎七分  
去滓空心服寒多者倍細辛茱萸渴者去細  
辛加括婁根若有所思去大麥加栝子仁三  
合服之

妊娠二月名始膏無食腥辛之物居必靜處男子  
勿勞百節皆痛是謂胎藏也少陽者膽之脉也主  
於精二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足  
少陽在足小指閒本節後附骨上一寸陷中者是



妊娠二月陰陽居經若有寒多瓊不成有熱則萎  
萃怯弱中風寒有所動搖心滿臍下脹急腰背強  
痛猝有所下乍寒乍熱服艾葉湯

人參 當歸 艾葉 甘草

麻黃去根節 丹參各一兩 阿膠炒一兩

右爲呶咀每服一兩水盞半棗三枚薑五片  
好酒一盞煎一半盞去滓分爲二服食前

妊娠曾於第二箇月墮胎者入月預當養其胎

藏服黃芩湯

黃芩 人參 阿膠各一兩

當歸

牛兩  
炒乾

吳茱萸

一分  
洗七次  
焙乾微炒

右爲咬咀每服三錢水盞半薑三片煎八分  
去滓食前如覺大段不安加烏梅一兩

妊娠三月始胎當此之時血不流通形像始化未  
有定儀見物而變欲令見貴盛王公好人端正莊  
嚴不欲令見傴僂侏儒醜惡形人及猿猴之類無  
貪薑兔無懷刀繩欲得見男者操弓矢射雄雞乘  
肥馬於田野觀虎豹及走犬其欲得女者則箸簪  
珂環弄珠璣欲令子美好端正者數視白璧美玉  
看孔省食鯉魚欲令兒多智有力則噉牛肉心食

大麥欲令子賢良盛德端心正生消和虛一坐無邪席立無偏倚行無邪徑目無邪視口無邪言心無邪念無妄喜怒無得思慮食無到癯無邪臥無橫足思欲瓜果噉味酸菹好芬芳惡見穢晷是謂外像而變者也手心主養之手心主者脉中精神內屬於心能混神故手心主養之手心主穴在掌後橫交者是診其妊娠脉滑疾重以手按之散者胎已三月也妊娠三月爲定形有寒則人便青有熱則小便赤不赤則黃若猝驚恐懼憂愁嗔恚傷動於筋脉繞臍痛或腰背痛猝有所不服唯雞湯

人參

麥門冬

白茯苓

當歸

白朮

甘草

川芎

白芍

阿膠二兩

右爲咬咀每服用一兩入煮烏雞汁一盞

棗二枚好酒一盞煎至一盞半去滓分作二

服食前

子 妊娠曾於第三箇月墮胎者入月宜服茯神飲

茯神

丹參

龍骨

人參

阿膠炒

當歸

甘草

赤小豆

各一兩 各二兩 炒合

右爲咬咀每服三錢水盞半棗一枚煎八分

云滓溫服腰痛者加寄生二兩空心服

妊娠四月之時始受水精以成血脉其食宜麥菘其羹宜魚鴈是謂盛榮以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽者三焦之脉也內屬於膈四月之時兒六腑順成故手少陽養之手少陽穴在手小指間本節後二寸是也診其妊娠四月欲知男女左脉疾爲男右脉疾爲女俱疾爲生二男當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂也是手少陽三焦之脉內屬於三焦靜形體和心志節飲食

妊娠四月若有寒心中欲嘔胸滿不食有熱則小便頻數如淋狀臍下若急卒風寒項頸強痛寒熱驚惕腰背及腹痛往來不定或胎上急迫心頭煩悶不安卒有所下宜服菊花湯

當歸

人參

麥門冬

甘草

麻黃

去節

半夏

湯洗七次

阿膠

炒二兩

菊花

半兩

右爲散咀每服四錢米盞半薑三片棗一枚煎八分去滓空心溫服非風寒項強者當去麻黃半夏緣二藥能損胎

調中湯

白芍

白朮

柴胡

甘草炙

烏梅肉

續斷

當歸

川芎

枳實

厚朴

甘李根皮

羸人  
去之  
各等分

右爲咬嚼每服三錢水盞半薑四片煎八分  
去滓溫服空心

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起洗浣衣  
服淨室必厚其裳朝吸天光以避寒殃其食宜稻  
麥其羹宜牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以  
定五臟者也一本云宜食魚鱉足太陰養之足太  
陰脾之脉主四季五月之時見四肢皆感故足太

陰養之。足太陰之穴。在足內踝上三寸也。診其經  
娠之脈。重手按之不散。但疾不滑者。五月也。又其  
脈數者。以向懷。脈緊者。必胞阻。脈遲者。心腹滿。脈  
浮者。必水懷爲腫。

妊娠五月。若有熱。頭眩。心亂。欲嘔者。有寒。則腹痛。  
小便難。猝悸恐。四肢疼痛。寒熱胎動無常。或損仆。  
腹痛。有所不安。服旋覆花湯。

旋覆花

當歸

人參

黃芪

一本黃芪

麥門冬

赤芍

吳茱萸

洗七次

各一兩

阿膠

炒二兩

甘草

炙半兩



右爲咬咀每服四錢。水盞半薑三片好酒三分煎八分空心溫服。

妊娠六月始受金精以成其筋。身欲微勞無得靜處。出游於野。數觀走犬及視走馬。宜食鷲鳥猛獸之肉。是謂變滕脊筋以養其爪。以牢其背脊。足陽明養之。足陽明胃之脉。主其口目。六月之時。兒口目皆成。掖足陽明養之。足陽明穴在太衝上二寸是也。

妊娠六月。猝胎動不安。寒熱往來。腹痛滿身。腫驚怖血下。腹痛狀如欲產。手足煩熱。並宜服麥門冬。

麥門冬

人參

甘草

黃芩

各一兩

熟地

阿膠

蛤粉炒  
各二兩

右爲改咀每服四錢。水盞半入酒五分薑五片棗二枚煎八分去滓溫服食前

妊娠曾於六箇月損墮者。入月預服柴胡散

柴胡

去苗

白芍

麥門冬

熟地

茯苓

酒浸焙

川芎

白朮

各兩

甘草

炙半兩

右爲改咀每服四錢。水盞半棗三枚煎八分去滓溫服空心

妊娠七月始受木精以成骨勞躬搖肢無使身安  
動作屈伸居處必燥飲食避寒常宜食杭稻以密  
腠理是謂養骨牢齒者也手太陰養之手太陰者  
肺肺主皮毛七月之時兒皮已成故手太陰養之  
手太陰穴在手大指本節後白肉際陷中是診其  
妊娠七月脉實大牢强者生沉細者死懷軀七月  
暴下斗餘水其胎必傷而墮此非時孤漿預下故  
也喘促頸項腰背強服葱白湯

半夏

洗七次

黃芪

人參

當歸

黃芩

各一兩

阿膠

炒

旋覆花

甘草

炙

麥門冬去心各等分

右爲咬咀每服四錢水盞半薑三片葱白三

寸好酒半盞煎至八分去滓溫服空心

妊娠曾於第七箇月傷墮者宜預服杏仁湯

杏仁泡去皮尖鍾乳粉 紫苑 吳茱萸

甘草炙 乾薑炮 五味子 麥門冬

粳米各等分

右爲咬咀每服四錢水盞半煎八分去滓空

心服

妊娠八月始受土以成膚革和心靜息無使氣極

是謂密腠理而光澤顏色。手陽明養之。手陽明者大腸之脈。大腸主九竅。八月之時兒九竅皆成。故手陽明養之。手陽明穴在大指本節後宛宛中。是診其妊娠八月脈實大牢強弦緊者生。沉細者死。妊娠八月忽中風寒有所犯觸。身體疼痛。乍寒乍熱。胎動不安。常若頭眩繞臍疼痛。有寒小便白濁。或復漏下。顏色無定。腰背冷痛。目視茫茫。悉宜服芍藥湯。

厚朴二兩

甘草

當歸

白朮

各二兩

人參

白芍

各一兩

右爲咬咀每服四錢水一盞酒半盞薑五片

薤白七寸煎八分

妊娠曾於八箇月傷墮胎者宜服荻子湯

厚朴二兩

甘草

當歸

白朮

各二兩

人參

白芍

各一兩

柴胡

三兩

葵子

右爲咬咀每服四錢水盞半薑五片棗一枚

煎八分空心溫服

妊娠九月始受石精以成皮毛六臟百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之時謂養毛髮多才力足少陰養之足少陰者腎之脉腎主續縷九月

之時兒脉續縷皆成故足少陰養之足少陰穴在  
足內踝後微近下前動脉是也妊娠九月若猝得  
下痢腹滿脹急胎上衝心腰背不可轉側短氣滿  
悶並宜服半夏湯

半夏

湯洗

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠

炒各

乾薑

兩

大棗

十二枚

右爲咬咀每服五錢水

盪半煎六分去滓入

蜜少許空心服三方用

雌雞煮汁煎藥

妊娠曾於第九箇月產者宜先服茯苓腎

湯

白茯苓

桑寄生

熟地

白朮

川芎

麥門冬

去心

人參

各一兩

乾薑

炮半兩

右爲咬咀先以猪腎一對切去脂膜用水一碗入黑豆一合同煮取汁一盞半入藥入味五錢煎至一盞去滓食前溫服分爲二服

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神咸備然可預備滑胎方法也

妊娠十月滿足入月預修正順產理滑胎易產甘草散

甘草

黑豆

大麻仁

別研

糯米

各一兩

女科百病



乾薑兩半 白茯苓兩半 吳茱萸牛兩 洗七次

右爲細末入麻仁末同拌每服二錢溫酒調下未入月不可調服

○第七十九問橫生逆產者何也

答曰將產坐臥須順四時方面拜避五行禁忌若有觸犯多令產難或因漏胎去血臟燥或子臟宿挾疹病拜觸禁忌或覺腹痛產時未到便即驚動穢露下早致子道乾澀產婦力疲又有橫逆不順者皆難產也或有子上逼心者皆繇妊娠之人夫於將養也大抵臨產之際腹痛而腰不痛者未產

也若腹痛連腰甚者卽產所以然者腎候於腰胸  
繫於腎故也診其尺脉轉大如切繩轉珠者謂之  
離經日中覺夜半生右腰痛甚者卽產也

愚謂橫生逆產者皆因少母未經生育將產之時  
不肯怒痛務欲逼下爲妙殊不知時候未到胎氣  
未至其子未能翻身受逼不過只得一任離胎逕  
下以至倒生其有橫生者其子離胎將欲翻身投  
下半中之閒被母逼緊轉身不及以至橫下古人  
云瓜熟蒂落粟熟自出自然之理凡有橫逆皆繇  
母不能忍痛也

烏金散治橫生難產及催生

此方救子母於頃刻

百草霜 香白芷

右等分爲細末每服二錢以童便醋各少許調更以熱湯化下未愈再服

乳香丸治難產

乳香

一兩研爲細末

右用猪心血和作十丸每服一丸煎乳香湯化下

出衣法治妊娠胎死腹中衣不出及產後猝有別病欲至狼狽

若胎衣未下。腹滿宜水一盞半。煮猪脂一兩煎  
五七沸。和脂服下之。

寤生丸治難產

枳實

六兩一  
木枳殼

桑白皮

乾六兩

已上二味。入大鑊內。以長河水煮半日許。  
候枳實透軟。去桑白皮不用。取枳實去穢。  
薄切作小片子。焙乾。再入後藥。

木香

半兩

甘草

炙半兩

右三件和爲細末。煉蜜丸。桐子大。晒乾。每日  
空心日午臨臥。各用溫米飲送下。三十丸。加

至五七十九日三服。懷七箇月後服。

○第八十問熱疾胎死腹中者何也

曰因母患熱疾至六日以後臟腑極熱薰煮其胎是以致死。緣兒身死冷不能自出。但服黑神散。其胎須臾胎氣溫煖。卽自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌青色者是其驗。

黑神散

官桂

當歸

芍藥

甘草

乾薑

炮

生地

各一兩

黑豆

炒焦去

皮二兩

附子

炮

半兩

黃

右爲細末每服一錢空心溫酒調下

烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷  
臍腹疼痛頭目昏眩無力多汗及治崩中下血  
過多不止宜服

麒麟竭

亂髮

松墨

散醃

百草霜

當歸頭

肉桂

赤芍

玄胡索

鯉魚鱗

燒

右等分爲細末每服二錢溫酒調服下

黑龍丹治產後一切血疾垂死者但灌藥無有  
不効

五靈脂

生地

當歸

川芎

高良薑

已上各等分。入沙合內。赤石脂。泥縫紙筋。鹽泥固濟。封合。炭火上。勦煨通紅。去火候冷。開取合子看。成黑糟。乃取出。細研入後藥。

硫黃

研一分半

花乳石

煨一分

乳香

別研一分半

琥珀

研一分

百草霜

別研五兩

右同爲細末。醋煮糊丸。彈子大。每服一丸。炭火燒通紅。投生薑自然汁。與無灰好酒各小。

一會小便半盞內研開頓服立効

芎藭湯治產後去血過多。運悶不省。及傷泣。血多。崩中去血多。金瘡去血多。拔牙齒去血多。不止。緣虛心煩眩暈。頭目痛。耳聾滿塞。舉頭欲倒。竝皆治之。

當歸

芎藭各等分

右爲飲子每服三錢。水盞半煎一盞。去滓稍熱服不拘時。

○第八十一問胎衣不下者何也

答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。故不得



下治之。微緩脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘息  
急者難治。但服奪命丹。以速去衣中之血。血散脹  
消。胎衣自下。而無所患。

### 奪命丹

附子

兩半

牡丹皮

兩 乾漆

碎炒烟盡  
二分半

右爲末。醋一升。

大黃末一兩。同熬成膏。和藥

丸如桐子大。溫酒送下。每服五十九。不拘時  
牛膝湯。治產兒已出。胞衣不下。臍腹堅滿。脹急  
疼痛。及子死腹中。不得出者。宜服。

滑石

八兩

當歸

木通

各六兩

冬葵子

五兩

牛膝

去苗酒浸焙

瞿麥

各四兩

右爲吹咀每服三錢水二盞煎八分去滓稍熱服不以時候

○第八十二問難生者何也

答曰胎側有成形塊別呼爲兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難生但服勝金散逐其敗血卽自生逆生橫生竝皆治之

勝金散

麝香

錢一

鹽豉

一

兩舊青衣裏燒令漚紅急以乳鉢研爲細末

右爲細末取秤銚燒紅以酒淬之調藥一錢

七服

琥珀黑散治產婦一切疾病。產前胎死。產難。逆橫生。產後胎衣不下。衣帶先斷。遍身疼痛。口乾心悶。非時不語。如血暈眼花。誤以爲暗風。乍寒乍熱。誤以爲瘧疾。四肢浮腫。誤以爲水氣。言語顛倒。見鬼見神。誤以爲邪祟。腹脇脹滿。嘔逆不定。誤以爲番胃。大便秘澀。小便出血。誤以爲五淋。及惡露未盡。經候未還。起居飲食。便不戒忌。血氣之疾。聚卽成塊。散卽上衝。氣急心痛。咳嗽多痰。四肢虛熱。顛驚盜汗。崩中敗瘵。遠臍刺痛。

或頭面赤因變骨蒸皆宜多服若產後鼻衄口  
鼻黑色氣起喉中喘急中風口噤皆爲難治須  
急服之凡產前宜進一二服皆能安神順胎產  
後雖無疾七日內亦進一二服能散諸毒或因  
驚恐變生他證當連服取効

琥珀

研別

朱砂

研別

松墨

百葛霜

新羅白附子

血苗灰鯉魚鱗

黑衣

龜尾麋各半  
兩一作突烟

麝香

別研

白殭蠶

炒去絲

當歸

去蘆各  
二分

右爲細末每二錢炒薑溫酒和童便調下食

前

○第八十三問產後血運者何也

答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼花甚者令人迷絕口噤神昏氣冷醫者不識呼爲暗風若作此治病必難愈但服清魂散

澤蘭葉

二分

人參

二分

荊芥穗

乙兩

川芎

半兩

甘草

一分

右爲細末每服一錢熱湯溫酒各半盞調下  
咽喉卽開眼氣定人事省

七寶散新產後調血和氣補虛壓驚悸治虛運

朱砂

桂心

乾薑

當歸

羚羊角

川芎

人參

茯苓

各半

右爲細末。若產婦平和。三日以前。直至滿月。每日各取一字。以羌活豆淋酒調下。空心服。若覺心胸煩熱。卽減桂薑。冷卽加之。腹痛加當歸。心悶加羚羊角。心胸氣短加桂。不下食。或惡心。加人參。虛顫加茯苓。以意斟酌。日二服。夜一服。不飲酒者。童便酒少許調下。

○第八十四問產後口乾痞悶者何也

答曰。產後官胃太虛。血氣未定。食麪太早。胃不能

消化麩毒結聚於胃脘上熏胸中是以口乾煩渴  
心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯此宜服見睨  
丸

薑黃

京三稜

葶澄茄

人參

青皮

高良薑

蓬朮

各藥分

右爲末用細蘿蔔慢火煮令爛研細將汁煮  
糊爲丸桐子大蘿蔔湯下不拘時

木香丸治婦人有妊傷食

京三稜

此藥能落胎不可用前胡五分代之產后用之無礙

木香

人參

茯苓

去皮各

右爲細末麴糊丸如菟豆大每服三十九丸熱水送下

白朮散治氣不調和飲食許學士云妊婦傷食難得藥惟此二方穩捷

白朮

炒一兩

乾紫蘇

兩一

白芷

微炒三錢

人參

七錢

川芎

各半

甘草

二錢

訶子皮

一本

青皮

各半

右爲麴末每服二錢水一盞薑三片煎七分

溫服不拘時候

六君子湯治胸膈痞塞脾寒不嗜食燥藥不得

服

服



枳殼

炒

陳皮

人參

白朮

白茯苓

半夏

洗各等分

右爲咀咀每服五錢水二盞薑五片煎一盞  
去滓溫服無時

○第八十五問產後乍寒乍熱者何也

答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血  
氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽  
相勝則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宜  
越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人  
誤作瘧疾治謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血

不散宜奪命丹又問二者何以別之答曰時有刺  
痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸

芍藥

人參

川芎

乾薑

各一

甘草

炙四分

右爲㗗咀每服二錢水一盞薑五片煎六分  
去滓熱服

增損柴胡湯治婦人產後虛羸發寒飲食少腹  
脹

柴胡

錢三

人參

甘草

半夏

白芍

陳皮

川芎

右爲咬咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎七分溫服食後日三服

猪腎湯治產後日淺久坐視聽言語多或運動勞力遂覺頭項及肢節皮肉疼痛乍寒年熱此是蓐勞

猪腎

一對去脂膜

當歸

芍藥

生薑

兩三

桂心

葱白

一合

右以水八升緩火煮腎汁六升澄清內入諸藥煮取二升分三次溫服

加減八珍湯

當歸

半錢

川芎

一錢

熟地

薑汁炒  
五錢

炒

白朮

錢一

白茯苓

錢一

人參

三分

益母草

錢一

陳皮

分五

砂仁

分五

右爲咬咀水一鍾半煎七分食前溫服二劑  
後與益母丸閒服服益母丸川芎歸湯送下

◎第八十六問產後四肢虛腫者何也

答曰產後敗血乘虛停積於五臟不行經絡流入於四肢留滯日深却還不得腐環如水故令四肢而目浮腫醫人不識便作水氣治凡治水氣多用

女科百問

導水藥極虛夫產後既虛是謂重虛往往曰致天  
枉但服調經最自然血行腫消

調經散此方百發百中

沒藥

研

琥珀

研各一分

官桂

赤芍

當歸

各一兩

細辛

麝香

研各半分

甘草

炙二錢嚴氏方中  
多此一味藥

右爲細末每服五分七生薑汁溫酒各少許

調服

正脾散治大病之後脾氣虛弱中滿腹脹四肢  
虛浮狀若水氣此藥治之及產後四肢浮腫

蓬朮

香附

茴香炒

甘草炙

陳皮

各等分

右爲細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下

◎第八十七問產後乍見鬼神者何也

答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗  
血停積上千於心心不受觸遂致心中煩躁臥起  
不安年見鬼神言語顛倒醫人不識呼爲風邪如  
此治之必不得愈但服調經散加生龍齒一捻得  
睡卽安

調經散方見八十六問

右件藥如前每服加龍齒一捻

栝子仁散治產後謊言亂語錄內虛少血邪氣  
攻心

栝子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

琥珀細研

當歸

熟地

甘草

各半兩

右爲咀咀每服以水二盞入白羊心一箇切  
碎先煎七分去心滓須下藥五錢更煎四分  
去滓溫服不拘時

琥珀散治產後血邪攻心迷悶言語錯亂

琥珀研

鐵粉各一兩

人參

茯苓

乾生地

阿膠各七分半

炒令黃色

朱砂研半兩

遠志

七錢半  
去心

甘草

麝香

研各一錢半

有爲細末入研丁藥同和極細每服一錢命銀湯調下無時

●第八人十八問產後不語者何也

答曰人心有七孔三毛產後血氣多端致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉寒則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散

人參

石菖蒲

熟地

川芎

各一兩



細辛

一錢半

防風

兩半

朱砂

半兩研

右爲細木每服一錢金銀薄苛湯謂下不拘時

交感地黃丸治婦人產前產後眼見黑色或卽發狂如見鬼狀臆衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化

生地

洗淨以布絞汁留滓以薑汁炒地黃汁炒生薑滓各至乾爲度

生薑

洗淨以布絞汁留滓各二兩

當歸

一兩

琥珀

別研一兩 不胡索 糯米炒令赤去米

蒲黃

炒

小茴香

兩

右爲細末蜜丸彈子大當歸湯化下一丸食  
前

○第八十九問產後腹痛又瀉痢者何也

答曰產後腸胃虛法寒邪易浸若未滿月飲冷當  
風乘虛進襲留於胸膈散於腹助故腹痛作陳如  
錐刀所刺流入大腸水穀不化洞洩腸鳴或王亦  
白脇肋膨脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫  
者以爲積滯取之則禍不旋踵

調中湯

高良薑

當歸

官桂

白芍

附子

川芎

各一兩

甘草

半兩

人參

半兩

右爲咬咀每服三錢水二盞煎一盞去滓熱服空心食前

定痛散治產後惡血不止腹內熱痛不可忍及兒未定

當歸

芍藥

各二兩

桂心

一兩

右爲咬咀每服二錢各盞半生于大拍破煎至六分去滓溫服如洞泄腸鳴者加附子乾薑下服

又方治產後瘀血法病不已

生料五積散。加乾薑。良薑。丁香。官桂。用煮酒  
童便各一盞。服立効。又方。獨用肉桂末。調  
好酒服之。立効。

○第九十問。產後遍身疼痛者何也。

答曰。產後百節開張。血脉流走。遇氣弱。則經絡肉  
分之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脉引  
急。故腰背不得轉側。手足不能動搖。身熱頭痛也。  
若醫以傷寒治之。則汗出而筋脉傷。手足厥冷。變  
生他病。但服趁痛散。以嘿除之。

趁痛散

牛膝

酒浸

當歸

官桂

白朮

黃芪

兩各半

薤白

二錢半

生薑

兩半

甘草

二錢半

獨活

兩半

右爲麤末每服二錢水一盞半煎七分去滓

溫服本方每服半兩水五盞煎二盞分作二

次溫服

透經湯方見十八問中

○第九十一問產後大便秘澁者何也

答曰產臥水血俱下腸胃虛弱津液不足是以大便秘澁不通也若五六日腹中悶脹者有燥糞在

臟腑以其乾澁未能出耳。宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱而投之以寒藥，則陽消陰長，變動百出，性命危矣。此小柴胡湯之證誤，不可不謹。

麻仁丸

三因方云：去血過多，臟燥，大便秘澀，則因常調之。天黃似難輕用。候葱瀝瀉，則茶爲丸，次以葱茶下之，必通。愚按此言大黃不可輕用者是。

麻仁

研

枳殼

麩炒

人參

大黃

各半兩

右爲細末，蜜丸，桐子大，空心溫酒下，未通加丸數服。

滋腸五仁丸。治血氣不足，大腸閉滯，傳送艱難。

桃仁

杏仁

各一兩，炒去皮尖。

栝子仁

半兩

松子仁

一錢三字

郁李仁

炒

陳皮

別爲末四兩

末

右五仁別研爲膏。合橘皮同研。煉蜜爲丸。桐子大。每服三十九至五十九。食前米飲下。更看虛實加減。

○第九十二問產後血崩者何也

答曰。產臥傷耗經絡。脉未平復。勞役損動。致血暴崩。淋瀝不止。或因鹹酸不節。傷盡榮衛。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。爲難治。當急服固經丸。

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

炒

木賊

各半

附子

一隻泡去皮臍

右爲末陳米糊和丸桐子大食前溫酒下  
十九米飲亦得

熟乾地黃散治崩中下血不止心神煩悶頭目昏重

熟地

半一兩

甘草

蒲黃

各半

蟹爪

微炒二合

白茯苓

伏龍肝

半七錢

桂心

白芍

當歸

微炒各三錢

阿膠

炒黃一兩

熟布

燒灰二兩一本昆布

右爲麤末每服四錢水盞半入竹茹一分煎

六分去滓溫服不拘時

○第九十三問產後腹脹悶滿嘔吐不定者何也



答曰。敗血散於脾胃。脾受之。不能運化精微。而致  
脹滿。胃受之。不得受納水穀。不化而生嘔逆。醫者  
不識。若以尋常服止吐藥療之。病與藥不相干。轉  
更傷動正氣。疾愈難治。

匠勝湯三四方名抵勝湯

赤芍

半夏

泡

澤蘭葉

人參

陳皮

各一錢

甘草

一錢

生薑

兩半

右爲麤末。每服三錢。水盞半。煎七分。去滓。熱  
服。食前。

八順理中丸。治新產血氣俱傷。五臟暴虛。腹脹。

羸乏。少氣多汗。纔產直百晷日。母日常服。壯氣  
補虛止嘔吐。

甘草

人參

白茯苓

神麴

炒各半兩

乾薑

炮一兩

砂仁

二兩

麥蘖

二兩

白朮

四兩

右爲末。蜜丸。每服三十九。食前薑湯下。或加  
半夏麴一兩。入鹽點服。

○第九十四問。產後口鼻黑氣起。又鼻衄者。何也。

答曰。陽明者。經脈之海。起於鼻。交頤中。入上齒。還

出俠口。交人中。左之右。右之左。產後氣消。血散。榮

衛不理。散亂入於諸經。却還不得。故令口鼻黑氣

女科百問

起及變鼻衄。此緣產後虛熱變生。喘疾其疾不可治。名曰胃絕肺敗。詳此一證。保慶府無方。可急服琥珀黑散。視其病人鼻黑退。衄止者。活方見第八十二問中。

○第九十五問產後喉中氣急喘者何也

答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脉中。衛行脉外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無主。獨聚於肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。難治。若產後惡露不快。敗血停凝。上熏於肺。亦令喘急。如此恒服奪命丹。血去喘急自止。

奪命丹方見

旋覆花湯治產後傷風。或風寒暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。如服奪命丹喘不定。可服此藥。

前胡

麻黃

杏仁

五味子

茯苓

甘草

赤芍

旋覆花

半夏麴

人參

玄及

各等分

右爲飲子。每服四錢。水盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。溫服。食前。

○第九十六問。產後中風者何也。

各曰。產後五七日內。強力下床。或月內傷於房室。或憂怒。撥蕩冲和。或灼灸。傷動臟腑。初眼澀口噤。

肌肉攣搐以漸腰脊筋急強直者不治此乃人作  
非偶爾中風所得本集無方三因方評之頗詳

八風湯治迷惑如醉狂言驚悸恍惚見鬼

天雄

當歸

人參

各五兩

附子

防風

大門冬

蜀椒

獨活

各四兩

烏頭

秦艽

細辛

白朮

乾薑

各三錢

山茱萸

五味子

桔梗

香白芷

柴胡

莽草

各半兩

右爲末每服二錢溫酒調下日三服以身中

覺如鍼刺者藥行也

獨活散治產後中風口噤肩項強直四肢拘急

獨活

桂心

甘草

當歸

炒一本  
律川芎

麻黃

附子炮

細辛

半兩

防風

八兩

每服四錢水酒各半盞煎七分拗開口灌之

○第九十七問產後心痛者何也

答曰心者血之主也有伏宿寒氣因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣逆冲擊於心之經脉故心痛但以大岩蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛自止若誤以爲所傷療之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳之正經則變真心痛朝發夕死夕

女科百問

下七十一

發朝死不可輕用藥如此

大岩蜜湯

熟地

當歸

獨活

吳茱萸洗

官桂

芍藥

乾薑

甘草各兩

細辛

小草

遠志苗也  
各一兩

右爲麤末每服五錢水三盞煎一盞去滓溫服不拘時

四神散治產後留血不消積聚作塊急切疼痛及心腹酸痛下痢

當歸

乾薑炮

川芎

赤芍

右為末每服三錢溫酒調下不拘時

○第九 八問產後熱悶氣上轉為脚氣者何也  
答曰產臥血虛生熱復因春秋取涼過多地之蒸  
濕因足履之所着而為脚氣其狀熱悶掣癢驚悸  
心煩嘔吐氣上皆其候也但服小續命湯三兩劑  
必愈若醫者誤用逐敗血藥攻之則血去而疾增  
益劇

小續命湯

此藥不論胎前產後或人風痲虛極

遍身疼痛或疾喘不定者宜服之加  
麝香半夏入每服水二盞候煎熟傾藥汁後  
另以麝入于內再煎一二沸食前服一二服

神効



人參

黃芩

官桂

麻黃

防已

各一兩

生薑

五兩

芎藭

芍藥

甘草

白朮

各一兩

滑子

去皮

防風

各一兩

右為咬咀每服二錢水二盞煎八分去滓溫

服不拘時

大驅風散治猝中欲死風攻身體及五臟言語

蹇澁神思冒昧或履濕氣變為脚氣此方尤妙

麻黃

二兩

芎藭

一兩

石膏

煨

肉桂

白芷

甘草

乾薑

炮

當歸

芫花

杏仁

去皮尖炒各二分

右爲咬咀每服四錢。水盞半煎六分去滓不  
以時候稍熱服。汗出爲度。  
同煎大驗。如脚氣加白朮一兩。乾木瓜一兩  
去乾薑。

○第九十九問。產後汗出多而變。屋風者何也。  
答曰。產後血虛。內理不腠密。故多汗。因遇風邪。搏  
變。瘧風。瘧者。口噤不開。背強而直。如風發癩狀。搖  
頭馬鳴。身反折。須臾十發。氣息如絕。宜速斡口灌  
之。小續命湯。稍緩卽汗出如雨。試不及者。不可  
治。三因方云。旣汗多。如何更服。黃桂等。不若大

局方大聖散亦良藥

小續命湯方見九十八問

防風湯治產後中如角弓時時反張口噤

防風

一兩

葛根

一兩

芎藭

生地

藁本

杏仁

去皮尖  
各一兩

獨活

一兩

甘草

桂心

防已

蔓荆子

各七錢半

麻黃

一兩

右爲咬咀每服四錢水盞半煎六分去滓溫

服不拘時

○第一百問產後所下過多虛極生風者何也

答曰婦人以榮血爲主因產血下太多氣無所主  
唇青肉冷汗出口膜神昏命在須臾此但虛極生  
也如此急服濟危上丹良以風藥治之則誤矣

乳香

五靈脂

硫黃

太陰玄精石

研

桑寄生

眞阿膠

卷栢

生

陳皮

各等分

右將上四味同研石器內微火炒動勿令焦  
炒了再研極細後入餘藥末用地黃汁和糊  
丸如桐子大溫酒下二十九當歸酒下丸妙  
神授散治產後一切疼痛不論大小以致危篤

者皆可服

百合

水洗

乾薑炮

甘草

當歸

川芎

各二兩

青皮

桂心

牡丹皮

白芍

陳皮

各五兩

神麩

炒

麥肉

一本麥冬壬守

秦書作麥芽

人參

各三兩

紅花

一兩半

右爲咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心去滓溫服妊婦不可服虛者去牡丹皮紅花加附子三兩

女科百問卷之下竟