

丹溪先生胎產秘書

胎產秘書目次

卷上

保胎前

保安胎論

辨胎症名

補母壽子論

補母壽子安胎飲

加味大造丸

孕婦患病勿妄論

生化湯主方

議落胎救母辨

耗氣種子方不可服辨

濟坤大造丸 治氣血弱不能成孕或數

墮胎生子不壽孕後
虛熱盜汗食少帶多

瘦胎方不可服辨

滋榮易產方

孕婦九十
兩月宜服

孕婦樽節飲食禁忌

丹溪安胎飲

治胎氣不安腹痛腰疼飲食不美孕至五六個月並宜服之

孕婦元氣不足倦怠胎氣不安身微熱減食

孕成三月經阻嘔逆惡食頭暈倦怠

孕婦常多怒氣胸腹滿悶或服順氣烏藥香砂耗藥

反滿加悶

孕婦腹痛小腹重墜

面目虛浮四肢有水氣 胎氣上攻心腹脹痛

受孕下血不止或按月去血點滴名曰漏胎

孕婦頓仆動胎下血 孕婦心驚膽怯煩悶不安

孕婦腿膝發腫氣促滿悶足指腫水出

孕婦口噤項強手足攣縮語澀痰壅不省人事

孕婦小便澁少或成淋瀝名曰子淋

孕婦形體勞苦或過食炙炒小便中帶血

孕婦臍腹作痛脹或小便淋

孕婦胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利

孕婦元氣壯盛孕後有血來幾次乃血盛故也

孕婦咳嗽屬風屬寒 孕婦咳嗽吐血

孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛

孕婦瘧疾寒多熱少 孕婦口乾不得臥

孕婦壅熱心神煩燥口舌乾渴

孕婦嘔吐不食胸中煩燥

孕婦熱病斑出赤黑色小便如血氣急欲絕落胎

孕婦熱病骨節痛不急治卽落胎

類中風症

加味益母丸

附載保產經驗仙方

保小產方

卷中

備臨盆

臨產須知 計二條

又臨產須知 計五條

臨盆頻服生化湯

七八個月預備生化湯

從權急救加參生化湯

治產下形色脫
暈或汗多脫暈

產下卽煎服生化湯

生下服生化湯三四帖

胞水來交骨未開停產

加味加參生化湯

治子宮不收及

產戶不開

加參生化湯

治產下卽患氣短症

催生如神散

霹靂奪命丸

治臨產未產時目翻口噤

面黑唇青口中沃沫

橫生逆產方

橫倒難產方

橫倒先露手足方

催生兔腦丸

產婦宜戒

計四條

產婦禁藥

計九條

產後忌物

計九條

附載製豬肚方

七八個月服之健脾助力產無崩暈之患

卷下

治產後

產後血塊痛

計二條

諸凡雜症

凡危急症

產後胞衣不下

產戶因虛感寒產門如生陰毒痛苦難近

產後脫肛或痿症或勞倦昏暗血暈

產後身熱惡寒冒風寒 產後乍寒乍熱脇痛頭痛

產後感寒心痛腹痛 產後身熱夜熱往來寒熱

每日應期寒熱類瘧 產後感寒心下痞滿

產後感寒咳嗽身熱 產後傷食

產後忿怒心膈滿悶 產後日久大便不通

產後血多或汗多小便澀少或不通

產後小便不禁或遺溺 產後泄瀉

產後失血心神失守妄言妄見

產後手足發厥血塊痛 產後痢不分紅白

產後血崩大脫 產後霍亂吐瀉

產後遍身痛 產後癰疽

產後四肢麻木 產後目痛昏熱赤腫

產後因怒吐血 產後煩燥口渴

產後卒然口噤牙緊手足攣縮類中風

娩下卽時昏暈形色脫 產後形色脫勞倦

產後血崩形色脫

產後汗多形色脫

產後氣喘似短

產後諸凡危症

產後頭痛身熱有汗

產後先寒後熱或潮熱或

夜熱每日應時發作頰瘧有汗

產後感寒身熱頭痛嗽聲重肚疼有汗

產後妄言妄見

產後足冷發厥

產後身熱有汗便閉

產後身熱脇痛潮熱

產後大便不通潮熱睡中妄言

產後有汗小便少

產後有汗泄瀉

產後有汗泄瀉危困

產後大便不通誤下

產後傷食誤消

產後忿怒誤耗氣成臃脹

產後誤消導絕穀食

產後血崩日久不止

產後神昏形脫有汗

子宮不收產戶不閉脫症

加參生化湯

治產後危急諸症雖有血塊痛隨症可服

滋榮養氣復神湯

治產後血崩汗脫氣短促妄言妄見血暈冷厥乍寒乍熱類瘧有汗

長生活命丹

治產後虛甚勞倦胃弱不思穀食脾胃虛不能轉運誤藥消耗大傷脾胃

加味歸脾湯

治產後失血過多發熱有汗睡臥不寧怔忡驚悸盜汗妄言妄見神氣不清

產後乳癰初起未成膿

乳癰已成膿

乳癰膿出後

生化止崩湯

滋榮益氣止崩湯

續氣養榮湯

治產後氣短促

寧神生化湯

治產後妄言症

滋榮益氣復神湯

血塊痛止可服

健脾消食生化湯

木香生化湯

血塊未除又受氣

健脾消食化氣湯

產後受氣傷食

加味人參養胃湯

產後一月瘧疾

滋榮益氣扶正湯

治產後寒熱有汗每日午後應期發

加減養胃湯

寒熱往來頭痛無汗類癰

加味生化湯

治產七日內發熱頭痛

養正通幽湯

產後大便閉類三陰傷寒

滋榮活絡湯

產後血少口噤項強筋痛

天麻丸

產後中風恍惚語謔四肢不利

止汗散

治產後盜汗

生津止渴益水飲

治產後口渴燥咽乾而渴或兼小便不利

加減生化湯

治產後不開背強而直身反氣息如絕

又方

治產後汗類產中風筋脈四肢急

加減生化湯

治產後泄瀉血塊未消

加味生化湯

治生產三日內完穀不化

參苓生化湯

產後血塊散可服補方

加減生化湯

治產七日內患痢

香連丸

治禁口痢

產後諸種瀉痢

計十條

生化六和湯

血塊未除日患霍亂

附子散

治產後霍亂吐瀉手足逆冷

溫中散

治產後霍亂吐瀉不止

加減生化湯

治產後逆食嘔

溫胃丁香散

治產七日外患嘔逆不食

石蓮散

治產後咳逆嘔吐心忡目眩

生津益液飲

產後血少汗多內煩作渴

健脾利水補中益氣湯

治產後水腫七日外服

五皮散

產後風濕面目虛浮四肢腫脹氣喘

加減養榮湯

治產後驚悸

養心湯

治產後心血不寧驚悸不安

安神丸

與前藥兼服

清骨丸

治產後骨蒸

保真湯

治骨蒸勞熱

加味生化湯

治產後心痛
即胃腕痛

加味生化湯

產後風冷乘
虛入腹作痛

加減生化湯

治產後
小腹痛

延胡索散

起痛散

治產後
身疼痛

養榮壯腎湯

產後感冒風
寒傷冷腰痛

茅根湯

治產後
冷熱
膏石諸淋

又方

治產後
淋水
便痛及血淋

又方

治小便
數
及遺尿

桑螵蛸散

參歸生化湯

治產後
流注
未成已成

神仙迴膿散

產後流注惡
路日久成膿

療陰蝕瘡方

治陰戶
生瘡
名曰匿瘡

治疳虫食下部及五臟方

丹溪醫案方

治大便
不通
誤下成脹

交加地黃丸

血塊半消
可服此方

產後空肚痛方

附載保赤須知

計六條

凡例

一 是書法脉取宗於丹溪先生而作者之姓氏湮沒不傳故仍顏之曰丹溪秘書

一 是書原本錯雜無次今分爲上中下三卷隸以胎前臨盆產後三種諸症欸條各從其類使病家便於檢閱並非敢作聰明而亂舊章也

一 原本草錄差訛甚多今揆其理而度其意畧易隻字度免疑義要期無失作者之初心

一 是書之刻欲使販夫牧豎家喻人曉故於病症用方圈於加減用尖圈於句讀用圓圈稍加分別俾

觀者瞭然於心目之間

一每卷末附載數條皆係經驗良方緊要事宜故錄之以補是書所不逮諒觀者未必以爲多贅

衡山周君樂善好施見是書而卽有博濟之願今梓成行世裨益良多第恐不能辨字無資搆藥者正不乏人唯望從旁見聞君子其發仁慈或指示以方或相助以藥則隨遇安全福報自有攸歸

紫陽一峯山人識

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷上 保胎前

保安胎論

凡孕婦脾胃旺而血氣充，則胎安而產正。生子精神有壽，何須用藥以調氣血安胎耶？若稟質薄而氣血衰，脾胃弱而飲食少，則虛症百出，孕成數墮，或產子不壽，是必資藥力以助母安胎壽子也。故丹溪先生册定安胎飲之良方，治孕婦元氣虛弱胎氣不安，飲食不美，或腹冷腰痛，隨症加減，皆可治胎前諸症。後

開隨症加減二十餘方。按方取用。夫精血會凝而成孕。精氣蒸胃而嘔逆。血少肝虛而愛酸物。胃氣受傷而厭飲食。若素弱嘔阻。本方量加橘半。若稟厚吐逆。再加竹瀝薑汁。下血不止名胎漏。胎漏宜涼。須加地黃生熟。小腹墜痛名胎痛。胎痛宜溫。少加帶殼砂仁。頓仆動胎下血。膠艾爲佐。怒氣冲胎上逆。木香爲使。小便短澁成淋瀝。乃子淋之症。安榮飲不應。本方宜小便帶血流於脬。是膀胱之熱。逍遙散宜入炒山梔。子癰症多面目虛浮而肢體有水氣。全生白朮堪醫。子煩症則心驚膽怯。而或時加煩悶。安胎竹葉無疑。

天仙藤散治足指縫內之出水病名子氣虛人多加
參朮羚羊角散瘕項強筋搐之拳攣病名子癘痰多
竹瀝參歸至於脾胃氣虛而胎壓尿胞則臍腹脹滿
而小便淋閉安胎飲服法宜加探吐升提有如脾胃
虛弱而轉運舒遲則飲食停滯而腹脹嘔吐安胎飲
力緩加參平胃調和又有胸滿腹脹便閉遍身浮腫
名曰胎水不利須用鯉魚湯若脾胃虛弱佐以四君
五皮又有胎氣上攻心腹脹滿作痛名曰子懸之候
必用紫蘇方若食少晡熱兼以加味逍遙柴前梅連
爲丸治骨蒸之勞熱當歸六和爲湯療盜汗而晡熱

孕成數墮因母血弱不能分蔭其胎本方須用可保
期生[婉]子無氣由母氣虛僅可滋榮於已安胎之方
必須月服若老夫得其少嬾宜寡慾以候經期若壯
陽或遇衰陰頻服藥以全胎力其人愛精重施生子
精神且壽狂陽妄洩育子清寡無神此造化必然之
理後人望嗣之當鑒大抵孕婦素弱又欲分氣血以
蔭胎則虛症自然百出是以丹溪先生助母安胎之
方以補爲主參朮黃芩乃安胎之聖藥佐以順氣清
涼務須對症而發芎歸懷地實補血之良劑佐以蘇
葉陳皮可爲常服之方也夫孕婦六月之前其胎尙

未轉運茯苓性降不宜多用黃芪肥胎豈可常加香附惟胎喘宜用無補則虛人反害砂仁可止嘔定痛多服則動血行胎歷考安胎之論不過數言安胎之方不過三四若能加減治療則可十全八九誠後學之準繩也

辨胎症名

諸家巧立病名竹葉湯以治子煩安榮散以治子淋天仙藤散治子氣之方羚羊角散醫子癩之症子腫症用全生白朮子懸症用紫蘇葉方胎前之症非止數名大抵孕婦多因血氣虧虛或由外感致生諸症

而胎不安豈胎有病母之理耶子煩淋懸腫等名乃後人巧立名色以形容胎前之症耳予隨症立治方法亦遵信丹溪先生安胎飲首方加減治之庶免悞失之尤矣

補母壽子論

凡屢產生子無氣及育而不壽皆父母元氣不足故也夫人愛精重施則髓滿骨堅又得壯盛之婦爲配則種子精神而有壽若壯陽弱婦成孕則母無血蔭胎必藉藥補以培胎元斯生子壽又若弱人衰翁必須異床寡慾藥味助神算候經期固真方施斯乾元

資始之本實坤元資生之源厚也因而和之是爲聖度若不遠惟薄則相火易動雖不交會亦暗流損壞多矣經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕後立二方實補先天之不足孕成藥宜多服以全胎元生子必精神有壽經驗多故錄以示人

補母壽子安胎飲○治屢產生子無氣或育而不壽氣血虛弱孕成不安或得孕數墮照方每月服十五帖弱甚者日服一帖大益胎而分娩易生子精神而有壽經驗良方也

人參

一錢弱者
二三錢

懷生地

自蒸熟

白朮

歸身

各二條

實黃芩

一錢

紫蘇

炙甘草

各四分

陳皮

去白

黃連

各五分

分川芎

八分

棗二枚水煎服

加減法○脾胃弱常泄瀉減地黃加蓮子

十枚帶

穀砂仁

三分

多怒而瀉再加木香

二分

○口常燥

渴加麥冬

一錢

○怔忡驚怖加棗仁益智

各一錢

圓

眼肉

十枚

加味大造丸

煎服助胎尤妙

紫河車 一具

人參

歸身

各一兩

麥冬

去心

北五

錢

味五錢肥懷生地

九兩

○如脾胃弱常瀉減地黃

加白木懷山藥

各一兩

黃柏

八錢

○久瀉不用麥冬

○煉蜜爲丸各藥爲末先將地黃門冬蒸搗如泥
次下諸藥末搗干餘下丸如棗豆大每早空心清
湯送百丸忌蘿蔔

孕婦患病勿妄論

凡孕婦患傷寒或疫症熱久皆能墮胎墮後未免增
熱因熱消陰血又繼產脫血故治者慎勿妄論傷寒
疫熱未除誤投梔子淡豉芩柏等藥或寒熱往來柴
胡不可用也或潮熱大小便閉承氣五苓等方不可
投也宜頻服生化湯時進兩帖不拘帖數服至熱退
停藥如虛脫形色脫或汗多或渴兩帖後卽加生脉

人參麥冬以防暈厥危急且生化湯有川芎性平散邪乾薑助血藥能除陰虛大熱其結燥便閉灼熱多服生化湯自然津液漸生二便通利矣若因熱而用寒劑反虛中氣

生化湯主方

當歸 八錢 川芎 三錢 炙甘草 五分 黑乾薑 四分 桃

仁 去皮尖 水二鍾煎七分和酒六七匙稍熱服

議落胎救母辨

凡孕婦患虛損潮熱骨蒸少力或崩漏或少食皆由氣血不充胎弱日久不能鼓動或胎不安上攻或跌

撲損胎不動疑於死活難辨或患熱病損胎或因誤服動胎藥及食莧菜雖血行胎逼切不可用落胎之方妄議去胎以救母也必須滋補母之氣血力健則形自然漸動卽果是胎死助血自落可保兩全無虞若攻弱血之胎胎落而母繼殞者多矣慎之慎之

耗氣種子方不可服辨

時人妄立種子方多用香附爲主大損氣血服久則少力腰疼反成痼疾絕產聞有服交加散而偶得子者因少壯婦多恚怒服此折氣諧榮倖中耳豈可視爲良方珍服圖嗣乎且無子多由少血不能攝元或

墜胎損血及經行作痛或子宮虛寒之故欲求嗣者
須合河車大造丸三四料以助陰血頭胎胞功甚奇
經行痛人丸內用牛膝一兩延胡五錢以補之得孕
數墮者孕成後每月必服丹溪安胎飲十數帖

濟坤大造丸○治氣血弱人不能攝元成孕或數墮
胎及生子不壽或孕後虛熱盜汗食少帶多並宜
服之益氣血溫子宮種子神方也

紫河車 一具

人參

一兩
五錢

麥冬

一兩
二錢

天冬

去心
牛

膝

酒浸

當歸

各一兩

懷地

自蒸

山藥

八錢

黃柏

七錢

鹽水

杜仲

姜汁炒

五味子

各五錢

去絲

瘦胎方不可服辨

時用香附枳殼等耗氣藥立斂胎易產方名。非無見也。做古方士進湖陽公主枳壳瘦胎方後遂擴增幾味耗氣藥品。巧立斂胎易產方名使人信秘而服之。惑世誣人久矣。且方士因湖陽公主居養厚而形樂食膏粱而胎肥過期難產特進此方。亦倖中耳。其胎之損元不壽不責咎也。常人豈可槩服乎。夫孕至九十兩月胎形全具。一母之氣分蔭其胎業已兩用正宜大補娘母。倍於他月。反復耗之。則母故已不暇。奚有餘血分蔭其胎。是以虧損胎元。日漸伶仃瘦弱焉。

月產... 有斂胎易產之效。反無虧元損壽之害乎。其孕母血氣虧損多至臨盆艱澁。後暈厥危症亦由所致。人不知也。卽婦人良方所載。無憂散。保氣散。神寢丸。俱不可服。

滋榮易產方。○孕婦九十兩月服之有益。

人參

一錢弱

當歸

三錢

川芎

一錢

白朮

黃芩

大腹皮

懷熟地

益母草

各二錢

茯苓

八分

甘草

陳皮

各四分

孕婦樽節飲食禁忌

凡孕婦謹守禁忌。可保安正產。若誤服降性藥多。則

胎墜小腹誤食葷菜則胎逼欲產稟弱人孕至五六個月腰痛欲墮三者並服補母壽子方以安之胎傷藥食墜下者少加升麻五分以提之腰疼欲墮一時頻服兩帖方安弱母成胎後食減困倦足腿腫者日服一帖以補之又必謹戒房勞方保正產

一丹溪安胎飲○治孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不美孕至五六個月並宜服之

人參一錢 白木 當歸 熟地各二錢 川芎 條芩

各八分 陳皮 紫蘇 甘草各四分 砂仁 三分 薑棗水

煎服

二孕婦元氣不足倦怠或胎氣不安或身微熱減食
並宜服加味安胎飲如腰疼腿痛必一日一夜服
兩帖方安

人參

二錢

白朮

二錢

當歸

熟地

各二錢

條芩

八分

陳皮

紫蘇

各四分

砂仁

甘草

各三分

○如煩渴加

麥冬

一錢

棗水煎服

三孕成後三個月內經阻嘔逆惡食或頭暈倦怠宜

服加味參橘飲

人參

一錢

白朮

當歸

各二錢

製半夏

八分

橘紅

八分

藿香

甘草

各四分

砂仁

三分

竹茹

一九

如肥人加

竹瀝

半盞

薑汁

半匙

生薑

三片

水煎服

四孕婦常多怒氣胸腹滿悶或服順氣烏藥香附砂仁耗藥反滿加悶宜服此方

人參

白朮

當歸

各二錢

川芎

條芩

各八分

陳皮

四分

木香

磨

甘草

各二分

五孕婦腹中不時作痛小腹重墜多因血氣虛弱間有兼寒者可服加味安胎飲

人參

錢五

白朮

當歸

懷地

各二錢

川芎

八分

甘

草

紫蘇

陳皮

各四分

薑水煎

○如兼寒加吳茱

莢一錢

或加乾薑

砂仁

各五分

六孕婦面目虛浮四肢有水氣多因脾胃氣虛或久

瀉所致宜健脾胃利水服全生白朮散

人參

茯苓

各一錢

白朮

當歸

各二錢

川芎

八分

大

腹皮

陳皮

各七分

紫蘇

四分

甘草

三分

水煎服

七胎氣上攻心腹脹滿作痛宜服順氣安胎飲

人參一錢

白朮

當歸

各二錢

川芎

黃芩

各八分

紫

蘇

甘草

陳皮

砂仁

各四分

薑水煎

八受孕下血不止或按月去血點滴名曰漏胎大率

多因勞因氣血虛有因喜食炙博物多宜謹房事

服補中安胎飲

人參

黃芩

各一錢

白朮

當歸

熟地

各二錢

紫蘇

白芷

各五分

甘草

四分

薑水煎

九孕婦賴仆動胎下血不止宜先服安胎飲一日兩

帖如不止加膠艾安胎飲

人參

五錢

白朮

當歸

熟地

各二錢

條芩

阿膠

各一錢

川芎

八分

甘草

陳皮

紫蘇

各四分

艾葉

片

薑水煎

○如感寒頭痛加帶鬚葱白頭四個○

腹中痛減艾葉加帶殼砂仁

四分

十孕婦心驚膽怯煩悶不安名日子煩宜服竹葉安

胎飲 方內有白朮 二錢

人參 棗仁 麥冬 各一錢 當歸 二錢 懷生地 錢五

黃芩 遠智 各八分 川芎 七分 甘草 四分 陳皮 三分

竹葉 十片 薑棗水煎。如煩渴加竹茹 一丸。○有

痰加竹瀝 酒盞七分 薑汁 半匙。○虛人加人參 二三錢。○

脾胃常洩減棗仁地黃

十一孕婦腿膝發腫氣促滿悶不舒或足指腫水出

蓋脾主四肢脾氣虛弱不能制水而發腫肺腎少

血氣滋賴而氣促滿悶諸書名日子氣治宜先服

天仙藤散不效再服補中健脾湯。○虛人服天仙

藤散必加參歸白朮補藥乃可服

加味天仙藤散○天仙藤

洗畧炒

香附

各六分

陳皮

紫蘇

各四分

甘草

三分

烏藥

七分

木瓜

一錢

薑皮

片

水煎○虛人加人參

一錢

白朮

當歸

各二錢

○

脾胃虛弱宜兼服補中益氣湯

十二字口噤項強手足攣縮言語蹇澁痰涎壅盛
不省人事不可作中風治治以羚羊角散如無痰
言語如常但見似中風症多因血燥類風切不可
一槩作中風論治誤人事也

加味羚羊角散○羚羊角

棗仁

炒

薏苡仁

各一錢

當歸 二錢

茯神

川獨活

五加皮名八分

川芎 七

分 防風 五分

木香 二分

甘草 四分

杏仁 十粒

煎○人虛加人參 一錢

○痰加竹瀝酒盞七分薑汁 半

○脾胃弱加白朮 二錢五分

十三孕婦小便澁少或成淋瀝名曰子淋宜服加味

安榮飲

人參 當歸 白朮 麥冬

各二錢

茯苓皮

通草

各一錢 甘草 四分

燈心 五分 ○若有痰侵肺金加黃

芩 七分 怒動肝火宜用山梔 二三分

十四孕婦形體勞苦或過食炙炒等物小便中帶血

宜清膀胱之火常服加味逍遙散

當歸 二錢

芍藥

柴胡

各一錢

白朮

各五錢

茯苓

丹

皮

炒山梔

各七分

炙甘草

四分

十五臍服作痛脹或小便淋此由脾胃氣虛胎壓尿

胞宜服安胎飲加二陳升提

人參 一錢

白朮

熟地

各錢五分

當歸

二錢

川芎

八分

製半夏

五分

甘草

陳皮

去白

柴胡

升麻

各四分

薑水煎

○又有空心飲鹽湯探吐則氣升斯

下經行亦一治法也。

十六孕婦胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利

宜服鯉魚湯

白朮

五錢

白茯苓

四錢

當歸

三錢

白芍

二錢

用鯉

魚一尾重二觔去鱗腸水煮加橘皮少許生薑七片用水四盞取汁一盞半加前藥四味煎七分溫服如水未盡再煎

十七孕婦元氣壯盛孕後有血來幾次乃血盛故也若不腰痛酸疼不須服藥如過慮可服安胎飲

十八孕婦咳嗽屬風屬寒宜服寧肺止咳散

天冬

各一錢

知母

各一錢

桔梗

紫蘇

甘草

各五分

○寒

嗽加杏仁

十粒

桑皮

八分

廣橘紅

四分

竹瀝

薑汁

○熱嗽加黃芩八分○虛嗽加紫苑一錢款冬六

分○夜喘多嗽加麻黃三分○虛損嗽加瓜蒌一

錢竹瀝薑汁○心胃不舒加貝母百合各一錢

又方嗽不止胎不安杏仁 甘草 紫苑 桑皮

桔梗 天冬等分水煎

十九孕婦咳嗽吐血

懷生地三錢天冬二錢紫苑 知母 白朮 麥

冬 當歸各一錢陳皮 甘草 黃芩各四分犀角磨

八分○如喘加瓜蒌仁一錢

二十孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛先服六和湯

人參

木瓜

各一錢

扁豆

二錢

茯苓

八分

半夏

七分

砂仁

五分

陳皮

藿香

甘草

各四分

杏仁

十粒

竹

茹

一丸

薑棗水煎○次服安胎飲

卽第一丹溪方

○加服六和安胎不易方

二十一孕婦瘧疾寒多熱少

安胎飲減陳皮

加半夏

七分

草果

青皮

各三分

烏梅 二个

人參

黃芩

各一錢

白朮

當歸

各二錢

紫

蘇

甘草

各四分

藿香

五分

薑水煎

二十二孕婦口乾不得臥

安胎飲

卽第一丹溪方

加麥冬

乾薑

又方黃連爲末粥飲調下一錢

二十三孕婦壅熱心神煩燥口舌乾渴

人參 知母 梔子仁炒 麥冬各一錢 甘草 條芩

各五分 瓜蒌根 犀角各八分 棗水煎○夏季加竹瀝

薑汁

二十四孕婦嘔吐不食胸中煩燥

人參 麥冬 梔子炒 知母 葛根 蘆根各一錢

竹茹一光 葱白三寸

二十五孕婦熱病斑出赤黑色小便如血氣急欲絕

落胎

梔子

黃芩

升麻

各一錢

青黛

八分

懷生地

二錢

豆豉

十粒

杏仁

十粒

石膏

錢五

葱白

七寸

二十六孕婦熱病骨節痛不急治卽落胎。

葛根

石膏

升麻

前胡

青黛各等分○痰

加竹瀝

一盞

酒

薑汁

半匙

二十七孕婦患吐衄血或因破傷失血驚患口噤項

強背直類中風症皆因失血。

安胎飲加人參

二三錢

當歸

白朮

熟地

天麻

各二錢

條芩

八分

防風

荆芥

陳皮

甘草

各四分

麥冬一錢

加味益母丸。○孕婦諸症只宜服之亦可作細丸。

益母草 四兩 白朮 一兩 條芩 八錢 煉蜜爲丸如彈

子大。清湯送下一丸孕內常服甚好。○多氣人加

木香 三錢 ○胸滿不舒暢加紫蘇陳皮 各二錢 ○弱

人加安胎飲送下

附載保產經驗仙方

不論孕婦身體強弱於臨月預先服一劑及將產
一二日前再服一二劑自然臨產快易子母安全
此方屢試屢驗甚至五六日難產者一服卽產其

功甚速。或懷孕之日胎氣不安服之即可安胎。願人共信仙方。遍傳天下功德不淺。但藥十二味。分兩不可增減。方得功奏萬全。既產之後止服益母湯。此方不必再用也。

大白當歸

酒洗

真川芎

各錢五分

黃芪

荆芥穗

各八分

兔絲子

錢四分

白芍藥

炒錢二分

厚朴

薑汁炒

真蘄

各一分

艾

各七分

枳殼

麩炒六分

川貝母

去心一錢

川羌活

甘草 各五分

薑三片。水二鍾。煎八分。空心服。

又附載保小產方

白茯苓

二兩

條芩

二兩

於白朮

一兩

土炒

延胡索

醋炒紅花一兩益母草一兩香附一兩童真沒藥一兩
三錢雜桃去梗右藥爲細末。蜜丸如桐子大。每日清晨
膠者不用。白湯送下。七丸不宜多。如胎不安。一日間可服三
五次。亦不宜連服。安後仍一日一服。皆以七丸爲
度。戒惱怒勞力。并冷水冷物。一切發氣之物。不可
用。并忌房事。無不效驗者。

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷中 備臨盆

臨產須知

凡生育之難者皆因坐草太早用力太過遂有橫生倒產之厄且臍腹疼痛之初兒身纔轉產母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿雖兒逼門而不能下但云兒已露頂非頂也乃左右頭角也亦不能出當令產母仰臥穩婆輕推兒近上以手正其頭項用力一逼卽下若兒頭之後骨偏在穀道兒頂未正當令穩

婆熱手急放穀道外。輕推兒頭正。然後用力一送卽下。

又有兒先露手足卽以鹽塗脚底。又可急搔之。并以鹽塗母腹上。又用小針放兒手足心針入一二分三四次刺之。以鹽擦之。輕輕送入。兒痛驚轉一縮當卽回順。

又臨產須知

一痛陣未緊。交骨未開。雖胞水來。不可試湯。

二產門兒頭未正。不可服催生丹。

三胞衣破胞水來。而交骨未開。宜服六料參歸湯。

四弱婦宜勉強食藥物及氣血藥

五不宜服滑胎敗血等方

臨盆之際必須頻服生化湯預燒紅鐵秤銚一個投入醋瓶安產婦枕邊再將醋煎韭菜放產婦枕邊生化湯○見胞衣一破速煎一帖候兒生下即服不論正產半產俱服兩帖

當歸 八錢 川芎 三錢 炙甘草 五分 黑乾薑 四分 棗

仁 去皮尖 水二鍾煎七分和酒六七匙稍熱服渣

留次帖并煎兩帖共三煎要在一兩時未進食之先相繼頻服則下焦血塊速化而新血驟長自無

暈厥危症。

凡孕至七八個月，照方預備川芎二兩，當歸五兩，桃仁五錢，甘草五錢，黑乾薑五錢，以待臨期取用。○若產婦勞甚，血崩形脫，卽加人參三四錢，在內頻灌無虞。○若汗多氣促，亦加人參三四錢，人參加於生化湯內，血塊無滯。

從權急救，加參生化湯。○治產下形色脫暈，或汗多脫暈。

人參

三錢

當歸

四錢

川芎

二錢

桃仁

去皮尖

黑乾

薑

薑

炙甘草

荆芥

各四分

水煎服

產下卽煎服生化湯

人參 二錢 當歸 六錢 川芎 三錢 黑薑 炙草 各四分

桃仁

十粒去皮尖搗碎

○如下血多加炒黑荆芥 八分 ○

汗多加麻黃根 一錢 煎好加無灰好酒四茶匙和

藥內止服二帖

凡兒生下卽服生化湯三四帖。外烘衣煖塊痛處。卽散如感寒。食冷物冷茶水。又失煖腹。則塊凝停腹。癢至半月外不消。或如腫毒高起寸許。或身熱減食。倦甚。必用生化湯加三稜蓬朮肉桂等攻補並治。其塊自消矣。如虛甚少。食泄瀉。只服一帖定痛。

且健脾胃進食止瀉。然後服消塊湯。

當歸 三錢 川芎 一錢

黑薑

炙草

各四分

桃仁

十粒去尖

三稜

醋炒

蓬朮

醋炒

延胡

肉桂

各六分

水煎服

臨盆胞水來。而交骨未開。停產宜服大料。加參芎歸

湯。以助血氣。血氣旺則自然即開分娩。

人參 三錢 當歸 一兩 川芎 四錢 益母草 一錢 甘草

四分 水煎服。連服二三帖。如有合成。益母丸用前

四味煎湯送化一丸。如兩帖服後不開。加靈板

一个 亂髮

一丸燒灰存性。生母髮不可用。

加味加參生化湯。治子宮不收及產戶不開。

人參 當歸 白朮 黃芪 各二錢 川芎 一錢 甘草

四分 升麻 八分 五味 十粒 酸以收之 子宮不收再

加半夏 八分 五味 十五粒 醋炒芍藥 八分 補而升之

二症皆元氣不足之甚 媿下患產血塊

加參生化湯○治產下卽患氣短症有血塊痛不加

芪朮

人參 川芎 各二錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 五分

桃仁 十粒 棗二枚 水煎服 連服二帖 三煎

催生如神散○須候兒頭正頂產門可服未正先服

恐催逼逆

銅底煤 香白芷 滑白等分 爲末芎歸湯調服
二錢

霹靂奪命丸○治臨產未產時目翻口噤面黑唇青
口中沃沫母子命在旦夕若兩頰微紅子死母活

急宜用此方

蛇退

一條煨要全皮

蠶故紙

燒灰

髮灰

各一錢

乳香

五分

黑

鉛

二錢五分

水銀

七分半

右藥爲末用雄猪心血和丸如

桐子大金箔七片爲衣每服二錢倒流水灌下

治橫生逆產方

伏龍肝

灶中心土多年者佳紅色方妙

研細末

酒調下一錢其藥

兒頭戴出

治橫倒難產方

蛇退

一條全者蠶故紙 一張

入新瓦瓶中。鹽泥固口。燒

存性研末乳香一錢煎湯調下二服卽出

治橫倒先露手足方

阿膠

蛤粉炒成珠

滑石

各一兩

黃葵子

一合

每服四錢水

二鍾煎服。又爲末溫酒調入蜜和勻服之。

又方以草麻子一粒研爛貼產婦脚底產下卽去

藥粒。

催生兔腦丸。治生理不順橫逆難產神效。

臘月兔腦髓

去膜研如泥

母丁香

取末

乳香

一錢

另研將兔

腦和藥爲丸如芡實大。硃砂爲衣。乾油紙包。蜜封。酒送。一丸男左女右。兒手握藥。媿下。

產婦宜戒

- 一戒食鹽。鹽止血。令人無乳。且發嗽難治。
- 一戒勉強起居。及暴喜怒。喜則氣散。怒則氣逆。
- 一戒貪涼。食冷物。夏月用扇。坐臥當風。
- 一戒七日內沐浴梳頭。脫換裏衣。

產婦禁藥

一產後氣不順。

禁枳實厚朴耗藥。

二產後傷飲食

禁枳實大黃蓬稜

三產後身熱

禁黃連梔柏

四產後七日內

禁地黃芍藥

五產後血塊痛

禁牛膝稜蓬蘇木

六產後大便不通

禁大黃芒硝

七濟坤丸

損氣血不可服

八瘦胎丸

損氣血不可服

九產寶峻藥方

不可服

產後忌物

一果忌梨藕橘柑柿西瓜

停塊作痛

二食忌涼粉菜豆冷粥麩蕎麥生冷停塊作痛。

三肉忌鶩犬猪牛首肉。

停塊痛恐犯藥。

四菜忌莧菜生菜苔菜。

停塊痛。

五忌砂糖酒。

損新血。

六忌獨煎山查湯。

損新血。

七忌多食胡椒艾酒。

行血致崩。

八忌生薑酒。

發汗行血。

九忌濃茶汁。

性寒停塊痛。

附載猪肚方

人參一錢 蓮肉

去皮心 一兩

白扁豆

去皮 一兩

右用雄猪肚一個洗淨將人參等共入肚中用線
紮口又將大砂礪一個底用碎磁碗片鋪一皮防
水乾煮焦之患扣水慢火煮爛孕婦七八個月每
月服二三個連肚湯藥盡數吃完大健脾胃决不
崩暈精神更旺。

丹溪先生胎產秘書

紫陽一峯山人校閱

卷下 治產後

凡產後血塊。乃孕婦餘血之所積也。因產婦送兒送
胞勞倦無力。或調護之際。腹欠溫煖。故致血塊作痛。
日久方散。勿輕服峻削藥。及飲薑椒艾酒。恐傷太熱。
則新血未免損失多矣。宜頻服生化湯。以助血行血。
外用熱衣以煖腹。

凡產後血塊痛。宜服生化湯爲主。血塊痛散後。加參
生化湯爲主。

凡諸雜症。必用上二方爲主。如消食散氣治痰止嗽。等藥爲佐使。庶無失誤。如血塊痛。芪朮地黃不可用也。

凡危急症。必須頻灌藥。可保無虞。少緩難甦。將絕神氣。加參生化湯。神治危急產症。病家無疑。生化湯乃治產神方。妙在頻服。

一產後胞衣不下。宜溫服生化湯兩帖。初煎就送益母丸一粒。次煎又送一粒。外用烘熱衣服。煖產婦腹。慎不可冬月夜坐桶上。及人身上。守候胞下。嚴寒恐損害產母。必須上床。被蓋和煖。兼服生化湯。

方保無失。

二產後起居太早。產戶因虛感寒。產門如生陰毒。痛甚苦楚。手不可近。衣被雜着。宜急用驅風定痛方。慎勿悞爲生癰。服敗毒散等方。

當歸

懷生地

各二錢

川芎

一錢

獨活

防風

肉

桂 茯苓

荆芥

各五分

棗水煎

三產後勞傷。氣血兩虛。及稟弱少食。患脫肛症。或有痿症。宜大補。或勞倦昏暗。血暈。宜頻服生化湯。幾帖。服至產母精神乃止。○如血暈。形色脫。或汗多。脫宜加人參三四錢。

四產後身熱惡寒雖明知感冒風寒只宜速進生化湯三四帖服至熱退痛除乃止。○如三四帖後頭痛如破加帶鬚葱頭四五個或用葱放鴛湯中亦可。

五產後乍寒乍熱脇痛或頭痛宜服生化湯三四帖。○如未除加桂枝七八分以散寒塊再用木香磨一分。

六產後感寒上攻則心痛下攻則腹痛且血塊又痛宜服生化湯加桂枝一錢以定痛。○如二帖未止痛再加吳茱萸一錢或加老薑三片必用在生化

湯中助血。若用熱藥幾味攻寒，其痛雖止，則未免新血虧損多矣。

七產後身熱，或夜熱，或兼寒熱往來，並宜服生化湯幾帖，則熱自退矣。

八產後寒熱往來，每日應期而發，類瘧，宜服生化湯幾帖，則寒熱自除。○如汗多人虛，可服加參生化湯。

九產後感寒，心下痞滿，宜服生化湯加陳皮、桔梗、白豆蔻各五分、木香一分。

一產後感寒，咳嗽，或身熱，宜服生化湯加知母、天

冬各一錢杏仁十粒甘草四分桔梗五分○痰加橘

紅四分花粉八分○如有汗可服加參生化湯

十一產後傷食宜服生化湯加神麩一錢麥芽五分

以消飯麩○傷寒傷食加吳茱萸一錢桂枝五分

○傷寒食脇痛加肉桂七分○傷肉食加砂仁四分

分山查五分

十二產後忿怒心膈滿悶宜服生化湯加木香磨用

二分

十三產後日久大便不通宜服生化湯加肉蓯蓉二

錢日服二三帖以助血血旺自通○另研芝蔴三

合爲末和米一升作粥。三餐食之。卽愈。

十四產後血多或汗多小便澁少或不通宜服生化湯加生脉散人參麥冬五味以通之。○如服藥不通用葱頭十個線縛切一指厚致臍上以艾火熨之則無不通矣。

十五產後氣血虛感寒小便多不禁或多遺溺宜服生化湯加鹽炒益智六分。

十六產後泄瀉宜先服生化湯加茯苓一錢澤瀉七分。○再將蓮子同糯米粳米各等分煮粥食。○如泄瀉形昏倦卽服加參生化湯。

十七產後失血心神失守妄言妄見宜服生化湯加

茯苓 棗仁 遠志 栝子仁 麥冬 各一錢 橘紅

四分

○如汗虛脫卽服加參生化湯

十八產後手足發厥血塊又痛宜服生化湯服兩三

帖後可服加參生化湯

十九產後痢不分紅白宜服生化湯減黑薑加木香

三分連服二三帖則血塊與痢積推盪盡矣

二十產後血崩大脫宜類服生化湯加荆芥穗一錢

服十餘帖○如形色脫服加參生化湯

二十一產後霍亂吐瀉多因虛中感寒宜服生化湯

加砂仁 茯苓 藿香 生薑

二十二產後遍身痛多是血氣虛滯宜服生化湯加肉桂八分韭白二十根

二十三產後癰疽宜服生化湯加連翹天花粉各一錢

二十四產後四肢麻木血虛宜服生化湯加浮萍○如血崩脫而麻木可服加參生化湯。

二十五產後目痛昏熱赤腫宜服生化湯加荆芥。

二十六產後因怒或偶吐血宜服生化湯減川芎加當歸去尾荆芥一錢犀角八分

二于七產後卒然口噤牙緊手足攣縮類中風宜服
生化湯加天麻 羌活 防風 薑一片

二十八產後煩燥口渴宜服生化湯加生脉散

產後有五急症並宜服倍參生化湯加減治之

人參三四錢 當歸 五錢 川芎 二錢 炙甘草 四分 桃仁

去皮尖十粒 棗二枚

一婉下即時昏暈形色脫宜倍參生化湯加荆芥

穗 五分 人參 倍加

二產後形色脫勞倦宜服倍參生化湯加人參

用黃芪 一錢 熟地 三錢 熟附 四分 ○血塊痛芪地

不可用

三產後血崩形色脫宜倍參生化湯加荆芥穗四

分人參倍加○如血塊痛可服升舉止崩神烏湯

人參四錢白朮當歸熟地各二錢黃芪黃連

升麻炙草荆芥穗陳皮白芷各四分熟附

三分棗水煎

四產後汗多形色脫宜倍參生化湯減黑薑加麻

黃根棗仁黃芪各一錢熟地三錢○血塊痛去

止芪地不可用加浮小麥五十粒防風八分

五產後氣喘似短宜倍參生化湯加人參二錢沉

香磨一分 陳皮一分 香附各三分

以上五症兼見雜症照後加減

渴加麥冬一錢 五味五粒 ○瀉加白茯苓一錢 澤

瀉八分 ○大便燥結加肉苁蓉一錢半 ○驚悸加棗

仁益智各一分 ○傷麪飯加神麪麥芽各五分 ○小便

不禁加益智六分 ○寒嗽加杏仁十粒 桂枝五分

○傷肉食加砂仁山查各五分 ○痰加花粉八分 橘

紅四分 ○虛嗽加天冬一錢 瓜蒌仁八分 ○食少

加白朮二錢 土炒 ○氣虛痰加竹瀝半酒 薑汁少許

一凡產後危症並用加參生化湯為主對症加減

人參 當歸各二錢 川芎 一錢 黑薑 甘草各四分 桃

仁去皮尖 十粒

二產後頭痛身熱有汗宜加參生化湯加黃芪 麻

黃根 地骨皮各一錢 防風 白芷 羌活各四分 棗

水煎

三產後感寒身熱頭痛嗽聲重肚疼有汗宜加味生

化湯兼雜症照後開 人參 天花粉 麻黃根

地骨皮各一錢 桔梗四分 ○如頭痛加帶鬚葱頭五

個

四產後先寒後熱或潮熱或夜熱每日應時發作類

瘡有汗宜加味生化湯加軟柴胡八分青皮一錢

烏梅二個○汗多加麻黃根一錢○汗多不足加

熟地二錢○食少加黃芪白木各錢陳皮四分

五產後妄言妄見宜加味生化湯加棗仁茯神

遠智柏子仁麥冬各一錢橘紅四分

六產後足冷發厥一日而三四厥去宜倍參生化湯

加白朮一錢熟地二錢熟附四分

七產後身熱有汗大便不通宜加參生化湯加麻黃

根地骨皮麻仁肉蓯蓉各一錢

八產後身熱脇痛潮熱宜加參生化湯加麻黃根

黃芪

各一錢

桔梗

七分

柴胡

八分

○臍下痛止可加

熟地

二錢

九產後大便不通潮熱睡中妄言宜加參生化湯加

棗仁

麻黃根

地骨皮

各一錢

十產後有汗小便少宜加參生化湯加麻黃根 麥

冬

葛根

五味

黃芪

十一產後有汗泄瀉宜加味生化湯加肉果一個蓮

子

十粒

麻黃根

等分

十二產後有汗泄瀉危困宜用丹溪醫案大補方

十三產後大便不通誤服大黃方

十四產後傷食誤服消導方。

十五產後忿怒誤服耗氣方。致成臃脹。

以上三症。誤下誤消。誤耗宜用丹溪醫案方。

人參 白木 當歸各三錢 川芎 白芍 茯苓各

錢澤瀉八分 厚朴 柴蘇各五分 陳皮四分 大腹皮

蘿蔔子各六分 木香三分 ○傷飯麪加神麩麥芽○

傷肉食加山查砂仁○傷怒氣加木香

十六產後傷食痛或脇痛誤服消導方多絕穀食獨

用飯鍋焦爲粉。再用人參三錢薑一片煎湯調飯

焦粉飲下。漸漸引開胃氣。

十七產後血崩日久不止宜服升舉大補方

人參 白朮 當歸 熟地 川芎 黃芪 麥

冬各二錢 陳皮 甘草各四分 黃連 黃柏各三分 荆芥

羌活 防風 升麻 白芷各五分 水煎服

十八子宮不收產戶不閉脫症並宜服倍參生化湯。

十九產後神昏形脫有汗方內宜減乾薑忌薑葱

以上十九症並以補氣爲主問無血塊痛可服治

產症方

加參生化湯治產後危急諸症雖有血塊可服隨症

可服如危症參可加至五六錢。

分娩下血崩暈去宜服加參生化湯。

分娩下汗多倦甚宜服加參生化湯加參三四錢。

分娩下無力送胞倦甚宜服加參生化湯。

胎前素弱產後見虛宜服加參生化湯。

胎前泄瀉產後倦怠宜服加參生化湯加參四五

錢。

汗多加麻黃根黃芪各一錢防風五分○足厥冷加

人參四錢五錢熟附五分○氣短促加人參三四錢○渴

加麥冬一錢五味十粒○大便實加肉蓯蓉一錢

○煩燥加竹茹一丸○寒嗽加杏仁十粒桔梗五

分○痰加天花粉八分竹瀝半盞薑汁三匙

滋榮養氣復神湯○治產後血崩症汗脫症氣

短促症妄言妄見症血暈症冷厥症俱用

此方若真感寒頭痛發熱惡寒此方不可用

若產後乍寒乍熱類瘧有汗問無血塊痛決宜用

此方

人參看勢加減當歸三錢川芎白木黃芪麥冬

棗仁各一錢生地八分炙草陳皮各四分五味十粒

棗二枚水煎後開加減法

加減法○手足厥冷加黑薑五分或熟附四分○

妄言妄見加柏子仁益智

錢各一

○暈厥氣短喘促

加黑薑熟附

各四分

○口氣冷小便不禁加益智

炒

一錢

○汗多加麻黃根

一錢

浮小麥

一撮

○大便

日久不通加肉蓯蓉

八錢

麻仁

二錢

○泄瀉加白

茯苓

茯苓

錢半

肉果

一個

○痰加竹瀝薑汁

○傷麩飯

加神麩

一錢

麥芽

一錢

○傷肉食加炒仁山查

各

五分

炒

炒

炒

長生活命丹○獨參湯古今通用加鍋焦粉引開胃

氣產后虛甚勞倦胃弱不思穀食脾虛不能轉運

因傷食誤藥消導因受氣悞藥耗散大傷脾胃愈

消耗愈不食穀必用此方必用此方。

人參

二錢

生薑

三片

麥芽

五分

蓮子

八枚

飯鍋焦

研粉二

三蓋。用水煎參、薑、蓮、麥四味至七八分，取汁留

渣再煎。先用藥汁一酒盞調鍋焦粉二三匙。與病人漸飲。少頃再用藥汁送粉三四匙。引動胃氣。漸漸思穀。弱人三四次就進穀矣。不可遽吃厚味及飯。恐胃人虛不能容藥。確宜新舊確有藥氣。聞之要吐。○一產後悞藥消食損胃絕食。宜服此方。○一產後悞藥耗氣損胃絕穀。宜服此方。○一老年傷食。服消導藥不進食。此方助補。○一氣血虛弱。

人服此漸漸加食○一胃氣久敗雖納穀良人吐
出如翻胃宜服此方。

加味歸脾湯○治產後失血過多發熱有汗睡臥不
安或怔忡驚悸盜汗或妄言妄見神氣不清並宜
服之

人參

當歸

熟地

各二錢

白朮

茯神

益智

炒

黃芪

棗仁

炒麥冬

各一錢

木香

三分

炙草

陳皮

各四分圓眼肉

八枚

產後乳癰初起未成膿服瓜蒌乳沒散胎前生癰亦用此方。

瓜蒌

一個連皮

當歸

金銀花

各三錢

白芷

一錢青

皮 乳香 沒藥 甘草 各五分 水煎服

乳癰已成膿服神仙迴膿散○膿從大便出。

大黃 三錢四分 白芷 七錢二分 乳香 沒藥 沉香 各一分 穿

山甲 蛤粉炒 右爲末。乳香另研。每服三錢。用人參

二錢煎湯調服。

乳癰膿出後服十全大補湯。

人參 當歸 各三錢 白朮 熟地 各二錢 茯苓 川芎

黃芪 各一錢 炙草 九分 蓮肉 八粒 水煎服○泄瀉加

蓮子 十粒 肉果 一個 煨 ○渴加麥冬一錢 五味 十粒

生化止崩湯○治產後血崩○如半月外崩宜服升

舉大補湯

當歸

四錢
去尾

川芎

一錢

黑薑

四分

炙草

荆芥

各五
分

桃仁

十粒

棗水煎

○忌薑椒熱物生冷

○鮮紅血

大來加

荆芥穗

白朮

各五
分

○血塊形脫汗多氣促

俱加人參

三錢

○如紫血乃當去者

敗血非崩

滋榮益氣止崩湯

人參

川芎

麥冬

黃芪

各一
錢

當歸

四錢

熟地

白朮

各二
錢

陳皮

炙草

白芷

荆芥穗

升麻

各四
分

黃連

三分

棗水煎

○如老年人血崩宜用升

舉大補湯

原缺

人參 當歸各二錢 川芎 一錢 黑薑 炙草各四錢

問無血塊痛加白木 二錢 陳皮 三分 傷麩飯加

神麩 麥芽 傷肉食加山查砂仁 寒停脇下

作痛加桂枝 八分

加味人參養胃湯 治產後及一月癱疾宜用此方。

兼服參朮膏。

人參 錢半 白朮 當歸各二錢 茯苓 半夏各八分 草

果 三分 甘草 青皮各四分 藿香 五分 烏梅 二個

參朮膏 用於白朮一觔。淨切片。土炒人參一兩。

用水六碗。煎取碗半。如法再煎三次。去渣。其六碗。

再煎至一碗每日半酒盞白湯送下

滋榮益氣扶正湯○治產後寒熱有汗每日午後應

期發

人參

熟地

各二錢

當歸

三錢

川芎

黃芪

麥冬

麻黃根

各一錢

白朮

錢半

炙草

五分

陳皮

去白四分

○夜

服六味地黃丸七八十丸白湯送下

加減養胃湯○治產後寒熱往來頭痛無汗類瘧

人參

錢半

當歸

二錢

川芎

茯苓

蒼朮

各一錢

半

夏

八分

藿香

甘草

橘紅

各四分

薑水煎

○痰加

竹瀝薑汁半夏麩

○人弱加河車丸○產後久瘧

無汗不愈○兼服參朮膏以助藥力

加味生化湯○治產七日內發熱頭痛症

當歸 三錢 川芎 錢半 甘草 黑薑 羌活 防風

各四分 桃仁 十粒 ○服兩帖後頭痛身熱不除加白

芷 八分 細辛 四分 ○若頭痛如破加帶鬚葱頭五

個○虛加人參 一錢

養正通幽湯○治產後大便閉類三陰傷寒症

當歸 六錢 川芎 二錢 甘草 五分 桃仁 十五粒 肉苳蓉

酒洗去甲 陳皮 四分 麻仁 二錢 ○如汗多便實加

一錢 人參 黃芪 麻黃根 各二錢 ○口燥加人參 麥

冬

各一錢

○腹滿液乾便實加人參

二錢

麥冬

肉

苳容

各一錢

枳殼

六分

○汗出譫語便實乃氣血並

竭神衰心主失守宜養榮安神加茯神 棗仁

遠志

柏子仁

黃芪

肉苳容

各一錢

人參

白

朮

各二錢

以上大便燥結症並宜大料歸芎補血其人參

不可少非歸芎數觔難取功效

滋榮活絡湯○治產後血少口噤項強筋搐類中風

症

人參

二三錢

當歸

三錢

熟地

二錢

川芎

錢半

黃芪

茯神 天麻 麥冬各一錢 甘草 陳皮 荆芥

防風 羌活各四分 黃連薑汁炒三分 ○如有雜症另加。

天麻丸 ○治產後中風恍惚語澁四肢不利

人參 茯神 棗仁 遠志 山藥 麥冬 柏

子仁各一兩 當歸二兩 天麻 防風各五錢 川芎 羌

活各七錢 細辛 四錢 南星麩 半夏麩 石菖蒲各入

錢 蜜丸辰砂爲衣

止汗散 ○治產後盜汗

人參二錢 當歸 熟地各三錢 牡蠣一錢 浮小麥一

大撮 麻黃根錢半

生津止渴益水飲○治產後口燥咽乾而渴或兼小便不利

人參

熟地

麥冬

葛根

各一錢

當歸

三錢

川芎

錢半

五味子

十粒

茯苓

八分

甘草

升麻

各五分

加

減同前

加減生化湯○治產後多汗出而變類症症口噤不開背強而直身反氣息如絕

人參

當歸

川芎

甘草

麻黃根

防風

桂枝

羌活

天麻

羚羊角

附子

又方○治產後汗類症中風筋脉四肢攣急

川芎 當歸 羌活 防風 棗仁

加減生化湯○治產後泄瀉血塊未消宜服此方。

人參 三錢 當歸 白朮 各二錢 川芎 一錢 茯苓 錢半

澤瀉 八分 黑薑 四分 炙草 陳皮 各五分 肉果 一個

加味生化湯○治生產三日內完穀不化胎前素弱

人患此症。

當歸 四錢 川芎 益智 各一錢 茯苓 錢半 炙草 五分

黑薑 四分 桃仁 十粒

參苓生化湯○治產後血塊散可服補方。

人參 川芎 茯苓 益智 炒 白芍 各一錢 當歸 三

錢 黑薑 四分 炙草 五分 蓮子 八枚 肉果 一個 麩 一個 ○瀉

水多加澤瀉 木通 各八分

加減生化湯 ○治產七日內患痢

當歸 五錢 川芎 二錢 茯苓 一錢 炙草 五分 木香 磨

三分 桃仁 十二粒 ○紅痢腹痛加砂仁 六分

香連丸 ○治禁口痢 木香 黃連 爲末 加蓮肉粉 爲丸 凡產三四日後 血塊散 痢積少 減照後開治法。

一產後久瀉 元氣下陷 大便不禁 肛門如脫

六君子湯 加木香 四分 肉果 一個 黑薑 五分

一產後瀉痢 黃色 乃脾土真氣虛

補中益氣湯加木香

四分

肉果

一個
麩煨

三產後傷麩飯瀉痢

加參生化湯加神麩

麥芽

四產後傷肉食瀉痢

加參生化湯加山查

砂仁

五產後胃氣虛弱瀉痢完穀不化當溫助胃氣

六君子湯加木香

四分

肉果

一個
麩煨

六產後胃氣虛脾氣弱瀉痢四肢浮腫

六君子湯加五皮散

七產後泄痢無後重但日久不止

六君子湯加木香 肉果

八產後赤白痢臍下氣痛

當歸 厚朴 黃連 甘草 肉果

九產後久痢屬血虛

四物湯加荆芥 人參

十產後痢羸瘦心腹絞痛

薤白 石榴皮 當歸 黃連 地榆○腹痛不

止用溫湯醮布煖腹則緩

生化六和湯○治產後血塊未除日患霍亂

當歸 四錢 川芎 二錢 茯苓 一錢 黑薑 炙草 陳

皮

藿香

各四分

薑水煎

附子散○治產後霍亂吐瀉手足逆冷問無血塊可
用此方。

人參 一錢

當歸

白朮

各二錢

附子

五分

陳皮

黑

薑 丁香

甘草

各四分

右爲細末。粥飲調下二錢。

又溫中散○治產後霍亂吐瀉不止無塊痛可服。

人參

當歸

白朮

厚朴

黑薑

茯苓

草

豆豉

薑水煎○產七日用六和湯下。

加減生化湯○治產後嘔逆不食

當歸

三錢

川芎

錢半

黑薑

炙草

砂仁

各五分

薑

水煎

溫胃丁香散。治產后七日外患嘔逆不食。

人參一錢 當歸 白朮各二錢 乾薑 丁香各四分 陳

皮 甘草 前胡 藿香各五分 薑水煎

石蓮散。治產後咳逆嘔吐。心忡目眩。

石蓮子去殼 白茯苓一兩 丁香五錢 共爲細末。米

飲調服。

生津益液飲。治產後血少汗多。內煩作渴。不生津

液。

人參 麥冬 茯苓各一錢 大棗 小麥 竹葉

甘草 括蕪根○大渴不止加蘆根

健脾利水補中益氣湯○治產後水腫七日用

人參

白木

各二錢

茯苓

芍藥

各一錢

木瓜

八分

陳

皮五分

紫蘇

木通

大腹皮

蒼朮

厚朴

各

四分

○大便不通加郁李仁

麝仁

各一錢

五皮散○治產後風濕面目虛浮四肢腫脹氣喘

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮

各一錢

水煎服

加減養榮湯○治產後驚悸塊消痛止宜服此方。

人參

白朮

茯神

棗仁

麥冬

遠志

黃

芪

各一錢

當歸

川芎

各二錢

陳皮

炙草

各四分

圓眼

肉八枚

水煎服○如血塊未消宜服生化湯加木

香減川芎麥冬卽歸脾湯

養心湯○治產後心血不調驚悸不安

人參

錢半

當歸

棗仁

各二錢

黃芪

麥冬

柏子

仁

各一錢

茯神

川芎

遠志

各八分

五味

十粒

炙草

四分

薑水煎

安神丸○與前藥兼服

黃連

酒炒

懷生地

歸身

各二錢

炙草

五分

右爲細

末蒸餅糊爲丸如菉豆大硃砂二錢爲衣每服四

十九。

清骨丸○治產後骨蒸作湯更效速。卽柴連梅丸。

柴胡

前胡

烏梅

去核

胡黃連

各二錢

猪脊髓

一

條猪膽

一個

韭菜白

長十二寸

根上四味藥爲末另將

髓膽韭白同搗如泥入童便一盞熬如稀糊入藥

末和勻再搗爲丸如棗豆大每服白湯送下。

保真湯○治骨蒸勞熱亦可作丸服。

人參

白朮

茯苓

知母

熟地

生地

麥

冬 白芍

枸杞

各一錢

黃芪

川芎

骨皮

各八分

當歸

天冬

各二錢

甘草

四分

黃柏

六分

五味

十粒

棗二枚水煎

加味生化湯○治產後心痛卽胃腕痛俗呼心痛如

真心痛卽死不救

當歸 三錢

川芎 一錢

炙草

黑薑

各五分

肉桂

八分

吳茱萸

七分

○三帖後加茱萸○傷寒物加茱萸

○傷肉食加山查砂仁○傷麪飯加神麪麥芽○

大便不通加肉蓯蓉

二錢

加味生化湯○治產後風冷乘虛八腹作痛○如有

血塊痛只服生化湯調一笑散鹿角灰散塊消痛

自止

當歸 四錢 川芎 二錢 黑薑 四分 炙草 五分 桃仁 十粒 桂枝 七分 ○如血塊痛未散加一笑散 二錢 延胡索末 二錢

加減生化湯 ○治產後小腹痛

當歸 三錢 川芎 一錢 黑薑 炙草 各四分 桃仁 十粒

○問有血塊痛本方調延胡索散一錢 ○亦治寒氣痛如痛可按屬虛加熟地三錢

延胡索散

延胡索 一錢 肉桂 一錢 共爲細末

產後虛勞指節痛不止汗不止

人參 當歸 黃芪 生薑 淡豉 槿白 猪
腎二個 先將猪腎水煮熟取汁二盞煎藥八分。温
服。

趁痛散○治產後遍身疼痛

當歸 黃芪 白朮 牛膝 獨活 肉桂 甘
草 韭白 薑水煎

養榮壯腎湯○治產後感冒風寒傷冷腰痛不可轉
動。

當歸 二錢 獨活 桂心 川芎 杜仲 續斷

桑寄生 各八分 防風 四分 生薑三片水煎服○兩帖

後不止痛屬腎虛加熟地三錢。

茅根湯○治產後冷熱膏石諸淋

白茅根 一兩 人參 葵子 桃膠 各錢半 瞿麥 白

茯苓 名五 滑石 甘草 各四分 紫貝 六分 石首魚頭

四個 生薑燈心水煎入齒末空心服。

又方○治產後淋水便痛及血淋

白茅根 瞿麥 車前子 冬葵子 通草 鯉

魚齒 百個 水煎入齒末空心服。

又方○治小便數或遺尿

益智仁 三十七枚 炒研爲末米飲下二錢

又方○桑螵蛸散

桑螵蛸

炒三十個

人參

黃芪

鹿茸

牡蠣

赤

石脂

各二兩

爲末空心粥飲下二錢

參歸生化湯○治產後流注未成自消已成自潰

人參

馬蹄香

各二錢當歸

川芎

黃芪

錢半

肉桂

六分

甘草

五分

○若漫腫微痛屬形氣病形

氣俱不足者最難治○未成膿或已成膿不潰氣

血虛也宜服人參湯○增寒惡熱虛也宜服十全

大補湯○日晡內熱四物加參朮丹皮○嘔逆胃

氣虛也六君子湯加黑薑○食少體倦脾氣虛也

補中益氣湯加升麻○四肢逆冷小便頻數腎虛也補中益氣湯加益智一錢○用葱一握炙熱搗爛作餅於腫處用布二三層以熨斗熨之初起可消神仙迴膿散○治產後流注惡露日久成膿用此方宣通其膿方見乳癰症○若其人未補血氣未旺此方又不可用

千金療陰蝕瘡方○治婦人陰戶生瘡名曰懸瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓

川芎 當歸 地榆 甘草 芍藥 以水五升煎二升去渣洗患處日三夜一

又方

蒲黃 一升 水銀 一兩 二味研勻搽之。

又方○治疔疔食下部及五臟

取桃東南枝三七條。輕打頭使散。以綿縛之。又研石硫黃爲末。將綿纏桃枝。撚轉之。令藥末少厚。再截一短竹筒。先納下部中。以所撚藥桃枝。點着入筒中薰之。

丹溪醫案方○治產後大便不通。候下成臌脹。

人參 三錢

當歸

白木

各二錢

茯苓

白芍

木通

各一錢

澤瀉 八分

海金沙

六分

薤白

陳皮

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

大腹皮

各五分

蘿蔔子

四分

木香

二分

薑水煎

交加地黃丸○治產後血塊服湯藥已半消可服此方。

人參

當歸

川芎

各七錢

白芍

沒藥

各五錢

木香

二錢

香附

一兩醋炒

懷生地

四兩

煎六分

老生薑

四兩

搗爛

取汁

先將地黃汁浸薑渣

再將薑汁浸地黃渣

酒杯

汁盡晒乾焙燥

同諸藥爲末

醋糊爲丸

如菉豆大

空

心溫酒送下四五十九。

產後空肚痛方

歸身

五錢

川芎

二錢

乾薑

錢半炒半

肉桂

一錢

桃

仁八粒去皮尖搗碎紅花七分水煎服。

保赤須知附載

一兒初生不可洗浴。保全真元。此法第一。或將頭面洗淨。周身以軟帛抹之可也。卽三朝亦不必浴。冬寒尤爲不宜。恐浴時風入臍中。臍風多由此起。

一斷臍帶必以蘄艾爲燃。香油浸濕。薰燒臍帶。令焦方斷。其束臍須用軟帛厚綿裹束。日開視之。勿令兒尿浸濕。此預防臍風第一要緊事也。

一兒生次日。口中上腭有白泡。及馬牙。卽以銀簪挑破。京墨搽之。所挑白點。必須刮出。勿落入喉中。

一兒濕衣不可夜露。恐鳥糞水投衣能生毒瘡。難治。
一胞衣瓶忌安太歲方。三殺方。其器稱大瓶穩者。
一滿月。古以一月爲小滿月。兩月爲大滿月。此兩月
內。不暴怒。少勞碌。禁淫慾。終身無病。且多生子。