

嬰
童
百
問

嬰童百問卷之二

肺臟 第十一 問

脾盛復有冷風。胸滿短氣。氣急喘嗽上氣喎。

復發散風冷。散肺瀉白散主之。肺只傷寒。則不胸滿。
肺熱則手掐着眼鼻而甘桔湯主之。肺虛熱唇深紅
色。治之散肺虛熱。少服瀉白散。肺臟怯。唇白色。當補
肺阿膠散主之。若悶亂氣粗喘促。哽氣者難治。肺虛
損故也。肺病久。則虛而唇白。脾者肺之母也。母子
皆虛。不能相營。故曰怯。肺主唇。白而光澤者吉。白如

枯骨者死。肺病春見肺臟勝肝。當補腎肝。治肺臟。肝
怯者受病也。補肝腎。地黃丸。治肺。瀉白散。主之。肺病
見春旺。肺勝肝。當瀉肺。輕者肺病退。重者目淡青色。
發驚。更有赤者。當瀉。爲肝怯。當目淡青色也。

瀉白散

地骨皮 桑白皮

炒各一兩

甘草

炙一錢

右剉一劑。粳米一撮。水二盞。煎一盞。食前服。

甘桔湯

治風熱毒氣上攻。咽喉疼痛。喉閉。隨塞勞渴。

肺壅咳嗽咯唾膿血。胸滿振寒。咽乾而渴。時有濁沫氣息腥臭。久久吐膿狀如米粥。又治傷寒。

咽痛

桔梗

二兩

甘艸

一兩

右爲粗末。每服二錢。水一盞。煎至七分。去滓食後溫服。加荆芥防風。名如聖湯。熱甚加羌活黃芩升麻。

阿膠散

治嗽肺無津液。喘急肺虛者。咳而喎氣有聲。

阿膠

一兩半
蛤粉炒

鼠黏子

二錢半
炒香

馬兜鈴

半兩
焙

甘艸

一錢
炙

杏仁

七箇去皮尖

糯米

一兩

右爲末。每服二錢水一盞煎六分食後溫服。

地黃丸

熟地黃
山茱萸
乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三錢

右爲末。煉蜜丸如桐子大。三歲以下一二丸空心白湯化下行。遲鶴膝加鹿茸牛膝五加皮。

腎臟第十二問

腎虛兒本虛怯而胎氣不成則神氣不足目中白睛多其顴卽解顏開面色㿠白此皆難養縱長不過八八之數若恣于色慾多不過四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲進下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎丸主之腎病見夏水勝火腎勝心也當重腎輕心病退重者悸動當搐也

地黃丸

治腎瘡卽急癥。腦熱肌削。手足如冰。滑洩腹痛。

熟地黃

山茱萸肉

乾山藥

各四錢

澤鴻

牡丹皮

白芍芩

去皮各

三錢

右爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。三歲以下。一丸至三丸。溫水空心化下。行遲鶴膝。加鹿茸半
膝五加皮。

面上證氣色總見

第十三問

○無方

左腮爲肝。右腮爲肺。額上爲心。鼻上爲脾。下頰爲腎。赤者熱也。隨證治之。此仲陽之至論也。口議所謂五位氣色總見者。其藍青色者。乃驚積不散。欲發風候。其火紅色者。痰積壅盛。驚悸增進。其黃土色者。食積癥。僵。欲作痈。疾痞癰。其色白者。大腸滑洩。水穀不分。欲作吐利。其黑色者。臟腑欲絕。其疾危惡。其兒不久也。又有面部形色。額有青色。主驚風欲發。紅。主大熱。印堂青色。初入驚。并瀉。紅。主大驚夜啼。黑。主客忤。山

根青至主三次驚青色主瀉後發躁黑色及黃甚主死年壽平陷者生夭。青主發熱生驚黑主利死紅主燥死微黃曰平。黃甚主霍亂死。鼻准微黃曰平。黃甚爲土動死候黑赤危甚。人中黑主蛔蟲咬患久唇反者死。短縮者固利死。邊旁黃主胃逆青色主下利正口紅者平。乾燥脾熱白主失血死。黃有積青因驚風死。黑氣邊口者死。承漿青因飲食時被驚黃主吐逆。赤主血痢赤黑主驚風。兩眼黑睛黃有熱白睛黃食積不化。辨細白睛青肝風驚黑睛黃有熱白睛黃食

忽紅主煩燥夜啼黃主霍亂久病紅者死風氣二池
青主風候紫主吐逆又發熱黃吐逆紅主煩躁夜啼
兩頰赤色肺有客熱兩太陽青主二次受驚青自太
陽入耳者死紅主血淋兩臉青主客忤黃主痰溢赤
風熱兩頰赤主傷寒左赤心熱口瘡右赤肺熱黃
主有積紅主血淋兩頰青主吐衄兩金匱青主第三
次驚生風黑瘧口二日死青連目入耳七日死兩風
門紅主風熱黑主痴青水驚黑從眉入耳當日死青
黑不食者死又而青眼青肝之病而赤心之病面白

肺之病。而黃脾之病。而黑腎之病。五臟各有所主。看
稟受盈虧。胎氣虛實。陰陽補瀉。當救其失。臟腑表裏。
若能辨其標本。則神聖工巧。自然得矣。

發搐 第十四門

仲陽云驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也早辰發搐因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口內生涎項頸急此肝旺當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸主之日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內生涎手足動搖此心吸也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸主之日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微

邪視身體似熱。睡露睛手足冷。大便淡黃水。是肺旺。
當補脾治心。治肝補脾益黃散。治肝瀉青丸。治心導
赤散。主之。夜間發搐。因潮熱亥子丑時。不甚搐而臥。
不穩。身體溫壯。目睛緊。邪視。喉中有痰。大便白色。乳
食不消。多睡不省。不納津液。當補脾治心。補脾益黃
散。治心導赤散。涼驚丸。主之。凡急驚欲發。先看握拳。
指內陰順。指外陽順。男左女右。搐須令全用藥通關。
大忌悶涎入肺。逆入心經。不能語言。卽與涼心鎮驚。
下痰藥始安。如逆倚者。便不可救。若因吐瀉後。變發。

邦難調治大凡此證要看搘拳逆順若搘順
理搗逆恐其復潮先用通關勝撲兒保命丹省風濕
後用疎風化痰退熱等藥便可無事又有驚風搗頸
吐瀉多啼急搗眼後有淚面紅則難瘥愛哭心中聚
涎臉有紅筋乃是癇疾指亂青紋疾病又傳下驚風
驚風鎮墜太過風疾不散與氣相逆搗不能定當下
轉氣疎風藥溫膽湯加酸棗仁服次省風湯化蘇青
丸又有急驚偏羸面青背冷男左女右不妨男右女
左難治如持心冷汗搗脅搗肚終日終夜不定者名

真搐兩肩都動此乃掣證。不惟定搐亦要順氣藥當下參湯平其胃氣却進川烏全蝎等藥并順氣藥亦要斡旋仲陽論傷風後發搐若傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之。傷食後發搐若傷食後得之身體溫多睡多唾或吐不思飲食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸入百日內發搐真者不過二兩次必死假者頓發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治宜芎

散。大青膏主之。仍用塗顱浴體法。珍珠丸下痰。卽定有熱不大便者。七寶洗心散。寬熱散下之。卽效。却用截風定搐。天麻防風丸。龍齒散。釣藤散等劑調理。有熱瘡疥或不語。防風通聖散。大連翹湯皆可服。

瀉青丸

當歸

龍膽艸

川芎

防風

大黃

羌活

山梔仁

等分一方加甘草芍藥

右爲末。煉蜜丸。雞頭大。每服一丸。沙糖湯下。

導赤散

生地黃

甘草

生

木通

各等
分

右咬咀竹葉煎。加黃芩赤芍藥羌活燈心煎。
涼驚丸

潮熱口內涎手足動搖此心旺也

治驚疳有熱發搐心神驚悸。上視赤色牙關緊

黃連

末五分

龍腦

一錢

龍膽

三錢

防風

三錢

青黛

三錢

釣藤

二錢

牛黃

一字

麝香

一字

一右同研麩糊丸粟米大每服三五丸至一二十
丸煎金銀湯送下。

地黃丸

熟地黃

山茱萸

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末，煉蜜丸如梧子大，空心溫水化下三九

益黃散

陳皮

去白兩二錢一方用木香

丁香

二錢核炮去

青皮

法白半兩

甘艸

炙各半兩

右爲末。三歲兒一錢半，水半盞，煎三分，食前服。

通關散

治諸風搐搦，關竅不通，皆由痰塞中脫，留滯百

節所致痰之所爲潮塞者氣實使之

南星

炮一錢

麝香

一字

猪牙皂

一錢略燒存性

赤蜈蚣

一條多

直殼蠶

一錢

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引
滴入藥兩三點涎自出

嚏關散

生半夏

一錢皂角半錢

右爲末用一二豆許用管子吹入鼻立醒

開關如聖散

赤蜈蚣

一條中分爲兩片各用葱汁浸一宿焙乾

全蝎

一箇亦半分爲兩片各託左右以二物各託左右分兩處

右各爲末。左眼翻左手擣。以左藥末搗入左鼻孔。右眼翻右手擣。以右藥末搗入右鼻孔。雙眼翻雙手擣兼之。

至聖保命丹

治小兒胎驚內釣。腹肚緊硬。眠睡不安。夜多啼哭。及治急慢驚風。目眼上視。手足抽掣。不省人事。悉皆主之。冷證用此。

全蠟

十四節去尾

防風

二錢

白附子

一錢

炮南星

一錢有熟用膽星

蟬蛻

一錢殼蠶去絲炒

天麻

二錢

朱砂

一錢

麝香

半錢

金箔

十片

有熱證加牛黃

冰片

硼砂

各少許

右爲本。粳米糊丸。每兩作四十九。常服鎮心安神化痰。除一切驚風諸證。湯臨時換一方。加入參白茯苓二錢。

省風湯

治驚風口噤。筋脈痙急。抽掣疼痛。風瘡癰腫。

暉 痘仆頭目眩胸膈煩滿恍忽不定神志昏憊

天南星

生用

防風

去蘿各四兩

甘草

生用

半夏

米泔浸一宿

黃芩

去粗皮各一兩

右咬咀每服二錢生薑一片煎去滓不拘時服

溫膽湯

治驚悸煩躁不得眠

半夏

枳實

各二錢半

茯苓

半兩

橘紅

甘艸

各一錢半

酸棗仁

去殼二錢半

腹疼加芍藥

右咬咀每服一錢入竹茹少許薑棗煎服

卷之三
玉餅子

治小兒夾食傷寒。其證發熱嘔吐。亦有肚疼者。

喫氣辨得分曉。先用此藥一服。推下食積。却用

平和藥發散。調治如惺惺散。加減參蘇飲皆妙。

滑石末

一錢 輕粉 半錢

半夏末

一錢 南星末 一錢

巴豆

廿四箇去皮膜用
水一升煮乾研細

右三味搗羅爲末。入巴豆粉。次入輕粉又研勻。

却入餘者藥末。如法令勻。糯米粉丸如棗豆大。

量小兒虛實用藥。三歲已下。每服三丸至五丸。

空心紫蘇湯下忌熱物。若三五歲兒壯實者不以此拘。加至二十丸以利爲度。

安神丸

人參

茯神

麥門冬

乾山藥

龍腦

各二錢

龍齒

一錢

朱砂

甘艸

寒水石末

各半錢

金箔

二片

右爲末。蜜丸雞豆大燈心湯調下。

大青膏

天麻

一錢

白附子

半生半熟

一錢

蝎尾

半錢

朱砂

一字

青黛

一錢

天竺黃

一字

麝香

一字

烏蛇

酒浸取肉

培乾半錢

右爲朱生蜜丸如芡實大月中兒粳米大全牛黃膏薄苛湯化下五歲以上同甘露散服之。

奇州白丸子

一名蘇青丸

治一切風小兒驚風

天南星

兩

白附子

二兩

川烏頭

去皮臍半

兩

生用

半夏

浸洗過白

好者七兩

右用井花水浸晒過次日早酒換新水至五日

夏三日秋七日冬十月晒乾爲細末以糯米粉
煎粥清爲丸如棗豆大小兒驚風薄苛湯調下
和蘇合香丸服名蘇青丸

浴體法

天麻末二錢全蝎去毒全蝎爲末朱砂

各半錢

烏蛇肉

酒浸焙乾

白礬各二錢麝香一字青黛

三錢

右同研勻每用三錢水三椀桃枝一握葉五七
枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

塗頰法

麝香

一字

蝎尾

去毒爲末半錢

薄荷葉

半字

蜈蚣末

牛黃末

青黛末

各一字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼顫上
四方可出一指許火上炙手頻熨百日內外小
兒可用此塗浴法。

珍珠丸

治小兒急驚風涎潮壯熱痰氣上壅

白附子

滑石

輕粉

各二錢

巴豆

半錢

全蝎

半錢

右爲末。糊丸如小豆大。三歲一丸。二丸葱湯下。

七寶洗心散

原係二方合成者。詳見三十七問內。

白朮

半錢

當歸

荆芥穗

麻黃

不去節

芍藥

大黃

麪裹煨去麪切焙各六錢

前胡

生地

各四錢

薄荷

少許

右爲末。每服一錢。水一盞。入生薑一片。煎服。

寬熱散

詳五十問中

枳殼

去白一兩。以水潤之。以巴豆四十九粒去皮同研。却去巴豆。

大黃

一兩

朴硝

半兩

甘草

半兩

右爲末以瓶器收之每服一字薄苛湯調下

天麻防風丸

詳五十四問中

天麻

防風

人參

辰砂

雄黃

麝香

甘艸

炙各一分炒全蝎炒

僵蠶

各半兩炒

牛黃

一字

一方有膽星無麝香

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一丸薄苛湯下

惺惺散

詳五十問中

天花粉

人參

細辛

白茯苓

去皮各等

白朮

甘艸

炙

桔梗

各等

古剉每服一錢水煎服

龍齒散

龍齒

蟬蛻

釣藤

羌活

茯苓

人參

等分

右爲末，每服半錢，薄苛湯下。

釣藤散

譯十六問中

釣藤勾

三錢

蟬蛻

天麻

防風

蝎尾

人參

各半兩

麻黃

去節

殭蠶

炒

甘艸

川芎

各一錢

麝香

一字

右爲末，白水煎，寒多加附子末半錢。

防風通聖散

詳二十八問中

防風

去蘆半兩

荆芥

二錢半穗

川芎

當歸

薄荷葉

去蒂

大黃

錦紋者佳半兩

芍藥

當歸

連翹

去蒂

各半兩

芒硝

各半兩

石膏

細紋者佳

黃芩

桔梗

各半兩

一

滑石

六兩

甘艸

二兩

白朮

梔子

各二錢

半

右剉，每服二錢，水一盞，薑二片，煎七分，去滓，食後服。

大連翹湯

治瘡瘍壯熱小便不通諸般瘻癰丹毒臍風

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炒各一錢

山梔仁

黃芩

錢各半

右剉每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳證加減爲佳。

急驚 第十五

急驚者，因聞大聲及大驚而發搐。發過則如故。此無陰也。當下利驚丸主之。小兒急驚者，本因熱生于心。身熱面赤，引飲口中氣熱，大小便黃赤，劇則搐也。蓋熱甚則風生，風屬肝，此陽盛陰虛也。故利驚丸主之。以除其熱痰，不可與巴豆及溫藥。大下之恐搐虛熱不消也。小兒熱痰客于心胃，因聞聲非常，則動驚搐矣。若熱極雖不因聞聲及驚，亦自發搐。急驚之候，牙關緊急，壯熱，涎潮竄視，反張，搐搦顫動。唇口

搐者十指開合

動。唇口

眉眼。吸引頻并。口中熱氣頗赤。唇紅大小便黃赤。其脈浮數洪緊。蓋由內有實熱。外挾風邪。心經受熱而積驚。肝經生風而發搐。治法大要用藥有序。通關以後。且與截風定搐。痰熱尚作乃下之。痰熱一洩。又須急與和胃定心之劑。如搐定而痰熱少者。則但用輕藥消痰除熱可也。蓋急驚須當下。切不可過用寒涼。及銀粉巴。消輩蕩滌太驟。此等重劑。醫家不得已而用之。僅去疾即止。或不當用而用。或當用而過焉。往往由此而成慢驚矣。此證亦用搐。昊通閉打噴涕。牙

開閉後用疎風化痰退熱藥道散柴胡天麻等劑
便可無事琥珀散通治諸經驚狂之要藥至寶丹亦
可服。

利驚丸

治小兒急驚風痰盛發熱潮搐

青黛

輕粉

各一錢

牽牛末

半兩

天竺黃

二錢

右爲末白麪糊丸如小豆大二十丸薄荷湯下
一法煉蜜丸如芡實大一粒化下

導赤散

生地黃

生甘草

木通各等分

竹葉三片

右咬阻加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服。

至寶丹

詳二十問中

生犀屑

生麝屑

琥珀

研細水飛

雄黃

細研水飛各一兩

金箔

五十片半爲衣

銀箔

五十片研

麝香

研各一錢

牛黃

半兩研

安息香

一兩半爲末以無灰酒濾去砂石糾取一兩慢火熬成膏

右和勻以安息香丸如梧子大每歲一丸入茶湯化下。

琥珀散

治小兒急慢驚風。涎潮昏冒。目瞪搖搖。驚吊肚
疼。及和順痘瘡。小可驚哭。眠臥不安。入口立效。
驚癇時攻發作。常服永除病根。

辰砂

一錢半
琥珀

牛黃

天麻

僵蠶

炒去
綠嘴

全蝎

去毒

白附子

乳香

蟬蛻

各一錢

麝香

半錢

代赭石

煅醋淬七
次一錢

片腦

一字半

牛膽

南星一字半

右爲末。三歲一錢。薄荷湯下。慢驚加附子一分。

下慢驚加附子一分。

慢驚

第十六病

慢驚者因病後或吐或瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時時癱瘓昏睡露睛此無陽也枯萎湯主之凡慢驚之候或吐或瀉痰鳴微喘眼閉神緩睡則露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷四肢熱口鼻冷氣面白淡青或眉青唇青其脉沉遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成为者有臟腑虛洞泄而成为者有久利氣脫而成为者有取瀉下積而成者

有吐血下血而成者。有感風不解傷寒傳變而成者。
有久嗽作癇不已者。有蟲積衝心者。有癇氣腹痛者。
或日夜汙出脾困多睡煩躁引飲四肢浮腫大小便
閉。丹瘤腫毒龍帶縲腰走馬急瘡竝傳慢候惟吐瀉
積利成虛致之則證變甚速治法須當審問源流不
可一槩用藥。曰慢候如吐瀉得之則理中湯加木香
以溫其中。五苓散以導其水。如臟寒洞泄得之則先
與朮附湯下積取轉得之則先與調氣散調和脾胃。
如外感風寒則可與桂枝湯葛根湯冀其他可以類

推矣。然慢驚雖屬陰，亦須準較陰陽。虧盛淺深，如每不可純用溫藥及燥烈大熱之劑。惟于生胃氣中，加以截風定搐。如全蝎花蛇僵蠶白附天麻南星草爲良方。傳慢候而尚有陽證者不必回陽，但與截風調督，可冷可熱，惟均平陰陽而已。太乙寶生丹、聚寶丹、蟬蝎散、神寶旣濟丹來復丹、王氏惺惺散、醒脾散、大醒脾散、溫白丸可選而用之。若陽虧陰盛病已傳過，純屬慢驚，無搐掣反引竄視之證，而但昏沈者，與星香全蝎散定命飲子、四聖散、烏蝎四君子湯、天南星

散烏沉湯沉香散之屬若手足冰冷者方可回陽用硫黃附子慢驚下痰身煖者天南星丸蘇合香丸白丸子痰盛者神寶既濟丹礞石散虛甚不可下痰者靈脂丸七珍丸如腦麝巴霜寒涼通開利腸之輩一切禁止如未發慢驚先要睡吐舌搖頭面青毛髮豎吐乳作腥額上有汗此證乃吐後胃虛生風當下截風驛脾散或四君子湯加全蝎防風銀白散或鈞藤飲去麻黃更宜多方走變藥餌不可輕忽又有慢驚正坐洩瀉吐乳冷汗雙眼閉唇紅舌出搖頭髮直而

腦動心悶氣粗口瘡當用南星末貼脚底心常進參
湯尤好少間口瘡不納乳食名曰鎖脣却難救凡小
兒病證見口如魚口作鵝聲者不治聖濟經有琥珀
丸南星煎等劑皆可服論曰心藏神而惡熱小兒體
性多熱若感風邪則風熱搏于腑臟其氣鬱憤內乘
于心令兒神志不寧故發爲驚若驚甚不已則悸動
不寧是爲驚悸之病紫金散牛黃散大丹砂丸治之
其急驚則有龍齒散巨勝散等劑可選而用之

括夢湯

治慢驚

括囊根

二錢

白甘遂

一錢

按本草白甘遂乃蜜
休又名草甘遂不用赤者

右用慢火炒焦黃色研勻。每服一字煎麝香薄
荷湯調下無時。凡藥性雖冷。炒焦用之乃溫也。

理中湯

詳五十三問內

人參

八分

白朮

乾薑

炮各

甘艸

等分

炙減半

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎服。

五苓散

治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利。

澤瀉

二兩

官桂

一兩

猪苓

六兩

白茯苓

白朮

各一兩半

右爲細末。每服一錢。白湯調下。燥渴新水調服。
大小以意加減。不拘時候。加辰砂一兩。治驚熱。

求附湯

治風溼相搏。身體煩疼。不能轉側。不嘔不渴。大
便堅硬。小便自利。及風虛目眩。甚則口不知味。

白朮

四兩附子炮去皮脐一兩半

甘艸

炙二兩

右剉每服三錢。水盞半。薑三片。棗一个。同煎服。

調氣散

詳第五問中

木香 香附子 人參 橘皮

藿香 甘艸 炙各一錢
薑棗煎服

桂枝湯

治太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。驚心惡寒。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。

桂枝

去皮

芍藥

生薑

各半

甘艸

一兩

右剉每服三錢。棗二個。水一盞。煎八分服。須臾啜粥一盞。以助藥力。溫覆令一時許。通身熱散。汗出爲佳。如減法。桂枝自西北二方。唇人。附

行之無不應驗。江淮唯冬及春可行之。自春至
及夏至以前桂枝證可加知母石膏各半兩。武
加升麻一分。若病人素虛寒者。正用古方。

葛根湯

治太陽病項強。几惡風。無汗。無惡寒。剛痙。

葛根

西兩

麻黃

三錢

桂

一兩

甘艸

二兩

芍藥

二兩

右剉每服五錢。水一盞半。生薑五片。棗二個。煎
一盞服。取微汗。

太乙保生丹

治慢驚風有陽證

全蝎

十四個

白附子

生

殼蠶

半錢

牛膽南星

蟬蛻

各一錢

琥珀

各一錢

麝香

半錢

防風

朱砂

各一錢

金箔

二片

作衣

右爲末每服二丸薄荷湯下

聚寶丹

治慢驚風

人參

茯神

琥珀

天麻

殼蠶

沙

防風

南星

生白附子

全蝎

沙

烏蛇

各一錢

朱砂

半錢

麝香

少許

右爲末，煉蜜丸桐子大。每服一丸。菖蒲湯調下。

蟬竭散

治方傳慢驚

全蟬

七个去尾

蟬退

十一个

甘艸

二錢牛蒡

南星

一个泡

右爲末。每服半錢煎服。

神寶旣濟丹

分陰陽平冷熱定吐瀉。豁痰涎。

硫黃

燄硝

鎔汁再研

五靈脂

炒等分

青皮

陳皮

去白半夏曲

炒等分

右爲末。粟米糊丸麻子大。每服三丸。米飲送下。

來復丹

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣有
水火既濟之功補損扶虛妙難盡述

硝石

同硫黃並爲細末微火略炒用柳葉子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過

硫黃

舶上透明

太陰玄精石

研細水飛各一兩

陳皮

去白

五靈脂

水澄去砂石日乾

青皮

去穰各二兩

右用靈脂二皮爲細末次入玄精石末及前二
藥末拌勻以好醋打和爲丸如豌豆大每服三十
粒空心粥飲下甚者五十粒小兒三粒新產

生嬰兒一粒。小兒慢驚風或吐痢不止，變成虛風搐搦者。非風也。胃氣欲絕故也。用五粒。辨下。

王氏惺惺散

人參

茯苓

木香

焙

天麻

白扁豆

陳皮

炒

全蝎

蟄

右爲末。每服半錢。薑棗略煎服。

醒脾散

全蝎

焙半錢

白附子

炮

天麻

焙

甘草

炙

人參

白茯苓

石菖蒲

木香

石蓮肉

白朮

各一錢

有熱者去木香

右剉每服三錢薑三片棗一个水二小盞煎服。

大醒脾散

南星

白茯苓

橘紅

各一錢

全蝎

焙

甘艸

炙

白附子

炮

石蓮子

人參

木香

各半錢

陳倉米

二百粒

右剉每服三字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用。

溫白丸

治風痰癆定驚

人參

防風

生白附

剝桂

全蝎

燒各一錢

南星

湯泡各二錢

天麻

各二錢

右爲末，麪糊丸，桐子大，每服一丸，薑湯調下。

星香散

治慢驚風

南星

燒二錢

木香

各半錢

人參

各一錢

橘紅

各一錢

全蝎

炙三分個

甘艸

炙半兩

有熱加防風

右剉每服一錢，入紫蘇薑棗濃煎，旋以時送下。

定命飲

半夏

茯苓

木香

生薑

各一錢

白朮

甘艸

炙三分

天麻

各五分

右爲末每服半錢臺棗煎湯調下

四聖散

治慢驚吹入鼻中

全蝎

七个

僵蠶

十四個

南星

七錢半

川烏

二錢

右將南星爲末水調作餅裹蠶蝎川烏外用溼紙重包慢火中煨令赤色頓地上一伏時每服一字煎金銀湯點好茶清少許調下

烏蝎四君子湯

人參

白朮

甘草

白茯苓

等分

川烏

全蝎

各少許

右爲末。每服半錢。薑棗煎服。如再服。卽去川烏。

天南星散

驅風散痰

南星

一个重九錢。以上者就地上作小坑深八寸。許炭火燒通紅。以好米醋半盞酒入坑中。卽納星于內。次以火炭密蓋之。又用盆蓋其上。一代時取出燒淨切碎。

右末每半錢。入琥珀全蝎各一錢。生薑湯調下。

烏沉湯

治驚風助胃

天麻

二錢

人參

生川烏

全蝎

焙

南星

炮

木香

沉香

各一錢

甘艸

炒半錢

右剉每服三字薑三片。煎服。

沉香散

茯苓 二錢 沉香

丁香

木香

藿香

厚朴

製

甘艸 炙一錢

右爲末。每服一字。米飲調下。

天南星丸

天南星

一斤。每一個重一兩。上一下者用溫湯

柴蒸

不住。洗刮去裏外浮皮。酒浸一宿。用桑

酒酒

常令藥潤。伏時搗取。出用銅刀切

開。一個大者嚼少許。不麻舌爲熟。未熟

再坎以熟爲度。然後用銅刀切細。燒乾。

麝香

研

丁香

各一兩

龍腦

研兩半

辰砂

芳粉一錢

右爲末，煉蜜并酒丸。朱砂爲衣，薑湯下一至五

礞石丸

礞石

搗碎一兩

焰硝

半兩同合

礞石入竈內用炭火煅令通紅候冷

研末

研末

研末

研末

右爲末，雪糕薄糊丸，棗豆大，每服二丸。急風薄
荊芥泡湯調下。慢風慢脾風，木香煎湯下。礞
石焰硝古文錢輩，雖能利痰，然其性非胃家所
好，故以木香佐之。

靈脂丸

五靈脂

白附子

焙

木香

直殼蠶

炒

各一分

全蝎

培牛錢

朱砂

一錢

大南星

溼紙包火
內煨半錢

右末米醋煮生半夏糊丸麻子大薑湯下三丸

七珍丸

治頑痰壅盛
半錢

細辛

川靈芝

直殼蠶

一錢半

白附子

一錢

朱砂

半錢

全蝎

四個焙

右末大南星煮糊爲丸麻子大薑湯下每五丸

四君子湯

治榮宿氣虛臟腑性弱

人參

去蘿
半錢

茯苓

去皮
半錢

甘草

四個

白朮

各等分

銀白散

糯米

炒二兩

扁豆

蒸二兩

藿香

一分

白朮

炒一分

丁香

二錢

甘艸

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。加天麻砂仁白蒺藜快脾正色直指方加炮白附全蝎木香石蓮生薑

鈎藤散

二十問二十

退鈎藤飲可參用

鈎藤勾

三錢

蟬蛻

天

防風

蝎尾

炙

八參

各半兩

麻

去節僵蠶炒

甘艸

炙

川芎

各一錢

麝香

不拘多少

右爲末。白水煎。寒多加附子末半錢。

琥珀丸

詳十五門

辰砂

一錢

琥珀

半錢

牛黃

僵蠶

炒去絲嘴

南星

製半

全蝎

去毒一錢

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬蛻

各一錢

麝香

半錢

冰片

少許

龍齒散

右爲末。三歲半字。薄荷湯下。慢驚加附子。

龍齒

蟬蛻

鈎藤

羌活

茯苓

人參

等分

爲末。每一錢。薄荷湯下。

脾風 第十七 開

慢脾風之候。面青舌短頭低眼合不開。困臥中。僵頭吐舌。頻嘔腥臭。禁口咬牙。手足微搐而不及收。或身冷。或身溫而四肢冷。其脉沉微。陰氣極盛。胃氣極虛。十救一二。蓋由慢驚之後。吐瀉損脾。病傳已極。總歸虛處。惟脾所受。拔曰。脾風若逐風則無風可逐。若瘡驚。則無驚可療。但心間痰涎虛熱往來。其眼合者。脾困氣乏。神志沉鬱。痰涎凝滯。然爾。世所謂慢風難療者。慢脾風是也。然慢脾風一名虛風。凡小兒或吐或

瀉之後。面色虛黃。大勢虛損。若因虛而發熱繼此。必得慢脾風。纔見搖頭直視。以手摸人。昏困喜睡。額上汗多。身亦黏汗。其聲沉小而焦。即是脾風之症。不必皆由急慢傳風。治法大要。生胃回陽。黑附湯。川烏散。金液丹。白丸子各一半。生附四君子湯可斟酌。胃氣漸復。則異功散輩溫平而調理之。如竭附散。陰癟散等。亦可參用。若其眼半開半合。手足不冷。症候尚在。慢驚。則不必用回陽。或已入慢脾。而陽氣未甚脫者。亦不可用硫黃附子丸服。回陽湯劑。手足漸暖者。

以醒脾散等繼其後以調之不可輕易用極劑

黑附湯

治慢脾風虛四肢厥冷者
子足暖而甦省卽止後劑

附子

炮三錢

木香

一錢半

白附子

一錢甘艸

名分

右剉散每服三錢薑五片煎取其半以匙送下

川烏散

祛風回陽

川烏

生一錢

全蝎

各半錢

木香

各半錢

嘔吐丸

半錢

丁香

右末每三字薑三片煎取其半旋滴入口中

金液丹

治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏
睡寒多露睛口鼻氣冷欲成慢驚風者
利目久脾腎寒多露睛口鼻氣冷欲成慢驚風者

舶上硫黃

十兩先飛掠去砂石稱研爲細末
入罐內再入赤石脂封縫鹽泥固

濟炭火燬三分畫
夜取出候冷用

右以柳木槌研爲細末。每服二錢。生薑湯下。

生附四君子湯

助胃回陽卽前四君子湯加生附子末四分之一。厥冷者對加。每服半錢。水煎以匙送下。

異功散

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

等分

右爲末。每服三字。薑棗煎服。

蠍附散

同蝎氣熱風痰

全蝎

一个

附子

炮

三錢

南星

炮

白附子

炮

白附子

炮

木香

各一錢

右爲末。每服半錢。鹽三片。煎服。

驅脾散

全蝎

燒半錢

白附子

炮

天麻

燒

甘艸

炙

人參

白茯苓

石菖蒲

白朮

各一錢

石蓮肉

白朮

各一錢

右爲末。每服三字。薑棗煎服。

陰癟散

桂風露

痰癥

回陽正酒

酒

白附子

黑附子

南星

半夏

並生各
一分半

右爲末。井水浸七日。逐日換水。浸乾。控乾。次入全蝎末二錢。每服一字。生薑湯下。

急慢脾風下痰輕重

第十八問

慢驚下痰輕者。神寶既濟丹。白僵蠶丸。重者。神砂膏。
甚則七寶妙砂丹。灸慢脾慢風。驚逆惡症候。諸藥不
效者。如有太衝脉。則取百會穴灸之。此治慢脾風之
大要然也。急驚亦下劑有三。輕下則用定命丹利驚
丸。防風湯宣風散枳殼散。小柴胡湯輩。重下則用青
金丸。天麻丸。蘆薈散。牛黃涼膈丸。青金丹。王監京墨
丸輩。稍重下。則用揭風湯。朱砂膏疎風散。柴胡加大
黃湯輩。下之後。宜和氣助胃。如生氣散。銀白丸。茯苓

二陳湯異功散天麻蘇合香丸參苓白朮散和中散
醒脾散之類皆可選用。凡急驚眼睛翻轉口中出血
兩足擺腹肚搗摸體循衣氣促噴藥口中痛絕大叫
者難治慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黑唇慘鴉聲兩
脇動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口
眼手足一邊牽引者難痊慢脾身冷黏汗直臥如尸
喘嗽頭軟大小便不禁口噤頭搖者最難爲力若急
驚甚者服鎮心丸化痰鎮心或金箔鎮心丸亦可服
珍珠丸下痰亦效然甚大便閉者寬熱散下之可也

神寶既濟丹

前集卷六附

硫黃

焰硝

五靈脂

青皮

陳皮

去白子

半夏麪

炒等

修合法詳十六問中。每服三丸。食前米飲下。

白殼蠶丸

方傳慢脾陽氣未甚者可川亦能截風

膽星

二錢

直殼蠶

炒等

五靈脂

錢子地龍乾

全蝎

焙各錢

右末水煮生半夏糊丸。麻子大。每五丸。薑湯下。

辰砂膏

治慢脾冷瘓寒溼。手足冷而微搐。

黑附子

一个八錢重者去皮脐頂上刻一孔入辰砂末三錢仍用附子末塞之以

炭火燒存性爲度

甘草

南星炮半兩

白附子培

五靈脂

蝎梢

各一分

七寶炒砂丹

右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服一丸，薑汁湯下。

治痢疾奇効。慢驚慢脾，通以木香佐之間。元通寶錢，皆背後上下有兩月片者，其色淡黑，頗小。諸錢以一個放鐵匙于炭火內燒，少須四圍上下，各出黃白珠子，將出候冷，傾入盞中，只作一

服南木香煎湯送下。人參湯尤妙。

防風丹治風熱痰壅大便不通

羌活

防風

枳實

川芎

甘艸

炒

大黃

溼紙裹煨各一錢半

右剉每服二字。薑棗煎服。或加赤芍藥。

宣風散

疎風導熱

雄檳榔

一个

甘艸

各兩半

橘紅

二兩

牽牛

二兩半

炒

右爲末。每服半字。錢密湯調下。

枳殼散

治小兒癰氣腹脹喘急

枳殼

一兩
炒

巴豆

廿一粒
炒黃去之

同上

右爲末。三歲小兒半錢。砂糖湯調下。

小柴胡湯

詳見二十九問

人參

甘艸

炙各三錢

黃芩

一錢

柴胡

八錢

半夏

湯泡七次
乾三錢五分

培

加枳實防風能利血熱

右剉每二錢葛棗煎服。

青金丸

治風痰壅盛

巴霜

一字
一錢

青黛

南星

炮各一錢

滑石

二錢

全蝎

一錢
焙

右爲末，稀麪糊丸麻子大每一丸，薄荷湯送下。

天麻丸

南星

炮
地二
錢

白附子

炮
牙梢
半錢

天麻

川靈芝

全蝎

炮
各一
錢

輕粉

半錢
二字

巴霜

右爲末，每服一字，煎金銀薄荷湯調下。

蘆薈散

治驚風痰盛發搐
炮

全蝎

五個
炮

巴霜

一字
輕粉
半錢

蘆薈

南星

炮
一分
角

朱砂

各一
錢

冰片

麝香

各一
字

鬱金

木
三分
角

培根

右爲末。每服一字。煎金銀薄苛湯調下。

牛黃涼膈丸

治熱盛涎潮

牙硝

寒水石

煅石膏

甘艸

各半兩

膽星

二錢半

紫石英

一錢牛黃

片腦

麝香

各半分

右末。甘艸膏丸。菉豆大。每服一丸。橘皮湯調下。

青金丹

棘風利疾

蘆薈

牙硝

青黛

各半錢

史君子

硼砂

輕粉

半錢

蝎梢

十四個

右爲末。香墨水丸。麻子大。每服一丸。薄荷湯下。

玉監京墨丸

治瘧熱。驚積。楚州王
監。曹此藥著名者。

青黛

史君子

炒。蘆薈。

膽星

各二錢。

川墨

二錢。

藏粉

麝香

半錢。

水片

一字。

右末飛麌糊丸。桐子大。每服一丸。薄荷湯調下。

揭風湯

治利下。瘧熱。

青黛

蘆薈

全蝎

各一分。

南星

半兩爲
末。謂作

餅包裏前項。
燒令赤盡。

朱砂

一錢半。

牙硝

輕粉

各三字。

右爲末。每服一字。煎金銀薄苛湯調下。

朱砂膏

治驚風疾盛

朱砂

一錢

牙硝

一錢

川靈芝

一錢

蘆薈

一錢

麝香

一字

冰片

一字

右末。甘艸膏丸。桑豆大。金箔衣。薄苛湯下一丸。

疎風散

治驚風痰熱俱盛

檳榔

各二錢

陳皮

各二錢

牽牛

各二錢

大黃

各二錢

右爲末。每服半錢。生蜜調下。

銀白散

糯米

炒二兩

扁豆

蒸二兩

藿香

分白朮

丁香

二錢

甘艸

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。

柴胡加大黃湯

柴胡

一兩

黃芩

炙

人參

半夏

製少許

生薑

各三錢半

甘艸

炒一錢半

大黃

少許

右剉散每服一錢，入棗煎服。

生氣散

治諸風疎利。以此調氣。

丁香

七分

白朮

青皮

甘艸

炙多

木香

人參

各二錢

右爲末。每服半錢。沸湯點服。

異功散

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

各等分

右剉散。每服二錢。薑棗煎服。

茯苓二陳湯

和胃氣化痰涎

半夏

五錢半

陳皮

二錢半

茯苓

四錢半

甘艸

一錢半

右判。每服三錢。薑三片。煎服。

天麻蘇合香丸

天麻 防風

人參

辰砂

雄黃 蘇合油

甘艸炙各一錢

全蝎炒一分

薑鑿半兩牛黃少許

星一錢

蘇合油一錢

右爲末煉蜜丸如桐子大。每服一丸。薄苛湯下。

參芩白朮散

一名和中散

扁豆

炒

人參

茯苓

白朮

土炒

甘艸炙

各一錢

山藥

各二錢

米仁

砂仁

蓮肉

各一錢

桔梗

各一錢

天麻

藿香

各五分

右末。每二錢，棗湯下。

醒脾散

全蝎

炒半錢

白附子

炮天麻一錢

天麻

培甘艸一錢

甘艸

炙

石菖蒲

白茯苓

人參

木香

右剉。每二錢，菖蒲煎服。

鎮心丸

朱砂

龍齒

牛黃

各一錢

鍊粉

琥珀

人參

茯苓

防風

各一錢

全蝎

七个
焙

金箔鎮心丸

朱砂

一兩半兩

白茯苓

半兩半兩

人參

半兩半兩

麝

半錢半錢

甘艸

半兩半兩

片腦

一錢一錢

紫河車

二錢二錢

黑豆煮

牙硝

五錢五錢

山藥

一兩半兩

金箔

十二貼十二貼

爲衣

右爲末，蜜丸，桐子大。薄荷湯下。

珍珠丸

白附子

滑石

巴豆

十五粒去油

南星

各一錢

全蝎

半錢

右末蜜丸小豆大葱白湯下。

發癇者。小兒之惡病也。幼小血脉不斂。骨氣不聚。爲風邪所傷。驚懼所觸。乳哺失節。停滯經絡而得之。其候神氣怫鬱。瞪眼直視。面目牽引。口噤涎流。腹脅膨緊。手足搐掣。似生似死。或聲或默。或項背反張。或腰脊強直。但四肢柔軟。發而時醒者爲癇。若一身強硬。終日不醒。則爲痙瘲矣。癇曰五癇。病關五臟。面赤目睂。吐舌嚼齒。心下煩燥。氣短息數者。曰心癇。而唇俱青。其眼上竄。手足拳攣。抽掣反折者。曰肝癇。面黑而。

晦振目視人。口吐清沫。不動如尸者曰腎癇。面如枯骨。目白直視。驚跳搖頭。口吐涎沫者曰肺癇。面色痿黃。眼睛直視。腹滿自利。四肢不收者曰脾癇。此五臟之證然也。調理之法。惟以驚風食三種。陰陽二證。別而治之。風癇者。汗出解脫。風邪乘虛。其初屬指數有熱生痰是也。驚癇者。震駭恐怖。打墜積驚。其初驚叫大啼。恍惚失魂是也。食癇者。食時得驚。停宿結滯。其初吐乳不哺。大便酸臭。或結成乳癰。先寒後熱。其初吐乳不哺。大便酸臭。或結成乳癰。先寒後熱。其初吐乳不哺。大便酸臭。或結成乳癰。先寒後熱。其初吐乳不哺。大便酸臭。或結成乳癰。先寒後熱。

別之以陰陽。始者身體有熱。抽掣啼叫是陰。身體無

熱。抽掣啼叫是陽。

症脉浮，面色光澤，病在六腑，肌膚此猶易愈，始著身體無熱，手足清冷，不抽掣，啼叫，是爲陰癇。陰病脉沉，面色黯晦，病在五臟骨髓，此最難痊。或以仰臥屬陽，覆臥屬陰，亦可參驗。蓋陽證不可用溫，陰證不可用寒。風癇先爲之散風，驚癇則爲之利驚，食癇則先爲之消積，續以定癇等劑。主之大蓋血滯心竅，邪氣在心，積驚成癇，通行心驚，調和心血，順氣豁痰，又其要也。雖令小兒有熱有痰，不欲乳哺，眠睡不安，時常驚悸，此皆發癇之漸，卽以紫霜丸導之。時間量與紫霜。

丸減其盛氣則無驚風癇瘈之患。其證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線。見之急爲抓破須令血出啼叫尤得氣通瀝灌兒衣不可夜露恐爲無辜鳥羽糞所落汙染未有不爲癇也挾邪怪者其色變易不常見人怕羞諸癇瘈不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩其道路之間抑亦血滯於心心竅不通所致耳。南星調雄豬膽汁少許名星蘇散啖之效。若錢氏五癇丸并南星散以菖蒲煎湯調下半匙。猪心湯以和蘇合香丸若治癇之要藥也。

之許叔微治小兒顛癇欲發眼暗癆癰聲嘶。黃丸主之。治風癇宜服薄苛散。有熱宜服細辛大黃湯。又有蛇黃丸養生必用方。斷癇丹散風丹保安丸獨活湯牛黃丸比金膏虎睛丸七寶鎖心丸清神湯蜜陀僧飲食癇通用妙聖丹天麻丸。斷癇丸當歸大黃湯。蝎虎散代赭石散日應丹地龍散全蝎五癇丸。星珠散可選而用之輕者化風丹亦可服。

紫霜丸

代赭石

煅醋碎
七次

赤石脂

各六錢

杏仁

五十枚
去皮尖

巴豆

三十枚
去皮心
臍油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏。却入代
赭石脂末研勻。以湯浸蒸餅爲丸。如粟米大一
歲服五丸。米飲吞下。一二百日內兒三丸。乳
下更宜量其虛實加減。微利爲度。此藥兼治驚
瘓諸疾。雖下不致虛人。

星蘇散

與第十六回天
南星散通用

治諸風口噤不語

天南星

畧炮剉散
每服一錢

右用白附子紫蘇五葉煎取其半却
許溫和服凡不語者大小便須要疎導治懶服
不語只用南星以人參石菖蒲爲佐

五癇丸

治食癇

硃砂 半兩 水銀 二錢 雄黃 一兩 真珠 一兩
細研

右爲末煉蜜爲丸麻子大每服二丸金銀煎湯

送下

雌黃丸

治顛癇搐掣惡聲嚼舌

雌黃

黃丹微炒各半兩

麝半錢

右爲末。拌和用牛乳汁三合。熬成膏入藥末。杵三百下丸如麻子大。每服二丸溫熱湯下。

薄苛散

薄苛葉半兩

羌活

全蝎

甘艸

麻黃

去節

殼蠶炒去絲青

天竺黃

白附子

各一錢半

右爲末。薄苛湯下。熱極生風加竹瀝少許。以四
又一方有柴胡台芎桔梗茯苓無全蝎。酒服。

黃白附子。

細辛大黃湯

治風癇內熱

天麻

防風

各半

細辛

大黃

川芎

各二錢

甘艸

一錢

右剉散每服一錢入犀角少許煎服，

楊氏蛇黃丸

治諸癇

蛇黃

一箇
七次研細
醋淬

鬱金

雄黃

硃砂

青礞石

各

鐵粉

研細

右爲末。梗米飯丸桐子大。每服一丸。人參煎湯

調下。

錢氏蛇黃丸

治驚癇

蛇黃

三箇大
煅醋淬

鬱金

七分半

麝

一字另研

右爲末。梗米飯丸如桐子大。每服一二丸。煎湯

銀磨刀水化下。

卷生必用蛇黃丸

蛇黃

一枚
研醋汗

青礞石

辰砂

雄黃

各二錢

鐵錘粉

四錢研
極細

右末化蒸餅爲丸用金銀剪刀股湯五歲已上
吞下幼小化下如麻子大丸。

斷癩丹

治癩差後復作證候多端連綿不除

黃芪

蜜水
塗灸

膝勾

細辛

云根
去皮

甘艸

炙各半兩

蟬蛻

四箇洗
去土

蛇退皮

三寸酒
塗灸

牛黃

一字
另研

右末煮棗肉爲丸如麻子大。煎人參湯下。一歲
十九丸。大小加減。

散風散

治風癟先用此

牛膽南星

一錢

羌活

六分

獨活

防風

天麻

人參

六分

荆芥

川芎

細辛

各一錢

右爲末。燒蜜爲丸桐子大。每服二丸。薄荷紫蘇

湯調下。

保安丸

治諸風癇久遠亦驗

川烏

生去皮尖
二錢半

五靈脂

生
兩

右爲末。猪心血丸如桐子大。每服一丸。薑汁泡

湯調下。

獨活湯

治風癇解表通裏

獨活

麻黃

去節

各一錢

荆芥

各一錢

大黃

焙

甘艸

炒各半錢

右剉散每服二錢薑二片煎服

牛黃丸

治風癇迷悶搐掣涎潮

牛膽南星

麝五分

全蝎

蟬蛻各二錢

防風

白附子生

天麻

僵蠶炒各一錢半

右爲末以糞棗去皮核取肉和水銀半錢研極細入藥末丸如棗豆大每服二丸荆芥生薑湯

調下

比金丸

治驚癇先用此

人參

琥珀

白茯苓

硃砂

遠志

葛根
去心
梨焙

天麻

石菖蒲

細者
節

川芎

南星

青黛

各一錢
一
麝字

虎睛丸

治驚癇邪氣入心

虎睛

調研
遠志
浸

犀角

石菖蒲

大黃

溫
裹煨
麥門冬
各一錢半

蟻娘

去足翅
炒三枚

右爲末粟米糊丸桐子大每服一丸竹葉煎湯
調下或金銀煎湯下

七寶鎮心丸

治驚癇心熱

遠志肉

鹽炒

雄黃

鐵粉

琥珀

硃砂

各一錢

金銀箔

二十片

麝香

少許

右爲末棗肉丸桐子大每服一丸去心麥門冬

湯送下

神湯

治驚癇

犀角

遠志

蜜製

白蘚皮

人參

石菖蒲

甘艸

炙各一錢

右爲末。每服一錢。去心麥門冬煎湯調下。

蜜陀僧飲

治驚癇。人心不語。神効。諸驚失音。大人通用。

右蜜陀僧爲末。每服一錢。米醋湯調下。大人用。

一錢熟酒調下。

妙聖丹

治食癆通用

代赭石

煅醋淬各五分

雄黃

蝎稍

硃砂

錢各一錢

輕粉

麝香

字各一錢

巴豆

三箇去心膜出油

杏仁

去皮尖微炒二錢

右爲末蒸棗肉丸桐子大每服一丸水通煎湯

調下

天麻丸

南星

炮

白附子

炮

牙硝

一錢

天麻

五靈脂

全蝎

焙各一錢

輕粉

五分

巴霜

一小撮

右爲末，稀糊爲丸，麻子大。每服三丸，薄荷薑煎。

湯送下。

斷癰丸

治諸癰瘍盛

皂角

茲人者三挺，出皮挺碎，用一升水浸取汁，濾過，銀器內熬成膏。

白藜

根枯研細一兩半

南星

熟紙炮一兩

硃砂

一錢半

直薑

炒研一兩

雄黃

各半

烏蛇

酒浸，取肉一錢半

麝

一錢

赤蜈蚣

一條去頭足酒浸多

右爲末同水煮半夏糊和皂角膏爲丸桐子大

每服一丸薑湯調下

當歸大黃湯

治諸癆壯熱利下心中惡血。

大黃

溫紙裹
畧

甘艸

炙

當歸

各三錢

赤芍藥

二錢五分

半夏

製

川芎

各一錢半

右爲末每服一錢薑漿煎服

蝎虎散

治驚癇

丸

褐色生蝎虎

一箇連
血研

右入硃砂末并麝少許同研薄苛湯調下。一服數年癲癇亦效。益癇疾皆心血虛滯。生蝎當以官守其血。繼是以二陳湯與之。若無生蝎。當取帶性雄猪心血代用。入代赭石散中亦效。

代赭石散

治陰陽癇通用

代赭石

煅淬研爲末
水飛過日乾

右爲末每服半錢。以金銀煎湯和金銀箔調下。
連進二服。良久小兒腳脰上自有赤斑。卽邪氣
發出。其病隨瘥。若無赤斑。卽難治也。

日應丹

治癲癇連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀

鐵粉

研各半兩

右水銀鐵粉。金銀箔夾和一處。先將黑錫於銚
內鎔開。次入硫黃。不住手就鎔內碎攪候。硫黃

烟氣欲息，次入餘藥，就火上同攪少頃時，復出地上一宿，出火毒，再研細，粳米饭丸，麻子大，砂衣，每服三丸。食後人參湯下。

地龍散

治諸癟發熱無時

乾地龍

培半兩

虎睛

人參

天竺黃

代赭石

煅

醋淬

硃砂

鐵粉

各二錢半

輕粉

五分

雄黃

一錢半

金銀箔

三十片

右爲末，每服五分，紫蘇湯調下。

全蝎五痫丸

治小兒五痫

赤蜈蚣

一條
是酒浸炙

南星

炮
錢半
去頭
麝香
一字

全蝎

防風

硃砂

細研
遠志
蓋製培

白附子

生
蘆薈

延胡索

各一
錢

金銀箔

三十
片

右爲末，入麝糕糊丸桐子大。每服一丸，菖蒲紫

蘇湯調下。

星珠散

定癇利痰

南星

濕紙裹炮
香熟一兩

硃砂

一錢

右爲末帶性。豬心血爲丸。桐子大。每服一丸。防

風調下。

化風丹

涼風化痰退熱定搐

膽南星

羌活

獨活

防風

天麻

人參

去蘆

川芎

荆芥

粉草

全蝎

各等分

右爲末。煉蜜丸。芡實大薄荷湯下。一方加辰砂
麝香少許。

鎮驚丸

治一切驚癇

紫石英

燒
淬

鐵粉

遠志

蕪
蘿
蕘
去心

輕粉

各七
分半

茯神

人參

琥珀

滑石

南星

炮

龍齒

蛇黃

焰
淬

熊膽

各二
錢半

右爲末。煉蜜丸如桐子大。硃砂爲衣。每一片一丸。

銀湯下或用猪乳調抹入口中

開牙散

細辛

南星

朴硝

各錢

麝香

五分

蝎梢

七箇

右末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荊芥末吹入鼻中治諸風癩搘驚癇用此
開竅與前十四問開閑散通用

驚風

第二十問

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其滉必青漸生
風而未至風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚
邪入肝則面目俱青眼睛窠視驚邪入腎則面黑惡
叫齒努咬牙驚邪入肺則面目淡白喘息氣乏驚邪
入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脉觀之虛
則散而濡實則數而躁治法鎮驚化痰安神定志亦
須究竟何臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有
所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼

之是謂治法。睡中驚啼聲浮者易治。沉者有聲不響難治。又有驚積者受驚日久積而成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來。肚腹有熱睡中覺腹內有物跳動。瀉下如白脂豆沙是也。治法量輕重而疎導之。仍與調氣和胃取愈。大凡小兒腹中或熱或脹或硬皆爲內實法。當疎利辰砂膏青龍丸主之。凡疎利之劑皆可隨證用之。熱甚心經煩渴者至寶丹解之。羞沽散防風導赤散蟬蛻釣藤飲天麻丸等劑皆可服。大便秘澀者七寶洗心散加辰砂治之。大小便不利。

神夢丸寬熱散極效輕者化風丹可服安神丸亦可服

辰砂膏

辰砂三錢蓬砂一錢馬牙消一錢玄明粉一錢

全蝎二箇真珠末一錢麝香一字

右爲末和畢用好油紙封裏自然成膏每服一
豆粒許諸鷺金銀箔薄荷湯下潮熱甘艸湯下
用內用乳汁調傅乳上令兒吮下

青龍丸

治驚積有熱

青黛

茯苓

蘆薈

南星

炮各一錢

麝香

少許輕粉

巴霜

各一錢

全蝎三錢

右先將巴豆研如泥。次入諸藥研極細丸如梧桐子大。砂爲衣。每服一丸。薄荷湯下。

至寶丹

治諸癇急驚心熱卒中客忤。不得眠睡。煩躁風涎搖搦。及傷寒狂語。伏熱嘔吐。並宜治之。

生羊屑

生玳瑁屑

琥珀

研細
水飛

雄黃

研細水飛

金箔

五七片
水飛

銀箔

五十

片鱗

研

麝香

一錢

牛黃

半兩

安息香

兩半爲末

以無灰酒

熟蜜

研細

研細

右生犀玳瑁屑搗羅爲細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯發化和搜爲劑如乾卽入步

熟蜜盛瓊器中旋丸如桐子大二歲兒服二丸

人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不

語卽惡氣中諸物毒中熱暗風產後血量死胎

不下茲用童子小便一合生薑自然汁三五滴

同溫過化下五丸立效

神妙奪命丹

七月取青蒿節內蟲入硃砂麝香爲丸加片脣人參卷活湯

治傷寒驚熱或中風體硬加麻黃乾葛薏苡仁

川羌活

獨活

前胡

柴胡

白茯苓

川芎

桔梗

枳殼

人參

地骨皮

天麻

各等分
甘草
桂半

右剉散生薑薄荷煎服加蟬蛻治驚熱

防風導赤散

治小兒初驚

生地黃 木通

去節防風 甘艸各等分

有熱加黃芩 赤芍藥各活

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

蟬蛻釣藤飲

治肚疼驚啼又十六間有釣藤散可兼看對

釣藤

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

各二錢

甘艸

蟬蛻

各一錢

右剉散燈心煎加木通麥門冬防風各活

天麻丸

南星

炮
錢二

白附子

炮

天麻

五靈脂

全蝎

培各一錢

輕粉

五分

巴霜

一字

右爲末糊爲丸麻子大每服三丸薄荷薑湯服

寬熱散

石膏

黃芩

甘艸

赤芍藥

葛根

各二錢半

麻黃

去節一錢半

柴胡

半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許。

葛白
二小錢一撮

七寶洗心散

治小兒煩熱生瘡。兼治驚風。

生地黃

荆芥穗

防風

甘草

黃芩

羌活

赤芍藥

各等分

右爲末。入辰砂減半。加當歸尤妙。每服一錢。燈心薄荷湯下。空心食前服。又三十七問洗心散可兼看對。

神芎丸

治風熱壅滯。頭目昏眩。口舌生瘡。牙齒疳蝕。或

遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁多渴或大小便滯滯或積熱腹滿驚風潮搐竝皆治之。

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

滑石

四兩

苦連

兩

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末。涌水丸桐子大每服四五十丸食後溫水下一方加蒲黃止血證用。

化風丹

膽商星

紫活

獨活

防風

大麻

人參

川芎

荆芥

粉草

全竭 等分

右爲末煉蜜丸如芡實大薄荷湯下一方加麝香辰砂

安神丸

人參

茯神

麥門冬

山藥

各二錢

龍腦

龍齒

各一錢

寒水石

五分

甘艸

五分

硃砂

五分

金箔

二片

錢氏方有馬牙硝

龍腦

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸燈心湯下

清心丸

治驚熱煩躁

人參

茯神

防風

硃砂

柴胡

各二錢

金箔

三十片

右爲末，煉蜜丸，桐子大。每服一丸，竹瀝調下。