

全

幼

心

鑑

全幼心鑑卷之四

嘔吐

有物有聲名曰嘔乾嘔則無物有物無聲名曰吐有聲吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和是陽明經胃脈絡陽明之氣下行則順今逆上行作嘔吐有胃寒胃熱痰水宿食氣攻之證有傷乳氣乳吐熱吐寒吐冷吐傷食吐傷寒吐各受病非一治法不同凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢候嘔吐每每太便秘上下壅遏氣不流行當利導之藥治之微緩候胃氣將絕常嘔腥臭不保天年

水兒脾胃虛怯方作吐瀉其證有五有熱吐冷吐虛吐痰吐食吐所三熱吐者謂母飲酒喫肥炙煖醱穢或胃風傷暑飲熱兒

物乳入胃遂成熱吐冷吐者謂兒胃冷加以宿冷之物與兒即吐虛吐者其兒肌弱神困疳積未消胃虛又虛即吐痰吐者其兒胃氣本虛復感寒邪生痰作熱留滯胸膈故吐食吐者其兒脾胃飲食不節強食傷脾作熱神困吐後即吐病家但知其吐不明其所以吐且吐無爲共作名曰霍亂其吐候又推輕重有五初見乳自流出謂之哕哕之不已即謂之吐吐之不已則作嘔嘔之不已即傳逆逆之不已即作噦反自嘔逆噦皆有出散動氣嘔者口開而作噦者心胸上下氣逆鬱結噦者無物可出即膈虛胃寒引氣噦噦作噦此等噦惡須臾證變即慢將風熱吐者先去風痰冷吐虛吐與生胃氣痞吐下却其痰次與正氣食吐宜與塌氣豈可一槩理之吐瀉不止將虛風生張開屎

驚眼合慢脾治之不啻更下驚藥死不旋腫豈可得而救  
分長幼病察虛實有吐瀉三五日發風者有一日半日而  
大抵女孩以吐爲急男以瀉爲速若氣虛暴瀉暴吐纔作便得  
之惟有疳瀉不成風候久則患無辜證終於虛之矣但滯腸止  
瀉爲良吐卽生胃爲正截風之藥加而用之凡驚藥及寒涼之  
藥切不可用亦不可用太熱藥其候乃屬陰證醫士載之勿妄  
爲幸

小兒呢吐嘔噎噦有五呢者謂呢乳如視簷水射出吐者吐出  
有物嘔者開口而作噎者心胸上下氣逆鬱聚噦者無物可出  
皆緊切之證慢驚皆由此而作又須詳其冷熱虛寒人傷所因  
胃寒卽似氣吐面青唇白清涎夾沫吐出

熱吐即似驚吐有黃涎夾乳食乳成片頭額溫五心熱小便赤少或乾嘔噦無物夏秋間多有此證

虛吐肌弱神困不思乳食用生胃氣藥

痰吐即風壅吐咳嗽氣急或表熱

傷乳食吐即積滯吐吐作霍氣吐熱

蟲吐面白毛焦唇紅或紫或昏田田不醒人事時吐又當於驚風內癩蟲痛及疳積門治之

鄭氏云但吐不瀉為逆吐而有痰發驚者危治之當斷乳但與

稀粥食

熱吐者夏間多有小兒日中遊露伏暑熱毒入乳母出外感冒

暑氣承熱便乳乳兒多成熱吐頭額溫五心熱小便赤必夾中

者之證當解暑退熱止嘔化痰五苓散用生薑煎湯調化不拘  
時候服香薷飲天水散皆消暑之藥

冷吐者冬月多有感冒風寒由乳母感受寒氣承寒便乳兒冷  
氣入兒胃中嘔吐喜熱惡寒四肢淒清寒吐必夾清涎吐以  
溫中藥服丁香圓霍香正氣散加丁香四君子湯加丁香陳皮  
去白乾薑炮生薑棗去核同煎食前服寒極者理中湯加附子  
炮去皮尖瀝量虛實治之

傷食吐酸臭夾乳食而出惡食胃瀰身發潮熱有下證下之有  
食積宿滯者服消積圓鶴頂丹無宿滯者下之後服消食圓長  
生圓治之

傷乳吐乳食過飽滿而必溢導虛胃氣久吐不止慢驚自此而

得乳母服沉香降氣湯兒服助胃膏調中湯大醒脾散治之  
氣乳吐乳母憂思忿怒之氣食乳乳兒乳隨上不能克化故嘔  
兒吐子母同服沉香降氣湯

傷寒吐傷寒傳裏裏氣上逆半表半裏之證多嘔有胃氣熱乘  
虛入胃胃得熱則氣逆嘔

### 吐奶說

小兒吐奶有數般或是風疾所致則其吐不可止也吐奶更夾  
痰穢吐却即主風若止却後其風無止處更入外風則朝心閉  
胃管後變驚風胃主四肢被痰涎閉却即搐心主神被外部所  
干即驚神不主故變驚風也故止住吐即驚風發手足搐搦口  
張目閉

小兒吐奶鼻青客傷風肺夜間煩燥身上發熱

小兒吐奶唇黑多哭是傷脾須夾痰也

小兒吐奶身熱其奶成片子者是胃有熱積久則生風

小兒吐奶不化夾清水是胃冷其人必面青唇白是也

小兒吐奶早晚發熱則足驚吐而不睡是也

小兒翻吐候 搐搦氣張羸 此病難醫療 其名號胃虛

氣羸胃家冷 氣細志風生 急取為妙手 調脾是術精

乳吐停胸膈 生痰作吐頻 不宜尿糞遊 尤忌燥紅唇

視乳候嘔奶曰呢

顛腦動不停 常聞有吐腥 碧壘眼上膜 汗出脚如冰

其證胃虛多呢奶眼碧膜心受驚風氣不順顛腦動及多



汗胃氣虛必致成此病

吐妳胃氣實 胃滿生吐逆 以多有風生 驚風因此得

吐罷腦後溫 吐乳無變色 先須定却氣 隨後除風疾

面青唇白胃管驚 吐現黃痰冷熱并 乳食不通乾嘔逆

調脾利膈立惺惺

小兒吐現嘔逆候脾氣不順胃氣結冷也用調胃補虛若生風

氣癰用藥止吐瀉

現乳從來胃來實 妳滿胸高生吐逆 吐多遍體有風生

驚邪皆爲如斯得 吐定須更腦後溫 吐出妳來無變色

先宜定氣又除風 急早求醫尋妙訣

時時顛倒動無停 現乳常聞氣又腥 碧色眼睛如上膜

更看汗出脚如冰 若還氣細胃家冷 氣若虛時宜急驚

胃冷調和方是妙 是風急取見須明

嘔乳生涎

嘔乳非為吉 生涎其可疑 闕睛防掣搐 咂口必驚危

時時吐唾 服地黃圓

時時頻吐唾 腎氣冷之因 日漸亡津液 萎黃作瘦人

吐乳發搐 惡候

吐乳頻頻必發驚 脾虛困弱失精神 精神既失涎潮壅

頰腫青筋不救因 頰筋亦同

壅乳生吐 惡候

孩兒何嘔逆 壅乳為傷脾 解脫因風冷 頻頻吐不宜

素問二食則嘔者物盛滿而上溢東氏云小兒吐嘔者乳  
甫冷熱不調則停胸膈因哺乳前後相觸氣不宣流故令  
見吐嘔也

五苓散 治嬰孩小兒霍亂吐瀉煩渴飲水虛熱加黃耆蜜炙  
人參各五錢

猪苓

去黑皮

白朮

赤茯苓

去皮各五錢

澤瀉 七錢半

桂 去皮二錢半

右爲極細末用生薑煎湯調化不拘時候服

香薷飲

治嬰孩小兒臟腑冷熱不調飲食不節霍亂氣逆有

心痛而先吐有腹痛而利者有發熱頭疼身痛而腹吐利虛煩  
或嘔無物四肢逆冷脈欲絕煩悶昏塞而欲死

白扁豆

炒去皮二兩厚和薑汁製炒四兩

香薷八兩

黃連炒一兩五錢

右剉散用水煎不拘時候服

益元散

一名天水散

滑石水飛

甘草炙各七錢半

右為極細末用滾白湯入蜜少許吐不止者薑汁調化不拘時候服

丁香圓

治嬰孩小兒嘔吐不止

丁香

半夏去皮膚生各二錢

右用生薑汁次一宿晒乾為極細末生薑汁煮麩糊圓如黍米大用生薑煎湯食遠服

全切心錄

沉香散

治嬰孩小兒補虛調胃氣止吐瀉進乳食

沉香一分

丁香

甘草炙

霍香葉各一錢

木香

桂各半錢

茯苓一分

右爲極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

理中湯加丁香 木香

四君子湯加丁香 陳皮去白 乾薑炮

右咬咀生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

定吐紫金核 治嬰孩小兒嘔吐不止

人參去蒸

白木

藿香葉

半夏

木香

丁香各二錢半

石爲極細末煮麪糊圓如芙蓉  
末一錢同爲衣陰乾棗一箇  
熟嚼化服後用米飲壓之

朱沉煎

治嬰孩小兒嘔吐不止

朱砂

水飛一錢

霍香

水三錢

滑石

水煎

錢

丁香

十四箇

沉香

一錢

右爲極細末用新汲水一小

匙之許以油點成花子抄藥在上

須臾墜下瀉去水却用別水

化令齋前服

益中膏

治嬰孩小兒嘔吐泄瀉

脾胃虛寒全不食肚脹腹疼困倦

丁香

肉豆

各一錢 炒去油各二錢

縮砂

去殼一錢

訶子

炮去核

甘草

青皮

去穢炒各五錢

陳皮

去白一兩

右爲極細末煉白蜜圓如芡  
貫大用滾白湯研化食前服不  
思乳食大便未穀不化夜起者日進二服

左黃散

治嬰孩小兒脾胃虛弱腹瀉泄痢不思乳食嘔吐不

止困乏神懶心脇膨脹顏色青黃懶不醒

丁香二錢

陳皮

去白一兩

甘草炙

青皮

去穢炒各二錢

訶子炮去核五錢

加肉豆蔻

麩暴燥去白二錢半

右爲極細末用生薑棗去核  
同煎湯調化食前服

沉香降氣湯

香附子

炒一兩五錢

沉香一錢

甘草 錢  
砂 去殼五錢

右爲極細末用鹽燒過  
煎湯調化食遠服

檳榔圓 治嬰孩小兒疳積  
積聚腹脹食積傷食嘔吐瀉

檳榔 去核  
一二錢 煨  
蓬萊木 煨

青皮 去穢炒  
木皮 去白  
木香 三錢

史君子 去穢  
砂 去殼各四錢

黃連 炒二錢  
山藥 去核六錢

右爲極細末煮麪糊圓  
如黍米大用米飲食前服腹痛加桂

一錢

八白散 治嬰孩小兒脾胃虛弱  
風痰水穀入口嘔噦躑躅

乏飲食不下霍亂吐利  
心胸膈滿中脘不和精神恍惚



沉香

藿香葉

人參去蘆

草菓去殼

乾薑炮

半夏炙

青礬炒

檳榔去膜

白豆蔻去殼

茯苓去皮

白朮

白豆蔻炒去皮

白芷各一錢

右各為極細末生薑葉去核同煎湯調化食前服瀉後復吐或吐後復瀉

人參溫中圓 治嬰孩小兒驚吐熱吐心神悶亂中脘不和漸

加恐悸恍惚無定

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

半夏炙

陳皮去白

肉豆蔻炙去油

右爲極細末黃肉去核圓如黍米大麝香葉生薑同煎湯不拘時候服

調中正胃散 治嬰孩小兒中脘不和胃氣不止胃冷傷寒吐逆煩悶困力之飲食不進虛弱思睡不安穩

藿香葉

白木

人參 去蘆

茯苓 去皮

甘草 炙

陳皮 去白

山藥

白扁豆

炒去皮

半夏 麩

乾薑 炮各一錢

右剉散用生薑二片棗一箇去核同煎不拘時候服

紫蘇子飲 治嬰孩小兒飲乳母氣妳嘔吐

紫蘇子

人參 去蘆

沉香 各二錢

甘草炙一錢半 縮砂去殼二錢 茯苓去皮四錢

右爲極細末用生薑煎湯調化食前服

### 泄瀉

胃爲水穀之海其精英流布以養五臟其糟粕傳送以歸大腸  
內由傷胃虛冷乳食積滯外因感冒寒熱所傷遂成瀉痢傷風  
自汗惡風者痛引腰脊鼻塞垣強夾寒者筋節拘急向慘惡寒  
傷暑面垢煩燥渴飲水漿背脊自汗傷濕者肌肉虛浮身痛重  
著冷者則腸鳴吐冷手足清熱則煩燥身熱而手足溫冷熱不  
調者乍泄乍澀執積於內者不能去其積徒以冷藥冰之熱氣  
無所發泄冷熱相博而下注此冷積於中不能去其滯徒以熱  
藥壓之冷積不能宣通故冷熱相干而成泄外則傷食一證失

飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃  
合氣以消水穀水穀既分亦有所謂脾恙而泄也

治法究以受病之源宜用吐瀉之藥吐瀉暴作暴為急證蓋脾  
虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作吐瀉不止必傳慢驚慢  
脾風也足陽明胃經以養三筋暴吐暴瀉津液驟之失其所養  
則轉筋入腹而死

大要散風邪消積滯開胃進食養脾之藥惟傷食泄瀉者必惡  
食發熱心腹脹痛下酸臭先以疎利其食服消積圓鶴頂丹微  
疎導不可峻取後消食藥治之

食積泄瀉者積聚停飲痞膈中滿肋脇疼痛夜熱晝涼口吐酸  
水嘔逆注瀉必實者先利而後補服消積圓鶴頂丹下後服消

導藥虛者元補而後下

蒸吐瀉者脾胃俱虛參朮散加丁香生薑棗去核同煎服以正胃氣

傷風泄瀉者脾臟虛怯也當補脾脾實者先解風熱服藿香散風熱已退微熱者參朮散梘圓子脾虛者先實脾後發散服醒脾散實脾散

假令春月間多有傷風咳嗽泄瀉者表裏俱虛服藿香正氣散倍加茯苓去皮白朮生薑棗去核同煎痰嗽發熱微瀉者服人參羌活散加生薑麴同煎後加味四君子湯參朮散止瀉治之夏月傷暑泄瀉者其證面垢煩燥作渴飲水漿頭熱嘔吐泄瀉服丁香圓定吐紫金核先定吐後參朮散發熱煩渴不止者參

未散如天木散深口湯食諸調任意服其功圓單水瀉不止者服玉華丹治之

秋月接敷泄瀉者服六和治之

冬月感寒泄瀉者助胃膏益黃散加肉豆蔻生薑棗去核同煎服寒極者附子理中湯吐瀉脾胃俱虛欲作慢驚服烏蝎四君子湯注薑棗去核同煎服或<sub>性</sub>脾散全蝎麴音散治之

中濕泄瀉者着冷腸鳴肚腹<sub>痛</sub>補手足寒服理中湯大養脾圓<sub>散</sub>香正氣散腹痛加桂乾<sub>薑</sub>伏<sub>白</sub>者加香薷寒暑同用

錢氏治傷寒泄瀉者泄止而後後瀉乃脾間有風不能發泄泄<sub>止</sub>而又泄用宣風散宣去脾間風然後止瀉

夏月伏暑吐瀉者乳母觸冒暑熱熱乳乳兒及小兒日中遊戲

受熱成疾便為霍亂吐瀉為中滿瘧疾大渴腹脹下痢諸熱病  
疾因暑得之其根未除難收其效傷暑證似傷寒但若能消氣  
氣消則脈散虛而無力六脈沉浮微弱

其證面垢昏倦毛聳惡寒吐痢煩燥渴其壯身熱頭痛四  
肢厥冷身軀無痛當解毒毒後發散表不解暑定傳瘧疾  
日久難瘥

治證服五苓散生薑煎湯調服天水散發解暑瀉不止者玉華  
丹煩渴不止者參朮散合天水散滾白湯調任食前服

中暑昏沉不醒黃連香薷散加羌活煎服調天水散異功圓胞  
能圓治之逆搖吐瀉交作喘而不治

古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚

小兒患吐瀉女壯身瀉身急證吐瀉不止脾虛風生急治  
五月二十五日身至也後吐瀉身壯熱此熱也小兒臟腑十分  
中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色服玉露散  
六月十五日大暑後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷也吐  
嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃  
散食後多服玉露散

七月七日立秋後七日吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食  
乳多似睡悶亂嘔氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不渴食  
前多服益黃散食後少服玉露散

八月十五日秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐  
水服益黃散不可下吐乳



吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下利唇口青白有熱者溫壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香圓夏月不可服如有證則少服

小兒臟寒腑冷大腸不禁摠謂之瀉分別輕重究竟緩速有澹有泄有滑有利有洞五者不同豈可一槩而埋之澹者糟粕不聚由其尚濃似瀉非瀉泄者無時而作或出不知利者直射瀉溜氣從中皖滑者穀食直過腸胃不化洞者頓然下之如桶散積餘更不留即知其兒臟寒腑冷瀉之作疾其來緩速輕重可知凡兒瀉糞出青色者皆脾虛命危也所謂肝屬乙木能克己土

所勝之功故現木質由其職之虛寒非謂瀉也又瀉初黃長久  
變青也乃臟寒之徵又瀉藥物直過尤爲寒滑凡虛滑三五次  
則困乏若不急與溫其臟調其胃平順三焦和正榮衛不爾即  
慢驚惡候傳變如此之意欲以止瀉藥次第理之往往不及惟  
務溫其臟腑臟腑既溫寒何能留於腸胃之間或以熱藥頓止  
則熱反爲它疾須先投婦腸藥然後生胃正氣與服切不可意  
急過劑投之熱藥稍或臟腑至虛寒孩童用之兩枚厥冷者是  
謂逆證用附子白朮乾薑量輕重而用凡投熱藥瀉止即刺作  
無疑理瀉良方已著在後請意度之爲得妙矣

瀉之證不同溏泄滑利洞也溏者糞粕不聚似瀉非瀉世者無  
時而作或不知出利者直射澀溜氣從中脫滑者水穀直過腸

胃不化洞者頰然下如桶散渣不留者脾胃之不調也熱瀉大  
便必黃赤或有沫糞射出遠先用五苓散分其水數却平胃氣  
脾虛受冷面青唇白眼輪黑糞或青或白手足必不溫調其脾  
必傳慢驚疳暴瀉糞臭如臭雞子腹膨時或瀉或絞絞身熱  
脉實可下之却調胃傷食瀉肚膨熱是冷瀉發熱是此瀉補不  
止宜下却補脾若脉弱田少消積脾藥却暖補驚瀉糞青夜啼或  
時驚悸參苓白朮散四君子湯加茯神蓮肉有食積者治上能  
令黃瘦子項作化生兒非服五積圓微利其積後服三稜圓  
夫大便青者臟冷也或初出微黃良久則青者亦然也靈秘云  
瀉下如藍澱胎中受積豎豎心受驚心主驚心驚則膽怯膽者  
與肝爲表裏也膽怯則肝冷肝傳脾脾受邪故大便初出微黃

脾之本色黃，復青肝之本色也。肝熱則外發，自赤；肝冷則內作，便青。又有不因驚而得此證者，謂胎氣怯弱，內受風寒，故也有便青夾白，濃稠粘如涎者，亦是腸寒。又則令兒面白形青，腹痛驚啼，失治則變陰病也。

吐瀉

初生三日內吐瀉壯熱不思乳，大便乳食不消或白色，是傷食。常利之後，和胃用益黃散治之。

初生三日已上至十日吐瀉身無涼，不思乳食，大便青白色，乳食不消，此上實下虛，更有無見證。

肺聽露睛喘氣，心驚悸飲水，脾困倦饒睡，肝呵欠頻聞。

腎不語，畏明常瀉，作見兒每臟補脾之藥，治之。此一證多。

病於夏秋也

生下吐初生下拭掠兒口中穢惡不盡咽入喉中故吐木瓜  
王之初生急須拭掠口中令必在右啼數發則嘔下多生諸病  
傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣羸大便黃白色嘔吐乳食不  
消咳嗽更有五臟兼見證當取入臍君臣藥先大青膏後服益  
黃散如先曾下或無下證慎不可下也此乃脾肺受寒不能入  
食也

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此爲胃  
虛熱渴吐瀉當生胃中津液不止其渴止後用發藥止渴多服  
白木散發散大青膏

便黃因內熱 紅赤黑尚看 綠白青皆冷 疳肥食臭酸

久瀉四肢癱

緣腎睡不安

熱疥毛作穗

涎定食大

肝瀉膨脹腹

肌膚日漸衰

脾虛難化食

腸滑久經

蒸多腥臭

頭垂腫四反

唇紅因渴熱

進退極難醫

肝火傳脾臭綠青

焦黃脾土熱之形

肺腸寒色膿結白

赤熱因心腎熱成

小兒洩瀉精神少

久患照虛食不聞

碧綠眼睛生白膜

青黃面臉見紅筋

有時極鼻梅眉額

或即亭唇擦齒齧

渴飲他留脾受濕

至今水飲不能分

毛乾唇白額頭筋

定是疳多積與驚

肚脹有蠶雜子樣

瀉如糟粕色黃形

其將熱與飽服

止住腸中便作鳴

忽若渴生身熱熱

候人虛脾又風生

只緣積熱傷脾後 致使終日瀉不休 項軟見人多噎氣

更兼清水鼻中流 少時一二深黃色 多努腸頭出不休

形候只看胸膈上 胸紅定自汗通流 眼如赤脉終難理

唇赤生瘡命定休 用藥先溫脾胃內 次醫餘瀉是源由

身熱發厥 久瀉利多虛熱

氣虛多發厥 血虛須作熱 氣血若俱虛 身熱手足厥

淺而腹脹脉弦者死 腹大而芤脉微細而澁者生 緊大而滑

者死 洩注脉緩微小者生 浮大數者死 注下脉細者可治

浮大者劇 洞洩食不化下膿 血脉微小者生 緊急者死

助胃膏 治嬰孩小兒胃氣虛 引飲食不進 腹脹滿腸鳴泄

瀉乳便青夜啼冷寒腹痛

白豆蔻 去殼

肉豆蔻 煨 丁香

人參 去蘆

木香 各五錢

茯苓 去皮

甘草 炙

白朮

桂 去支

藿香 葉

縮砂 去殼各一兩

陳皮 去白

山藥 炒各二兩

加沉香 二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用木瓜煎湯或米飲研化食前服

助胃膏

治嬰孩小兒慢驚風吐瀉不進乳食

人參 去蘆

白朮

蓮肉 去心各二錢

白豆蔻 去殼

甘草 炙

茴香 炒

丁香

檀香

木香 各一錢



右爲極細末煮粟米糊圓如芡實人用陳米飲研化食前服  
脾胃困不醒用冬瓜仁炒煎湯服

助胃膏 治嬰孩小兒助養脾止吐

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

縮砂 去殼

山藥

甘草 各各三錢

沉香

木香 各一錢

丁香 五粒

肉豆蔻 麩裏煨去油

右爲極細末煉白蜜圓如芡實不用生薑煎湯研化食前服

掌背膏 治嬰孩小兒脾胃虛弱泄瀉不止

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

甘草

肉豆蔻 煨  
白豆蔻 去殼

草豆蔻

去皮

陳皮

枇杷葉

去毛

青文

去穢炒

丁香

沉香

木香

藿香葉

縮砂

去屑各一錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

養脾圓 治嬰孩小兒脾虛泄瀉

白木

茯苓

去皮

乾薑

炮

黃連

炒

肉豆蔻

麩炒煨

木香

各一錢

右爲極細末煮麵糊圓如黍米大用燈薪糯米同煎湯不拘

時候服

藿香正氣散

治嬰孩小兒傷寒頭痛增寒壯熱痰喘咳嗽心

腹疼痛吐瀉虛腫疳積

藿香葉 七錢

甘草 六錢

腹皮

白芷

紫蘇

茯苓

去皮各一錢

半夏麴

白朮

陳皮

去白

桔梗

去蘆炒

厚朴

薑製炒各五錢

右咬咀用生薑三片小棗一箇去核同煎不拘時候服

不換金正氣散 治諸孩小兒四時傷寒五臟氣噎咳嗽痰涎

霍亂吐瀉臟腑虛寒 卜刺赤白

藿香葉

厚朴

薑製炒

冬

甘草

炙一錢半

蒼朮

未洲抄四錢

人參

去蘆

茯苓

去皮

木香

各一錢

半夏麴

三錢

陳皮

二錢

右咬咀用生薑二片棗一箇去核同煎食前服

麥冬白朮散 治小兒脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉此藥中和不熱久服養脾胃止瀉痢

蓮肉

去心

薏苡仁

縮砂

去殼

桔梗

炒各石

茯苓

去皮

甘草

炙

白朮

炙

白扁豆

生薑汁浸去皮炒一兩二錢半

山藥

一兩一錢

右為極細末用棗子核煎湯調化食前服禁口痢加石膏滑石五錢半薑棗去核煎服

藜香散

治嬰孩小兒脾胃虛弱乳食不調身熱風熱作驚吐瀉不止

瀉不止

藜香葉

人參

去蘆

茯苓

去皮

丁香

姜活去蘆

防風去蘆又

半夏麩

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

肉豆蔻圓 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉

木香

縮砂去殼各

赤石脂七錢半

礬煨七錢半

龍骨

訶子煨去核

肉豆蔻麩裏煨去油各五錢

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服

沉香豆蔻圓 治嬰孩小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上臍冷

歸下焦虛實不等水穀不化遂傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄

利夾積變為下痢膿血善居常脾胃更在調適也

沉香

芍藥炒

人參去蘆

蓬朮木煨

鱘去殼各三錢

當歸去蘆炒

肉豆蔻剉煨

木香

白木各二錢半

右為極細末蒸餅圓如黍小大用米飲食前服

固腸散 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉不止

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

甘草炙

訶丁煨去核

木香

肉豆蔻剉煨

藿香葉

縮砂去殼各一錢

右剉散用水煎食前服

桂苓白朮散 治嬰孩小兒瀉驚胃暑濕熱轉筋腹痛

桂去皮

茯苓去皮

白朮各二錢半

甘草炙

澤

石膏

寒水石

各五錢

滑石

右爲極細末用生薑煎湯

化令前服

桂苓甘露飲 治嬰孩小兒

液咳多嗽調臟腑寒熱嘔吐流濕

聞燥遍身氣逆水腫泄瀉不

桂去皮

人參去苗

藿香葉 各二錢半

茯苓去皮

白朮

甘草炙

葛根

石膏

寒水石

澤瀉各五錢

木香一分

滑石 一錢

右爲極細末用生薑煎湯

滾 曰湯調化食前服

麥散

治嬰孩小兒霍亂

瀉

肉豆蔻

去油

陳皮

去白

各一分

半夏

麩

青皮

去穢炒

木八

甘草

炙各五錢

石菖蒲

二錢

右咬咀用生薑三片紫蘇三葉同煎不拘時候服

開胃圓

治嬰孩小兒臟腑怯弱內受風冷腹脇脹滿腸鳴瀉

利普白乳食不化臟冷夜啼胎寒腹痛

木香

蓬萊木

煨

當歸

去蘆炒

人參

去蘆

白朮

各五錢

芍藥

炒

麝香

各一分

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研乳食前服

乳豆圓

治嬰孩小兒泄瀉



乳香二錢半 肉豆蔻 切片五錢

右用生薑五片同炒黑色只存乳香肉豆蔻二味研細成膏  
旋圓如黍米大用米飲食前服

玉華丹 治嬰孩小兒伏暑泄瀉驚搐

淨重金合定出火煨過八兩

右爲極細末真醋麵糊同圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

白龍圓 治嬰孩小兒泄瀉不止

白石脂 龍骨各二錢半

右爲極細末滴水圓如黍米大每三圓用紫蘇木瓜煎湯食  
前服

白龍圓 治嬰孩小兒中暑泄瀉不止

和止硫黃

煨硫黃 同炒成香滑石

礬煨各五錢

右為極細末用飛羅麵煮糯圓如黍米大用六爪煎湯或倒  
流水食前服

白龍圓

治嬰孩小兒吐瀉不定滑泄注水小便少

附子炮去麻

白石脂煨

龍骨煨各二錢半

右為極細末醋煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服一方加  
礬煨二錢半

參朮散

治嬰孩小兒脾胃又虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯

竭煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困少力因而失治變成風

癩不問陰陽虛實

人參去蘆

白朮

木香

茯苓去皮

藿香葉搗去  
土

甘草炙各一錢

白根炒二錢

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

伏暑煩渴加益元散用白湯調服吐瀉加丁香黃耆蜜炙白

扁豆炒去皮各一錢

麥米散 治嬰孩小兒吐瀉亡失津液煩渴心燥進乳食

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

山藥

白扁豆炒去皮葛根炒

藿香葉

丁香

訶子炮去核

甘草炙

右為極細末用建寧酒煮去核煎湯調化食前服

大安圓下治嬰孩小兒吐瀉不止

木香

芍藥炒

人參去皮

白朮各

茯苓去皮

訶子炮去核

厚朴薑汁浸炒

陳皮去白各半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實人用米飲研化食前服

調中散

治嬰孩小兒瀉瀉傷食瀉

香附子炒

甘草多

茯苓去皮

天仙藤

藿香葉搗去塵土

芍藥炒

葛根炒

石為極細末用烏梅去核甘草同煎湯調化食前服

六神散

治嬰孩小兒脾虛胃弱吐瀉不進乳食

人參去蘆

白朮

山藥炒各五錢

甘草炙二錢

白扁豆炒去皮 茯苓去皮各一兩

石爲極細末用生薑煮去核煎湯調化食前服發搐加天麻更不止加木香

妙香圓 治嬰孩小兒水瀉不止上吐下瀉飲食對過瀉出壯熱煩渴頭額有汗不進乳食

木香

黃連炒

煨礞

五倍子各半錢 石榴皮

穿山甲煨各一錢

右爲極細末煮麵糊圓如赤米大用陳米飲或丁香一粒藿香二葉同煎湯食前服

藥腸豆豉散 治小兒腸胃虛弱積滯不聚瀉痢不止或  
赤白冷熱不調日夜頻併愈而又發

肉豆蔻 麩 薑 煨 去油 一箇

胡粉 炒 二錢

龍骨 生

醫 各 一 錢

右為極細末用米飲調化不拘時候服

木香圓 治嬰孩小兒脾胃冷瘦疳

木香

青黛

檳榔 去麻

白豆蔻

去殼各 半錢

麝香 一字

續隨子 二錢

蝦蟇 燒存性 二錢

右為細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食前服

玉露散

治嬰孩小兒傷寒吐瀉黃色

寒水石 五錢

石膏 五錢

甘草 生 二錢半

右爲極細末用滾白湯調化食後服

沉香散

治嬰孩小兒補虛調胃氣治吐止瀉進乳食

沉香

茯苓 去皮各 二錢半

木香

桂 去皮各半錢

甘草 炙

丁香 各一分

右爲極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

溫白圓

治嬰孩小兒久瀉脾虛不進飲食訖仍前瀉下米飲

不化

白木

末 炒 浸 二錢半

半夏 麩

一錢半 丁香 炒半錢

右爲極細末生薑汁煮麩糊圓如赤米大用淡生薑煎湯食

前服

木炭圓

治雙咳小兒嘔吐

木炭末

一錢

木香末

一錢

木各一字

膩粉

石為極細末炙麴糊固如

米大每一二圓用甘草水不粘

時候服

痢

凡春傷於風因衣暖解脫為風冷所傷藏在肌肉吐夏因飲

食厚處不調又彼風冷形以入腸胃先輕後重則下痢也其

冷盛則頻下痢液亦白赤熱乘於血血滲大腸則赤也若風

亦夾熱則所下黃而赤也



寒邪併之則所下白而熱  
熱相交故赤白相半重者壯若膿  
濁而雜之輕者白濁中間  
必有赤縷內夾風邪故清血流注溫  
毒入腸胃之間則下如豆  
或成痼血也

治法大要風邪行滯氣  
痢者便不可用肉豆蔻罌  
邪氣得補心懸風邪積滯  
痢出於積滯積物積也滯  
下墜裏急後重乍起乍止  
當先未用通利之藥疎其  
腸腑積滯然後不問寒熱  
冷熱寒暑

隨證治之

其病感風寒者宜淡熱

冷物食飢傷飽不能開發皆成五泄

大素曰五泄者有溇泄、水泄、飧泄、濡泄、滑泄。此五泄者，感肝木之象，其色青赤者受心火之氣，其色赤白者得西方金肺之氣，其色白黃者脾土之氣，其色黃黑者得北方土之氣。平與水隨之，其色不齊，煩併疼痛。而不愈，諸藥不止者，導下服導滯散。小檳榔微利之劑，除濕瀉者，毒病閉積滯而便氣液宜通，內腸胃虛冷，乳食積滯，外感風寒，暑濕所傷，遂成瀉痢，傷風者自汗惡風，寒感寒者回燥，寒傷暑者煩燥，飲水傷濕者肌肉虛浮，停積者夜熱晝涼，乍遊乍瀉，冷痢者內脾虛胃冷，食啖食物停滯，下青白成凍，赤白赤者熱也，白者冷也，久痢者腸胃久虛，脾胃滑泄不止，休息痢，腸胃虛寒，腸鳴不禁，日夜頻併無度，各受病不同，用藥難收其效。有積者服消積圓，太乙圓，或水沉。

丹駐車圓先踈止積滯痢

漸減踈服阿膠梅連圓或黃連阿膠

圓感風邪發熱服人參散

散加蓮肉去心梗米煎服停寒服

痛即中湯加茯苓厚朴生

薑去核同煎服水煮木香圓中濕

者不換金正氣散加木香

人參赤茯苓生薑棗去核同煎服感

胃者毒五苓散入市前子

八天用米飲食前調服黃連阿膠圓

香連圓久痢休息痢者脾

以久虛不禁服大養脾圓真人養臟

湯切胃膏水煮木香圓赤

芍者熱散大勝下赤痢發熱服芍藥

甘草湯白水煎服後服芍

藥和皮圓白者腹中苦痛身痛厥逆

表裏俱虛理中湯寒極者加

附子赤白痢者冷熱不調下痢亦

白切雜服胃風湯小駐車

惟傷人之下痢夜熱晝涼氣急發渴

同胞腫脹肛下痢亦

腦酸臭惡食此痢亦不可使補紫

圓穿消積圓下後服褐圓子加炒黃連能消食止痢開胃進食  
有積者用巴豆大黃氣用枳殼桔梗青皮蓬莪木佐黃連阿膠  
大腸要藥有熱毒則能疎導無熱毒則安阿膠圓當歸青皮赤  
茯苓黃連阿膠炒作劑入烏梅蜜同煎服最能滌惡殺若止則  
止積滯既去痢漸減疎有熱去熱無熱則安用木香茯苓縮砂  
白豆蔻甘草和脾進食

治痢主薑助胃為陽茶助胃為陰平調陰陽蜜治痢主薑作片  
好茶各一錢半蜜水煎服蟲毒痢阿膠黃蘗各二錢用水同煎

服

痢疾不能飲食邪氣疫毒不能發泄傳入臟腑腸胃折疊以禁  
口九死一生脾虛胃弱有熱氣開閉胸中禁口服參及白朮散

小兒積穀穀米一撮同煎食前服心氣一通而便能食

小兒痢者皆因八邪而生也或冷熱不勻風邪入臟則爲痢也或痢則赤冷痢則白冷熱相加則雜赤白色食痢則酸臭驚痢則青黑痢則喫食不消化時行痢則有血疔痢是瀉瀉不時此是八痢也

小兒八痢曰冷曰熱曰疔曰驚曰冷熱不調曰休息曰瀉痢曰蠱毒諸痢無積不能成冷痢白積積熱痢赤積冷熱不調積下赤白疔痢黃白疔下無時度疔青積休息痢蠱黑如魚腸而復作瀉痢疔積而又下肚大飲食不爲肌膚氣臭大便膿瀉疼痛啼叫蠱母痢下紫黑不可不詳察略方藥斟酌用之

小兒久痢渴而思酒時時欲飲者是腸胃精液枯竭也諸書不

曾說經有效素問云厥  
痺使血身熱則死寒者生湯瀉下痢  
白沫脉沉者生浮大者死  
大奇論云熱在七日死腸癖下痢血  
而熱者是火氣內絕去心  
歸於外故死火受制故七日死凡痢  
如癰中膿者多死久痢舌  
黑者死聖惠方云久痢脉沉腹痛者  
死久痢身熱汗出者死

痢者利也痢之爲積無精  
不成及至積化成痢且脾胃亦虛即  
不可更下善痢者生其胃  
滿其脾厚其腸和其瀉無不愈也若  
成痢疾故不可下下之反  
虛作渴浮腫痞滿脹急不食亦不可  
便補補則傷熱能令脫肛  
不收光與燥毒一切等食之物類與  
生胃急即與厚腸胃服此  
細即通和順氣溫臟腑或純白者乃  
積冷毒加之即與揆去其  
毒却與溫其脾胃其利自止痢疾能

飲食可以治之妙藥調理不瘳愈稍失胃氣不能飲食疾不  
禁口有不食至死又有毒復胃口亦不飲食或患痢疾因食  
物毒不見腸頭鮮血頻滴而察大便黑可畏腹此皆痢疾急  
後重名曰刮腸日夜頻併食直過名曰滑腸此二種痢疾為  
惡候乃是一十二種中皆傳受而作此候也言小兒美飲食  
者欲謂飲食謂食飯若茹茹能飲水漿喜食菓子魚物之類  
者亦助其虛不能令臟腑實須是白粽子爛煮飯可矣若以  
極糲極粘膩不堪脾胃之類猶其增困幼者吻乳克化漸安去  
臟平和六腑調貼然後陰引自均氣脈自壯固散湯劑不以抑  
之或有餘毒宜以順調緩引不可攻擊又有時氣作痢黃者相  
染而成乃出天氣時雨不陰濕之氣冷熱相干腸胃糟粕不

聚遠成其疾腹肚疔痛裏熱復重化藥莫治者宜服木香散  
地榆當歸芍藥因豆蔻石鱉極細末蒸烏梅肉圓如黍米入用  
乘去核前湯食前服神功也法也

叔和歌曰濕多成五泄腸去若雷奔下痢微小却爲生脉大  
汗與無聲日身寒則生身熱則死

痢後眉頭皺唇青兩臉黃渴來唇帶赤盛熱眼朦朧

多因諸毒乳積於胃腸日久傳成瀉如膠夾白紅

頻啼并刺痛似凍或垂膿此爲諸痢證早治莫從容

小兒下痢有多般不可輕來一例看冷痢有時青與白

熱多黃赤糞成團熱侵絡絡爲鮮血壘毒纏似紫肝

冷熱相交紅白雜或成善黑或成丹



白痢 先傷冷積在胃故發渴而土珠出也

痢尤發渴要湯水 面上珠汗出光 騰騰眼慢常如瞶

腹內緣如刀刃傷 努出八腸多發痛 不思飲食面痿黃

髮焦眼碧耳雙冷髮焦耳冷是 變色三朝必定亡先

積次治痢止痛又 瀉氣方思飲食

### 赤痢

欲知赤痢眼無開 定是盲食熱藥來 唇白舌紺瘡滿口

一待須去十餘回 腹中刺痛兼滴瀝 胃閉難開飲食乖

此是毒脾先一候 要須知藥與詳裁

### 赤白痢

小兒下痢細尋推 不獨以於積所為 冷熱數般雖各異

竟勝諸胃在醫師

白痢青冷熱赤紅

夾食滯積也

有風

初患瀉渴身壯熱

不思飲食亦爲終

且須開胃調

胸膈

腹痛急與用神功

重重熱瀉一兩日

爲他脈候不浮洪

風痢

風要乘脾黃褐色

看來其痢

驚同

但聞不臭斯爲好

獨瀉脾經自有功

五色痢

痢成五色豈堪聞

日久傳及神氣昏

乾痛煩噯爲惡候

更防兒小命難存

五色痢疾無定止

已下方必有五般

青色只因驚積聚

黃多熱毒在脾間 胸高唇紺齒還露 臉赤青筋出額  
三七已前無變色 其令氣細喘相連 先安五臟不爲露  
氣次取預後止痢 醫者存心仔細看

下頰足冷

不食痢多頻 熱痛渴焦辰 手足時時冷 血黯命途巡

痢腫腸疼

下痢時多必損脾 令兒所體腫如吹 雙睛赤脈生雲翳

渴喘腸疼病已危

痢遍身腫

洪是氣流乃積腫才消而令過飽即

冷刺日久失醫持 遍身寸腫恰如吹 脈洪是氣化爲腫

沉實多因有積之 順氣出腫依元治 冷氣兩目便如尿

更有二般不可療 食飽無通莫大欺

瀉痢脫形

秋深瀉痢脫形神 嘔逆成沉渴燥煩 血氣兩亡肢體冷

涎潮腹痛死之因

瀉痢舌黑

瀉痢舌黑 經時五臟傷 黃因脾氣敗 手足冷須亡

痢噎不食

痢多胸膈滿 噎氣食難通 臟腑魚腸色 虛煩必變風

脾毒積痢

脾間有病本因傷 或被醫士執藥發 致使大腸成結澁

加添滯血入於腸 眼先因口如風候 項熱頭溫脚又涼

舌出胸山為外候  
此是醫家用藥良

多嗜鹽更對量  
先須解毒溫胃口

赤痢下血

鼻根白色唇如玉

此患原來化穢毒  
只緣臟腑冷熱

致使脾虛不消穀

臉白眼胞出綠青  
莫作尋常觀不足  
但請看也手足心  
點點深紅血沃

疳痢雜色

大便膿血黑青黃

久患成疳必滑腸  
下部脫肛情倦怠

上焦煩渴意悽惶

疼來冷熱難干作  
因為寒溫理失節  
體熱須宜多進食  
豈愁憔悴少精光

諸痢死候

痢類都不食

腹脹喘逆

下痢全如黑

渾身熱渴俱

穀道陷如筒

喉中乳不通

皆下同

渴煩狂燥喘

腎縮命將終

壯自箱箕仰

唇枯目白紅

痢中若有此

不必問醫功

目陷唇枯縮

睛中散星筒

痢中還有此

死證命將終

久田疝未產

積瘀臟甲寒

頻痢如膏白

大便若水汁

日漸痿黃瘦

心胸痞滿煩

喉中痰壅塞

不乳命難安

久痢不治

身熱膿青

身熱血黯

潮熱腹痛

增寒汗出

頭熱足冷

形羸顛軟

睛昏赤脈

眼溢白淚

口臭生痰

面腫作喘

舌頭黃黑

口唇焦赤

喉中鳴響

膈滿氣喘

肌不能食

渴欲思酒 痢如血紫 或如膿穢 神昏項硬

下痢脉微小者生大而浮洪者死 下痢膿血脉懸絕者死得  
者生 下痢白沫脉沉者生浮者死

一切瀉痢變作死候

糞門如竹筒黑色

口舌發瘡如白梅焦乾不通乳哺

肚皮陷落四肢逆冷

面青乾噉呀目無淚

唇青目陷肚熱如湯

面青黑啼叫不已煩燥

睡臥煩燥手足身體翻轉不穩

或瀉下如雞子白腥臭

多渴舌黑時伏齧魚口

瀉下如爛魚腸臭及如黑膠色

瀉久不作則忽痞脹暴發大熱氣喘促

通神冷如水四肢軟不收

忽吐長長氣噦噦向如緋紙色

瀉後用藥對過瀉出外腎黑縮

口氣臭唇黑縮鼻耳向目如蘭青

通身忽作大熱汗出如雨目閉不開

項數氣喘促口吐白沫青血

口開不收目直視胃大陷煩燥



吐如雷響瀉下如死雞肝黑惡臭

手足甲黑口吐白蟲項強無喘促

六乙圓 治嬰孩小兒傷乳食肚腹疼痛下痢赤白

乳香

沒藥 各一錢

胡椒 四十九箇

巴豆 十箇 酥油 炙去皮心 糝

右爲極細末 煮麵糊圓如黍米 大三五七圓 紅痢用蜜煎湯  
白痢生薑煎湯 赤白痢生薑蜜同煎湯 食前服

水沉丹 治嬰孩小兒泄瀉赤白痢

藥

黃丹 各一錢

黃臘 二錢 溶化

巴豆 十四箇 入器內 煎透後 不用巴豆

古用杵搗千餘下 入藥一處 和爲劑 旋圓如黍米 大七圓 用

新水食前服

註車圓 治嬰孩小兒赤白痢不止

百草霜 二錢

巴豆

煨熟去殼心膜油一錢

右為極細末飛羅麵煮糊圓如黍米大赤痢用甘草煎湯白

痢米飲紅白痢生薑煎湯食前服

斷下圓

一名掌白，余

治嬰孩小兒肚痛痢疾

礬石 十塊

丁香

杏仁

去皮尖

縮砂 去殼

棗

去皮核 各十箇

巴豆

去心膜油二箇

右為極細末搜和為劑旋圓如黍米大二五七圓赤痢用生

薑煎湯白痢乾薑煎湯赤白痢白豆乾薑同煎湯食前服

斷下圓

治嬰孩小兒下痢白日久不禁

茯苓 去皮

白朮

甘草 炙

草菓連皮

嬰粟殼 炒碎 水吞 各一錢

右為極細末煉白蜜圓如大實大用生薑棗去核同煎湯研

化食前服

香蓮圓

治嬰孩小兒冷熱不調泄瀉煩渴水飲不化腹煩腸

鳴下痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成

疳

白石脂

龍骨

乾薑 炮

黃連 炒

礬 煨 各二錢

右為極細末醋煮麩糊圓如赤米大煩渴用人參煎湯或米

飲食前服

豆蔻春連圓

治嬰孩小兒泄瀉寒熱赤痢疾腹痛

木香

肉豆蔻

麩麥畏去油各二錢

黃連

炒七錢半

右為極細末，蒸粟米飯圓如黍米，大用米飲食前服。

黃連阿膠圓

治嬰孩小兒腸胃虛冷，嘔不調，下痢赤白，壯如

魚腦，裏急後重，臍腹疼痛，口燥煩渴，小便不利。

阿膠

茯苓去皮各一兩

黃連炒一兩五錢

右為極細末，新水圓如黍米，大用米飲食前服。

阿膠梅連圓

治嬰孩小兒下痢無問，新久赤白，青黑，腹痛。

阿膠

烏梅去核各一兩

黃蘗炒

黃連

當歸去蘆心

乾薑炒

赤芍藥炒

赤茯苓

去皮各一錢

用真阿膠效

右爲極細末新水圓如黍米大用米飲食前服

芍藥蘄皮圓

治嬰孩小兒濕熱瀉痢熱從霍亂下血

芍藥炒

黃蘗

各一錢半

黃連炒

當歸

去蘆炒各一錢二分半

右爲極細末新水圓如黍米大用米飲食前服

大養脾圓

人參

去蘆

乾薑

炮

桂去皮

山藥

各二錢半

白朮

茯苓

去皮

縮砂

去殼

胡椒

白扁豆

炒去皮

神麴炒

麥蘖各五錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡心用滾白湯研化令勻服

水煮木香圓 治嬰孩小兒亦白膿血相雜裏急後重用

泄日夜無度積寒久冷臍腹疼痛不思飲食

陳皮

甘草炙

青皮去穢炒

當歸去蘆炒

芍藥炒

木香各一錢

乾薑力二錢半 罌粟炒 訶子煨去核二錢半

右爲極細末煉白蜜圓如芡實用水研化煮過食前服

水煮木香圓

罌粟去蒂蓋蜜炙黃

當歸去蘆炒

青皮去穢炒 芍藥炒 各四錢 木香二錢半

陳皮

訶子 煨 去核

甘草 炙 各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實太水研化煮過食前服

水煮木香膏 台嬰孩小兒脾胃受涼臟腑滑泄腹中疼痛日

夜無度腸鳴水穀不思飲食每欲痢吐裏急後重或下赤白膿

血

聖藥 設 去蒂蓋蜜浸炒

乳香

肉豆蔻 麩 去油 縮砂 土 設 各

乾薑 炮 一錢七分

枳實 錢 六分 當歸 去蘆 炒

芍藥 炒

木香 丁香

訶子 煨 去核

藿香葉 厚汁 薑汁 製

青皮 去穰 炒

陳皮 去白 甘草 炙 炙

黃連 炒 各 三錢 分 三錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用水半小鍾煮 箇上核

同煎三五沸食前服

胃風湯 小兒腹冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注  
下腹脇虛滿腸鳴疝痛腸胃濕毒下如豆汁或下餘血日夜無  
度

白朮

川芎

人參 去蘆

芍藥 炒

當歸 去蘆炒

桂 去皮

茯苓 去心

右咬咀用水入粟米百粒同煎食前稍熱服

純湯真人養臟湯 治嬰孩小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑冷

寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疝痛日久無



度胸膈痞悶肺肋脹滿全不思食脫肛墜下酒毒便血

人參去蘆

當歸去蘆炒

白木各二錢

甘草炙

桂去皮各八錢

肉豆蔻去油

芍藥炒

木香各一兩

訶子各二錢

罌粟殼去蒂

去蒂蓋蜜炙三兩六錢

右剉散用水煎食前服無瀉臍滑世忌酒麪生冷魚腥油膩之物久痢虛寒加附子炮去皮尖大棗三四片同煎服

真人養臟

芍藥

木香

當歸去蘆炒

肉豆蔻

去油

人參去蘆

甘草

罌粟殼去蒂蓋蜜炙各三錢一分

烏梅去核六分半

酸石榴皮

陳皮

赤芍藥炒

黃浦炒

白芍藥炒

厚朴薑汁炙炒 乾薑預

同參粉炒

訶子炮去核

地榆一名一錢八分六釐

右劉散用水煎食前服

參香散

治嬰孩小兒臟氣虛怯冷熱不調積在臟腑作成痢

疾或下鮮血或如豆汁魚腦瘀血或下紫黑血或赤白相雜或

成五色裏急後重日夜頻併膈脹絞痛甚不可忍及噤口疳壘

時癰諸痢無問新舊

人參去蘆

白扁豆炒去皮 木香各四錢

肉豆蔻新裹煨

茯苓去皮

陳皮去白

嬰粟散

去蒂去殼各二兩四錢

右為極細末用米飲調化食前服

地榆散

治嬰孩小兒冷執痢腹痛下痢赤白類併

地榆一分

甘草二分

芍藥一字

當歸去薑一錢

右剉散用水煎食前服

玄黃散

治嬰孩小兒春傷於風因天暖解脫為風冷所傷或

亡乳因三夏因飲食居處不調又被風冷乘之以入腸胃先後

重則下痢其冷氣盛則併下

定粉

海飄消

龍骨

青丹銀絹子同定粉

訶子炮去核一錢

右爲極細末用紫蘇米飲調化食前服

金鎖散

治嬰孩小兒又患赤白痢

性去皮薑汁炙黃連用吳茱萸同炒去吳茱萸

右爲極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

芍藥甘草湯

治嬰孩小兒血痢發熱

赤芍藥炒

甘草炙

黃芩炒

右咬咀用水煎食前服

導滯散

當歸去蘆頭

大黃紙裹煨

右剉散用水煎食前服下血出不禁止或瘀血在內胸腹脹

滿喘壅氣短加檀榔去臍

地榆散

治嬰孩小兒赤白痢發泄

地榆

訶子

槐花

枳殼

去穢麩

甘草

清散丸

赤芍藥炒

青礬

青皮

鹽石榴皮

右爲極細末赤痢甘草煎湯白痢乾薑煎湯或水瀉五倍子

煎湯赤白相參用米飲調化食前服

疳脾散 治嬰孩小兒置瀉下白痢如凍面青喘作渴不止

手足冷

木香

一錢半

甘草

一錢

五倍子

一錢半

白朮

一錢

沉香

神麩

炒冬一合

參藥也

陳皮

夫白

醫書卷之三錢

酸石榴皮 二錢

存為極細末用乾薑末飲煎粥飲調化燕白凍如雞卵白色  
用陳艾三葉煎湯食前服

人參養臟湯 治嬰孩小兒驚悸青色

人參 去蘆

當歸 去蘆炒

白石脂 煨

白朮

甘草 炙各一錢

右為極細末用米飲調化食前服

艾葉當歸湯 治嬰孩小兒白痢腹痛

艾葉 炒

當歸 去蘆炒

乾薑 炮

木香

訶子 炮去核各一錢半

右爲極細末用粟米煎湯調化或陳米飲食前服

香梅飲子

治嬰孩小兒腸胃受積脾虛下痢赤白腹肚疼痛

裏急後重黃赤五臟順益二焦陰陽既分腸胃自厚益生熟藥

而治冷熱病可謂功要而穩當也

木香

一片生

烏梅

半生半

當歸

去蘆半生半煨

甘草

半生半炙

陳皮

去白半生

半炒各二錢半

木香

一錢

黑豆

半生半炒三十粒

右咬咀用水煎生黑豈不可打破全用食前服

金粟圓

治嬰孩小兒下痢赤白水穀不化

黃連

炒

神曲

炒各一兩

川芎

枳殼

麩炒

穀粒升

赤茯苓

去皮

白芷

木香

各五錢

右爲極細末神麴煮糊圓如小米大用水飲不拘時服

生熟飲子

治嬰孩小兒虛積潮腹肚疳痛下痢裏急後重日

夜無度病有冷熱熱有生熟病有陰陽藥有造化有虛實有君

臣按君臣以理虛實分生熟而均冷熱治主本之法

聖藥殼

大者四箇一  
帶蓋內穰淨撈者佳

陳皮

二片半炙

甘草

二寸半炙

烏梅

二箇半  
煨去核

棗

二箇半煨去核

生薑

二塊指  
大半煨

木香

一錢作兩  
片半煨

訶子

二箇半煨去核

黑豆

六十粒  
半炒

黃耆

二片半炙

白木

二塊半煨

當歸

去蘆二十半煨

右各半生半熟咬咀用水煎任意服有生黑豆不要打破要



圓全同煎服

神仙救生散 治嬰孩小兒痢疾亦白晝夜百十行不止

續神

去腐切片炒赤色

罌粟殼

去蒂並鹽炒黃焦色各五錢另搗爲細末用銅鍋炒

右二味藥各白收用和勻紅痢審湯白痢沙糖湯亦白痢沙糖茶煎煎湯食前調化服忌食腥醃鹹生冷之物

疳

夫初生嬰兒者托質胞胎成形氣血誕生之後骨肉輕軟腸胃微細乳哺須要合宜臟腑自然調適若乳母寒溫失理動止乖違飲食無節甘肥過度喜怒氣亂醉飲傷勞即令兒成疳也百日已後五臟已訂乳食漸多不擇冷熱好食肥膩心食甘酸臟腑不調並生也

楊氏曰兒童二十歲以下其病爲疳二十歲以上其病爲勞疳  
與勞皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也疳者由小兒  
臟腑嬌嫩則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆  
乳食不調甘肥無節而得也或因嬰孩闕乳食肉太早耗傷形  
氣則疳自虛生或三兩醉後乳食稍多過飽無度則疳以傷得  
或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸停滯中脘則疳因積成或乳母寒  
濕失調飲食乖常喜怒房勞卽與兒乳則疳因母患傳氣而入  
此皆病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病因無津液而得也  
有因吐瀉之後妄施吐下津液虛渴得之者有因潮熱大下利  
無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏熱冷飲太過渴飲水漿  
變而生熱熱氣未散復干外邪得之又有積癥蒸熱膈下硬痛

或者不能漸與消磨遽以礪巴峻取津液暴傷得之者此乃醫  
誤藥壞病之過也

疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之必積者虛中  
之積治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫總補治積不可用藥  
峻取

錢氏曰小兒初病爲肥執而疳熱則涼之久病爲冷瘦疳冷則溫  
之小兒易虛易實服寒則生冷服溫則生熱峻取則再傷脾胃  
反所益疾上醫處此消積以和胃滋血和氣隨順藥餌以扶持之  
病家調節乳食以脾養之使榮衛調和臟腑充實若或過焉若  
子未保其往積者疳之母由積而虛謂之疳極凡有積者無不  
壯熱脚冷若積而虛甚則先扶胃使胃氣充實乃與微利急以

和胃之藥扶虛救裏如白豆蔻、薑、藟、藟、子、縮、砂、蓬、莖、我、水、消、積、等、藥、  
劑、疎、利、也、脇、間、癰、痛、亦、虛、中、之、積、先、寒、後、熱、飲、水、不、食、或、飲、水、  
而、致、喘、嗽、

錢氏有癖為潮熱之說法當解於寒熱即與下癖治療不一宜  
權度於此哉

湯氏曰小兒疳病乃庸醫之壞病也或因吐痢之後再施吐下  
致脾胃虛弱津液耗亡如日中潮熱乃心虛也肝為心母宜先  
補肝肝實而後瀉心必得母氣亡而內平潮熱自退庸醫每見潮  
熱妄謂其宜妄以大黃芒硝冷藥宜利既多津液內亡而成疳  
頭皮光急 毛髮焦稀 顯縮鼻乾 口噤唇白 兩眼昏爛  
揉鼻擗眉 脊脊軀黃 闔牙咬甲 焦渴自汗 尿白瀉酸

肚脹腸鳴

癖結潮熱

嗜嗜瓜菓

鹹酸炭米

泥土而飲

水占飯者

皆其候也

疢曰五疢

病關五臟

以臟別之

自然生疢

久吐

久瀉

久痢

久渴

久汚

久熱

久瘡

久嗽

久血

久淋

五疢在臟

目不轉睛乾啼少淚其病在肝

瘦粹少血舌乾多啼其病在心

搭口癢睡胸脘乾渴其病在脾

殷焦皮燥大便乾結其病在肺

身熱尿乾手足清冷其病在腎

菓實甘甜和乳食

交他臟腑有多般

因此腹中皮

肚上青筋作一團

朝夜渴瀉身壯熱

口瘡眼腫面如盤

取轉虛中疳積病

補利調脾治得安

頻頻飲水心臟疳

目青脇硬定連肝

肚尚展白脾中起

喘甚鳴籠肺裏藏

好喫土泥愛餌酸

賢疳之候細審看

專心若會通神訣

死後分明有數般

惡哭疳疔痛咬心

吐涎積冷痛難任

每食甜物并桃李

致死蟲生病轉深

喫泥愛土面青黃

本是脾家每被傷

腹痛氣攻蟲上嘔

發熱虛汗不曾涼

小兒喫土面痿黃

髮立毛焦手腦瘡

蓋為臟中積積熱

難消乳食胃曾傷

搖頭揉目熱攻肝

愛暗增明不欲觀

雀目母因風熱盛

斑疹肺腑翳睛漫

渾身熱似火手足冷如冰

腹大時加渴

皮膚盜汗蒸

疳眼最羞明才開泪又傾

肝心俱積熱

生膜翳遮睛

氣血未堅全因傷積不痊

朝昏寒熱作

頭額汗相連

日夜頻啼叫蟲生作毒涎

面青多口水

錫菓不宜餐

溫壯痿黃色多端不阻食

吐高青脈見

瘡癬滿身斑

糞白蟲頻出眉踈手足乾

尿時如米汁

此證是諸疳

虛黃如熟李疳水定無疑

氣聚膀胱內

陰囊腫似吹

小兒無辜疾皆因母所爲

若能精慎護

何得漸疔羸

驚撲成風急

寒暄卽氣痿

那得食兩乳

何間著

喫物無令早

學言一作行不怕遲

論中八不許

方內一難醫

腮腫肝還盛

脊高力已衰

頭皮光躍

首髮白稀稀

肝壅侵雙目

皮黃入四肢

肚大非爲飽

口讒不是飢

胸中常痞悶

喘息轉殷恸

畫鼓何曾打

綉衣無意持

枕肱須速理

硬氣致身危

油沫汗不理

糞黑不須齋

不專求龜鶴

有意叩神祇

父母情懷測

仙方還自施

神功虛藥

得效用烏犀

堪施調理者

方知有妙奇

雖然黃髮子

變作化生兒

惜勞患瘦

寒熱作連綿

成疔久不痊

髓中蒸滯作

骨血漸羸乾



四躰如枯竹 毛焦皮魚斑 舌瘡無齒露 難保此生痊

驚疳相傳

驚病無疳病 相傳心與脾 滋煎多愛哭 憔悴漸疳羸  
驚熱便黃沫 疳寒尿白脂 睡中眠不穩 遍躰有瘡痍

疳證

小兒五疳 因過多食 或因甘甜 驚氣入腹 或緣患後  
不長肌肉 致成疳疾 不思乳食 朝好暮惡 或發潮熱  
四肢羸瘦 腹急三熱端 頭髮稀疎 喜食泥土 變成疳勞

肝疳白瘦

肝疳白瘦眼中眵 怕日羞明淚不乾 交甲挫頭肌躰瘦

腹中堅癖塊多泄

消食

心痞松少精先

壯熱唇紅面色黃

才卧皮膚流盜汗

睡中驚大驚恚怒

脾疳腹脹

脾疳腹脹肚赤黃

食物難消又滑腸

揉鼻揉眉多愛吐

蛔蟲和糞瀉非常

肺疳咳嗽

肺疳咳嗽肺疳癰

喘急痰涎氣力多

疥癩皮膚生瘡痒

頻頻喫食口多飢

腎疳骨熱

腎疳骨熱上偏隊

齒黑唇焦瘡匿鼻

增寒壯熱手如冰

每夜驚刺不穩睡

肝風疳

搖頭揉口鼻 白膜眼中縷 楷磨常淚出 兩目不嘗乾

顏容面青色 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

心驚疳

渾身壯熱甚 四肢全不任 面黃并臉赤 怕冷愛重衾

口鼻常乾燥 根源即漸深 只因驚撲着 此病本從心

脾瀆疳

食物難消化 情中愛喫泥 腹高青脉起 頭髮薄稀疏

喘息饒呵欠 無歡只欲啼 痢多酸餛臭 此病本從脾

肺氣疳

喘多并救逆

口鼻脛生瘡

昏昏饒愛睡

軀瘦又滑脫

四肢無氣力

容兒不同常

瀉膿并吐血

此病肺家傷

腎急辨

瀉痢時頻并

吐逆轉加深

大腸紅頭脫

壯熱無腹驚

乳食全不進

手足冷如冰

急辨難治療

此病腎家因

小兒五臟發疳歌

肝

肝臟目頻痛

雙眸又不開

吐刺頻頻盛

疳蟲瀉出來

眼溢尊思睡

唇青淚滿腮

必竟毒時發

此病是肝來

心

心臟渾身熱

四肢力不禁

面黃兼頰赤

怯冷愛會食

口鼻干燥

根源積漸深

百上瘡斑點

此病本從心

脾

脾臟精神好

早晚辯疳類

吐出還飢飯

見泥便欲塗

莫教傳臟腑

他時即便難

醫士多不識

此病在脾間

肺

肺臟連時發

咽痰不出聲

口唇齒根鼻爛

腹脹幾時輕

肚鳴下部痛

脫肛腎未徵

小兒後轉加甚

此病致之形

腎

腎臟腰間氣

尋常祇愛驚

六寒中米不化

皮膚瘡疥起

疝氣陰沉久

手足冷如冰

口內瘡膿出

此病腎中生

五藏五疴五般看

治法詳推重

若見面黃肌肉瘦

齒痛髮脫即爲疔

身軀如柴 頭皮紫黑 目黃睛散 喘促心陷 兩脇凌癢

刺痛氣短 皮生紫瘡 牙斷黑爛 舌如白梅 乾噦塞噎

乳食直瀉 唇臉如稿 皆不可治

喘促目睛黃 頭皮紫黑光 龜胸心下陷 鋸脊舌喉瘡

手足如乾竹 枯蘊氣血傷 諸疔若有此 死證不相當

諸疔惡證

肝疔左脇結硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣不治

心疔飲水不化食則驚啼耳邊紋多舌上黯黑不治

脾疔喫泥泄痢水穀不消唇白腹高人中平滿不治

肺疔咳逆氣促頻瀉白沫身上粟生其色斑黑不治

腎甜飲水好鹹小便如乳耳焦眉髮牙黑骨枯不治

五絕不治

其脈清泄不休脫肛掣逆抱起昏沉手足垂軟視及脚心全不知覺項筋舒展身軀變冷是則爲五絕證候甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿下痢腹脇脹痞皮發紫瘡肌肉光紫與夫疔勞瀉渴面槁色天骨露齒張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞焉石韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不猥褻者難矣丁奚哺露腦疳瘡非胎中已受之病乎不持此爾兒方周粹母復有孕乳汁成毒欬嘔小兒神氣亦致昏之冠羸是謂之魁病凡此等類盧扁復生難施其功余以終篇所以爲之抽關啓鑰云

一切疴後變作死候

手足如竹筒口舌上黑白瘡發喘渴熱

身軀如柴無肉色青黑耳鼻生瘡

目如碧色身軀乾枯吐出不沫瀉下白蟲

龜胸鋸脊氣喘口舌生瘡喉中涎噎

解頰鶴膝下瀉如米泔外腎黑糞門如竹筒

肚大青筋乳食即吐塞噎手足細軟不能行

忽吐下黑血連蛔并小白蟲出無數

手足鼻耳口舌後胎生黑大腫毒瘡不乳

腹中刺痛面青黑吐瀉下黑血并蛔等蟲

手足四肢如冰頭項拘軟不收口伴痰流



五疳保童圖 治嬰孩小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑相調乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及百醉以後五歲已前乳食漸多不擇生冷好餐肥膩甘酸之物即成五疳

一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而臥目中溼痒肉色青黃髮立頭佳筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚蓋脫瘦

二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胸膈煩汗鼻乾心燥口舌生瘡利久不痊多下膿膿血有時盜汗或乃虛驚

三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣麤乳食不多久心腹脹滿多嗜食逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅滯水穀不消口鼻

常乾好喫泥土情意不悅愛憎憎明腸胃不和痢多酸臭  
四日肺疳其候咳嗽氣逆皮焦此佳饒涕多喘咽候不利鼻  
咬甲壯執憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸  
不調頻頻洩痢糞中米出皮上粟生

五曰腎疳其候肌肉消瘦齒齩生瘡寒熱作持口鼻乾燥壯熱  
如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門  
不收疳瘡疼痛是走馬疳已下疳疳皆治療

蟾蜍一名蟾 熊膽一錢

麝香五分 胡黃連 黃連炒

白鮮頭又名黃無炒 白蕪菜充代 草龍膽土蒼

雄黃水飛 青皮去穢炒 五倍子

夜明砂微炒

苦楝根

天葵子炒

青黛各二錢半

右為極細末，糯米飯圓如黍米大一歲二圓，用米飲不拘時候，日進三服。

消疳肥兒圓

蘆薈一錢

胡訶連

史君子去殼

青艾去穢炒

黃連炒

陳皮去白

羊龍膽去膚

三棱炒

蓬莖木煨

鐵砂去粗

芒硝去粗

白木

雲母去粗

木香

香附炒

礞石去粗

夜明砂炒

檀榔去粗

各二錢半

何皮 炒二錢

人參

去麩二錢半

無美

枳實 炒二錢

羅漢子

炒各三錢一兩

神麩 炒

麥蘖

炒各五錢

與胡 去蘆三錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食遠服

廣會圓

治嬰孩小兒食肉大半生蟲積發熱脾泄

廣會 一錢

無美

檳榔 去麩

青黛

黃連

炒各二錢

胡黃連 五錢

蟬蛻 去足二錢

麝香

一兩

右為極細末豬膽汁圓如黍米大用米飲食後服

香積散

治嬰孩小兒百日內下糞有蟲如頭髮

木香

甘草

炙各一錢

檳榔 去麩二錢

史君子

去殼  
七箇

麝香

一字

右爲極細末用茶飲調化食前服

消疳圓

治嬰孩小兒諸疳面合地臥多睡如醉腹脹面黃

聲啼叫心痛口乾糞下有蟲蓋由曾喫不熟肉食

檳榔

去殼三箇  
煎去皮二錢

蘆薈

夜明砂

二錢

史君子

去殼二箇  
黃連炒三錢

苦練根

地內者去皮五錢

右爲極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

肝疳即風疳

由乳母不調肝臟受熱所致也其乳母寒喧不調滋味不節

外感風寒內傷喜怒邪氣未撤遽爾乳兒多成風疳疳者腹之

候上膈伏熱痰涎雍滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛膜以蒸

膏後松骨情雀言甚至經月眼合亦名疳積以外餘

搖頭揉目 白膜遍睛 眼青淚多 翳生髮立 筋青腫痛

甲癢筋攣 燥多汗多 下刺搶癢 謂之肝疳

天麻圓 治嬰孩小兒肝疳風相疳眼

青黛 黃連炒 天麻

夜明砂炒 川芎

五靈脂 水飛各半錢 防風 去毒又

蠶兒 去足七分 全蝎 去毒炒 煎茶

燈頭 大二錢半

右為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用薄荷煎湯食遠

服

銀圓子

治嬰孩小兒肝疳脹青白眼睛痒按之變黃面合地

而母

龍齒 煨二錢

茯苓 去皮

羌活 去蘆

黃芩 炒

茯神 去皮木

狗脊 去二錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大銀箔薄為衣用米飲食遠服

雞心圓

治嬰孩小兒肝疳面黃黃按之變黃面合地

檳榔 去脂三箇

赤芍藥

龍膽草 去蘆

羌活 去蘆

獨活

川芎 各二錢

皂莢 燒存性三錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用熱水不拘時候服

生熟地黃湯 治嬰孩小兒疳眼閉合不開內有痰

生地黃

熟地黃

各五錢

川芎

赤茯苓

枳殼

去穢炒

杏仁

去皮尖炒

黃連

半夏

大麻

煨

地骨皮

甘草干姜各二錢半

右咬咀用生薑三片黑豆十五粒同前臨睡服

心疳即驚疳

由乳母不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生  
難滯內有滯執未得疏通故心驚鬱而作驚疳外證

身體壯熱

臉赤唇紅

口舌生瘡

胸膈煩悶

小便赤澀

五心皆熱

大泄汗發渴

齒齲虛驚

謂之心疳



茯神圓 治嬰孩小兒心疳驚疳

茯神去皮木

琥珀

黃連炒

赤茯苓

去皮各三錢

釣藤皮

遠志

去心生薑製

蝦蟇

去頭煨灰各二錢

葛蒲

細節一錢

麝香一字

蘆薈半錢

右爲極細末粟米煮糊圓如黍米大用薄苧煎湯食遠服

龍膽圓 治嬰孩小兒心疳頰赤面黃鼻乾心燥口内生瘡驚悸煩渴頭髮作穗

龍膽草十五釐

赤茯苓

去皮各四錢

黃連炒

胡黃連各二錢

朱砂

水飛半

麝香一字

右爲極細末煮麪糊圓如黍米大用熱水食遠服

脾疳即食疳

由乳母不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷  
過傷或飯後與乳致使吐乳多眠久則變為乳癖  
腹脹結塊亦名疔疳外證

面黃身黃 肚大脚細 吐逆中滿 乏力嗜啼 水穀不消

泄下酸臭 合面困睡 咸食喫泥 謂之脾疳

靈脂圓 治嬰孩小兒脾疳食疳

五靈脂 水飛 縮砂 去殼 白豆蔻 去殼

麥蘖 炒 蓬莪木 煨 青皮 去穢炒

芡若子 去殼 蝦蟇 炙焦 橘紅 去白各一錢

右爲極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

雞肉前圓 治嬰孩小兒脾瘕面足痿黃心腹膨脹滿身痲疹  
乳食不進好喫泥土潮熱往來焦啼出汗

蘆薈

人參去蘆

北柴胡去蘆

史君子去殼

胡黃連

黃連炒

燕美

去殼炒各三錢

右爲極細末拌和用黃雌雞一隻重斤籠者專蘇子飼之  
至三日依事治法去毛令淨放於簪後開孔去腸肚淨拭乾  
入前藥在雞腹內以線縫取小甌先以黑豆鋪甌底厚三寸  
實雞於甌中四傍亦以黑豆圍裹上亦以黑豆厚三寸蓋之  
自日出時蒸至晚候放冷取出雞骨淨將肉研細酒煮麩糊圓  
如黍米大用水飲食遠服

捉疳圓 治嬰孩小兒疳積胃受疳而黃腹脹多睡如醉愛喫生

米紙炭礮丸上泥十

丁香

木香 各一半

黃連 炒

蕪荑

去皮炒

蚌粉

神麴 炒

三稜 煨

青皮 去穰炒各一錢

右爲極細末猪膽汁煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

肺疳即氣疳

由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其  
不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢疳  
是爲鼻疳其瘡不痛汗所流處隨即成疳亦名疳蠱外證  
咳嗽喘逆 壯熱惡寒 皮膚粟生 鼻癢流涕 咽喉不利

頤爛唾吐

氣脹毛焦

泄痢類併

謂之肺疳

清肺飲

治嬰孩小兒肺熱疳積  
聖藥乳汁臭或生息肉

桑椹白皮炙

紫蘇葉

前胡

去蘆

黃芩炒

當歸

去蘆炒

天門冬

去心

赤茯苓

去皮

桔梗

去蘆炒

連翹

防風

去蘆炙

生地黄

甘草

炙各一錢

右咬咀用水煎食後服

化屋圓

蕪荑

去皮

蘆薈

青黛

川芎

白芷

胡黃連

黃連炒

蝦蟇

炙各一錢

石為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用杏仁去皮尖煎  
湯臨睡服

龍腦膏 治嬰孩小兒肺疳鼻下赤爛頭髮焦乾揉鼻猪胆汁

下血痢

龍腦一字

朱砂一錢

釣藤

赤茯苓 去皮

人參 去蘆

甘草炙

夜明砂 各一錢半

石為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食後服

鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗俟服化蜜圓進數服後用

青黛

當歸 去蘆

赤小豆

瓜蒂

地榆

黃連 炒

卷之八  
雄黃

少

有為極細末入量歛瘡

腎甘即急甘

由乳食不調臟腑伏熱遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口  
瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢疝爛濕環生瘡療治不痊  
精髓消耗難以有膠蟲者隱也且為濕陰多因疝傷久痢腸胃  
受濕得之壯如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬為喻初作口氣名  
腎王虛纒受熱邪疝氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名  
曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血逆出名  
曰宜露甚者牙皆脫落名曰齋根其根既齋縱得全活齒不穩  
主矣外證

腦熱肌削 手足如冰 寒熱時來 滑泄肚痛 口臭乾渴

齒齩生瘡 瓜黑面黧 身多瘡疥 謂之腎疳

泄黃圓 治嬰孩小兒腎疳

熟地黃

四錢半

赤茯苓

去皮

山茱萸

去核

當歸

去蘆

川芎

川棟子

去皮核

牡丹皮

山藥

史君子

去殼各二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用滾白湯研化食前服

殺疳圓 治嬰孩小兒腎疳面無顏色面黃身瘦齒齩臭爛出血

不思飲食

木香

肉豆蔻

去油

胡黃連

夜明砂

茯苓

去殼各五錢

麝香

一分



右爲極細末糕圓如木米大用米飲食遠服

雄黃散

治嬰孩小兒腎疳又名急疳又名走馬疳齒齦言露

臭爛出血

雄黃

如菜豆  
大七粒

雄棗

去核七箇

右將一粒雄黃入一箇雄棗內將小鐵線纏定留三四寸  
長用油燈上燒以東外黑內乾爲度將碗合定再燒第二箇  
如前法候燒得一箇爲度少時爲極細末少許乾擦牙齦臭  
爛出血處停少時嚼去涎再擦以血止爲度

疳蟲

近疳出蟲者疳傷之源雖起於乳哺不調然臟腑停積已久其  
不化而爲蟲其蟲如絲髮或如馬尾多出於頭項脰背之間

赤者可治青黑者則難療也

大毒

無英

鯨魚

鱗鱗

蝦蟇一名鱉各

蘆薈半錢

右為極細末雄猪膽汁圓如赤米大用陳米飲或史君子去  
蒸照湯凡蟲月首則頭向上凌早晨服

蛔疔

蛔疔者夫乳飯早食肉大早或腸胃停蓄甜膩化為蟲計證

皺眉多啼 嘔吐清沫 腹中乍痛 肚脹青筋 唇口紫黑

腸頭濕癢 謂之蛔疔

脊疔

脊疔者蟲銜脊骨身熱腫黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴  
脊骨如鋸齒或一指生瘡頻啣瓜甲是也

下蟲圓

新苦棟根皮

貫衆

木香

桃仁

云皮尖炒

黃芩炒

檳榔

土厚各一錢

鶴虱

沙一錢

輕粉一兩

蟾頭

一錢

史君子

去殼一十五箇

加當歸

去蘆炒

黃連

炒各一錢

右為極細末蒸餅圓如茶米大用肉汁湯食煎服

腦疔

腦疔者腦中素受風熱生下乳餅失常頭以手摩頭者為也



麥冬白朮散

黃連圓

治嬰孩小兒疳積

黃連

雄豬膽汁浸一夜

瓜蒌根

烏梅

去殼

杏仁

去皮尖

蓮肉

去心

茯苓

去皮各二錢

右爲極細末牛膽汁浸米糕圍如黍米大用烏梅生薑蜜同煎湯食遠服

全生方曰凡疳病皆因津液亡竭飲食之中入藥食之  
王氏曰仍以前藥加黃連入豬肚內縛口煮爛入臼內杵細末  
圓用米飲食後服生津清心止渴調脾諸肝常服

疳瀉

疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是也勿用藥  
藥止之

歌曰

小兒疳瀉時 連軟睡如癱 此瘵名疳注 醫士細意着

香薷圓 治嬰孩小兒疳瀉

黃連 炒

肉豆蔻 生

木香

訶子 煨去核

縮砂 去殼

茯苓 去皮各一錢

右爲極細末白米飲圓如黍米大用木飲食前服

疳痢

疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頰  
下惡物是也

木香圓

治嬰孩小兒疳痢

黃連炒三錢

木香

厚朴黃汁製炒

縮砂去殼

夜明砂隔紙炒一錢

訶子煨去核一錢

右爲極細末飯圓如黍米大用艾生薑同煎湯食前服

香橐圓

史君子去殼一兩

訶子煨去核二錢半

神麩炒

麥蘖炒

甘草炙

厚朴薑製炒各一錢

橘紅去白一錢半

木香一錢二分

右爲極細末凍白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

疝脹滿

湯氏曰此瀉與積瀉相類但真如抱退雖瀉又不頻又不如  
水聚作一次口難得止實者且微取積

人參散

人參

去蘆

白朮

黃芩

各一錢

茯苓

去皮

甘草

炙各二錢

史君子

去殼五錢

白薑

五錢

胡黃連

丁香

各二錢

木香

一錢

肉豆蔻

麩炒煨去油一錢

右爲極細末用陳米飲調化食前服

六神圓

肉豆蔻

麩炒煨去油

木香

丁香

各二錢半

訶子

去核一錢

史君子

去殼一錢

廣蒼

半錢



右爲極細末粳米飯圓如黍米大用米飲食遠服

肝腫脹

疔腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令時時腫脹由是脾胃復受濕腎中不能宣導故令頭面手足浮腫是也

積圓子 治嬰孩小兒疔腫脹

蘿蔔子 炒五錢

陳皮 去白

青皮 上曬炒

檳榔 去臍

一星牽牛 炒

五靈脂 水煎

赤茯苓 去皮

三達莪木 煨

木香 各二錢半

右爲極細末飛麵煮糊圓如黍米大用紫蘇桑根白皮同煎湯不拘時候服

異香散 治嬰孩小兒疔積 腫脹調脾胃

三棱炮

蓬莪木炮

青皮 去穢炒

陳皮 去白

半夏麩

藿香葉

桔梗炒

益智 去殼

枳殼 去穢麩炒

香附子炒

縮砂 去殼各五錢

丁香 錢

甘草 炙一錢半

右剉散用生薑二片棗一箇去核同煎食遠服

疳勞

疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸咳嗽枯悴是也

渴而復瀉 飲水惡食 肚硬如石 面色如銀 斷不可治

黃耆湯 治嬰孩小兒疳勞

黃耆蜜炙

當歸去蘆炒

川芎

芍藥炒

生地黃

蝦蟇炙去足

鱉甲

醋炙焦各錢半

人參去蘆

茯苓去皮

橘皮

去白

半夏麩

柴胡去蘆

史君子

櫻去殼

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

煎血煎

人參

去蘆五錢

川芎

蕪荑

柴胡

去蘆各兩

史君子

去蘆二兩胡黃連

黃連

炒各二兩

石用鱉血一盞吳茱萸一兩和黃連淹一宿次早炒乾

透去惡米更淨血只用一運  
餘藥杵搗極細莫粟米粉糊  
圓如黍米大用熟水食前服

猪心圓

木香

黃連炒

生地黃

柴胡

去蘆冬  
五錢

鱉甲

九筋者童子小便浸炙一兩

方為極細末猪肚一箇入藥在內縛定口入瓦瓶煖取出  
杵搗壯藥圓如黍米大用米飲食前服

無辜疔

無辜疔者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲  
如未粉不速破而去之免蟲隨熱氣流散滯蝕臟腑以致生瘡  
癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭暈骨高是針刺破膏藥貼

丁癸

其若手足極細項小骨節削然痿廢大臍突號哭胸陷或生  
穀微是爲丁癸之證

丁癸者由乳食過厚脾胃虛弱不能磨消哺食不化則水穀之  
精耗損無以榮其氣血故肌肉消瘦面黃腹大頸小者是也

哺露

虛熱往來頭骨分間  
飢食吐蟲煩渴嘔噦此三者皆柴骨枯露  
危矣

哺露者因乳食不化傷於脾胃致脾胃衰弱不能飲食血氣耗  
損不榮肌肉而菜  
積滯不通此作潮者是也

于矣哺露者皆因脾胃虛弱不能消化水穀以榮其氣血而積

瘦腎氣不足復爲風冷所傷復骨枯露有胎中受毒  
致之此皆無辜積類之疾病而至此不幾殆哉

丁癸噴露證

皮膚蒼黑斑

枯焦肚大作

渴熱項弁寒

乳食隨便出

如膿瀉數般

舌喉瘡白滿

父母轉悲酸

久積成疳因失治

肚高頸細變丁癸

更無手足如筒樣

面白血黃汗不時

積得疳後曰丁癸

補露因而又得之

腹大青筋蟲滿肚

吐頻瀉數急調脾

十全丹

治嬰孩小兒丁癸噴露

青皮

去穢炒

陳皮

去白

二稜

炮

蓬莪木

炮

川芎

白豆蔻

去殼

檳榔去穢

縮砂去殼

史君子去殼

木香各五錢

蘆薈一錢

丁香二錢

蝦蟆煨

香附炒各三錢

右爲極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用米飲食遠服

醍醐散 治嬰孩小兒吐瀉後調和脾胃進乳食及丁奚疔瘡

虛熱煩渴

陳皮去白

縮砂去殼

厚朴薑製炒

麥蘖炒

烏梅各五錢

良薑用東壁土炒

葛根

烏藥各二錢半 草菓炮二錢

甘草炙三錢

右以咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

冷熱疳

馮多膿血口加瘦弱

通神固 治嬰孩小兒冷熱疳

胡黃連

黃連炒各三錢 木香

蘇萸各二錢

丁香

肉豆蔻生

史君子

去殼各一錢半 煨麻黃去骨一錢半

右爲極細末煨麻肉圓如黍米大用米飲食前服

冷疳

湯氏曰小兒冷疳多渴好卧冷地乳食不進漸成羸瘦其證難明有甚無大便滑泄此證錢氏木香圓服病愈可服有效驗其病在內痢色無常其末青白肢躄軟弱目腫面顴遂致遍身熱



瘡煩渴不已

木香圓

在瀉門

猪肚黃連圓

猪肚一具

黃連七兩

右剉水浸濕納猪肚內縛定口入粳米飯上蒸爛安石臼內入麥飯杵括圓如黍米大用米飲食遠服後用

川芎

生地黄

茯苓去皮

茯苓去皮

甘草炙

右咬咀用水煎食遠服調血清心用薑薑圓肥地圓合服佐之可也

方

大腹皮

苦參

白芷去蘆煎湯洗

肥熱疳

小兒初病謂之肥熱疳其候

病多在外 鼻下赤爛 頭瘡濕瘡 五心煩熱 欲食不食

渴飲冷水 煩燥臥地 肚熱足冷 潮熱往來 乃欲傳疳

補脾進食 磨積消疳

肥兒圓

巴豆

去油心皮膜石剉將巴豆炒少時傾出留殼去巴豆不用

青皮

去穢

陳皮

去白各五錢

三稜炮

蓬莪朮炮

神曲炒

麥蘖炒

川棟子

去穢

黃連炒

史君子

去殼五錢

蕪荑

蘆薈各一錢

胡黃連

二錢半

青黛

殺蘇去足殼一錢半

右剉一處入銚內用前已豆微炒去巴豆和前藥為極細末  
煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

凡久積欲傳疳候宜作虛中積治之虛則補而後取實則取而  
後補切不可使用胡黃連蘆薈治補服胃脾散磨積消積藥之

五疳潮熱

小兒肚脹髮焦切不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別證難治

胡黃連

五錢

五靈脂

水飛一兩

右為極細末雜猪膽汁圓如黍米大用米飲食遠服

取胎毒者取而後補虛者補而後取當以補脾胃

淡豆豉

卜粒

巴豆

去油膜心二箇

右并如丸圓如黍米大用生薑煎湯食前服取下魚鱗

除痰

取交如一切疔毒

夜胡砂 五錢

右入瓦瓶內取精猪肉三兩薄切入澆內水煮取肉干前與  
兒食澄猪肉汁令兒飲汁食肉取下腹中胎毒次用生薑四  
兩和皮切炒黃連二兩一味爲細末煮麪糊圓如  
黍米大用米飲食前服

疳啞不言

肥兒用蘇合香入朱砂五靈脂爲細末煉白蜜圓如黍米  
大用石菖蒲煎湯不拘時候服

魃病 音奇

小兒所以有魃病者是婦人懷娠有惡神守其腹中胎妬嫉也  
小兒今病也魃者小鬼也妊婦人下地招數魃人時有此爾  
魃一為疾喜微做下痢其熱或有土金臺毛管長髮不悅是  
其證也

婦人先有小兒未能行而母更有娠使元飲此乳亦作魃也令  
兒黃瘦骨立髮落壯熱是也

阮氏曰小兒一二歲面色極黃乳食不消腹脹如絞或生青筋  
百斬羸瘦此由乳母兒未斷乳而又育孕其乳名曰愛妳小兒  
急之致有此疾

真以論小兒魃病者婦人懷娠惡神導胎中魂識嫉妬小兒

致令此病其壯微微下而寒熱來去毛髮等髮神色不悅等鑑  
云魃病是小兒鬼也蓋凡有病即腹中子之魂識疾也非母  
之魃子緣不靈字婦身凡小兒眼淨豈而致患以愚觀之既言  
嬰兒眼淨豈而得之其語嬰兒未能言安能有是語也又所言惡  
神導胎鬼神之事吾亦難明一說俱未之信也要之積神成胎  
其子必靈孩鬼成胎其子必怪靈子者如后稷端木賜是也怪  
子者如漢末之時三頭二首是也今之小兒形像於形既非其  
靈又非其怪一旦受病證可謂惡神導胎者乎蓋婦人妊娠之  
時氣血不榮或頭疼嘔吐或胎動不安或氣溜不注經絡澀滯  
乳脈不調將乳飲之令兒面黃腹脹臟腑不調寒熱來去毛髮  
鬚髮精神不悅日漸黃瘦者乃是飲母魃乳故也皆非惡神鬼

疔為之其間有兒飲喜乳怒乳熱乳寒乳氣乳病乳壅乳醉乳淫乳亦令兒病斷乳小兒必無疔病如母有病孕小兒飲別乳亦無此患證類本草云小兒繼病因母有娠乳兒有病如瘡疔他日亦相繼腹大或瘡或發其有受胎或實或虛寒或大飽而大飢或大醉而大勞至大雨大雷大寒大暑及陰陽不等犯諸禁忌受胎之氣令兒生下故多在懷抱中且有是病也所謂惡神傳繼之說蓋因此證而妄云也若夫靈字怪者是必有說焉

小兒有患疔病者非五臟傳變亦非六腑所主也緣兒生後方且周時母後有孕血氣所滲分之兩端是故胎胎漸傷乳汁成毒虛邪相攻兒勿致疾歛率其氣鬱傷其神魄令兒疔瘡疔瘡

括痺煩燥朝昏嘔噦日夜不可復寐理但速與斷乳溫平胃  
氣和順血脉自然而愈其有萎悴致痰乃成無辜證候何足怪  
訝者耶

龍睛湯

治嬰孩小兒疳病

龍睛草

去麩

釣藤

炒

柴胡

去麩

桔梗

去蘆炒

芍藥

炒

川芎

茯苓

去皮

甘草

各一錢

人參

去麩半錢

大黃

濕紙裹煨一錢半

右剉散每服

一錢用井水煎食前服仍以紅紗袋袋夜明砂與

兒帶

鬼胎



婦人產育有患鬼胎者廣都謂婦人納鬼之氣而受之者非也  
鬼胎者乃父精不足母氣衰弱滋首濇派之不及護愛安存之  
失調方及七八箇月以生又有過及十箇月而生者初產氣血  
虛羸降誕艱難所言鬼者即胎氣怯弱榮衛不克致子萎削語  
猶如菓子結實之時有所墜藉不到灌溉爲物偏小其形猥褻  
無有可愛如此之謂胎氣陰萎常與圓散挾乳哺勻調氣血  
克蔭腸胃固壯即保其靜善蓋由受氣不足稟賦不全忽爾橫  
殤非可惜耶

陰囊痛

人有常言天生地長多與小兒近地然見有大小壯弱起中  
節可也夫尙賢經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經之風

邪滯氣傷之石爲陰腫聚布矣間有嗝噎怒氣閉繫於下結聚不散以水實不行亦能發爲此疾

揚氏曰腎主納氣乃人之氣海焉腎氣爲風寒所乘爲暑濕所鬱爲膏怒驚恐所傷而水結又散又焉氣搏邪聚於中爲疝爲奔豚爲小腸氣爲膀胱等證不特外腎小腹作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或邪氣搶心心下痛滿或痛流臍傍或脇之左右如孟或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘腹大如盤或壯熱惡寒或洒泝寒熱有大小便秘者有裏急而下泄者其於陰間則卵有大小申縮上下不當囊有腫脹急痛而發欲無定文冷驚怒則塊物上逼囊根或攻腹脇皆謂腎氣

治法大綱風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水驚怒

則謂其心氣水與氣搏則行其小便其間又以治腎氣藥療之  
大便流行踈利爲先母曰腎虛不敢踈泄蓋腎氣壯氣所干若  
非虛病何由愈倘或姑息思及虛妄投剛補之劑大小踈秘而  
不通邪氣入腹冲心危殆心矣然腎氣雖虛得之當明冷熱及  
冷熱不調之證冷者脇邊及外腎清冷小便清而多過寒則發  
熱者內夾者氣或積酒毒熱則外腎與小腹俱熱小便數而  
泄瀉熱則甚冷熱不調者小便以外腎下冷乍熱大小便或泄或  
利用藥溫涼流行踈導於其下矣若逆氣長吁中脘停酸燥悶  
嘔吐最惡候乃天一生水腎主三焦筋脈於陰器必藉陽明得  
土以養今脾土未強腎水既涸脾土又二重陰陽不升降榮衛  
不流行大小便秘滋腎汁胃中必爲酸汁而暴吐者大抵難治

巢元方論曰諸筋會於陰器邪客於厥陰少陰之經與冷氣相搏則陰囊腫痛而引縮經中雖分四證曰腸癰氣癰水癰火癰然小兒患此若治之不早則成癰疔如腹則腹痛冷汗目出而陰囊二子澀縮入腹痛止方出名芫芎內蘗有陰壅全縮不見有陰囊足腫不見此因肝腎氣宜以橘梨子仁煎湯服又曰由腎虛或坐地爲風冷浸氣侵襲或爲地龍所吹或啼叫怒氣結聚或水道受熱澁滯而成

經曰癰癢疝膚脹者陰亦盛而股脹不通故曰癰癢疝由是觀之乃陰氣盛而致有此對縮者筋急也筋遇寒則汗縮遇熱則弛張故三因所用方法以寬小腸氣疎風爲治然小兒此證多因坐陰潤之地感風濕而得有外腎無故而膚囊腫大不燥不

痛光亮如吹此名氣虛外腎膚囊亦腫通明及女兒陰戶腫脹乃心熱之所得也

陰囊腫痛

厥陰少陰寒激搏致令腫縮且溫藥光浮不痛作虛治亦腫須憑涼劑却

浮囊腫痛

浮轉尿時痛尿時恰似常非干淋瀝病一氣壅結膀胱香木香湯治嬰孩小兒陰囊無故而腫或痛縮初因陽明有風熱濕氣相傳所以如是法當寬此一經其證自愈蓋陽明受病不能養其宗筋故也

青木香

去蘆一

枳殼

去穢炒

甘草

炙一錢半

右吹咀用水煎食前服

牙消散

治嬰孩小兒膀胱久受熱毒致陰器腫痛亦腫脹痛

赤小豆

赤芍藥炒

枳殼

去穢生

朴硝

商陸

右爲極細末用栢樹枝煎湯候冷調塗患處照三五次散如車  
前子薏苡仁用水煎食前服

天花散

治嬰孩小兒外腎腫痛

天花粉一兩

甘草

炙一錢半

右吹咀用水煎入酒食前服

桃仁圓

桃仁去皮尖麩桂去皮

牽牛炒頭末

疾熱

牡丹皮 各一錢

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用青皮木香葱白入煎少許同煎湯食前服

三白散 治嬰孩小兒解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風濕相乘

桑根白皮炒

白朮

木通去皮節

陳皮去白

白牽牛半生半炒

甘草炙各五錢

右咬咀用水煎食前服

母蠣散 治嬰孩小兒外腎腫大莖通明

母蠣粉

方為極細末先以津唾塗腫處次以母蠣粉傅

如腫

外名膀胱內爲腎臟一處承受三經所傳其外腎爲熱皆曰心  
氣主之心經有熱熱入小腸或赤或白或淋或澀心經有寒寒  
流膀胱或秘或瀉或腫或光初生見兩箇石子俱大光淨名曰  
如腫一邊差大名曰偏墜蓋由驚氣所行傳受於中或母懷孕  
驚憂之氣不散胞胎之間兒亦受之所以生下便有如腫汁宜  
傳之內用清心順之

黑散

黃連

黃芩

大黃

黃蘗各二錢

右同燒存性爲極細末雄指膽汁蜜同調傳



又方卵照用桃仁去皮尖研極細津唾調傳

### 遺尿

楊氏曰小便者津液小餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿聽裏自出者謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾於所致也  
葛氏曰亦有稟受陽氣不足胞冷傳送失度尿出不禁

### 尿床遺溺

膀胱因受冷 夜臥必尿床 久則遺便溺 淋漓滑小腸

### 偏墜腫硬

陰核腫如吹 兒啼怒氣為 或因疳積作 或被暑邪欺  
傳上膀胱內 侵陵外腎垂 停留堅日天 結聚一邊疝

雞腸散

雞腸一具另用雞肫共二用雄雞燒存性

牡蠣

茯苓 土皮

桑螵蛸 炒五錢

桂 去皮

龍骨 各二錢半

右爲極細末仍以雞肫腔一具雞腸一具燒存性研極細末  
每用前藥末一錢用溫酒調化食前服

白濁

楊氏曰小兒尿如白米泔壯由乳哺失節有傷於脾致使清濁  
不分而色白也久則成疳亦心膈伏熱蒸而得之

小兒夜間尿尿有父母不曉以管襁褓愈重其病殊不知此因  
膀胱冷夜屬陰故小便不禁睡裏自出也至於便濁則有二先

赤後白者心熱也便下純白者疳證也又有年齒稍長而非熱非疳亦白濁也此由習毒辯太過或因驚入小兒雖同其治則異隨證用藥

茯苓散 治嬰孩小兒伏熱尿白

三稜炮

蓬莪木炮

縮砂 去殼

赤茯苓

去皮各五錢

青皮

去穢炒

陳皮

去白

滑石 水飛

甘草

炙二錢半

右爲極細末用麥門冬去心燈芯同煎湯調化食前服

香砂圓 治嬰孩小兒小便白濁

香附子

炒一兩

縮砂

去殼五錢

三稜 煨

蓬莪木 煨

陳皮

麥蘖炒各四錢

石為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲鹽湯食前服

方用大甘草頭煎湯食前服

疝

按內經大奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆為疝心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝謹疝者寒氣結聚之所為故令臍腹絞痛者是也

巢氏方論諸疝者陰氣積於內復為寒氣所傷榮衛不調一氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則為寒為實為痛血為寒泣音澁則為瘕氣為寒聚則為疝皆因本臟氣虛外感於寒溫內傷於生冷遂使臍腹絞刺激搏而痛無有定處倉卒

之際不堪忍者謂之疝也宜五苓散調沸湯服

癰疽者陰核之氣結腫大而癢痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下繫必結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其壯有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有大硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

### 胎積疝

小兒疝氣每因啼胎積膀胱不散之偏者或傷或左右結成年久不堪醫

疝縮頻啼叫 膀胱冷熱為 疝紅偏疝墜 刺痛氣相隨

腎外皮焦黑 囊中紫黑瘡 青浮連小腹 何用更堪醫

諸症原來各有名 蓋因寒濕熱氣侵成 治分芍藥烏梅散

勻氣金鈴與五苓

此病從來有兩般 夜啼胎氣要詳看 赤紋虎口為胎疝

青脉端知哭夜間 一搐來時宜速理 莫教帶搐便驚難

膀胱疝氣入腎囊 羞顏疝墜兩分張 此是喜怒嘔逆氣

驚搐孩兒怒毒傷 行有小腸通小氣 莫教虛損不尋漿

更有一般疝裏患 人言獨腎不成雙

臍腹浮青 腎皮焦黑 紫血滿囊 耳中清血 唇黑氣噎

手足心黑

白氣散 治嬰孩小兒調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗

去蘆炒

陳皮

去白五錢

縮砂

去殼

茴香

各一錢半

白薑

炮一錢半

甘草

炙二錢

右各極細末用滾白湯冷煎腹痛燒鹽湯調飲前服

烏梅散

治嬰孩小兒腹痛初生臍下冷痛疝氣

烏梅

不去核

延胡索

甘草

半生半炙各一錢半

乳香

沒藥

釣藤

各一錢半

右各咀用水煎食前服

金鈴散

治嬰孩小兒疝氣腹痛愈而復作

金鈴子

同三錢

二稜

煨

蓬莪朮

醋炙

青皮

七種炒

陳皮

去白

赤茯苓

去皮各二錢半

茴香

二錢半

木香

一兩

甘草

炙二錢

檳榔 去脂

枳殼

去穢炒

釣藤

右爲極細末用茴香炒無灰酒調化食前服不飲酒者尚香炒煎湯服

金葉圓

治嬰孩小兒冷疝氣痛及膈囊浮腫

金鈴子肉

五錢

吳茱萸

二錢半

右爲極細末酒煮麵糊圓如芥米大用鹽湯食前服

川棟圓

治嬰孩小兒疝氣小腹引腰脊彎曲身不能直

木香

檳榔 去脂

三棱 煨

蓬莪朮 炮

青皮

去穢炒

陳皮

去白

川棟子

去皮炒

芫花

未醋浸炒

巴豆

去心油半錢

桂 去皮

黑龜牛

生各三錢



右爲極細末煮麵糊圓如芥米大用薑湯食前服

淋

楊氏曰諸淋皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏生膏血沙石從水道出焉故有欲出不出淋瀝不斷之壯甚者窒塞其間或令人悶絕大凡小腸有氣則小便脹有血則小便澁有熱則小便痛痛者爲血淋不痛者爲尿血敗精結澀爲以敗精敗者爲膏金石結者爲石揣木尋源各從其類治法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱調平心火蓋心清則小便自利心平則血不妄行切不可好息用補氣得補而愈脹血得補而愈澁熱得補而愈感

永遠道不行加之穀道不通

其能生者也又腎

虛弱兼中受寒夾冷而小便淋瀝者其證先寒戰而後溲便蓋  
冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋熱氣勝則戰解方得  
便尿也

巢氏病源曰諸淋皆腎虛所致腎與膀胱為表裏至水下入小  
腸通於胞行於陰而為受腎氣通於陰下流之道也淋有五名  
曰膏曰冷曰熱曰血曰石膏淋見小便有肥脂似膏而淨於小  
便之上此腎虛不能制其肥液而下行也冷淋先戰慄而後小  
便此腎虛而下焦受於冷氣入胞與正氣交爭故小便澀而戰  
慄熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其溺黃多而澀間有  
鮮血同來者血淋熱之極也心者血之主外行經絡內行臟腑  
熱盛則夫心常道心與小腸為表裏故下流而入於胞則為血

淋石淋腎主水水結則化為石腎為熱所變過小便則壅中痛  
不得流則痛引小腹則沙石從小便出甚至塞溺令人昏悶遍  
身有汗而後醒此痛之使然蓋五苓者雖曰腎虛所致然小腸  
為受感之府氣通於膀胱膀胱為津液之府氣通於腎餘化下  
流而不通者曰腎氣不足熱入膀胱水道壅而不利出入起數  
臍腹急痛蘊作有時或如豆汁當急用五苓散自欲愈也

風濕歌

五般淋瀝病相傳 一一須分病本源 若是吐啼傷水積  
或因飲食入脾間 次便因循傳入臟 致令淋病小便乾  
但看眼尾紅筋上 有血相和汗又連 肚上青筋垂至腹  
定知沙石痛難安 承上乾燥州度退 此是風淋定惡泉

外腎不種氣不急 一陰才種氣明運 先與寬腸疎導氣

定知醫藥可安痊

血淋尿血

又熱膀胱內 胞中積聚成 小便時下血 澁少痛干心

熱淋結澁

三焦因有熱 熱聚入膀胱 結澁陰串痛 淋漓溺色黃

石淋沙石

膀胱并腎熱 小水胞中結 似石或如沙 澁痛溺難洩

氣淋頻澁

寒氣膀胱內 尿難澁又頻 腎虛胞又冷 水道不裁精

寒淋如膏

林瀝脂膏水

胞寒腎氣虛

弱頰精液耗

白濁又難除

水泉不止

水泉頻不止

胞內不收斂

冷滑瀉難禁

亡領耗小腸

淋病雖然分五種

要明各類在詳看

曰膏曰冷同其證

血不均為熱一般

小兒淋瀝膀胱熱

風滯氣凝小腸結

胎中積聚沙石淋

熱結氣攻小便止

小兒淋瀝成難忍

冷熱須分色數般

小腹刺痛常結閉

腰間急脹豈能寬

或如膏色兼膿色

有似黃梳若米泔

腎縮黑青心撮痛

便投靈藥亦難安

列黑裏縮

臍下清睥

鼓滿額裂

湊心唇黑

頭軟腰折

口開氣冷

五淋散

赤茯苓

去皮

赤芍藥

炒

山梔子

六錢

甘草

生

當歸

去蘆

苦瓠

炒

車前子

淡竹葉

滑石

木通

去皮節

滑石

水飛

葵子

葶藶

炒

右取咀用葱白一握煎入車前草杆搗取汁用五苓散調化

食前服或消石末調化服 血淋白茅根煨新煎湯服

有氣淋小腹脹滿尿後有餘瀝末道煎湯服

熱淋小便

赤而淋瀝臍下痛新水煎服或蓄水煎湯服

石淋莖肉

痛尿澀有沙石令人悶絕砂石膈紙炒焦爲細末葵子煎湯服

葵子散

治嬰孩小兒諸淋

葵子

車前子

木通

去皮節

蓬麥

桑根白皮炒

赤茯苓

去皮

山稔

去殼

甘草

石剉散用井水葱白二寸煎食可服

草豆湯

治嬰孩小兒沙石淋

甘草

一寸生

黑豆

一斤二十粒

右艾咀用新水煮棄熱入滑石末煎食前服

阮氏方

治熱淋

六田螺十五箇新水養候螺中出泥澄去上清水以  
底下泥入臙粉調金臙上尿即通將田螺放去流水  
中若殺之病不得愈

尿血方

蒲黃生

地黃生

赤茯苓去皮

甘草生

右剉散用水煎入人髮灰調化食前服

又方小便出血生地黃汁生薑汁入生蜜同調化食前服

小腸氣痛

小腸氣痛腰先曲 無淚叫啼空眼哭 口乾脚冷二唇乾

額上汗珠濕漉漉



木香飲

治嬰孩小兒小腸氣痛

川棟子

上箇巴豆七粒炒令黃  
色去巴豆入丁香半兩

玄胡

系半兩

南木香

二錢

史君子

右爲極細末用米飲食前調服

脫肛

脉訣曰大腸共肺爲傳送蓋肺與大腸爲表裏肚者大腸之明  
肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸泄泄者有因痢久裏急後重  
努力肛開爲外風所吹或伏暑泄瀉腸頭不禁或稟賦怯弱易  
於感冷亦致大腸虛脫小兒所患遺精皆因暑濕風熱乘脾而  
得蓋風屬木木勝則制土土主脾胃虛而受制入濕喜傷脾因  
虛受濕不能分別清濁水穀交雜則爲洞泄洞泄既久大腸亦

虛大腸乃乎陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送之  
道亦虛又爲風火所襲故肛門脫而不收法宜補脾滋胃使金  
得受丹之益而氣實平胃散主之次則內投固腸之劑其肛門  
色紅而軟肺脉爲數右手指紋紫見身微有熱時或煩燥難經  
曰出者爲虛入者爲實

楊氏曰惟實則滿溫則內氣充而有所蓄惟虛則寒寒則內氣  
餒而不能收視人腸之厚薄膏脂之肥瘠內氣之虛實何如爾  
凡治脫肛先以溫湯澆軟漸漸納入及小兒啼叫怒氣久痢不  
止風邪襲虛亦有此證

肛腸脫出

肛頭顛自下 因利滑難收 秋後經時日 今傷痛不休

脫肛瀉血積因傷 冷熱攻脾作滑腸 消渴口乾焦上熱

氣攻虛腫面青黃

肛門出露久難收 再感風傷事可憂 况自先傳脾胃弱

更詳冷熱易為膠

本因良藥過於涼 冷氣從而入大腸 只看鼻根青脉見

更兼唇白齒根黃

凡腸頭作痒即是有蟲用生艾川棟根煎湯薰洗

龍骨散 治嬰孩小兒大腸虛肛門脫出

龍骨二錢半 訶子煨七枚 次石子 一箇

赤石脂 罌粟殼 去毛帶穢醋炒各二錢

右為極細末用米飲調化食前服

蟾龍散 治嬰孩小兒陽痿脫肛

地龍蟾 錢樣者上一兩

朴 一錢

右爲極細末 凡門濕潤乾慘處乾燥用清油調塗先以見  
處清劑芥生葱煖湯濕浴洗輕血拭乾然後傅藥

伏龍肝散 治嬰孩小兒陰證脫肛

伏龍肝 一兩

龜頭骨 五錢

白藥煎 一錢半

右爲極細末用紫蘇煎濃湯候溫和清酒同調傅

赤石脂散 治嬰孩小兒瀉痢後肛門不收

赤石脂

伏龍肝 各一錢

右爲極細末賜頭上傅

又方 蒲黃五錢猪脂一兩煉猪脂同蒲黃成膏塗賜頭

汗

楊氏曰汗者血之異名陽主氣氣爲衛陰主血血爲榮人之一身有陰抱陽平則寧偏則病陰虛陽必去故發熱汗出如水熱而湧陽虛陰必乘故發厥汗出如水蓋而流汗者素虛而津液爲之發泄也人以衛氣固其表所以溫肌肉充皮膚肥腠理明理論曰津液溱泄之利爲腠之理經會之中爲理可開固衛氣一虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥開關守也

明理論曰自汗者謂不因發散或昏或睡自然而出盜汗者睡困則出醒則復收頭汗者邪搏諸陽津液上溱則汗出頭上手足汗者胃主四肢陽明之證無汗者寒中榮則無汗謂溱理閉也

汗者心之液也。脈訣曰：液汗遺皮，潤聲言。要氣清，蓋人之氣。猶水火也。平則寧，偏則病。陰虛陽必濇，則發熱。自汗陽虛，陰心乘則發。敵自汗，小兒脾虛，自汗多出，額上沾粘，人手速救，胃氣用全蠲，觀音散治之。

小兒盜汗，由冷食熱水傷脾土，為水傷不能制其津液，故成汗。自出汗者，心之液，或心虛驚，熱血不足而汗先當收斂。心氣有遇夜而睡中汗出者，名曰盜汗。

小兒盜汗者，因食冷物過度，或熱水淘飯，大能損脾土，為水之所傷，則不能制其津液，故成汗自出也。

夫盜汗者，心之液也。小兒血氣嫩弱，膚腠未密，若厚衣溫煖，薰蒸臟腑，生熱搏於心，心為邪所勝，故液不能內藏，薰出肌膚。

則爲盜汗也。又或傷於冷傷於熱。冷熱交爭陰陽不順津液洩越亦令睡中汗自出其間有虛熱之證。虛者謂諸病後或大汗後血氣尚弱液溢自汗實者或潮熱成寒熱發過之後身涼自汗二者日久令人黃瘦矣。治別證爲骨蒸疳勞也。

巢元方論曰病因睡寐中而自汗流此因陽虛所致久不已者令人羸瘠枯瘦心氣不足津液妄出故也。

### 自汗

血不禁則神不備氣不衛則人脈不充理其血用和其氣安其神用調其脈陰陽均平氣血相參百脈流順二焦五臟自然以無其軀凡初生至周歲之凡不可自汗自汗卽亡陽亡陽卽氣怯氣怯卽脈虛脈虛則神散神散卽驚風看作驚風已作搐搦。

瘡爲醫士失之究意血不榮氣不衝作疾不輕爲害必大禍生  
起於微人事而不察庸醫反笑之曰自汗豈能成風癩耶愚曰  
渠莫知其所由然者非世友也舉此一端虛以類之智者應有  
誦云觀其瀾而探其海知其末須明其本道變之士審乎得失  
是是非非不離乎中裁度踈謹而後已瘵乳幻自汗切勿止之  
方用白朮一分小麥一撮水煮令乾去麥爲末黃耆煎湯調服  
以愈爲良若以止汗反爲閉邪作熱煩燥所謂氣血相蒸則汗  
自止矣

盜汗如珠

才睡汗如珠 夜多日晝無 亡津添骨熱 面色燥皮膚

虛熱盜汗



盜汗類來氣受傷 臟中虛熱小便黃 夜間潮熱無時節  
頰赤唇書有口瘡

小兒自汗證多端 切莫將爲一例看 嬰識陰陽虛實候  
勤勤調理自然安

團寒湯 治嬰孩小兒虛汗盜汗心血液盛亦發爲汗收斂心  
氣

人參

去蘆

當歸 去蘆炒各二錢

右剉散用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一片并水同  
煎食遠服一方加黃耆蜜炙二錢

牡礪散 治嬰孩小兒白汗

牡礪

黃耆 蜜炙

生地黃

右以咀入浮麥麻黃根同煎食前服

止汗散

人參去蘆

白朮

茯苓去蘆

黃耆蜜炙

當歸去蘆炒

止草炙各一錢

右以咀用生薑三片入麥麩同煎食前服

又方

白朮五錢

小麥一撮水煮乾去麥白朮杵極細

末用黃耆煎湯食前服

漢浮方

牡蠣

麻黃根

赤石脂

糯米粉

具母

右為極細末綿包藥撲汗

腫

全生方曰由小兒臟腑嬌嫩乳母過傷脾胃虛冷不能消化乳食停滯腹間脾受積傷衰弱不能制水故流溢漬於脾膚腫有

三證疳水積水驚水也

疳水者心中虛脹腫

積水者五積在腹結化為水其候或冷或熱四肢頭面俱浮若面浮作虛中積治宜補而後取

驚水者前後重疊驚致令心火熾瀉飲水過多停積於脾其候四肢腫身上熱脈訣曰水氣浮大得延生沉細應當是死別尺脈如系或浮洪按之無根乃絕脈

楊氏曰古洛陽以腫於癩疾則知病之危惡非他疾比也夫人  
全性命者水穀而已則腎主之上穀則脾主之惟腎虛不能行  
水脾虛不能制水胃與脾合氣傳為水穀之海因虛而不能傳  
化故腎水泛溢浸漬脾上於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮  
膚注於肌肉而發腫矣其候目胞上下微腫四肢腫着咳喘怔  
忡股間清冷小便澁黃皮黃薄而光手按成窠舉手則滿

楊氏曰身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下  
則通利小便順氣和脾不可緩也然證雖可下當審其虛實權  
其輕重不可過用芫花甘遂大戟猛烈之劑用之大過吾恐峻  
決者易固閉者難水氣復來何以治之

凡虛腫先起於腹而散於四肢者可活先自四肢而後歸腹者

不治蠱脹肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘡轉作虛浮及唇  
黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺男爲足腫  
而上女從身腫而下或肉硬或手掌平皆不治

經云諸有水自下必微腫又頭面腫曰風腳腫曰水

朱氏曰腫因積而得既取積而腫再作小便不利若再用利小  
便藥性寒而小便愈不通到此則求矣蓋中焦下焦不升降爲  
風寒痞膈故水凝而不通服沉附湯則小便自通喘滿自愈大  
小通用久服無礙

腫脹二證皆由臟腑怯弱榮衛不順三焦壅滯表裏俱虛虛中  
有積又患失治虛虛不能傳化水氣滲泄經絡脾得之氣溢皮  
膚而腫入臟而喘能暴而重急者明其因受濕腫脾胃受濕冷

不尅氣浮四肢面目皆腫此由脾虛止調胃補脾然後去腫先服理中湯傷寒下之早來虛人腹作腫理中湯加枳實作喘加豆豉食毒傷脾胃傷冷積致腫瀉利久脾氣虛致腫先正氣調胃氣虛腫亦名氣蠱血虛腫亦名血蠱禁衛俱虛腫亦名血氣蠱先服禁衛飲子次分氣飲子已上七證先明所因用禁衛飲子至穩若是水腫或受濕以利小便切不可動大腑蓋腫脹已因脾虛若下之愈見脾弱也

原腫病之標本之疾腎主元氣天一之水主焉肺主沖化地四之金主焉腎為本而肺為標地且至陰以積水其為病也腎者胃之關鍵關鑰不利樞機不轉水乃不行滲於脈絡皮膚而為浮腫當推究內外所因而為施治兒大者憑脈以明虛實古方有

子種論證知氣不得卧而心水兩脇緊痛爲肝水大便鳴漉爲  
肺水四肢若重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲膽水午  
虛乍實爲大腸水腹急肢瘦爲膀胱水小便秘澀爲胃水小腹  
急滿爲小腸水然脉浮爲風爲虛沉浮爲水病沉則脉絡虛伏  
則小便難卽爲正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃成水腫  
蓋脾屬土喜燥而惡濕常感濕氣濕善傷脾血化爲水土敗不  
能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得症時見眼泡早  
晨浮突至午後稍消以羌活散疎解次醒脾散主之此證夏與  
秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢蓋肝木  
旺而脾土受尅不能勝水所以難療進退不常須慢調即忌鹽  
醬薑蒜油麵皆味鹹能溢水者併其他生土今毒物亦戒重則半

或輕者二月脾胃平復腫消氣  
實後於飲食中旋以

投則其疾自不再作

劉氏曰治腫非易補養尤難  
忘者切須詳審

鄭氏方引千金云從腰以下  
當利大便腰以上腫當以發汗

內經云開鬼門後汗潔淨府  
小平治權衡以平爲期也

府腫明亮

虛黃如熟李 泔水定無疑  
氣聚膀胱內 陰囊腫似吹

風腫多痒

腫時時痒 風邪客肺皮  
搔之成疔癩 痰熱互相蒸

氣腫因嗽

久嗽胸浮腫 因勞肺氣蒸  
痰停胸膈滿 延喘不相宜



虛腫煩渴

久痢損傷脾 脾虛腫四肢 渴煩多畏食 臍凸滿將危

遍身浮紫黑 喘促渴頭加 自似黃槐色 皮膚斑若麻

臍邊青腫出 外腎脹如八 諸腫逢斯證 堪堪命若除

古今議腫是脾虛 大抵多從濕熱為 十種根因名調理

詳分補 在靈機

皮肉紫腫 臍出青黑 自利黃泡 腹虛如泡 小便不禁

滿面血 氣逆不通 胸腹頭陷 唇縮枯澀

禁衛飲子 治嬰孩小兒 調補氣血俱虛四肢頭面手足浮腫

以致喘急

當歸 去麩

熟地黃

人參 去蘆

茯苓 去皮

川芎

白朮

甘草 炙

芍藥 炒

枳殼 去穢麩炒

陳皮 去白

黃耆 蜜炙各一錢

仁為極細末或水煎不拘時候服

分氣飲子 治嬰孩小兒調理腫脹作喘氣短促急坐卧不任  
四肢浮腫飲食吐逆神困喜睡

五味子

枳梗 去蘆炒

茯苓 去皮

甘草 炙

陳皮 去白

桑根白皮 蜜炙

草薢 去殼

大腹皮

白朮

當歸 去蘆炒

紫蘇

枳殼 去穢麩炒

蘇子 炒

半夏 麩

右以咀用生薑一片棗一箇去核同煎不拘時候服

沉附湯

附子

生去皮

切片二錢

右剉散用生薑五片入沉香一錢磨水同煎食前服

內消圓

治嬰孩小兒頭面手脚虛浮

橘

用青湯浸

去穢五箇

巴豆

去皮心膜

木香炮一錢

防己

一錢半

丁香

十四箇

右青橘巴豆同炒蒼色去巴豆不用為極細末蒸餅圓如餅

米大男用陳皮煎湯女用艾葉煎湯食前服

塌氣圓

治嬰孩小兒乳食不化腹脹氣急浮腫

巴豆

十片

胡椒

十粒

丁香

十箇

青橘餅一餅一餅不去皮每餅入豆半

右用糯米醋一椀煮青橘醋乾取出細切青橘同諸藥焙乾

爲極細末粟米煮糊圓如黍米大用米飲食用服

葶藶散 治嬰孩小兒水氣腫滿

葶藶同細炒 黑牽牛炒 桑根白皮炒

檳榔去臍 大黃各二錢

右爲極細末用生薑三片蜜半匙同煎食前服

消渴

大渴者有大渴熱渴疴渴三者大同小異大渴起於吐瀉之後脾胃因虛而生邪熱脾受邪熱涎液內涸唇乾舌燥故成大渴也熱渴起於血氣盛實臟腑之熱或冒暑毒因熱蒸燥津液不

生唇焦舌乾故成熱渴也巢氏云渴而飲不止疝渴者起於腎  
與膀胱好食肥膩恣食其酸骨熱盜汗黃瘦腹脹口臭唇乾故  
成渴渴飲水多小便無度其病久則多發癰疽巢氏云其病久  
則發癰疽或變腫病寶鑑云腸虛土壤不尅小便為腫病在於  
皮其渴內熱則小便利則津液竭津液竭則經絡虛經絡虛則  
榮衛不行榮衛不行則血氣流溢故成疽也其渴久則脾土虛  
脾土虛則腎水盛腎水盛則水反尅土致脾生風濕脾則生虛  
熱濕熱相搏故發於皮膚遍身腫滿也

渴變成腫

渴頻因久瀉 脾胃並亡津 水飲無乾舌 烟焦又燥唇  
眉攢多困倦 髮堅少精神 往暮經時日 成虛腫遍身

蒸邪極

肺枯津液乾

心胸停燥熱

瘡渴致睡煩

水無休歇

皮膚紫黑斑

肚膨加喘腫

寸死一生難

胞黑腫

皮下浮青

氣促如鋸

喉出烟焰

目白黃沉

唇腫白爛

龍粉圓

治嬰孩小兒疳熱煩渴

草龍膽去蘆

定粉炒

黃連炒

烏梅去核各一錢

右爲極細末煉白蜜圓如黍米大用烏梅去核煎湯不拘時

候服

烏梅

夫鼻衄者是五臟熱結所爲也血隨氣行通流臟腑冷熱調和

不失常度無有雍滯亦不流溢血得寒則凝結得熱則流散熱  
乘於血血隨氣發溢出於鼻衄也或因傷寒溫疫清陽受病不  
得其汗熱毒停聚五臟故從鼻而出也血熱不循經從鼻出血  
隨其氣肺主氣外屬鼻故衄也

欲衄之候脈弦洪 鼻內乾燥似響風 五臟積熱邪壯熱

膠氣積血在肺中 出之數合宜醫治 若須斗升命必終

人八若要病神效 清肺涼血有奇功

聖黃湯

川芎 生地黃 赤芍藥

當歸 去蘆 蒲黃 少許

右咬咀用水煎不拘時候服

夏秋月車前草洗淨取汁生薑汁入蜜一小匙調化先以滾水

鼻次以井水澆汁服地黃湯若傷寒證小柴胡湯入生地黃煎  
服  
鼻衄方用生蘿蔔汁仰頭滴下鼻飲汁

### 吐血

夫吐血證者出於衛氣逆也榮者血也衛者氣也榮衛相濟不  
失常道一有所感則致妄行血者水也決之東則東流決之西  
則西流氣之使血其勢如此

巢氏云吐血者是有熱氣盛而血虛熱乘於血性得熱則流散  
妄行氣逆則血隨氣上故令吐血也或飲食大飽之後脾胃內



冷不能消化忽吐所食之物氣血相衝因傷脾胃亦令吐血又  
嗽氣逆而目浮腫而嗽吐血者是肺虛損也

小兒九道出血何爲而然蓋人之所有者血與氣也心者血之  
主肺者氣之主氣主呵之血主濡之禁養百骸灌漑係脈升降  
上下榮衛諸和自然順適一或不調疾由生矣或外爲六淫所  
浸內因七情所迫氣乃流而不行血乃壅而不濡內外抑鬱不  
能流注以禁於身必有妄動之患

叔和以乳脈爲失血之義在上表爲陽故也陽明主乎多氣多  
血未有不因熱而得蓋氣血俱熱鬱鬱內逼失其常度是以妄  
行有在強裸處此證者因非虛而所傷皆乳母執着不自寬釋  
及嗜辛辣之味流於乳絡見飲之後停滯不散鬱蒸於內亦能

動血或居重懷胎間火氣重  
則湧泄或吐或衄或大小便亦多血來者

吐血氣逆

血虛氣逆不和同 熱毒流 心引肺風 忽發氣逆

吐也鮮明點點紅

九道何爲妄血行 蓋因劫 帶熱邪生 隨經施治

氣順如常血自勻

便血

見生七日之內大小便有血 出者由胎氣熱盛或母食酒麵炙

煖鹹醃流入心肺在胎受之 熱毒亦傳心肺且女之臟其熱即

入心故小便有之男之臟其熱即入肺故大便有之或淡如垢

水或血加鮮又不可謂熱過服涼劑其血愈只以生地黄根取  
汁五七匙酒半匙蜜半匙同和勻食渣服

夫大便者是太陽乾結損傷脾為也臟氣既傷風邪白入或痛

熱或積冷或濕毒傳於脾胃紫州食傷於臟腑因茲冷熱交繁

疴濕互作致動血氣停留於

血也又有腹脹冷氣在內攻

客入脾胃或瘀血腸濕毒下

上焦心肺積熱流注大腸亦

血虛其人必肌腠萎黃頭髮不黑矣

### 大便下血

風冷腸間又熱攻交相繫上糞須紅疴傷臟腑令便血

云筋者瀉血而瘦孫氏  
云痛傷心肺腸中下血  
一漢書得六胃中  
古書云下血如赤豆汁

度膠散 治嬰孩小兒吐下血

阿膠炒

蛤粉各一錢

辰砂水飛少

右爲極細末用藕汁入白蜜調化食遠服

方 藕節晒乾爲極細末用人參去蘆白蜜同煎湯調化食  
遠服能消瘀血

五倍圓 治嬰孩小兒大便下血腸風臟毒

五倍子

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

小便出血

夫小便者蓋心主血與小腸相合血之流行周遍絡絡循行

腑若熱，髮膀胱血滲入胞，故小便出血也。

蒲黃散 治嬰孩小兒吐血咯血下血

蒲黃

油頭髮 各一錢

石為極細末，用生地黄汁或米飲調化，食前服。

槐花散 治嬰孩小兒熱便血

荆芥穗

槐花

枳殼 去穢麩炒

甘草 生各一錢

右為極細末，用白蜜煎湯調化，食前服。

三效散 治嬰孩小兒糞前後血下，腸風下血

糞前血 石榴皮末用煎枝煎湯調化，食前服。

糞後血 五倍子末用艾葉煎湯調化，食前服。

養血或腸風下血茹葷燒蒜存性爲末用米飲調化食前服

龜胸

胸高脹滿其壯如龜此肺經受毒所致也乳母酒麪無度或夏月熱煩執乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此疾保幼須知乳母常担去宿乳夏常洗乳令淨担去熱乳恐傷損肺氣胸膈脹滿令兒如龜胸也

常論此候因風痰停飲聚積心胸再感風熱肺爲諸臟華蓋居於膈上水氣泛溢則肺爲之浮日久疑而爲痰停滯心胸兼以風熱內發其外證唇紅面赤咳嗽喘促致胸膈高如覆掌名曰龜胸服藥後而復作傳變自睛目視痰涎上墜兼以發搐難治

無端唇口忽然紅 心肺因痰飲聚中 風熱乘之加喘急

形如落葉掌號通胸

通胸散

大黃煨三分

天門冬去心

百合

杏仁麩炒

水通云節

枳殼麩炒

桑根白皮

蜜炙 甜葶藶紙炒 朴硝冬五錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用溫湯研化食後服

龜背

兒生下不能護背自冬風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致

個樓背高如龜背自矣然此多成痼疾

龜背者蓋初生未滿半周強令坐早春風吹着背脊傳入骨髓

發令背高如龜之壯名曰龜背終成痼疾

和殺防風圓

枳殼去穢麩  
炒

防風去蘆  
義

獨活去蘆

大黃炒

前胡去蘆

當歸去蘆炒

麻黃去節各一錢

右爲極細末煮麩糊圓如黍米大用米飲食後服

語遲

保幼須知言心戲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒  
感受母氣心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

菖蒲圓

人參去蘆

石菖蒲

麥門冬去心



遠志去心

川芎

當歸去蘆

乳香

朱砂水飛各一錢

右爲極細末煉白蜜圓如黍米大用米飲食遠服

又方社壇餘脂酒飲

齒遲

聶氏云稟受腎氣不足者即髓不强善膏之所經而爲髓不足故不能兄於齒不生也

芎黃散

川芎五錢

山藥

當歸去蘆炒

芍藥炒

甘草炙各一錢半

右爲極細末用白湯調化食後服空心末溲齒限

三香檳榔圓 治嬰孩小兒齒牙氣不足腎主骨髓髓不充  
於齒故齒不生

香附子炒

沉香各二錢

檳榔去穢

人參去蘆各一錢半

麝香少許

蝦蟇燒灰二錢半

右爲極細末羊髓煮爛圓如黍米大用米飲食後服

髮澤

本草方兒稟受血氣不足不能榮於髮故頭髮不生或者呼之  
爲疳病也

香粉膏

香需一兩

胡粉五錢

豬脂二錢半

方用水一小鐘煎香需取汁三分入胡粉豬脂調勻頭上塗

一日三次

行遲

羅氏云兒生至周歲三百六十日膝骨成乃能行也近世小兒多因父母氣血虛弱故胎氣不強骨氣軟弱故不能行也骨者髓之所養小兒元氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能行也

錢氏補腎地黃圓加鹿茸牛膝五加皮酒炙服髓生而骨強即能漸漸行也

虎骨圓

虎脛骨

酒炙

生炙

地黃

茯苓

去皮

酸棗仁

酒炙

生炙

桂

去皮

防風

去蘆

當歸去毒

川芎

牛膝酒浸去毒

右爲極細末煉白蜜圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

五加皮散 治嬰孩小兒三歲不能行

五加皮二錢半 木瓜一錢二分半

右爲極細末用粥飲入酒二點調化食前服

調元散 治嬰孩小兒虛受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦

大如臆致語遲行進手足如箇神色昏慢齒生暹

山藥五錢

人參去蘆

茯苓去皮

茯苓去木皮各二錢

白朮

芍藥炒

熟地黃

當歸去蘆炒

黃耆蜜炙各二錢半

川芎

甘草炙各半

石菖蒲一錢

右劉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服如嬰孩  
幼乳母同服

雜證

長大不語 心氣不足

長齒不出 受胎父氣不足

長髮不出 受胎母氣不足

長大不行 腎肝不足

手皸不展 肝氣不足

腳皸不展 腎肝氣不足

三不治法

二者內實而表虛腹痛滿大小便不通心下平強手足煩熱者

脈細數而乾嘔無水出者死候也

二者內虛而表實內熱而吐下清氣不聚者虛也脈洪大者必死

候也

三者內外俱虛身軀空冷而汗出如珠微吐嘔而虛煩脉厥逆身不安靜必死候也

五絕

口定筋癆肝腎傷 口虛乾逆而青黃 心絕不言魚口禁 喘急腸虛肝受殃

警署

證候不明醫之過也 圓散不良十之繆也 去醫裁藥審證察候 猶若權衡以究標本 醫藥純全之道 調理小兒雜病須究其五 臟所傳及至變作也 志殊失原流迷而不反 所以作疾故述詳 悉

小兒平常服藥過多 頑玩臟腑調和之劑 不愈則易之以攻 繫

固守之劑太過則時乎而疏利主治在我不可不問源流不可偏徇病家所欲圓機達變消息輕重而應之是通變之不可無法也大槩小兒臟腑柔嫩易虛易實易冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎日視指切意度心推醫權極衝斟酌對證調治

瘡疹論

小兒瘡疹之由皆始生之時所敷一發口中所含惡血隨吸而下還於右腎而然之包甲其疹之發下焦相火熾也三等之斑皆出於此太陽寒水之經外爲大寒內爲二火交攻化血肉爲膿寒爲發寒邪可令內瀉一火又令濕氣上歸本位一二服斑疹即愈已後再無一番斑出之患而損生金者矣

小兒斑疹始出之證必先見面頰赤赤目眇赤則火頓悶乍涼乍熱咳嗽噴足稍冷多睡驚風並痘疹之證或生膿胞或生小水斑或生癰疹此三等不同蓋諸證皆自太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊並流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導運于面上是壬癸寒水逆赴丙火熱火故也



痘毒受病之由

小兒在胎之時乃母五臟所養成形也其母不與禁忌恣意所欲加添滋味好啖辛酸或食毒物其氣博於胎胞之中所以小兒在胎胞之時受得此毒名曰三穢液毒今痘毒者是三穢液毒所出也

一者五臟六腑穢液之毒發為水痘瘡

二者皮膜肌肉穢液之毒發為膿水痘瘡

三者氣血骨髓穢液之毒發為膿血水痘瘡

三者既出發為瘡痘瘡也子母當宜慎口即不可食葱韭薤蒜酒醋椒薑薑菹兔雞牛羊及河海蟲魚腥等味世俗未曉將為食藥往往不顧其後悞傷者多矣

此書卷之四

前經方不載或云建武中於南陽征  
後世明醫經方始說瘡痘斑痧龐氏云天行斑痧自漢魏以  
前經方不載或云建武中於南陽征  
史建武乃

光武年自光武至魏相去一百九十五年則是起於東漢也龐  
氏兼言漢魏能無疑乎蓋小兒瘡痘是把質成形在胎食母血  
穢何以知之兒生下不食乳前古今以黃連汁飲一二日下胎  
養前以此觀之胎中食穢則尖出腹哺穀才落則熱下血噤坐  
妻急拭口中冷淨兒生由病同胎糞而下唯血穢之氣存焉錢

氏云餘氣入兒臟中本因傷寒入兒成痘癩因傷寒時氣或積

熱潮熱運動穢氣入於五臟其毒當出譬之荒野草木無根而

生者蓋受地土之氣也小兒瘡痘因熱而生者蓋受胎穢之氣

也五臟受穢氣多則出盛少則出稀兼臟則相雜出兒稟氣虛

則出早氣實則出晚如地虛則萌芽早發實則遲也穢氣入肝

則淚目感則爲水泡巴澤微青以應肝之象入心與血相感則

爲瘡子色深紅以應心之象入脾與涎相感則爲癩子色赤

黃淡以應脾之象入肺與痰相感則爲癩子色白而肥以應肺之象腎主

骨與髓相感則爲癩子色黑而肥以應腎之象

氣虛者不流即

然出不透者皆

腎旺多作寒顛禁牙之證其瘡發由五臟先有證候各有時辰  
錢氏云河欠頰悶肝也時發驚悸心也乍熱乍涼脾也頰赤瘡  
噴肺也寒顛禁牙腎也

道書曰寅卯屬肝巳午屬心申酉屬肺亥子屬腎辰戌丑未屬  
脾五臟之氣皆與時辰相合也

檢五臟所出瘡子

肝

出爲水泡其氣旺在寅卯

心

出爲赤斑其氣旺在巳午

脾

出爲疹子其氣旺在辰戌丑未

肺

出爲膿血瘡其氣旺在申酉

腎

主瘡黑色其氣旺在亥子

假如小兒寅卯時發潮熱來日依時或三日依時蓋肝旺於寅  
卯因潮熱而運動肝氣故隨臟而出必知水泡也錢氏云自寅

至午皆心肝用事脉經云其旺日甲乙旺旺時平旦日出如巳  
午時發潮熱來日依時必出斑子也若辰戌丑未時內占一特  
發熱來日又占一特復作者必知出痧子也如申酉時復作潮  
熱本屬肺臟來日却在寅卯時發熱不依次第必知膿痂水疱  
相雜而出餘皆效此推之腎之在下不受穢氣惟內虛多歸於  
腎變黑色難治也凡痧痘欲出先見於頭面難經曰諸陽皆會  
於頭錢氏云痧痘屬陽出則爲順素問云春陽上升故知先出  
於頭面也痧痘者是小兒大難不可不爲詳審也

四臟有證腎獨無證

小兒在胎含濁穢以養五臟生下則其證當出痘出之時其證  
悉見呵欠頓悶肝也乍涼乍熱脾也足冷多睡脾也時發驚悸心也呵欠頓悶肝也乍涼乍熱脾也足冷多睡脾也時發驚悸心也

赤痰打噴嚏惟腎在腑下不受穢濁物無其證腎之平證耳  
尻蓋尻尾俱屬腎屬水又居於下右冷左熱而尻尾反熱乃變  
壞歸腎其證平也

痘疹熱諸熱不同

小兒痘瘡其初不免乎發斑臨病之際不可不審一藥用藥鮮  
不敗事今列于后以便後學

傷寒熱乎足稍微冷熱熱惡寒而無汗面色青慘而不舒

左額有青紋

傷風熱手足稍微溫發目汗面赤而光

傷食熱自胞腫右額有青紋身熱而頭額脹吐最甚仍熱

晝涼面黃或吐痢腹疼

驚風熱面赤青紅額正下有青紋手心有汗時作驚惕手

脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅燥赤大小便秘

潮熱如水之潮依時而止

痘清熱心有四臟之證此冷中指冷尻冷

潮果  
左云

谷空響應形動影隨舉此而消彼也痘瘡發熱看其潮熱之時  
可知何臟發出

寅卯辰時潮熱傷肝 出 出水痘

巳午未時潮熱傷心 出 出斑瘡

申酉戌時潮熱傷肺 出 出膿疱

亥子之時潮熱在脾 常出瘡

獨腎無熱

辯證

人稟天地理氣要元氣盛壯論語註云肉氣不可勝穀氣穀氣不可勝元氣人身氣血相乘環轉頂足氣旺和血氣和人安血敗氣弱則疾生小兒痘瘡將出肌腠至熱得氣壯出長皆齊斂也瘡入譬如春種十餘日方出夏止五六日即長為何氣盛然也瘡出猶火熾若下涼劑如水投火必傷其和又如痘瘡出長皆齊或小兒喫涼物便減元氣若水減火力氣軀削弱身反加熱致瘡遲入不曉者再服溫涼藥則臟冷瀉其命傾矣經云氣亡神滅出瘡當忌涼藥可也



聖童寶鑑云癰疽是臟腑俱熱發於皮膚為之熱在腑發之即  
癰熱在臟發之即疽未發同一治未出可下解熱而退既出忌  
勿下及冷藥逼之其病不出在裏害人

癰疽之病首尾證平下之者證首尾有實熱證不下者誤切不可用巴豆圓子飛下之此藥乃攻食積出活人書首尾有虛寒  
證不補者誤癰疽出透色澤則紅證平者不須服藥如證候平  
穩強施湯藥殺小兒也大抵治病之法對證用藥有是證服是  
藥順其證則生逆之則死此而詳昭然

斷治癰瘡

寶鑑云癰疽是臟腑積熱發於皮膚為之熱在腑發之即癰熱  
在臟發之即疽未發同一治未出可下解熱藥惟此言其詳誠

可信也

論瘡痘約日訣

小兒瘡痘者與傷寒相類或安或危或見或隱皆六七日之間  
歸證明矣凡瘡欲出先發熱輕者三四日次者五日遠者不過  
七日此約法也一日太陽傳膀胱二日陽明傳胃三日少陽傳  
膽四日太陰傳脾五日少陰傳腎六日厥陰傳脾七日還經傳  
遍五臟六腑故七日而止也有小兒因傷寒至七日後或已汗  
或未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而未發熱毒入胃發於皮  
膚成斑者壯如蚊蚤所螫赤斑十生一死黑斑十死一生及有  
胃熱發黃者壯如橘色下利者死又有成癍癍或白泡者此皆  
傷寒熱毒不除多變此疾也巢氏云發斑不可用發汗藥

春夏爲順，秋冬爲逆。

經云：春夏陽氣在上，人氣亦在上；秋冬陽氣在下，人氣亦在下。今痘瘡之發，自裏達表，當春夏之時，則血氣隨陽氣而上，運而  
行疾；秋冬則血氣隨陽氣而下，陷而行遲。是以發於春夏者順，  
秋冬者逆。又當論小兒稟受充實，堪耐寒暑，節令變更，不以爲  
事。雖發於秋冬，亦不爲害。受氣怯弱者，寒暑易節，便生疾。故雖  
發於春夏，未可言爲順也。

順候

春夏爲順，先發搐而後發瘡者，生先發熱，大便如常，其瘡紅活，  
乳食如常。

逆候

秋冬爲逆春脹迴<sup>全</sup>夏黑<sup>陰</sup>秋斑<sup>欬</sup>冬瘡<sup>上</sup>

而譫語不止者惡候 病瘥後<sup>必</sup>驚者危 病止出而吐瀉者

明 便血而乳食不化者死脾虛也 瀉血而瘡爛無膿者死

大小便秘目閉殼<sup>蟬</sup>肌肉黑者死 瘡遍身黑陷目閉無魂

者 面色青黑色病不相應者死 或因吐瀉內虛而爲陷伏

或因已出妄汗表虛而成<sup>斑</sup> 或因冒犯風邪而成倒靨

或因穢惡觸忤而成黑陷耳尻反熱其瘡青紫變壞歸腎面

黑或有黑氣不治 燥渴小便澀澁不食危 瘡成<sup>鮮</sup>塔色

點不出殼啞不治 兩目閉黑睛蒙昧無魂不治 頭面腫瘡

盡抓破或臭爛不可近或足冷至膝不治 面腫鼻陷目閉咬

牙不治 痘瘡里雀風攻頤頰唇腫頰硬或腦高而尖不治

全初心經本

三

瘡痘避忌

腋下狐臭氣

俗呼猪狗臭是也

房中淫液氣

新房之氣是也

婦人經候氣

非諸般血脈自來等

醉酒暈腥氣

聞醉氣痘毒苗入兒契酒痘毒每發出

硫黃蚊藥氣

并毒藥之氣硫黃發燭之氣赤日觸之疼痛難差

麝香臊穢氣

聞麝香即苗入痘子契則後出

疫汗蒸濕氣

錢氏云左右常令存胡荽酒甚辟汗氣

烘燒頭髮氣

并魚骨諸般臭氣及柴烟入口鼻內

髮絲葑菲毒氣

煮炮煎煮油烟氣

溝渠濁毒氣

孫真人云胡荽酒辟毒惡氣

已下者不... 田舍小兒任之自然... 稟受不同也

瘡痘可畏

不食多渴 渴瀉不食用法黃散白朮散

反齒齲牙 能令痘子隱伏是腎旺也

增寒困倦 能令痘子顯伏是脾虛也

煩燥身熱 搖頭者欲生風候

吐逆洩瀉 食不化正出疥痘後大便膿血

疥作黑坑 內無膿血或黑色疱或先毒跡作黑孔多死

癰疽腫 疔毒變疔口臭蝕唇口臭牙落若死

大小便澀三黃圓

喘急痰盛

熱嘔氣或正出盛或瘵後有此證多死瘵發食腹中鳴者死

已上是瘵痘惡證首尾可畏也除此之外皆不妨內犯其一  
二日但飲食如舊雖困重醫救有可生之理如飲食減  
平日一半者死有飲食如舊內犯其二四亦死

### 論痘瘵治法

小兒瘵漸未出已出之間有類傷寒之狀其瘵瘵病證自然增  
寒壯熱身熱疼痛大便黃稠此乃是正病也若無他證不宜服

藥

凡瘵瘵瘵先分表裏虛實若虛實不分則無所治

如毒裏俱實者其瘡易出易腐也

如表裏俱虛者其瘡易出難腐也

### 疔瘡

董氏曰初出如紅點遂旋起脹形如豌豆而結膿窠方結如疔而愈

癰瘡 即疔子

王氏曰有熱則易出一出遍於肌膚之上如痛瘡細疔子見而

便沒

楊氏曰赤疹遇涼而後消白疹遇溫暖而後滅

傷寒熱毒發瘡

胡氏曰乃熱在表而失于熱毒蒸發其瘡色白或赤如丹頭帶



白膿者輕根下紫色在肌肉者重毒痘瘡也

斑毒紋迹

楊氏曰陽證候投海藥或失汗下陽毒因熱蒸滯外迫毒氣入胃令人發斑其證昏憤關前脈洪大先紅後赤多見於胸腹輕則如癍子重則如錦紋紅者易治黑者難救

紋迹陽脈不洪病人自譁先紅後黃多在手足之間乃紋迹也

丹毒

楊氏曰赤浮肌肉變易五色遊走遍軀

遍認痘瘡

楊氏曰方論所載皆以耳冷尻冷中指冷驗之或中或不當以耳後有紅脈亦續焉的

痘證也

痘因自耳以紅紙粘懸者油無以消則必有小紅點如粟起  
謝氏曰忽然發搐也無痰涎不惡風惟惡熱腹痛則腹先出  
痘則服先出熱輕痘亦輕熱重痘亦重身熱時不出首候身涼  
方出

錢氏曰面紅燥臉唇赤眼瞖黃目胞赤四肢小赤手足冷其尖  
冷尾冷身冷身熱或乍涼乍熱頭痛腰脊疼痛小便赤少大便  
不通不惡寒惟惡熱皆傷多辨必有四臟之證

先發無搖

夾熱吐瀉者不可妄投燥藥真狂瘡發搐者不可妄投寒劑經  
云諸瘡皆出於心火痘瘡雖出於四臟要之心火爲之主蓋氣

始作未形見之間忽然發者乃毒氣自心經而出也苟不以外  
證辯明之而證必有中指冷四臟之證不以痘證防備之使用  
銀粉巴硝麝香等劑更心寒肌冷毒氣內陷往往痘瘡之  
初發者多因誤服寒藥而死氣絕之際或隱隱斑出已無及  
矣蓋心竅一寒則毒氣陷伏表裏不透况心主一身之血心寒  
則血凝不行痘瘡欲出不可得也且痘瘡發時必有外證可驗  
又小兒未居安樂素無痛苦或爾發者痘證也用解表退熱  
消毒快氣利小便藥服之不致誤證待其親證得泄心神亦自  
安矣或有風寒與山熱相博致疾者各從其證治之但加勻氣  
藥爲妙

張氏曰痘瘡氣勻則出必毒氣勻則榮衛無滯有邪亦散大抵

治驚惟平肝利小便爲第一志也

錢氏曰腦田心所生心主熱而生血熱則生風肝風心火二臟  
交爭而發瘡又曰瘡者脾所生脾虛而肝旺乘之木能勝土熱  
動心神而生驚

必令避穢

木得桂而枯柑得脯而壞物之相畏者如此痘瘡之畏穢惡毒  
氣者亦由是也

仲景曰痘瘡欲出宜焚香木仍謹司門戶勿令主人輒入大忌  
狐臭父母房事月婦經水穢觸担動廁糞六畜棲欄穢糞房中  
床帳多掛胡妥以酒灑之常燒乳香降真香使榮衛得香運行  
甚速酒掃房舍潔淨若不防避如法使欲出者不出已出者斑

爛成片甚者瘡黑陷伏加以臭爛痛如刀割悶亂死者多矣

出溼而朝夕啼哭

五臟平和則精神安靜有病則不然痘瘡乃五臟蘊毒發作之時朝夕啼哭當察其毒氣在表在裏若虛甚當隨證調治使氣血流通神守清爽昧者或以爲心熱爲腹疼妄亂用藥以致冷熱偏勝變生他證可不審乎

遍身青紫紋

痘瘡之出乃熱邪內外蒸發熱毒方運天氣暴寒折之外寒與內熱相拒而不得入內熱爲外寒所閉而不能出毒氣壅於肌皮其痘如痣點或青或紫俗云黑搭青或年壯肌肉厚密亦有

此證

面青爲中

上下浴未病心主血痘以血爲主面赤身熱痘紅者乃心之  
證形爲順今面反青色乃色病不相應也其證爲逆更當察其  
外證預防之熱者必坐風虛者必下痢且消風散虛者下痢宜  
理中湯異功散

膿汁不乾

出得太盛膿水不乾粘或惹勝疼痛濕爛不能轉動且白龍散  
敗草散

陷伏倒靨重商

外感風寒不能出者謂之倒靨

胡氏曰若外感風寒肌肉閉塞血凝不行必有身疼四肢微厥

紅點不長或青紫紋或黑色宜溫肌發散寒邪使毒透風復行其  
瘡自出

楊氏曰或因煩燥惡熱揭衣被為風邪所傷或解脫取涼為  
風冷所襲或值天寒為冷氣所侵輕則其壯如赭色紅而不發  
重則陷如石白色白而冰硬治法當溫血氣散寒邪宜不換金  
正氣散加川芎惡寒加桂紫蘇

穢氣觸忤而成倒靨

胡氏曰痘瘡初出未收被父母房事月經等穢氣衝觸欲出者  
使之不出已出者再爛成疔感者瘡焦陷伏加以臭熾痛如刀  
刺悶亂而死急宜黃解毒之常以胡荽酒熨床帳仍掛胡荽以辟  
惡毒宜辟穢丹烈火焚之

瘡黑有逆順

黑醫陷伏本是逆證亦有順者瘡雖黑陷而忽瀉膿血加死能食者為順此必舊服脾藥脾強可以勝腎脾土不致毒入腹而瀉出脾病則五臟危今脾土既盛他證無慮矣所謂逆者脾土虛不能制腎水乳食不化脾虛則四臟危矣

不結痂疔

血疔既成常結膿窠痂疔而愈痂疔者瘡醫是也當結而不結乃內外熱極毒氣散漫無陰氣以斂之古方用宣風散導之磨生犀汁解之或用沙糖滾白湯調化服隨手而愈用沙糖不可大早以膏入目入血疔起脹毒氣弥盛而不結也

疔癰腫硬



痘瘡既平夫爲解利餘毒太盛內不能入於臟腑外不能泄於皮膚聚而不散輕則結於瘡癩重則頭項胸背手足肢節亦腫而成癰疽消毒飲

痘瘡入目

痘瘡毒氣攻目成翳治法活血解毒而已活血不致於熱解毒不致於冷用藥平和其證自退或誤用熱藥反所益疾過用冷藥反以傷脾也

有正痘有膚瘡

臟腑蘊熱不同表裏受證各異六腑屬陽有熱則易出一出偏於肌皮之上如痲瘡泡子見而便沒受毒淺也此名膚瘡俗曰麻子五臟屬陰有熱則難出在肌肉之間受毒深也此爲痘瘡

內虛不能出者謂之陷伏

胡氏曰若胃虛不能副榮衛必出而復沒瘡點白色或黑其人必不能食大便自利或吐或厥急以救裏溫而出之

楊氏曰痘瘡初出或因臟腑虛怯自然吐痢或未發之前候服涼藥以致泄痢其瘡不發形見小點淡紅而白或白而微黃不能起脹治法先正吐痢後以溫和之藥發之宜理中湯沐昏散美功散豆豉圓

熱毒入裏重陷

胡氏曰痘瘡不透心煩狂燥氣喘妄言如見鬼神大小便秘瀉而能食毒毒盛入裏此證甚實及血疱六七日當結膿窠痂疔而不結乃毒氣瀰盛心火炎燥宜猪尾膏曾用服則結痂死神

異奇速獨之 篇于後醫士詳之

黑醫而發寒

痘瘡黑醫其證有四所因不同用藥亦異一者感冒風寒宜溫散之二者毒氣太盛宜解毒利小便三者內虛無陽急宜溫裏四者穢毒觸忤宜重解之大抵黑醫發寒者爲重不發寒者爲輕發寒之證乃脾弱爲腎水所勝用百祥圓瀉膀胱孰若先溫脾土救胃氣以制腎水決無黑陷發寒之證

變壞歸腎黑陷

胡氏曰由蘊毒至重內外蘊結不結加疔大小便秘腹脹瘡黑紫而乾陷錢氏以百祥圓瀉膀胱經毒服之身溫欲飲水者可治加以寒戰身冷汗出耳尻反熱者死獨立

大抵熱蒸而便引者必屬瘡矣熱難出必瘡瘡

湯氏曰小兒痘瘡其證與傷寒相似先當發表使毒氣出腑則成細癩若失表則熱毒在臟則成痘瘡

楊氏曰由風邪夾熱起於湊理皮膚不腫不疼發而搔痒謂之癩癩此風熱在表之浮淺也亦有寒暑濕之氣行焉風熱在表天時炎暄燥氣乘之則爲赤癩風熱在表天時寒涼折之則成白癩赤者遇青涼而後滅白者遇溫熱而後消又有浴後感受汗出解脫得之者隱隱微黃似可似白癩癩肌肉之間而四脉重者此風熱夾濕當用寒暑濕之所由生不可一槩用而執等藥便致嘔吐

餘毒作嘔吐

脾胃主納而不主出大小腸主出而不主納痘疹嘔吐餘毒在胃也病有冷熱之不同藥有溫涼之各異醫士明之

熱吐者心煩而渴食乳甚急暴滿胸中復又吐出如射其人必面赤手足心熱居處喜冷宜去桂五苓散加橘皮生薑汁服冷吐者面色青白乳食隨吐不化大小便自利宜理中湯羌活散大抵病後餘毒多是熱證其間冷證十有一二

吐瀉不食

吐痢有冷熱之不同不食有虛實之各異吐而不渴瀉而手足冷面色青白此冷證也羌活散治之既吐而且瀉瀉而手足心熱面赤身熱喜居冷處此熱證也五苓散竹葉石膏湯如熱證治之脾胃虛弱精神慢而不食者為虛當溫養之理中

其功散立效  
皆木香散

貴賤不同用藥亦異

富貴之人形弊而志若加之奉養遇風雨寒暑邪氣易爲侵襲  
方暑而傷熱多陰則中寒嗅荆芥薄荷而腹痛服薑桂雄附而  
不知其熱貧賤之人其身雖苦其志則安服薑桂蒼朮則發熱  
大便秘習風雨霜雪而習以爲常由藥之際不可一槩論也又  
有形志俱樂形志俱苦之不同醫士宜併知之

癰疽論

夫癰疽始出之證必先見面爛腮赤目胞赤呵欠煩悶乍涼乍  
熱咳嗽噴嚏足稍冷多腫忽驚并瘡疹之證或生膿泡或生小

紅藍或生癭癩此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上諸證皆太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎是太陽勝膀胱寒水夾脊逆流上頭下額達手太陽丙火不能傳導逆於面上故顯是證蓋壬寒水尅丙丁熱火故也諸般證皆從寒水逆流而作也醫士當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名膀胱亦名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生死之源非五行也非水亦非火此陰陽之異名也象坤土之主萬物也夫人胎感血海始靜一日二日精緣其血則為男子三日四日五日血氣已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長先身生謂之神又謂之精道釋二門謂之木來固是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸亦吸者陽氣也而生動作益精氣神則食

母血滑則飲膠血腫日長皮肉筋骨血脈形氣俱足十月降生  
口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻  
于一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下溜合於腎中  
三火交攻營氣不從逆於肉裏歸于陽明故二番癩始顯之證  
皆足太陽于膀胱起小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉裏  
熱化爲膿二火熾盛反傷寒水遍身俱出此理皆足太陽傳變  
中來也當外發寒邪便令消散內瀉二火不令交攻其中今濕  
上歸復其本位可一二服立止仍令小兒已後再無二番癩出  
之患此內外經之法詳矣

癩疽勸戒論

多有入不會醫小兒疔瘡今具捷法如信用之者但保十全醫



醫至當先說病源狀後診視庶無差錯言之幾何人哉

痘瘡既分曉部有二證一曰好證二曰常證三曰危證


一好證若乳食與大便如常或一日一次或兩日一次通者此爲好證不須服藥亦自愈如要服藥只平和不冷不熱即安

二常證出痘瘡而大便秘小便赤者此是常證

三危證出痘瘡而腹瀉不已及小便青者此爲危證用生料理中湯四味加藿香葉數片入米三十粒濃煎服人家出痘瘡爲父母者切忌色慾不得熬油不得出廁仍須忌食一切毒物

陳氏形證圖

瘰癧 日一日始見微微欲出如粟米未入或如蠶豆大似  
 水珠光澤明淨者極佳



○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

四日五日痘瘡大小不一等根窠紅光澤明淨者輕如稠蜜頂陷灰白色或瀉瀉者重

六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促汗乾腹脹止指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟已者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴

牙者至重

十日至十一日瘡潰腐爛加欲結而愈

冷而虛

身冷

自利

吐瀉

脾胃虛冷

乳食不進

精神慢

自汗

乳食不化

腹脹

口氣冷

至初心虛

真

治法冷則溫之

熱而實

身熱

大便秘

小便赤色 脈大

喜居冷處

手足心熱

吐痢而渴

口氣熱

治法熱則涼之

輕者

出瘡作三次出

大小不一等

頭面稀少

眼中無

根集紅

肥滿光澤

裏外肥紅

痘出稀少

乳食

如常

色亦發於皮膚

重者

一齊片出

密如蟻種

稠密無縫

五內七孔回目

皆有吐衄

瘡灰如色

身溫

脈脹

頭溫足冷外

白內黑大

瘡內黑點如針孔

或如茱萸三五

半輕半重

外黑內赤

痘瘡夾疹

輕變重

犯房室

不忌口

冒風寒

食生冷

飲冷水

食小蜜

過飽食飢

飲酒多

服熱藥

誤服升麻湯大黃白芍等涼藥

月婦外人穢解

痘已出而汗妄下

信巫不信醫

不食血肉

担廁糞六玄里樓欄

重變輕

避風寒

常和暖

大便秘

不燥渴

忌外人

萬物以禁

大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生

成者也。今瘡癩之病，臟腑調和則無氣克實，自然易出，易屬益。因外常和暖，內無冷氣之所由也。

### 表裏俱實

小兒瘡癩始出一日至十日，溲身壯熱，能食大便黃稠，小便清利，乳食如常，其瘡必光澤，必起發，必肥滿，必易屬根，氣紅是表裏俱實而不致損傷也。

### 表裏俱虛

小兒痘瘡已出未愈之間，其瘡不壯，澤不起發，根窠不紅，或腹脹或瀉，渴或氣促，是表裏俱虛也。常一二味異功散，七味肉苳菰圓治之，以助五臟六腑表裏之氣。

### 不宜用升麻葛根湯

小兒如痘癘始出一日至五七日之間雖身熱成癍脹足稍冷者不宜升麻葛根湯或身熱瀉渴者亦不宜升麻葛根湯或身熱驚悸腹脹者即不宜升麻葛根湯或身熱汗出者不宜升麻葛根湯已上四證宜服一味木香湯治之

### 戒用升麻葛根湯

道有經有權兵有正有奇病有常有變常有可必變者不可必古人用升麻之意治痘瘡之常不治痘瘡之變常有未見癍點之先已結痂死之後自發熱者常也若夫癍點既見及正出未收其證不一曾無定論可拘如傷寒得變不一也安可執一藥以應無窮之變哉且升麻葛根湯藥性大寒不過涼肌解表而已今昧者不能究此既出未收之際回令服餌及愈受虛弱者



鑒用之致令肌寒表弱陷伏危殆醫士戒之

錢氏曰古方用升麻葛根湯治痘瘡已發未發皆可服世習以爲常不問虛實冷熱正出未收以爲常用之劑蓋升麻葛根湯其性寒涼若小兒內虛胃弱則以水濟水虧損胃氣水凝血脈使已出者不能起脹未出者陷伏不起或出而後陷傷生之命可不慎乎

陳氏曰痘瘡首尾皆不可用升麻葛根湯切宜戒之

小兒出痘癍時方言先用四味升麻葛根湯涼劑又方用五巴豆煮爛食之豆性亦涼須看虛實大便不通或大小便赤黃色可用大小便青白色或泄瀉二方切不可服

宜利之過

小兒痘疹雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解散致令臟腑受冷榮衛漸滯則氣血不能衝衛皮膚肌肉其瘡不得起發不得克滿不得結實不能成痂故多痒癩煩燥喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生而必罕矣

### 瓜菓冷物

小兒瘡疹發熱口熱乾燥煩渴不止者切不可與冷物食之又不可妄投清涼飲消毒飲等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰嗜牙難治咬牙者齒槁也乃血氣不禁也不可妄作熱治之

### 泄瀉

小兒瘡疹若如瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者宜十一味木

香散七味。薤白。圓。治之。瀉止者。住服。不止者。多服。

瀉脫

小兒瘡癩。若瀉。類多津液。內耗血氣。不榮其膚。雖是起發。亦不能。醫也。如身溫。腹脹。齒牙。喘渴者。難治。緣水穀去多。津液枯竭。而欲飲水。不止者。瀉散。真氣。故多死矣。速與十一味。木香散。急救之。如不愈。十二味。異功散。治之。

瀉腸

小兒瘡癩。如四五日。不大便者。可用肥。嫩。猪。胰。一塊。以淡。白。水。浸。火。煮。軟。熟。取。出。切。如。豆。大。或。皂。子。大。與。兒。食。之。令。臟。腑。滋。潤。使。瘡。疔。易。落。百。無。滯。礙。切。不。可。妄。投。宣。瀉。藥。恐。內。虛。瘡。毒。入。於。裏。傷。元。真。氣。

大便熱結

小兒瘡癩六七日身壯熱不大便其脈緊盛宜三味消毒飲服  
微得利即愈

禁忌

小兒神氣軟弱瘡癩言初出二三日至十二日當忌外人恐有  
卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡癩

寒熱

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸  
湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不  
知熱治之何如故陽盛則補陰十一味木香散加丁香桂陰盛  
陽虛十二味異功散加木香當歸每一兩藥共加一錢

小兒瘡癩若身反發熱煩渴者宜六味人參麥門冬散治如不  
愈服七味人參白朮散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜若  
與者轉渴而死且十一味木香散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者不  
可與水蜜若真者即死急宜十二味異功散治

小兒痘瘡十一日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧計  
則硬氣煩渴嚙牙急服十二味異功散更加木香當歸以救陰  
陽表裏若與水蜜西瓜等冷物者殺之文忠誠告

賢明君子當且詳審

十二日十二日瘡痂已落其瘡癩猶黯紫或凹或凸肌肉尚嫩不

可濕浴亦不宜食炙博物乃 不宜食五辛五味并毒之物恐熱  
毒薰於肝肺眼目多生翳障 若不依此熹馬兒身之患宜  
三味穀精草散治

若痘瘡磨已其痂欲落不落煩渴不止切不可食蜜而瓜紅  
柿冷物等食之若與之轉生寒渴或頭暈或或弱脹或時瀉  
或咬牙以致難愈五十一味水煎服

壯熱不除

若身壯熱經日不除則無他證者三味柴胡麥門冬散治熱退  
若住服如不愈服七味人參白朮散

深睡身熱

若涕唾稠粘身熱身熱大便如常小便黃赤宜下六味人



若身熱大渴者宜七味人參白朮散如不愈者服十一味木香散治

渴

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面皸白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不已者已上九證即非熱脾胃肌肉虛津液衰少故也宜十一味木香散如不愈者更加丁香桂多煎服丁香攷裏桂發表其表裏俱實而瘡不致痒喘渴而死矣

身生癰腫

小兒痘瘡首尾不宜與水塞其喉與之瘡腐之後其枷運若或身生癰腫若鍼之成瘡蝕瘡血水不絕其則宜直唇白以致難



愈者何也蓋脾屬土外主一身之肌肉抵緣飲水過多滯損脾胃傳於肌肉其脾胃肌肉虛則津液衰少津液衰則榮衛滯滯榮衛滯則氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而身生癰腫也

### 疔蝕瘡毒

小兒瘡癤已屬未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膏腠之間則津液滯滯故成疔蝕瘡也宜雄黃散綿繭散治之而不愈者潰骨傷筋以致殺人

### 疔蝕瘡毒

小兒疔蝕瘡毒之病俗言癩子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所化薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤癩遍身也

先發赤痘者十生  
外發黑痘者十死一生

痘毒生熱

痘毒多生熱 攻衝 氣血虛 黃肝睛上膜 入肺嗽難除

傳腎瘡猶黑 傳脾吐涎有餘 傳心驚恍惚 眠臥不能舒

痘毒攻肝

熱毒攻肝膽 羞明眼 溼昏 赤筋生白膜 白翳結癩痕

瘡痘如珠

瘡痘如珠 肥紅正行 瘡毒石解利 有瘡毒

痘毒未盡

痘毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

痘後結毒

痘後結毒癰疽

肌層熱未除

瘡毒

噤喉無歡意

驚眠不自如

腸鳴

痘毒及胃亦結毒

痘毒及胃亦結毒

痘毒及胃亦結毒

仇傳臟腑結毒

痘毒及胃亦結毒

衝脈衰弱

侵腎耳聾腰尻痠

痘毒及胃亦結毒

心驚若也邪干犯

驚哭精神不自居

痘毒及胃亦結毒

痘後牙疳

痘後亡津液

主痘餘毒斷

侵唇連口鼻

損肉又傷筋

瘡後壯疔

發熱肚中痛

瘡瘻腹內攻

出多防不瘳

出少更防癰

瘡痘便難

毒氣每熱又攻 尿難養不通 數日須鼻衄 或瀉又腸風

瘡痘逆候 不治

吐瀉疰瘡逆 便難膠亦危 醫者因走氣 屬痘血之衰

瘡痘變證 不治

喉物時時噎 喉中搶錯聲 喉淡頭有汗 腹脹氣虛鳴

瘡痘青黑 不治

瘡痘欲出先青黑 半在皮膚紫黑色 昏沉默默又增寒

困頓其具都不食 心煩延盛痛膿頻 射熱喘急癰腫極

渴吐裏牙時發顛 毒嘔咽啞氣喘寒

全生方云一病未已一病復生五行勝復相乘其人必死

痘瘡五不治

痒塌寒戰咬牙渴不止

此番面色而渴不寧

灰白色陷頂腹脹喘渴

清溫足公臨亂飲水

咬牙氣促瀉瀉煩渴俱難治

一切脉豆變作死候

通身忽生起如雞子大腫毒鬼

忽自瀉下鮮血并黑豆如死雞

唇青黑縮咽喉腫閉口舌喉生

忽被外風手足搖擗直視口吐

肚脹如鼓氣喘煩燥大熱發渴

瘡子紫黑色癍心先陷沒後

瘡子出後通身氣腫如冬瓜氣

急促

面耳口鼻俱黑四肢逆冷項軟汗出大汗

手足身軀俱冷如冰腎中寒縮口吐腥臭

被外風面色青黑手足搐作鵠股手足攣

一向作大熱煩燥喘急服諸藥熱不退回黑

消毒救苦湯 治嬰孩小兒疳證悉具消化便令不出如已出

稀者再不生癥立方隨四時加造化明藥性者能此

麻黃根

羌活

防風

各半錢

細辛 去葉

地黃

蘇木

白朮 去梗

橘皮

川芎

藜蘆

紫胡

黃芩

各一分

葛根 去皮

蒼朮

赤泔水浸

黃連

去脂炒

當歸

去蘆各三分

紅花

連翹

吳茱萸

甘草

生各半錢

黃蘗 酒浸

升麻

煨各五分

右咬咀水煎食前熱服

小兒出痘瘡時用五色豆煮爛和只齊出

赤豆

黑豆

白豆

菉豆

黃豆

論用五色豆煮爛食豆性涼須看虛實大便不通或大小便赤黃色可用大小便青白色或泄瀉切不可服

防避入目

瘡瘡護眼人多用胭脂塗目四邊仍以黃蘗膏塗之

黃蘗膏 治嬰孩小兒瘡癩正出用此藥塗而後用胡荽酒

黃蘗 五錢

新葶豆

五錢半 甘草 生二兩

右爲極細末用生油調如膏從耳前至眼匡唇口並厚塗月  
三五次若早用瘡不生頭面用之遲縱出亦稀

胡荽酒防諸般惡氣用胡荽二兩切細入好酒二盞煎令沸沃

胡荽便以物合定不令氣出候冷出薄微毋吸一兩口

噴從項已下噴背脊及兩足心腹令遍勿噴面上頭病人

左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡癩出快忌外人穢觸

之物雖不可受風冷然亦不可擁逼常令衣服得中并虛

涼處坐卧



楊氏曰胡荽酒噴身瘡便出快也若見虛弱及天氣陰寒則可  
用之若春夏晴熱陽氣發越之時及兒壯實加以酒麴助虐以  
天益火胃中熱熾毒血蓄聚變成魚腦急煎薄荷湯入猪尾血  
和龍腦服

薰解穢惡

阮氏辟穢丹

蒼朮

細辛

甘松

川芎

乳香

降真

右爲末用水圓引火焚解穢氣

小兒痘瘡房室中宜時時燒大黃末末以辟穢氣不宜燒沉檀  
香真麝屑乳白膠等香煎燭肉油益益切忌之

疔瘡不透乾黑危困用棠穉子右爲細末紫草酒煎調服食前  
新生小兒上三日將木身兒脫下臍帶燒灰研極細末用親母  
乳汁調灌服不拘時候不生痘瘡

芥子膏 治嬰孩小兒瘡痘不入服

白芥子

右爲極細末用木調傅足心引毒歸下

仙退散 治嬰孩小兒疔毒入眼成翳

蟬蛻

右爲極細末用羊肝煎湯調化食後服

十 味木香散 治嬰孩小兒性溫平能和表裏通行津液清

上實下扶陰助陽之藥腹脹瀉渴如神

木香

大腹皮

桂心去心

前胡去蘆

橘紅去白

丁香

訶梨勒煨去核

人參去蘆

半夏麩炒

赤茯苓去皮

甘草炙各二錢

右爲散用水一小鍾生薑三片同煎去滓食前溫服量兒  
大小以意加減服藥後忌蜜水

十二味異功散 治嬰孩小兒能除風寒溫痺調和陰陽滋養  
氣血使疳瘡易出易愈蓋因不致瘵塌文中代代世醫不敢妄  
處藥餌思人身難得因果非輕

木香

當歸去蘆焙

人參去蘆

橘紅去白

厚朴薑汁製炒丁香

肉豆蔻

麩

去油各二錢半桂去皮

茯苓

六錢

白朮各二錢

半夏麩炒

附子炮去毒以尖各一錢半有執不用

右為散用水一小鍾生薑三片棗五箇去核同煎去滓食  
前熱服二歲兒作三次服五歲兒作二次服一週二歲兒作  
五次服病有大小以意加減累經效驗參水

七味肉苳蔻圓

木香

縮砂

去殼各二錢

白龍骨麩

訶梨勒煨去核

肉苳蔻麩麥煨去油各五錢

赤石脂散

白礬

煨各七錢半

右為極細末糊圓如黍米大用米飲食前服一週兒服三

十圓或五十圓三歲兒服一日圓瀉不止異功散同服瀉止  
住服若不止瀉多服

人參麥門冬散

麥門冬去心兩

人參去蘆

甘草炙

陳皮去白

厚朴薑汁製炒

白木各五錢

右以鹽用水煎不拘時候服

人參清腦散

人參去蘆

柴胡去蘆

羌活去蘆

芍藥炒

知母

天麻去蘆

白木

黃耆炙

紫石英去土

地骨皮

茯苓土炙

石

滑石各七錢半

右劉散用水煎食遠溫服

射干鼠粘子湯

鼠粘子炒一兩 甘草炙

升麻煨

射干各二錢半

右劉散用水煎不拘時候服

穀精散 治嬰孩小兒痘疹已靨眼自翳膜遮障瞳人癡澁  
淚出久而不退

穀精草五錢

蛤粉生一兩

右爲極細末獺豬肝一葉用竹刀批作片子擦藥在內用草  
繩縛定以菟藟肉貯水慢火煮熟令兒食不拘時候

前胡枳殼湯

前胡 去蘆

赤茯苓 去皮

枳殼 去穰麥麩炒

甘草 炙各二分一錢

大黃 酒洗紙裹煨一錢

右以咀用水煎去渣分食前服如身溫脈微并瀉者不可服

四聖散 治嬰孩小兒疳瘡出不快倒驚小便赤色餘熱不除

紫草

水通 去節

甘草 炙

黃耆 炙

枳殼 去穰麥麩炒各一錢

右以咀用水煎去滓不拘時候服

紫草散 治嬰孩小兒疳瘡疔瘡黑陷

紫草

甘草

黃耆 炙

糯米 各一錢半

右咬咀用水煎去滓不拘時候服

生地黃散

治嬰孩小兒癩駁身熱口乾咳嗽心煩

生地黃五錢

麥門冬七錢

欬冬花五錢

杏仁七錢

陳皮各三錢

甘草炙二錢

右剉散用水煎去滓不拘時候服

稽榎甘草防風湯

稽榎去麩炒

甘草炙

防風去麩炒

右咬咀用水煎去滓不拘時候服

麥湯散

治嬰孩小兒水瀉

地骨皮炒半分 麻黃去節一分 甘草炙半分

滑石水煎半分 人參去蘆

知母



甜葶塵

紙卷煨

卷活

上廣各一

右剉散用水煎入小麥七粒同煎不拘時候服

身痒

氣血不足其痒爲虛不進乳食胃主肌肉調脾進食活血自氣  
其瘡不致痒塌

一物湯

蟬蛻

去足洗淨二十一枚

甘草多一錢

右以咀用水煎去滓食遠服

阮氏收草散

屋爛草

乃蓋屋多生干爛草如無益者燒其亦可

右其草多經霜雪雨露感大地陰陽之氣善解瘡毒其功不

能盡述一味不以多少晒乾或焙乾為極細末吃則熱時將  
渾身癢破膿水不絕粘黏衣裳難以坐卧可用二三升攤席  
上令兒坐臥仍用十一味水香散如丁香桂煎服。

王充白龍散

黃牛糞晒乾火煨過成灰取中白者用

右為極細末用綿包撲之

百草膏 治嬰孩小兒痘風瘡

乾羊糞燒灰清油調傳

滅癩散 治嬰孩小兒痘瘡癩愈毒氣尚未全散瘡如雞落其

癩猶黥或凹或凸

韶粉一兩

輕粉一字

右研極細末煉豬脂油調傳

百花膏

治嬰孩小兒痘瘡疔難心誤抓成瘡及瘡疔欲落不

落

蜜用好白蜜

右塗瘡上其疔易落自無紫黑癩痕

綿繭散

治嬰孩小兒身腫及肢節上生疔腫瘡膿水不絕

出蠟綿繭

右不拘多少用生白礬搗碎塞入綿繭內令滿以炭火燒化

白礬汁盡取出為極細末用乾紙貼疔瘡口內

猪尾膏

治嬰孩小兒瘡癩醫用猪尾尖刺血亦好

龍腦

右細研旋滴猪心血圓如茶棗大用紫葢散  
潘氏曰此方與靈死方同須更一身痘出後安  
橫矣

四聖丹 治嬰孩小兒癩疔

珍珠七粒或三五粒研 琥珀四十九粒

頭髮不拘多少燒灰

右為極細末用搽面臙脂調成膏子  
藥點入疔內即時大小  
有灰頂者十死八九  
也今要於癩疔黑色中  
疔又有瘡臭氣者為疔  
依方治之救人多矣

李幼心

卷

四物湯 治嬰孩小兒時行瘧疾過熱之出氣不舒不快又

消瘴癘除毒大凡瘧症不濟者為即以此藥能活血調

瘴癘無如此藥活人善白芍藥一味無末法在法於不快以此

四物湯誠瘴癘之仙藥也 一六加首草丸

白芍藥 炒

川芎 去土

熟地黃

當歸 去土炒

右取咀用小一小盞煎去滓服不拘時候此是婦人藥

痢入櫻栗殼炒同煎

天花散 治嬰孩小兒瘧疾失音

天花粉

桔梗 五厘

茯苓 去皮

訶子 煨去核

石菖蒲

甘草 炙

右爲極細末用水調在碗內小竹七葉小荆芥七葉薄作一  
束點火在碗內煎臨睡服

小兒明堂灸經

夫小兒之患詳悉幽玄默而抱疾且不能言也或即胎中受病  
或是生後傷風動發無時寒溫各異且據諸家方論醫藥多門  
藥既無痊全憑灸法散在諸經文繁至其其說不同既點穴以  
差訛則治病全然紕繆按諸家明堂之內精選到小兒應驗七  
十餘穴定是曾經使用累驗神效今錄于後

天醫取師療病吉日

正月卯日    二月寅日    三月丑日    四月子日

五月亥日    六月戌日    七月酉日    八月申日

九月未日

十月午日

十一月巳日

十二月辰日

點灸法

凡點灸時須得身體平直四肢無令拳縮坐點無令俯仰立點無令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒好肉虛忍心痛楚之苦有病先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多皆宜審之

下火法

凡下火點灸欲令艾炷根下赤暈廣三分若不三分孔穴不中不合得經絡緣榮衛經脈氣血通流各有所主灸穴不中則火氣不能遠達而病未能愈矣

用火法

古家用火灸病忌八般木火切宜避之八木者松木火難避

病柏木火傷神多汗竹木火傷筋目暗榆木火傷骨失志桑木  
火傷肉肉枯棗木火內傷吐血柘木火大傷氣脉楠木火傷榮  
衛經絡有火珠耀日以艾盛之遂得火出此火灸病爲良凡人  
卒難備矣次有火照耀日以引之便得火出此火亦佳若遇天  
色陰暗遂難得火今卽不如無木火也灸人不犯諸忌無云元  
痲清油點燈燈上燒艾莖點艾是也無滋潤灸後至瘡愈已安  
且無疼痛用蠟燭更佳諸蕃部落知此八木火之忌用銅鐵鑿  
砢石得火出以艾引之遂乃着灸

人神所在不宜針灸

一日在大指

二日在外踝

三日在股內

四日在腰間

五日在口舌

六日在兩手



七日在內踝

八日在足

九日在尻

十日在腰背

十一日在鼻柱

十二日在髮際

十三日在牙齒

十四日在胃管

十五日在遍身

十六日在胃

十七日在氣衝

十八日在股肉

十九日在足

二十日在內踝

二十一日在手小指

二十二日在外踝

二十三日在肝及足  
二十四日在手陽明

二十六日在背

二十七日在膝  
二十八日在陰

二十九日在膝脛

三十日在足趺

此日忌灸

十二時不宜灸

子時在踝

丑時在頭

寅時在耳

卯時在面

午時在胸

未時在腹

申時在心

酉時在背

辰時在項

巳時在乳

戌時在腰

亥時在股

十一部人神不宜灸

建日在足禁晡時

除日在眼禁日入

滿日在腹禁黃昏

平日在背息入定

定日在心禁夜半

執日在手禁雞鳴

破日在手禁平旦

危日在鼻禁日出

成日在唇禁食時

收日在頭禁雨中

開日在耳禁午時

閉日在目禁日跌

每月忌口不宜灸出血

正月丑日

二月未日

三月寅日

四月申日

五月卯日

六月酉日

七月辰日

八月戌日

九月巳日

十月亥日

十一月午日

十二月子日

新忌傍通不宜灸

新忌傍通不宜灸

新忌傍通不宜灸

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二  
月 庚戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥  
月 癸戌 戌 戌 丑 丑 丑 辰 辰 辰 未 未 未  
月 殺丑 戌 未 辰 丑 戌 未 辰 丑 戌 未 辰  
月 刑己 子 辰 申 午 丑 寅 酉 未 亥 卯 戌  
日 善己 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午

四季人神不宜灸

春在左脇 秋在右脇 夏在臍 冬在腰 男忌除日 女

忌破日

貼灸瘡去

春取柳飛花如鷓毛者夏用竹膜秋用新綠冬用兔毛取

白紙者猶見厥上者更佳

正人形第一圖



小兒驚癇者先驚悸啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大

小兒風癇者先屈手指如數物乃發也灸鼻柱上髮際宛宛中三壯炷如小麥大

小兒緩驚風灸尺澤各一壯在肘下橫文約上動脈中炷如小麥大

小兒二三歲忽發兩眼大小皆俱赤灸手大指次指間後一寸五分陷者中各三壯炷如小麥大

小兒顛門不合灸臑上臑下各五分元各三壯灸瘡未發顛門先合炷如小麥大

小兒夜啼者上燈啼雞鳴止有灸中指甲後一分中衝一壯炷

王人形第二圖



小兒喉中鳴嚙乳不利灸璇璣一穴三壯在天突下一寸陷者中炷如小麥大

癰病者小兒惡疾也呼吸之間不及未師致困者不少諳二國無良醫枉死者半小兒猪癰病如口穢吐沫灸巨關穴三壯在鳩下一寸陷者中炷如小麥大

小兒睡中驚目不合灸屈肘橫叉中上三分各一壯炷如小麥大

小兒口有瘡鍾斷鼻穢氣衝入灸落唇已一穴各一壯左手心中以名指屈指頰際言者處是也炷如小麥大

小兒雞癰善驚反掣目揉灸手少陰二壯在掌後去腕半寸炷如小麥大

小兒瘡久不愈者灸足大指次指外間陷者灸各一壯壯女小  
 麥大內疔尤也

正人形第三圖



合身骨節



小兒身強角弓反張灸鼻上入髮際三分三壯灸大椎下節間三壯炷如小麥大

小兒龜胸緣肺熱脹滿攻胸膈所生又緣乳母食熱麪五辛轉更胸起高也灸膈乳前各一寸半上兩行三骨驛間六處各三壯炷如小麥大春夏從下秋冬從上灸下若不依此法灸十患不愈一二也

小兒疳眼灸食各二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中灸三壯如小麥大

小兒秋深冷痢不止者灸臍下一寸二寸間動脈炷如小麥大

正人形第四圖

肺心三俞

鬼祿穴

膝下分水穴

中指節

脊背動脈



小兒驚癇灸鬼祿穴在下唇內中央弦上炷如小麥六綱刀決  
斷更佳

小兒木氣盡腫及腹灸臍上一寸二壯炷如小麥六分水穴  
小兒熱毒風盛眼睛疼灸手中指末節頭三壯名拳尖也炷  
如小麥六

小兒龜背上生時被寒風拍着脊骨風達於髓也所致如是灸  
肺俞心俞膈俞各三壯炷如小麥六

肺俞在三椎下兩傍各一寸半

心俞在五椎下兩傍各一寸半

膈俞在七椎下兩傍各一寸

小兒臍腫灸腰對臍骨節間炷如小麥六

正人形第五圖



小兒急驚風灸前項一穴一壯在白會前一寸若不愈須灸兩  
眉頭及鼻下人中一穴炷如小麥大

小兒但是風癇諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分豎而  
取之蠐螬穴也

小兒嘔吐奶汁灸中庭一穴一壯在臍中穴下一寸陷者中炷  
如小麥大

小兒目溢怕明狀如青盲灸中渚一穴各一壯在手小指次指  
大節後陷者中炷如小麥大

小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫大頭白內除  
各一壯炷如小麥大

小兒睡中驚掣灸足大指次指之端芸瓜甲如菲葉各一壯炷

正人形第六圖



小兒多疳者是腦風被風拍着及肺寒也灸額會一穴二壯炷如小麥大在上星上一寸直鼻

小兒急喉痺灸天突穴一壯在歧骨結喉下二寸兩骨間炷如小麥大

小兒食癩者先寒熱酒 乃發也灸鳩尾上五分三壯炷如小麥大

小兒半癩目直視腹脹乃發也灸尾一穴二壯在臍後骨下五分陷者中炷如小麥大

小兒馬廐張口搖頭身反折馬鳴也灸僕勞二穴各二壯在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之炷如小麥大

小兒陰疝灸肉崑崙二穴各二壯在肉蹇後五分筋骨間陷中

大麥小炷

背人形第一圖

百會穴

富貴穴

承漿穴

九種上穴





小兒脫肛瀉血每則瀉肝撮痛不可忍者灸百會一穴三壯在頭中心陷者是也炷如小麥大

小兒初生三四日七日內嚔不吮奶多啼者是客風中於臍循流至心脾二經遂使舌強唇脛痙攣得斯疾所施方藥不有十全大抵以去風無過灸承漿一穴七壯在下唇稜下宛死中是也次灸頰車一穴各七壯在耳下曲頰骨後炷如雀尿大小兒食時頭痛及五心熱者灸噤噤穴各一壯在第六椎下兩傍各三十宛宛中炷如小麥大

小兒三五歲兩眼每至春秋心赤白翳遮睛二疼痛不可忍者灸九椎上一壯炷如小麥大

習人第二圖



小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難灸心俞穴  
壯炷如小麥人在五椎下兩傍各一寸半陷者


小兒痢下赤白秋末脫肛每痢肛疼不可忍者灸十二椎下節  
間名接骨穴灸壯炷如小麥大

黃帝療小兒疳痢脫肛躄瘦渴飲形容瘦悴諸般醫治不差者  
灸翠尾骨上二十骨陷間三壯炷如小麥大

岐伯云無二伏時內用桃柳水浴孩子午正時當日灸之後用  
清帛子拭盡有似見蟲子隨汗出也此法神效不可量

歧伯灸法小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯如小麥大春  
端窮骨也

背人形第三圖



小兒癰毒入眼灸大疔二穴各一壯在項後第一椎下兩傍各一寸半陷者中炷如小麥六

小兒好癖日不明者灸中俞一穴各一壯在肩甲內無土者

二寸陷者中炷如小麥六

小兒三癰目腫吐舌驚也灸第九椎下節間三壯炷如小麥

六

小兒飲水不歇面目黃者灸陽剛二穴各一壯在十四椎下兩

傍各一寸陷者中炷如小麥六

小兒胎產加偏腫面黃灸囊後縫十字文當上三壯春灸夏較

夏灸秋較秋灸冬婦人灸春較炷如小麥六

小兒疳瘦食飲少水肌膚黃胃俞各一壯在十二椎下兩傍各

一寸眉者常炷好小麥大

一日為醫一日憂

上三科分自傳流

瓜通三部須防變

藥施千金為弗瘥

補瀉先明惟委

陰陽務在論剛柔

毫釐差矣任生命

潑水焉能再得收

全幼心鑑卷之四終