

萬氏秘傳片玉心書

原缺

荒殘失懷青囊者未嘗不歎
恨也。辛丑五世孫萬通立褒叔
藏於千百泥磚蓋魯壁之經天
直不欲絕此道柱後襯焉弗色

人士

方悅李師

朱子

暇僉清對梓

基而慮工浩

難成余與通之謀曰通主有小
兒片玉脰脢乃寄

所不

而全書未移載者曷先刊而後
全書之藉通之欣然乃出厲補
友致行授梓踰年載而貽就
嗣后全書漸次刊行然見

小兒一書圖彩方症採訥鉤

尤洵盧扁之精微 肾堂之未

及聞悉者如許奇珍寧不

寶歎父母斯人小兒乃幸矣

雖然仁壽

生

心良

大

一出將民生

繕之于上俱遊於堯天舜
中矣。謂謂醫工書非采庸
教鐸之功德。祚誰謂萬氏
之書不成於仁人君子之
間

揚武企傳金聲以德不朽云

貴

順治乙卯年歲在夏穀

旦邑人呂蘇齋一貞書額

萬氏秘傳片玉心書目錄

卷之一

活幼指南賦

慈幼做心賦

卷之二

小兒總治法

卷之三

四

水今

額印

歌

鼻準論歌

承浆兩眉論歌

歌

風池氣泡兩頸論歌

歌

兩臉論歌

歌

覩形色憶論

歌

命門部位圖附歌

歌

小兒肺法

歌

胎毒門

寒熱門

驚風門

風吐門

瀉泄門

止瀉門

痢疾門

止瀉門

卷之五

瘡疾門

發熱門

哮喘門

咳嗽門

心腹痛門

浮腫門

黃疸門

夜啼門

大小便門

目病門

鼻病門

舌病門

咽喉門

諸瘡門

班疹癰瘍門

羸痺門

貧弱門

內門

口瘡門

牙齒門

形声門

丹毒門

秘傳十三方

目錄終

萬氏秘傳片玉心書卷之一

山東泰安州李雨雷方悅處樂峰

耀田萬全密齋著

活幼指南賦

小兒方術號曰啞科口不能言脈無可施惟愁色以為憑竭心思而施治故善者似豢龍以調讒不善養子者如舐犢而已惜愛之愈勤害之愈急乍頭溫而是冷忽多涕而不止之毫釐失之千里此小兒方術專門以捕忙之不及

腸胃脆薄易于飲食易傷筋骨易于損易于風寒易襲父母何知晝承太極重錦厚襖及滿陽以耗陰流歡放飯持敗脾而損胃門異聲見異物生于隄防深其居簡其出過于閑密失期而行立易于喜其長成無事而嘻笑易于謂之驕懶一旦病生變親心戚不信醫而信巫罔求藥而求鬼乃人事之弗修謂天命之如此

欲觀氣色先分部位左頰子腎龍屬肝右頰子白虎屬肺天庭高而離陽心火地低而坎陰腎水鼻

左頰即
右頰骨即

在面中脾通氣覗乎色之所現知乎病之所起又况脾應乎唇肺通乎鼻舌乃心苗目為肝液胃流注于雙頤腎開竅于兩耳瓜則筋餘而脾為之運變則血脈而腎為之主脾司手足腎連牙齒苟本臟之或衰即所屬之先憲能辨形色乎似撻撞鐘若昧朕兆乎如石投水

凡觀乎外可知其內色覗乎素晝色露而驚悸如煤之黑兮中惡之圓似橘之黃兮脾虛之謂白乃麻癆紫為熱急晝連口角扁鵲難醫黑掩太

陽虛醫莫治。舉毒赤光兮。多生瞞血山。恨青色兮。
頻見灾危能察色。以知凶凶。按圖而索驥。

朱雀貫於雙瞳兮。火不水絶。星龍繞于四白兮。肝
乘肺位泄病而帶陽者。須防咳嗽而施藍者可畏。
腰痛方殷常面青而脣撮驚風歇。發先顛赤而目
瞪火光繼。又苦外感風寒。金氣浮。又苦中藏癖積
乍黃乍白兮。辨熱連綿。又青丈赤兮。風邪緊急察
之既精治之得。理鴉聲魚口枉費心機。肉折皮乾
空勞氣力。

朱雀即心經心屬火。星龍即腎水。水火即水鄉即
火魁即水。青龍即木。肝經即木。

氣色改移形容變易氣乏則顛門成坑血衰則頭
毛作穗眼生眵淚兮肝風瞤目口流涎沫兮脾冷
滯顧面目虛浮定膨脹而氣喘眉毛顰蹙則耽痛
以多啼蛇呵兮脾胃漸敗霍瘡兮肝臟先虧尚瞑
眩而弗瘳縱神仙亦何益

手如數物兮驚風將
如塗硃兮心火已熾坐
卧參冷兮頓

脚小脾欬困而成痺耶
張勢已危而必斃弄
舌脾熱鮮顧腎懲重舌
衣蓋熱積于心脾硬氣

喘氣實火浮于肝肺齦竅心露必是牙痺嘯露丁
奚多緣食積營乾作渴日自利夜啼分為四証
變蒸周于一歲心熱欲言能脾虛無時而好
睡病後失聲者腎怯失聲者肺痿肚痛而青
水流出者虫腹痛而大便酸臭者積口頻撮而脾
虛舌長伸而火熾龜胸是肺火脹于胸膈龜背乃
腎風入于骨髓鼻乾黑燥弓火盛金衰肚大筋青
弓木強上瀆

丹瘤瘡疥皆胎蟲之汙連吐泄瘡痢乃積食之沾

滯不能吮乳者熱在心脾嘗欲俯卧者火蒸腸胃
喜視灯火煩熱在心愛吃泥土癖熱在脾腹痛寒
侵口瘡熱積腑風忌干一臘火丹畏于周歲驚自
熱來癟因痰致吐泄而精神耗者則危瘡痢而飲
食減者必痺

驚本心生風由肝致體分左右等証有順逆藥分
補泄等病有虛實急驚由于積熱之深涼泄便宜
慢驚得于大病之後溫補為貴頭搖目竄而氣喘
等上工莫醫口禁臭張而是冷等神丹何濟閉目

卷五
一
四
者無魂枉呌者多祟不知吞吐必見閻羅反加悶
亂者終歸蒿裡既明症候次知調理

胎毒用甘草黃連食積用白朮枳實急驚搐掣以
寧赤泄清慢驚瘧癥以礞石益氣集聖去癆倘急
治積抱龍丸化痰鎮驚胃苓丸補脾開胃夜啼須
退熱清心肺熱必養血升提理中止泄香連止痢
積熱不除涼驚丸大有神効沉寒難療養脾丸最
為審秘瘧火攻号三黃丸水谷不化号金丹一粒
柴芩治療月蟬消痞潮熱金花咳嗽玉液瘡疥皆

胡麻丹癰者涼膈吐泄而渴者白朮可投煩熱而
渴者益元為最班疹兮消毒腹痛兮脾積効血咳
血者茅花重舌木舌者針刺口瘡不愈者洗心腹
脹不食者平胃五拗治喘四苓利水退黃消腫胃
苓加減以堪行破積安魚集聖從容而可治大抵
嬰兒易為虛實調理最取其平補泄無過其削尤
忌巴牛勿多今石幸熱走氣以耗陰苦寒敗陽而
損胃如逢食積解之不可或遲若遇虛羸補之尤
為至急總少俄延便成勞弊

慈幼懶心賦

醫門治例幼科最難腸胃脆而多傷乳食筋骨嫩而易感風寒易虛易實乎變如反掌或補或泄乎貴若轉丸鹹多泄腎酸甚扶肝苦入心而寒涼損胃辛走肺而燥熱傷元欲求中正無過平其或病須于瞑眩乎勿犯其毒且淺治于權宜乎但取其能中病即已收本為先苟悞投于湯藥即便致于損殘此上工誓於活人而良醫驗于折肱

嘗聞法無一定但占症候固不三世勿服湯丸病者

詳于擇樹醫者務于救瘡覩疾若已見利勿貪先
察運氣兮陽陰妙契次觀形色兮順達了然春夏
陽而苦寒可用在夫人之勇健秋冬陰而辛溫可
參相其人之勞痺既溫反補已寒再宣七神離散
五臟虧崩雖晉心于方脉兮何補于世反致人傷
殃兮獲罪于天是故胎疾兮急于解毒食積兮剝
在消痺治兮二法妙可十全樞樞未寧但調其母
閨闥不快當固其元悲夫腸胃中和豈堪藥石微
乎氣血難調以漸發生治非得已病有卒然如謹

風燭心常憊之若惜掌珠意惟拳上醫可補乎同
命應無忝于家傳

且如病則熱起熱則驚生或治熱以熱或攻熱以
寒熱在表而柴葛解肌可飲熱在裏而芩連消毒
急煎積熱無如集聖虛熱妙以調元要在識夫脉
色不可妄揆湯丸貽終身之痼疾促嬰兒之寿命
輕以变重功不補患徒委命于氣數不詳審手簡
編前車既乘後轍獨然魂魄遊于郊野哭声達于
淵泉誠此之故是誰之愆嗟夫渡穢駕橋放雀解

獎况伊萬物之靈匪惟一虫之賤不知謹密燭爾
輕泛推惻阤之良心如見入井考聖賢之遺訓如
弗及衆居易慮險因蹶知便証隨百出治無一偏
熒調造化保乘真元善攻不如善守宜急不若宜
緩種杏成林踵當年之董奉植橘名井見今日之
蘇軾柰何泄久變痢積久成痔瘡久生瘡驚久成
癰未至晉連弓攻之宜速已見沉疴弓治之且緩
腸胃秘塞急泄而已氣血虛羸弓急補而安外毒
急攻毋令入腹表和急解毋令再傳餘則緩而調

理當恐急而生變若藥下咽猶防其過治或中病
勿張其能知者常慮一失死者不可復全此其悔
于已悞孰若謹于未然欲求魚兔當寄鑿蹄苟多
方而治病宜三復于斯言

小兒總治法

面赤發熱服涼驚黃白發熱用胃苓身熱便祕三黃
下瘦弱發熱集聖靈安蒸發熱用摩法驚風導赤
吞泄青泄瀉胃苓用一粒熱泄玉露散同竹寒泄
理中丸可服泄渴白朮散生津痢疾保和圓香連
瘡疾養脾瘡自平咳嗽玉液降痰氣浮腫胃苓引
灯心瘡疥胡麻丸最好米脾最是保孩嬰細魚寸
白用集圣臨時用藥細叮嚀

小兒初生臍風

初生三五日大便血。尝来黑色為胎糞。鮮紅實可哀。
初生便嘔吐。胞漿畜胃中。物尽吐。自止。不止便為立。
小兒初生十日內。少乳多啼。常噴嚏。急晝。喉中有珠。
泡。手法括去。免憂慮。

不看撮膚風。撮膚糞少通。急用解毒散。便下滑涎客。
便閉肚彭脹。口緊咬唇青。時上手足掣。膚風枉用心。
腹脹不便。名鎖肚。口緊不乳。是噤風。目直叫哭。盤脹。
吊天吊身。仰似角弓。初生葉兒。有此病。父母歡喜。

小兒交蒸

小兒初生多交蒸三十日細雜論如蚕之眠添智慧遍身發熱不惺

交蒸休用藥三日自然安靜慢散傷食保和丸惺散內用人參甘桔川芎白茯苓紅粧少許天花粉防風白朮九味行

小兒胎疾

胎熱甘草黃連湯胎寒去連加桂方胎黃甘草加茵陳胎驚辰砂一味良胎瘦胎肥浴躰法胎怯五軟

用地黃此是家傳真口訣兒孫記誦莫遺忘。
肝色多青心赤紅脾黃肺白腎黑同黃白脾虛黑中
惡赤經是熱青驚風

小兒五臟部位

五臟有外候不離正面耳乃腎之竅兩眼原屬肝
鼻吼肺為主脾唇心舌尖左頰屬木肝生風右頰
屬金肺位同頰為心火頰為腎準頭鼻上位居中

五臟外症

肝主風子目直視門亂叫哭不安寧心主熱舌不得

眠驚悸飲水口舌乾脾主困兮多幻睡吐沫瘦弱
病成疳肺主氣兮多咳嗽安乾髮枯喘綿々腎主
虛兮胎氣弱小兒腎弱養應難

看小兒虎口紋

今人專看虎口紋風關氣關俞關兮風關病輕氣關
重命關若過死將臨青筋紅熱黑勢惡直輕斜曲
重看云

脉法

小兒一指分三位息數湏將六至看七至八至數為

熱三至四至遲虛寒堅實平和無病脈細小沉遲
有病者

接全嬰等書云小兒三歲已前虎口第一指上當卽
聞有脈絃見者可驗病伏男左女右視之脉弦經
寅閏起不至卯閏者病易治若連于卯閏者病難
治如寅連卯七遇辰閏者十難救一若脉弦小或
短者病可治宜參視之

小兒夜啼

啼哭直視熱在肝泄青一服即時安啼哭面赤熱在

心導赤麦冬妙如神面赤四逆股中痛益黃散用
姜湯送夜上見灯多拗哭父母嬌愛多不足

驚風

急症驚風面赤青目多直視不回睛手足搐掣牙關
緊只怕昏口再不醒

驚來挾人中虎口拿捩筋泄青委導赤調理治涼驚
口眼若喫斜看他左右偏太陽頰了穴一婢自然
安

面色黃白神氣弱昏睡眼閉口不合口鼻氣冷手足

冷慢驚搐掣痔上作

慢驚不可醫調元急補脾漸醒能食言常昏不乳危

吐瀉

吐泄之病而皮黃有寒有熱有食傷尚紅熱渴難調理手足寒時急補陽

吐泄常治法胃苓一粒丹脾積去食積理中補虛寒
吐泄多傷食益黃散最宜看他癟零退胃苓再補脾
泄瀉常如是消積功十全

泄瀉作渴白朮散人李白本茯苓甘草香干葛霍金

葉常與服之真格言

瀉甚烏梅加入熟甚知症門冬虛煩甘草炙用隨症
用藥不同

痢症

痢疾赤白皆是熱眉頭掌歇腹中疼身熱脉大難得
退脉小身涼客易安

痢症多因積先下木香丸保和消滯積止痢用香連
痢疾若不食噤口痢必殘急用香連散能食保平

小兒瘡疾

瘡疾之色多黃黑痛至作寒又作熱早瘡日來容易
退晚瘡間_時宜急

初瘡要吐痰漸鬼及嘗山久瘡不可截葦脾功十全
咳嗽

行寒飲冷即傷肺咳嗽病來多痰氣而青氣促怕生
驚面白胸高還不吉

初咳要發表五拗并九寶氣實葶苈宜肺虛阿膠好
當服玉液丸桔梗同甘草

五拗用麻黃杏仁甘草強石燕臘茶葉發汗是奇方
九寶蘇葉配麻黃薄荷陳皮杏桂良大腹桑白同
老烏梅加入細參詳

痺癆

面色黃白是痺癆肚大頭顎頭髮黑折乳傷食大病
後只怕時上熱來潮

痺症無多法集聖初如神面色轉紅活相間服胃苓
潮熱如不退只防作慢驚

傷食

傷食發熱面赤紅惡心腹脹痛時攻露身怕熱不思
食症與傷寒大不同

傷食宜調解霍香散量宜保和同其服病退再參脾
若是成驚搐惟有下為奇

傷食發熱用藿香蘇葉香付朴陳蒼半夏黃連甘草
曲蘖芩引子用生姜

傷寒

傷風弊熱面色赤煩悶不困不思食喜人喂抱畏風
寒作渴便秘裏必實

惡寒病在表敗毒拿法好裏实三黃九驚末泄青計
敗毒發表用姜防升麻柴葛解肌涼前胡枳壳甘草
桔蘇葉人參用成湯

浮腫

小兒浮腫因風濕久癰脾虛止有之上身主風下主
濕養脾一法少人知

遍身若浮腫胃苓丸裡求避風行治法切莫用牽牛
肚大有青筋灯火火之處粹內用集聖丸胃苓宜相

兼

口瘡

小兒驚口瘡白屑珠丸良赤瘡姜連散洗心是奇方
洗心散內用麻黃荆芥薄荷赤芍當白朮將軍同
國老臨時煎服入生姜

牙根爛成瘡走馬瘻可防出血又作臭蚊蛤散宜良
小兒口流涎滯順脾虛寒益黃加蒼朮不治必成瘻

疥瘡

遍身疥瘡是何因血熱由來胎毒成瘻痒不安多夜
迫切莫入腹每歸雲

瘡疥不宜搽胡麻丸最佳入腹宜解毒驚末莫治他
雜症

小兒吃泥土脾熱用泄黃梟聖相間服麻成不可常
小兒合面睡原來熱在心只用導赤散泄心火涼驚
小兒多白尿落地如米泔胃參鹽湯送數服解憂煎
小兒大便清邪熱在肝經只用泄青丸此法妙如神
小兒糞焦黃和熱在脾綿誰知泄黃散端的是奇方

五臟外症

吐泄瘡疾病在脾驚風心肝兩經為咳嗽哮喘病在

肺鬚稀骨軟腎元虧

五軟病症

如小兒五軟有胎稟不足軟者有大病後軟者有悞服涼藥軟者胎稟軟者地黃丸主之大病後軟者參芩白朮丸主之服涼藥軟者加味八味地黃丸主之已上三症若不急治有傷真元久則成癩以致不可治者多矣

萬氏家傳片玉心書卷之二

羅 四齋 萬 全 菩

公 順通之萬 達 列

水鏡訣

夫明暗運合男女成形已分九數四肢乃生五臟六腑卽位各分順逆難明若憑寸口之浮沉必乃精亡于孩子湧明虎口辨別三間參詳用藥必无差悞未至三歲止看虎口男左女右從第二指第一節名風關若脉見初交病第二節為氣關脈見則

准治第三節為命關脈見則死人當辨其色若三
關青四足驚三關赤水驚三關黑人驚紫色泄痢
黃色雷驚三關脉通度是急驚之症必死餘病可
治或青或紅有紋如線一直指是乳食傷脾及蒸
熱驚左右一樣者是驚此積齊發有三條或散是
肺生風瘧或似鈞輪声有青是傷寒及噦如紅火
是渴有寒相寓卒下痢紅多白痢黑多是赤痢有
紫相雜加渴不虛虎口脉數亂乃氣不和也蓋脉
紋見有色皆曰貴紅紫青黑由其病甚色能加變

如黃紅之色紅盛作紫紅紫之色紫盛作青紫青
之色青盛作黑青黑之色至于純黑之色者不可
治矣又當辨長珠形主夾積傷滯肚腹疼痛寒熱
飲食不化來蛇形主中脘不和積氣攻刺脣齶不
寧乾嘔去蛇形肝虛冷積泄濁神困多睡子反裡
形主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢
稍冷小便赤色弓反外形主痰熱心神恍惚作熱
夾驚寒食風癟症候鱗形主邪熱痰盛生風發搐
驚風魚骨形主驚癲熱水字形主驚積熱煩躁心

掌形圖



男以左手側看之

神迷悶夜嘯痰盛口噤搐拗針形主心肺受熱子極生風驚悸煩悶神困不食痰盛搐拗透閑射指主驚風痰熱四症背聚在胸膈不散透悶射指主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生十死一生唯治此十三位形脉悉有輕重察其病根則詳其症

女以右手側看之

虎口者人手處是也

三關者二指三節是也

風關第一節寅位是也

氣關第二節卯位是也

命關第三節辰位是也

震關指頭上節

卯關指中節

寅關指下節

命關死候

氣關病深

風關易治

未關命門

午關氣候

初關風候

九嬰兒生下一月至三歲以前須看虎口脉次指辰

節為命閑次氣閑次風閑所謂初得風閑病絕可
停入氣命定難陳湯氏云小兒初生至五歲血氣
未定呼吸至數太過必辨虎口脉色方可察病之
前突男驗左手女驗右手蓋取左手屬陽男以阳
為主右手屬陰女以阴為主然男女一身均具此
明陽左右兩手亦當參驗左手之故病應心肝右
手之大病應肺脾知此消息又得變通之意驚風
初得紋出虎口或在於關多是紅色傳至中關色
赤而紫脣病又傳過其色紫青病勢深重其色青

界而紋紅者病深重若見純黑色惡不治大抵紅
者風熱輕赤者一風熱甚紫者驚熱青者驚積青赤
相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫仲續來
去主慢驚風或紫不青不黑不既；相雜似出不
山主慢脾風脉紋從寅閑起不至卯閑者病易治若
連卯閑者有病難治如寅閑連卯侵過辰閑者十
往救一若脈紋小或短者看病不妨如紋勢弯曲
入裡者病雖重而症順從可用力攻勢亦反出外
較；靠于指甲者斷不可回其有三閑紋如流珠

沉米三五點相連或形于面或形于身尤惡尤甚

八門候歌三首

五指稍頭冷驚來不可安若逢中指必定是傷寒
獨自冷麻痘症相傳女左男分左分仔細看
初起寅閏淺破侵過卯深生枝終不治良位实難禁
脾虎口指脉紋訣

氣候黃盛作紅之盛作紫之盛作青之盛變黑絕黑
則惟治矣

黃色无形者即安樂脈也紅若无形亦安寧脈也有

前數擗形者即病之脉次第而變初作一點于氣
多紅脉至風閑其病尤急純黑分明不可療治
左有紅紋似線形
右有双紋加左狀
紋頭有似三大擗
青赤應是傷寒症
肺氣生痰夜作聲
只是虛紅泄定生

又微

虎口亂紋多湧知氣不和色青驚驚積聚下乳泄如何
青即慢驚發入掌內約多三閏忽通過此候必沉癥

指上辨青紋

亮口脉青色

黑色因水摸

紫色多成鴻

齒灰風還盛

但看人手處

九小兒三歲以上

黑色蓋兒脉絕

不可保矣

認是四足驚

是借大馬驚

赤色火人驚

黃色是雷驚

青弓食上蒸

方可辨其形

有病深重危急者

指甲口鼻多作

指甲口鼻多作

黑脉見在水起
紫脉見指土
泄洞是傷寒
是傷寒

黃脉見指因
或跌在大而起


黃脉見指因
或跌在大而起

黃脉見指因
或跌在大而起

黃脉見指因
或跌在大而起

黃脉見指因
或跌在大而起

小兒正西圖



少兒脣背

百會穴

凡驚吊後或百會穴
此二條脈齊不對耳其名
血母路快
年每次愈者不治也
際後變

察雅色之圖

鏡印堂山銀輪軒



標紅大熱燥青色有肝風印堂青色見人驚火則紅
山根青阮子驚遠是兩重若還嘶處赤泄燥寒相交

年壽論敘

年上微黃為正色

若平更臨天雞禁

忽有黑色痛疾候

霍亂吐泄黃色混

鼻半搘黃亦白乎

鼻半搘黃赤白乎

渴費燥黑死惟生

人中短縮吐因瘧

昏反黑候蛔必傾

正口齒數

正口常紅號曰平

燥乾脣熱積黃生

口上失血黑燒口

青黑驚風死

承浆两眉論歌

承浆青色食時驚

煩躁夜啼青色吉

兩眼論歌

白睛青色有肝風
或見黑睛黃色魄

風池氣池兩頤論歌

君足厥時有積水
傷寒病產此其宗

風氣二池黃吐逆
更有兩頤胚株赤

煩躁啼哭色鮮紅
肺家客熱此非空

兩太陽論歌

太陽青色驚方始
要知死症是如何

兩廡論歌

兩臉黃為瘧寒咽
傷寒赤色紅主淋

兩頤金匱風門論歌

青色青忤紅風熱
二色請詳分兩頤

一色頤間兩自詳

欽青金匱主驚狂

風門黑竈青驚水

、素色總論

凡看小兒疾病先覘形色而切脉次之蓋面却氣也
見而五位青色者驚積不散微發風候五位紅色
者痰積壅盛驚悸不寧五位黃色者食積癥傷脾
臟病癆五位白色者肺氣不宣滑泄吐利五位黑
色者臟腑欲絕則疾危惡面青眼青肝之病而亦
心之病面白肺之病面黃脾之病面黑腎之病先
別其五臟各有所主次者稟受盈虧胎氣虛实明
陽二症補過泄多當收其失兼五臟六腑表裏各

有相應若能辨其標本則神聖工巧矣

五位所屬

心為顙南方火

脾為鼻中央土

腎為頰北方水

肺為右頰西方金

肝為左頰東方木

部位歌

中庭映天庭

司空及印堂

顎角方廣處

有病定存亡



面部部位圖

青黑驚風惡休和滑澤光不可醫辨換脣黑最難當
青甚湏憂急昏黯亦堪傷此是命門地醫師妙較量
兒形色西江月

凡覲小兒形色青筋肝熱生風兩腮紅赤熱相攻黃
色脾虛取用黑氣腹疼中惡白為辨爽生血如逢
兩目赤重上此是商柯一夢

要識小兒症候但將外貌推求黃浮肌削痞癰瘍
繼面青痛楚吐舌舊焦內热昏了奸睡脾枯手掀
足掣是驚由脾疾青筋大肚

眼角眵生肝熱口邊涎出脾寒頭毛稀脫血將乾胞腫脾家溫顫鼻吼黑焦肺熱耳輪枯燥腎傳胸高氣促肺炎了熱慾顫門腫陷

小兒精神忽減面皮黃白无常必因乳食內成傷生冷油蠟阻當或致腸鳴泄痢或為癰疾難當忽然眼漸羸弱痺積重并四樣

小兒面皮紅赤兩腮恰似蜜珠風寒外感事何如潮熱无時來去或作驚風症治或為班毒輕除口乾啼哭淚如珠睡固參不乳

小兒病形各様慢慤眼力消詳懷丁猿縮怕風涼合
面睡時熱痺夜啼熱煩腹痛目直驚搐須防長吁
短氣痰中藏痰喘上冲火旺

要辨小兒死症額門陷下成坑喉嚨搥鋸氣和痰口
閉无神拘脣口唇牙齦粉白乎、運恰似冰寒鳴舌
口紫眼常纏不乳遺尿悶亂

小兒脈法

小兒一歲以上可以看脉以六至為平和七至八主
為實熱三至四至為虛為虛弱

西江月

小兒尋常肺候一息六至平和七至八至九生多三四虛寒病作九十連來雀啄一二動指成癥微虛數不虛訛補泄分明用藥

身熱脉浮可汗身寒脉細休攻喘咳嗽數葉死功體脈細微堪痛泄痢沉遲易愈痘出洪數宜從若述吐吸口津洪腹疼沉微拈弄

小兒治法

知是熱而腮紅煩渴不止頭面好露揚手擲足大

便閉小便皆身壯熱不退此宜涼解不可服熱補之藥

如足壯冷而能自吐泄不止壯腰作痛身常犯人眼珠青口中冷氣潮熱往來不定此宜溫補不可服涼利之藥

西江月

小兒不宜熱乘兩腮俱帶鮮紅手足壯熱火烘上六脈浮洪亂動小便赤黃又澁大便秘結難通撤衣飲水喜當風煩渴鼻流血湧

小兒不宜涼藥 面皮皺白无精四肢厥冷似寒水六
脉浮微阨；吃乳不消嘔吐糞如鴉屎頰上神虛
腹疼眼珠青病久成癆諸症

小兒純陽之體 阴陽不可偏傷常常三分飢與涼此
個孩兒易惹大抵脾常不足有餘肝氣須防不寒
不熱藥為良功忌妄行猛藥

小兒何為難治古今號曰疎科脈死可槐如之何日
不能言病作父母將之驚怕醫人試驗訛多從醫
對症用方藥有甚誰為捉摸