

萬氏秘傳片玉心書

萬氏秘傳序玉心書卷之四

羅田醫齋萬全著

公孫通之萬達刻

胎毒門

凡小兒在月內有病者皆胎毒也併治其母

小兒月內腸胃甚脆氣血未充若有微疾不可妄施
補鴻恐臟腑一傷將貽患終身或致夭命矣可不
戒哉如不得已而用湯丸毋伐天和中病即止又
不可過劑也乳母服藥必別擇乳母而后再補可

泄也若蓐母自乳又不可乱投湯藥蓋產后之婦
氣血甚虛有補無泄苟兒有熱病而用涼藥則犯
產后之禁必害其母如有溫補則反加小兒之熱
又害其子医者人之司命而可妄為乎必須斟酌
謹慎勿損阴德 生光之母謂之曰蓐

凡小兒縛生即死者急看兒口中懸癱脣上心有泡
塞住即以手指搘破其泡連以軟綃拭血全淨若
血入咽即死

凡小兒初生氣絕不能啼者必因難產或因胃寒所

致急以柳絮重裹其兒抱于懷中不可便斷將
却把胞衣置鍋中向炭火上煖之又作油炷薰
于脐帶上性來燥之潤更熱氣由脐入腹便能
方可洗浴斷帶若不如此急救之而先斷帶者多
死不治

凡小兒初生下被寒風所吹鼻塞服藥不得者用天
南星為末生薑自然汁調成膏貼額門上自愈
凡小兒生后或月內或有日氣急喘滿目閉眼赤睛
多神困呵吹遍身壯熱小便赤澁大便不通時復

驚煩此胎熱也。固母平日喜食辛甘，雜物食服，致用涼驚丸、黃連解毒湯治之。

黃連解毒湯

黃連 牛黃 木通 生地 遼薑 薄荷 小許

川芎 陳皮 破心 三根 水煎服

小兒生後，竟口全腫，熱脣消泄，渴甚，多眠或夜多啼，此胎寒也。因母喜嗜生冷，或外感多服涼藥，傷胎氣理中丸，氣散治之。

白氣散

桔梗

陳皮 雜二

砂仁

五分 半分

生薑

炮二分

粉草

四分 加木香二分

共為細末

每服一字 盒

湯調下

凡小兒生下浮腫遍身紅色滿月以後漸減瘦弱五心煩熱此名胎肥又有生下面光晶亮身無血色目无精彩肌肉消削此名胎怯並內服八物湯外用沐浴法

八物湯

當歸

川芎 生地

白芍 沙參

白朮

甘草

白茯

姜東引水煎服

沐浴法

天麻

蝎稍

硃砂

各五分

白丸

青黛

射干

各一錢

烏梢蛇肉

酒浸燒爲

末各三分

共研為細

末每用三錢水

三碗桃枝連葉

一握同煎十沸待

溫熱沐之慎勿

沐背

凡小兒生下遍身面目背黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如枝子汗乳食不思皆胎黃也因乳母受熱而傳于胎用

地黃湯

生地

赤芍

大桔粉

赤茯

川芎

當歸

猪苓

澤泄

木通

甘草

茵陳

水煎溫服

凡小兒生後壯熱癟眼惺忪拳咬牙身僵強直涎潮嘔吐搗掣驚啼腮縮頸開或煩赤面青眼合更胎風眼合不可悞作慢脾風妄用湯藥要視其眉間氣色若紅赤鮮碧者可治若鷺黑青黑者不治虎口指紋曲八稜者可治出外者不治此固妊娠調食平常飲酒嗜肉忿怒驚撲母有所触胎必感之或

外挾風邪有傷于肺故子乘母氣生宵即病以至
聖保命丹 治小兒驚內癥腹肚堅硬睡不安夜

多啼哭急慢驚風眼目上視手足搐掣不省人
事者服之即効

全蝎十四个防風二半白附子微一南星泡湯牛
蟬退去毒僵蚕炒去天麻各二錢砂一升射香分五
右勿米擦糲米飯九如黃豆大金菊為衣每一片
鈎藤灯心湯磨下有熱加半黃腦子研砂又方加

卷活二 不此藥常服鎮心化痰

袖珍方云附驚治法宜解散風邪利驚化痰調氣貼
頭甚則以朱銀丸利之而青拳搘者宜服保命丹
釣藤散全蝎散初生嬰兒雖以用藥凡有此候急
取猪乳細研辰砂牛黃射香各少許調抹入口中
即愈矣

金蝎散 治胎驚癇諸驚

全蝎一个琥珀一錢砂各少許 冬湯調下一字

独活湯 治胎驚癇散風邪

羌活

独活各

二

兵部

天麻

麻黃

去

耳草各

各一

石割散

每服一

末

白朮煎內加

天南星

蜜調貼

額

門上

凡小兒生下大便三五日不通者此名鎖肚胎中受
熱之毒壅盛結于肛門閉而不通先復溫潤急令
婦人以溫水漱口吸唾兒前后心併脐下手足共
七處凡四五次再用輕粉五分蜜少許溫水化開
時少許服之以通為度如更不通即是肛門內
合或沙金腫透勿通之須剝八二寸以香油細審

納入孔中糞出為快也若肚脹不乳呻吟聲至于
七日雖可望生矣

凡小兒生即不吮乳此均拭口不净織物入腹致全
腹滿氣短不能吮乳或有嘔吐乳不得下或胎中
受寒令兒腹痛不乳此則多啼以

木香散治之

木香 甘草 茯苓 午姜 木瓜 丁香
陳皮 各等分共為細末每用一字水煎噙漱酒
典食之

肝風着由斷肺之後被木溫風冷之氣所乘流入心
脾令腰脛脣腫四肢強直日夜多啼不能眠乳甚
則發為風癩暴瘍青爛微白不調若是久內搐
不治卒甲鼻者死

標口瘡由肺氣挾熱乘風邪入肺涌入心脾二經故
全舌強脣青口標喘急啼声不出不乳若口出白
沫四肢冷者不治最為急候一服之內尤甚
兼風有眼閉口噤啼声漸少吮乳不得日吐白沫大
小便皆不通亦由肺中受熱之毒流入心脾故形

子喉舌間也

以上三症其名雖異受病則一初生七日之內得此症者多死若不急救坐以待斃良可憫焉但見小兒噴嚏多啼身熱不乳急看兒上脣有小泡子如粟米大或以指甲或以它耳軒子刮去以綿綿繩指蘸溫水拭淨其血勿令下咽即便安妥不必服藥誠良方也

凡小兒牙閼緊急已成撮口驚搐者先用撮風散以開其閼次用控瘀散以吐其瘡然后用益脾散和

胃保命丹桂鶯即愈若半足李拳口噤不開者不

治

撮風散

金脚蜈蚣

毒不明者去毒

全蝎

去毒五個

僵蚕

炒去嘴

射香

少許

共為末

每用一字以猪乳和之滴入口

中即開

捏瘻散

蝎尾

銅青

各三分

砂子

紅臘粉

射香

少許

共為末每服一字鹽水送下吐出風瘻

益脾散

白茯苓 草果 煨 木香 半夏 陳皮 厚朴 炙
蘇子 各等分為細末每服五分姜枣煎湯細了
服之

亦有熱在胸膈伸縮無時呃作聲弩脹其氣以致
腑突浮腫此非斷腑使之然也但散其血愈加威
龍胆湯主之

胆草 前胡 黃芩 防風 柴胡 桔梗
赤芍 茶芩 半夏 大黃 煨 水煎服得下便止

亦有肚脹青筋吊腸外感內氣引痛而搔口者皆腸
胃鬱結不通致之治法貴乎陳利紫霜丸量而與
之一粒金丹尤妙

紫霜丸

代赭石醋淬七枚赤石脂各一杏仁五十粒巴豆三十粒
先將杏仁巴豆研如泥布入二石和勻浸蒸餅丸
如粟米大百日者三丸周歲者五丸看兒肥怯加
減微利為度

九腑中出津不乾者用龍骨五黃柏一帖丸三分為

未敷之

西江月

小兒初生病症許多名狀並同胎驚撮口此勝風寒
熱肥瘦黃腫嘔吐脊不乳脣間血水濱未曾
滿月病多凶好以風中燭弄

是勝風可畏三朝八日為殃初然噴涕似風傷寒
哭時口喚嚦急看口中上腭刮除白泡中央展開
惡血細端詳莫使下咽為上

若是不知此法致令泡落兒吞忽然腹脹滿膨脹

腫青筋雜亂撮口昏迷不乳目瞪又紫牙閼啼声
不出命竭天勘取衣棺平辦

胎黃狀如金色身熱大便不通小便黃赤色胎胞少
乳時下舌弄此症傳來羌首脾胃溫熱相攻涼驚
涼血解重上保養胎元無用

外有胎肥胎癩此為稟賦虛盈父精母血必多虧兒
子不充元氣此個甚難調護愚夫不曉支持一朝
有病致傾危却把命來茲刈

生不時上吐奶不思乳食昏迷此由穢物下咽門拭

洗未能潔淨會厭中間阻隔太倉上口畱凝難解
順氣藥通神炮製生姜作引

生下忽然腹脹肺中血水淋漓斷脐將息失調宜客
水邪風侵入外用灰丸粘貼速令乾較為奇若還
銀口哭声稀繼有灵丹莫治

小兒生下數日睡中啼哭多驚此因母氣失和平常
因七情為病以致胎胞氣逆痰涎入肺心治須
順氣更清神鎮墜痰涎始定

胎熱遍身如火發班丹毒風瘡神昏目痛大驚章大

小便難哭噪此是母貪煎炒溫經燉藥無方急須
解毒令清涼并草黃連為上

胎寒生來吐泄大便滑滯多清脹中疼痛哭聲頻而
色青黃不定平日母喜生冷寒邪傳入胞桂治宜
丸散用井溫可保嬰兒性命

要識小兒治法方為得業專門半週一歲病何因胎
毒單工見症自後飲食漸瘦肥井之變湏明此時
脾胃病多尋消食養脾法定

胎病要行涼解无如井草黃連若加脾弱病相參參

术陳皮有驗巴豆牽牛丁桂紙硫白汞青鉛銀傷
正氣損真元候了孩兒命短

變蒸門

變蒸者此小兒正病也蓋變者異也每變異性情即
異于前何者長生臟腑之意也蒸者蒸工然熟也
萬物生于春而長于夏者以阳主生長將于人亦
然故變蒸足始及成人真血充實骨肉堅牢也小
兒此症譬如蚕之有眠能之脫骨虎之轉爪而變
化同也故每三十二日有變蒸至五百七十六日

卷之三
大小便蒸足矣輕則發熱微汗其狀似驚重則壯
熱脈亂而數或汗或煩帝哭燥渴輕者五日解其
候與傷寒相似亦有變蒸之餘感寒邪者但變蒸
則耳冷上唇鼻泡如瓊珠若寒邪傳之則寒熱交
爭而腹痛啼哭之声且夜不絕治此之法輕者不
須服藥重者以平和飲子微表之熟甚便結以紫
霜丸微利之若吐泄不乳多啼者調氣散治之

平和飲子

人參五
白朮一
去皮甘草一
升麻根五
粟米
受弱者加

白术紅附與者不用 水煎服

調氣散

木香 香附 厚朴 人參 陳皮 薑香

炙草 姜枣水煎

凡小兒初生，有用黃連牛黃以下胎糞者，若兒壯與者，稟胎足固，无所損耗，稚弱者受此寒涼之劑，不生異症者鮮矣。

如有癰症，鬱結壅閉不通者，下胎毒只用淡豆豉濃煎湯與之五七日，其毒自下，又能助脾胃，真

奇方也

凡小兒當變蒸之時不熱不驚別生他症是為晴變
一此受胎氣壯弱故也

凡小兒初生多有灸百會者取其可以截風也殊不知地南北人有勇怯北人用灸固宜南人用之无益而有害也

凡小兒初生不有身破裂者必死阴囊白者必死阴不起者必死牙糞門者必死腋間无肉者必死哭如鴨者必死周歲之間頸骨間解離未生手足率

縮膝如雀節身體瘦弱長大不能行立者此皆胎氣不足者也多天若筋实則多力骨軟則行卑血实則形瘦多髮肉实則少病精实則伶俐多語笑不拘寒暑氣实則少髮而体肥此皆受稟脂氣之有餘也多寿

西江月

小兒變蒸何以三十二日為期精神改變異常時發熱蒸上昏睡或遇風寒外感或熟乳食傷脾肺過苦楚莫差池好把湯丸調治

大抵六十四月初生腎與膀胱作半心火與小陽肝
膽第三長參肺與大腸若四脾胃五次消詳三焦
胞絡不同鄉又為有名老狀

小兒變生智慧自然聰慧如集昏不乳久醒不怡
似蚕眠相應医者不須妄治父母何必憂驚三日
之后自和平只怕別生形症

若遇風寒外感惺子散子堪行內傷亂食不安寧保
和養脾煎進咳嗽參蘇散子吐泄理中靈犀散來
臨掣用瀉青導亦宜選進

驚風門

驚自是驚風自定風要分利頭目不可混治

凡小兒因聞非常之声見異類之物或為爭鬭推跌或大小禽獸之類致驚其神氣陷于心而痰生焉痰壅氣達遂成搐搦口眼歪邪口吐涎沫一時即醒如常无事或一日一發或間日再發或三五日一發或半年一發一年一發若不急治變成癆疾而為終身之痼病也治法當先利痰順氣后用清心安神

風者或因外感風寒或內傷飲食以致熱生痰上壅

驚搐口眼歪邪手足牽動氣喘涎潮口吐涎沫勞
過畧醒潮熱不退湏更復發治法當先泄火開痰
後用安神清熱

驚風有二有急有慢急驚風為实為熱當涼驚泄火
慢驚風為虛為寒當用溫補不可一例混治以致
殺人

急驚風小兒无氣素实或因恐怖或因風或因飲食
而發要審明白詳察症候而施治法

日久因恐怖而成驚者其症發過即如常無他症先

以利痰丸順氣開痰後用安神丸調之

如曾因風寒而 成者其症發過畧醒酒更復發輕首
只用導赤散吞下瀉青丸以清心肝之火後以抱
龍丸治痰保命丹除風緩之調之

如曾因傷飲食而成者其症發過畧醒之多啼哭酒
更復發不思亂食先用陳皮麥芽湯吞下五色丸
推云食積則癥自降後用辰砂五參散治之
凡治急驚風除飲食一症外不可選用下藥必先問
其大小便何如若小便清大便通利其邪在表只

用導赤散加防風或泄青丸去大黃加全蠍作湯
服之去表中之寒邪其風自退後以辰砂五釐散
調之不可犯射香恐引邪入裏若小便赤澀大便
秘結此邪在裏可用五色丸下之後用抱龍丸保
命丹調之

凡急驚癇時牙關緊閉不醒者急用艾炷灸兩手大
指頭少商穴合而灸之在甲旁即醒而後施治法
凡急驚風痰氣喘急者用定喘湯加竹瀝治之
瘧疾湧瀉塞不開者可用此法

凡病退後潮熱不退者此脾虛熱也四君子湯加炒
乾姜以治之者小便赤大便硬內腮紅足胫熱者
此餘邪未盡不可作虛看用涼營丸薄荷打心蓮
湯吞下調之

凡病退後睡眠不醒者此心脾二經之邪熱未尽去
也安神丸治之

凡小兒但有潮熱覘其兩頰若赤目上視者必作驚
風也當先以導赤散加灯心薄荷以去其熱次用
抱龍丸以安其神則風自不作矣

利瘻丸

南星二兩 牛胆一錢
枳壳炒二兩 陳皮一兩
牽牛頭末二兩 大黃二兩
共為末。皂角蒼水薑丸。灯心湯吞。

下

安神丸

黃連去黃柏二兩 菖蒲二兩
遠志去心二兩 墓身火麥冬二兩
茯苓二兩 山梔子二兩
共為末。煉蜜為丸。

導赤散

生地木通 甘草 加竹葉七皮水煎服

五色丸

黃芩二分大黃三分黃連二分共為末分作五分酒水
為丸一分青黛為衣名青丸子一分礞砂為衣名
礞丸子一分輕粉為衣名白丸子一分皂角燒灰
存性研末為衣名黑丸子一分雄黃為衣名黃丸

子

鴻青丸

歸身

川芎

大黃

燒熟

羌活

防風

桔子仁

胆草

各等分

為末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉

湯下此鴻肝火之藥也如發熱去大黃加全蝎姜桑炒竹葉引水煎服

辰砂五參散

朱苓澤泄赤茯白术官桂一斤心引水煎調辰砂末服之

定喘湯

陳皮去白南星製桔子仁軟石黑杏仁泥薄荷葉赤茯苓右剉水煎入竹瀝服之止法用土牛膝根取自然汁灌入口中其涎自止

灸法

先以兩手六指相合于甲側縫中灸燒三壯

又以兩手中指相合于甲側縫中心燒一二

壯即醒者可治不加痛者不治

祖傳治驚風先以雄黃解毒丸利去痰熱後用涼驚

丸退火再用保命丹安神丸調之

發急驚風之時手撮目閉口張顛頭口氣促急吐沫
噴藥昏睡不語不啼口禁絕不飲食遺尿失屎面
赤如硃此皆不治之症

凡慢驚風小兒胎稟素弱又多疾病或大吐大瀉或

久瘡痢服吐下之藥皆致精神虛耗漸成搐搦
十死一全如元神虛弱又逢恐怖而成慢驚者其
症發遇即如常但多啼哭睡中不寧不可妄用利
痰之藥先以青州白丸子加青礞石以去其痰次
服安神丸以四君子湯送下如因吐瀉大病之後
手足逆冷昏睡目睛微露而无搐掣者此欲成慢
驚症也急溫補之四君子湯加熟附子一片愈后
以集苓丸調之

凡吐泄大病之後已成慢驚風者其症口目牽引手

足 擃掣以醒脾散驅風醒脾風退以參苓白朮散
為先服之

凡 慢驚風痰氣壅塞者不可妄用通利之藥只以青
州白丸子加青礞石治之

凡 慢驚風不醒不退者灸百会三里男左女右乳下
凡 慢驚風已退或有餘熱不喜飲食先服四君子湯
一 二 剂后以集玉丸調之

青州白丸子

半夏 炮川烏

去皮尖
各五分

南星

三分

白附子

一分

共為末

以絹袋盛之用水擦尽為度放磁器內日晒夜露
一日一換其水換水必燒數轉候如玉片舟研細
入用青礞石紅另研細以焰硝五同石末入
銅鍋內煅通紅稍不為度全冷入上藥和勻以糊
米粉打糊為丸以薄荷湯入蜜調送下其痰自墜

調元湯

黃芪參人參各二錢草薢二錢白芍一錢水煎服內經
云熱瀉子內以丹泄之以驗取之此之謂也

桂附散

人參 全蝎 向附子 天麻 牡草
木香 白术 石菖蒲 蕓內 水一升
煎服有熱去木香

凡治驚風不可妄用辛香寒涼之藥蓋辛香能竄元氣寒涼反傷脾胃也

凡小兒夜啼哭目睛上覩日間畧定者此內訌也蓋因受寒氣腰中作痛以至痛極日定以打心燒灰調滾水化下理中丸痛止病退

如小兒日夜啼哭目覩物不轉身後仰者此外訌也

五食種作痛其身強直而目亦定以灶心土泡水
水送下丁香脾積丸病退痛止

如小兒忽然氣急涎响口眼如常手足不搐身无熱
著此乍感風寒肺經受邪也用茅蠅散一服即退
如小兒腹脹喘滿胸膈氣急兩肋肩動隨下作坑兩
鼻竇張闊亂咳嗽作渴聲喎涎痰壅塞大小便閉
此馬肝風也若不急救或不識症死在旦夕宜先
用牛黃奪命散下之後用白虎湯平之

如小兒兩手輪指目睭直視此白虎症也溫身不泄

手足不掣宜向年白虎方取土泡湯吞蘇合香丸
如小兒口吐黃白沫面色變易喘急腹痛更側掣搐
其狀似驚但眼不上竄此由精神虛弱外感寒氣
卒暴觸忤名客忤耳先視其口中上脣左右有小
腫胞急摘破之更以蘇合香丸姜湯化下外以降
香皂角二味燒薰次用淡豆豉三合水浸溫搗爛
為丸如雞子大摩兒顙上及兩足心各五六遍次
摩脐心良久拍闌有毛即擲之

如小兒久咳腹脹作喘胸高氣促目睛上視手足牽

引此名龜胸熱症也。但身无熱以夢虛尤治之。方見
以上之症俱與驚相似。不可一例施治。悞者恐
傷其命。

亨
蝎散

川芎一撮
各一撮一
蝎稍細辛半錢泡酒浸一宿

一
焙乾共為末。熱湯調服或薄荷湯化下亦可。

牛黃奪命散

白牽牛黑丑各半生半錢
大黃枳壳各一

共為末。冷漿水調下。涎多者加蜜少許。

如小兒痘疹驚搐者只用導赤散調和砂末一服不可妄用涼驚抱龍保命等藥

西江月

小兒驚風症候須分急慢根由急因实热泄中求慢是虛寒温補急為風寒食積慢是久病調繆如斯辨認不差謬施顯神功效手

急驚卒然大熱因而熱則生風痰涎哽塞角張弓口眼歪邪沉重先使雙驚妙散後用導赤疏通合灸少商與中冲鴻青涼驚選用

君過風寒外感先瀆津汗為宜瀉青丸子作湯醫加上蝎泰二味果是內傷飲食又當解利相隨三黃五色任施為積去熱除驚止

慢驚先因火病精神漸減脾虛懶了沉困氣長吁口眼張開不乳搘拗時了牽掣四肢達冷何如理中附子急驅除不瘧艾灸左乳即期門穴也小兒乳要認驚風寒症而如紅粉金搽口滿涎出緊閉牙目直氣粗聲嘔喫內响似抱錫毛端汗如珠了目睭眼小不湏誇大叫悶亂尤怕

摘掣乍作乍止痰氣无了无休養了軒睡喫堆泄乳
食不知香味呆呆遺時步竟四肢僵直難收啼声
不出汗如油辨得是丹砂救

小兒驚風咳嗽人當備風寒大黃白果二牽牛人
參分兩勻用四味俱研為末蜜水調和稀稠灌將
一字下咽喉免得胡針亂灸

兩指伸縮名為搘 十指開合搘之形

掣則連身常跳起 賾而四体動搖鑊
身仰向後為反症 手如挽弓引狀成

經目觀高是攘攘 晴露亦活量斯真

嘔吐門

声物俱有曰嘔死声有物曰吐有声无物曰乾嘔其症有三有寒有热有食積

嘔吐者吐時少而出物多此胃虛寒也以理中丸治之或用胃參丸以陳姜湯送下寒吐食不化惡食熱吐者吐時多而出物少此胃有熱也以二陳湯加黃連煨姜治之熱吐食化不惡食

食積吐者要分三集明白俱惡食如食即吐者此積

在上焦胃口也宜用瀉鹽湯養一小中後以鵝糴毛婦喉中全有吐不尽相積后以二陳湯加乾姜蠟神曲炒麥芽炒砂仁治之如食多之時而吐者此積在中焦下口過小腸上口處也先以丁香脾積丸通去因積在以二陳湯加消導藥治之如早食晚吐晚食早吐者此積在下焦小腸下口過大腸上口處也先以丁香脾積丸下之后以二陳湯加消導藥治之消導藥 神曲炒麥芽炒砂仁者附于之類

如嘔吐久而諸藥不効者此胃口壯火鬱精之病用
理中湯以黃連猪胆汁同炒煎服即安
如嘔吐脫肛者以理中丸加烏梅一個附子一小片
黃柏川椒一服即愈

凡嘔吐后瘦弱者只以集泰丸調之
理中湯 此兼性熱所以治寒

人參 甘草炙 炒乾姜 白术 水一中煎服
若為大寒蜜臘肺屬毛凍水送下
却謝吐不納藥者此明盛推阴也必加黃連猪胆汁

者取童便味酸鹹性寒胆汁味苦性寒以和理中
湯服則阴体漸消陽性乃發於內經曰伏其所主
先其始因之謂也

二陳湯 此兼性平寒熱通用

陳皮 半夏姜汁泡次 白茯苓 甘草 水一升生
姜三片引呕 止加白朮 姜乾姜此二味呕吐
必用之藥也 挑熱而吐者加 姜乾姜炒黃連
几傷食加 神曲炒麥芽炒仁青附子山楂 此
五味消導必用之藥

組傳治嘔吐只用胃參丸煨乾姜湯奉治之不問寒
熱凡吐不止服藥无効加陳閱者不治吐不止且
上竄顧后仰者不治

西江月

嘔吐病原不一治者要辨根由嘔則声物一時有三
物无声曰吐更有一声无声此名嚦而乾嘔又當
辨症稟分枝有甚難易措手

冷吐乳食不化腹脹喘急先時面白眼慢氣多干吐
有寒食清水此因風寒入胃或食生冷傷肺抑傷

前乳胃中虛本納乳食出出

為吐有紅齒亦乳食久而解消吐物黃色遍身燒大
渴多煩躁此因暑氣在胃或食熱物煎熬胃氣
因熱不和調氣運通則止了

積吐如何分曉眼胞浮面微黃足冷脉洪異尋常登
鞋夜重癮瘡宿冷滯在脾胃故吐黃酸水瀝或味
酸醜氣味看此傷宿食形狀

小兒傷乳吐者形症更要消詳乳緣哺后吐瀉蕩或
少停而吐止此因乳食无度脾氣弱不能當連將

空乳令兒嘗乳節吐止馬上

吐症既分明白治法施貴精微冷吐理中湯最宜熟
吐五苓去桂續吐九轉靈應下后枳术調之傷乳
而吐藥方奇三種散子為最

嘔吐乳食不納任暉湯藥難當此謂門盛格孤阴晴
醫都无主張參术煨姜熟附島擣童便尤良猪胆
同入慢消詳此法應如影響

嘔嘔燒藥不納我有絕勝奇方臘吐散子炒非常半
夏宮桂二樣生姜独且多取井草必用為良佐方

製造水煎嘗仍用生姜為上

一等蛔蟲吐出此為蛔多厥陰烏梅丸子加神曲一
服蛔安吐定又有咳而吐者化痰順氣須明如聲
嘔吐淡胃苓湯用生姜作引

嘔吐不止之症分明說與醫人如服正藥俱无犯更
加煩燥亂悶嘔吐只是不止目睛上竄頭眩
上仰魄如飛正好安排后事

再附惡心一症有痰有熱有虛三症生姜通用之藥
宜隨症區處若是胃中有熱二陳加上芩連姜汁

炒過共同煎各用一錢最驗

一 泄鴻門

泄鴻皆属于溫其症有五治法分利并提為主

如泄鴻青白或不思食不化腹痛四肢冷而貌白作渴者此寒濕也其症多得于冬以五苓散作引春化理中丸即止如寒甚不止者理中湯加附子一片即効

如泄鴻注成黃水者或渴或不渴此風濕也其症多得于春五苓散加防風羌活蒼朮治之

如泄瀉清水脫中死痛者此純濕也以胃參湯治之
如泄瀉肠滑不止者此溫傷元氣下陷也宜升提之
四君子湯加升麻防風烏梅治之或用四君子湯
吞下七味肉豆蔻丸

如泄瀉酸臭腹痛面黃帶熱不喜飲食者此食積也
先以丁香脾積丸推去其積后以養正丸調之
如泄瀉日久目無神氣口唇張四肢冷好睡者以四
君子湯調之多服有効甚者加熟附子一片煨姜
服之

如泄鴻日久身熱不退只以調元湯治之此虛熱也
不可妄用寒涼之藥甚者加乾薑即効

凡久泄後人事黃弱者以集玉丸調之

益參散 入膀胱腎經

朱參

去澤泄

白术

赤茯苓

官桂

此分利

阴阳之藥也水一中煎服

建中丸

人參

白术

甘草蜜燒姜

加砂仁

藿香

烏梅

附子

朱參

澤泄

玉露散 此藥性寒可以治熱

寒水石 滑石各一錢
兩 芦草五

共為末每服一錢
冷水調下或用此藥煎湯參理中丸

胃苓湯

蒼术 厚朴 猪苓 洋牕 白术 白茯苓

芍草 陳皮 官桂

四君子湯 此藥性溫可以補元氣之不足

人參 白朮 白茯苓 芦草 水一中姜三片枣

二枚溫服

肉豆蔻丸 此藥性溫而澀所以止滑也

肉蔻

麵糊五分
赤石脂五分
卜廣木香二分
砂仁一粒
桔丸七分

白龍骨五分
柯子肉五分
共為末水糊為丸
陳米湯送下

白术散

此治渴之至藥也

人參 白术 白茯苓 木香 僧香葉 芫草

而
各一

乾葛

共為粗末每用一二錢姜三片剉水煎

服 神珍方非乾葛乃乾姜也

調元湯

此治虛熱之至藥也

黃芪

人參 芫草 如無不退加乾姜即効如

身熱手足寒者加熟附一錢煎服

祖傳治泄濁不問寒熱丸川芎參九華一粒

丹以

車前草同炒米煎湯服之

凡久泄不止精神萎好面赤唇紅者不治

凡久泄不止作渴不休者不治

凡久泄不止脉沉細遍身皮冷不忍乳食泄滑不止

者不治

凡久泄不止又成鶯搐者不治

凡久泄不止變成赤白痢疾者不治

凡久泄不止大肉消瘦者不治

凡久泄不止大孔如竹筒不收閉者不治

凡泄濁不間雜重只要飲食如常不半他症者不難

于治而易愈

西江月

泄鴻秘傳治法非閑不譖時人如今傳授與子孫勝似良因萬頓初次且行淡滲溫中以次施行三升四塞收斂嬰此方古今未定

泄濁緣何弊作只因水谷无分所以淡滲法先行小

便長而泄定滑石車前赤茯人參白朮猪苓并草
澤泄與砂仁姜東煎來作引

淡滲行而又泄湏防谷氣中虛濕中尤散不湏拘踈
要一時泄住白朮入參砂仁姜東草依書烏梅
熟附澤泄猶引用生姜作主

溫中若还不効中氣下陷湏攝人參白朮與黃芩
芍草乾姜炙取澤泄猶本方扶升脉熟附烏梅柴胡
白芍與當歸引用姜東休棄

以此升提未止只因腸滑難收塞用通用更何憂

其情婦可救參木炭姜炙草烏梅棗壳相扶升麻
柯子參歸求姜東同煎溫服

泄盡泄還不止其間吉少凶多假饑父母不奈何要
你醫時休錯參木附陳姜東砂仁豆蔻粟柯乾蟬
芦茶木香砂赤石醋丸服可

泄鴻時常作渴白朮散子如仙人參白朮木香無乾
鷄耆黃芩牛車梗參七味烏梅加上同煎服時
再用伏龍肝此法千全不換

泄瀉如常治法不須別用心丸只將黑藥胃苓四三

服自然停息如此不能取妙微前四法支持吾將
心法歎人知辨顯明歷三世

五六月間泄濁其中舉少熱多理中丸子救沉疴玉
露散子真可不動四參你引同秉理中調和自然
泄止莫嗟跎活得人多念我

夏月人多泄濁腹疼煩熱相攻猪苓澤泻茯苓同甘
草乾姜炙用白朮黃連滑石人參炒藿溫中升麻
提氣妙无穷更把烏梅煎送

泄濁症雖各別大要挹因溫成風寒水濕中人身乳

食過傷為病此由中氣不足脾胃積滯惟深以致氣脈不調勿故成泄鴻之症

人皆知有泄鴻當分泄鴻原根令則滑泄故无声熱則腸結毒熱故致乘急後重如車轍下有声此名鴻症熱歸因下而條成熱癥

細詳冷泄病並臍中却似雷鳴注下清白水之形而白肚疼等症甚者四肢厥逆此由寒濕寒侵寒氣在腹刺攻人故令兒患此症

熱泄色多黃赤小便不利心煩口燥作渴定咽乾食

乳必粗可驗此由腸胃挾熱冷風乘入其間冷氣相傳不安然所以兒有此患

冷熱不均泄鴻，色赤白不常或水或谷病為殃。小兒如何抵當此由先冷后熱先熱後冷傷腸胃宿虛內中藏冷熱交攻勿當

更有傷食而泄腹痛乳食不思面黃寒熱異常時糞多酸臭氣味此由乳食過度以致脾胃傷虧遂成泄鴻病孩提小兒多有此疾

又有一般暑泄多于暑熱之時亦宜寒熱症中推處

好醉酌用刑若或瀉濁亦自廢大青筋髮稀或疎
泥土出蛇時此為痔泄之疾

人見泄多青色亦或聲甚有時腫脹不安忽驚悸乃是驚泄之勢此是脾受肝犯速宜及早醫之若變膚風瘻癰時就是神仙費力

泄濁注成黃水或渴不渴殊途此在風濕症中求多病春天晴候如或瀉下青水腹中不作痛楚此是純濕病之由症傳阴雨之後

泄濁腸滑不止濕傷元氣陷虛藥宜升舉收兜驅遠

得医理妙处如或泄泻日久身热仍旧不除此为
日久气多虚调元汤剂宜服

清溪治泄之法泻水腹无病疼此辨因受湿分明四
参一木当增补食不胃不佳常春不化施在此则
气虚病之根参术并麻芍益

腹内痛苦荆泻口后痛甚见轻此辨食积症中暑神
曲大黄排滞一痛一泄此障泄火更见肠鸣火症
承明用四禁加上参通丸勝

大端泄泻脉虚潮热脉实者明医人兼要细詳商處

黃休方对曰。消渴之病。前法避藥。切當先行。若然胡亂敗章。釋反變病。謬草症。

泄泻不知症候。許久不止。堪憂情神。萎弱渴无休。而赤脣紅消瘦。脾理弟見沈細。滯泄不乳。煩熱發渴。赤白驚驚。搘大孔。如筒不散。

辨瘡狀

便黃。因內熱紅赤。蟲間瘡。如青苔者。非肥食臭味火泄。四肢癰癤。驚膽不安。拂痒毛仰。微汎微定。傷寒肝冷。傳脾。臭綠青。集黃。脾土熱之形。

肺腸寒色膚粘白

赤熱因心腎熱成

身熱發厥熱

久泄多虛熱

氣虛多發厥血虛湧乍熱氣血若俱虛身熱手足厥

吐瀉門

吐瀉名曰霍亂其症有三有寒有熱有食積

凡上吐下瀉兩腮紅赤遍身熱口作渴吐瀉時多而出物少者此屬於熱用五苓散燥乾姜治之或用
燥姜湯泄冷調服甚无散神妙

凡上吐下瀉而脫白及冷腹痛多啼哭不作渴吐瀉

時少而出物多者此屬於寒用理中湯治之甚者
加附子烏梅効此上二症皆不阻乳食
凡吐瀉出物酸臭而黃不喜飲食腹常作痛者此食
積也以丁香脾精丸推去其積后以集苓丸調之

凡吐瀉久身瘦骨無者只用集苓丸治之
祖傳治吐瀉不問寒熱虛實只用胃苓丸服姜湯送
下即安

益元散 又名六一散又名天水散

滑石

六兩

甘草

一兩

為細末或煎服或冷水調服

凡吐瀉不止作渴不休者不治加驚搐者不治口舌
生瘡手足冷身熱此阴障阳升脾氣中絕不治

西江月

大凡男女吐瀉明陽順逆當明男多瀉甚下氣
女子吐多不應出物多而數少此為寒盛相侵如逆
物少數頓之火盛細加休憩

吐泄若是同見此名霍亂阴阳只用一劑理中湯上
吐下瀉了當服此若止不効再加熟附蠟蜜烏梅
作引是良方莫與傍人誇獎

吐渴時三作渴譜酸湯藥无灵飲水飲湯腹膨三來
手坐塊死症急用伏龍飲子時 嘎咤調停須臾
吐止火邪寧綠典理中对症

吐渴分為三症食積寒熱當知而黃糞與惡乳食此
立方為食積若舉身熱作渴互為熱症祛除面白
身寒腹痛時正是虛寒之疾

食積宜行轉取炎應去積為宜如逢熱症又何如益
元五苓為主寒症埋中可用甚加附子烏梅齊治
摻用胃參奇吞用乾姜煎水

痢疾門

痢疾不問赤白皆屬濕熱或以赤為熱白為寒者非
也亦有食積而成者其消渴利小便有泄赤白溫些
皆有但熱症腹痛泄瀉者謂

凡痢有赤此溫熱傷寒雖分推小腸中來也以四物
湯加黃連黃芩黃柏潤之

凡痢有白者此濕熱在氣分從大肠中來也以四君
子湯加黃連善木潤之

凡赤白相雜者此血氣俱傷以八物湯加黃連黃芩

黃柏養水滑導之有病三焦俱熱抑快即枳實
丸治痢疾不問亦向但初輕之時盡然后重腹中脹
痛者先用三黃丸大承氣湯下之后用香連丸調之
丸痢亦自愈久人病虛陽乘本經下精血下之則人
事虛而不可損其不早甚不重則積不去而難愈
只用佛手丸連服數次候腹止痛為度后以香連
丸調之

丸治痢不可妄用也草牽牛只用三黃丸穩當
儿痢有鮮血者用清血丸以草前草陳米煎湯送下

凡痢有白涎久不止者用固腸丸以陳米飲送下

凡暑月痢純血者以益元散炒過滑石加紅曲為丸

陳米飲送下

凡赤白痢脫肛者此氣下陷也宜升提之和中丸以

升麻湯吞之

凡赤白痢嘔吐不食者此名禁口痢用木香則失之溫用山藥則失之閉只以參苓白朮散加石菖蒲末陳米飲調下胸次一開自然思食

凡痢止后身熱不退或人事喪謗者只用集玉丸

調

芍藥湯 行血則便，曠自愈，和氣則后重自除

向考二、帰尾 黃連 黃芩各一、大黃七、甘草

換即 木香 檀心各五 右細切作一服水碗半煎一碗空心服如病初起重急迫者倍加大黃加芒硝一升若病滿氣不宣通者加枳實一升

四物湯

當歸 川芎 白芍 熟地 加 黃連 黃芩

黃柏 水煎溫服

四君子湯見泄門加 黃連 黃芩 茄朮 水煎服

八物湯

見胎
毒門加

黃連

黃芩

黃柏

蒼朮

滑石

枳壳

枳郎

水煎空心溫服

三黃丸

黃連

黃芩

大黃

各等分爲末神曲糊丸末

香枳

即湯送下

大承氣湯

此通陽去積之藥

枳壳

厚朴

大黃

芒硝

甘草

加枳郎水

煎服

保和丸

凡食積脾胃虛者用此藥

山楂肉

一兩

神曲

炒半錢

白朮

陳皮

聚菔子

連翹

各五錢

麥芽

炒兩錢

甘草

五錢

共為末蒸餅和丸

如粟米大米飲送下

青血丸

梔子

荆芥穗

枳壳

炒熟

柏葉

炒醋

各等分

朱砂粉

陳米湯送下

圓鴟丸

即二根丸

紅椿木根白皮

白椿木根白皮

各步分為末

米糊丸

陳米飲送下

清六丸

即益元散加紅曲是也血痢有此方主之

滑石

炒一兩牛草半錢紅曲去壳炒五錢為末米糊丸陳

米湯送下

和中丸

黃連

炒陳皮各五分半蜜酒

車前子

白芍

小柴

白术

木香石蓮肉

肉豆蔻

麵包火

煨乾姜炒

人參各二錢

共為末醋糊丸陳米飲送下如肚脹者

升麻湯送下

參苓白术散

此藥性平補助脾胃之藥也

人參 白术 白茯苓 山藥 白扁豆 紗布
桔梗 薏仁 石蓮肉各一 加石膏滿內
甘草末陳米湯化服

確傳治癆不問赤白只用保和丸香連丸調之

凡癆久大熱大渴不退者不治

凡癆日久六脉洪數面赤身熱者不治

凡癆日久作渴不止者不治

凡癆日久嘔吐不食服藥无効者不治

凡癆日久不止下紫血成塊者不治

凡痢日久下黑水如墨滿盛水者不治

凡痢目久大肉瘦削折者不治

凡痢久脫肛出寸餘者不治

凡痢久轉作驚搐者不治

凡痢變作泄濁飲食如常者易治

西江月

痢疾古名滯下食積濕熱相參腸鳴腹痛不能安寢
急后重尤甚赤乃小腸火盛自大腸邪停愚醫
以白作寒稍辛熱亂行丸散

治癆无過二法河間秘訣漏傳行氣和血術中仙營
取十全无变氣行後重自止血和下痢由寒寒涼
淡滲禁辛卉不怕年深日遠

丸病先行通藥黃連枳壳_桂多加酒薑消大黃或用
三黃推湯若是虛人忌此且從消導推詳保和丸
子是仙方只要認病停當

下后痛除裏急再將赤白消詳赤痢无過剪紅方向
荆固腸穩當赤白相兼不愈者連丸子高強術精
鄉都把名揚專取錦燈頭上

若遇時行癆疾排門一樣无差頭疼身痛慢吁聲交
一病氣行渙怕先用人參敗毒次將承氣推車然后
察脈看盛加虛妄分明調他

前人前法不止氣陷陽滑者停急停亦樂此兼升固
流燕行甚穩參术升麻歸芍烏梅梔壳連芩乾姜
柯子赤茯苓粳米陳皮作引

記得癆症藥品解毒桔子芩連大黃牛硝可推陳本
香青皮痛定梅榔枳壳厚草非麻紫胡根升固陽
栗壳柯榔夏津泄朱參水煙

癆疾不治數症肺若洪大渴防禁口不食吐水兼大
熱煩渴腹脣大孔不收氣力甚加脹鼻爪癟面紅
唇赤陷眉眼氣急悶亂死樣

小兒肝頭脫出此由泄痢濁氣虛下陷不能升冷
熱不和相併氣急后重雖便用力太過傷神以致
肝出冷寒乘不得收逆而進

失識成肛症治養血和氣為宜川芎白芷當歸白
芍人參赤石脂子山藥蓮肉龍骨五倍相隨細研
五倍丸子兒仍用米湯吞吃

內服湯丸取妙外用諸藥扶持保上倒掛壁盛灰生
頭燒灰研細風裏共末艾搗入插用火燃之人坐
其上令燙宜頃刺摩翻收入

前法若还不効用擦水搗為泥朴附大黃共和之趙
齋敷上即愈不効再用擦藥熊胆水片堪懶懶胆
調搽病即除此法歷人罕犯

導氣參連共木香

大黃歸芍壳灰散即

痢下膿血時尤效

晉取一服即安康

治脫肛浴法 用陳艾煎水以陳壁土研細入艾水

澄過渣以艾水溫浴之俟收入為度外用
熨法 用來麵以好米醋和成薄餅敷在脐上將艾
薄之鋪于餅上燃之