

萬氏秘傳片玉心書

萬氏秘傳片玉心書卷之五

羅田密齋萬一

玄脈通之萬達刻

瘧疾門

瘧疾治法有二新瘧先截後補久瘧先補後截

瘧疾要分早晚治之如上半日發者此邪在陽分氣位也先用平胃散加常山草果截之後用平瘧莽脾丸調理而安如下半日發者此邪在陰分血位也輕者以四物湯加桂枝桃仁紅花發出血

寒邪甚者以麻黃湯加升麻當歸提到陽分  
虛以小柴胡湯加常山草果截之畧愈以平癘  
辨丸調之而安

如癘來寒多熱少者以平胃散加常山桂枝草果仁  
截之熱多寒少者以白虎湯加常山草果青皮截  
之寒熱相半者用小柴胡湯加常山草果截之后  
以平癘辨丸調之如大人以補中益氣湯調之  
以上數症皆先截后補也

如久癘連綿不退者或二三日一次其邪已深不可

妄用截藥只以平瘡赤脾丸調之有汗要无汗无汗要有汗其瘡易退再要避風寒禁雞魚冷水死不安者如犯禁戒雞丸轉靈丹亦難治也

凡瘡後轉作痢症者此症多得于夏末秋初因內有伏阴多傷生冷故也當從虛治不可妄用通利之藥如平常下痢者以香連丸米湯送下

如瘡痢併作者以平瘡養脾丸橘皮和中丸相間之服如瘡后遍身浮腫者此因汗后受風故也以胃養丸加五加皮大腹皮灯心長流水煎湯治之大兒加

臧胃苓湯治之外用浴法于日當午時向避風處以溫水拂拭遍身畧腫一時以被蓋之微汗為度每日依此行之為妙甚効

如癰后腹脹或喘或不喘者此因內傷生冷脾肺俱病故也蓋脾主脹喘屬肺以痛氣丸消脹以尊虛丸定喘治之后以集聖丸調之

如癰后腹中有痞者此癰母也因多食冷水所至亦有熱而臧者治以月蟾丸主之

凡癰后形体黃瘦者只以集聖丸調之

平月散

此治濕養脾之藥也

蒼朮

米泔浸炒 一分二分 厚朴 一分

陳皮

二分 甘草 一分

加

常山

子三 草果三

姜來引

四物湯

見痢

此藥性平治血不足之至藥也

桂枝湯

此發散風邪之藥也

桂枝

赤芍

甘草

姜來引

小柴胡湯

此半表半裏之藥也

柴胡

二

黃芩

五分

半夏

七

人參

七

甘草

五

加山

枳

丹皮名加味小柴胡湯

姜來引

心中飽悶加

枳壳 桔梗 痞滿加黃連 枳實 渴加知母 石膏  
內熱甚 錯語 心煩 不得眠 着合解毒湯

白虎湯

此藥性寒 所以治熱也

石膏

五知母 二粳米 一甘草

水煎服

以上諸方 截瘧必用 常山 草果者 蓋此二味 乃治  
瘧必用之藥也

補

中益氣湯

此補中氣 不足之聖藥也

黃芪

人參

甘草

柴胡

升麻

白朮

當歸

陳皮

水煎 姜棗 煎

有汗用白朮 無汗

川谷朮治瘧加青皮

加腹胃參湯 此溲利之聖藥也

米苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 五加皮

葛朮 陳皮 厚朴 甘草 木通 大腹皮

防風 生薑皮 灯心 姜引取 順流 水煎服

平癰養脾丸

婦身 人參 陳皮 去穢各 黃芩 二 草果仁 一

南星 炮一 白朮 一 白茯苓 一 紫胡 五 甘草 炙五

共為末米糊丸如黍米大竹葉炒米湯下一方加

常山

黄芪

鱉甲

醋炙  
黄色

月蟾丸

木香

人参

黄芪

當歸

桔梗

火君子肉

黄連

山稜

炮

枳实

義术根鱉甲各苦練根皮

乾蟾

以

燒存

柯子肉

夜明砂

綠丸

各并

共為末

醋糊丸陳米湯下

祖傳治瘰之法以酢鬼丹截之胃苓丸調之常用平

胃散加常山草果為末每服一字于臨發日五更

用桃柳枝七根煎湯調服

治大人癰疾方

人參

五

常山

三

酒炒

檳榔

三

草果仁

四

藜豆粉

炒

甘草

貝母

三

青皮

五

水煎服

又方

常山

檳榔

一

當歸

蒼朮

甘草

陳皮

先一服用酒搗細滾酒泡服如不效將桃枝七根  
灯心七根水煎二三滾露一宿發日五更溫服禁  
生冷鵝魚麩物

西江月

瘵疾來時潮熱內傷外感生癩初時截法似神仙不可  
可暴虎遺毒外感小柴飲子內傷平胃為先內加  
草果與常山東西桃柳枝煎

截后總調脾胃只消清痰養脾祛邪補正作良臣不  
讓仲陽錢氏瘵久成痞塊面黃腹滿消肌月蟬  
集聖是根基此個方兒密記

如是小兒久瘵或于半后来潮又如間日又三朝截  
法不宜急暴只用養脾清痰相其集聖和調神丹  
辨鬼真神陸陸日五更分曉

瘵痢如逢併作共問言高須知六端飲食要加時胃  
氣完全可治若是不思乳食強將脾胃扶持胃寒  
九子莫差泡間以香噍止痢

久瘵多成壞症脾焦肚大青筋頭乾脚細瘦无神飲  
食全然不飽面目羸浮怯弱四肢无力难行不瀆  
醫治枉勞心尤死一生危病

平瘵養脾用人參

白朮陳皮當歸身

茯苓厚朴姜汁炒

蒼朮五錢米水浸

粉草半夏浸七次

青皮柴胡與黃芩

常山草果二錢半

鱉甲五錢勅煎搗

發熱門

小兒凡病有熱症既不同治亦多異酒分虛實不可妄用汗下也

陽風發熱其症汗出身熱呵欠目赤遊多睡惡風喘急此因解脫受風所致宜疎風解肌退熱先服紫荷餅收湯發去風邪結道七時再服涼驚丸以防內熱

湯寒發後其症无汗身熱呵欠煩悶項急而未喘急

惡寒口中氣熱此因解脫受寒所致宜發散寒邪  
退熱鎮驚先服醒脾散發去寒邪後以涼驚丸以  
防內熱 以上二症如小兒羸賦原寒者可用涼  
驚丸若虛怯者不如只用胃苓丸甚効

如傷風寒發熱又吐泄者不可發散此脾虛怯也只  
以五苓散吞理中丸甚効

傷熱發熱多得于夏其症身熱自汗作渴昏睡手足  
俱逆此因天氣已熱包漿太厚重受其熱也先以  
白虎湯調益元散以解其熱次服調元生脈散以

補正氣

傷暑發熱亦多得于夏其症身熱自汗作渴昏暈手足冷此由阴寒中食涼太過所致服調元生脉散補其元氣次服四君子湯以防吐泄之病

如夏月汗出常風以致身熱渾身自汗不寧者此名暑風四君子湯加麻黃紙黃芪以去風次以益元散以去熱

傷食發熱其症手心脾腹在熱噎氣吐乳大便酸臭或腹疼多啼飽脹喘急不思乳食此因飲食過度

所傷宜先用利藥去其積用丁香脾積丸復以集  
聖丸調之

如傷食已久日漸黃瘦死時作熱者不可下之野者  
保和丸重者集聖丸百无一失

痘疹發熱其症面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍熱  
乍涼咳嗽噴嚏手足指冷驚怖多睡此由時行痘  
疹各相傳染宜清熱解毒惟痘疹宜參蘇飲加木  
香麻痘宜用荆防敗毒散不可妄施汗下恐生變  
症若變蒸發熱此小兒常症不須服藥見本門

潮熱者當分二症有時開發熱過時即退來日依時  
復發其狀如癘此肺熱也若早晚發熱每日兩度  
如潮水之應期者此胃熱也蓋因感觸邪氣以致  
血脈滯滯不得流通若不治之變為驚悸者多矣  
肺熱地骨散主之胃熱三黃丸下之如虛熱者用  
集聖丸調之

驚熱者過身發熱而青自汗心悸不寧脈數煩燥顛  
斗恍惚此心熱也以涼驚丸退熱安神丸定心

以熱者但夜發晝退此血虛症也以人參當歸散治

之更難抱龍丸以防作搗

熱者傷寒汗后而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元  
陽浮于外不可再用寒涼之藥古人戒之當和胃  
氣使陽氣收斂其熱自退人參蒼朮主之甚者四  
君子湯加炒乾姜即効

身熱者形色黃瘦食不長肉背蒸盜汗泄瀉无帶壯  
大脚小此多得于大病之后失于靜息又或傷飽  
失飢用集至丸調理

此熱者一向熱而不已由氣血蘊滯五臟生熱鬱蒸

于内则睡卧不安精神恍惚兼发于外则表裏俱  
热燥急喘粗甚则喘急潮先以導赤散泄青丸以  
治其热后以抱龍丸鎮其驚如实热大小便秘者  
三黄丸下之

烦热着心燥不寐五心烦热四肢温壮小便赤色宜  
導赤散加麥冬山稜仁治之再以涼驚丸撤其除  
邪

積热者煩赤口瘡大小便赤澀此表裏俱实或内傷  
酒麵煎燻热瀟峻補外因厚綿少火所侵皆能生

此內外蘊積之熱也非食積先以三黃丸下之  
后以涼驚丸調之

三焦皆或因汗下太過津液虛耗或因大病之后元  
氣受傷皆能生熱其症困倦少力面色青白虛汗  
自出慢啞氣軟筋手足厥冷此氣血俱虛氣虛則  
發熱血虛則發熱也四君子湯加炒乾姜甚著加  
熟附子一片待熱少退以涼驚丸調之

客熱者陽邪下于心也心若受邪則熱形于額故先  
起于頭面而身熱恍惚多驚聞聲則恐此由正氣

虛而邪氣勝故其之交爭發渴死時進退不定如  
客之往來先以導赤散去其邪后以涼驚丸調之  
癖熱者由乳食不消伏結于中致成癖塊以生內熱  
薰灼于外集毒丸主之

瘧熱者寒熱往來有頭痛汗出者有嘔吐不食憎寒  
壯熱作渴者有遍身疼痛者或吐泄者症既百出  
病非一端頭痛汗出及遍身疼者小柴胡湯加蒼  
朮羌活治之噤痛者脾積丸下之作渴者白朮散  
治之吐泄者理中湯治之后用平瘧券脾丸調之

血熱者每日巳午時發熱遇夜則涼此心熱也輕者  
導赤散重者四順飲治之

紫葛解肌湯

柴胡 乾葛 黃芩 桂枝 赤芍 人參

甘草 竹葉七皮姜棗引

怪散

人參 白朮 白朮 甘草 桔梗 天花粉

細辛 防風 川芎 加麻黃 薄荷葉 姜引

調元生肺散

黃耆 人參 麥冬 甘草 五味子 水煎

參蘇飲

人參 半夏 茯苓 甘草 桔梗 枳殼

乾葛 前胡 木香 蘇葉 陳皮 姜枣引

防風敗毒散

生地 防風 連翹 升麻 荆芥穗 牛蒡子

玄參 酒糟 人參 桔梗 甘草 水煎服

地骨皮散

知母 紫胡 升麻 地骨皮 赤茯苓 半夏

姜三片引水煎服

人參當歸散

人參 歸身 生地黄 地骨皮 柴胡 苡苳

生薑引

四順散 解小兒疳熱

當歸 大黃酒蒸 赤芍 升麻 水煎服

祖傳治發熱不閉其症脾胃虛弱者以胃苓丸竹葉

炒米湯吞元氣虛者以涼驚丸竹葉湯荷灯心湯

送下隨症用引

西江月

小兒病則生熱，須知得病根苗。風寒外感，熱來潮飲，食內傷，煩燥吐泄，癰疔瘡疥，變蒸痘疹，如燒骨蒸，體熱漸減，勞調注般，分曉。

若是風寒外感，面紅又惡風寒，惺惺散子妙難言。有咳參蘇，効驗飲食內傷，可下三黃脾積，和參再加。集至保平安，莫使脾虛難轉。

泄胃苓最妙，赤白痢用香連。瘧家平瘧，解和干瘧。疥胡麻丸散，變蒸小兒常病，不須安用。漏丸如連。

瘧疾汗傳集至專調疝軟

治熱汗下作錯誤汗誤下傷人應汗而下痞滿便閉  
下而汗驚走只為不明表裏致令兇命早傾果雄  
從摸且因循藥用胃苓集至

哮喘門

哮喘之症有二不離痰火

有卒感風寒而得者有自傷鹽水而得者有傷醋湯  
而得者至天明則發連綿不已輕則用五虎湯一  
帖重則洋蘆丸治之此皆一時急解之法若要斷

本草綱目卷之五

五

根帶服五至丹外用灸法

五至丹

天南星

煨一兩

半夏

泡七次

陳皮

去白

甘草

并一兩

杏仁

日十九粒另炒

先以南星半夏二味研末姜汁皂

角汁拌勻和作餅又將其草陳皮研末取竹瀝一

碗以藥和成餅子焙乾又浸濕又焙乾竹瀝盡為

度再研杏仁泥蒸蜜和為丸臨時噙化一丸以薄

荷湯送下

取心水  
上書背  
尾三單  
各三壯  
仍禁酸鹹辛

熱之物

西江月

哮喘症雖有二皆由痰火中藏或被風寒襲外方  
披鹽水醋哈亦有乳哈而得致令攻脹為殃用藥  
調理法雖良斷根灸法為上

哮喘多成喘疾天阴飲雨連綿治時登表及行痰九  
室時常靈驗表邪未除五虎棗突毒蘆為先不瀆  
砒石作成丸悞了孩兒命短

咳較門

咳嗽治法有三有發汗有下泄有清補

如初起挾風寒外感者轉則蘇沉九寶湯重則五虎湯一帖即効

如咳久身熱喘急此肺中伏火也以葶藶丸利之

如咳久肺虛連綿不已即當補肺阿膠散主之

如咳久連声不已口鼻出血者茅根湯主之

如夏月得咳嗽者以加味白虎湯治之不可汗下見方

產門

咳痰甚精以利痰丸主之方見醫門

如咳久成龜胸者以葶藶丸主之  
如咳嗽吐血者二陳湯加姜汁主之  
如咳嗽咽痛聲啞者以耳柝湯主之  
新說九空湯 此發散之藥也

桑白皮

去赤

甘草

大腹皮

官桂

陳皮

蘇葉

麻黃

不去節

烏梅

一个

薄荷葉

杏仁

不去尖

各等

分姜

引水煎微汗為度

五虎湯

此發散之上藥也

麻黃

比杏仁

甘草

一个

細茶

炒七

白石

半

水

一

半

水

一

水

一

滋陰清肺風

亭麗丸 泄肺喘通水道

研亭麗炒黑牽牛炒杏仁去皮尖炒漢防己 各等分

共為末然後入杏仁泥和之束肉同搗為丸淡薑

湯送下

阿膠散 定喘消痰止咳此補肺之藥也

牛勞子 井車 杏仁 烏兜琴 阿膠粉炒成

糯米 水煎服

勞恨湯

陳皮去白半夏炒茯苓 甘草 天冬去杏仁泥

片參 枝子 貝母 知母 石膏 瓜蒌霜

生地 桔梗 水煎取茅根自銜汁和服

凡咳嗽日久而青而光其氣喘促哽氣時多出聲唇

白如練此肝氣旺而肺氣絕者不治一

凡咳嗽日久喉舌生瘡其聲啞者不治

凡咳嗽日久胸高而喘肩與胸脇俱動加驚搐者治不

凡咳嗽日久潮熱喘急一咳之時面青黑目上流血

從口鼻長出者此本火旺盛而肺已絕不治

凡咳嗽日久面白唇青目閉悶亂頭暈手擺者此肺  
氣將絕不治

西江月

小兒或病咳嗽醫家症要分明咳為有傷于肺經嗽  
則脾家癆瘵有聲无痰是咳无聲有痰嗽真時乎  
咳嗽病同臨有聲有痰一定

小兒傷風咳嗽其症身熱憎寒自汗燥煩不安然日  
夜嗽声无通時常鼻流清涕咽喉不利痰涎脉滑  
頭痛症多端治則宜乎發汗

咳嗽或傷寒症此因飲冷形寒冬月生卧濕地開窗  
被冷風吹犯其症脈紫无汗煩燥不渴惡寒治宜  
發散汗為先藥用參蘇飲驗

這是咳嗽傷熱其症而赤燥煩飲水不止隔咽乾咳  
唾稠粘症現甚則急喘病中痰涎必生喉咽潮熱  
手足或冰寒小兒多有此患

咳嗽若患火症決然咯唾血濃甚者七竅血流通此  
是肺熱火動若吐青綠白水胃冷停飲相攻嗽吐  
痰涎乳食中宿滯不消取用

要知治嗽大法依時認症扶持春天外感症無疑夏  
是炎上火氣秋則肺傷燥熱冬為風冷相隨相時  
而動作良医对症依方用劑

大抵實者當下虛則補薄為宜寒者溫散藥中推熱  
症清涼為貴凡則佐當發散停痰消逐為施初然  
止瀉莫投之德要化痰順氣

肺乃五臟華蓋皮毛為感風寒初医發汗最為先杏  
仁麻黃桑葉薄荷荊芥甘草黃芩桔梗人參前胡  
枳壳喘茶煎一服緒風脈散

久咳不宜發汗化痰順氣為宜潤下玉液有神荷不  
幼百行湯劑貝母陳皮枳殼茯苓甘草桑枝蒲蘇  
薄荷杏仁泥有熱石膏堪取

久咳痰壅發熱看他二便何如若還清利是中虛只  
用抱龍區慶如果秘結寒熱亭廔五色驅除要分  
虛實不須拘此見小兒命主

久咳連声出血清金降火為佳參連并桔欬冬花知  
貝二冬多下去白陳皮枳殼蒲胡地骨霜瓜茯苓  
玄參茅根加此個方見死價

大凡咳嗽治法必須清化痰涎化痰順氣最為先氣  
順痰行咳戒順氣陳皮枳壳化痰半夏天南黃芩  
按子火邪干桔梗枳殼芩開湯

虛咳時加作熱西黃氣短无神當歸陳皮白朮苓按  
子黃芩枳殼知貝前胡天麥甘草枳壳人參更加  
黃栢炒如神煎用生姜作引

又咳連声不已面青目窳常吁胸高有息汗如珠臉  
白唇青背屈骨瘦如柴潮熱鼻乾髮燥神虛嘔噎  
驚搐不瀆拘攣有灵丹无驗

蝦蟇瘴論症治歌

咳嗽小鷄鳴痰多吐血淋非麻湯一劑管叫得安寧

心腹痛門

心腹痛有六有寒有熱有食有積有虫有霍亂

小兒外感風寒內傷冷物胃氣當心而痛啼哭悶  
絕手足冷或吐或不吐以熱手按摩則止若用草  
豆蔻丸主之

凡小兒受寒遠腹疼痛叫哭不寧手足冷汗出或泄  
或不泄得熱稍定以理中湯主之

凡小兒腹痛無時舉發者此積痛也不可數下。則  
乳傷而難愈以集毒丸調之。

凡小兒飲食之后卒然腹痛此傷食也。須問其平日  
日有此疾否。若原無此疾作傷食者以丁香脾積  
丸利去所傷之食。用原傷之物煎湯送下。后以集  
毒丸調之。若原有此疾當作積論。

凡小兒心腹疼痛雜口吐清水而黃肌瘦得食即  
止。肚飢又作嘈雜痛此蟲痛也。先用雄黃解毒丸  
苦練根白皮煎湯吞下。追去其虫。后用集毒丸調。

之如元氣弱者不可下只用集聖丸主之  
凡小兒昼則死夜則啼哭此腹痛也蓋腹屬陰痛  
主寒遇夜則發陰寒甚也以理中丸灯心燒灰煎  
湯下

草豆蔻丸

草豆蔻

油一包煨去

陳皮

大澤泄

半夏

各一分

桃仁

七粒去尖

麥芽

炒二分半

神曲

炒

柴胡

姜黃

各四分

共為末湯浸蒸餅為丸白湯下

丁香脾積丸

丁香

良姜

醋炙各五斤

木香

巴豆霜

三棱

煨

莪朮

各三斤

青皮

醋浸去白五斤

皂角

燒存性二斤

百草霜

四斤

共為末醋糊丸有積茴香湯下

傷食原物湯下

水泄者并草湯下

祖傳治腹痛甚者解毒丸下之輕者脾積丸下之

凡小兒心腹痛急面青手足冷指甲青目上嵐闊亂

煩燥狂言邪譫噴棄喘急者皆不治

西江月

凡過小兒腹痛必須察認原由西黃腹痛食中求驗

白肝虫作楚指冷而青寒痛三家啼哭无休或湿  
或下藥先按不可說時差謬

積痛先行脾胃脾以次調和虫聚別用取虫科集  
至勤之服可寒痛理中藥妙茱萸湯引宜多至時  
腹痛又如何集至妙如利藥

積痛有時發作面黃腹脹難痊丁香脾胃積下當先后  
用養脾調緩蒼白青陳曲麥苗香菝葜木山稜砂仁  
靈脂木香其枳實黃連川練

虫痛時作楚面白青水長流  
換即芦香與糖越君

子蕪黃陳肉白朮木香靈脂黃連辰砂黃蘗青陳  
乾蟬與麥曲煎去痛降是掃

疝氣門

疝氣初得屬寒久則屬火

凡小腹疼痛外疝腫硬者此名疝氣蓋由小兒久寒  
濕地以致寒氣內侵于疝而得所以小腹刺痛外  
疝腫硬但左為偏墜右為膀胱輕者內服五苓散  
加茴香川練子橘核楸即少加木通屢試屢效甚  
者加附子一片即效后服茱萸內消丸調之外用

敷藥及薰洗法

凡小兒性急多啼有傷于脾胃以致羸丸腫大下疳者小腹不痛但外囊溼大汨三有聲此宜二陳湯去耳草加海藻昆布荔枝核小茴香川練子為末噴流水調服更以瀉青丸去大黃加青皮相間之服敷藥用蚯蚓糞不拘多少為細末以葱汁調敷腫

處一日一換以消為度

薰法用葱搥研細煎百沸湯入鹽少許以瓶盛之令小兒正坐其上蓋其腫處待水溫洗之后加敷藥

灸法 牽小兒明整向膝側比之尺處是穴左則取  
左右則取右併灸三明交穴各三壯  
祖傳治小兒疝氣偏墜用萊菔內消丸外用敷藥

西江月

疝氣如何而得下焦結膀胱腎囊腫大似茄樣左  
右墜難抵當內服萊菔丸子外用龍土葱湯待他  
痛止腎消囊再灸兩邊臍上

我有得傳妙法楠核木香沉香茴香大小用相當食  
鹽故紙為上巴豆少炒川練去巴取練如常研為

小兒調營一服汗淋停當

浮腫門

浮腫治法開此門者發汗也潔淨府者利小便也

凡小兒面目遍身浮腫者或因胎稟虛弱卒冒風濕  
或因瘧疾汗后不曾禁風皆成此症輕者用胃苓  
丸治之重者用加減胃苓湯治之

凡小兒浮腫又加喘急者此脾傳肺也當專治脾而  
兼治肺目服加減胃苓湯夜服葶藶丸如先喘急  
而后面目浮腫者此肺傳脾也當專治肺而兼治

脾胃服葶藶丸夜服胃寒湯加麻黃杏仁

如先浮腫而后腹脹者此表邪傳裏也只以加減胃

苓湯主之

凡浮腫不可妄用汗下更不宜用大戟葶藶牽牛之

類以傷元氣

加減胃苓湯

陳皮 蒼朮 厚朴 姜炒 枳實 豬苓 赤茯苓

澤泄 木通 白朮 官桂 滑石 防己

五加皮 生薑皮

國藥而致者加 麻黃杏仁桑白皮

腹脹者加 大腹皮木香枳即蘇梗去甘草

氣虛者加 人參 灯心引煩取長流水煎溫服

浴法 于午時盪蔥百沸湯畦風處浴之益乘零取

微汗日一依此行之効

祖傳治浮腫只用胃苓丸用長流水五加皮灯心煎

湯吞外用浴法

凡浮腫氣促面黑脉微細不飲食者不治

西江月

小兒病患浮腫或因胎氣羸虛率因風溼外邪致以  
致渾身腫起又或諸病汗下脾虛又被風吹遂致  
浮腫甚憂虞症別輕重用劑

輕用月卷九子重則加減堪行再用浴法保安寧此  
法古今未定亦可太施汗下太補亦不宜行能依  
方法救孩嬰方可稱為司命

大抵浮腫治法也門淨府須知木通防己五加皮蘇  
葉車前滑石澤瀉曲蘆飲子補脾平胃須豈灯心  
長流水煎之每日清晨早吃

要識浮腫死症氣候面黑頰憂脉微細小不堪謀飲  
食不殮難救臍顛糞如羊屎太山倒了難扶忽生  
大喘肺經虛縱有丹何救

脹滿門

脹滿專屬於肺有虛脹積脹熱脹寒脹

虛脹者或因吐泄或悞服下藥致成脹滿者此宜補  
中調氣利小便以四君子湯去甘草加厚朴陳皮  
蒼朮木香木通治之蓋中滿忌甘草所以去之若  
厚朴乃脹滿必用之藥

積脹者腹中原有食積結糞小便黃腹時作痛微喘  
脈實時飲水又不能食者可下用下香脾積丸  
下后以集聖丸調之

如脾胃素弱不能消導運化傷食作脹者先補脾四  
君子湯去甘草加厚朴陳皮砂仁后以脾積丸下  
之后天補脾集聖丸主之輕者只以保和丸調之  
熱脹者渾身壯熱而赤煩燥大便秘此因胎稟素厚  
快服藥而致者急以三黃丸下之不通者用胆導  
法下后以胃苓丸調之

寒脹者因寒積鬱結而照手足厥冷而青氣急先以  
塌氣丸治之后以胃苓丸調之

凡脹滿喘急除寒脹一症其餘俱以葶藶丸治之  
亦有通身瘡疥因淋洗盥搽過毒婦內而腹脹者輕  
則敗毒散治之重則解毒丸下之瘡出脹消而愈  
如而青黑氣上急手足冷目直視或目閉嘔乳者  
皆不可治

塌氣丸

之胡椒兩一鴉稍

五毒

共為末製糊丸陳米飲下一方

加蘇苜子名楊九子

敗毒散

荆芥

防風

連翹

枳殼

柴胡

薄荷葉

羌活

獨活

桔梗

乾薑

木通

金銀花

黃芩

川芎

甘草

山枝子

上廬

加葱三莖

下腫加灯心一握

萎三片引水煎服

凡腫脹大小便不通嘔吐者不治  
凡腫脹與背平者不治

凡腹脹喘急氣長出目閉不食者不治

凡腹脹喘促驚搐亂者不治

担傳治服滿以解毒丸下之胃苓丸調之

西江月

服名為惡症寒熱實虛分明忽然飽悶勢律律傷  
食熱家休惡吐泄服而來形大便秘而實因四肢  
浮腫濕家尋痞瘵久減虛癆

傷食服而急下，后还用燥和者是寒服理中可塌  
氣神方不錯秘結三黃葶藶木香順氣宜多胃苓  
又是溫家科痞瘵月婢堪妥

實症悶亂喘滿治宜白餅靈丹其喘作虛看溫藥

補養方驗二朮參苓厚朴陳皮木香當參更加木  
通利小便此藥虛症可也

九治小兒虛服先服翳氣神方不愈食積腹中藏糞  
結小便黃燥但竟時間微喘飲水能食如常脉浮  
而實下為良下后丹宜補藥

大抵腹脹急症皆平疝哭多凶二便秘結亦難通反  
吐水漿堪亦氣喘服家常病只愁目閉痰癢面赤  
脚細黑筋叢集至九子妙用

小兒服服多因食  
山查曲麥朮青陳

甘草 仁同入內 寒加茱萸熱加芩

小兒患腹脹紫蘿葛陳并食少加白朮煎服自然安  
黃疸門

黃疸不必分五樣總是濕熱

凡小兒身皮目皆黃者黃病身痛背強大小便澀一  
身面目指爪俱皆黃小便如壅漏壅水色着物皆  
黃濁者難治此黃疸也其症多得于大病之后以  
茯苓滲濕湯主之

如小兒生下百日及半年不因病后身微黃者胃熱

也加戒瀉黃散主之

如面黃腫大吐食而渴者脾痺也集聖丸主之

又有自生而身黃者胎疸也地黃湯主之若淡黃甚

白者胃怯白朮散主之

如夏月身体暈熱胸膈煩滿皮膚似襦白睛赤黃筋

骨痿弱不能行立者脾胃鬱熱也加戒瀉黃散上

通治黃疸茵陳五苓散尤穩

知此泄黃疸三稜湯主之

茯苓滲濕湯

白朮 澤泄 茵陳 猪苓 黄芩 黄连

枳子 防己 白朮 蒼朮 陳皮 枳壳

水煎徐溫服

加戒瀉黃散

黃連 茵陳 各五 黃精 黃芩 茯苓 枳子 各五

澤泄 和二 水煎

三稜湯

三稜 莪朮 青皮 陳皮 神曲 茯苓

甘草 黃連 白朮 茯苓 傷食吐泄加山查

神氏吐泄加滑石 發熱加薄荷 水煎

桂傳治黃疸以胃苓丸一劑加茵陳末五錢同為丸  
用竹葉灯心車前子煎湯吞服

九榮黃大渴不止而無鼻氣冷寸口無脈者不可治  
請汗門

汗者心之所藏在内為血在外為汗

小兒氣血嫩弱膚膜未密若厚衣太暖蒸為肺肺熱  
肺生熱不得于心故液不能自藏而額汗出也額  
屬心本傳宜收斂心氣用參湯主之此虛汗也

如大病后氣血尚弱液雖自汗或潮熱或寒熱發  
之後身涼自汗日久令人黃瘦失治則變為骨蒸  
并癆黃茂固真湯主之

如睡中汗出不睡則死汗乃腫瀆也醒老則止而不  
後出汗亦是心虛此盜汗也宜欬心丸團參湯主之

如睡中遍身汗出醒竟時久不乾此積症盜汗脾冷  
所致益黃散主之

如病困睡中身体汗流此因陽虛所致黃茂固參湯  
主之

如脾虛泄瀉自汗后而通身冷而汗出有時遇泄則  
无末世則有此為大虛症急當補脾宜理中湯加  
熟附子待泄止又以黃芪同真湯主之

凡自汗上至胸下至臍此胃氣虛也當補胃四君子  
湯加黃芪治之

如肺虛自汗其症有臉色多脫白脉無之无力蓋因  
久咳嗽連声不已以致肺氣上壅故令汗出以四  
君子湯加麥冬此護母收子之義也

如慢驚自汗遍身俱有其冷如水此危症也大補湯

如熱附子一片治之

如傷風作熱自汗者宜收表解肌以柴葛解肌湯之  
如死時冷汗出發根如頭珠面頰上濺然此為驚  
風宜抱龍丸四君子湯加麻黃根治之

凡小兒自汗上至頭下至項謂之六陽虛汗不須治  
之自愈

凡小兒傷寒汗出至頸而止者此欲發黃茵陳湯  
凡諸汗症服前藥不止者俱加牡蠣蛤粉或止汗散  
調之如有實熱在內煩燥汗出不止三黃丸下之

固參湯

人參 當歸各三片 桂枝心 一片 每藥二片 備心

一片非水中半煎一中食前溫服

黃芪固真湯

黃芪 人參 白朮 甘草 炙當歸 麥冬 水煎

益黃散

陳皮一两 青皮 枳子肉 砂草各五片 丁香二 為末

每服二片未迴歲者只服五分水煎 如感寒吐

泄加姜枣

大補湯

當歸

人參

黃芪

白芍

生地

枳實

三

白朮

白朮

川芎

加附子去苓芍

浮麥一

撮為引水煎

止汗散

以敗蒲扇燒灰灯心湯調下或酒調亦可

夜啼門

夜啼之症有四驚啼熱煩啼腹痛啼神不安啼

驚啼者邪熱乘于心也當安心以導赤散加灯心照

心熱以安神丸定心効

蒸煩啼者其哭无淚見灯則喜而止以導赤散加麥冬枝子仁治之

腹痛啼者脾胃冷兩痛也西青兩半以温中藥調理

中氣益黃散治之

神不安啼者睡中忽覺自哭以安神丸灯心燒灰胡湯吞服

又有拂其性而初哭者要審明白不可妄投藥丸  
祖傳治夜啼以至垂危命丹灯心灰胡湯下甚効

西江月

小兒夜啼四症忤驚肚疼心煩如逸拗哭忤家言睡  
中忽啼驚見肚痛手足厥冷腰曲口气水寒心熱  
煩燥不安眠其症面赤腹煖

託辨夜啼症候其間治法須明分明傳授與人問只  
得心誠求適忤驚安神九子理中專治脾疼涼驚  
錠子治心煩搥用燈花妙散

燈花散 用燈花七枚辰砂一分研末燈草湯吞

疳症門

丁奚者手足極細項小骨高尻削體瘦腹大睛突脫  
哭胸陷骨癢潮熱是也哺露者虛熱往來頭骨分  
開翻食吐虫煩渴啞喘是也丁奚哺露皆因脾胃  
久虛不能化水谷以致精神減損无以榮其氣故  
軀肉消削腎氣不足復為冷風所傷骨枯露也  
小兒十五以上為癯十五以下其症為癆此皆氣血  
虛憊腸胃受傷致之同出而異名也蓋小兒易虛  
易實凡病久則成癯用藥乖力飲食過度將息失  
宜俱成癯症俱用集聖丸加減治之

小兒臟腑嬌嫩飽則易傷飲食失常不為疳者鮮矣  
或小兒失乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生故  
乳食稍多過飽无度則疳因傷得恣食肥甘粘膩  
生冷醃酸以滯中脘則疳因積生

乳母睡臥寒煖失其調理飲食乖常喜怒房勞即  
與兒乳則疳因母患傳氣而入以致脾胃一傷諸

疳皆弱但見目澁或生白膜唇赤身黃喜卧冷地  
愛吃泥土泄痢无常肚腹脹滿耳鼻生瘡頭髮作  
穗脚弱項小極瘦飲水潮熱進退皆其症也以集

至九本方調之燕服參苓白朮丸百无一失

有因大病妄投吐利之藥以致胃虛而亡津液內發  
虛熱外消肌肉者以集聖丸去莪朮青皮加人參  
白朮治之

有因熱病不退以致津液枯燥者集聖丸去砂仁莪  
朮加龍胆草治之

有因吐泄下痢而成疰者集聖丸去青皮莪朮加白  
朮炒豆蔻柯子治之亦燕服參苓白朮丸治之

有因久癰不退而成疰者集聖丸加慈甲治之

有因食積而成疳其腹痛者集聖丸去歸芍加川練  
子肉小茴香三稜治之

有因虫痛而成疳者本方去歸芍加白薑芫川練子  
肉治之

有因脾胃久虛不能運轉以致其氣或胸中受毒腸  
澀血少以致手足杳細嘔吐骨高鼻削作瘦者前  
丁薑哺露之症皆以集聖丸參羌白朮丸治之  
有因乳母恣食五辛滯麪炙博致令小兒日則煩渴  
飲水乳食下泄夜則渴止此名疳渴以集聖丸去

我木砂仁加人參白朮治之無服人參麥冬散之治  
凡痺症熱者虛中之熱冷者虛中之冷治法不可用  
涼治冷不可用溫尤不可用雲施汗下以致殺人  
凡小兒羸見黃瘦作抽肌身癢痛不眠乳食者即服

五痺消積丸或集聖丸治

凡治痺瘕不出細分五痺留壅則補之熱則清之冷  
則溫之吐則治吐痢則治痢積則治積虫則治虫  
不出集聖丸加減用之屢試有驗

凡有死毒痺者臍后項邊有核如彈子按之則動狀

而不動又則肢體離棄便溺膿血壯熱羸瘦頭露  
骨是也凡見此症速破其核有虫如米粉膏藥貼  
之內服集聖丸調治

集聖丸

茵蔯

焙乾

五靈脂

炒

夜明砂

淘去沙

煨乾

縮砂仁

炒

木香

陳皮

去白

義木

使君肉

炒

黃連

川芎

酒洗炒

訶糖

炙

當歸

青皮

炒

因于虛者加人參

二

白朮

炒

去義木

青皮五靈脂

因于熱者加龍胆

草

三

去砂仁義木

因于瘡者加鱉甲

炙焦三

因于吐泄下痢者加白朮仁肉豆蔻煨柯子肉各

去青皮莪朮 因于積痛者加三棱煨川練子肉

小茴香煨名去當歸川考 因于虫者加蘇莧半

川練肉仁去婦考 因于渴者加人參白朮各

去莪朮砂仁 右為末用雄豬胆二個取汁和麵

糊為丸米飲送下

參苓白朮丸

人參 白朮 白茯苓 甘草 山藥 白扁豆

桔梗 薏米 蓮肉各一加歸身各川考七共為

米神曲糊丸米飲送下

人參麥冬散

人參 白朮 麥冬 黃連 甘草 乾葛

柴胡 竹葉引

五疳消積丸

使君子肉炒 五 來 炒 陳皮 神曲 山楂肉

白燕莢 黃連 胆草 各 等 分 為 末 陳 米 飯 為

丸米飲送下

西江月

小兒疳癆又險愚夫不識根苗面無血色髮穗焦壯  
大頸乾脚小吐泄時上舉發似癰非癰來潮吃泥  
弄舌滯頤交不治休嗟命歎

小兒食傷脾胃疳癆煩熱虛羸黃連芦荅解蒸危莪  
朮豬青去積當歸川芎赤血夜砂君子攷細乾蟬  
木香五靈脂粟米糊丸為最

大小便門

凡小兒有病或甚勝痛或驚大小便不通者此疳積  
危看處實急通利之

如小兒形實熱甚內服三黃丸外用貼臍法即通  
如小兒形怯不可下者用熨臍法肚導法即通  
如用上法不通又加腹脹氣喘多哭悶亂目上視手足  
足冷者不可治也

凡小便不通者有陰陽二症陰閉者冷濕乘虛入裡  
因而不通五苓散加兩木香為末空心鹽湯調服  
外用炒鹽熨臍即通陽閉者因暴熱所逼澀而不  
通輕者五苓散加車前子灯心治之重者以木通  
散外用熨臍法即通

小便淋澀者蓋小腸為受盛之府氣通于膀胱膀胱者為津液之府氣通于腎小腸受氣容于膀胱銷煉腎水，道澀而不利故小便澀痛也先以八正散泄去其熱次以香芎丸調之不論五淋治法同皆小便出血者熱之極也蓋心生血于小腸相合熱甚則失其常道故不流滲入于胞故小便血出也以導赤散加蒲黃末空心時灯心湯送下小便出白者初出微赤良久澄白如米泔狀此由乳哺失節有傷于脾致令清濁不分兩色白也又剛

或痺以分清飲主之

但傳治小便白色如米泔者以胃苓丸溫藥湯下

小便不禁此腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能制其尿出而不禁謂之遺尿腫裡自出者謂之尿床俱以雞腸散治更以地黃丸調之

凡大小便不通者有虛有熱虛者津液不足大腸乾澀而秘結內服通幽湯甚有用導法

熱者臍膈積熱內有燥糞其腹必痛或作渴內服三

黃丸外用導法

大便下血者是大腸中有積熱也因恣食酒麵炙煨  
熱物流入心肺血熱妄行滲入腸中故大便下血  
久則脏毒无時下血黃連丸主之

凡小兒初生七日之內大小便有血者此胎毒也不  
可用他藥只以生地黄取自然汁入蜜少許和勻  
溫服之自愈

凡小兒非月內大小便有血者此積熱在心肺二經  
熱積于心故小便出血熱積于肺故大腸出血三  
黃解毒湯主之

小兒出痘疹之時大小便血者此熱毒內  
潰乃危症也難收

凡小兒常時糞后出血不止者此名野雞痢地榆丸  
主之

木通散

木通 扁蓄 大黃 瞿麥 滑石 赤茯苓

枝仁 條荊 車前子 升草梢 灯心引

八正散

滑石 瞿麥 大黃 木通 扁蓄 車前子

山枝仁 井草梢 加黃精 灯心引

香考丸

香附 川考 赤芍 各五 海金沙 滑石 各一

枳壳 澤泄 石膏 枳殼 各三 與烏末糯米粥

糊丸 麥冬湯送下

如小便澀痛者取長流急處順水用火微溫入鹽少

許調勻空心服

分清飲

白蒲 烏藥 加茯苓

各等分為末灯心引水煎服

雞腸散

雞腸

燒男用雌女用雄

壯仍煨白茯苓

桑礞石

微炒各五

骨

龍骨

各二

共為粗末姜枣湯服

黃丸

雞地

酒浸焙

山茱萸肉

山藥

各四澤泄

丹皮

白茯苓

各五

共為末煉蜜為丸温水空心服

通幽湯

生地

升麻

桃仁泥

歸身

甘草

紅花

麻仁 炒 加大黄 水煎 调粉 即末服

黄连丸

黄连 下五 槐子 炒 侧柏叶 炒 枳壳 荆芥穗 各三分

地榆 三分 脱肛者加胡皮 三分 为末 醋糊丸 绿豆

煎送下

三黄解毒汤

黄连 黄芩 黄柏 红花 木通 大黄

生地 归身 甘草 水煎服

地榆丸

防風 烏桕心 枳壳 阿膠 升麻 剉升麻  
黃連 生地 當歸身 槐花 白朮 伏龍肝  
本和丸陳米飲下 加地榆

非脐法

用四環大者拖爛貼脐下能開結毒

灸脐法

用連鬚葱一根不洗去泥土生姜一片濕豆豉二  
十一粒鹽二匙同研拖作餅燒銼子烘熱餅掩脐  
中以厚綿絮繫定良久氣通自利不然再換

胆導法

用猪胆大者一個將鵝毛筒截去兩頭一頭挿入胆中用線扎定不令移動着口吹氣入胆內又以線作活套子扎定其氣將鵝毛筒向內納入谷道中取出活套摺胆汁入腹中源史氣通自利

西江月

大便不通症候有虛有實不同虛為津液少沉通腸澀不能傳送內服通泄湯劑外法貼導疏通者是也  
熱症腹中存屎燥三者可用

若傷食症候腹中必作痛疼面黃便秘少禁藥用  
九轉靈應大便若足下血大腸積熱之因連槐  
栢榆柳荆脫肛蠅皮加增

糞后時常出血地榆九子高強防風枳壳與生黃地  
榆當歸為上烏梅甘草柯子黃連荆芥同行伏龍  
槐花白朮當米醋為丸吞放

小便不通症治閉閉閉須知閉為風冷入乘虛五  
苓木香加入又加靈砂為末空心鹽湯吞之外用  
鹽炒熨其臍氣流通曰滯

陽閉暴熱所逼其症唇赤面紅便如敗滴血鮮流五  
苓車前加用或用剪紅散子車前八正木通外用  
熨臍法即通活幼之功可頌

又有濕痰下墜其兒体胖身肥喉中有痰面微紅小  
便落地降注其形澤如米泔此症不可胡為二陳  
湯內增蒼朮木通非麻茄入

初出有微紅色良久澄白如泔此由乳食積脾元清  
濁不分症現治用分清飲子或用胃苓湯先補脾  
化滯法為先脾實方為此患

凡治小便不通涼藥不可多施若用田螺貼其脬區  
寒入腹難出宜用人參白朮茯苓甘草相隨再加  
車前與滑石并麻笨通併入

大小二便俱閉此症果是凶危先通大便最為宜小  
便自然通利藥用九轉靈應車前煎水調之此般  
治法實為奇醫者銘心牢記

大小二便下血心肺積熱相攻三黃解毒有神功黃  
連黃芩相共黃柏紅花生地大黃并草木通當歸  
只可用其身白水煎湯相送

頭項門

小兒之頭四時要涼但見頭熱即有病生可預服抱  
龍丸

小兒頭顛腫大青筋顯露者此肝熱也瀉青丸主之  
頭顛腫起者此因熱在內其氣上冲故而腫起宜  
退熱疏風瀉青丸抱龍丸主之

小兒无<sup>病</sup>項軟者此肝熱有風也瀉青丸主之

顛門下陷者此因久病肺腑虛弱氣不上行故下陷  
如坑參苓白朮丸主之已成疔者集聖丸主之

... 而 不 合 者 此 筋 氣 有 虧 名 曰 解 顛 乃 危 症 也  
正 內 服 地 黃 丸 外 用 封 顛 法

久 病 之 后 其 頸 軟 者 此 天 柱 骨 倒 乃 危 症 也 當 大 補  
氣 血 八 物 湯 主 之 以 薑 黍 末 調 服

小 兒 生 下 便 頸 軟 者 此 胎 氣 不 足 地 黃 丸 主 之  
封 顛 法

用 大 南 星 微 炮 為 末 米 醋 調 塗 絹 帛 上 烘 熱 貼 之  
以 合 為 度

目 病 門

黑珠屬肝白珠屬肺瞳仁屬腎兩角屬心兩胞屬脾

目內赤者心經積熱上攻導赤散加黃連防風

方見驚風

祖傳治小兒目赤者以涼驚丸菊花煎湯下

目內黃者脾熱也瀉黃散主之目胞腫者同治

目連劓者肝有風也凡疔或新或久皆引肝風目屬

肝風入目上下左右如風吹兒不能任故連劓也

用瀉青丸主之

方見驚門

目直視者肝有熱也熱入于目聾其筋脉目之兩角

俱繁不能轉視故目直也俱用瀉青丸主之

小兒初生其目閉者此胎熱也內連服生地黄湯  
外用胆草煎水洗目上一日七次恐緩則損目

小兒生下眼胞赤爛者此因生時洗拭不淨以致穢  
汚潰兩角中故兩胞赤爛至長不瘡真金散主之  
小兒久嗽其目兩眶紫黑如物傷損白珠紅赤如血  
謂之血眼內服玉液丸外用貼法

小兒生下日久之后目不見物者謂之雀目此肝虛  
也用地黃丸治之以猪羊肝吞啞

小兒痘疹之后目內有膜者以谷精散主之

小兒熱病其目羞明喜暗者此風熱也宜解風熱以清陽散火湯主之

小兒吐泄后目有白膜閉不能開及无精光者難治  
瀉黃散

藿香七 山枝仁一 石膏五 甘草七 防風二  
石劉細用 蜜拌炒但微炒 為末 水煎溫服

真金散

黃連 黃柏 當歸 赤芍各二 杏仁去皮尖  
石劉細用 乳汁浸一宿 晒乾為末 生地黄汁調一

字頻三點眼以新帛蘸荆芥湯洗之

生地黄湯

生地黄 赤芍 川芎 鹽歸 升麻 天花粉

各等分搗末每少許灯籠湯調服

貼

真生地黄無豆豉研成膏貼目上其血自散如血  
去既出腫黑自消甚妙

不精草散

谷精草

二  
兩 蝉退

三  
去翅足

密蒙花

五

白蒺藜

三

炒

去殼

共為末每用一升取雄猪肝一兩竹刀剖開搽藥  
于內以草束定水煮肝熟令兒食肝飲湯

清陽散火湯

黃芩 荆芥穗 川芎 防風 薄荷葉 甘草

連翹 山枝仁 當歸 石膏 羌活 水煎服

小兒驚風目斜視而不轉睛者灸風池穴目左斜灸  
右穴右斜灸左穴

西江月

小兒眼目多病皆因自食酸其胎生邪熱焚其肝沖

發于目為患或為赤腫痒痛或多眵淚遮睛甚則  
翳膜掩瞳間更有睛盲省眼

眼目部分常識五臟各屬一位黑珠屬肝白珠肺腫  
人又為腎水大小兩角淵異心火是則屬之上下  
兩胞屬何如脾土中央定位

目內赤色心經積熱上冲導赤加連併防風更  
有洗心堪用又或現出黃色此為脾熱蒸攻瀉黃  
散子有神功此方又逐浮腫

小兒目患赤痛難用點藥醫效只將湯藥內服通外

用敷藥止痛湯藥洗心肝散敷藥四螺連同二味  
共研要通融紙攤貼之休動

如或要用點藥莫將眩藥雜藥只把黃連細研勻將  
大四螺水浸藥末納入螺內須臾黃水流行蘸水  
點入眼中存熱退涼生痛定

目痛肝家風熱瀉肝釅是仙方外用乳洗目清涼  
使點藥輕安久病目生白膜肝虛之症消詳盡則  
補母用地黃養血養精為上

牙痛門

耳竅爲腎耳珠前爲少陽耳病有五皆由于腎經  
寒與氣上冲于耳遂使津液壅而爲膿爲清汁也  
亦有因沐浴水入耳中急爲聾耳內服蔓荊子散  
外用龍膏散搽之

耳珠前后生瘡浸淫不愈昔黃藥散主之

耳傍赤腫者此熱毒也若不急治必成大癰外用款  
毒散內服消毒飲

凡暴聾者此氣閉也通竅丸主之

有虫入耳者以清油灌之其虫即出又用兩刀于耳



黃藥散

黃極 白枯丸 海標硝 滑石 龍骨各等分

為末濕用乾搽乾用猪油糊敷

救毒散

用桑豆粉不拘多少或且研細末以淡醋調敷  
處乾則易之

消毒飲

羌活 防風 黃芩 連翹 桔梗 甘草

人參 川芎 喘喘 柴胡 水煎服

通竅丸

用磁石一為末射香五同研成丸如枣核大綿裹之  
納耳中又以錫鉄一塊熱酒泡過含口中須臾氣  
即通矣

西江月

尋常耳中水出日久就結難通雖然停耳不為凶只  
恐成膿堪痛治在少附風熱腎銜濕熱同攻紅綿  
藉血可消膿方子分明選用

鼻竇門

鼻為肺之竅鼻竅者肺氣不通于竅然肺主鼻

風寒外感則肺氣壅閉而鼻塞川芎膏主之

鼻涕者肺為風寒所襲而津液不收則為鼻涕細辛

散主之

鼽鼻者肺受風寒久而不散濃涕結聚不開使不開

香臭則鼽矣萬金膏主之

以上三症皆宜通利俱用加味煎通氣散

鼻乾者心脾有熱上蒸于肺故津液枯竭而結當清

熱生津導赤散吞抱龍丸治之

如痛已極鼻乾而黑竅張長出冷氣者此肺絕也必

死之症

鼻淵者流下渣涕極其腥臭此胆移熱于腦又名腦崩辛夷散主之

凡小兒初生三朝五日一臘忽然鼻塞不能吮乳不得呼吸者因乳母安卧之時而不知迴避鼻中出氣少着兒顛門或因洗浴用水過冷又不避風邪所以致兒鼻塞通關散治之

鼻衄者是五臟積熱所為也蓋血隨氣行今得熱則熱氣動而妄行溢出于鼻也宜涼血為主內服加

成地黃湯外用吹鼻散

川考膏

川考

細辛

藜本

白芷

牛草

三

龍腦

五

射香

丑

杏仁

去皮尖

七粒

共為末

煉蜜為丸

灯心湯

化

明

化

如体弱者綿裹一九塞鼻孔中男左女右

細辛散

細辛

前胡

防風

川考

人參

甘草

各等分為末乳香湯調服

萬金膏

羌活 川芎 細辛 蔓荊 麻黃 石膏 蒲瀉

龍腦 射香 許少

加味 麗澤 通氣 散

寇活 獨活 蒼朮 蘇合 升麻 荆芥 穗

高根 升麻 炙 細辛 麻黃 白芷 川芎

木通 姜 三片 朮 二枚 葱 白 三寸 水煎 食后服

辛 芎 散

華 芎 仁 五 蒼 耳 子 煨 二 白 芷 一 薄 荷 葉 五 黃 連 一

共晒乾為末 葱湯調服

香薷子 川芎 荆芥穗 僵蚕 細辛 牙皂  
共為末以葱白搗成膏攤絹細上烘乾臨卧時貼  
顛門

加減地黃湯

生地 黃芩 枳子仁 赤芍 鬱金 菊花引  
水煎入車前草自然汁細服之

吹鼻散

山枝仁 亂頭髮燒灰 共為末吹入鼻中

祖傳治衄血用神芎九茅花煎湯可

西江月

小兒若是鼻塞風寒各有根由傷風清涕必長流乾  
燥傷寒挑搞清涕荆防發散乾燥火挑中水奉連  
枝柯可同侍引用葱姜平復

忽然鼻中衄血五臟積熱所為血隨氣上溢于鼻治  
用涼血為主川芎當歸赤芍生地黃芩生枝黃連  
茸草牡丹皮栢葉茅根煎吃

口瘡門

脾之竅唇內應乎脾

小兒鵝口者口內白屑滿舌上如鵝之口者此為胎熱而心脾最甚重發于口也當內服涼驚丸外用鵝口中涎以絹包手指洗淨以保命散吹之此亦名口瘡

口瘡者滿口赤瘡此因胎稟本厚者育過溫心脾積熱薰蒸于上以成口瘡內服涼驚丸外用地雞搗水遍塗瘡上又以一連散敷之地雞搗下多有之以上二症如服涼驚丸不效洗心散一服如神

口糜者滿口生瘡爛乃膀胱移熱于小腸腸熱不便

上為口糜以導赤散去小腸熱五苓散去膀胱熱  
當以導赤散調五苓散主之

口瘡服涼藥不効乃肝脾氣不足虛火泛上而无制  
用理中湯治之外用官桂末吹之

口泄后口生瘡者亦是虛火理中湯主之

小兒上脘有脹起如懸癰者此名重膈由脾胃熱  
血氣不能收斂而成此若用針刺去惡血內服涼  
而散外用碧雪散吹之惟若服涼驚丸

小兒尚願流涎浸潰胸前者此滯願蓋涎者脾之  
口為脾之竅由脾胃虛冷不能收斂津液故涎從  
口出而潰于頤者宜溫脾丹主之

小兒口頻撮者氣不和也蓋唇應乎脾氣乃肺之所  
生脾虛不能養子故口頻撮宜補其母則氣自和  
以異攻散主之

小兒口撮面青多哭者此脐下痛也理中湯主之  
初生因脐風口撮脐腹腫者不治

小兒急欲乳吃而口不吮乳者此心脾有熱瀉黃散

治之

保命散

一名硃凡散

硃砂

白枯凡

五斤 牙硝 五斤

共為細末搽舌上

一連散

即泄心湯

黃連為末蜜水調

洗心散

白朮

甘草

當歸

荆芥

加生地

大黃

煨

麻黃

赤芍

薄荷葉

生薑引

碧雪散

蒲黃 青黛 礪砂 火硝 生甘草 苛分為

末次之

溢脾丹

木香 半夏各五 生薑 白朮各一 青皮各一 陳皮各一

共研末糝糊為丸米飲下

異攻散

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 姜棗引食

前溫服

小兒鵝口 口瘡重 膈不能吃 乳咽喉腫塞者用

青黛散

青黛

二 黃連

黃柏

各五

牙硝

各一

辰砂

各一 雄黃

硼砂

牛黃

各五分

腦子

一分

共為

細末

先以薄荷

汁拭口

后擦藥

入口

每用

二分半

西江月

小兒心脾積熱唇口舌上生瘡白為鵝口唇浮靨赤  
者石櫛子搽上下口唇破裂令兒乳食難彈洗心  
涼膈是奇方搽洗各宜併當

舌病門

舌尖屬心舌根屬脾

望舌者心脾有熱也蓋心候乎舌而生血脾之脉絡  
出于舌下若心脾有熱則氣俱盛附舌根而重生  
一物形如舌而短小內服涼膈散外用針刺去惡  
血以瀉黃和黃柏敷之

木舌者心脾積熱之氣上冲故令舌腫漸長大塞  
滿口中若不收急必致害人內服涼膈散以針刺  
去惡血用碧雪散和竹瀝敷之

弄舌者脾脏微熱令舌絡緊時時縮舌勿冷藥及下

之少以瀉黃散服之亦或飲水面无紅白色者此  
脾胃少津液故耳不可燥認爲熱以白朮散主之  
面黃肌瘦五心煩熱弄舌者此痺症也集聖丸主之  
大病后用藥而舌弄者凶舌上生白胎者此丹由積  
熱也內服涼薑丸外用碧雪散治之

舌上生黑胎者其熱已刻急以蒲荷葉水洗之如紅  
者可治以涼膈散下之洗不紅者必死

舌上生胎又加大熱者不可治十有九死

此泄后舌上生白胎者此虛熱也理中湯主之

涼膈散

連翹

山枝仁

大黃

薄荷葉

黃芩

甘草

芒硝

姜汁少許引

西江月

兒重舌木舌心脾蘊熱攻中舌下生疔兩重不  
去大硬腫痛急用針刺去血何妨鮮血瀝紅枯  
搽上有神功解熱消風可用

牙齒門

上片牙屬胃下片牙屬大腸齒屬腎

凡齒生遲者腎氣不足也蓋腎主骨齒者骨之餘  
不足則髓虧髓虧則不能充乎齒所以齒生遲也  
以地黃丸治之

上下齒床腫者此陽明實熱也涼膈散以酒蒸大黃  
為君加知母石膏羌麻為佐頻含嚥牙齦謂之

重齦者腎脏積熱附齦腫痛謂之重齦以針刺去其  
血用鹽湯洗淨黃柏末敷之

小兒多食肉牙齒與息不可近者此陽明有熱也內  
服神效丸外用姜汁調溼含漱

牙疳者狀如狐惑初作與乳次則牙齒黑甚則齧肉爛而出血名曰宣露此由腎熱其氣奔上焦故以走馬為喻當速治之若上下唇破鼻穿牙齒落者此名崩砂氣喘痰潮飲食減少則不可治當內服黃柏丸外用如至散敷之

咬牙者風熱也由陰明大腸二經積熱則生風故令相擊而作聲必于夢中者蓋動則風散于表靜則風歸于裏也宜風散主之

上唇生瘡虫食其脰曰感下唇生瘡虫食其脰曰感

出傷寒指掌之言，孤感者取其進退，猶操之義。  
咬牙惟癰疹中有此者為危，餘无大害。亦有因病戰  
栗鼓顫而閉牙者，治其病則自止矣。

牙蓋落而不再生者，由于舌絨之故，其肉頑厚，用針  
刺出血，以凡骨散擦之，即生。

大蛤散 治牙疳

雄黃

枯

凡各五

五倍子

二

蚕退紙

一

共為

末，先以米

泔水洗净，以藥搽上一日三四次，  
為愈。

蚕退紙散

治牙疳

蚕退紙燒五分  
人中白燒五分  
紅楊片助五分  
白礞一分  
硃烟分  
共為末搽之

神効丸

蘭香葉  
當歸  
藿香葉  
木香各一  
升麻二分

生地酒洗  
甘草各二  
黃黃酒炒  
砂仁各五  
共為末

湯浸蒸餅為丸白湯送下

黃栢丸

黃栢半生半炒  
為末煉蜜丸白湯送下

如全散

用婦人尿 桶中白垢刮取煨尽烟氣一銅葉 二分  
射香半分 共為末先以臘葉浸米泔水洗淨血后  
搽此藥

### 宣風散

樵即二陳皮 甘草各及 牽牛半生 共為末蜜水

調食前服

### 鼠骨散

用雄鼠一個爛尽肉取骨研末加射香少許粉  
擦姜湯漱口

西江月

上下牙齦黑爛，眼宣息露，堪嗟敗唇穿鼻，落齒牙迅。  
速呼為走馬內環，咽喉可畏，啼聲漸變，啞啞又名。  
孤感兆非佳，治鑿四露，无傾。

咽喉門

咽者胃腕主納，入於喉者，肺腕主氣，出入為一身之  
樞要。若胸膈間蘊積熱毒，致生風痰壅滯，而不散  
矣。而為咽喉病名。雖數種皆受熱毒，宜速解熱毒。  
緩則有難救之患。輕則井括湯重則化毒湯主之。

如出痘瘡而咽喉痛者此毒氣上攻也加減并結湯  
主之喉中生瘡不能吮乳者化毒湯主之

小兒為諸骨所哽骨大難嚥者以鵝羽掃喉吐血骨  
小者用海上方及視由科治之不治恐傷人  
誤吞麥芒者取梅口中涎嚥之即効

耳指湯

結喉

甘草

人參

水煎

細玉

吞之

化毒湯

桔梗

五

清荷葉

別

養德

各

一斤

二斤

水煎

一

山豆根

半斤牙硝

硃砂

各二雄黃

辰砂

各一

為細末吹之或以水調服

海上方

用金盞花根並碎米醋煎用有甯瓶盛之將口封  
紙嘴仰面嚙之其膏即出吞時勿令汙牙

用玉簪花根亦可 或威靈仙根亦可俱如前法

祝由科

用淨水半碗一炷香龍師火帝七遍吞水即效

西江月

小兒咽喉却出一身難命所關極積熱毒膈胸間攻  
生風痰不散病難數種各別治宜去痰為先後解  
風熱病斯痊是有難收之患

咽喉若然有疾治宜認其重輕輕者井枯散先行重  
則化毒當進如或喉腫口禁開散子宜薰喉風  
急救散通神吐痰消腫退病

知患車取鵝喉治者不可胡行可針之症要用針不  
當針時麥集只用蕪漆等藥退後依次施行蟾酥  
錠子點瘡疔瘡毒自消可幸

形声門

髮乃血之餘腎之苗也小兒髮久不生維生不異而  
稀此由腎氣衰則血氣不足之故也地黄丸主之  
齒乃骨之餘骨者腎所主也齒久不生維生而不齊  
者此腎虛故也地黄丸主之

行遲者何也蓋骨乃髓之所養血氣不充則髓不滿  
骨故軟弱不能行此由腎與肝俱虛得之蓋肝主  
筋筋弱而不能早行腎主骨骨弱而不堅加味地  
黃丸主之

脚細者稟受不足氣血不充故肌肉瘦薄骨節俱露  
如鶴之膝此亦由腎虛名鶴膝節加味地黃丸主  
小兒大病后手足痿弱及驚風后手足痿緩併宜加  
減地黃丸主之

語遲者由見在胎之時母受驚印之氣兼心兒感母  
氣心忡不定不能榮舌故而語遲驚疳丸主之

凡吐泄及大病后雖有聲而不能言又能進藥此外  
失音乃腎怯不能上接乎陽也地黃丸主之

有卒暴寒冷而聲不出者此脾風邪也加味瀉白散

主之

龜胸者其胸高腫狀如龜背由容風吹脊入于骨髓  
主之

此症多成痼疾間有灸肺俞二穴三推骨節下兩  
傍各寸半膈俞穴第二骨下兩傍各寸半如此而  
收功者然未見効也以揲壳丸主之

地黃丸

地黃

酒蒸  
八分

山茱萸

去  
糖

山藥

各  
四分

澤泄

白茯苓

河皮各三 腎弱失音者加 巴戟心去 石菖蒲各三

煉蜜為丸麥冬湯下

加味地黃丸

虎胫骨酒炙 生地黃 酸棗仁炒 辣桂 白茯苓

防風 當歸 如驚后得前症者加 羌活

煉蜜為丸白湯下

為備丸

人參 石菖蒲 麥冬心去 遠志肉炒 汁川芎

當歸各三 滴乳香 硃砂各一 因于驚得者加

牛胆南星三 煉蜜為丸米飲下

加 歲時 蘆花

大黃

煨

天冬

心

杏仁

去

皮

共

研

有

金

桑

白

皮

炒

木通

甜

葶

炒

蜜

丸

滾

白

水

送

下

顛

顛

詩

七

言

乳食不常飢飽起寒熱積脾氣上冲散成此症隨經  
重風熱相交未易攻治宜退熱疏風症泄青丸子

顛

神

功

顛

論

詩

七

言

瀉泄久 而氣血虛不能上冲 元氣虧 細脊尖黃為細  
末 雞蛋白 胡椒服即愈 藥用 參 苓 白朮 散服之 此症  
頃能除

滯願 詩 七言

脾胃虛寒 涎自流 不能收斂 漬願 藟 半朮 姜 陳 青 皮  
末 一歲 一丸 米飲 投

語遲 詩 七言

受胎母 即有驚邪 二氣乘心 舌未加 昔 衛 衽 神 參 遠  
志 麥 冬 蒲 歸 乳 香 砂 蜜 丸 粟 大 吞 二 十 薄 荷 湯 下

可見瘥

行遲詩七言

肝腎二經俱不足肝主筋腎主骨若要二經氣血  
充加味地黄能助補

龜胸詩五言

小兒龜胸症肺熱服于胸加殘葶藶丸服之有神功  
龜背詩五言

龜背為惡症風入骨髓內服枳壳丸灸法宜相繼

髮齒生遲詩七言

髮久不生，不黑，齒久不生，不齊，賢虛血弱成斯

症地黃丸子俱能治

解頤 四言句

解頤八物有熱加連以綿繫束香附白欬

鶴膝 四言句

小兒鶴膝此屬腎虛地黃加味服却无虞

諸瘡門

小兒初生遍身生虫瘡及泥水瘡風瘡皆胎毒也切

勿搽藥恐逼毒入腹且服胡麻丸

凡有誤用漆藥逼毒入腹以致腹脹者  
凡有頸面遍身生瘡非干漆藥忽然自平加痰喘者  
切不可解利當以連喬湯治之以上數症俱是胎  
毒不可用灸法

其有一歲以上生流水瘡者此血風瘡也胡麻丸  
痘瘡后生膿泡瘡者此痘風瘡以胡麻丸治之  
以上二症俱是風熱宜灸風池穴曲池穴血海穴  
足三里穴各灸三壯

連喬湯

鹿角 人參 川芎 黃連 生甘草 陳皮

白芍 木通 水煎入竹瀝服

小兒生癩毒腫癢者皆因氣血凝而熱乘之內服解毒湯外用貼藥如已潰者內服木桶湯外用紫金錠塗之

解毒湯

玄參 連翹 升麻 黃芩 赤芍 歸身

羌活 防風 生地 甘草 剉香陳 秘結者

加大黃 木通

八補湯

人參

黃芪

川芎

連翹

白芷

白茯苓

當歸

生地

白朮

甘草

赤芍

姜棗引

紫金錠

山慈姑

三兩

五倍子

三兩

大戟

兩半

續隨子

肉

一兩

射香

三

雄黃

硃砂

各四錢

為末

糯米糊

作錠

子

磨水

搽

貼藥

黃芩

黃連

黃柏

各二錢

大黃

蒲黃

各三錢

血結

乳香

各二分

沒藥

各二分

射香

少許

共為末

取生薑

自然

煎

服

汁和雞蛋清打勻調藥貼之

頸上生軟癰膿水不乾者用紫金錠搽之自愈用車  
方擦亦効

車方

用上好磁器不拘多少研為極細末雞子清調搽  
又方

大枳壳一個去穰令空磨令口平以麪糊塗抹枳  
壳四圍安貼于癰上自破膿血流尽先于一邊以  
灯草一根通之癰瘻便无痕迹

又方

用石灰篩過以雞子清和灰為丸入炭火燒煉通紅如此搥和三次依法煨煉取研細香油調敷頭上生核腫脹發熱者內服連喬丸外用五倍子為末淡米醋調敷一日二次易之効

連喬丸

連喬 桑白皮 白頭翁 牡丹皮 防風

黃柏 肉桂 豆豉 獨活 秦花 各五分

海標硝三分 為末煉蜜丸灯心湯下

西江月

小兒通身瘡疥虫窠膿血浸淫此由胎毒內藏深故  
有許多形症涼血故虫解毒胡麻丸子通神切防  
搽洗毒婦心腹痛神昏命危

若是要用搽藥瘡痒无過蛇來蠶虫作楚用雄黃痛  
腫喉水為當不痒頭加狗脊喜鹽湯火 硃黃斑猫  
同研熟由良手擦鼻間搽上

丹毒門

小兒赤遊丹毒雖有十種皆由心火內盛熱與血搏

或起于手足或發于頭而胸背遊移上下其熱如火  
火痛不可言亦如片砂故名丹毒自腹出四肢者  
易治自四肢入腹者難治癰此症者其法必先用  
表藥以解熱毒方可搽敷若遽用藥搽使氣无所  
泄而入于裏傷人者多矣

小兒丹毒一歲以下者易治未週歲者難治  
疔疔疔疔而危丹者此毒氣由內出外易治有先發  
丹而後發者此毒氣由外入內者多死不治  
一從頭項起者名飛灶丹

- 二從頭上起者名走炷丹
- 三從面上起者名魁火丹
- 四從背上起者名天火丹
- 五從兩手起者名天灶丹
- 六從兩脇起者名水丹
- 七從臍起者名胡芦丹
- 八從兩脚起者名野火丹
- 九從兩脚背起者名烟火丹
- 十從阴上起者名胡漏丹

飛丹 先用葱白水自然汁搽

走牡丹 紅腫痛 用赤小豆末雞子清調搽

鬼火丹 用伏龍脾雞子清調搽

天火丹 用桑白皮末羊脂調搽

天壯丹 用柳木燒灰水調搽

冰丹 用生鉄秀末猪脂調搽

胡芦丹 用煆即末米醋調搽

印火丹 用乳香末半膽調搽

細火丹 用猪槽下土清油調搽

胡漏丹 用屋漏處的土羊脂調搽

五淋上十種丹毒俱先服防風芥麻湯以解其毒次  
用熨針法以去其毒血如無熨針用砭針法然後  
用救急法

防風芥麻湯

防風 芥麻 山棧仁 甘草 麥冬

去荆芥穗

木通 葛根 滑石葉 芍藥 連翹 牛黃

便秘者加 大黃 水煎服

熨針法

用水烘軟條放于江腫處令吃出毒血立愈

砭針法

用磁瓦片打成尖鋒以快子夾疔北住連刺令出惡血

急救法

取灶心對鍋底焦土研末以新汲水調搽乾則之  
小兒丹毒脹脹氣喘悶亂不乳及驚搐者皆不可治  
小兒生后百日之內半歲以上忽兩眼胞紅暈微起  
面青黯色夜則煩哭或除如胭脂此因伏熱在內

發之于外初則滿面狀如水痘脚微紅而不壯出  
注休息无定次至頸項赤如丹砂名為驚丹以三  
鮮散治之

三鮮散

人參	防風	天麻	薄荷	茯苓	白附子
大黃	黃芩	羌活	金燭	枳殼	薄荷葉
粉草	赤芍	灯心			

小兒驚風后風從氣行血逆氣使毒氣蓄于皮膚流  
為腫毒多在腮頰耳根間成癰成疔謂之毒風宜

內服當歸百解散外用拂毒散敷之

當歸百解散

當歸 赤芍 大黃 川芎 升麻 蒲荷葉

乾葛 麻黃 黃芩 甘草 枳殼 皂角刺

葱姜引

拂毒散

半夏 貝母 大黃 朴硝 五倍子 各二

共為末淡醋調敷患處乾則易之

小兒或因跌撲刀斧破傷皮膚鼠狎侵襲傷處發此

謂之破傷風且內服脈風活血散外以紫金丹塗之

脈風活血散

當歸 生地 川芎 赤芍 荆芥 防風

甘草 紅花 蘇木 水煎服入酒少許

丙江月

小兒赤遊丹毒雖有十種原根皆由心火熱多溪上下遊移不定其色渾如丹石故稱丹毒之名治法方冊甚分明全在匠家体認

小兒流丹藥毒十種發出不同自上而下  
下至腎可憫半週之內休見滿週病此宜攻蝨針  
的之有神功內解外敷蒸用  
內解婦稍赤芍羌活荆芥防風升麻升草地黃通竹  
葉玄參煎用外用蠶元付貼更加寒水相同三朝  
五日急相攻驚搐靈丹如瘰  
治丹用功次第從頭一之鋪陳解表下毒藥先行次  
用蝨針吮進若是蝨針不便須更急用砭針然後  
金藥救孩身此法前人已免

捷法先須解毒或將利藥疏通初起塗敷莫胡攻毒  
入于裏過聖解毒無價散子防風升麻湯同利藥  
靈應有神功只在匠人善用

經驗治疔妙法而今說與后人先將靈應滌病身下  
后縛施塗潤田螺搗餅敷貼或用水調灶心艾  
南星大黃停芒硝研勻水浸

烘托衣與兒

火丹速成之

芒硝寒水石

青黛石羔奇

赤瘰因何起

胎中受熱多

斑疹癘疹門

小兒斑疹其掀腫于外者屬少陽相火也謂之斑紅  
點在皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹  
其症有陰陽輕重之別陽斑用托裏清熱化斑涼血  
此急治其標也陰疹用調中溫胃其疹自消此緩  
則治其本也大抵安裏之藥多發表之藥少首尾  
不可妄下四毒者或發于面部或發于背部或發  
于四肢極其稠密狀如錦紋紅赤者胃熱也紫黑

者胃爛也一則下之早其熱乘虛而入胃一則下  
之晚其胃熱不得發越當服消斑青黛飲明疹者  
或出胸背手足稀而小有此由失守之火聚于胸  
中上薰于肺傳于皮膚而成斑點如蚊蚋蚤虱所  
咬而非錦紋也宜服理中湯治之其火自降其斑  
自退矣

斑疹者自吐泄者慎勿亂治因其毒氣上下皆出宜  
調中氣若吐泄之後遍身發斑如錦紋者此熱即  
乘虛入胃其症多得于夏天化斑湯主之

消斑青黛飲

黃連 井草 石燕 知母 柴胡 山枝仁

玄參 升麻 生地 黃芩 人參 青黛

姜三片 豆豉二十粒引

調中湯

蒼朮 陳皮 砂仁 白芍炒 井草炙 薑青葉

桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼 川芎

姜三片引

化斑湯

人參 石膏 知母 甘草 水蘗粳米引

如斑紅者易治異者難治

小兒癰疹多屬于脾以共隱在皮膚之間發而多  
痒或不紅者併風與濕而成也加味羌活散治之  
或加減攻毒散亦効

加味羌活散

羌活 前胡 人參 桔梗 甘草 薄荷葉

枳壳 川芎 天麻 茯苓 鮮薑 薑三片引

加減攻毒散

下缺

羌活 枳活 前胡 柴胡 當歸 川芎

枳壳 桔梗 茯苓 人參 甘草 薄荷葉

防風 荆芥 蒼朮 芍藥 生地 姜棗引

續諸瘡驗方

小兒眉叢中生瘡，浸漚不乾者，名曰鍊銀瘡。用川山  
甲前膊上甲灸焦，為末入靛粉少許，清油調敷。  
凍耳成瘡者，內服防風通聖散，外用鉛粉以水搽細  
將艾絲爛焚成烏色，研末敷之。

防風通聖散

防風

川芎

羌活

獨活

大黃

山枝仁

赤芍

麻黃

去

連翹

石膏

黃芩

桔梗

滑石

荆芥

白朮

甘草

加乾葛

生薑引

身上生瘡如粟米大成塊成路極痛者此名龍蟬瘡  
用珍珠鳳尾草搗汁搽之又以渣調清油敷之効

文驗方

取糯米不拘多少浸漲搗漿淀粉搽之

治夫地瘡方

以韭菜地蚯蚓糞炒乾研極細蜜調搽