

種痘新書

五臟之位面圖



心印堂麗靈
 肝在肺腎兼
 耳齒關先見
 天庭陽子細



吉 凶 痘 位 之 圖



乾宮出方為吉
 坎宮出方定然凶
 艮宮報點三分數
 震宮出方報數勿
 巽宮見標實是險
 坤為逆痘治無功
 惟存身重慎個福
 順逆分明八卦

面痘之圖



凡痘圖面痘先出俱能閉毒初見急宜去之

兩額及眼上下先

出吉唇口兩旁出

吉完壽人中先出

最良天庭太陽承

漿先出兩腮之上

下二位水火交攻

之症先出必凶初

見以燈烙之可減

三分之痘

面部諸

一看天庭并太陽
四看喉吻定陰陽
二看唇口舌尖方
五看諸湯御氣色
三看梁上梁下穴
六看週圍八卦方
行細推尋依法斷
此痘縱變也無妨
神仙妙道自非常
二部痘瘡如慘暗
天庭太陽若明朗
十個孩兒九個亡
喉吻之中怕痘多
再加黑陷死來磨
飲食性喉難下嚥
七朝端的夢南柯
舌尖一穴統心經
痘瘡紫黑令人驚
再加舌有黑疔見
此見三日見圍君

論部位

痘瘡初出紅點先察部位可知吉凶蓋人之面部左額屬肝木

也。右額屬肺，金也。天庭屬心，火也。肉屬腎，水也。准頭屬脾，土也。正額者，大陽脈之所會。唇頰者，陽明脈之所經。兩耳後邊，少陽脈之所過。瘧為陽毒，故隨陽而先見之。于面也。但陽明者，胃血。大腸所經之地，故先于口鼻兩傍。人中上下，照耳元壽之間，先出者吉。若太陽者，水火交戰之處。少陽者，水火相併之衝。故其位而先見者凶。其起漿收脈，亦皆如是。至于頭，乃諸陽聚會之處。面為五臟精華之府。咽乃飲食之道路。喉為呼吸之要區。胸皆為心肺所居之地。此五處最宜稀疎，切嫌稠密。蓋頭顱多者，謂之蒙頭。喉頭多者，謂之鎖項。胸背多者，謂之脯胸。覆背是皆陰逆之症也。大世蒙頭，則視聽昏而形勢絕。頸項刺軟，則

而氣易衰。蒙胸覆背則臟易傷而神易失。所以皆爲難治。如兩頰兩頭亦要界地清而顆粒明。若成一片如塗硃者。此肝熱盛而尅脾。肺留毒而內壅。其後必來泄瀉而至喘嗽痰鳴。惟有四肢無得。雖多亦不爲凶。以上諸症若見治之之法。要清熱解毒。疏通榮衛。調和表裏。使血活氣行。而能宣毒化毒。庶無乾枯紫黑之虞。症之重者亦可輕矣。

辨放標不必拘部位

標者初見之點也。部位者臟腑各部之位也。天癰屬心地。魚屬腎。左額屬肝。右額屬肺。元毒屬于脾胃。右謂承漿見點乃腎經出痘爲不可治。天庭見點乃心經出痘亦凶。惟兩頰及腮準頭

見點最吉此其所以然者蓋痘毒原于相火發于命門理宜由相火以傳君火自君火再傳肝肺與脾毒之輕者其勢必緩循序而出猶源泉之水盈科後進必傳之肝肺始見點也故兩頰及鼻俱點者吉若毒之盛者一湧而出若決江河不用科次其毒一發故即見于腎位次即見于心經此其所以爲凶也然毒之盛者多在發熱一二日即出或一齊湧出若熱來和緩至三四日始報點點出又甚粗肥則雖報于坎離二宮亦無妨若報太速或隱于皮下瑣屑稠密或一片紅毡雖兩頰報點亦爲凶也

五臟見症治法

五臟者肝肺心腎與脾也。痘疹之毒發于五臟故五臟而皆見。症第取其尤者而治之。庶毒不鬱于其臟。其臟乃不傷耳。如肝症甚則用藥宜走肝經。肺症甚則制方宜平肺腑。其餘則兼理之。斯可矣。試舉各經而條陳之。

心屬火。火性上炎而為陽。故其位居于天庭。方歲之區痘出而天庭稠密則心經之毒盛無疑。法當清心而解毒。其來久連齋黃連硃砂不可不用。且心為藏神之舍。而謔語狂言搖頭驚搖皆是心家之症。然虛癰不同。久不可以概論。如初發之時多為夏熱屬實熱者其唇必紅其舌有苔。目多上視口必渴飲此火燥而神昏亂也。必宜清解為主。然心與小腸相連。

而清心必須利水小便通而心火自降矣故清心之劑又宜
加以車前木通也若瀉膿收腐之際或有狂譫驚悸此時定
是心虛治當補血寧心凡歸茸遠志在所必投况心爲生
血之源毒又附血而化治者宜觀痘色血熱則涼而清之血
衰則補而溫之又當審機觀變而治也然天庭是爲純陽
此處不可先收若滿而未盛而方廣先焦則火烈心灰此症
斷然莫救治之必致無功印堂若見黑點則胸前舌上定有
疔傷觀顯可知其隱又不可不詳也

腎屬水水性就下而爲陰故其位居於承漿地角乏地痘出而
唇下此明知其液精充足雖多亦可無虞地角若形焦缺則

其腎原將竭。以瘡何以成膿。再或兼之腰痛。則為腎敗無補。雖治亦為難救。然不忍袖手旁觀。法祇滋陰補血。方發之初。內服解毒養血之劑。喬務歸芎元枝。故仲為佳。更以川甲雄黃為引。外刮生雞。以敷腰痛。其亦或者能療。出齊其痘。不振用猪尾血。與人參。又加麝香少許。痘將有水。則純用內托補腎之藥。而不可以緩也。但承癘有黑點。陰中必有疔。此又不可不知也。若諸部未露。而地尚先收。則腎竭源枯。其死必矣。縱有良醫。奚能救乎。倘陰囊腫脹。則腎毒外洩。不至內攻。有生理也。見此且莫慌張。只宜力為托毒。收靨之後。再解膀胱之熱。以加味四苓散。加益芎芎其腫自退矣。

肝屬木而居左。左額是其位也。兩額紅而左額尤甚者則肝熱盛而可知。法當清肝化痰。且肝以藏血。血不榮活皆由毒鬱肝經。治此之法而鬆肝活血爲宜。故芍藥丹皮必用。而柴胡生地宜施。再加紅花紫草兼用紫花地丁。則兩額界地自明。至于痘生水泡皆因肝盛尅土。脾土不能制水。故使水不成膿。是削肝又爲承漿之妙用也。但肝來尅土。又有瀉青之症。故健脾方中加用白芍。則肝斂而泄自安。况肝木又生心火。木盛而火愈炎。故驚風顛癇雖出心經。必伐木而心火乃平。矧肝統筋膜而司眼目。或手足牽引目睛上吊皆是肝經風熱。治此又必平肝。至于立方之化裁。全在良醫之妙用。必見

其症乃設其方不可膠固而不通也

肺屬金而居右右顛是其位也兩顛多而右顛更密者則肺經
毒盛堪知但肺主皮毛毒雖盛而藏亦淺故兩顛雖密無
凶機其見症也多在咽疼咳嗽治之之法祇宜發肌解表理
氣寬胸而桔槔陳皮芩連荆防為可用必痘盡出而咳漸減
痘起脹而嗽已除則毒不留于肺自是可以無慮若治之不
早至起脹而嗽愈甚則毒疑于肺勢必不可成漿迨至轉為
聲啞則肺氣將絕其症亦云莫救是又不可忽也若寒戰亦
屬肺經虛是又宜詳辨六日以前寒戰其或執盛唇紅必是
肺經熱甚投以清金解表之藥其症可以立除七日以後寒

見五石麻

戰則肺寒。當補何疑。此際急施桂附。恐臆虛痘致顛危。必寒退而肺乃安。但肺宜清而不宜斂。斂則腠理不通。而毒何由宣化。故未脹之時。而五味。柯子。凡斂肺之藥。不可先嘗。若脹成之候。恐肺虛易中風寒。故炙芪諸品。須秘勝以固肺。開治法。權衡斟酌。清補須要。因時始不至有悞也。

脾屬土而居中。元壽是其位也。此間見點。首無一凶。但脾胃之衛之樞。氣血賴其滋養。百骸悉望分糧。脾土堅強。則毒不致陷。且易成漿。脾胃若敗。則五臟立虛。毒氣須臾伏陷。變症必下內攻。然痘毒方出之時。毒以胃管。雖吐亦非胃弱。即形寒亦屬胃。此際雖爲甘。而石。甘。甘草。恐敗胃。亦不敢。

常或泄瀉毒奔騰治以安脾利水兼解毒四苓散得其宜
如秘結脾燥雖酒製大黃微利然亦不可猛攻恐傷脾土之
元若瀉膿之候純以健脾為主但木能剋土慮肝盛或致損
脾故健脾又要平肝更念土雖剋水然水壅而上亦崩又宜
疏通水道水洩而脾乃寧故止泄又當利水只有升水之時
白朮惟山真用恐土燥而水不升將醫尤宜土旺補脾自見
良方前後治之得法用藥乃不差訛也

異痘類

夫痘有吉凶症有生死吉者生而凶者死理固然也必先識其
吉凶乃敢決其生死論症豈可差訛况有似吉而凶似凶而吉

者左不可不詳而辨之使學者庶不誤也

天根痘(生)

天根者諸痘不起惟天庭太陽起灌也蓋天庭乃諸陽之首此處若起則陽氣必旺將漸傳次而起十有九生陽氣爲痘根基天庭起者其根本固也故名天根而必生

天空癩(死)

天空者諸痘雖起天庭曉星不起也此必其陽氣已虧不能灌于陽會之處卽諸部起者必漸剝落而成空癩故天庭不起十有九凶其餘諸痘悉是虛花故曰天空

明創痘(生)

明明者諸痘不起而太陰太陽獨起也。蓋太陽太陰乃日月光華之地，二處灌漿則陰陽之血氣俱盛，故直達千日。月高懸之所，日後諸痘豈至燦暗而不升，故曰明明而生。

明蝕痘 (死)

明蝕者諸痘雖起，惟太陰太陽不起也。日月當明而不明，猶如天狗之蝕矣。此處不明則氣血兩虧，故不能充灌乎陰陽聚精之位。其後諸痘安能運化而無虞乎，故以死而論也。

海溢痘 (生)

海溢者諸痘不一而耳，後方圓一寸獨起也。蓋此處屬腎，名星宿海。此處升灌，故名海溢。海而充溢則腎經壯旺，精髓已足而

血不虧故可治。

海枯痘 死

海枯者諸痘俱起惟耳後方圓一寸不起也此處不起其腎已敗若不調元補腎後變唇裂齒崩之症則難救矣。

有根痘 生

有根者地角方圓其痘起脹明潤如珠者十有十生蓋腎部明潤腎水足也腎爲人之根本故曰有根。

無根痘 死

無根者諸痘雖好而地角之痘乾枯不灌及灰陷白陷者腎水絕也不治。

抱鼻痘

險

余遇是症未嘗不治

抱鼻者面部雖稀而鼻梁左右密如蚕種者名爲抱鼻此毒聚于脾胃故也其症甚險

單鎖口雙鎖口

危

鎖口者嘴角有黑痘一粒而猶大者名單鎖口兩嘴角俱有黑痘者名雙鎖口皆惡候也主不食而死見此須宜剔破令出血以拔疔散敷之或可救此毒凝于胃也

鎖項托頭

危

遍身俱稀惟頸項稠密絕無界地不分顆粒者名鎖項竟至于頤者名托頤主飲食不進聲啞而死蓋頸項爲陽道上升之要

樞要於此則陽不能升焉有不死。

猪頸瘰

瘰出而喉窩及頸窩甚多者名猪頸。必主喉痛咽爛不進飲食而死。急用 豆根 玄參 桔梗 甘草 生地 川芎 歸尾 木通 牛蒡煎服。緩則毒結于喉必難治也。

兩頭瘰

自胸以上自臍以下俱有而中間一截全無者名兩頭瘰。此氣血不能貫通于上下而腰臍之間恐為寒毒凝滯也。若不急治七日之後必變灰白之症矣。見時急用 生芪 當歸

赤芍 桔梗 防風 厚朴 續斷 白芷 山查 木通

入黃豆三十粒服此中間有痘乃可無虞

逆痘 生

上身絕少。下身絕多。或從下身先出。而汁漿收結。俱從下身先行。此雖出於常數之外。其實無妨。

鬼捏痘 死

通身全無點粒。各處一片紅青。形若打傷之狀。擬爲鬼所傷也。故名鬼捏。此症七八日內必死。何用施治。

鬼痘 險

手足胸背俱多。而頭面全無者。其痘如鬼不敢現于陽道也。故名鬼痘。又曰無頭痘。此氣血不能上升。故頭面絕無點粒。急于

五日之內提氣上行令頭而略見痘點乃可不然諸痘雖出亦難起脹行漿卽痘無虞其後亦主曲池生毒氣骨而死然四肢胸背俱稀者不在此例 治法宜用 升麻 川芎 白芷 防風 羌活 前胡 生芪 當歸 桔梗 甘草 笏尖生

賊痘 死

初出便如菜豆過一日大如黃豆再一日大如龍眼其大甚速者是賊痘也此痘根窠與頂全無血色形雖起脹而按之虛軟痘中有此是爲閉毒之寇故以賊名其後必上下失血而死又有一種於將熱之時或初熱一二日間卽于天庭太陽見標

數點大如赤豆。光亮好看。過一二日。卽收沒者。猶恐賊欲攻城。陷地。先命一二細作。探其虛實。故名賊標。此標既沒。隨卽大熱。攻作。遍身之痘。必如鋪種。蚕種。不可救療。甚可畏也。凡見此症。俱急用銀針。破去其惡血。以拔疔散敷其口。猶或可救。

蛇皮痘 死

頭面遍身俱無空地。狀若蛇皮。故以是名。必乾枯不能作漿。至十二三日而死。

昔余孫女出痘。如此發熱之時。寒戰咬牙。口氣臭甚。常如食物。余曰。此惡候也。急與解毒。用解毒湯。日進三四服。及痘出。密如蚕種。顆粒不明。乃用 前胡 川芎 丹皮 元核

紫草茸 人中黃 連喬 牛旁 紅花 黃芩 連進散

服乃分顆粒其後加生芪白芷去人中黃紫草紅花黃芩等藥其水漸升乃用參歸鹿茸湯加丁桂白芷白芍次加白朮其漿乃足漿起之候竟似蛇皮落癩之際成片連皮而去遍身如蛇退壳手足指間無一不落毛髮悉皆脫換其癩果蛇皮也善以治之亦竟安全可見不治之症亦須藥而不治也但症遇惡烈藥必猛攻而遷延觀望豈能救乎

藥思痘險

初標紅潤至八九日忽變陷伏此必其人氣血虛弱而毒又盛庸人見其初標明潤而玩忽不治當藥不藥故有此變以庸醫

審症未明。誤投藥餌。致有此變。皆爲患也。故名藥患。試觀此條。當顧名而思其義。慎勿潦草而治也。

九焦疽死

天庭地角右額左額耳後胸背手足九處皆有一二點黑陷焦枯者。名九焦也。此臟腑皆滯留內毒。將漸遍身焦黑而死。誠不可治之症也。

伏陰癰險危甚

痘不灌漿而瀉膿血。此毒氣陰伏于內而不升出于外。故名陰伏。十一日死。但痘方不振之際。七八日。注意用溫中內托。猶可救療。

空瘡痘 死然善治亦可救

痘雖肥滿內是乾枯全無血水乃空瘡也其痘硬者皆跌空瘡症至如是其必死矣此等之症其氣雖盛其血必虧或又以前失于解毒致毒火內熾其血愈涸漿汁乃血之所化血枯故是空瘡

一兒出痘甚多體性又弱醫人不明氣血之理只謂保元湯乃治痘至穩之劑人參用去數錢其痘竟無漿汁請余往視余曰此空瘡也汝試以針刺之別破之痘俱無血水其家大驚余曰無妨此氣有餘而血不足也人參可以不必乃用 川芎八分 炙芪八分 當歸身二錢 鹿茸二錢 白芍一錢 白芷八分 大生地三錢

牛角 八分 川甲 四分 肉桂 八分 連進二服 漿脚來矣 乃去牛子
而又以補血爲君 補氣爲臣 其漿乃足而愈

石白痘 一死

其痘四弦起而中落 雖明亮好看 內並無漿 以手摸之 其硬
如石形 若石白故名石白 此毒凝于表 血潤于中 不能運化 其
症必死 不可治也

菜莢痘 一險

其痘不甚起 脹四弦起而中略陷 痘有亂紋于頂上 形若菜莢
名菜莢痘 其後必空漿 倒陷而死 此毒盛而中氣又虛 故痘頂
有紋而不尖圓也

一兒出痘如此諸醫皆云難治請余往視見痘中問多有黑服
余曰此毒凝而氣不能升其毒將入臟腑急爲解毒行氣猶爲
可救蓋此時祇六日也乃用 川芎六分升麻六分生芪六分赤芍六分
牛子錢一分連翹一分黃芩五分黃連四分虫退三分白芷六分甘草三分外以楊
柳水洗之連服數服其痘漸圓淨紋與黑眼俱無其後以補氣
爲君補血爲臣治之竟愈余治此症甚多其死必須解毒有銀
葉莫紋乃可除也

痘險

蝨吮之浮而痘內生蛆故其痘痒甚用針挑去蛆虫自愈或用
柳條七寸鋪于牀上令兒睡臥其蛆自出此亦毒火留于皮膚

故有此症猶之腐草生螢之義也

血痘 死

初出血點其色紅紫七口之內斷其必死 又遍身如硃筆點者內根已腐外苗必萎無生理也

血泡痘 險

滿泡通紅其內是血故名血泡此血熱毒熾不能運化以成漿故有此症急宜涼血清毒為上用 生地 赤芍 紅花

紫草 丹皮 牛子 薺苳 白芷 弱者加入參 身熱加前胡

血廔痘又名珍珠痘 生而甚佳

痘出稀少四五日胖如黃豆七八日帶血而爛十日落痂如若
明珠故名珍珠痘此氣血充足而毒又稀故隨出隨結而不及
醱膿也此痘最佳百無一凶而且主貴

白漿痘

死

古以死論愚陋險也

初起發時瘡頭即有白漿其後必成灰白瘡塌而死蓋漿必由
脚而起乃為順症此毒奉陽分而陰血不能運化故不久而即
陷伏也但初起之際間有數點即刺去其漿旋有此者又刺之
時時瞻顧不可怠玩內服千金散大補氣血而乃可無虞若徧
身如此則難治矣

西園痘

死

其痘出後四圍又旋出小痘。此族本痘者乃四圍也。後必串成一痘而爲水泡不可治也。但此痘僅見于手足者則無妨。若遍身如此其死必矣。

漏痘 險 古人斷死

痘未成漿頂上有孔漏出汁水堆聚而結。形若癩頭俗呼漏瘡。此因表虛不能養漿故不傷而自潰也。急宜補氣健脾胃其肌肉乃可救也。若遍身俱潰則必死矣。須用人參、炙芪、當歸、官桂、川芎、白朮、白芷、炙草、丁香、淮山、加龍眼、蓮子同煎。

駐痘 險

痘有小孔如針嘴大似禹蛙之眼故名蛙痘此膜理不秘乃有是症若不急治大泄元氣必成灰陷而死須用人參 炙芪 當歸 炙草 桂心 丁香 加荔枝爲引必孔秘而痘乃起脹行漿也

瑠璃痘

又名隱血痘

險甚危

痘雖光亮全無血色明若瑠璃擦即破內俱清水而或出血總無膿漿此氣血不能運化毒氣而然也後必音啞而死痘若起脹見有此等急取其尤者而刺去其水再用雷漿散 人參 黃芪 當歸 鹿茸 白朮 淮山 山查 扁豆 白芷

炙草 加黃豆四十九粒

赤萍紫萍白萍

皆死

瘡出之後形若浮萍連片虛浮不分顆粒又無起脹之勢其色赤者各赤萍紫者各紫萍白者白萍余見此症十無一生不必施治

豆尾珠

生

遍身俱陷惟尻骨一圓飽滿潤澤其明如珠猶之豆尾露珠也故以是名蓋尻爲腎部此必腎強精髓充足急用內托之劑則遍身之痘旋復起矣

黑痘

死

痘毒隨血而出毒盛血熱之甚故其痘乃黑也此必死之症古

方雖有數條總以涼血解毒爲主始載于後以備參用

初見黑點在皮膚之間者用硃砂冰片生黃或用猪尾血
調入牙散好酒同服

初出點必黑者用紫葺茸二三錢好酒調服

又皮膚發青紫紗者用紫葺一錢紅花京芥防風牛子生芪分

甘草三分麻五木香三

又黑淚併黑睛者用蠅退五个紫葺茸一錢

又黑如煤炭血不紅活者用紫葺紅花生地牛子赤芍

又黑而軟者氣弱而血熱也用保元湯加紅花紫葺生地

又焦燥者用無比散十加紫葺生地紅花磨犀角

調服

氣血兩收痘

死

近看猶如小蓼花。遠望胭脂甚可誇。臨漿清水無膿汁。古聖名醫束手嗟。

復出痘

險

有等痘出甚佈。依然起漿收靨。究竟皮膚之內。有痘未出。厥後頤下發毒。而此皆元氣虛弱。不能送毒。故也。凡痘出稀者。須用搵子照之。若皮下隱隱有數。是痘未盡出。宜急用千金散。方九散。托出其痘。方可無虞。

雲翼子二十八般怪痘

丹雲繞頂

遍身痘俱好惟頭頂一片通紅也此虛火上炎故

耳宜滋陰降火通利小便則火瀉下行矣

紫雲貫頂

遍身痘好但頭頂一片焦紫陷伏者不治此毒凝

陽分陽氣莫升不久而皆陷伏也若不焦紫于帶不起者則非此症蓋頭爲純陽足爲純陰凡痘之起脹必下至于足而頭乃行漿收靨亦然

烏紗覆頂

頭上一片其痘皆黑逆皮膚俱有黑氣此元陽將

脫陽血已死救不治也

梨花漫頭

頭上一片俱白陷此元陽虛弱故也急用保元湯

加肉桂附子鹿茸川芎猶或可救

爛粟疔聲 遍身痘俱好惟臀及髓尾如粟之崇鼻爛癩者

此下元虛也宜大補湯以扶之

榴花遍野

諸痘俱好惟四肢紅紫而唇白如硃或硬裂者乃

脾肺二經甚也宜用赤芍生地紫草牛子石羔甘草桂枝與服可解

黑珠過體

遍身之痘盡皆枯黑四肢手足形若柴炭命在且

久不可用藥致入譏誚

楊花發枝

諸痘俱好惟手足灰白蓋手足屬脾胃是藥衛之

血氣虛也宜用人參鹿茸白朮黃芪丁香附子當歸肉桂桂

枝炙草

加煨薑引

見點辨症賦

痘初見點宜觀痘色榮枯一來便覺粗肥稀疎可必見點如暹
瑯屑稠密堪知帶熱敷瘡陸續出來雖稠密猶爲可救一齊湧
出縱稀疎未必全生細細白頭如麻子乾枯硬作內攻形啾啾
紅點如一粟焦萎定成憔悴勢肥粗蓬頂似佳苗而點子不紅
終白陷皮薄頭尖如美種葉莖紋起定空漿肌嫩則皮薄嬌紅
黃癩則痘成褐色入黑皮粗痘色必然慘暗是故嬰兒之肌肉
不同不可一例而斷古症只要綻突有神不喜煩紅內症乾燥色潤身清
見點如珠如粟毛焦皮燥敷瘡或紫或焦雖然帶熱而出亦恐
密似針頭縱是陸續出來尤忌形如蚕種如麩麥壳也如盾如疹

如疥癩集不立脚地全無。犯此數端皆云莫救。點出如同蚊咬。惡烈勝似蛇傷。一片紅若鋪毡。神醫也言不治。况或輕重。此症孰是能醫未熟。先敷數點。俗名報痘。若還孰久不敷。此症便作疔看。先發塊而後敷。瘡塊名痘母。而必生先發瘡。而後發塊。塊名鬼種。而難痊。避痘避于隱僻。眼胞候內定多凶。悶痘悶于要處。胸心舌喉皆不吉。順不畏多。逆嫌一點。冷疔先現。諸痘安敢張形。賊痘若生。諸痘豈能灌汁。辨症若得真詳。急宜剔破。與灯燒。是以重症未平。痘雖出而毒猶在內。透肌發散。尤加解毒。為良便。調人靜身。雖熱而毒已在表。補液發散。仍以安表為先。設使內外症平。此候不須過治。再觀男婦。審詳清補何如。

見點認痘法

夫痘與蚊蚤所傷自異亦與痲丹瘡疥不同蓋蚊蚤所傷雖有紅點其紅必散摸之而不得手痲丹乃浮游之火亦不得手瘡疥乃肌肉之毒雖或碍手而皮必濇惟痘毒從骨體而出又係精血所運故方出之時摸之自然碍手而且潤滑此痘所以異于凡瘡也

見點三日調治法

見點用藥與初發略同但初發之藥左發竅而兼解毒見點之藥宜解毒而佐升提凡補滯辛熱之品此時猶不敢妄投故肉桂附子丁香于薑芩藜芎藭草鹿茸鹿血白朮茯苓佳山東仁遠

智然地黃香砂仁豆蔻柯丁五味一切滋滯之藥此際切宜
之卽用黃芪甘草亦用生而不用炙。芍藥用赤而不用白。地黃
用生而不用熟。恐其滯毒氣而助毒火以貽禍于其後也。

見點要合常期

夫人之一身皆統于五臟。故骨髓屬腎。筋脈屬肝。心主血脈而
肺主皮毛。脾主肌肉。而又司乎手足。蓋痘乃先天之火。其
毒發于命門。當命門毒出而始發熱。一日透于筋骸。二日出于
血脈。三日傳于肌肉。四日乃至皮毛。至于皮毛方見點也。故四
日而始見標者吉。若一日見點者甚凶。二日見點者亦凶。三日
見點者次之。古人謂一二日出痘者爲火裏苗。不治以毒火方

熾之時而苟卽見是不應出而出者皆爲不應之症也雖然不應出而其症固重若應出而不出其症亦不輕此時急宜詳審慎勿袖手旁觀倘不急治則點子不見毒在內攻須臾告變不可救矣嗟夫自古方書皆詳于已出之後畧于未出之前深言出而稠密之危不言留中不出之禍不知已出之毒外寇也未出之毒內寇也速出而稠密者外攻也留中而不出者內攻也內寇與外寇孰烈內攻與外攻孰甚故痘已出而死者必在旬日之外未出而死者必在六日之中此余所以長顧深慮諄諄爲天下警也凡小兒發熱三四日而未見點者急用燃子照之其痘隱于皮膚之間者歷歷可指辨其虛實寒熱而速治之

麻不致毒在內攻而速死也

若皮下點子紅紫其人唇紅舌苔臍下腹痛煩悶咬牙目赤口
臭者是毒氣壅盛滯于氣道不能出也急用 升麻 防風

川芎 虫退 牛子 連翹 黃芩 黃連 貝壳 麥冬

桔梗 陳皮 紫草 甘草 山查 川甲 前胡

若皮下之點不甚紫而其人聲重鼻塞咳嗽惡風迷悶不醒膚
起雞皮者是爲風邪所閉腠理不通故不能出也然此二症必
以前尖于表解身無微汗故有此症若爲風寒閉而不出者仍
用前方加紫蘇去荅運弱者加生芪用薑葱引熱服後以被
蓋片時令有微汗痘卽見矣再用推拿法以鬆其肌表而痘

目出矣

若皮下之點不甚紅潤，唇淡倦臥，二便清利，手足冰冷，目閉無魂者，是元氣虛弱，不能送毒，故不出也。急用補中益氣湯。

人參 當歸 生芪 白朮 升麻 柴胡 陳皮 甘草

若無人參，須加官桂 鹿茸

大抵痘之所以不出者，惟此三者。詳審而善治之，自無有不
出也。

見點順症

熱至四日于耳目口腮元壽之處，先見數點者，吉。或兩額起點者，亦吉。或面部未見而手足先見者，尤吉。此標從肝肺脾經。

來也。惟手足元壽見者是脾經發痘。必至稀少。乃無一凶。而頤來者是肝肺二經發痘。雖多寡不同。究皆可治。是以俱爲順症也。

報點之痘。肥大皮粗。堅硬碍手者。吉。此元氣旺而毒氣少也。必主其痘稀疎。始終無事。

痘作三四次。出到五日後。手足方纔出齊。頭面胸背以及頸項俱稀疎者。吉。蓋面爲五臟之府。頭乃諸陽所聚。兩處若稀。則五臟不留毒氣。諸陽悉得上升。且頸疎。則扼要之區。不截胸背。不密則週身之血。皆榮各處。稀疎所以云吉。縱四肢稠密。亦自無妨。

痘出遍身稀疏者上吉蓋痘少則毒稀其血氣必能運也故痘少之症百無一危。

痘初出卽有起發之勢日漸起脹頭項圓淨皮又粗老堅硬結實摸之碍手此元氣充足故然也此等終無變症。

痘初出卽紅活潤澤光明可愛摸之潤滑脈有紅暈而不散漫痘與肉色紅白分明者佳此榮血週充必能化毒起脹灌漿悉可無虞。

痘見點後潮熱漸減雜症漸退飲食漸進吐瀉皆止至五六日上痘齊熱退雜症全無飲食如常精神清爽者吉蓋毒盡出干肌膚而不少留于臟腑也又安有他虞乎。

以上數條俱爲順症。凡如此者。固喜出眉端。然亦要緊。風寒
節飲。食避。脈穢。憤起。居軍酒。不可多與。藥俱不可妄投。蓋痘
毒雖出肌膚。而臟熱未嘗盡退。氣血爲攻。毒氣陰陽未免不
寧。更慮毒臨肌肉。表裏皆虛。此際若或不慎。而風寒穢氣所
衝。毒反倒。艾內向。若或妄施藥餌。又恐另生他症。以致輕變
重。而順變逆者。深爲可太息也。余故不憚。至再至三。而叮囑
之。

一兒以痘身熱已退。痘又稀疎。起居飲食已如無事之時。人人
皆曰此順症也。不必服藥。余亦曰然。忽爲風寒穢氣所冲。身
復大熱。結胸咳嗽。至子失聲。余以 升麻 前胡 陳皮

卷之五
三

桔梗 炒琴 連翹 防風 川甲 川芎 甘草 諸藥

與脈此時已七日矣連服二劑至八日遍身復出痘甚稠密

余將前痘置而不理只以後痘為主但理肺升提又用陳皮

桔梗 牛子 川芎 前胡 川甲 紫草 白芍 山查

甘草 與服其後痘升漿行乃其嗽漸止其聲漸開而愈此

亦可為不慎者鑒也

一痘出潮熱方退不可驟投辛熱蓋火煽雖息而餘燼猶存一

遇燥烈其火復炎煩燥狂謔之症不旋踵而至矣

一後生出痘至五日上醫人見其熱退快投桂附其人遂發狂

謔口鼻出血夜半請余往視聞其房中狂叫寔甚余取冷冰

一痘進房卽噴其面其狂略定方得細觀見痘雖淡紅而顆粒明朗知爲服熱所致乃以川連麥冬生地黃芩加百草霜磨犀角調定心散與服卽愈。

一見點之後毒之輕者其熱卽退毒稍重者熱略緩而不退也必至五六日上出齊其熱方退其痘若好雖熱無妨不可妄用寒涼以退其熱恐後難于起脹也。

一痘方出三四日上手足冷者不要驚慌蓋陽氣上達以逆毒未及下行于足也必五六日上痘將出齊乃溫耳。

一痘未出齊其兒不食此是胃中有熱故不食也不可認爲胃弱而投煖胃之藥滯其毒氣貽後日之患也。

見點險症

痘既見點。吉凶攸分。當知其吉。宜識其凶。火垂前來。痘方出而苗已槁。一齊湧出。毒甚猛。其勢難療。至于天庭地角。乃水火交攻之所。此處不宜先見。鎖口攔門。爲飲食呼吸之關。有痘即宜剔去。曉星報點。非爲吉賊。疔疔現。總皆凶鎖。項象頭毒。暴陽而截。要眇胸脅。着痘逼臟。以多慮。若夫點來沉隱。是毒多而氣難送。痘色慘暗。是毒壅而血不榮。界地不分。是熱血散漫于皮膚。不得附根。而領毒治。此須當涼血。一片紅毡。是惡毒積。肆于肌肉。不能出外。以成瘡。遇此斷乎不治。如見黑癍青點。榮血知其已死。初出白頭。不振氣血。知其將亡。此等皆爲逆症。點來即

預知其肥粗而起。愛其潤滑而粗顆。粒分明。終爲吉兆。稀疎佈點百無一。因是以痘方見點。可決死生。豈待變症將危而始知其壽夭乎。

一諸痘未出。獨于印堂先見一顆者。名曉星。報點此痘。能閉諸毒。急宜以燈烙之。但小兒畏燈。必然躲閃。須用銅錢一個。印于痘上。令痘從錢眼暴出。然後烙之。乃不差謬。

又承漿廣額。先見數點者。此心腎二經之苗。必凶。又恐爲賊標之賊標。俱速以燈烙之。或用銀針剔破。吹去惡血。旋用拔疔散。方見九散篇。敷之亦可。此標一除。能滅無許之疔。

一嘴角有痘。曰鎖口鼻孔邊痘。曰欄門。二者皆爲凶痘。喉嚨之

痘主咽痛心窩之痘主煩悶凡耳後窩中頸項窩間有痘皆不吉或痘出不拘何處有獨大異常者非賊痘卽痘疔也能閉通身痘毒俱速宜去之

一兒出痘稀疎潮熱亦退余見天庭有痘二顆其大異常余曰此宜去之其家不信余言至次晚復來請余謂其兒潮熱復作煩燥驚譫痘皆變色余往剔去其痘以藥敷之熱退入安痘遂起脹勿謂此爲無善也

至四日上痘一見點則毒氣將達皮膚此時熱且漸退諸症亦當漸平若熱不少減宜用清解丸次服散花丸

方見丸散篇

倘猶大熱煩渴悶亂不安或點來瑣屑者其毒必重其痘必

多急進水藥一日須二三服以解毒湯為主方見初論此際速爲解毒痘或可減若怠忽視之則鋪也垂種些集結之弊至矣蓋四五日內正宜解毒若宜清不清遲延數日痘成焦紫而不敢用涼悔之作何及乎

至五日上頭面胸背俱宜出矣至此猶隱于皮膚之內欲出而不出者謂之不快然痘出不快亦有數等或爲風寒所闕或爲熱毒所壅或因元氣不足前已明辨其症而立其方矣又有爲穢氣所冲而功氣退縮痘出不快者其症必痒急宜內服平和湯以托毒解穢外以紅棗沉檀乳香燒桐葉之即穢解而痘毒出矣古方用蘇朮全燒余謂痘貴潤澤而蘇朮去

濕以此藥之恐致于燥之弊。余故辨此以戒之。瘡以香而惡臭。香清淨而惡污濁。一過厭穢。則毒退。穢亂于肌肉之間。後雖托出。亦輕。症變重。痘稀變多。余臨是症。往往然也。可不慎乎。

平和湯

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍各四分 防風 白芷 官桂

桔梗 沉香 乳香 檀香 藿香 生薑引

右方參芪歸芍補氣活血。以托毒。諸香解穢透肌。以達毒。除厥之藥。莫此爲妙。

一。復月天炎暑氣所逼。痘出不快。以致煩渴者。用人參 白芍 防風

或用五苓散 或神砂益元散用香薷煎水調服暑退而
自出 凡小兒出痘之時痘毒達于皮膚宜熱氣透洩不可
包裹大甚鬱其熱氣余嘗見恒仰臥者其背必多頸時靠母
之腕者其項必密此皆氣血不行則毒必壅熱氣攤洩則症
必多之明驗也况覆蓋既秘則內熱蒸而外莫洩或致鼓動
浮游之火而有夾丹夾癰之虞是又不可不知也

人參白虎湯

本方去人參卽白虎湯

人參

五分

石羔

四錢

知母

五分

炙甘草

三分

粳米

一撮

五苓散

分陰陽利水道止
熱瀉之良方也

白朮

赤苓

猪苓

澤瀉

官桂

木通

加干葛

生薑引

神砂益元散

硝石飛過甘草一兩神砂五錢余加車前木通牛子

凡治傷暑總宜利水蓋暑不可發亦不可下當從小便解瀉也

有因嚴寒冷氣所侵以致肌表不溫而痘出不快者其必皮膚粟起時作戰吟用陳氏木香散或用五積散或麻黃桂枝湯主之

陳氏木香散共爲末量見大小與之

木香 腹皮淨洗赤苓 前胡 青皮 法夏 丁香 柯朮

炙草各一錢肉桂一錢五分加紫蘇二錢

五積散

川芎 當歸 白芍 茯苓 人參 陳皮 蒼朮 厚朴
炙草 半夏 白芷 桔梗 加乾薑 肉桂 麻黃

麻黃桂枝湯

麻黃 桂枝 乾薑 炙草

或因以前勞力傷神以致元氣虛弱而出不快者宜用補中益氣湯加官桂與之

或因初出時吐瀉過甚以致脾胃虛弱而出不快者宜用理中湯若瀉未止加茯苓豆蔻椰子

人參 白朮 炙草 乾薑 加官桂

或因前有房勞以致腎虧而出不快者多有腰酸腹痛宜用

人參 生芪 當歸 川芎 元支 白芍 杜仲 故紙

續斷 枸杞 肉桂 炙草 或煩渴者加麥冬連翹

或痘正出時忽然中風眼目直視牙關緊閉者不可用驅風按

藥急以薑附湯濃煎灌下令出微汗即愈附子

或又熱症又形虛症又見是元氣不虛而毒氣猛烈而痘出不

快者解毒既恐傷元扶元又恐助熱此涼熱俱忌之症最難

措手必用頂方剖雞敷臍以托之其痘自出余遇此症屢用

是方百無不效

至五六日痘當出齊凡看痘齊與否必以腳心為驗脚心有痘

則由毒氣然痘稀少亦不拘此總以熱退而痘為出齊也

熱極難離四肢有痘終恐未齊不可謂毒輕痘少而讓不
意也

一兒痘出疎甚四肢俱有所出之痘。又皆起脹。但熱不退。人漸
浮腫。時至八日。其熱與脹愈甚。乃請余往視。以燈照之。皮下
又無點粒。余思痘稀則無熱。熱則毒留于中。余乃以內托之
劑與服。其熱稍輕。連進二三服。然後復出其痘甚稠。及痘出
齊而熱退。人安。

又一兒痘齊熱退。但人不寧靜。不肯眠于床上。必向地上。揭衣
覆睡。晝夜如此。余思此必火伏中州。其腹中熱。故必欲覆于
地也。余用頂方。仍引雞敷臍。復托出痘一層。其兒乃安。

又一兒痘出一半忽不能言語手足冰冷目閉無魂面青唇白氣息俱涼余曰此厥陰症也一時無參且不能進藥仍用頂方以雞敷臍之法連換四雞其痘乃齊其人方愈

又一兒痘出甚稀潮熱亦退但其體性怯弱余見週身之痘未上百顆此毒輕痘少何足介意且其家又貧遂未用補至十日上其痘將屬忽然咬牙寒戰乃用桂附理中湯連進二三服其空地忽出小痘然時日已緩不能成漿後手足心胸俱發癩毒反用去人參二三錢其兒又受餘毒之痛楚皆忽而失補之過也可不慎乎

矣。痘毒之極重，氣血之虛實，要皆畢著于痘瘡。此由外可觀。內也。痘既出見，急宜觀痘之形，察痘之色。辨症立方，速與調治。預為起脹之計也。

痘色慘暗不明者，是邪火壅于肌肉之間，而血不榮活也。宜用

加味升麻湯

宜入中黃亦日草更妙

升麻 防風 牛蒡 連翹 赤芍 川芎 當歸 紅花

紫草 甘草 天庭暗加麥冬黃連 兩額暗加丹皮黃芩

發熱一二日即見標者，曰火裏蒸。若不急退其熱，則苗稿矣。急

清地退火湯

地骨皮 錢地膚子 牛蒡 柴胡 紫草 干葛 連翹

赤芍

紅花各六分

木通一分

虫退二分

次服去乾葛

一方用秦艽以酒洗淨然後煎水與服

痘出大熱不退一切紅紫乾枯界地不分者皆毒壅血熱所致若不治必忽然焦備八九日間必腹脹氣喘瘡塌而死故見此症即宜清毒活血以涼血解毒湯或大成散治之

涼血解毒湯

紫草

生地八分

赤芍七分

紅花四分

防風三分

荆芥三分

黃連三分

生芍

前胡

木通五分

人中黃四分

天麻三分

丹皮八分

川芎三分

右方以生薑糯米引弱者加生芪人參

大凡毒盛血熱之症不敢用當歸鹿茸蘇合劑印成

大成

川用

酒炒

甘草

錢三

雄黃

硃砂

各二錢

麝香

仁共爲末

右方最能攻毒出膿。膿若痘出不快，與此則不起。胡說不是。

者用此立効。

怯弱者人參煎水調服。

狂者薄荷燈心

車前米通煎水調服。

痘紅紫不起者，紫草紅花赤芍人中

黃煎水調服。

有虛寒泄瀉不敢用。

痘或一齊湧出，大熱煩悶，稠密難數，痘反形焦而色此，此皆熱

毒猛烈，而氣血凝滯，不能拘攝毒氣外出，以成膿。

石不忌

治將變紫黑一陷，決死于十二日間，甚則斃于十日之內。一

見此症速宜活血調元透肌解毒，宜用。

調元化毒湯

若無人中黃用甘草

生芪

錢一人參五分

當歸各八分

牛蒡

連翹

錢一黃芩

黃連

五分俱炒各防風

荆芥

各三分

桔槓

木通

各五分

前胡各八分紫蘇

生地

各七分

紅花

人中黃

各三分

虫退

各三分

山查

錢一

右方以參芪補氣歸牙紅地活血喬芩連解毒防荆歸桔

疏風達表最爲穩妥。有嗽加陳皮花粉。實熱或四五日

內去參芪芩連亦當略減。六七日來恐防荆散氣亦宜少減

或去之血熱者去當歸全要因時因症善於加減莫執成方

瘧出稠密于柴不起身熱氣机而譫亂驚搦時點額搐頭手足

味則以此熱毒帶于肝肺故用木動而生風心火炎而驚

此藥能驅風濕。就透攻內。腫之邪。當用。

偽金丸

疆卷

酒洗

全蝎

尾去

甘草

糸草

白附

麻黃

各五錢

川田

一分

五分

蟬退

二袋

加木通

桔梗

柴胡

石膏

白芍

犀角

各二錢

五分

五分

五分

共爲末。另將紫草紅花各一兩。以好酒一碗。慢火熬煎。酒至半碗。乃去渣。將酒入蜜。共熬成膏。滴水成珠。爲度。和前藥作丸。如龍眼大。硃砂爲衣。量見大小。與之。

痘雖見。熱其毒。移中壯熱。煩渴。唇口硬裂。而痘紫黑不起者。此

山毒留脾胃。治當內解脾胃之鬱。外清肌肉之邪。宜用

防風 白芷 紫草 甘草 紅花 生地 虫退 木通

川芎 赤芍等藥煎水調下小無比散治之

小無比散

滑石六兩 石膏一兩 甘草五錢 寒水石五錢 鬱金五錢 甘草水煎過 南透焙干

右為細末量兒與服熱甚者加犀角磨水和前湯藥調此散

服 黑陷不起者加川甲二分麝香五厘紫草煎湯調下

痘初出有如雲霞突起紅丹遍佈者此浮游之火散漫于肌膚

之間以邪而亂正治當涼血解肌以退邪火須用

玄參升麻湯

玄參 升麻 甘草 加紅花 紫草 黃芩 荆芥

又痘初起黑外白者是毒凝于裏也宜早服此湯

三黃湯

黃連 黃芩 炒支 加紅花 柴草 人中黃 川山甲
人參

又痘有內白外黑者是毒滯于表也當解肌毒而活血

升麻湯

升麻 連翹 黃芩 乾葛 加紅花 紫草 赤芍

凡痘初出雖貴紅活然其紅也亦要明潤而鮮若紅而兼紫與黑者皆毒氣凝于血分以致痘癢紫黑而成焦枯也總宜涼血解毒為主失此不治必成黑陷速用涼血化毒湯

涼血化毒湯

歸尾 赤芍 生地 木通 連翹 牛子 紅花 紫羅

山豆根

人人數服追
為未調服

痘出頂上有栗莢絃者是毒凝而氣滯也。色不甚紅者用調元化毒至之色紅甚者用涼血化毒湯。加川芎。由退防風。若不急治。後必成空瘡之痘。而死於十三日矣。

以上俱毒盛血熱之症。固宜清毒涼血。一用辛熱必轉寒。臨惟清涼之劑。乃對症也。然熱亦不可盡退。毒亦不可過清。若痘轉紅。病人稍安靜。即宜此清涼。而漸進溫補。以為成漿之地也。若過用寒涼。恐寒熱變為虛寒。又更為可憂矣。一見出痘稠密。其發素。醫術知宜解毒。遂以芩連枝栝。咳為清解。

其謬愈甚而狂亂矣請余往視余見痘色淡而不紫其又不甚熱知爲內虛之症心血不能養神故如是之狂亂也雖僅五日亦當用補乃用人參黃芪炙草當歸棗仁硃砂入猪心血與服狂譫卽定又見其大便紅赤余曰此熱毒淫于腸胃也遂以人中黃牛子慈菴一服卽愈此亦過用清涼所致也學者切宜鑒之若五六日上見其便秘或黃而妄用下藥痘卽陷伏致不可救者又屢見也可不慎乎

一見點虛寒諸症

凡痘出而熱不退痘頂不起根窠欠紅若隱若見出而復沒者兼之唇淡面青雙眸不炯聲氣不雄此氣血兩虧不能蒸發

其毒也若不急治則毒陷內攻甚則歿於六日之內否則八
九日間必變灰白痒場而死矣一見此等宜速用千金內托
散以托毒出外而後乃能起脹

千金內托散

人參五分

六日前
生用

當歸

各一錢

白芍

炒六分

川芎

四分

官桂

炙草

各三分

山柰

木香

厚朴

防風

白芷

桔梗

各三分

薑棗

引

又痘出雖稀其痘與肉色無異而根窠絕無紅暈者此血虛而
氣亦不甚振也宜用人參黃芪當歸鹿茸川芎白芍

又方用保元湯

人參

黃芪

加當歸

川芎

紫草

紅花

肉桂

防風

初出之時痘雖不紅而相肥起頂者是氣至而血未至也又不可一槩以血虛而論至起脹時其腳自紅

又有痘出身涼不思飲食痘色灰白吐乳瀉情手足厥冷腹或服痛者此純陰之症最為危險速用起死回生丹或異攻散救之

起死回生丹

丁香十粒 干薑一錢 水煎熱服。被蓋片時令脾胃溫暖陰退陽回痘自紅活矣若吐瀉不止再用

異攻散

人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮 半夏 厚朴 木香

丁香 肉蔻 柯肉 官桂 炙草 加薑棗引

右方調陰陽救表裏治虛寒吐瀉灰白不起但非虛極不可
輕用

凡痘初出形貴蒼實而厚勢宜起脹而堅若皮薄而不蒼厚瘡
軟而體不堅此皆毒在氣分或氣虛而不振也不急治之則
必變爲灰白塌陷而或爲一包清水致潰爛不痂而死矣必
于初出之時速以固陽散火湯治之

固陽散火湯

人參 黃芪 當歸 白朮 升麻 防風 連翹 木通

甘草

右方以參芪白朮補氣升防連喬入氣分疎通而解毒故氣旺不滯而毒得宣也。

以上諸症俱是虛寒然痘色白者亦非可以概例或有執寒鬱結於中使氣血不能舒暢而痘色亦起眈白者必解毒活血其痘乃紅不然三日後漸變紫色而轉焦枯矣然此實熱似虛者痘色雖白其人唇紅舌苔煩悶不寧宜以調元化毒湯治之方見前若虛症既形而痘又白則必以補為主

凡痘初出卽有起發之勢者是氣血不虧而不滯也雖毒盛稠密亦可以治只怕隱伏在皮膚之間摸不碍手則毒盛元氣是難療矣

大凡看痘須看面部蓋面爲五臟精華所著面上之痘若好則臟氣充實毋不內留雖遍身稠密不起亦可以治。

大凡痘至五六日上痘已出齊必要退熱若熱不退是可憂也蓋毒猶在內而未盡出于肌膚也若增大熱更可憂是毒中留將爲內攻其痘必爲焦枯也。

痘出點來稠密其天庭地角雖然明朗而兩顙甚秘一片丹紅不分界地此毒在肝肺二經是爲逆症若不急治斯咳嗽失聲痒塌死矣已未年建邑最多此症余用前胡赤芍紫草茸生地丹皮牛子連喬川芎黃芩茵蘆木通甘草外用水柳草煎水屢拭其面其痘立卽轉色後普邑得外洗之法此

內外交攻之義也。又或以胭脂米醋水搽干痘上亦能解毒活血。但更難于辨色耳。此皆屢試屢驗之方。不可忽而不用也。

見點雜症

痘毒方發之初。凡風寒暑濕俱先毒氣而出。故發熱之初。雜症甚多。若痘出齊。則餘邪盡退。雜症固當除矣。然亦或有未除者。非餘邪爲亂。是痘毒爲殃也。治者當以治痘爲主。痘若起脹。諸症又烏有子。故一切雜症。俱詳于發熱之篇。而是篇祇數條耳。驚搐謔語。見點之後。亦常有之。此皆痘未出齊。熱毒內壅所致也。痘若出齊。其症乃定。仍用鎮驚丸與定心散治之。古謂先

痘後驚爲凶者蓋以出齊後驚言也

腹痛前已辨明。但有痛而發厥其痘出不快者用蟬退去翅足爲末每服一錢痘出自定。有煩燥叫痛者用芍藥防風湯。白芍 陳皮 升麻 防風 桔梗 川芎 枳實 厚朴 牛子 有大便秘結而痛者用大黃化毒湯 白芍 二錢

厚朴 一錢 五分 陳皮 七分 大黃 一錢

嘔吐泄瀉最傷脾胃。脾胃一虛必難起脹。此際急宜詳辨虛實而調治之。其方已詳初熱篇。

夾痧丹疹癰 正痘方出之時有夾痧夾丹夾疹夾癰而出者不可不辨。辨則點稍大而不紅。此皮膚素受風寒也。宜用立

參朮麻湯治之宜以玄參爲君藥

方見前

四則其點甚紅

而小粒粒佈若丹砂此乃皮膚入毒也治當以解毒湯加玄參爲君 疹卽麻也其毒發於六腑亦宜清毒活血其法詳後麻症卷但麻痘齊出宜先治麻蓋麻毒屬陽其火更烈速宜升提清解先祛麻毒以治其標然後乃扶痘以行漿收靨况麻症易干收成痘前又宜解毒七日以前善干解毒則二症並行亦不戾也 癩則紅點隱于皮膚之間而不現耳

以上四者俱是浮游之火散于皮膚總以清解丸多加玄參一二服卽立退矣彼世愚夫愚婦不知此症疑皆是痘相類驚慌醫者誰識此症不肯明言其故反謂其有刪痘之方以

聳一時之庸愚余深惡之故詳辨焉

灰水痘。水痘者亦在胎中其母飲食之毒或成胎而再交之火也其毒不藏臟腑所以不致傷生依然潮熱起水其形與痘無異但不灌膿亦無甚痂疵而易收結正痘未出或水痘先出或水痘與正痘並出者但水痘易干起水正痘必如其期有分辨耳正痘若好見有此等不必過慮特行家遇此則謂吾能去惡痘而復出好痘甚可惡也

疥痘。痘中有紫黑乾硬暴脹獨大脚無紅暈者卽疔也痘疔能閉諸毒未齊有疔則諸痘不能出現既齊有疔則諸痘不能起辰行變時有疔則諸痘必致倒陷其爲禍也豈勝言

哉。故初出之時，見有紫黑獨大之點，恐其成疔，卽宜以銀針刺破，吸盡黑血，然後以拔疔散方見丸散篇敷其瘡口。次日

復看，若再硬脹，仍然刺破，以前藥敷之，必轉紅活，方可已也。若針挑不動，手捻有核，則成疔矣。須用針從四邊剝開，以小鉗鉗出，其形如疔，有半寸許長，拔去其疔，仍以前藥敷滿瘡口，乃可無虞。又手足四肢有痘，慘暗堅硬而甚痛，或外無痘而內有核，作痛者，亦痘疔也。宜以艾火灸之，卽愈。或以燈火烙之，亦效。若不急治，則其疔深陷，穿筋透髓而爛，見骨甚可畏也。又天庭有黑點，心窩舌上必有疔，地角有黑點，陰囊必有疔，兩額有黑點，兩腋必有疔，準頭有黑點，四肢必有

疔此觀顯可知其隱又不可不詳也。又治疔法用巴豆一
个去皮硃砂一分研爛點入一時即愈。

婦人出痘稀疎明潤似為順症但熱不退已而明潤者漸覺
慘暗其人亦煩悶不寧矣余詳觀面部見地角一痘紫黑將
焦乃命其夫察其陰中有痘疔否未幾其夫出曰陰戶之上
果有黑痘一顆其形甚大余曰是疔也仍教其夫用銀針剔
破鉗出痘疔以板疔散敷之其熱遂退諸痘悉皆潤澤起脹
而即愈矣凡遇是症不可忽也。

一兒出痘至六日上巖症請余往視余造其廬則言已徹察觀
其痘稀朗而起乃自思曰此非死症胡為致死又曰諸痘根

脚猶紅心口微溫余曰此兒未死須解衣視之見心窩中有
一疔余遂與之刺鉗拔去其疔將獨參湯漸口灌下不一時
遂回陽而愈古謂逆痘點遂致殺人者是痘疔也

一痘初出三五成群聚成一簇者俗謂梅花痘其後必連串一
個不能成漿而爲水泡凡見此症惟四肢有者則亦無妨若
其遍身頭面多有此痘則不治矣

痘瘡入眼

痘出之時有眼紅而不敢開者是眼中有痘也任
其眼白黑珠有痘亦自無妨只用清肝丸方見丸散篇磨水

蒸出藥性又用胭脂米研爛入藥水中頻頻點入又以藥渣
敷于眼上數日毒散痘收自不傷目卽用胭脂水點入亦可

小痘 痘之大者俗謂大痘小者各赤痘蓋以形而名也赤痘雖不甚起脹而尖圓可愛此乃毒稀之症故易齊易靨不如常期亦無恙也

余見有遍身之痘一齊湧出一齊起脹一齊收靨而無恙者然其痘自光明潤澤痘出熱退此氣血兩盛易于送毒故也

瀉痢 此皆熱毒下注大腸故有是症亦或值時疫所染而然也此時五六日上痘與痢症俱宜清毒活血用四物湯如紫連木香紅花木通則二症兼治矣此時若曾解毒至痘起漿用補亦不妨于痢也

見雜逆症

凡痘初熱一日卽出者凶。二日出者次之。一齊湧出者不治。此皆惡毒猛烈。不由經絡。斬關破壁而出。故如是之速也。此時急宜解毒涼血。猛以治之。若熱退毒清。猶可救也。不然必轉焦黑而死矣。

凡痘于天庭方膺印堂承漿先見點者。此痘出心腎二經。此固毒恭陽位。火臨水府。再加天庭地角稠密。慘暗。則心腎受敗。水火交傷。如或唇紅目赤。色白痰鳴。則斷不治矣。

痘已出後熱一遍復出。一遍者凶。

凡痘密如蚕種。或如釜中滾沸。而無縫者不治。

凡痘初出。全不起頂。形如燈燒湯泡者不治。此氣血不和。毒無

由化也。九日後必瘳塌而死。

凡痘初出遍身之痘，猶如蚊咬者，不治。此毒氣壅于肌肉，不能透出，以成瘡也。必在十日內死。

凡痘初出，連肉通紅，不分顆地，形若紅毯者，不治。或以化毒

湯加紅花、芍藥、連紫、草、辰砂、蘇木治之。界地能分，則可救。否則必死。

凡痘稠密，其根窠絕無紅暈，或紅而散漫者，不治。此氣不能領血，而血又不能散毒也。急以八珍湯治之。若紅活起頂，或可救。

凡痘初出，即白而肉色無異，久而不轉紅潤者，不治。

痘初出卽紫黑焦枯如乾疥瘡者不治

凡痘初出卽預陷中有黑點如針眼者不治此毒入臟腑不出也

凡痘初出卽含水珠皮薄易破者不治

凡痘初出皮薄色光明若瑠璃雖然好看而根窠全無血色一二日間卽大如菡萏者決不灌漿必成一泡清水八九日癢破而死大補血氣或可救

一痘先於天庭不展忽現賊標光亮好看倏然而沒者不治

一痘出而煩燥不寧腰腹仍痛口鼻氣粗點來紫黑者死

一痘初熱腰痛痘出而痛愈甚熱之標如蚕種煩悶不寧者死

六日問、口唇青黑、舌上生疔而死。

一痘出不似痘形、滿面血點、如噴丹砂者、七八日內卽死。

一痘既出、狂言如見鬼神、好飲冷水、點從腰上先出者、不治。

一痘初出、未見痘形、祇有紅癍如錦如霞者、急用玄參升麻湯。

或犀角地黃湯退之。若不能退、必死于六七日間。

犀角地黃湯

犀角磨 生地 赤芍 丹皮 牛子 桔梗 升麻 玄參

防風 甘草

又有痘出而或青或黑、猶如痣者、或肌內有成片青黑者、俱死。

又有痘出稠密、唇崩裂、鼻爛、癍者、不治。此毒攻脾胃、大便

解利若下膿血十可救二

一痘出而舌捲囊縮者死

一痘初出卽有紫赤之點大如棗豆現于兩腋及腹上者此肝肺與脾皆中毒也不過三日遍身之痘俱紫黑而死

一痘既出後發無名腫毒者十有九死此毒氣不能洩之于瘡而故發此腫也較之餘毒發痘爲更烈耳

一痘既出而吐瀉不止蛔虫從口鼻大便滾深而出者不治此脾胃已敗蛔不能安也雖極力健脾亦難補救

一痘渾身發紫泡刺出黑血者必死

一痘出斜視若有正視則無面如橘皮者死

一痘出形如蚕壳又似蛇皮者不治。或以青歸均氣治之若轉紅活尚或可救若不轉紅則血虧已甚斷不治也。

青歸均氣飲

人參 當歸 川芎 赤芍 防風 荆芥 青皮 木香
官桂 麥冬 薑引

一痘初出數粒于山根之上其色深紅而紫者。此氣弱不能主血血與熱毒乘虛而犯上也宜用涼血化毒飲主之。

涼血化毒飲

歸尾 生地 赤芍 木通 連翹 牛子 紅花 紫菀
豆根

疔痘初出口中腥臭之氣勃上冲人者此肺中毒火熬煎肺爛潰爛故也急以清金湯治之如遲不救必變失聲喘急而死

清金湯

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天冬 麥冬 地骨

木通 山枝 花粉

痘初出之時澀水洩或將起脹即帶膿漿或膿水味酸然收醫此皆毒火太甚失其自然之序不應至而至謂之