

種

痘

新

書

種痘新書卷之九

寧邑張琰遜王氏編輯

受業曾衡波仝叅

痘後辨症賦

痘結痂疤雖生意已成其八九餘毒未消而變症正慮其多端易以服合腹股猶爲危候虛浮不退尚是齒機痂成成而反致失聲前死恐爲黑膿腫未消而眼已先開眼閉疑是內攻陽氣極而狂叫喘呼腸胃傷而唼唼不寧至于冷風入胃則利下腹粘熱參膀胱則小便溺血熱毒逗留不化痂結而壯熱增寒經絡各遭陰毒日晡而潮熱在來發在午前爲實熱煩渴腮紅中

時方作是陰虛。便調人靜。他如撮脣。弄舌。心經熱盛。何疑。扶肝抬胸。肺胃勞神。有準。身熱。燎人而便祕。恐寒。暴驚。驚風。依依潮熱。兼泄瀉久變慢。脾風症。駛喪目子眼。令羞明辨口瘡于唇焦齒黑。寒熱下注大腸。必有秘結之禍。虛寒客留臟腑。乃成泄瀉之病。喘渴須分虛實。驗症切勿差訛。欲觀癥落之餘。再審瘢痕之色。桃紅潤澤。榮衛俱安。紫黑乾枯。尚留風熱。粉白爲氣血之虛過也。應深逝走馬狀牙疳之烈。月餘亦見長驅遍體赤癰。乃是失於解利。瀝身青紫。恐爲風寒所吹。餘毒未消。不特爲痘。爲癤。見風太早。恐其復發。瘡病此是先質之秘訣。余向後學以

實傳。

痘後調治法

痘至十五六日，廢齊其功已就。至是雖可無虞，第恐發熱，留餘毒。致留餘毒爲殃。餘毒若在肌膚，是必爲痘爲癆。痘旣形，則毋不內攻。此兒知其不爽，雖綿延亦可全生。若熱蘊肝經，則目紅頭痛，而眼合者，明肺留餘熱，則咳嗽痰涎，而瘡痕外著。實熱下注大腸，則大便或來腹血裏。愈後重致生瘡，瘡之病餘熱，若滲膀胱，其必陰囊脹脹，以致小便赤痛。若夫目瘡腐爛，齒血牙疳，狐惑瘡生，皆是因經有病。至若驚搐，狂言，惛沉，蒙昧，弄舌，撮唇，悉是心家之熱。經絡若留餘毒，是以變生莫測。總隨症以調治，有熱則退其熱，有風則去其風，勿謂痘家之症，遂膠固而不通。

但用藥不宜太猛。恐元氣難任。寒涼良以大病之後。氣血已耗。不惟病者必須慎其藥餌。即未病者亦宜謹其起居。蓋沐浴太早。恐生浮腫。冒犯風寒。致生潮熱。慢服食物。致腹脹痛。痘損破乃病癒。是以落痂之餘。最要避風寒。稍飲食。竟遠梳頭。竟早洗浴。不可出外行動。不可忍飢過食。熱物慎勿多食。生冷一切須禁。忌必待氣回血復。精神如故。肺腑安寧。然後可以無虞。痘收結痂。厚遲之三日。自落者吉。又痂色光潤。其癥帶紅更無他症。飲食如常者吉。自食痘痂。雖有他症。任尚不齒。

痘後雜症

潔齋

病後發熱症有數端。有氣血回元而熱者。則悠悠潮熱不除。渴不一二日。氣還血復。而熱自退矣。不必服藥。又有瘦後不耐。或久坐久視。勞動傷神。而發熱者。只須安息調養。不必服藥。

又有感冒風寒。而發熱者。必聲重鼻塞。惡寒惡風。宜用補中益氣湯。

人參 黃芪 白朮 茯苓 升麻 柴胡 炙草

熱甚。則以升柴爲君。加前胡。有咳嗽。加陳皮桔梗。半夏。南星。炒芩。不過一二服。其熱自退。又有餘毒。攻作將發。瘡疽而潮熱者。必痘漿清。癰漸熟。而煩渴舌有黃苔。遍身俱熱。有一二處尤熱者。卽瘡之所在也。治此宜解餘毒。精神旺者用。連翹飲。

連翹 牛子 柴胡 前胡 當歸 赤芍 防風 刑芥

木通 車前 炒芩 炒連 中退 活石 甘草 弱者加

人參 黃芪 大便秘者加酒大黃 或頭目大痛者除毒土

攻目疾將作也仍以連翹飲去木通車前活石加升麻桔梗川  
芎薄荷白芷蒙花菊花 目紅去當歸加胆草紅花生地 俱

必熱退痛止藥方可止然痘後元氣已虛解毒之藥必傷元氣  
若毒清熱退卽宜溫補以顧元神 又有氣血兩虛而熱者其

熱稍緩頭熱而不甚熱手足心熱手足背不熱精神怠倦大小  
便利者乃虛熱也其熱多在午後故曰發在午前為實熱申時  
方作是陰虛治此宜用十全大補湯 又有餘毒不形症痛而  
特傳于肝肺而發熱者晝夜不息舌有黃苔或十指搘縮用生

地 柴胡 白芍 炒芩 姜虫 勾藤 牛子 郁丹 刀  
皮 漢瀉 花粉 枣皮 甘草 此必血燥皮紅

癥落不落

癥黑唇紅而舌有苔其身有熱者此餘熱爲歎而不落也宜用  
調元化毒湯與服解其餘熱外用細茶猪膏共搗以絹盛之卽  
于痴土茶以解其熱膏以潤其燥其癥自落矣。若癥薄唇白  
而舌無苔者此元虛而血不潤故不落也宜用人參 茶葉

當歸 炙草 虫退與服外用雞骨與茶潤之而自落也 又  
有痘癥不落虛弱之甚昏沉不省人事者用人參清補湯 人  
參 黃芪 當歸 白朮 荻神 枣仁 麥冬 陳皮

卓 又有癰陷入肌肉而不落者用乳香 二錢 輕粉 二錢  
爲末用猪膏調敷 又或用麝囊燒灰馬齒莧汁和蜜調敷  
又或過服辛熱而癰不落者用升麻 乾葛 防風 連翹  
虫退以去肌熱而自落矣

痘後發痒 抓破成瘡

此皆血熱之症宜用黃芩 黃柏 生紫草 甘草 生牛子 銀  
花 生地 紅花共煎油搽之即愈

痘爛復瘻 致成瘡疥

亦用前方與擦或用黃豆燒灰調油搽之亦可。

癰自

此因氣清而血不足也。宜用四物湯加白朮、陳皮、紅花。

唇不藍齒

此氣血兩虛而秀留脾胃也。失治將變走馬牙疳。宜用人參

當歸、赤芍、元朮、牛子、蓮荷、石炭、石膏、甘草。

玄參

坐立戰搖

此氣血虛也。宜用八珍湯。

飲食倍進

若而赤喘急二便秘澀則內熱易于消燥也。若不急治必生他症。宜以四順飲主之。大黃制當歸芍藥甘草。

痘後諸瘡

遍身枝節上生瘡者名爲痘瘡。此因風寒相搏而氣血滯凝于  
腠理而乃生是瘡也。宜以前綿繩散敷之自愈。又有見風太  
早致成癰癰而出膿汁者燒乾牛糞敷之。又有痘風瘡者年  
至春卽發宜用防風 荆芥 牛子 甘草 苦參 當歸  
又或用 當歸 連翹 牛子 防風 荆芥 生地 赤  
芍 紫草 甘草 蒼朮 川芎 薄荷與服外用黃丹 黃  
柏 黃芩 大黃 輻粉共爲末以猪油調敷再于風池曲  
池三厘諸穴以火炙之則永不發矣。又有皮膚之間隐隐而  
起者俗呼疣瘡此皆餘毒滯于皮膚而然也。宜服解毒藥外敷

漆櫃剖開取其腹內之水洗之或用幌壳煎水亦可蠅形如蟻壳在魚池泥中凡割漆者必用此壳俗呼漆塊其性涼而解毒又有用活石一兩甘草五錢共爲末調敷瘡上者名天水散

凡痘癩之後孤破出血遍身復灌膜殼成血風瘡每至春夏南風一起其瘡復發秋冬自愈但不經染他人者俗呼痘風瘡也欲其不發須用火炙風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥 銅線 白礬 生大黃 檀腦 流黃 川椒 膽藥 榕子蜜白芷 水銀 錫 右方各等分爲末另將錫融化入水銀攪勻然後入諸藥末調豬油敷上

苦參丸

苦參 炒枝 防風 只壳 玄參 獨活 贻連 黃芩  
大黃 菊花等分共爲細末蜜調作丸如梧桐子大每服五寸  
丸 水送下

花蛇酒 用白花蛇一條蒸米數升先放酒曲次將布袋盛蛇  
貯于酒曲之上然後將蒸米與酒藥和均頓于蛇上用器封缸  
口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨每服酒時配蛇全服再增  
酒則調苦參末爲丸服愚謂只將蛇去其首置酒碗中入好  
酒封固其口謾火煮熟俟數日取酒與蛇並服

藥症

口瘡者遍身而生者是氣虛肺虧赤白條城  
風邪故如是也。用生銀朱一錢以生薑汁調服之。其效  
速而愈。

### 赤火流丹

一片通紅從頭起者過心不治從足起者過腎即死此惡毒暴  
發乘血橫行也。宜內服 立參 錦尾 藥草 紅花 石脂  
皇橘 赤芍 骨皮 車前 木通 防風 蒜芥 淡竹葉  
升丹用馬蝗蟬三五條置紅腫處此去惡血以減其勢乃不延  
云 又俗呼天虹腫余紅此症其小便赤澀乃用 立參 紅  
花 藥草 生地 防風 牛子 連荷 木通 車前 淡

鴻朱苓活石甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之先  
用瓦鋒刺去毒血後用墨與三七塗之卽愈

走馬牙疳

其先牙齦生痒時時出血繼而齦黑腐爛其齒漸落或每目落  
一齒成一日旋落數齒滿口齒俱落盡乃死見齒生痒卽宜施  
治此蓋因經蓄熱所致宜用人參石蒜牛子甘草石斛與服以  
解脾胃之毒再用石蒜牛子連翹黃芩生地紫草蛇床枯葵甘  
草煎水與噙卽愈若牙齦腐爛則用蚕退散敷之枯葵三錢  
入中白卽尿脚燒乾二錢五倍子二錢桑退燒一錢蛇床子二錢共爲末  
先用蜡蠟五蘸米泔水洗淨腐瘍惡血然後以水

之。又敷苦散亦治牙痛。人中白、煅青黛、五分冰片、一分白  
薑虫一錢半、寒水石三錢共爲末敷之。又用薑虫、丹皮、甘草心  
連、荷心、生地、銀花、桑白皮、沙參、茯苓、炒柏子分煎服。虛弱者加  
人參。

唇口生瘡

上唇有瘡、虫食其臍。其名曰狐。下唇有瘡、虫食其肚。其名曰惑。  
皆由裏熱生虫。而食臍腑以及于肛。而外于唇之上下。乃有瘡  
形也。必其人昏昏好睡。不思飲食。其聲嘎啞。而音不亮。則狐惑  
也。此最惡之候。必致鼻扁。齒落。失聲而死。宜用除惡丸治之。  
黃連二錢。蘆薈一錢。使君子肉三錢。白蘿蔔一根。燒灰。川

練子肉

一錢

共爲末用烏梅洗净去核搗爛和末爲丸米飲下

又有口舌生瘡赤者名赤口瘡此心肺有熱也白者名白口

瘡此心肺有熱也

赤者用陰陽散白者用朱礪散又通用洗

心散與服又通名鴛口瘡以鴛涎洗净卽鴛毛

煎水洗之亦可必洗净乃可敷藥亦有洗之卽愈者又用苦脾止瀉水漱

水洗之者

陰陽散

黃連三錢

乾薑一錢共爲末

敷之

朱礪散

硃砂二錢

白枯藜一錢共爲末

敷之

沈心散

黃連

歸尾 生地 木通 薄荷 牛子 遊絲

共爲末

煎水洗之

桔梗

甘草等分煎服燈心湯引

綠杞散

薰芩

黃連錢一石羔

寒水石

各二兩半兩半兩半兩

五分青黛六分共爲末。凡爛口瘡敷之立效。

### 耳病

有瘡後耳內腫痛流膿出血者俗名垂耳須先用棉花攬淨洗血然後用黑沙糖調水少許滴入耳內其痛立止而汁自乾戒勿抓把而自愈矣。

### 腹痛

有口禁彊直冷汗如雨透腑而痛痛定汙止者防風寒八胃俗謂盤腸內釣也用升消平胃散加勾藤木香一服立平方見九散條有痛而吐瀉交作者用正氣散 薤薜 噎皮 半夏 紫蘇

大腹皮 厚朴 茯苓 木香 白芷 山楂 神曲 犁草  
白芍 有大便秘結而痛者用白芍二錢厚朴一錢陳皮七分  
甘草三分 大黃一錢 有方醫之後忽然腹脹而痛煩悶不寧者  
必兼清瘀薄餘毒入裏最爲危急未幾漸加喘急手足厥冷則  
不治矣速用 雄黃解毒丸 雄黃一錢益金三錢巴霜三錢  
兵爲米糊爲丸如米粒大好酒送下 有腹中飽脹不思飲  
食時時而作痛者此必悞服食物或過服藥而致餘熱滯積  
而作痛也其必腹有微熱治宜消導解毒爲主用芩术 厚朴  
陳皮 半夏 木香 香附 砂仁 牛子 連翹 山楂  
神曲 川芎 前胡 犁草與服

不食

痘後臟腑空虛，最要能食，方可滋養百骸以復元氣。若其不食，不亦危乎？然有脾胃虛寒而不欲食者，必唇舌俱白而身復涼，精神困倦，懶向人言，須用人參、黃芪、當歸、川芎、白朮、茯苓、丁香、肉桂、砂仁、乾姜、山楂、麥芽。又有脾胃滯留餘熱而不欲食者，必舌心有苔，腹脹微熱，仍用前消導解毒之方爲主。又有一向能食，忽然聞食則嘔而不欲食者，必爲傷食所致。若不施治，必成疳勞。須用平胃散加三移、柴木、只實、良姜，問其所食何物，即將原物爲引。

心痛

必熟。蓄于心胸，故在膈以上，痛須用夢金、陳皮、半夏。  
桔梗、黃連、山枝、炒玉竹、水脊、香附、厚朴、白芷。  
連翹心。

虫痛

腹痛時，腹中滾起數團，痛定而塊亦落者，此是蛔蟲過多，所食  
又少，穀氣不能養蛔，或胃有滯積，而蛔不安，故蛔虫在內攬亂  
滾起而作痛也。宜用平胃散加使君子肉、苦練皮、胡蘋連。  
服後瀉出蛔虫，則永不痛矣。

手足厥冷

五臟脈沉細者，元氣虛也。宜以調元生脈湯主之。

人參 炙草 炙芪 當歸 門冬 官桂 甚加附子

昏迷錯語

當毒氣已散元氣未復精神疲倦故昏昏喜睡卽呼之不醒亦  
自無妨若連日不醒日中喃喃自言自語形如醉人每多交語  
者此邪熱乘于心胞也宜以導赤解毒湯或安神丸主之

導赤解毒湯

木通 車前 生地 門冬 十草 茯神 在菖蒲枝子。

人參 燈心湯引

安神丸

牛黃 五分黃連 五錢 當歸 二錢 炒枝子 二錢 共爲末八猪心血和

卷之六  
句爲九疊砂爲衣燈心湯下卽若無真牛黃則加川以胆星  
琥珀

驚搐危

此必毒化未盡火毒攻心所致也此時血氣已衰正不勝邪故  
曰痘後發搐是凶機然搐而易退者正氣猶足敵邪尚可以治  
若連綿不已則必死矣宜用清神散火湯或粉紅丸治之

清神散火湯

木通 車前 麥冬 玄參 黃連 甘草 枝子 燈心湯  
引加神砂調服 大便祕者加酒大黃 弱者加人參

粉紅丸

胆星

四錢

天竺黃

神砂

胭脂米各三錢

共爲末作丸

生薑薄荷

各一錢

共爲末作丸

荷湯下

咳嗽

此餘毒流于肺，肺熱生痰，故咳嗽也。只宜清金降火爲主。但久而不止，胸高肩息者，則不治矣。凡嗽用寧肺散，知母、牛

子、桔梗、陳皮、馬兜鈴、杏仁、全地、川貝、桑皮。

芦紅、炒芩、甘草。又有元氣虛弱而風邪入肺而咳嗽者。

必在寒乍熱，宜用補中益氣湯加桔梗、陳皮、半夏、白附。

杏仁。又有潮熱不息，肝肺二經皆有風熱而咳嗽者，宜用柴

胡、赤芍、炒芩、炒枝、胡黃連、全蝎、勾藤、川貝。

花粉 桔梗 峨皮

尿血

此熱滌於膀胱也。其必小便短澀而痛。宜用

牛子 銀花

木通 車前

瞿麥

滑石 赤苓

朱苓 濡鴟

又方用

苦練樹皮入猪尿胞內煮熟與服立效。然必先服前方數劑後以此而枚功也。

秘結

痘之首尾俱要便調。若便秘、恐留餘毒，如無他症，則必慎服。既以致陰血受虧，不能滋潤，宜用潤腸湯主之。歸梢 生地  
麻仁 桃仁 甘草 有熱加知母 石燕

痘。前要腠理開通而毒乃不閉故宜有汗痘後要腠理緊秘而風邪方不易侵故不宜過汗然動作用力或飲食溫充氣血動暢身軀溫緩而出汗者常也若身不舉動而飲食未進其汗自流者謂之自汗寤寐之中汗濕衣席醒則自止者謂之盜汗盜汗自汗皆由表虛所致宜用人參 炙芪 炙草 炒當歸  
連桂枝與服其汗自止 又方用當歸 炙芪 炙草 生地  
麥冬 炒蓮 麥楚 八猪心內煎熟與服

諸失血

鼻衄血者熱流于肺也目吐血者熱蘊于胃也小便血者熱注

于小腸大便血者。熱滯于大腸皆由熱留于裏致血而妄行也。急用涼血地黃湯主之。治之而血止則生。不止則死。

涼血地黃湯

黃連、歸尾、生地、炒枝、玄參、甘草、犀角、鴟血加  
黃芩、蓼花、吐血加知母、石燕、童便、香附、小便血加  
木通、活石、東前、大便血加葵花、槐花、地榆、諸血  
不止。欒加蒲黃、蘿蔔、掌柄。

蛔

蛔虫從口鼻而出者。皆由裏熱。蛔不能安。故從口鼻而出也。但  
熱毒上蒸。則蛔從上出。熱從下迫。則蛔從下出。其症皆以  
蛔蟲上蒸。則蛔從上出。熱從下迫。則蛔從下出。其症皆以

黃連止衄湯治之 黃連 黃柏炒烏梅 人參 白朮

引一痼病

欲便難便。裏急後重。或赤或白。兼之腹痛。是痼病也。此皆熱毒鬱于腸胃。是故有是症也。但赤屬血。自小腸來。白屬氣。自大腸來。赤者以活血爲主。用四物湯加炒芩。炒連。木通。甘草。桃仁。紅花。久而不愈。則去桃仁。加阿膠。硃砂。炭。姜。自者以扶氣爲主。用四君。湯加炒芩。炒連。木香。炒活石。陳皮。裏急後重。加吳萸。生白芍。腹痛則多放木香。肛門突出。則加炒芩。以提氣土。行久而不愈。則加黃芪。乾薑。砂仁。若赤白並下。則以四物四君子合飲而加芩連。若小便亦澀而煩。

渴者加生地 木通 車前 薺冬

東垣曰痘症下痢須用升麻提起正氣使痘不致下陷。可見痘中治痘須用保元湯加升麻爲主然後隨其赤白加減治之在痘中不致陷伏之虞痘後可免發元之禍也。

便下膿血

古名倒廝。疽毒從便解不可妄治。若驟止之則閉門閉盜其禍不搥踵而至矣。若便不順利而後重者須用黃連解毒湯。黃連 黃芩 俱炒 只壳炒歸尾 紅花 酒大黃 甘草 文武  
用和中湯 人參 當歸 只壳 陳皮 木通 甘草  
羞素有積熱腸鳴復痛裏急後重者宜先用調胃承氣湯以散

某發以芩連湯或香連丸治之

調胃祛氣湯

只兒 大黃酒制 九蒸 桑榔節 甘草蜜制

芩連湯

芩連俱酒炒 寶歸 川芎 甘草 木香 赤芍久下加升麻。

香連丸

川連一兩茶葉 木香二錢 共爲末醋糊爲丸如麻子大。水飲下。  
水制炒半錢共爲末醋糊爲丸如麻子大。水飲下。  
若久而不止與痘中下癰血者用韭莖白豆豉炒板仁。  
久病脾虛則用人參 白朮 茯苓 官桂 川芎 寶歸

赤芍 升麻

痘後浮腫

痘後膿血去盡。脾土已虧。氣血俱衰。邪易入而食易傷故或感風濕。或傷飲食。或滯餘毒。皆發爲浮腫。然感冒風寒者多自面白先腫而身熱口渴。宜用升麻 柴胡 茯苓 水通 杜仲。

前防風 付皮 甘草 薑葱引令出微汗而腫自退矣。

有感濕氣而腫者多在足下先腫其形光亮以手按之而即有窩其起亦緩且其人好飲而小便赤澀以水洗之而愈腫者水腫也。用當健脾利水爲主。宜用荊芥 厚朴 木通 滻石  
瞿麥 澤瀉 朱苓 茶芩皮 大付皮 使少  
便清利其腫自消。外用蒼术檀香燒烟薰之。以被蒙蓋令出微汗。

水其腫即退

又有食積而兼滯毒者多自腹先腫起必腹中隱隱作痛不想飲食且腹有微熱大便黃臭小便赤澀者滯積而腫也治當消導解毒爲主宜用蒼术 厚朴 陳皮 付皮 香附 川芎 山楂 神曲 牛蒡 連翹 木通 車前 旋蘿  
皮 陳皮 半夏 甘草

又有脾氣不行而浮腫者其皮如皺按之難下乃氣腫也治當理氣爲主宜用 人參 五皮散治之 人參 白朮 官桂  
麥冬 大付皮 陳皮 桑皮 姜皮 茯苓皮 水香  
澤鴻

車前 太子

又有血不行而腫者其皮膚之內隱隱若有血路是血腫也治當以活血爲主用四物湯加人參 陳皮 香附 木通 茯苓治之使血行而腫自退矣。

又曰面目四肢腫者屬肺因表虛爲風寒所侵而腫宜發活而腫自消用加味五皮散主之 羌活 防風 桂枝 防已 蒼朮 木通 五加皮 桑白皮 大付皮 茯苓皮 羌皮 朱苓 甘草

又曰腹脹加皺胞微腫者屬脾同脾胃素虛土弱不能制水以致水蓄而不行故浮腫也 又或傷食滯積脾不能消以致濕熱內蓄而腫者俱以厚朴湯治之 蒼朮 厚朴 陳

皮 大付皮 茶芩皮 朱苓 木香 水腫者其陰囊亦  
腫加 漆瀉 活石 車前 水通 莼蘆子治之 積滯  
腫者加 山楂 神曲 三棱 藥术 又藜菔丸通治一  
切浮腫 萊菔子炒五錢 胡椒 厚朴五錢 白朮二兩 共爲末  
作丸以陳皮煎湯送下

又虛弱而氣不行者用肉桂磨酒服外用燒酒搽之即愈

### 餘毒疽癰

九痘衆潰瘍薄者必有餘毒收結之餘其毒多發于手足腕中  
接骨之處紅腫焮熱爲疽爲癰但發于手足四肢者生若發於  
心胸腹上及顎門耳下者死。餘痘既現癰疽則不內攻有生理。

矣然此等之病由于骨髓必繩延難愈若或失治則筋角腐  
骨致風廢拘攣以貽終身之疾是僅尋常痘癧而已哉方其  
始發必然潮熱宜速用連翹飲或仙方活命飲或十三味敗  
毒散以退其熱而解其毒

### 連翹飲

連翹 牛子 防風 荆芥 炒芩 炒枝 白退 赤芍  
當歸 柴胡 木通 車前 活石 甘草弱者加入參生芪

### 仙方活命湯

白芷 防風 乳香 没藥 連翹 川甲 赤芍 當歸梢  
銀丹 花粉 全銀花 皂角刺 陳皮 痘形既現須用此

右方排膿解毒止痛。消癰無膿者可使成膿。有膿者能令排膿。消腫十三味散不過顛倒而異其名也。

紅腫者用活血解毒湯。防風刑芥。生地赤芍。當歸。連翹。牛子黃連紫草。川芎。木通。甘草。白芷。弱者加參芪。

腫者用消毒湯。防風刑芥。牛子首烏。白芷。白芍。痛加升香。沒藥。白芷。腫毒在上用升麻。毒在于下用牛蒡。引在手用桂枝。引凡瘡後之人元氣必弱。雖解餘毒亦當顧其元氣。以上諸方。但宜加參芪。蓋痘發餘毒不致內攻。未必死。人性命若欲求延效。妓用清解之劑。恐元氣一耗。禍起蕭牆。是不死之症而反立致其死也。不堪恙乎。余見世之庸醫。遇痘後潮熱。餘毒發

蒸。恒。據。蕭。公。之。書。輒。投。大。連。喬。飲。以。政。變。生。莫。測。令。人。不。可。  
救。者。不。可。屈。指。而。數。也。故。余。治。餘。毒。必。先。調。元。以。顧。其。本。而。  
兼。解。毒。以。治。其。標。標。本。兼。治。十。無。一。危。且。須。內。外。交。攻。再。始。  
易。去。看。其。腫。便。之。最。起。者。是。膿。腰。之。所。也。宜。用。瓦。錐。刺。去。惡。  
血。然。後。用。藥。從。四。圍。敷。之。留。口。莫。敷。令。出。毒。氣。將。四。圍。之。毒。  
趕。聚。一。圈。再。用。膏。藥。貼。之。拔。盡。膿。汁。而。自。愈。矣。若。已。成。膿。亦。  
以。針。刺。之。令。膿。潰。而。痛。立。除。亦。以。膏。藥。收。功。

敷藥方列後

一方三豆散 緣豆 赤小豆 黑豆 共爲末調醋敷之  
一方用豆心渣敷之

一方鐵鎗敲。取樹上白尾虫。新堯棓煅成灰爲末。調油敷之。任諸癰毒俱可內消。其正腹下盡皆生足。其背壳硬跳下地來。即自尾夜食其形。如環其大如指長二寸許。

一方矣。芙蓉花或葉或皮或根。仍可惟花更佳。黃荆子各等分共搗爛用鴉蛋白調敷留頂莫敷連敷二三次。即頂如烟起立時止痛其效如神。

一方必勝膏。馬齒莧搗汁。猪膏脂。石蜜。芙蓉膏。敷之即消。

一方用紫花地丁搗酒服。搗爛外敷任無名腫毒。無有不退。一方用黃豆。薑。葱。共搗敷之亦消。

一方如意散 生南星八錢 生半夏二兩 鐘金五錢 生大黃

八兩

生大黃

五兩

生大黃

菖

五錢

白芷五錢 蒼木

五錢

共爲末用醋調敷

一方沖和膏

紫荆皮

五兩

獨舌

三兩

赤芍

二兩

白芷

二兩

菖蒲

一兩

共爲末酒調敷

內服六君子湯加北芥子

此餘毒不甚起頂且不紅者多是元虧不能升。必用內托散。與服然後其腫乃聚。其頂乃起。頂起腫聚方可成膿而愈也。毒瘡已潰不能收口者須用生肌散 黃連 黃柏 地膚

皮 桔子 枯礬 甘草 共爲末以塗之

一薈藥方 防風 商陸 連翹 生柏 生芩 花粉 苦

參 赤芍 蓼活 獨活 川烏 床子 麻蕕 首烏

刺

南星

生

白及

川甲

草曷

木鱉

紫蘿

紅花

蛇退

大戟各一兩

用桐油三斤將諸藥入油內先浸

一宿然後葱煎見藥渣枯浮乃用棕竹去其渣再將

孔蓋

沒藥

去油

石脂

銀硃各三錢

血竭

兒茶

輕粉各三錢

龍骨

膠粉各一兩

黃丹十二兩

共爲細末看油滴水成珠漸漸入此

藥末攬勻

痘疔遺爛成坑或疽潰不能收結者宜服人參敗毒散加川

山甲

重退

薑頭連翹與辰

小月五分

雄黃

上俱研末

升二錢

輕粉一錢

蛇參二錢

黃丹沙八分

血竭五錢

黃柏生一錢

乳膏

沒藥五分

杭粉一錢

血竭一錢

水片一分

共爲大敗

之其口自合

兒癲發熱手足腫脹。若用大連翹飲與服外用三豆散敷之忽然變症狀同急驚。延余往視。余觀其左耳以及左頸俱紫黑。其紅腫亦在左邊。手足啼叫不寧。但唇舌俱白。余謂此兒元氣已虧不能勝其餘毒。又復內外俱受清涼之藥。餘毒將八臟腑毒盛生風而肝症居多。肝以藏血。肝經血少。毒將乘之。故左頰青紫。肝動生風。故狀同急驚也。宜大補血氣兼驅風散毒爲主。遂用人參。黃芪。當歸。白芍。鹿茸。

天麻。白附。薑虫。牛子。防風。白芷。炙草。一服而醒。額青紫之色已退。乃去。天麻。白附。薑虫。純用。

之劑而兼解毒之藥乃漸漸聚腫起頭出膿而愈可見清銀  
解毒之藥痕後元虧莫輕試也

一兒痘後兩手腕間腫脹不能轉曲已經八月有餘延余往視  
余見其氣血已衰以瓦絳刺之並無血出亦不知病余謂宜  
活血解毒遂用黃芪 當歸 川芎 白芍 防風 白芷  
肉桂 元枝 連翹 牛子 金銀花 皂刺 桂枝 破  
補 勾藤 茄草 煎酒與服 外用生南星磨醋與軟過  
數日犯處生痒刺之有血矣後將前方爲末一斤每日三貼  
調酒與服其腫漸消而愈

鼻渊

痘後鼻中時時流涕臭不堪聞者名鼻淶也此熱毒乘于肺經而熱蒸肺竅而然也宜用絲瓜近蒂五十加黃芩枝竹牛子甘草全煎服外用絲瓜藤燒灰爲末吹鼻竅竅之卽以絲瓜灰調酒服不過數日鼻氣自息而涕亦止

眼目

目爲五臟精華之聚最是輕清不容塵染毒氣稍侵多致喪明可不慎乎故痘發之時恐痘入眼先以油胭脂塗其眼眶或以生勞爲末密調敷其四傍或以白芥子爲末水調敷其足底明熱下行俱防痘毒入眼之良方也然或兼清肺瀉火止渴手足同是故有紅腫而不能開者宜用

澀州散

川芎

歸尾

羌活

防風

薄荷

桔子

紅花

菊花

肥草

甘草

飯後服

眼痛加夢

刑子

石羔

谷精草

葵豆

有翳膜加

虫退

白蒺藜

木

賊

石决明

蒙花

大便熱結者

加大黃

黃連

牛膝

小便短赤者

加車前

水通

活石引火下瀉而上焦之火

乃清

紅赤者血熱

上犯干日也加生地

丹皮以涼其血

有翳膜者用機靈散

防風

羌活

黃芩

黃連

白芷

甘菊

荊芥

龍胆草

石決明

草決明

石羔

七厘

文方除翳膜用蒙花散

蒙花

石決明

七厘

本賦

羌活爲米清茶調服

羌菊散 治眼今羞明

羌活 菊花 胆草 谷精 京芥 薄荷 蔓京 枝子  
連翹 赤芍 生地 黃芩 黃連 有鱗加七厘 沉明  
胆草散 治羞明障翳

胆草 甘菊 七厘 白芷 防風 黃連 牛退 水渺  
枝子

兔糞散 治痘毒入眼生翳

兔糞炒黃色爲末 又用牛退 水通 甘草煎水調服。

兔糞丸 治痘毒入目生障翳

鹿藥 炒四石決明(七孔者)大炙等分各一白芍一兩當歸一錢防風一錢

谷精諸藥名五錢 薄荷四錢 共爲丸如棗豆大每服數丸

用別芥煎湯送下

涼肝明目散 治痘後羞明

當歸 胆草 酒洗 蒙花 柴胡 川芎 防風 川連 和猪

肝全煎服

望月散 治痘後兩目難開

望月砂即瓦屑一兩 蒙花 虫退去足 谷精各五錢 共爲末用猪肝切

開每肝一兩入末一錢包于肝內煮熟連肝及汁俱服

眼有白翳或赤者用藥點入諸方列後

一方用青橘核磨清水點入可除白翳

一方用小魚子將魚頭在翳上薰洗亦能洗去其膜  
一方用黃蠅血磨牙箸點入亦可去翳

一方用桑樹內細嫩皮井水浸爛爲丸磨清水點入立效

一方用胭脂或胭脂米點入或紅或膜皆可以除此解毒涼血

乃良方也

一方用水牛身上所生蟹子以其血濾入卽效

一方用 輕粉 黃丹 雄黃 射香 共爲末左眼有翳吹入右耳右眼有翳吹入左耳其翳自除

一方用木鱉一個爲末取雞子開一小孔入末在內蒸熟與服亦能除其翳膜

一方取白雞拔其翅毛以肉中拔出之。潤滑而軟。向眼中鑿上揩抹其翳可去。

以土諸方俱各有效。故悉錄之以備參用。

天地陰陽之精。則畢聚于日月。人生五臟之英。而悉粹于雙眸。故瞳仁屬腎。烏珠屬肝。眼白屬肺。眼角屬心。上下眼胞則屬脾胃。凡目無障翳。而瞳子昏沉。珠無精彩。此其腎源將竭。英華已衰。宜以菟絲枸杞。覆盆元支。滋腎以養其元。而清涼叱而不用。其如上下胞崩。則脾胃已敗。其人必多泄瀉。宜以白米茯苓淮山丁蔻。要在健脾爲主。至若紅腫。必是血熱。羞明。必是火炎。血熱火炎之症。須清上焦之熱。而腫頭頂之風。且涼諸經之血。其

症乃可消除。然火勢上炎必須下瀉。故大黃枝子是抽薪之妙。  
用車前木通爲止沸之良方。要知目爲肝竅。凡目疾之作。總不  
外乎平肝。而痘後之症。斷是毒犯精華。紅腫頭疼。乃熱毒之攻。  
擊急。宜涼血清肝。雖不紅腫而羞明。亦是英華留蓄。餘熱若無。  
紅腫羞明之弊。眼內忽生白翳。則用前方點八翳膜。亦可消除。  
須戒服熱物。恐助熱毒爲殃。若或見風太早。風侵淚下汪洋。  
下四弦紅赤。眼自覺生痒。此是風眸之症。年年復發爲殃。余  
恆屢臨此症。因而制就其方。

法風明目散 治痘後風眼。凡弦紅作痒。下淚者。百無不效。

防風 荆芥 川芎 薄荷 生地 紅花 連翹 白芍

菊花 蒙花 谷精 蕤 蔓荆 川椒 生薑引發散

服數劑可以除根

痘後逆症

一癰落而瘢雪白者氣血盡虧也急用大金大補湯以補其氣  
血養其脾胃不然必飲食漸減肌膚消瘦而死

一痘後發搐連綿不已者心氣已終絕神無所依也不治

一面色青白神氣昏暗目無神光瞳子不明心腹疼痛者不治  
一眼睛弔白失智亡魂不省人事者不治

一寒戰咬牙手搐足拘禁口不開者不治

一目閉腹脹足冷過膝者死

一牙齦腐黑臭不可聞者其膿已爛也不治  
一遍身腫脹者毒入于脾不能制水也不治

一孤破穿肌遍身肉爛者不治

一口鼻出蛆滾滾而上者冒絕也不治

一遍身大熱忽一日之內其瘡盡落卽發驚搐者毋攻心也  
不治

一潮熱不退肌膚盡落其瘦如柴者不治

種痘新書卷之二

醫邑張琰遜王氏編輯

受業曾衡波余叅

女子出痘

痘瘡以氣爲主。以血爲附。氣血充足。乃可灌汁成膿。女子若至十四天。癸已動。倘遇出痘。而經水忽行。則陰血已虧。將何以運轉而成漿乎。然發熱之初。經期適至。則毒隨血解。可以無虞。若至三日之後。而血猶不止者。則熱入血室。血至妄行。此內動冲虛之痘。治之不容緩也。否則血虛不能送毒。狂亂忽生須臾而告變矣。故經行二日急以四灰散調酒與服止之。若至五日血

猶不止急以涼血地黃湯治之

灰散

舊棕 老杉樹皮 胎髮 膻帶 俱燒灰存性調酒服。  
涼血地黃湯

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻 川連 甘草  
人參 枣子 玄參 阿膠

右方加棗二枚水煎服以痘出血止爲度。

一女子非經行之期於發熱時而經水忽至者乃火毒內熾而  
血妄行也其毒必盛其血必多急用涼血解毒湯倍加連葛  
牛蒡或用柳花散治之若因循應忍則血愈虛而毒益甚

旋踵而伏陷內攻雖有良醫亦難治其後矣

涼血解毒湯

當歸二錢白芷七分升麻五分紅花一錢紫草一錢芍藥八分連翹牛子各二錢燈心五節

柳花散

柳花七錢紫草一兩升麻七錢當歸八錢赤芍六錢共爲末  
每服七錢葛根煎湯下

女子發痘又值行經經水方止身發壯熱獨言謳謳如見鬼  
神尋衣摸床顛狂百出目上直視煩渴不寧此陰虛似實切  
不可以質熱治之蓋行經之後血室空虛心以生血虛則

心神不寧。肝以藏血。亦且藏魂。血盡肝虛。而神無自能安。此狂譖之所由來也。痘未出。宜以逍遙散加丹皮、玉之痘已出。宜以加味歸脾湯主之。又有邪熱乘虛而入。血室以致于狂譖者。古人以瀉肝散治之。愚謂仍以加味逍遙散加防風斯可矣。

一女子正值崩漏。適逢出痘。則氣血俱虛。必不能透毒。由外急宜大補血氣。否則痘不能出。雖出亦易倒陷矣。過此之症。速以十全大補湯或參歸鹿茸湯二之。

一女子一向閉經。血海已涸。適逢出痘。毒氣鬱於衝衛之間。腸井發熱。孰以甚其症最危切莫。用攻撃之藥。便血妄行。瘡

養心補血調理脾胃爲主，仍用歸脾湯加角鶯靈鈞草用之  
遙散主之

瀉托散

姜活六分、當歸一錢、枝子、胆草酒洗各六分、川芎、防風各八

炒芥六分、柴胡、木通各六分、淡竹葉引

歸牌湯

人參、黃芪、白朮、茯神各一錢二分、甘草三分、水脊五分、遠志一錢、全地、棗仁各二錢、加柴胡、山枝名加味歸脾湯

逍遙散

白朮、茯苓、當歸、白芍、生地、甘草、柴胡

加桔仁丹皮名加味逍遙散

十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 地黃 官桂 川芎 當歸  
白芍 甘草

女子起脹灌漿

一女人出境當起脹灌漿之時。忽然行經。恐血虧裏虛。痘易倒。  
暗急宜大補血氣用十全大補湯或參歸鹿茸湯主之。

參歸鹿茸湯

鹿茸二錢 人參一錢 紫苑一錢 雞身二錢 多益七分 盐一片 龍眼

三個八角酒一盃 金瓜

少陰之經。其經忽來而不能歸者。此乃血  
甚而少陰之脉不能上榮于舌也。宜以當歸養心湯主之。  
其能言復用十全大補湯主之。

當歸養心湯

人參、麥冬、生地、炙草、加燈心引

一女子痘當匯聚之際。經水大來。血虛不能化毒。以致其痘癰  
起不起。應腫不腫。頂暗灰白。皆由血去過多。陰氣耗散。故此  
急用調元內托散主之。外用胡安酒噴之。使痘起瘡消。則然  
空處又出一層。則爲吉也。若服此不效。寒戰咳嗽喘急。腹脹  
反增他痘。則內氣已脫。必不治矣。

調元內托散

人參 黃芩 肉桂 木香 當歸 川芎 白芍 附片

孕婦出痘

夫妊娠出痘。痘家最忌。蓋痘毒出於五臟。痘毒發越。則風火相搏。以致動胎。胎動則氣血耗散。勢必不能遂。勇行潔涼。況痘家用藥多主溫補。如生薑、肉桂之類。皆爲妊娠所忌。而黃芩、葛根、薄荷諸品。又非痘家所宜。此妊娠出痘。所以最難調治也。遇此痘。德以清熱安胎爲主。故初熱血動者。以四物湯加芩連主之。或用單胎散主之。必使胎元莫動。而後可無虞也。

四物湯

當歸

川芎 熟地

白芍

臍胎散

當歸

川芎 白芍

人參 白朮

茯苓

柴胡

甘草

條芩

防風 荆芥

白芷

乾薑

砂仁

紫草

阿膠

桔梗

一妊娠出痘身熱腹脹手足冷者用八物湯加木香主之

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

白芍

熟地

甘草

一好婦出痘而胎將動者是用安胎散主之恐胎落則痘陷也

川芎

當歸

白芍

人參

白朮

茯苓

黃芩

甘草

砂仁

陳皮

阿膠

香附

蕤葉

各等分

胎落而瘦稠密者用 人參 黃芪 川芎 當歸 防風  
白芷 白芍 桔梗 厚朴 木香 肉桂 紫草 生子  
一座後寒戰咬牙者裏虛甚也宜大補湯加桂附

一產後小腹急痛者瘀血未盡也宜用黑神散另行之

黑神散

當歸 川芎 熟地 岩蜜 桂附 通草 木香 陳皮  
黑豆炒香附炒 水酒各半煎服

生產之後然後出痘者總宜大補血氣。但須照常體用藥不必妄爲多從而反致變亂。

訣曰：妊娠出痘治應難

夫出痘者，其胎爲

清熱安胎爲

妙法 胎元若動病終難

又曰 產後天行出痘瘡 此時平順不須惶 只將大補加  
功效一謾向諸書更檢方

總之 妊婦出痘要以安胎為主若胎已落法以補血為先但收  
壓時胎落者多無事發熱初出時胎落者猶或可救若當期  
腹瀉時胎落者多致不救胎者須宜知之

種痘新說卷之十終

種痘新書卷之二

寧邑張琰述玉氏編輯

受業曾衡波纂

麻原賦

麻雖胎毒那因疫時而敷暄孰令大寒逆時傳染而行遍乎  
州里其毒發也但痘初以其變症也比痘非輕患夫視爲淺常  
頃刻殃人性命此其所以然者蓋毒起於脾氣流於肺心始終  
之惟皆無症故非體內之殃而臟腑之傷肺則尤甚閉門閑處  
不若路中每經楊湯止沸不如去火抽薪吾試言其始末而與  
天下詳矣初熱亦似癧瘍目出淚而不止鼻流涕而不乾咳嗽

太急煩燥難言以火照之隱隱在皮膚之下以手摸之燙燙於  
肌肉之間其形如朴其色如丹隨出隨沒乍隱乍現想其腫脹  
兮麻而兼隱皮膚如赤兮麻而火麻似錦而明兮十有九活如

燥而黑兮百無一生症雖變異治法不同微汗常出毒勢越而  
不留清便自調邪氣行而無難勝理弗開兮恐毒鬱而不泄節

論治法

當發表為貴腸胃秘結兮慮執滯而不通急以疏利為先苟不  
慮終而慎始正恐變害以爲凶其鋗不必憂邪從劖解利不少  
止毒以利鬆所苦者身上清涼所畏者喉中腫痛飲水不休法  
在生津養血飲食若減方須救胃和中且出之太遲或爲風寒  
所束治在急於發表出之大甚藏腑積熱慎多治之勿宜解毒

確醫貴因時。母于天和官視歲氣若取風寒濕氣微而不行火。日炎炎邪氣乘而作癥。或施溫補勿助其邪。若用清涼伏傷其胃制其過。但取其平驅其邪勿傷其正。或寒或熱。或性之陰陽自異爲虛爲實人生之強弱不齊。欲與溫涼必觀虛實入品固宜詳覲藥味亦當深究。防風荆芥散。理之留邪升麻葛根。

開榮衛之蘊熱。點子未現之初乃先行之要藥。入參養氣地黃涼血氣虛血熱非此難。方黃連八心而瀉火。黃芩八肺以清金。熱留心肺非此莫除。玄參石羔治邪火之浮游核子連着開萬毒之鬱結。此瘡家之亞藥。解毒方中必用瓜蔞潤肺止渴。須合麥冬知母降火生津。山同黃柏當煩渴在所必加。方中桂附

痛白朮止乎脾泄小便濁。又通咽喉竊。甘桔心肺喉之病。  
以辰砂大便秘。今利以大黃牙齒生疳。文蛤配平瀉。自喉痒而  
痛。射干助以牛蒡五味杏仁。治喘氣之噓。呴。薄荷竹葉解瘧。  
之。烽烽火燒入屎。密炒麻黃。發癰毒之出現。今邪氣之抒張。只  
壳山楂消腹積。而化毒蛇鈴地。肖解肺熱。以回瘡癰。疹既出調  
理甚難。坐卧宜燙飲食。宜淡風寒若受。分爲肺爲熱。藏酸不休。  
謂理  
分爲咳爲喘。穢若癟兮。發瘡嚴寒搏兮。消沙。調理失宜輕而變。  
重飲食不節安者反危。以致變症多端。餘殃莫測。翻便多腹泄。  
令腸胃夾熱。咳多痰煙兮。華蓋俱寒。口爛脣瘡心脾之火未退。  
毛焦髮稠築衛之液將枯。治此變症各有奇方。身熱不除。柴胡。

乾葛四物曰瘧若甚。柑桔對平三黃。消腫定喘。芩麻有效化  
痰止咳。分順氣爲良。氣血已虛。八物增損而可用。水穀不納。一  
陳斟酌以相。當刺血分。香連丸去蔻。而加地榆芩柏。咳血分五  
樹湯去麻。而加茅根地黃。此疹家之治法。繼痘科而更詳。

麻疹酉江月共十三首

胎毒現爲麻疹。蓋因毒火薰蒸。遍身點似硃砂形。乃是心脾二  
症。切忌善癬死候。愚見赤似朱紋。大都治法。喜病深不可。辛  
土。下。

疹子何因咳嗽。只因肺與心連。肺被毒火苦熬煎。致生咳急氣  
喘。治宜清金降火。不可悞用辛燥。譬如庖丁蒸龍烟。只要氣

縣火善

初熱狀似傷寒其症如何分辨症多咳嗽有紅班頭目眼中水現或見腹中疼痛或時吐瀉相兼疹家吐瀉不須認毒因嘔泄而鮮。

疹與痘家異治二家不可同方痘宜溫補疹宜涼只要現形爲上風寒閉而不岀其間凶險難當急宜發散保平康最怕神昏腹脹。

凡遇疹子出現詳看時令如何假如日熯及風和敗毒荆防方可若是時行疫熱芩連消毒宜多用心調理救沈實效聞天井坐。

且說荆防敗毒此爲發散仙方防風荆芥地黃湯炒製芩連  
樣桔梗玄參甘草連翹升麻牛蒡人參炒柏酒爲良竹葉水  
煎停當

又有芩連消毒散火散毒尤佳芩連枝子及升麻桔梗玄參多  
把石羔以及知母連翹牛子紅花引用淡竹葉參加此個方  
兒無價

若是發散不出令人真個憂疑麻黃酒蜜炒如煤芩連枝柏當  
施更加大黃酒製連翹牛蒡相宜石羔止退紫紅歸不效命  
離塵世

如見出時紫黑此症今古多凶急求人糞路歸東火燒存性取

用細研酒調吞下須臾黑色轉紅若還依舊黑臉面管取黃  
梁一夢

疹子現形發熱化癰湯是真傳石羔甘草玄參桔梗連翹有驗  
若見毒多熱甚速齋消毒爲先大便秘結大黃添硝使微溏  
數遍

疹子類多咽痛火邪薰灼無他連翹甘桔要多加射干牛蒡前  
罷外用十宣妙散吹喉休要呼嗟假如見效莫爭差消毒茶  
連無價

赤痢下時鮮血黃芩柏葉槐花只壳荆芥穗同加痢止血除方  
罷曰痢茱萸滑石樗根只壳升麻烏梅取肉作丸佐赤白朮

連可下

四疾更防死症臨時休得殊差。蓋多體熱病如麻。咳嗽而毒聲  
啞走馬牙崩齒落葉疾樂口吁嗟此班卽是死鬼家不可騎。

牛問馬

癥勢

夫癰痘皆胎元之毒痘乃父精母血陰陽交媾慾火所慾藏於

命門是爲陰毒癰乃受胎之後在母腹中飲食積垢色慾疑汙

蘊於六腑是爲陽毒益毒藏陰分貴陽氣之壯旺而毒乃得上

論治去有陰陽則化之妙

升而外化故治痘之方必用參葛朮桂以陽藥而化陰伏之邪

毒在陽分貴陰血之活動而疹乃不焦黑而內攻故治癰之法

多用四物地黃以滋陰而降燥烈之火此麻痘之藥品所以畢施況陰主閉藏故痘毒深而難解陽主發散故麻毒淺而易消且臟陰多虛寒故治痘之法雖解毒亦要溫中腑陽多虛寒故治癰之道宜發表而尚清涼矧痘毒必須外化化盡方可無虞是以遷延時日治始貴虛其終癰毒俱要發出出盡則無後患是以時日無多治此只須解表然麻毒雖藏於腑而陽毒之激烈一發卽蒸於肺肺主皮毛寘受其毒故發熱之初鼻流清涕咳嗽噴嚏音啞咽疼而肺經見症獨多而其所以異於傷寒者祇有眼痘畧腫目內汪洋而腫腮赤是以知爲癰症耳其初發也最忌風寒尤嫌觸觸宜置之潔淨之所處于溫暖之室半

清痘之點放傷寒

之物。恐助火。萬勿與。嘗生冷之藥。萬勿與。氣切莫與。食宜有香薰而使穢。不能觸用。藥必須發散。以開肌表之虧。理開張而毒不內鬱。察香時接而毒得外升。此初熱之調理。再觀症而察形。若潮熱往來。二便不秘。飲食如常。論症極主精神清爽。身潤澤而有汗。脣不紫而自榮。舌無黃白之苔。日無腥臭之氣。此其內毒最輕。知其症之必順。不須用藥。費心勤自可。安然平定。若鼻衄吐血。請君不必驚慌。毒從衄解。有何妨。此症從不危凶。嘔吐毒攻胃管泄瀉。莫作虛看。腹痛多爲內熱。驚譖心竈火旺。利以發散爲竇。再以清解爲良。發熱三日以後。麻疹已現皮膚。以燈照之。如霞如錦。以手摸之。如粟如麻。一日而出三遍。三日

而出九回至于五六日間癥毒盡出其熱漸退熱退余察其症  
方平當其現形之際不畏瘡之稠密惟喜色之紅活故色之明  
潤雖一片成瘡吾亦知其堪救若瘡來紫黑雖稀疎不審吾亦  
謂其難醫是以紅色者輕紫色者陰青黑色者則爲不治之症  
炎蒸血以載毒血活則毒必清毒壅則血必熱紫而轉黑蓄毒  
凝而血已死矣其又安能活乎治此之法如黯來焦紫必以清  
毒爲主九以涼血爲先凡芩連枝柏桑菊石參知母甘桔  
荆防一切清肺解毒之藥此時不容緩進至子紅花歸尾紫草  
地黃丹皮赤芍荆芥川芎一切滋陰活血之品當此急進其方  
雖人有虛弱不可西體弱而妄進補劑以致助毒爲虐在所

之見不過於解毒劑中用人參而畧扶元氣麻踰執症亦不難。因症熱而過用寒涼以致耗其元氣當熟清毒解之餘則宜調其脾胃而思固其本原若執盛而藥微則杯水固難敵薪也。毒輕而藥重是驅盜自傷其門壁均非所云善治。在經之未出之先宜發爲主發毒盡出自不內攻雖紅腫之甚狀若淤滯亦不足慮既出之日概以解毒爲良毒清血活血能化於皮膚方免餘毒之訛調理得宜十有十全苟失其宜發人亦如反蠶泊麻之與痘又安可不慎乎

### 概論治法

麻即疹也疹形如麻痘形如豆因象命名故呼麻痘夫瘡痘皆

胎。其。道。出。五。臟。臟。屬。陰。而。主。血。故。痘。有。形。而。有。汁。其。症。有。熱。亦。有。熱。麻。出。六。腑。明。屬。陽。而。主。氣。故。麻。有。形。而。無。病。其。症。多。寒。熱。而。無。寒。爲。症。既。異。則。治。法。亦。殊。蓋。痘。宜。內。寃。可。用。補。而。麻。忌。內。實。宜。解。散。惟。初。熱。之。時。畧。相。似。耳。若。既。出。之。後。則。痘。宜。補。氣。以。生。血。麻。要。滋。陰。以。制。陽。蓋。陽。毒。燥。烈。在。陰。血。受。其。熬。前。勢。必。至。于。虛。耗。故。必。以。滋。陰。降。火。爲。主。斷。不。可。用。燥。悍。之。劑。扶。陽。以。助。火。承。也。是以。治。麻。之。法。宜。清。不。宜。補。也。

### 麻症與傷寒辨

發。熱。之。初。寒。熱。往。來。咳。嗽。噴。嚏。鼻。塞。聲。重。日。流。清。涕。其。症。與。傷。寒。無。異。但。麻。症。則。眼。胞。累。腫。目。淚。汪。洋。而。浮。腮。亦。惡。心。乾。渴。此。

爲異耳若見此症必是發疹。須宜謹風寒飲食避厭。故成黃  
酒忌。辛熱用藥表散使肌膚通暢。腠理開張或身有微汗則邪  
從汗解而毒則易出耳。熱至三日麻當出矣。一日出三遍。三日  
出九遍。至六日間當出盡矣。及出至足頭而將收。收曆之處其  
熱即退。疹子漸次收下。熱亦漸次而退。至八九日麻始收齊。而  
熱乃退盡也。若發不出者固危。出不盡者亦險。出而旋收者更  
險。治之其可緩乎。

論麻症輕重

或熱或退而無他症者輕。頭面不出者輕。  
出透三日而後漸收者輕。紅活潤澤頭面均淨而多者輕。

紅紫棕暗于焦不潤者重

移熱大腸藥者重

黑暗乾枯一出卽沒者死。

膚青紫裏者死。

鼻扇口張目無神光者死。

胸悶氣喘心前竊動者死。

又眼白赤色齷齪唇腫心煩目渴腹脹口鼻出血人事不清大小便秘狂亂不寧舌苔黃黑口氣腥臭此名閉症毒滯于中而不得出將作內攻最危候也急以清毒解表湯主之若疹能出可救發不能出則死。

升麻

防風

荆芥

麻黃

連翹

牛子

桔梗

石藥

知母

黃芩

黃連

虫退

麥冬

甘草

加無價散

瘡症鼻漏血者毒重口出血者毒尤重初起手足心如火熱

毒亦重。起初失于清解，則熱蘊于肌。口鼻腥臭，必生牙疳。  
毒入大腸，則成廔痢。發表太過，元氣損傷，則成疳積。若或失  
治于前，其必敗。起于後，雖明初發之重輕，宜顧後來之生死。  
誰謂麻也？祇詳于前，而可不思其後乎。

又有一種爲感風熱而出麻者，俗謂飄麻。此皮膚小癰，不致傷  
人，祇散風清熱而即愈矣。

有小兒初生滿月之內而出麻者，俗謂胎麻，可不藥而愈。

○麻家四忌

已、董腥生冷風寒，六穀氣逼，內氣滯，凡是膏膜俱能滯，  
所以忌也。莫生刑難，劍化物令，則能水伏火伏，不化毒乃渾。

留又當忌也若風寒閉塞毛髮不開則毒氣何由出乎此數端者是以俱莫犯也

一忌驟用寒涼 麻雖熱症固不宜用辛熱之劑然初熱之際虛寒之症未形輕重之勢未見遂驟以苦寒之藥而峻攻之幾何不水伏其毒而不得出其反至于內攻乎故善治者惟達房而不趨表解毒而不水辨也

一忌誤用辛熱 瘀本熱症若復投辛熱之藥是猶火上復加薪也斯以火助火其毒不愈橫乎然瘀症初起之時亦有四肢厥冷者此熱極似寒之故切不可誤認虛寒而妄投以熱藥也卽遇天時太寒亦宜置暖室切不可用寒藥遂致以

辛熱之物以滌腹中之火也。

一忌誤用補瀉。毒火之發，堅硬疏通尤難。補瀉則毒得外洩而解，補瀉則毒滯內留爲殃。但初發之時，症多吐瀉，愚夫愚婦急欲止之，若誤用參朮砂石補瀉之藥，則關門閉益，毒滯于中，必作內攻之禍矣。

○孟氏治麻方

前後諸症並治

石羔根二兩川貝四錢紅花三錢荆芥骨皮桔梗各八錢乾薑一錢  
歸尾一錢甘草四錢桑白皮赤芍牛子薄荷陳皮各六錢  
昇槰六錢共爲末，每服三錢，白湯下。

此方能發表透肌，清毒活血，理肺消痰，清胃解結，不拘四時。

皆可以服誠治瘧之良方也

○麻症初熱三日調治法

夫痘爲陰毒其勢更緩或死或生尙判之于成瘍之日。麻爲陽毒其熱甚烈若存若沒早定之千方出之時故發熱三日。瘧當現於皮膚若脈理緊秘風寒嚴束氣滯于中。毒凝于內不能出現則毒作內攻須臾告變故痘則虛難成瘍。則慎其不出此。痘前痘後最難。要古今之通議也。當發熱三日之間急宜觀形察色審聲辨症以爲調治之方如聲重而熱則輕寒甚則風寒所束宜用

加味升麻湯

升麻

乾葛

防風

荆芥

牛蒡

連翹

桔梗

赤通

赤芍

甘草

柴胡

黃芩

陳皮

虫退

玄參

右加葱白水煎熱服令取微汗一二服間其麻即出

如大熱藥蒸肌膚乾燥目赤唇紫毛髮焦駭煩渴不寧驚狂顛  
謔便秘結而出不快者乃熱毒盛壅也宜用

枝仁解毒湯

枝子

黃芩

黃連

石羔

知母

牛子

連翹

升麻

柴胡

防風

赤芍

甘草

大便秘加酒大黃 煩躁加麥冬 咳甚加杏仁桔梗生

驚訝用鎮驚丸方見丸散條 無汗腰墮秘加大黃 再用紫

桂

水令熱氣薰之。或用酒遍身擦之然後以被蓋片時其  
即出。治風寒閉者亦如是。一若爲穢氣所觸而出不快則  
用沉香檀香荆芥燒烟薰之。

又有毒氣水盛元氣又虧而出不快者則用

人參白虎湯

人參一錢四錢知母一錢加升麻 防風 牛子 炒芩  
治癥須明時令。蓋春夏秋冬之不同，陰陽寒暑之各異，時令  
既殊，治法亦異。

時令溫緩而出不快者，以辛涼之藥發之，宜用

防風解毒湯

防風 荆芥 薄荷 石羔 知母 桔梗 生子 滻石  
木通 只羌 升麻 甘草 加灯心水煎服  
如時令晴熱而出不快者以辛寒之藥發之宜用

黃連解毒湯

防風 黃芩 黃連 荆芥 知母 石羔 黃柏 桔梗  
大青 玄參 桔梗 大通 甘草

如嚴寒大凍冷氣逼人則以辛熱之藥發之宜用

桂枝解毒湯

桂枝 麻黃酒 赤芍 防風 荆芥 羌活 桔梗  
甘草 人參 川芎 牛子 生薑引乘熱服

如時寒時煖而出不快者則以辛平之藥發之宜用

升麻解毒湯

升麻 乾葛 甘草 柴胡 前胡 赤芍 牛子 桔梗  
防風 羌活 連翹 甘草 人參 淡竹葉引

又不論四時寒暑而出不快初熱並用

宣毒發表湯

升麻 乾葛各八分 防風 桔梗各五分 荆芥 薄荷各三分 牛子  
連翹 前胡 只壳 大遜 赤芍各六分 甘草三分 大黃加  
炒芩 大寒加麻黃炒暑用竹葉引 寒用生薑引

此殊症最怕一時不得出所以必元明表人看時寒熱齊人強

弱調理散。如前用藥發散疹即隱現而透出者其毒雖  
而無事也。若發不出宜用再加味麻黃湯發散之外用芷  
酒燙蒸熱擦之自頭上至足爲齊。若出現而頭面愈多者爲  
佳。若遲延日久而不能出。腹脹氣喘昏迷不醒。則亂瘥瘞者  
則必死矣。

### 加味麻黃湯

升麻酒洗 淫麻黃蜜炒 人中黃 生子 山退去脚等分生薑引

發癉之時遍身自汗者此毒從汗散腠理開張其麻易出也。  
又有鼻中出血者亦內症不明毒從血解也。二者俱不可遽  
止。但汎出太多則恐津液耗散表虛過甚致生他症宜用當

歸六黃湯加麥芽以止之。血出不止又恐陰血耗甚不能生津降火。宜用茅花湯以止之。若汗多劫甚。置而不治則元氣虧而精神散。則正氣弱而邪必橫。將毒內攻。倒戈反掌致成莫校良可嘆也。

當歸六黃湯治自汗盜汗

當歸 黃芪 薏苡 黃柏 生地 熟地 加麥芽  
敗蒲扇燒灰調服

茅花湯治衄血

薏花 歸尾 耳叟 生地 甘草 加玄參百草霜四兩  
犀角地黃湯治火血

犀角 荷葉 生地 丹皮 外用髮底咬入鼻中其血即止

一初熱煩渴大甚者。用人參白虎湯方見生前壯旺寒熱者去人參。  
大熱不退而渴甚者加竹葉麥冬。

發熱之初或疹出之後。一切咽喉腫痛不能飲食者為毒火  
薑蒸上沖咽喉故也。宜用甘桔湯主之。更以十宣散或玉鎖  
匙吹之自愈切不可妄用瓦鋒刺其碍處令出血也。刺破則必爛矣。

甘桔湯治喉痛

桔梗 甘草 牛子 連翹 玄參 黃芩 山豆根

水煎服

十宣散吹喉口

黃芩炒柏子仁二錢苦參二錢硼砂一錢玄明粉各七乳香三分

兒茶一錢

雄黃一錢

水片一分

共爲細末吹八喉口中

口瘡亦可用之

玉鎖匙吹喉口

硼砂 朴消 蟲蟲 水片

共爲細末吹八

二聖散治喉口

苦參三錢 薑一錢

共爲末吹入

發熱之時或吐或瀉皆毒氣內逼而欲奔藏故吐瀉也吐者毒逆上行攻于胃管因吐而毒乃解瀉者毒隨下降注于

大腸因瀉而毒乃洩故大吐大瀉俱能泄毒是爲順治不必  
施治俟瘀出而吐瀉自瘳所可慮者欲吐不吐時嘔張口而  
作乾嘔此毒壅乎胃而不能出誠險症也宜用玄參解毒湯  
與灯心竹葉湯主之

玄參解毒湯

玄參 黃芩 炒枳 桔梗 甘草 生地 乾葛 芫荽

灯心竹葉湯治乾嘔

淡竹葉三十片 灯心三十根 前方並煎 或加木通 車前

活石引熱下瀉崩脫則不上逆于胃而嘔自止矣

又如泄瀉雖云順症然瀉若太甚又恐傷脾須用加味四苓散

主之。最可慮者欲泄不泄重急後重時時欲去而下此實熱滯于大腸將成痼疾之禍宜用黃芩芍藥湯主之又謂治白利者用升麻澤瀉湯治嘔逆者用竹葉石膏湯。

加味四妙散治水瀉

白朮一錢赤茯苓一錢猪苓八分澤瀉八分木通六分大棗前分生子七分

黃芩五分

黃芩芍藥湯治麻瀉下

裏急後重  
葛根

炒芩 赤芍 升麻各一錢甘草 生地 木通 大棗 只壳

歸梢各一錢川連八分人參六分加酒大劑以利之

升麻澤瀉湯治泄利

葛根

獵藥 濚瀉 滌石 赤葵參 甘草 川連  
等分煎服

竹葉石羔湯

治麻嘔吐

陳皮 法夏 石羔 茶芩 竹茹 甘草 水煎服

凡癲症初熱吐瀉切不可妄用接腎補脾溫滯之藥恐滯  
毒于內而不得出以貽後悔也

一發熱之時未有不口渴者治渴之法但當以茶豆灯心炒米  
湯飲之以入參白虎湯佐之方見前使其生津解熱渴自止矣  
若恣飲冷水恐生水薑之症益水入于肺爲喘爲嗽宜用竹  
瀉以洩肺中之水水入于肝爲腫脹爲目利水入于胃

爲嘔爲嘯須用猪苓澤瀉茯苓以洩脾胃之水 水入于心爲驚爲悸宜用赤茯苓木通以洩心下之水 水入于肺爲脇痛宜用芫花以洩肝膽之水 水入于腎爲小便不利爲陰囊脹脹宜用車前木通以洩膀胱之水但隨症用藥以調治之不可執一而不通也

癥症既出調治法

夫癥既出則毒之重輕症之順逆觀形察色可以宜知不可不詳辨也庶使症之輕者不必過慮而妄治重者則不容怠忽而不治也

凡瘧從耳項腰腿先見者吉蓋腠理既通筋骸不滯故得

此預知其毒必能避出也

凡麻項貞而不甚脹形小而均盡出者吉。蓋氣盛痰輕故圓小而盡出于皮膚之外也。

凡瘡紅活潤澤鮮明光彩者吉。蓋血活毒輕必能化毒也。以子順症皆不必服藥但慎風寒節飲食善為調護而已。如瘡色白皆吐不足也宜用

養榮湯治瘡色白

當歸 川芎 紅花 赤芍 人參 甘草

如瘀色紅赤如朱者乃血熱而兼火邪也宜用化班湯主之。人參白虎湯佐之失治若變紫色則險矣。人參白虎陽方見前

化班湯

治麻色  
紅赤

人參 知母 石羔 牛子 連翹 升麻 水煎以米熟爲皮

如麻色焦紫乾紅慘暗不明者乃毒盛火熾五死一生之症急宜涼血解毒滋陰降陽用加味四物湯主之或辰砂益元散方見九或大青湯或玄參散條而用之

加味四物湯

治麻人紅

當歸 川芎 生地 赤芍 丹皮 前胡 乾葛 連翹

牛子 紅花 甘草

天寶湯

治麻紫  
黑脫

葛參 大青 橘梗 知母 升麻 石斛 桔子 杏仁

人中黃

水煎入燒人藥味調服

如麻色黑著則熱毒尤甚爲十死一生之症須用大青湯或用

紫草解毒湯

麻黃 紫草 紅花 川甲 人中黃 蒜頭 金虫

川連 烧人糞 出退 牛子

一癰症發表之後疹子出于皮膚之間此時切宜謹慎風寒莫犯生冷若爲風寒所束閉塞肌膚或爲生冷所水濕不能出則渾身青紫毒入內攻雖有良醫莫能救矣

一癰已出而復沒者乃風寒所觸而毒氣退縮也若不急治則

必內攻而死矣。宜速用消毒升麻湯熱服之，則瘥或能復出，不然其必死也。

消毒升麻湯

升麻 乾葛 荆芥 半子 李芳各一錢 甘草 生薑引

一兒元虧毒盛，麻出復沒，日閉無魂，口不能言。請余往視，余曰：此毒隔內攻，不能撓矣。其父母哀告再三，求賜一方。余思非參連湯不可。乃曰：如必欲治，須用人參五錢，川連五錢，若減分厘，亦不見效。其家果依余言，用參連各五錢，全煎一盞，與服，奈不能進藥以然匙灌入口中，即從口角溜出。余曰：藥須難進，亦有三分之二盤，宜略遲之，再緩緩灌下，不及至夜半。

其藥性已行乃能取藥及藥服完至次日天明其服方聞曰  
方能言仍用前方與服竟愈蓋非連之多不能解其毒非參  
之重不可扶其元此重藥而祛重病之故也

一癥出之時咳嗽口渴而心煩悶者此毒在心肺二經而發矣  
盡也宜用瀉心湯或黃連杏仁湯主之

瀉心湯 治癥咳嗽煩渴

桑白皮蜜地骨皮 甘草 淡竹葉 灯心 加花

連翹 玄參 川連 川貝 等分水煎服

黃連杏仁湯 治麻疹咳嗽煩渴

川連酒炒去皮 杏仁去皮尖 麻黃去節壳 炒乾葛葛根引

一癥出之時咳嗽氣喘唇紅舌赤熱伏于內煩燥不寧口渴  
血者此實熱不宣也不拘前後宜用

化痰清火九

犀角

一兩歸尾入錢連喬

一兩赤芍

六錢牛子

五錢生地

二兩丹皮

一

川連

四錢

共作細末煉蜜爲丸如彈子大竹葉湯下

一癥出之時自利不止或瀉稀水頻數不休者最爲要候宜看其疹如何以爲施治若疹稀色淡其毒本輕而作泄者乃脾氣本弱不能制水而又積滞于腸胃使陰陽不調水穀不分而泄也宜用和胃四苓散治之若癥稠密而紅紫之甚者蓋毒注大腸宰世而解宜用平胃散加乾葛連喬以解之疹一

子病依期而收。自然瀉止。若疹收而瀉猶未止。仍是醫勢未盡。須再用前方加連翹。牛蒡。木通。車前。澤瀉。猪苓。治之自愈。若用柯。蔻。粟壳。止瀉之藥。則滯毒壅中。重則腹脹。瘡癰喘急。而死輕則必成痼疾。以爲休息之症也。

和胃四苓散

蒼朮 厚朴 赤茯苓 猪苓 澤瀉 神麌 山楂  
白芍 香附 陳皮 水通 茄草 或加肉桂

平胃散

蒼朮 厚朴 半夏 陳皮 猪苓 澤瀉 加乾薑  
連翹 升麻 等分水煎服

小兒體性怯弱氣血兩虛而出瘡症瘡色不紅者雖病後之  
兒身體瘦弱而出麻者宜用

加味逍遙散

怯弱之兒而隔離症已出未出俱宜用之

白朮 白芍 漢荷 枸杞 當歸 丹皮 陳皮 柴胡  
甘草 豚冬 乾葛 等分水煎服

一癆已出稠密不堪紅腫太甚或一癆雍出者此毒熱熾之  
故但已出于外未留于內必不至于傷生須青火解方自獲  
平安不必過爲驚惶也此等只宜用

化毒清表湯

治癩紅腫太甚一齊湧出

半夏  
炒連翹 花粉 地骨皮 川連 黃芩 山楂

元散

知母

乾葛

玄參

各八分

桔梗

前胡

木通

各六分

甘草

薄荷

防風

各三分

如口渴加麥冬

去心二錢

石膏

標三錢

大便祕

結加酒大黃

一錢分

右方解毒鬆肌清痰降火除五內之鬱熱散肌表之火邪  
滌腸胃之滯垢瘀毒甚者不拘前後俱宜用此

一疹子之出常以六時爲度如子後爲陽午後爲陰如陽候出  
者至陰分而收陰候出者至陽分而收此陽生陰成陰生陽  
成造化自然之妙故漸出而漸收者合乎陰陽消長之証其  
毒輕而症順也若麻出之後大熱不退連綿三四日而不收  
者此毒火大甚邪發未盡內留餘熱臟腑薰蒸所以外疹難

暖也宜用化班湯方見前或用消毒飲主之或用前化毒清  
表湯主之俱可方見前

消毒飲治癥紅腫難收

荆芥二錢連翹二錢甘草六分石燕 玄參各二錢桔梗

前胡各一錢黃芩 花粉 防風 木通各八分水煎服

一疹子既出熱宜漸退若遍身俱出猶沸沸大熱慎渴不寢而頻頻惡心而作嘔吐者此毒發未盡尚留于肺胃之間宜用前化班湯主之方見前或孟氏治癥方主之方見前如大便祕者俱加酒製大黃微利之如或失治必生他症矣

凡麻見形之後宜服清熱解毒之劑便毒能化而熱自退庶幾

後無變症也須用

解毒快班湯

連翹 生子 防風 刑芥各六分 虫退五分 山楂二錢 歸尾六錢  
生地二錢 桔梗 炒芩各八分 川芎五分 乾葛 紫草各八分 甘草五分

右方用觀音柳少許全煎多則不可

凡瘡既出其形色紅活上升有漿影者其毒盡化最爲上也收  
結之時竟有稀壳如疥癬者最爲吉也出齊之後其熱漸退  
收盡熱亦盡除則無餘毒爲殃矣

麻症收後餘症治法

一疹發既收之後其熱已宜盡退而反渾身發熱甚夜不退者

此毒散未盡邪火鬱于肌肉之間故如是之復熱也若不急解餘毒以退其火久則毛髮焦脫皮膚枯槁爲骨蒸發熱之症矣故當其始也餘毒發熱宜用解毒散及其繼也將成疳療則用蘆薈肥兒丸或清熱除疳丸治之遲則變誤肺之症不可救也

解毒散

連翹 牛子 知母 玄參 荆芥 前胡 地骨皮

黃芩 山楂 木通 牡草

蘆薈

肥兒丸治麻後發熱晝夜不眠  
肌膚癩瘍之症

葛根 炒胆草酒木香 唐阿皮 人參 使君子肉

標榔

黃連

酒炒

白華黃

名三

胡黃連

五錢

外加當歸連

益

各三  
共爲末用猪胆汁糊爲丸如黍米大每服五六十九米  
飲送下若不治至眼睛露白口鼻氣冷手足厥逆則必  
死矣

清熱除疳丸治全前

川連

當歸

各二

龍胆草

一錢

川芎

五分

青皮

錢

陳皮

使君

子肉

各一錢

乾蟾頭

一錢

蘆薈

一錢

胡黃連

二錢

神曲

錢

共爲末

米糊爲丸

水送下

一麻收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩渴不寢驚搖頭痛  
神昏智亂如見鬼神者此陰血衰耗致毒邪入肝而傳于心

故也治宜安榮養血定志寧神須用當歸養血湯加黃連  
神九丸之

當歸養血湯

當歸 川芎 生地 麦冬 木通 茯仁 芫草

淡竹葉 山楂仁 灯心湯引 大便秘加酒大黃  
黃連安神丸

黃連 肉草 石菖蒲 茯神各一錢  
當歸一錢 金鷄子七个 去刺

共爲末湯浸蒸餅和猪心血爲丸砂爲衣灯心湯引

又麻後驚搖余常用鎮驚丸亦效方見九散條  
癩後面青唇淡精神困倦氣血兩衰者宜用

調元健脾湯

治癰瘍後瘦弱成瘡

桔芩 人參 黃芪 丹皮 沙參 白芍

炒甘草

當歸

百合 以石 穀冬 各等分 如有酒鴻鴻白色者加木

香白朮 柯子少許 濉黃色者加炒芩草前

一 麻後失調體倦氣虛或成瘡積泄瀉等症宜用

健脾肥兒丸

人參

五錢炒熟研末

神曲

炒熟研末

杏仁

炒熟研末

川連

一錢

桑白朮

炒熟研末

甘草

炒熟研末

白扁豆

炒熟研末

川連

一錢

桔梗

炒熟研末

吉紅

炒熟研末

當歸

炒熟研末

陳皮

一錢

地骨皮

炒熟研末

白茯苓

炒熟研末

白朮

炒熟研末

白朮

一錢

淮山

炒熟研末

百合

炒熟研末

白朮

炒熟研末

白朮

一錢

共爲細末煉蜜爲丸如彈子大空心白湯送下

一 痘後毒流入胃致牙齦爛口臭牙癧常常出血爲走馬牙  
疳及兩頰浮腫久而穿爛破腮缺唇崩齒迨齒落盡而後乃  
死此最危之症甚堪慮也其初牙癧血出或口鼻時卽宜以  
清胃化毒湯或噙且服甚則呂文鈞散斑、雄黃散擦之又用  
人中白散或清胃敗毒散與服又外用拔毒散以擦患處亦  
或有能愈者然牙疳旣甚則不治者恒多也

清胃化毒湯

石羔三錢甘草 生子 連翹 生地 炒芩 檀香各二  
使君子肉六分 紫草分金銀花 前水時噙與服  
人中白散治牙疳

人中白  
周身小推  
鼻瘻藥  
便當裏肉  
瀝脂頭  
川連  
脂等分爲末蒸餅作丸服

清胃散治牙疳

蘿蔔  
丹皮  
甘草心  
連翹心  
生地黃  
金銀花  
桑白皮  
沙參  
茯苓  
黃柏炒  
等分服弱者加白朮  
文蛤散治牙疳

雄黃五倍子一錢  
枯柏一錢  
退紙燒灰一錢

共爲末先將清茶或米泔水洗淨然後以末藥敷之

雄黃散治牙疳

雄黃一兩  
桔梗一錢  
蛇床子一錢  
共爲末先以艾葉煎湯洗淨然

後用此末藥敷上 又有加貞柴燒灰者更妙

救苦散治牙痛

人中白青鹽分水片白芷生石錢加牛黃  
更妙 其爲末先以清茶洗淨後將末藥敷上

一癥出之時暫作泄瀉未經清解以致熱毒逗留於腸胃及麻  
收之後變爲休息病者或赤或白重寒後重晝夜無度煩躁  
欲去終莫能止者此餘熱流滯于大腸也須辨虛實而治之  
甚熟者用三黃丸利之 虛者用香連丸角之 後用黃芩  
湯 或清熱導滯湯治之總以養血行氣爲主 獅河潤目  
養血而下痢自行氣而後重自除誠治痢之要訣也

三黃丸治癰後癟病

黃芩

酒川連

酒大黃

酒枳

酒黃芩

酒三味等分共爲細末米糊作丸如

梧桐子大每服三十九粒心口水送下

香連丸

治一切癟病

川連

一兩外用吳茱萸五兩

浸水同炒去茱萸不用

木香三

共爲末以醋糊爲丸

如梧桐子大米湯送下

清熱導瀉湯

黃連

黃芩

白芍

炒山楂各二

錢厚朴一錢

甘草一錢

生子一錢

梔榔各去

心皮當歸

甘草一錢

連翹各五

錢加紅花三分

地榆

五分

分枝甚者加酒大黃

錢二

生薑一片引

此方以芩連喬旁甘草清熱解毒。五味子桔梗川芎  
行氣歸芍桔榆活血。行滯去茹生新誠治麻痘之良方  
也。此方去喬旁加三秒莪朶可治痘熱成痘。

一、痘退之後時時咳嗽者此肺經尙有餘毒而未能盡解也。宜  
用清肺飲與消毒飲主之。若嗽太甚氣喘聲啞。連聲不佳甚  
至食穀則噦。飲水則嗆。咳嗽出血者名爲頓嗽。此熱乘於肺  
而然也。宜多服麥冬清肺湯。加連喬主之。若見胸高如圭。看  
鏡而喘。血從口鼻中出。擺首搖頭。面色青白或紅而慘暗者。  
則毒留已甚。肝肺受傷不可治矣。然亦有肺氣虛弱而爲熱  
毒過壅。肺氣不暢致咳逆喘急發嗽連聲而不已者。但嗽無

由出候食不喫耳凡如此者須用清肺飲加入參王亦不可因其咳嗽拘于肺熱遂概以清涼之藥治之也

清肺飲合消毒飲

治麻肺熱咳嗽

麥冬

桔梗

知母

桑白皮

蜜水炒

地骨皮

天花粉

甘草

各一錢

牛子

防風

荆芥

各一錢

加淡竹葉

煎另加人參

麥冬清肺飲

治麻肺熱咳嗽

知母

川貝母

天冬

麥冬

桔梗

陳皮

杏仁

牛子

馬兜鈴

石羔

桑白皮

用糯米一撮同煎

一底後咳嗽內熱不清心神恍亂夜卧不安且脾虛或玉瘡者宜用

天氣膏

生地四兩麥冬去心四兩玄參

知母

生黃芪各四兩白茯苓

桑皮

炒名一兩沙參

桑白皮

生以仁

白朮

炒名四兩丹皮

茯神

紫苑

當歸

橘紅

各二兩以上諸藥各依分兩取

長流水浸諸藥乃入沙鍋內以桑柴燒火用文武火緩緩

前熬令藥水成膏再加白蜜八熬然後取起盛淨器中去

其火氣每服三五茶匙以白湯調下

一麻退之後咳嗽聲啞肺熱不退日久延綿而不能愈者此青  
火未除肺金受剋故如是也宜用

清金降火湯

治麻後身熱不退咳嗽聲啞

當歸洗白芍炒陳皮 甘草 川貝母 瓜蔞子 白茯苓

玄參 炒芩 山枝炒天冬 藜冬 桑白皮 杏仁  
石羔炒蜜酥 桔梗 黃連炒 各等分生抽引

一麻退之後或有餘毒而發瘡毒肢節疼痛者宜用

薑活散 治療後瘡毒

薑活兩川甲大黃 全蝎名五錢一葉金三条去頭足白芷稍五錢  
甘草節一錢乳香 没藥各一錢或加皂角刺一錢

右共爲末好酒調服令取汗爲度

一癥退之後餘毒未盡而熱之甚者致口鼻出血須用犀角地黃湯合解毒湯主之或用四物湯加茵陳木通之類以利小

便使熱氣下瀉于膀胱而自愈也

犀角解毒湯

犀角 生地 赤芍 丹皮 黃芩 黃連 枝子 等分

右方以諸藥共煎另將犀角磨汁調服

加味四物湯

當歸尾 生地 赤芍 川芎 茵陳 枇子 木通 杞子  
牛子 運喬 知母 活石 芫草

等分煎服此滋陰降火令火下行之義也

一痳退之後餘熱未盡熱乘于心日夜煩躁狂言妄語人事不  
清治此法宜退心經火邪祖心與小腸相連欲退心火頗

利小便宜用辰砂益元散主之。或用辰砂五錢水通五錢黃連一錢。辰砂益元散。

滑石

飛過六兩甘草兩辰砂五錢木通五錢車前五錢黃連二錢

另將辰砂乳成灰塵。青與諸藥末合研匀。燈心湯下。

辰砂五芩散

辰砂乳白芷 藁苓 猪苓 溼葛 腸桂 炒芩 炒連

共爲細末。灯心湯引。

升麻葛根湯

升麻 杜葛 赤芍 甘草 寒冬 共煎調益元散服

麻退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如雨者此元氣虛弱失於調理外雖無病更甚空虛偶然吐惡朝發夕死然痛之不甚或因感風寒而痛者須用升消平胃散方見九散條加木香治之

又有麻後身熱不退飲食不進常當腹痛者此餘毒內留而作痛也須用大黃化毒湯令其下泄則毒退熱除而痛定矣

### 大黃化毒湯

芍一錢厚朴一錢陳皮七分甘草三分大黃一錢只兒一錢

一兒麻後身熱痰涎壅盛咳嗽喘急胸高心膈苦嘔瘻渴請余往視余先用通開散少許吹入鼻中須臾噴嚏流涕吐出陰

涎再用鎮驚丸

方見散策丸

其心漸平。瘧乃不鳴。其後用

黃芪

當歸

白芍

前胡

連翹

牛子

桔梗

陳皮

黃芩

花粉

川貝

馬兜鈴

燕芥

知母

甘草

生地

等藥爲末與服乃愈

一麻後聲啞者用雪梨水與服能開聲音或用乾梨子煎水與

服亦可

或用百合花亦可

或用葛荷煎水亦可

一癩發痒用酒遍身擦之其痒即止

一癩後須慎風寒水濕蓋疹出之後腠理疏通皮膚必微且毒  
從腋出以達筋骸是以筋骨空虛肌膚不秘若受風寒水濕  
之毒而爲終身之患可不慎乎

平素

一病後須節飲食。蓋疹出之後。內脾空虛。肺爲之變者。悞服煎炒致熟。留腸胃而成痼症。以及心腹疼痛之病。悞服生冷。恐脾虛不能转化。致成瘡塊之虞。且食肉太早。則每歲逢出疹之月。多致下痢。腥血。悞食鷄魚。則終身皮膚癩起。猶如鷄皮之狀。但退時行疹。疲又復重出。悞食蘿蔔。致令咳嗽。悞食五辛。則主驚熱。種種餘症不能盡述。必待四十九日或五十日之後。方無禁忌。欲免後患。須宜節之。

孕婦出疹

凡孕婦出疹。必要安胎。胎動則內脏空虛。不能送房。必致內攻而死。治此之法。須用四物湯。胎加白朮砂仁。條芩艾葉以安。

胎清熱爲主胎若不動則疹亦易出也。如胎氣上注急風  
苦麻根艾葉煎湯磨極細調服。

一熱毒蒸胎胎多受傷然胎落而母自安蓋疹與痘不同痘要  
內寢故胎落而母亡疹要內虛故胎去而母存前以安胎爲  
訓者貧母子俱存爲仁人之善術也

種痘新書卷之十一終