

麻科活人全書

卷之三

安成

璣齋謝玉瓊纂輯

怡菴彭

肇續刊

阜山劉齊珍原刊

咳嗽第五十

發熱蒸七咳嗽頻。涕流鼻孔。渴滿睛。面浮眼腫。雙腮赤。此是天行麻毒侵。

發熱蒸七。咳嗽頻。目腫面浮。氣上行。坐臥不安。痰唾少。肺葉焦舉。熱邪蒸。

麻症百聲。咳不歇。初熱未出。止相宜。不咳少。咳皆不順。歇咳須要用陳皮。

正收收盡宜無咳。此時有咳須早醫。清金湯火為急務。及待危時悔是遲。

麻毒連綿上氣喎。發作百聲終不歇。胸高肩聳蝦長流。擺手搖頭泉下客。

天行麻疹與傷寒相似。惟麻則噴嚏鼻流清涕。眼胞腫目赤。汪汪之為異耳。但見此等症候。真是麻症。夫麻原發於心。心火內亢。則肺金受尅。以致肺葉焦舉。故有咳嗽。法當清金湯。火以加味。人參白虎湯見二十一條。去人參。甘草。粳米。加牛蒡子。連翹主之。有用白虎湯大補丸二十去甘草。粳米。加牛蒡子。薄荷。菜治之者。或以三味消毒散合渴白散二方。俱去甘艸治之。

方中桑白皮。取採鮮者多用為炒。熱甚煩渴者。加知母。天花粉。石膏。黃芩之類。如咳甚者。以二母散。或麥門冬湯。除去升麻。亦芍甘艸。或清肺湯去吉梗甘艸加蘇子。或秘本清肺湯去吉梗甘艸。或聶氏清肺飲去柴胡陳皮吉梗甘艸等方。隨見而用之。然確宜清熱透毒。不可止咳。故古人多用清暢飲子去甘艸。加速翹主之。慎勿用五味子。及收斂等藥。秘塞肺竅。令咳嗽終身不已。只宜清餘熱。消痰壅。而咳自止。貝母。麥冬。飲除甘艸吉梗。加速翹牛蒡子。黃芩。黃連之類。前後咳嗽俱可施用。夫寐有咳。則肺氣疏通。毛竅開豁。而寐則易於出透。所以寐症初熱未出之先。最喜咳嗽。多咳則為順候。俚言。

所謂摸麻是心脾發出透。則心經火息。肺無魁伐。而咳自止。正出之際。若無連聲咳嗽。反少咳嗽。不咳嗽。則膜理閉密。難透表。急於升發藥中。多加留白陳皮。以啟其咳。使毛竅開洩。腠理舒暢。而麻自易出透矣。已出之後。及將收收後。則又以無咳為佳。如麻已出。而咳不止。身熱作渴。煩燥不食。脉洪者。以古方黃連解毒湯。見三十加生地黃鮮骨皮治之。肺熱如哮喘者。用生地黃散。去陳皮。加黃芩。草薢。桑白皮治之。喘甚者。加桔梗霜。北芥子。蘇子。萊菔子。治之。出盡及收後。微匕咳嗽者。此餘邪未盡。肺氣未平也。不須服藥。若欲治之。則以湯白散。合三味消導散。俱去甘艸。與服。如肺燥塞不利而咳。

者。以利金湯去陳皮吉梗甘艸生姜加麥冬牛蒡子黃芩桑白皮治之。麻盪遠而壯熱咳嗽大便閉者以除熱清肺湯去赤芍甘艸加黃連黃芩地骨皮火麻仁只壳以清利之。或加大黃下之如出盪及收後咳嗽甚而仍不止者是屬於熱治宜清熱降火佐以消痰之品以清咽滋肺湯去玉竹吉梗甘草加黃連桔黃芩或薛氏清肺飲去陳皮柴胡吉梗甘艸加貝母黃連主之出盪收後咳嗽不止而多痰者以清咽滋肺湯去玉竹浙麥冬吉梗甘艸加只壳茯苓陳皮治之或薛氏清肺飲去北柴胡吉梗麥冬加只壳治之若麻至五六日而仍咳嗽氣粗外熱不退乃尚有餘毒留於肺胃宜用孟介石

清肺飲除僵毒，紫胡陳皮吉梗甘艸加地骨皮桑白皮葶苈治之。或以靜遠主人清肺飲去吉梗甘草，石膏黃芩治之。如麻後咳嗽，聲音不清，不思飲食，眼目干，口乾燥者，以清肺消毒化痰湯去吉梗甘艸治之。若麻後氣喘，咳嗽連聲不住者，此乃毒流於肺經，肺中伏火，金虛葉焦，故咳嗽連聲不住也。以秘本門冬清肺湯或用骨皮清膈散俱去桔梗甘艸糯米治之。如體熱者亦以秘本門冬清肺湯去甘艸吉梗糯米加黃連黃芩牛蒡子治之。咳嗽甚而氣喘連聲不住，甚至飲食喫水者，此熱毒乘肺而然也。亦以秘本門冬清肺湯去甘艸吉梗糯米加蜜足杞葉治之。見血者再加茅根阿

膠治之。如咳嗽有吐血者。以麥冬清肺湯去查內吉梗加生地黃主之。兼有喰水者亦以此方除查內吉梗治之。如麻後咳嗽氣急者。以只壳前胡湯除甘艸吉梗以蘇子易蘇梗。加芥子萊菔子草庵括姜霜以治之。然亦有加沉香者。在麻後似亦無害。如麻後但氣粗者。以蟲氏清肺飲仍除柴胡吉梗甘艸加芥子蘇子萊菔子草庵治之。如麻後咳嗽不止。內熱不清。心神不寧。夜臥不安。以天真膏除黃芪白朮薏苡仁。加酒炒黃連酒炒黃芩辰砂主之。如麻後咳嗽失聲發熱者。以夢慈丸加地骨皮天花粉酒炒黃連黃芩水煎與服。麻後咳嗽腹脹喘急。煩躁泄瀉聲啞唇青口青者。以賈蘭峰傳方除。

麻黃陳皮桔梗甘草白芍加麥冬骨皮芥子治之或不除白
芍更加紫胡亦可此在麻後活法變通在乎其人然切不宜
遂用白朮等味如麻後久咳不止以生地黃當歸身白茯苓
川貝母桑白皮杏仁柿霜等味以養血涼血清金而咳自止
然竟有以四物湯見二十一五味合只吉二陳湯加桔梗霜杏仁治
之者雖曰無碍反不若以前之七味治藥簡而功捷也如兼
渴者如麥冬只壳東莞者加薑子芥子治之或更加葶苈萊
菔子亦可其有感觸風寒咬嗽煩渴嘔逆清水眼赤咽痛口
舌生瘡者以防風敗毒散或織加生黃芩治之如咳聲氣喘
脣焦熱結在內煩躁不寧或口鼻出血不拘前後並可以服

角解毒化痰湯去赤芍甘艸。加麥冬杏仁葶苈酒之或用五
氏清肺飲去陳皮柴胡淡竹葉甘艸吉梗。加黃連當歸尾治
之。收後如見此候以加味人參白虎湯見二十九條去人參甘艸
糯米加生地黃地骨皮黃芩以滋潤之。倘或久咳不止。面浮
目腫。胸高如龜。肩聳氣喘。搖手擺頭。口鼻出血。面色或青或
赤或白而枯。鼻燥昏悶者。皆不治之症也。

三味消毒散 治咽喉疼痛及痘疹已出未出。尚未出。又治
一切瘡毒並能涼膈消癰。

牛蒡子炒研二兩 荆芥穗二錢 半草五錢

研末每用三錢水煎服

渴白散 治喘嗽並脾經肺有熱目黃口不吮乳

桑白皮 糯地骨皮各一錢甘艸五分

粳米一百粒引水煎食後服

加人參白茯苓知母黃芩名加減渴白散治肺炎喘嗽

二母散 治麻後咳嗽甚及肺熱咳嗽

知母 貝母去心童便洗 生姜一片引水煎服

或薑末白水下一錢

參門冬湯即二十八條內葛根參門冬散去人參變易藥

麥冬桂 葛根 薰白膏各一錢 苍苓 赤芍藥

酒炒各半錢

升麻 茄甘草各四分水煎服

清肺湯 治癰後咳嗽甚

桔黃芩 貝母 却母 吉梗各七 防風 炙甘草各四

水煎服

秋本清肺湯 治不時咳嗽寒熱唾紅

黃芩 當歸 薏冬 防風 赤茯苓 生地黃 連翹

蘇葉 前胡 吉梗 甘草各五 桑白皮錢 水煎服

聶氏清肺散 治癰後氣粗咳嗽

桑白皮炒 地骨皮去骨各 五分 錢五分 天花粉

元參各八 柴胡分 吉梗 黃芩酒 川木通去皮各 七分

熟石膏 生地黃各一 陳皮 生甘草去皮各 三分

清楊飲子

痘瘡主方

西河柳

五錢

麥冬

元參各二錢

牛蒡子炒

葛根各一錢
五分

知母

蜜炒

蟬蛻肚

洗去土

薄荷葉

荆芥穗

甘草各一錢

淡竹葉

三片

水煎服

貝母麥冬飲

貝母

麥冬

薄荷葉

元參

桔梗

吉梗

甘草

水煎服

生地黃散

治麻肺熱喘咳斑疹身熱口乾心煩

生地黃一錢

麥冬五錢

杏仁

桑白皮

陳皮各八分

水煎服準絕有甘草一書並有桔梗

利金湯 治肺燥塞不利而咳

貝母 桔梗 尺壳 陳皮 吉梗 甘草 生桑白皮引

除熱清肺湯治癆盡透而壯熱咳嗽大便閉結

石膏殼 麥冬去心錢五分 元參 生地黃 貝母 桔梗根

亦芍藥各一 甘草紅 水煎溫服

清咽滋肺湯 治麻後餘熱咳嗽聲嘶

元參 牛蒡子 荆芥 貝母 麥冬 桔梗根 馬鳩鈴

明玉竹 吉梗各八 甘草四 水煎服

前方繆仲培有薄荷無馬鳩鈴

孟介石清肺飲

熟石膏 生地黃各一錢
元參茶 胡鉗一錢
僵蠶炒五隻
來冬 雞子
甘草去皮三分
當歸尾 黃芩
知母炒 吉梗各七分
燈心五十寸引

靜連主人清肺飲 治癥後傳肺胃二經嘔嗽喘急

來冬 牛蒡子 防風
吉梗 甘草 水煎服
桑白皮 地骨皮 知母

清肺消毒化痰湯

牛蒡子 荆芥穗 防風 貝母各五分連翹 黃芩 前
胡 茶分七只壳 吉梗各一錢甘草三分

水煎作十餘次徐徐服

秘本門冬清肺湯

天冬
麥冬
知母
貝母

杏仁

去皮尖炒研

石膏
骨皮

牛蒡子
款冬花
桑白皮

馬兜鈴
吉梗

甘艸

糯米引
水煎服

石膏清膈散

黃芩

二錢五分

石膏

七分

滑石

五厘

地骨皮

當歸

知母

桑白皮

紫苑草蜜炒

白芍

荳蒼

甘梗

甘艸

姜三片引

水煎服

前方加人參

柴胡白芍白朮黃芩蜜炙各

名人參清膈散治

肺熱鼻乾涕唾稠粘

麥冬清肺湯

麥冬 知母 貝母 黃芩 杏仁 天花粉 只壳
陳皮 丹皮 薑內 吉梗 水煎服

只壳前胡湯

只壳 前胡 防風 赤茯苓 薑梗 吉梗 甘草
水煎服 氣急者以沉香磨水對服

天真膏 治麻後咳嗽不上內熱不清心神不寧夜臥不安或

生瘡疥

生地黃 麥冬 元參 白茯苓 紫苑草 知母 陳皮

桑白皮 沙參 生黃芪 薑苡仁 李人 丹皮 茯神
當歸身 白朮

右以生地麥冬元參沙參黃芪苡仁炒。白朮為君。白芨芩炒
棗仁茯神當歸丹皮陳皮紫苑草為臣。知母桑白皮為佐。
入砂鍋內以長流水浸用。桑柴文武火煮兩時辰久。水乾再
添水於內。取出去滓。將藥水清後入砂鍋再熬。加蜜和成
膏。以磁罐收貯。每用三匙。滾水調服。

葶苈丸 治麻出氣喘。將成風胸。

葶苈子隔姜炒 漢防已 牵牛子炒 杏仁去皮 茄菔子
水煎服 大便溏滑者除牽牛

賈蘭峰傳方

黃連 黃芩 連翹 元參 知母 杏仁 乾葛 麻黃

牛蒡子 陳皮 厚模 白芍 吉梗 甘艸 水煎服

只吉二陳湯

生夏姜竹薄

陳皮去白

白茯苓各一錢

甘草分

只壳

吉梗各八

姜引

水煎服

犀角解毒化痰湯 治癥後嘔嗽氣喘脣焦結熱在內煩躁不安或口鼻出血

犀角汁磨

丹皮 連翹

貝母

天花粉

薄荷

紫艸草

甘艸梢各一錢

當歸

牛蒡子

赤芍

生地

黃芩

黃連分五

淡竹葉

三十

水煎服

氣促發喘鼻扇胸高第五十一

氣促原因肺未清。開口出納喘候真。鼻扇痰鳴肺將絕。胸高定歸幽冥。

氣促之症多緣肺熱不清所致。治法當分時候。若見於未出

及正出之時。藥宜疏托以清熱透肌湯見二十條去甘草主之。

如見於正收及收後。藥宜降火及潤肺氣以清咽滋肺湯見五十一條

補去生竹甘草。加茯苓陳皮以消痰。若開口而作出納

胸肋高聳起止不常不定是為喘症。乃屬痰火之候。熱邪壅

遏肺竅氣道阻塞而然也。然喘症有虛實之分。實者易治虛

者難為。欲察其虛實之確。在於大便之溏泄。小便之清利大

便之聖結小便之赤瀉上別之若大便溏泄小便清利。脣白而身無大熱皆為虛症。縱以半夏蘇子芥子夢懸吉梗甘草萊菔子陳皮南星茯苓之類以清痰潤肺多難獲效實則大便堅燥小便赤瀉脣紅而身發壯熱用甘草吉梗陳皮枳壳蘇子括薑仁杏仁桑白皮黃芩黃連天冬麥冬等味多易於取效果保實者以竹葉石膏湯見二十一條去人參半夏炙甘草粳米加括薑仁貝母北芥子治之。冬月更加蜜酒炒麻黃少許可以隨手而應。大抵未出時而喘者易治。收後而喘者難治。如發熱時多喘邪熱壅於肺故也。慎勿用定喘之劑。惟宜以大劑石膏知母竹葉湯或潤前功根湯去甘草主之。初發

熱而喘者。以麻黃湯去甘艸。加連翹牛蒡子只壳。或以清金散火湯去吉梗甘艸。加酒炒黃芩杏仁連翹只壳治之。初發熱未出之時而喘者。以三拗湯去甘艸。加荆芥石膏芽茶治之。如肺炎喘。以加味瀉白散去甘艸。人參主之。發喘而鼻黑乾燥者。以白虎鮮毒湯。大經二十主之。如痰實壯熱。胸中壅悶。則喘急以前胡只壳。除甘艸。加貝母黃連黃芩括萎霜治之。如麻已出而喘者。用加味清肺降火湯主之。如麻出三日後而作喘者。急以靜遠主人清肺飲。見五去知母吉梗甘艸。加杏仁括萎霜芥子治之。或以生地黃散。見五治之。如麻後發喘。以清咽滋肺湯。見五去玉竹吉梗甘艸合白虎湯。

見二十
六條

去甘艸粳米以滋潤肺胃。若麻後而喘。日久胃虛。不

可用白虎湯。見二十只宜以靜遠主人清肺飲。復主之。麻

後如有日久發喘不歇者。以小柴胡湯。見二十以貝母易半。

夏沙參易人參。加五味子從權治之。若喘而無涕。兼之鼻扇

者。則難治矣。蓋鼻扇症。肺氣將絕。若鼻扇而兼喘滿痰鳴者。

此必不治。如鼻扇而咽喉清利。無喘滿而精神似故。不減者。

十數二三。宜滋培肺氣藥以潤肺清痰為主。以補肺阿膠散

治之。收後而鼻扇者不治。若麻喘而胸高者。乃肺經熱甚。而

眼起者也。其症多見於正收及收後。凡癥見胸高之症。為肺

寒。乃不治之候。有用葶藶桑白皮散治之者。亦僅十全一二

而已。若冀其施無不應，未之有也。

石膏知母竹葉湯

石膏

五錢至一兩

肥知母

一錢至三錢

淡竹葉

三十片至一百片

麥冬

五錢至一兩

薄荷葉

二錢

西河柳

兩

水煎服

檉前葛根湯

西河柳 前胡 葛根

荆芥穗 貝母 元參 知母

麥冬 甘草 水煎服

麻黃湯

麻黃

泡去

杏仁

去皮尖油

甘草各

五

石膏 腸茶葉各

一錢

一方去石膏加桑白皮

水煎服

清金散火湯

麻黃泡末

蘇葉

牛蒡子

吉梗

甘艸

水煎服

三拗湯

麻黃不去節

杏仁

不去皮尖二十粒

生甘草

水煎服

加桔梗荆芥名加味三拗湯

加味薄白散

桑白皮

地骨皮

白茯苓

知母 黃芩

人參

甘草

糯米一百粒引水煎食後服

前胡只壳散

前胡

只壳

赤茯苓

炙甘草

各五錢

大黃

量減

右㕮咀每服三錢。水一盞。煎六分。旋服。

加味清肺降火湯

治麻出喘急

陳皮
桔黃芩
麥冬
桑白皮
生地黃貝
枝仁
括蒼仁
天花粉
石膏
葛根子
一地骨皮
蘇子炒
燈心二十根。引水煎服。

補肺阿膠散 治肺虛有火嗽無津液而氣硬鼻扁

阿井膠

蛤粉炒一兩五錢能補血液清肺滋腎益血

陰氣噴則不硬液補則津生大便而緩解

馬兜鈴

一兩良師故入肺清熱降火

熱降大便而緩解

牛蒡子

炒一兩利膈滑痰而解毒能治火嗽

杏仁

去皮尖七個潤肺止嗽

粳米

一兩
隔夜
脾胃

炙甘草

一兩
研

水煎服

李時珍曰補肺阿膠散用馬兜鈴。味取補肺。取其清熱降氣而肺自安也。中間之阿膠。乃補肺之正藥。要知清熱降氣漏之。即所以補之也。若耑於一味用補。反能助肺火而增咳嗽。

芩桑白皮散

治胸高氣喘

芩桑子

隔夜
炒
香研

漢防己

杏仁

貝母

蘿蔔子

姜汁
炒研

紫蘇子

炒研

桑白皮蜜

只壳

黃芩

北芥子

姜汁
炒研

二劑水煎服

胸高而喘者加蜜炒森黃芩

約言第五十二

喉中齁七吸船上毒火不得發越者。未出正出十全。一正收坎復難治也。

麻傷肺胃。如喉中有痰齁吟而鳴者。其症屬燥火之候。此因專火內結之極。邪熱阻逆不得發越所致也。若見於未出正出之間。泊當清肺降火消痰為主。十中可救一二。以除熱清肺湯見五條。赤芍甘草主之。若見於正收及收復者。必邪熱未透。毒火傳裏。或露風早收。餘熱內攻。而肺氣受傷也。實為難治。此症宜防之。未得之先。

瘡啞聲音不清第五十三

咳嗽明傷聲瘡啞。非與痘瘡同例也。此乃麻疹之常候。認作危症是愚者。

麻本屬火。瘡啞乃麻之常候。多吉無凶。不可以痘瘡瘡啞比。例盡因肺胃熱邪為風寒所襲。不能盡達於表。咳甚咽傷故瘡啞也。治宜清肺降火消痰為主。以清咽肺湯。丸五錢除去王竹吉更甘草。加黃芩木通主之。若肺熱咳嗽聲啞者。以萬氏清肺飲去菖蒲。訶子仁。吉梗加黃芩貝母主之。若聲瘡而咽痛者。以射干消毒飲去甘草加黃芩山豆根主之。如麻後聲音不清。咳嗽不思飲食。眼目不清唇口乾燥者。以清肺消

毒化癰湯見五去吉梗甘草加麥冬黃連天花粉主之如心虛聲音不暢者以導赤通氣湯除去甘草人參加沙參主之如係肺熱聲音不清響者以甘草清金散主之兼有咳者以清金降火湯主之或以驗方治之

射干消毒飲

射干 元參 連翹 荆芥 牛蒡子 甘草 水煎溫服
萬氏清肺飲

麥冬 荆芥穗 天花粉 知母 吉梗錢一 石菖蒲

芍子仁 各八分

水煎

導赤通氣湯

木通 土地黃 麥冬 當歸身 石菖蒲 人參 半夏
燈心引

甘桔清金散麻後肺熱聲音不清有用之而瘡甚者宜刪
桔梗一兩 甘草 連翹 蘿子皮分五錢 牛蒡子七錢
為末每用一錢加薄荷葉少許水煎服

清金降火湯 治麻肺熱聲啞咳嗽
清金降火湯 治麻肺熱聲啞咳嗽

當歸 白芍藥酒 生地黃酒 桔梗仁 白茯苓 陳皮
貝母去心姜汁蒸熟 桑白皮蜜炒 麥冬 黃芩酒炒 杏仁去皮尖
苦連炒酒 枝仁炒 元參 蘇梗 石膏 天冬 甘草
姜三片引水煎服

治麻後嘯噏失聲驗方

牛蒡子 黃芩 天龍粉

薄荷葉 桔梗 甘草

水煎服

既逆第五十四

既逆雖曰有虛實麻症實多虛無一火因逆氣上冲暎胃火炎
作既逆

既逆之症乃氣逆上冲而作聲也其症雖有虛實之分而麻
屬火候而發既逆乃胃火上冲所致實者八九而虛者未嘗
見一二也治法宜以清火安胃為主如審熱痰火發既逆者
以竹茹柿蒂湯去半夏甘草加貝母石膏二錢如既逆不止
者以安胃散去杏肉治之若既逆一連二三十聲不歇者以
紙條塞鼻孔中得宣即已或以生姜汁同蜜汁煎熱頓服之
亦可

竹茹柿蒂湯

竹茹 柿蒂 陳皮 半夏 半草

因惱怒發呃者加柴胡青皮黃芩

安胃散

陳皮 茶芽 木通 澤瀉 黃芩 石斛 無肉

水煎食速服 胃火甚者加石膏

噴嚏第五十五

噴嚏能令肺氣清。始終有嚏。必輕。若還鼻塞而無噴。風邪胃
寒毒來侵。

麻疹初起而多嚏者。乃內火因風邪搏激而然。故有噴嚏者。
則肺毒得解而肺氣全通矣。初熱未出之時。若有噴嚏者。必
是先因外感而後得通也。其毒雖凶可救。正出之時有噴嚏
者。其麻必輕。收後而尚有噴嚏者。方為盡退。乃毒得盡解可
無餘患矣。若突而多涕。渴壅得泄。肺氣自清。最為吉兆。若無
嚏而鼻塞不通者。必有風邪留滯。如清肺湯見五條除去。吉便
甘草加荆芥薄荷葉連翹牛蒡子只壳赤茯苓或利金湯。見

附去吉梗甘草生姜加赤茯苓薄荷葉連翹牛蒡子或全書
除熱清肺湯等方俱可施用但凡遇有鼻塞不通之症總宜
用辛涼之劑以速達之如荆芥乾葛牛蒡子薄荷葉麻黃辛
散之品元參石膏淡竹葉桔梗根清涼之味在所當施

全書除熱清肺湯重出 治心火清肺金主方

麥冬 黃芩酒炒 石膏 元參 生地黃 芥母 赤茯苓
水煎服。壯熱加地骨皮。壯熱大甚更加黃連。
氣粗加革蔴子括囊霜。氣喘加蘇子杏子
便閉加大麻仁只壳。便閉甚加大黃。

鼻通多涕鼻乾無涕第五十六

始終多涕木屬吉。鼻乾無涕肺府熱。其間形症有數般。叮寧良工細認識。

鼻通多涕。肺氣順也。所謂多涕者。鼻常有涕。非鼻涕暫見比也。麻症得肺府平和。鼻無阻塞。此為順候。初熱至出時。多涕者。皆為吉兆。收後亦以多涕為易治。至於鼻乾無涕。必須鼻孔之內。絕無物塞。而鼻乾燥。方是真候。此乃肺府熱極閉塞而不通也。初熱未出之間。見之。其症必重。以清肺飲去陳皮五味子。桔梗甘草合清揚飲子。見五除甘艸淡竹葉加石膏黃芩。更量加蜜酒炒蘇黃。以解表而疏通肺氣。或以荅氏第

二清肺飲去柴胡陳皮姜黃桔梗歸尾淡竹葉合蘇葛湯見六
條去柴胡赤芍甘草加只壳治之若已出大熱致鼻乾無涕者此症亦重宜以全耆除熱清肺湯見五十
條加黃連地骨皮連翹牛蒡子只壳治之或暫有而暫無涕者雖重亦可救以杏仁清肺湯去吉更甘草加黃芩治之又有先無涕其後熱過鼻通有涕者又有因熱甚鼻外被裏乾結似於無涕者以利金湯見五
十條去吉梗甘草生姜陳皮加牛蒡子黃芩赤茯苓連翹治之或更加桑白皮杏仁治之以上數症總皆要肺氣通暢雖凶可救醫家須宜詳察施治

杏仁

貝母

茯苓各一錢

陳皮

吉梗

五味子

甘草各五分

水煎服

聶氏第二清肺飲 治麻出四五日同時有餘毒留於肺胃之
嘔嗽氣粗外熱不退

熟石膏

生地黃各一錢

元參

柴胡各一錢

麥冬二錢

陳皮六分

枯黃芩

酒炒五分

當歸尾

知母炒

淡竹葉

吉梗各七分

僵蚕

炒五分

生甘草

去皮三分

燈芯引

水煎服

杏仁清肺湯

杏仁

麥冬

貝母

款冬花

牛蒡子

吉梗

甘草

水煎服

微汗自汗大汗無汗第五十七

微汗常出然不留初出未收總麻升發之味須禁用之大洩反為仇

自汗之症屬陽虛麻後見之更可危勿令見風感瘡病治陰抑陽症自除

發熱渾身汗最宜羌府開豁麻出時衛中表邪從此散汗多亡陽又忌之

壯熱無汗大非吉不因風寒因火熱自始至末總無汗縱麻已收症百出

癆有自汗微汗大汗無汗等症而均有宜有忌麻初出至未

收之時皆宜微汗。有微汗則皮膚通暢，腠理開豁，而麻易透。發熱之際有自汗者，則有發散之義，乃為常候。蓋麻遇自汗，則毒從汗解。元府開而麻毒透，衛中之表邪則從之而散矣。不可遽止，亦不可復用升發之劑。若自汗而更升發，恐汗大淺，致有亡陽之患。夫自汗之症，原屬陽虛。初時無妨，若麻後，自汗多成痼病，勿見風，法當治陰抑陽，使腹內虛熱清退，而汗自止。以四物湯加減二十，仍去白芍、川芎，加元參、牡蠣粉主之。如麻後自汗兼不食，吐衄者，真是虛症，最為難治，亦宜以四物湯加減二十，加牡蠣粉、香附、石斛，用舊蒲扇或舊蒲席燒灰研細末，入藥中調服。若誤投藥餌，傳變多端，難收功矣。

切勿拘治麻初起常法而用辛溫解散之劑。如果係脾熱可用瀉黃散去甘州。因症加減而治則又可拘麻初之常法矣。若自汗而噦渴氣壅脈數者。則以靜遠主人化斑湯加括萎霜主之。至於大汗過多之症。則有二因。一因衣被蓋厚而致大汗過多者。一因用升發之劑過甚而發汗過多者。二者皆不宜也。蓋恐大汗過多致有亡陽之變。輕則症難脫體。重則多有不救。倘遇麻有隱暗不透之壞症。從權施治。而用升發之劑。取其大汗。使毒從汗解。此時語其變而非正治也。然亦多凶。經曰汗多亡陽。急須止之。以秘木黃連湯或當歸六黃湯外用溫粉樸法治之。有以人參白虎湯合古方黃連解毒湯五味三十治之者。似乎未當方仍列

後備

若婦人麻後汗多。心慌神昏者。亦有因而致不可不察。
有因麻症初起適遇經行。麻乃火候。心火旺盛。榮血多虧。全
又月期適至。血又下洩。虧耗大過。至麻收之後。氣血兩虛。未
有不成汗。多怔忡。神昏等症。急宜以玉屏散加牡礦粉與服。
以止其汗。免至亡陽。旋用參養榮湯去桂心。五味子。另加
牡礦粉。龍骨數大劑與服。須宜急治。遲則不救。若麻症初起。
壯熱而無汗者。多因外感風寒大重。以致皮膚乾燥。毛竅不
開。痳疹壅滯。而汗亦難出。多成內攻之症。或肚腹脹痛。或發
喘促。夏秋之間。宜微升散。以葛根解肌湯。見第去赤芍甘草
加木通。只壳治之。春冬寒月。重為發散。如加味三物湯去吉
五條

梗甘草。或葛根疎邪湯。見三十條加炒麻黃治之。但不可過劑。使渾身常得微汗為妙。有微汗則腠理潤澤而麻易出。又有
一等因熱極火鬱而無汗。亦致皮膚乾燥而不活澤。麻亦難
出。此症外必見脣舌破裂。二便結滯。昏沈壯熱。或身痛。肚腹
脹疼。多發喘促。齁齁痰鳴。不拘何時。無分遲早。急用寒涼降
火清肺之劑。佐以升發之藥。以白虎解毒湯。見二十條加地骨
皮。貝母。元參。牛蒡子。前胡。乾葛。治之遲則恐成壞症。大抵麻
症常以微汗為順。自始至末。必以得汗為妙。經曰。微汗常出
熱。(越而不留)此之謂也。若始終無汗。麻難收斂。後必有餘
症。宜用寒涼升發解毒為當。

滾黃散

防風四錢

桔梗一錢

藿香葉七分

石膏五錢

甘草

二錢為末白湯下或用蜜同酒拌炒仍用白湯下

加味三拗湯

麻黃不去節三錢

杏仁不去皮尖油二十粒

生甘草

荆芥穗

吉梗水煎服

靜遠主人化班湯

石膏 知母 元參 麥冬 牛蒡子 連翹 黃芩

地骨皮 淡竹葉 水煎服

秘本黃連湯

黃連 黃柏 黃芩 麥冬 生地黃 當歸 生黃芪

水煎加入燒蒲扇灰調服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 生地黃 熟地黃 黃芪蜜炒各一錢 黃芩 黃連

黃柏各五分 水煎服

溫粉撲法

黃連 杜礪粉 貝母各五錢 糯米粉一升 為末撲身上

玉屏風散

黃芪蜜炒一兩 大當歸大枝 陳耘米黃色一合炒 水煎服

五屏散 治自汗不止氣虛衰弱

黃芪蜜炒

防風各一
而

白朮五錢
土炒

生薑紅棗引水煎服

人參養榮湯

治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘寢汗發熱食

少無味身倦肌瘦

人參 白朮王

黃芪蜜炒

炙甘草

陳皮

全當歸

桂心各一

熟地黃

五味子蜜炒

白茯苓

各七分

白芍藥酒炒

遠志肉去骨甘草

水煮五分

生薑一紅棗引水煎服

人參白虎湯見六十四條

黃連解毒湯見三十五條

衄血諸失血第五十八

毒邪併迫血離經。衄流於鼻。不須驚。當知熱毒從茲解。血去榮中。毒少輕。

吐血便血與渴血。當分熱甚和血甚。熱入血室。勞動火總而名為失血症。

鼻之衄血。因內熱熾甚。邪火沸騰。血隨火載。自肺胃上行而溢於鼻也。麻疹本乎肺胃。故初起及未出之先。而衄血者。是為順候。亦發散之義也。蓋癥毒從衄而解。而藥中之毒則輕少矣。不必遽止。熱得開洩。不藥而衄自己。非錯經妄行之比。但不宜久耳。如衄血過多。此為火迫經曰奪血者亡。急須止。

之如衄之不已。或有失血者。俱宜清肺泻火。佐以凉血之藥。治之以犀角地黃湯。去白芍加荆芥穗枯黃芩生之。凡初熱見形衄血者。乃心火上沖。煩悶其症。不妨用生地黃枝子湯加枯黃芩以散心火之鬱熱而清肺。已出而衄血者。以加減犀角地黃茅花湯去甘草治之。已出大便下血。或小便溺血者。或吐血衄血。或二便閉滯。熱渴赤痛。以犀角解毒湯去赤芍治之。如衄血不已。急須止之。以茅根湯加黃連或元參地黃湯去升麻白芍甘草加茅根黃連。或茅花湯去甘草加黃連等方主之。已收之後。或出鼻血。或失血者。俱宜以加減犀角地黃茅花湯去甘草治之。有用四物湯加茅根治之者。凡麻症血熱及

勞動火熱入血室。吐血衄血發狂發黃者。俱宜用犀角地黃湯去白芍加桃仁治之。若正收及收後仍衄不止者。以四物湯見二十加茅根麥冬以滋潤之。然麻症衄血。或便血溺血俱為失血之候。須當分熱甚血甚施治。熱甚者以黃連解毒湯見三十主之。血甚者以犀角地黃湯去白芍主之。

犀角地黃湯 治傷寒溫病一應發汗而不得汗。內有血及鼻衄。吐血不盡。內餘瘀血。大便出血而黃。或中脘作痛。

犀角 生地黃另搗浸 牡丹皮 白芍 各等分水煎服。喜妄如狂。加大黃黃芩。吐血衄血者。加扁梢藕汁童便。陳大來。遲腹不滿而自言滿者。加當歸肉桂。

生地枝子湯 治心火上沖衄血

生地黃 枝仁 葛根 薄荷葉 燭心引

加減犀角地黃茅花湯

犀角梢 生地黃 茅花 丹皮 只壳 黃芩 枝仁
連翹 黃連 峩冬 當歸尾 甘草 灯心三十根引

犀角解毒湯

犀角 黃連 黃柏 黃芩 枝仁 生地黃 牡丹皮

赤芍 木煎服

苏根湯

苏根 當歸 生地黃 山枝仁 枸黃芩

水煎加百草霜入藥中服

元參地黃湯 止羸疹癬

元參 生地黃 丹皮 茯仁 升麻 中甘草 各一錢

白芍錢 水煎

按此方宜均勿用升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明胃經
即可用升麻也

茅花湯 治衄血

靜草花 當歸頭 牡丹皮 生地黃 甘草 水煎服

附方

茅花湯

麻料

卷二

五十八條

二七

茅花 蒜金 生地黃 黃芩 火煎入百草霜調服

元參解毒湯 治衄血失血

元參 黃芩 枝仁炒 生地黃 粉葛 荆芥穗

吉梗 甘草 水煎加茅根汁京墨汁對服

犀角地黃湯 治失血衄血便血尿血

犀角 升麻 生地黃 木通 吉梗 京芍 甘艸

水煎服

嘔吐第五十九

毒火鬱遏胃氣傷初熱嘔吐原無妨欲吐不吐乾霍亂二者一見最卿當

瘧症初起嘔吐亦屬帶候而吐瀉交作者順乾霍亂者遂能吐不吐者危。夫瘧症之有嘔吐者皆因胃間火毒不能發波而鬱於內。致傷胃氣而作也。初熱而得嘔吐之症此毒未發出藥宜疏托以葛根解肌湯見第去赤芍甘草或葛根疏邪湯見三十主之正出及正收時而見嘔吐之症者是毒未盡藥宜清涼解毒少加疏散可也以消毒飲見二十去甘草加只壳黃連治之多痰者加桔梗霜貝母治之收後而仍有嘔

吐者。乃是餘毒留於胃脘所致脾胃虛而熱滯也。宜用清涼
脾胃之藥。佐以分利之劑。用石斛清胃散去赤芍甘草主之。
取此方中之陳皮扁豆藿香以止嘔吐。若嘔一止而陳皮藿
香葉扁豆又宜除之。不可過用恐致燥害。此症若不間以金
石之品。全用輕浮之藥。其嘔難定。如嘔吐不止者。以竹茹湯
主之。如熱甚嘔吐者。以解毒湯見二十大條去吉更加竹茹枇杷
葉主之。

石斛清胃散 治麻後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛 茶荳 只壳 丹皮 扁豆 藿香 陳皮
赤芍各一錢 甘草五分 生姜引

竹茹湯

竹茹 陳皮 柘蒂 薑肉 水煎服

吐痰麻後有痰胸口痰甚第六十

吐痰之症有多般，都緣肺胃火邪干，俱宜清肺消痰火治者須作一例看。

吐痰之症有二。有吐出而白者，有吐出而成塊者。皆肺胃之火欠清而作也。俱宜清肺消痰降火為急，以杏仁清肺湯見五
快大去甘草吉梗加黃芩。或以清肺飲見六十去五味子白
吉梗甘草加麥冬黃芩知母石膏治之。但清痰切勿用半夏
南星等燥藥，惟宜用天花粉、貝母、陳皮之類。清肺降火宜用

天門冬麥冬杏仁桑白皮黃芩黃連之類切勿用吉梗中州
之品如麻後有痰而不吐痰者宜用加味二陳湯去半夏甘
草加貝母括囊霜主之如麻後胸口痰甚者用經驗敷方或
敷或指治之

加味二陳湯

陳皮 半夏 白茯苓 防風 天麻 連翹 甘草

水煎服

經驗敷方

治胸口痰

吳茱萸炒一兩

葱白 餘

為末以生姜自然汁和葛白搗和作餅蒸溫敷胸上立效

卷六十一

吐蛻之症是何因。胃虛無粒虫上行急宜施治免胃爛調養脾胃症自平。

麻前吐蛻乃胃熱不進殺食所致。治法宜清肺鮮散以秘本門冬清肺湯加五條去甘草吉更主之若將出正出之際而吐蛻者是因胃間有熱膈上有痰虫不能安故也患者能食則已不必用藥若欲用藥則以殺虫丹與之在初熱未見麻時而吐蛻者與吐蛻過多而不能食者皆為胃氣虛敗必不能治然吐蛻之症多見於正收及收後之時亦因胃火熾甚多致少食虫無所養故望上而出或三四條或五六條或十餘

條而止不宜過多。多則有害。治當安胃爲急。久則胃爛難救矣。以七味白朮散加烏梅再斟酌加減而治之。或得酸則安矣。如麻後熱退能食而吐者。宜調養脾胃。庶無他變。以安丸散除胡粉白礬。七味白朮散加烏梅等方治之。若麻後吐就不食而煥自汗者。真是胃虛最為確治。以七味白朮散加烏梅牡礪粉釀石斛治之。如係脾熱則以瀉黃散見五十加七味白朮散治之。

殺虫丹

生葱一把 炒吃虫即化為水

七味白朮散 治胃虛津氣不行而渴

人參 白朮炒 白茯苓 火甘草 合香葉 千葛根

木香 水煎服

安就散 治吐就色赤成團而脣屬熱者

烏梅肉 三錢 黃連 蜀椒 蟬殼各一錢 胡粉

白礬各五分 萩末每用五錢水煎如糊空心服

吐沫帽狀也 口中流涎不止 第六十二

清涕之中見白沫 實為胃火旺所政治宜清胃並降火 莫以白沫作寒治

吐出涕中有白沫 流涎不止均非虛都因胃中邪火旺急宜清
胃免傾危

吐沫者。吐出清涕之中而有白珠是也。乃是胃火旺甚所致。治宜清胃降火為急。宜以加味清胃散加連翹牛蒡子主之。其不去升麻者。蓋欲用之以開提胃熱故也。然亦須斟酌而用如麻。後有口中流涎不止者。亦是胃火旺甚所致也。宜以河間涼膈散六錢二十治之。但方中有大黃芒硝。須要察人之虛實強弱大小及大便之堅滯而施。不可槩用。以殊伐無過。加味清胃散。治胃中蘊熱中脘作痛。口後火氣發泄必作寒熱。乃止及齒齦腫痛出血。引頭腦。

生地黃四錢 川升麻一錢 杜丹皮五錢 當歸尾三錢 洗
川黃連酒蒸三錢 防風 荆芥 右膏 水煎服

泄瀉第六十三

淋初泄瀉最為宜瀉而已久須治之熱寒食冷便腹脹數般當分新與遲

麻症泄瀉慎勿遽止蓋麻有瀉而胃與大腸之邪熱得解是亦表裏分消之義也。初熱作瀉者用豬苓湯去阿膠甘草加葛根連翹牛蒡子主之。有用香蘇散者然終不若分利之為當也。香蘇散方仍列。若麻見二三日泄瀉者以透斑和中湯去升麻川芎柴胡吉梗半夏陳皮甘草生薑加連翹牛蒡子地骨皮主之。若身熱煩渴泄瀉者用三苓散見三十七條加地骨皮黃連黃芩麥冬主之。夏月用辰砂益元散去甘草治之。如麻後泄瀉者以薏苡仁散去

香附甘草主之。麻後泄瀉及便脹血者，皆由熱邪內陷所致也。大忌止泄。惟宜用升散之藥以黃連葛根湯加扁豆滑石白芍藥數劑與服而自愈。然麻症泄瀉須分新久寒熱傷食傷冷六般。若初熱瀉者用三苓散加木通以重瀉心經之熱。累瀉則十中無一或有傷食傷冷而作寒瀉四肢冰冷肚腹不熱口不作渴小便不赤者不得已而用理中湯一劑止之。久瀉不止者以六君子湯加肉荳蔻或香寇丸止之。如再不止用醒脾散與服或以五倍子駢粟壳燒灰用米飲調下瀝之。凡後數方。蓋亦萬不得已從權而用切不可目為定規而濫用也。

猪苓湯

猪苓

澤鴻

赤茶

滑石

阿膠

甘草

水煎服

晉蘇散

蘇葉

陳皮

白芷

川芎

香附米

甘草

生姜葱白引

透班和中湯

葛根

猪苓

澤鴻

茯苓

川芎

升麻各七

前胡

吉梗芩一

柴胡五分

陳皮

半夏各七

甘草三分

生姜三片引水煎分作數次服

辰砂益元散

治暑月小便不利

辰砂錢

桂府滑石水

飛過六兩

甘草錢

炙甘草錢

為細末清水調下二三錢老人虛人及病後傷津而小便不利者不宜用

又治暑月發驚多汗小便澀痛兼瀉心火

前方加薄荷葉少許以清肺熱名雞蘇散

加青黛少許以散肝火名碧玉散

加石膏少許以除胃熱名白玉散治同本方

加紅麴五錢以治赤澀名清六丸

加吳茱萸一兩以治濕熱吞酸一書治白澀名茱萸六一散
加乾姜五錢以治白痢一書消飲食名溫六丸

名溫六丸

加生柏葉生車前生蘚節以治血淋名三生益元散

加牛黃治虛煩不得眠名至寶益元散

加葱白五根香豉四合名葱豉益元散以水煎服則兼

散表邪

薏苡仁散

薏苡仁 淮山藥 白茯苓 谷麥芽 白蘿蔔 香附米

山楂肉 甘艸 水煎服

黃連葛根湯

黃連酒 葛根 升麻 甘草 水煎服

理中湯

人参 白朮 乾姜 甘草 水煎服

一書加肉豆蔻 一書加肉荳蔻六人參

六君子湯

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 陳皮 半夏

紅棗 姜引

香薷丸

黃連炒 肉荳蔻麵包 許子肉 麵包煨 木香 砂仁

白茯苓 為末飯丸 蔓子大 米飲下十五丸

醒脾散

北全蝎五隻粉米白附子烏豆水 人參 木香 白茯苓

拌炒 拌蒸水

天麻葛根

姜汁

石菖蒲去尾

甘姜

炙甘草

葛根水調服

糞泻水渴第六十四

糞溏之症不須除。麻得斯保毒得舒。始終糞如黃褐色。雖有變症保無虞。

糞出有沫名水泄。初潮正出見為吉。久瀉氣陷恐成痢。渴赤燥渴脾胃熱。

麻症溏糞理勢必然。此肺胃之火所作而致。不必施治。何則火勢極則大便閉結。麻本火候倘再便閉。則火毒內作極矣。

麻出必陰。是以糞溏爲正候。初出與出時見此症。其麻雖陰可救。正收與收後而糞溏色如黃褐者。雖有變症可保無虞。若水瀉之症。糞色必黃而有沫。小便赤。口乾唇燥。皆由脾胃有熱所致。然麻症泄瀉熱邪得以開洩。是爲候候。初熱未出之間。水瀉者。以三苓散見三十條加葛根連翹木通滑石主之。正出之時。水瀉者。亦以三苓散見三十條加連翹麥冬。潮熱甚者。更加黃連黃芩主之。古人有用人參白虎湯去知母。加麥冬治之者。實為不妥。方仍收列。夫麻泄瀉毒火因瀉而解。雖曰美候。然不可令其久瀉。倘或久瀉不止。則正氣必衰。脾氣下陷。凡有未發熱之前。水瀉至正出之際而不止。其爲日已久。則麻毒難以發越。後創留毒。緣

害不小。宜以加味三苓散主之。倘執泥毒邪得瀉而解之。訛其久瀉而不為之早治。恐至麻收醫之後。變成痢症。或下紫紅血等症。治療維艱。正收及收後而水瀉者。毒邪雖得瀉而盡。然止宜瀉三五次不可過。若自首至尾。水瀉不止者。宜用清涼利水之藥。而佐以升提。方有用三苓散加桂枝三十克。香白芷。浙麥冬。治之者。須當審理察宜。隨機加減而施。正收及收後水瀉過甚者。頃以理脾胃為主。宜以只實理中湯。隨意消息加減而治。若不急治。多成腫脹便血痢疾等候。至若麻後瀉利不止。口渴目闊。四肢不溫。與嘔吐不食。洞泄不知者。皆為不治之症。

加味三苓散 治痘麻渴甚小便紅黃

諸苓

木通 赤苓

車前子炒各

澤渴分

黃芩炒

牛蒡子

各五分

黃連

酒炒二分

燈心五十寸引水煎食前服

人參白虎湯

治熱病舌乾大渴發熱背寒

人參

炙甘草各一錢

生石膏一錢

一錢一書

知母三錢

耘米餅

水煎分作三次溫服一日飲盡

枳實理中湯

治胃挾食及結胸本虛不能受攻者

乾姜

炒黑五分

各一錢

人参一錢

三錢

白朮

炒焦一錢

各二錢

只宜

茯苓

各一錢

炙

一五分至一錢

水煎服

潤清第六十五

麻症泄瀉本常候。當分屬熱與屬寒。瀉下清稀白沫者莫作熱候一般看。

麻症泄瀉。本屬常候屬熱者多。屬寒者少。然亦有瀉下清稀白沫者。其症喜溫腹疼喜按。此屬寒瀉。宜以胃苓湯去蒼朮少用白朮肉桂加煨姜治之。不可一例而治也。

胃苓湯

治飲食停積浮腫泄瀉。脉症俱實者。

蒼朮水浸去皮以芝

川厚朴去皮姜

廣陳皮去白

炙甘草各三

生白朮

白茯苓

堅豬苓各二

澤瀉三

肉桂三

水煎服

平胃本平胃氣之嗽。阜若因脾土之虛不能消運。又須稍藉參苓如養胃湯之類。然復有土衰不能分利而成腫脹。且氣壅不勝參苓難合理中者。乃合五苓以健運水土與正氣之假蘇。蓋以此之邪而不可移易之定例也。

渴而腹痛脹滿第六十六

渴下腹疼與脹滿噯氣藏息如敗卵飲食不節腹中寬腸化食自安妥。

渴而窘迫腹痛脹滿或有噯氣如敗卵者此乃飲食不節停滯腹中宜用只壳湯見四十條去炙甘草加山楂肉麥芽木通以治之。

咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第六十七

咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉之宜熱毒由斯消滅時治法解毒同一例用方首尾不共施

痳疹初出必要咳嗽使腠理疏通。鼻衄則熱毒得以隨衄而解泄瀉則上下熱毒得出。嘔吐均屬美候。亦脾胃二經熱毒所致。且痳出自肺胃。其理只以解熱毒為主。六一散至寶丹。或四物湯見二十條加黃連黃芩。仍憑擇用。若痳出之後而見咳嗽鼻衄吐瀉等候。則又不宜用上三方。俱宜以三味消毒散見三十條之可也。

六一散 治表裏三焦之熱解肌清燥

清石太
兩 甘草一
兩 為末灯芯湯或姜湯下
前方滑石等分四兩甘草等分一兩名曰天水散治痘乾燥
而痛用蜜水調塗並白湯調服

至宝丹又名松風

防風 蒜芥 連翹 麻黃 卜荷葉 川芎 當歸
白芍炒 枝仁炒 大黃酒 芒硝各五 枯黃芩 石膏
吉梗各一 甘草黑
兩 滑石三 人參 熟地 川黃柏
黃連 茄湯 獨活 天麻 細辛 全蝎 白朮五錢
為末蜜丸彈子大不拘茶酒任下一丸

前方即防風通聖散此處加人參補氣熱地益血黃柏黃連

除熱羌活獨活天麻細辛全蝎祛風

自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝

涎嗽加姜製半夏

大便秘第六十八

火壅血燥津液竭。大便因之而閉滯。無分先後急通潤稽延日久變紫黑。

大便秘結者。乃火壅血燥而耗精液故也。麻之為候大便宜滑如黃褐色乃為正候。若大便閉而不通。大非所宜無論前後日期。但大便閉者急當用通潤清涼之劑。初時大便難通而堅結難出者。宜微潤之不可通利。以通幽湯去升麻甘艸熟地黃加火麻仁。只實黃連治之。如麻未出之初有面色或青或紅或唇紫或煩悶而大便秘而不通者。宜以大承氣湯去厚朴加連翹牛蒡子防風葛根荆芥穗下之。使毒從大腸

經而出然後再用宣毒發表湯。見第^五條去升麻吉梗甘艸以發出麻疹其症自瘡若正收及收後大便不通者則宜用大通潤之劑以四順清涼飲治之甚則用河間涼膈散。見第^{二十}以通利之若大便閉結發熱身痛者以大柴胡湯主之腹痛氣喘者以前胡只壳湯。見第^{五十}一條去炙甘草加姜竹炒芥子治之凡麻見便閉之症急宜早治慎勿遲延日久則麻變焦紫枯黑而難救矣。

通幽湯 升清陽降濁陰治噎塞便閉

油當歸

二錢

升麻

醋浸三分

桃仁

研如泥一錢

紅花

生甘艸

炙甘艸

五分

熟地黃

生地黃各一錢

五分

水煎以藥汁磨桃核五分對藥稍熱服

加大黃仁
大黃方
歸潤腸湯

大承氣湯

大黃酒洗四錢

芒硝三錢

厚朴

只實各八分

水煎服

四順清涼飲一名四

當歸

赤芍

大黃酒蒸

甘草等分

水煎入生白蜜一二匙對藥熱服

大柴胡湯

治表症未除裏症又急汗下薰功用之

柴胡一錢

黃芩

芍藥各三分

只實三分

半夏五分

大黃二分

姜棗引

小便赤瀉第六十九

膀胱餘熱小便瀉火毒如何消散得。無分初潮與收後三本導亦為定格。

小便赤瀉此裏熱甚之症也。在初熱正出之時見之乃熱邪瀉毒是為正候。麻出現時小便赤瀉或淋者以三苓散見三條加燈芯石膏慈射干治之。若熱甚小便赤瀉諺語數驚恐者以導赤散見二十條去甘艸合三苓散見三十條加辰砂主之。夏月以辰砂益元散見六十條去甘艸加石膏主之。若小便不利而嘔吐者以三苓散見三十條加藿香竹茹桔梗杞朶荳治之一。二日不通者以加味導赤散見四十條主之。若於正收及收後

而見小便不通者。是內有熱毒。不得消散。而餘熱下匿膀胱。
用導赤散見六十加麥冬。或用加味導赤散見四十。以濫氣
化導利而小便仍不通者。必因大便秘滯之故。速宜通利大
便。以通幽陽。見六十。去升麻。熟地。甘艸。加只壳。丑牛。合導赤
散見二十。治之大便一通而小便自利矣。

大小便不通第七十

麻疹二便閉不通邪火熾甚在裏中通關涼膈利賁腑曾取一服見奇功。

麻疹自出至收總宜大小便滑利二便俱不宜閉閉即急宜通利若麻疹有大小便俱不通者是火邪內熾之極宜以河間涼膈散見二十條去甘艸加牛蒡車前木通治之甚則以通關散去甘艸人參八正散去甘草治之

通關散 通心經利小便良方

枝仁炒 大黃酒煎各一錢 木通 赤茯苓 車前子炒
瞿麥 滑石 烏蓄炒 人參 甘草各三五分

燈芯十根引

八正散 治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿

木通 瞿麥 車前子 枝仁 大黃 滑石 無苦

甘艸 燈芯引

木通瞿麥燈芯入小腸而降心火車前入膀胱而瀉肝火枝仁渴三焦之帶火大黃滑石乃渴火利水之捷藥。扁蓄利水止痛甘艸稍入益止痛雖治下焦而不專治下焦必三焦通利水方能下行也。一書加木香

吐利並作下端裏急後重脫肛第七十一

發熱之時吐利并。任他吐利不須驚。胞胎蓄毒從斯解。腸胃停汚自此清。

發熱蒸蒸吐利并。或時滯下作腸鳴。火邪內迫宜清解。法向時行麻症尋。

白利甚時多變更。裏急後重症隨生。須為通利洩其毒。若犯滯劑病更增。

麻症脫肛何所因。火邪內迫後重成。升提清熱是神手。若作氣虛定傷人。

久泻脫肛氣血虛。治法不可一例拘。養血升提成妙用。破濁用

下更增危

麻本胎毒發熱之時吐利並作毒火因之而解此為美候如吐利並作或時下滯或作腸鳴亦是火邪內迫而然純是熱候不可作寒而治治法總宜清解依麻科憑症施治庶保無虞。如上焦火甚者則吐下焦火甚者則瀉中焦火甚者則吐瀉並作自利甚者則必見裏急後重而為滯下矣知見裏急後重之症則病者不耐猛力下氣催便而脫肛之症又勢所必致也如麻發熱之時吐多者以竹茹石膏湯去半夏加桔蒂主之。自利甚者以秘本猪苓湯去升麻甘草分利之發熱時吐利並作者以三芩散加竹茹柿蒂滑石主之。下滯

滯以加味黃芩湯去白芍藥甘草加只實連翹牛蒡子青皮以治之。麻收後熱毒未曾解盡有下積滯者當以連石茱萸丸去升麻乾葛甘草白芍藥加只羌山楂肉麥芽青皮治之。但方中茱萸若非陰寒膈寒而兼有熱者亦須除去愚按下積滯之症非僅麻收後有之即將出正出之時亦常有見者愚謂不拘先後但麻兒有下積者則當以清熱導滯湯見七十二保去白芍藥厚朴甘草當歸淡竹葉加山楂肉麥芽治之更為妥當自利甚而變為裏急後重者以黃連解毒湯見三十五加連翹牛蒡子青皮治之若小便短少者更加木通滑石治之如裏急甚者則當加半生半炒黑向丑牛以利之或以飼

壁山人黃芩湯去人參赤芍甘草加連翹牛蒡子。且牛以利之或以加味黃芩湯去白芍甘草。加只實木通連翹牛蒡子丑牛以利之。若夫脫肛之症多見於將收已收之後而治法有不可一例者。若因毒火內迫大腸枯滯肺金受傷不能傳送致成裏急後重之症而病者難忍無耐下力送氣催便以冀稍鬆致肛脫出不可認作氣虛施治治法總宜清熱解毒導利行滯。泻火清金兼用升提之品以加味導赤散去薄荷淡竹葉加當歸尾潤腸胃破惡血而養心血牛蒡子以消毒枯黃芩泻肺火以涼肺血只壳以破氣滑石各八分通利六腑九竅以蕩熱散濕丑牛四五分以除壅滯丹皮四五分

以開陷伏之邪。使之外散升麻五六分以升散大腸胃膽三焦之火熱。如兼有潮熱者加鮮地骨皮二三錢治之。若因久渴而脫肛者亦以加味導赤散去卜荷竹葉。加當歸身錢許川芎錢許升麻六七分以養血理氣。升散大腸胃膽三焦之火熱而只壳丑牛。又不宜緊用矣。

竹茹石膏湯

竹茹 石膏 黃芩 陳皮 半夏 水煎服

秋本猪苓湯 治渴

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 黃連 升麻 甘草

澄心引水煎服。并治病人用力催便脫肛

加味黃芩湯

黃連 黃芩各一錢 滑石 白芍各三錢 甘草七分
水煎服 血痢加地榆皮二錢

連石茱萸丸

黃連酒 滑石飛過各一兩 黃芩 千萬 白芍各八分

茱萸一兩

升麻七分

甘草四分

爲末以山藥研粉作糊合丸梧子大食遠用白湯送下三五

錢

銅壁山人黃芩湯 治裏急後重

黃芩 黃連 生地黃 木通 只壳 當歸尾 赤芍藥

人參 甘草 三劑水煎服 初劑加大黃微利之
加味導赤散

生地黃酒洗一錢五分 川木通 川元參各五分 連翹六分
川黃連八分 ト 荷葉四分 淡竹葉七分 瞳心引水煎服

卷之二
痢症第七

熱邪內陷因成痢憑症施創莫雷同用心調理起沉痼勿輕割
瀉圖霸功。

痳之成痢乃熱邪內陷所致多見於正收及收復間有見於初熱未出及正出之時者亦有自首至尾而作痢不輟者又有因久渴而成痢者當分別治療不可混施若於初熱未出與正出之時而作痢者藥宜以疎托爲君行滯氣爲臣爲佐解毒爲使以葛根解肌湯見第少用葛根去赤芍蟬蛻木通甘草畧加青皮枳榔再加防風主之若麻已出透身熱未全退毒氣流注而成痢者以清熱導滯湯去白芍查芍甘草川

厚樸加生地黃地骨皮木通主之。若麻毒未清，夜成赤白痢者，以加減黃芩湯去白芍，查肉甘艸加地榆皮連翹牛蒡子主之。如麻後成痢，赤白腹痛者，以古方黃芩湯加只壳治之。亦有久瀉而感痢者，原因氣血已虛，不得已用人參黃連枯黃芩乾姜煎湯從權治之。如正收及收後而下痢，白色者，藥宜用解毒涼血行滯氣之品。以靜遠主人黃芩湯除去人參木香甘艸加生地黃牛蒡子連翹防風主之。痢下膿血者，以白頭翁湯去黃柏加防風主之。或因食積下滯者，以消食化氣為主，用只壳湯九味四十去甘艸加山楂麥芽木通青皮主之。若腹中作脹時痛時止者，以厚樸湯去乾姜甘艸加枳榔。

山楂

主之

夫癩後成痢乃積熱移於大腸

以治癩後痢統方

加減主之

有以三才散見卷十加麻後下痢而身熱腹痛者

木通桔梗芩治之者

以古方黃連解毒湯

見三十條

治之若壯盛之人內有抉食積

滯能食者

以三黃丸見四十八條

利之若麻後赤痢以四物湯

見二十條

去枝仁用當歸尾加尺壳

條五合古方黃連解毒湯

見三十條

加姜汁炒黃連榆皮治之如

治之稍輕者以四物湯

見二十條

加陳皮白芍木香更有加生白

術者須宜酌用

癩後作痢如兼小便赤澀者

以四物湯見二

條加車前子木通治之

癩後痢症或赤或白者以四物湯

見二十五條

倍白芍藥當歸加大黃少許

以利瀉數次

麻後泄瀉成

條十五

前著以四物湯四二十一加地骨皮酒炒黃芩主之。若麻前曾經泄濁日久，未曾清解，至於麻後變為休息痢，不問赤白，但見裏急後重，晝夜無停者。此餘毒在大腸，乃積熱移于大腸也。急宜行氣養血，切不可妄施瀉劑以圖霸功。河間曰：養血而痢自止，行氣則後重自除。誠格言也。宜以河間治久痢方去人參、白芍藥主之。有用古方黃芩湯合天水與香薷丸，
附三柏間服者。有用靜遠主人黃芩湯。送下香薷丸。體虛者香薷丸內加榆根白皮治之者實不若河間治久痢方之為當也。如自首至尾，下痢不輒者必有風毒留滯於內，宜解毒行滯而兼疏風寶脾之劑。庶幾立應。以清熱導滯湯去當歸、淡竹葉、加防風、荆芥治之。有用四君子湯加山藥、吳茱萸者。若痢而兼治之者，猛而有理方，并列後。

嘔吐噤口不食。更腸滑不止。或下鮮血。或下紫黯色。或下如瘡膿。或下如塵漏水。或下如雞肝色。如黑荳汁之類。兼之氣喘煩渴熱甚。發呃麻色紫晦者。皆不治之症。

清熱導滯湯

十六味用

黃連炒
枳榔
黃芩酒
生白芍
只壳炒
厚樸姜汁
陳皮各七分
青皮
甘艸各三分
連翹
牛蒡子炒研各八分
查肉
當歸
淡竹葉各一錢

燈心五十寸引水煎加犀角末三分調服

紅多者加紅花二分地榆皮桃仁酒炒各八分

秘瀉甚者與裏急後重之極者加酒炒大黃八分

加減黃芩湯

黃芩 黃連 當歸 川芎 檳榔 青皮 潤瀉 山楂
槐花 白芍 牡丹 薛仁朴

古方黃芩湯 治伏氣發溫小便膀胱三焦胆腑合病自痢

黃芩一錢 白芍六分 炙甘草一錢 大棗二枚

加半夏二錢名黃芩加半夏湯生姜引

人參黃芩黃連乾姜湯 治胃虛客熱痞滿

人參 黃芩 黃連 炮乾姜各二錢水煎溫服

靜遠主人黃芩湯

黃芩 黃連 當歸 只壳 桔梗 青皮 川芎 木香

人参 甘艸 水煎調六一散服

白頭翁湯 治熱痢下重

白頭 黃連 黃柏皮

各等分水煎溫服下愈再服

厚樸湯 治脾胃虛作脹腹中時痛時止

厚朴姜 陳皮去白 苍朮 乾姜 炙甘艸 水煎服

治麻後痢統方

黃連 水煎服 黃芩 梅冬 防風 天花粉 元參 只殼

牛蒡子 木通 枝人 滑石 吉梗 京芍 勾藤勾

甘艸 二劑水煎服不愈加豬苓青皮

河間治久病方

當歸 白茯苓 黃芩 車前子 陳皮 人參 白芍藥
甘草 炙乾姜少許為引水煎服

四君子湯

人參 向术土 白茯苓 甘艸 紅棗姜引

附 治麻後癰丹方

附 西河柳 為末以沙糖水調服四錢

萬氏治麻後癰下鮮血驗方

當歸尾 生地黃 條子芩 黃連酒炒 吴羌夢 為梅肉
人參 白芍 生甘艸 水煎服

下蛲虫第七十三

上膈胃火盛少食。晚上不安往下行。此便不須用方藥。調其飲食症自平。

下蛲之症多見於麻收之後。乃上膈及胃火壯盛少食。虫不上安。而往下行。虫往下行亦順症也。與過食傷中虫不能容。而下不同。但調其飲食自愈。非若口中吐虫之比耳。不須施治。