

麻科活人全書

麻科活人全書卷之四

安成_{梁齊王}李原列

白華堂 麻科刊

眼光如水眼眶紅爛羞明赤腫眵_睛淚生翳第十四

眼光如水是何因肝腎之熱極而興未發初癆必見此如無斯候別病侵

目赤弦爛淚常淋非失謹風即烟燄治者不早成痼疾急為疏通奏奇然

熱毒餘毒上攻目蓋明怕日眵多赤腫閉目生翳眼眶皮爛宜清毒

眼光如水此肝腎兩經熱極所致乃癆之正候也未發熱與

初熱之間有此症者方為出麻之候如無此症即非麻候。如有癰毒入目生翳障者以銀菊散主之。如熱毒上攻眼目生翳并暴赤羞明者用羌荊散主之。大便滑者去大黃少加生只壳散導之。如麻後餘毒不解上攻眼目羞明怕日雲翳眵淚俱多紅赤腫閉用羚羊角散去黃芪升麻加連翹牛蒡子黃連主之。如麻後眼目生翳目赤紅腫眼眶皮爛俱宜用朱純銀加威青毒散醫湯主之。其有眼眶紅爛當多淚者其症多因麻之正收時及麻收後不避風寒為風濕所侵或被烟薰皆能令目赤強爛而常流淚當即為疎解急以柴胡飲子治之若日久不治則為終身痼疾。

蟬菊散 治痘瘡入目或病後生翳障

蟬蛻去土 白菊花去梗

各等分為末水煎加蜜汁少許再煎食後溫服

羌菊散

羌活 白菊花 蟬蛻 防風 杏仁 豆精草

大黃 白藜蘆 黃連 沙苑蒺藜

為末清米水調下一錢

甘草

羚羊角散

羚羊角 猩黃芩 草決明 車前子 防風 大黃

芒硝 黃芩 升麻 水煎稍熱服

朱純嘏加減清毒散藥方 此方最驗可隨症加減

生地黃一錢 甘菊花 黃芩酒 牛蒡子 連翹各七

當歸尾 柴胡各八 川芎六

草決明研 白蒺藜各一錢 外去刺頭

紅花 木賊各五
甘草二錢

水煎服

柴胡飲子 治風熱眼眶亦爛

柴胡 茯苓 防風 赤芍 桔梗 荆芥 生地黃各一

甘草五水煎熱服

眼閉第七十五

未曾睡着閉雙眸。脾經火旺欠清消。正收後多見此急宜利水清上焦。

眼閉之症非熟睡而兩目閉謂未曾睡着而雙目自閉也。其症多見於正收及收後。蓋因脾經之火旺盛未消而然。治宜清上焦之熱。兼以利水為急。以瀉白散加木通薄荷葉玄參牛蒡子連翹荆芥治之。火退而目自開矣。

或問脾火旺當用瀉黃散而用瀉白散何也。曰土為金之母。實則瀉其子也。

瀉白散 治肺熱或兼手足心熱

桑白皮

姜汁

地骨皮

竹脂名

炙甘草

蜜

生甘草

蜜

淡竹葉

一把

松木

一百粒

引水煎服

加陳皮桔梗亦名加味瀉白散有熱更加知母黃芩
或問地骨皮乃三焦氣分藥而瀉白散用之何義也曰三焦
屬肺。肺為肺之子。實則瀉其子也。或曰唯。

眼多眵涕第七十六

眼生眵涕本屬熱。肺脾二經火來。息無分初起與收後。清降肝脾火為患。

眼生眵涕者。脾肺火甚故也。見此症者。無分前後。即當清降脾之火。以渴白散。見七十除甘草。加龍胆草治之。

白珠紅赤第七十七

白珠路屬手太陰。初熱紅赤是本經正收後仍赤紅肺氣風熱未清。

目之白珠屬肺。今癥之發正合本狀。故初發熱之時。未出癥之際。目即赤紅。此正候也。如出現後。及正收與收後。而白睛仍前赤紅者。此乃肺經風熱未盡所致。宜清肺潤火為急。以瀉白散見五十一。加荆芥薄荷葉連翹元參牛蒡子治之。赤而腫痛者。風熱上壅也。以加味導赤散見四十。加荆芥治之。

雀盲第七十八

癥發於心火。詳。丙丁反悔壬癸。鄭以致麻復患雀盲。照月夜靈四六湯。

雀目者。每至日暮而眼不能見物是也。又名離目暗。又名高風障。經曰。眼得血而能視。肝藏血。肝血有虧。兼之火邪旺。盛熱乾壬癸津血虧耗。致病雀目。至日暮屬陰之時。而目不能視。物矣。治法宜以四物湯。見二十一條合六味地黃湯。加石决明。夜明砂主之。或以照月飲。次明夜。更敷治之亦可。

六味地黃湯

熟地黃一錢 石棗肉五分 推山藥三分

白朮三錢
芍藥二錢

牡丹皮

去骨大分五厘

澤瀉

七分

水煎空心服

照月散

治雀目立效

真雄黃

研細末飛過

用活雞刺開取熟肝搗極爛入雄黃末五

厘溫酒調服

決明夜靈散

治男婦大小眼目至暮則昏夜間雖有星光月

亮不能視物

石决明炒

夜明砂水淘

二味各二兩

公猪肝一兩

母猪及獐鹿之肝切不可用

右肝勿犯鐵器以竹刀切肝作兩片將藥末鋪於一片肝上
將第二片肝蓋合以線扎緊勿令藥末漏出放入砂罐內以

淘米泔水一大碗煮肝。煮至米泔僅存小半碗時。去火於
時。以藥肝與汁一齊與服。

前方右决明鎮腎益精以之為薑

夜明砂升陽主夜以之為臣

米泔水主脾胃以之為佐

肝與肝合以類相從引入肝經以之為俱

口氣臭第七十九

足陽明經有蘊熱。口中因之有穢息。倘或臭氣不可聞。或是神仙醫不得。

口氣穢濁。乃熱邪蘊隆於胃。宜用清金降火之劑為急。以清胃散少用升麻。以開提胃氣。加連翹牛蒡子治之。如麻收之後。有口臭。口瘡唇爛。兼之咽喉疼痛者。以生地敗毒散除去赤芍桔梗甘草柴胡。加黃連治之。其有口臭不可聞者。此是胃癰必死之症。若其人原有口臭者。則不在此例。當詳問施治。

清胃散 症治與六十二條加清胃散同。

生地黃

升麻

丹皮

當歸

黃連

酒

石膏引

生地敗毒散

生地黃一錢
丹皮
黃芩
柴胡各七分
牛蒡子炒
連翹
天花粉
元參
金銀花
桔梗各八分
黃柏
赤芍各五分
生甘草三分
熟石膏
淡竹葉各一錢
燈心五十寸
引水煎另以犀角磨汁對服

口瘡第八十條

心脾腃經。毒未降。壅上焦。口生瘡。滿口唇舌俱赤爛。獨有牙齦不受傷。

口瘡之症。滿口唇舌生瘡。或黃或赤或白而爛。獨牙齦無恙者是也。其症多見於正收及收後。乃心脾胃三經火甚。餘熱未盡。而毒壅上焦。下必大便燥結。小便赤澀。治宜清利心脾之火。煎潤大腸之劑。以導赤散。太陽二十去甘草。加豬苓澤泄。以導脾胃之火。火麻仁杏仁。以潤大腸之燥。若得大便通利。小便頻行。其毒自退。外以蠟袍散吹之。如乳下嬰兒。乳母有熱。亦當服散。使乳無熱。兒亦清安。以礞乳方去甘草與乳母。

服之。若麻收之後。口瘡唇烈者。均宜以秘本洗心散去麻黃。
或以河間涼膈散。規二十去芒硝甘草。俱加石膏牛蒡子下
之。如係牙疳之症。則又從牙疳門施治。

綠袍散 治一切口瘡腐爛

荆芥穗 小薄荷 青黛 絳墨 元明粉 硼砂 各二錢
百草煎二錢 甘草一錢
三分

為末點舌上。令其自化。或用新汲井水和蜜調點舌上亦可。

釀乳方

木通 淾泄 茶芩 生地黃 赤茯苓 天花粉 連翹
黃芩 茵陳 甘草梢 燈心引水煎

右藥係乳母食後。令抱去宿乳服之。服後令乳母仰卧。使華
味傳貫於乳。再令乳母舉去乳汁少許。然後以乳乳兒。仍以
此藥與兒同服。

秘本洗心散 專治口舌生瘡

當歸 生地黃 木通 黃連 大棗 小茴葉 麻黃茸
各等分。燈心引水煎服。

舌生白珠第八十一

舌上聚聚生白珠。心脾鬱熱致灾危急。宜清心與降火。依法調治。症自除。

舌者心之苗。而脾肺又絡於舌。心脾二經之熱。無所泄而發於舌。故舌生白珠。聚聚如粟。甚則上腭牙齦。滿口遍生。其症多見於正收及收後。法當以朱氏洗心散去甘草。加黃連。或加味寧赤散。丸。四錢。加麥冬治之。如大便不通者。以洗心湯去京粉甘草。合瀉心湯。加石膏牛蒡子。或以河間涼膈散。二術。大去芒硝。甘草。加黃連石青牛蒡子治之。外以桑白皮搗自然汁塗之。或用塗方塗之。或用綠袍散。悅糲點之。如食乳

孩子以驥乳方見八去甘草與乳母服之

朱氏洗心散 治心經有熱口舌生瘡白珠等症

生地黃

枯黃芩

麥冬

歸尾

知母

卜荷葉

甘草

鮮藕節

側柏葉引甚者加黃連

水煎服

洗心湯

治心熱白珠滿口二便不通

防風

荆芥

黃芩

木通

大黃

連翹

生地黃

歸尾

京苟

甘草

燈心引水煎服

一書無京苟有黃連

有潮熱加柴胡羌活

一書有潮熱加黃連骨皮元參黃柏枝仁

渴心湯

川黃連 為末。晚卧蜜水調服。

塗方 治口瘡甚者

黃柏去粗皮切碎
蜜染黃色

青黛 各等分為末。以蜜調敷患處

塗方

薄荷葉 黃柏 砂硼 米片 黃連

為末。以蜜調塗患處

牙疳第八十二

陽明胃火留為殃。毒上冲牙生疳瘡。比症非同口瘡。比頃刻能令性命傷。

麻毒流連走馬痛。牙齦黑爛食難當。敗唇崩鼻牙齒落。漏潰穿腮旦夕亡。

牙疳者專於上下牙齦腐爛其毒最重其症最危。非若口瘡舌珠之比。此乃胃火留而不去。餘毒上冲所致。急宜清胃涼血。佐以潤大腸之劑。以秘本加味清胃散。加石膏荆芥火麻仁杏仁治之。大便閉者。以秘本洗心散。見八條去麻黃。加牛蒡子石膏微利之。有用當歸散者。寔為無濟。方仍存之。外以栗根白皮煎湯漱洗。

以馬鳴散文蛤散救苦散無比散燒鹽散等方隨用以塗之。
若麻一出即收。麻毒收入於裏。致生牙疳。大熱譫語不食等
症。內宜用涼解之劑。以加減清胃湯去陳皮桔梗甘草。加黃
連葛根牛蒡子主之。外以熟附子切片。將水煮敷。敷患者兩
手心。兩足心以拔之。如麻後牙疳腫痛者。以清胃散見七十九條加
荆芥元參牛蒡子主之。外以尿桶中白堊。火煅如鹽。加冰
片研和蜜調搽之。凡麻後牙齦黑爛。肉腐出血。呼吸氣息臭
氣冲人者。名為走馬牙疳。急用屎白火煅。加冰片以蜜調頻
塗。或用馬鳴散等方。或以龍硼散。黃龍散。雄黃散。神授丹等
方吹之。又或以黃連硼砂各一錢。胆礬三分。冰片五釐研末。

搽之。再加白鹽梅燒灰存性。人中白火煅同研。搽之更應。內急以生犀地黃湯。加石膏治之。俟症平。以四物湯。取二十用生地黃。加木通枝仁。生犀角山茵陳。以利小便。使熱血下行。而毒火不致上冲矣。若牙疳白色。為胃爛不治之症。有用粟樹根白皮煎水洗患處。而以五倍子雄黃百草霜細研。為末吹之者。間有取效。未必全驗也。若通齦白色。自外延入內者。無膿血者。牙腫爛而口臭者。喘促痰鳴者。而頰浮腫者。環口青黑者。頰漏腮穿者。喉穿齒落者。各用鼻瘻散。或不治之症也。

本加味清胃散

治咽喉口舌生瘡牙齦癰爛

生地黃

丹皮

當歸

黃連

犀角

連翹

升麻

甘草

木煎服

馬鳴散

治走馬牙疳良方

人中白

榔

榔

榔

榔

榔

榔

蚕退帝

燒灰

二錢

生五倍子

錢

明礬

錢

又五倍子

一個裝入明礬未於內

火燄之俟其

枯為度取用

同為細末

先用米泔水洗患處

然後以末搽之

蚊蛤散

雄黃

枯明礬

五分

一錢

燒灰

生五倍子

錢

又五倍子

一錢

炒枯用

為末。先將米泔水洗患處，然後以末擦上。一日數次，以愈為度。

救苦散 治口瘡牙疳

人中白火硝

寒水石飛過

青黛五

姜鹽炒

黃柏

冰片各一錢

牛黃分

為末。先以苦茶洗患處，然後以末擦上。三五次少愈，十次全愈。

無比散 治牙疳腐爛

黃牛屎煅

冰片炒

為細末吹患處

燒鹽散 治牙疳潰爛

取樣斗大者，黃鹽滿壳。合起，將鐵絲扎定，燒化存性，以碗覆地片時，取起加入麝香少許，研細塗之。

樣音許財，胡字辨陳風。完丘之胡。作樣也。一名籽。三四月開根，八九月內結子。子為串子，又有扁，可集鳥。又相貌丈姓。

加減清胃湯 治麻後口瘡

元參 連翹 生地黃 黃柏 麥冬 木通 白芨芩
天花粉 陳皮 桔梗 甘草 蟬蟅引

龍硼散 治麻後口瘡

牡黃牛屎尖焰 明礬五分 水庵一分五厘 朴硝錢 砂硼二
為末，以鴛管盛末，吹患處。

黃龍散

壯黃牛屎尖

煅

冰片分
為末以鐵管吹患處

雄黃散

雄黃

黃柏

麝香

為末先以艾葉煎湯洗患處然後以末搽之以愈為度

神授丹

枯明礬

麝香

白毛灰

為末以竹管盛吹患處

生犀地黃湯

連翹

葛根

元參

黃連

生地黃

荆芥穗

升麻

生犀角另
甘草

水煎入犀角汁二三十匙對服

狐惑第八十三

上唇生瘡虫食腮下唇生瘡虫食腮此名狐惑非佳候化蠶丸兒是妙方

麻症唇口多瘡其聲喎啞者名曰狐惑其義云何乃出自傷寒指掌之言謂上唇多瘡者虫食其腮名曰狐下唇多瘡者虫食其肛名曰惑蓋取其進退猶豫之義也大非美候宜以秘本化蠶丸或古方化蠶丸酌量而治之如更煩燥昏悶失聲者死症也

秘本化蠶丸

均子肉

蘆薈根

龍胆草各二分

五靈脂一錢

五分

黃連錢

二分

黃連錢

二分

黃連錢

二分

黃連錢

二分

黃連錢

二分

黃連錢

二分

川陳子

一錢
五分

烏梅

為末以烏梅去核搗爛合丸白水下

古方化墮丸

黃連

五錢
蜀椒明目者勿用
去擗炒二錢

苦練樹根白皮

四錢
二錢

為末用烏梅肉七枚以艾湯浸搗爛合丸艾湯下

咬牙第八十四

咬牙之症非痘比。痘有寒熱二症分。喜食熱物四肢冷。下血咽痛見間君。

咬牙雖非痘症比亦有寒熱二症分。未會服導從熱治。適用寒涼又宜溫。

症之咬牙非苯痘比。痘症咬牙。有寒熱二症之分。而癥症咬牙皆屬熱候。乃陽陷於陰。故多發渴而手足無熱。喜飲食冷物。治宜瀉陰降火。以參冬湯去白芍加丹皮治之。若手足俱不熱而反嚴冷。喜食熱物。此為熱邪內亢。後必下血咽痛。疾鳴而死。即以白虎湯。大劑二十治之。然多不可救。若飲食犯板

董仲敦、劉熙等物更非所宜。然麻後咬牙亦有虛實不可執泥無虛實之說。但不與疽瘻比耳。麻後咬牙其先未曾服藥而咬牙者乃實症也。解毒乃止而三味消毒飲見三十之類可以隨見加減而用。若已經服藥而咬牙者恐服寒涼之藥過多。有傷氣血而然。宜以四物湯見二十加人參治之。

麥冬湯 治麻症便實而渴

生地黃 當歸身 麥冬 白芍藥 水煎服

舌胎第八十五

舌胎雖當分顏色。黃為胃火。白肺熱。惟有黑胎。莫相避。麻症逢之心經也。

舌者心之苗。心為君火。殊本火燥。故舌有胎。胎有黃白黑三種。白胎為肺熱。黃胎為脾胃熱。均當清解疏利。更兼外症參詳而治。如宣毒發表湯。見繙去升麻桔梗甘草。葛根解肌湯。見第去赤芍甘草。葛根疎邪湯。見三十防風敗毒散。現繙去桔梗甘草。蘇葛湯。見第去柴胡赤芍甘草。俱可隨症加減而施。能黑者則為心經。黑而濃者。熱淫血分。黑而燥者。熱淫氣分。皆為急擾。此症無分首尾。均宜清熱疏利一例而治。並宜

用白虎解毒湯是二十味藥。濕者多用生地黃。加元參。燥者倍用黃連。黃芩。麥冬。淡竹葉。加地骨皮。木通。黑色漸退者吉。不黑者不治。

唇燥第八十六

唇燥火熱在胃脾。紅赤熱重淡白微。若蒂紫黑而燥者。苦寒之味正相宜。

唇燥乃脾胃二經之熱。其症有三。一則唇淡白而燥枯者。其熱尚微。以白虎湯大條二十去甘草粳米。加麥冬木通牛蒡子治之。一則唇赤而枯燥者。其熱極深。以白虎解毒湯見二十大條加元參牛蒡子連翹木通治之。一則唇蒂紫黑而枯燥者。其熱劇而重也。以白虎解毒湯大條二十加犀角。元參牛蒡子。木通車前子治之。惟宜隨症輕重。以清熱分利方稱良工。

唇舌破裂第八十七

少陰太陰火上冲。唇舌必然見赤紅。正收收後唇舌裂。心脾已絕歸羅歸。

唇舌破裂此心脾之火甚上冲也。其色必深赤間有紫黑者。若初發無及正出之間。唇舌紅而破裂者。此症還輕。斯時其毒在未出將出之際。若得久輕血活。內能托出。口能食。物斯為可治。藥宜用寒涼。加以疏托之劑。以白虎解毒湯。見二十一條六味加元參牛蒡子荆芥葛根薄荷葉治之。若正收與收後而唇舌破裂者。以白虎解毒湯見二十條六味加黃柏元參山豆根木通治之。若唇舌破裂而紫黑枯燥。此心脾二經俱絕兼之血不

活者則難治矣。

三

咽喉痛第八十八

火邪拂鬱咽喉痛。射干鳳粘湯可用。吹喉惟有十宣散。莫犯金針病增重。

毒火薰蒸氣上炎。咽喉自此正煩疼。從東麻痺多咽痛。莫作尋常喉痺看。

麻症屬火。咽喉疼痛。亦是常候。乃毒火拂鬱上薰。故咽痛也。切勿誤認作喉痺。而妄用金針去其血。初潮咽喉者。以宣毒發表湯。五味去升麻甘草桔梗加射干山豆根主之外。以十宣散吹之。有以甘桔湯加牛蒡連翹升麻治之者。萬不可用。方竟芟已出而咽痛者。以靜遠主人射干鳳粘子湯。去升麻桔梗甘草或錢氏甘露散去

熟地黃酌用石斛菌陳加牛蒡子射干防風主之。麻痘有咽喉痛者，不拘初熱正出已收，俱以射干牛蒡子山豆根防風煎湯與服，餘用十宣散吹之。或用二聖散吹之。如麻痘有結喉等候，以射干消毒飲。見五十條去甘草加防風主之。如麻毒上攻咽喉，腫痛熱渴，或腫毒不消等症，以加味骨皮清膈散。見五條去當歸。如石桔梗甘草紫苑加石膏元參麥冬薄荷防風牛蒡子主之。有以大如聖散子治之者，非惟不講避忌，而實於病無濟，方始為收效。如麻痘血熱咽喉不利者，以加味消毒飲去甘草加射干生地黃，或以紫草消毒飲去甘草加生地黃防風射干治之。如咽不利而兼風熱咳嗽者，以射干消毒飲。見五十條去甘草加防風連

翹桑白皮貝母治之。如咽痛而麻不大起發者。以消毒散二
條十三去甘草。加葛根前胡射干主之。如肺熱咽痛聲音不清
者。以全書除熱清肺湯五條去石膏。加射干牛蒡子黃連
主之。有以甘桔清金散治之者。不可輕用。方仍收效。大凡麻症咽痛不能啞。照症用
藥而外。不拘前後。外用十宣散。二聖散。此無越化毒散等方。
任憑選用吹之。

靜遠主人射干風船子湯

射干 山豆根各一錢 牛蒡子 紫草 紫地黃各一錢
蟬蛻 升麻各六分 木通 石膏 桔梗各八分 葛根三分
燈芯九根引水煎食後服

錢氏甘露飲 治心胃熱咽痛口舌生瘡痘疹癰毒上攻牙齦

腫牙齒動搖

大冬 參冬 生地黃 只壳炒 黃芩 銀石斛去苗

熟地黃 茵陳 枇杷葉 甘草

水漱食後服 牙齒動搖者并以此漱口

加味消毒飲

牛蒡子五錢 荆芥七分 防風六分 紫草芽一錢 甘草五分
粳米一撮 冷水煎不拘時服

紫草消毒飲

紫草 連翹 牛蒡子各一錢 荆芥七分 山豆根 甘草各五分

水煎不時溫服

十宣散

黃連 黃芩 黃柏各一 兒茶 雄黃 苦參各五
硼砂五分 乳香分 元明粉分 冰片少許時用時入藥內

為末每用五錢以竹管吹入喉中

二聖散

苦參三錢 善參二錢 桑葉吹喉二三次即痛止腫消。

五錢是

飲硼砂一兩 硼砂五錢 姜委五錢 冰片一

為末每用五分吹喉

化毒湯

薄荷葉 荆芥穗 雄黃 長砂礬二 朴硝一 牙硝
硼砂 甘草礬二錢 桔梗軀五 山豆根五錢
爲細末。以竹管吹入咽中或以水調服。

大如聖欽子

牛蒡子 桔梗 甘草礬 多久軀 水煎服

甘桔清金散

牛蒡子軀 連翹 甘草礬五 桔梗一 詞子皮三
爲末。薄荷少許。煎湯下一錢。或加薄荷。不煎服亦可。如非声
音不清者。則去訶子皮。

附治平常咽喉方備用

射干鼠粘子湯 治咽痛

牛蒡四兩 射干 升麻 甘草各一 水煎服

甘草防風湯

甘草一錢 防風一錢 桔梗一錢 水煎服
加味甘桔湯 治咽喉暫用

桔梗分 甘草二錢 牛蒡子 射干六錢 防風

元參湯四錢 生姜一片引 热者去防風加黃芩

五物湯 治咽痛

麻黃 杏仁 荆芥 桔梗 甘草 姜引水煎服

射干散

治咽喉腫

射干

元參粉

牛蒡子殼

升麻

桔梗

甘草殼

水煎服

海上方

治骨硬

金鳳花根打碎。以米醋煎用。有嘴瓶盛之。令患者將口噙。規嘴。仰面嚥之。其骨即出。吞藥之時勿令沾牙。或用玉簪花根。威靈仙根。如前法治之亦可。

頭疼背強頭項腫遍身痛第八十九

寒熱頭疼。甚者頭項俱腫者。都歸毒火未清降。

麻症本類傷寒。倘或不避風寒。未經清解。邪火內迫。毒攻於裏。症生多端。或有傷寒並作。頭疼背強。或頭面頭項浮腫。或脉強火盛。大熱作渴。或麻收之後。發熱而遍身疼痛。種種症候。在所不免。急宜清火解毒。如寒熱並作。頭疼背强者。當用表散。以宣毒發表湯。硯篋去升麻桔梗甘草。畧加白芷治之。有加羌活者。頭面頭項腫者。以宣毒發表湯。硯篋去升麻白桔梗甘草。加葛蘆主之。脉强大熱。盛作渴者。則以白虎解

毒湯見二十條主如麻出細密遍身疼痛燥者以涼血飲
子見四十條去赤芍加連翹牛蒡子主之。如麻收後遍身疼痛
者以古方黃連解毒湯見三十條加葛根前胡白芷防風治之
有加升麻羌活者亦詳所宜

腹痛第九十

腹痛原因毒內攻。首尾治法不相同。清解通利消飲食。更分虛實莫暇曉。

腹痛之症不一。總由火毒內鬱而不能出。或為風寒壅滯遏抑。或因飲食停滯不化。而皆能致痛。若見於初熱正出之間。風寒壅遏。毒反內攻。而腹痛者。急與疎表麻出透。而痛自止。以宣毒發表湯。見第五條去升麻桔梗甘草淡竹葉。或葛根陳肌湯。現第去赤芍甘草加只壳。或葛根陳邪湯。現第三十治之。若飲食過傷。腹滿脹痛者。以只寶導滯化毒湯。去山楂厚朴檳榔甘草治之。有用平胃散加神農山楂麥芽只壳木通治之者。治腹痛深故當而泊麻腹痛亦非所宜方仍

附大便閉者。加丑牛。或大黃以利之。小便赤澑不通者。加猪

芩澤鴻以導之。若於正敵及敵未盡之時而腹痛者。乃外邪未盡。而復入裏所致。宜兼清中外法。當疎托。佐以清解。使毒

復出而痛自止。

見二十條以清熱透肌湯。

加只壳木通黃芩治

之。如麻全敵之後而腹痛者。治宜清涼解毒。佐以風藥。或分

利餘熱。使毒內消而痛自愈。以化毒清表湯。見十去知母花

粉桔梗甘草。加只壳治之。又須驗其有無他症。分別屬虛屬

實而治。若邪熱內結而腹痛者。以通利大便為主。以河間方

膈散。見二十條去甘草治之。如麻後脾氣不調。而致腹痛。而口

四肢浮腫者。以分利小便為主。以導赤散。見二十條治之。或人

而小便不通者以導赤散見卷二十一加芍藥湯治之。若麻症毒重腹痛頗煩潮熱者以連翹敗毒散去赤芍甘草治之。倘腹痛不止加黃連芩冬治之。若麻症首尾肚痛者此皆由毒火內蘊而然宜先發散以防風敗毒散。或加桔梗甘草治之後以山楂肉煮湯服之。至若元氣大虛陰陽不能升降少水不利遍身浮腫喘促兼見者則難治矣。

只實導滯化毒湯

只貞 青皮 瓣芽 木通 牛蒡子 連翹 加荳
山楂肉 檳榔 厚朴 甘草 燈心引水煎服

連翹敗毒散

連翹 防風 牛蒡子 荆芥 木通 赤芍 甘草

水煎服

平胃散 治胃中宿食不化。藜藿之人宜之。

蒼朮

米泔水浸去皮屑油
炒黃色

厚朴

去皮姜
炒

陳皮

白者

炙甘草

名二
蜜

姜引水煎服

腰痛第九十一

麻疹腰痛症候惡。嬰兒罕有婦老多男為腎敗女血耗治法不同切莫錯。

麻疹之症原係胎毒有感而發而臟腑所蓄之毒因之而洩故諸經皆有見症惟腎為清淨之府不宜見症腰者屬腎膀胱之絡繫焉故凡麻疹多忌腰痛如見腰痛則為逆候然腰痛之症幼孩罕有惟男婦多有腰痛者何則蓋男人有五勞六慾之傷腎多虛弱麻乃火候丙丁熬煎壬癸必涸麻收之後陰血必虧津精重耗故多見斯症乃為腎敗之候最為難治宜以四物湯見二十加五味子六味地黃湯見十五十加枸杞杜仲

故帶之類主之。如尚有餘毒未盡者，更加牛蒡子連翹治之。
如兼有潮熱者，加酒炒黃連、黃芩、鹽酒炒黃柏、地骨皮等藥
治之。如初熱正出已出之時，腰痛者，則於宣發清解藥中，多
加生地黃當歸以滋養之。若婦人出麻之際，或值經來之期，
或因熱重迫血妄行，天癸非期而來，血既下行，已經暴耗，兼
之毒火熬煎，耗中加耗，人身之血能有幾許？當此重耗，未有
不生腰痛之疾者。凡有此候急宜以四物湯見二十一多加元
胡索主之。倘仍有餘毒未清者，或兼有潮者，則仍加炒黃連
炒牛蒡連翹之類，以解其餘毒。清其餘熱，如見於初潮已出
之間者，則亦於宣發清解藥中，多加生地黃、元胡索、當歸治

之。宜急為調治。免致奪血而亡之患。

氣痛第九十二

氣疼皆因風邪干內有餘熱與風搏此症逢之休矣治法當寒熱分兩般

麻痺氣痛皆因內熱未減外為風寒所襲風熱相搏內外夾攻致有此候然有寒熱之分寒者易治熱者難為治之者先

宜探其寒熱而施治。方無差謬。凡遇此候。先以冷飯炒熟。以
絹包裹。乘熱而揩其胸。喜憎而痛稍減者。此寒多熱少。以香
菜湯與之頓服。得吐則寒邪外洩。而痛即止。不吐亦即痊愈。
若揩之而更加痛者。此內熱已極。外感最深。熱毒風寒。搏結
胸中。吐之難。咳下之不利。溫之增劇。涼之弗息。延經一、二日。
肺胃腐敗而死。雖用清熱保肺清胃之劑。亦僅十全一丘而
已。

香菜湯 治寒痛絞腸痧等症

香附米 吳茱萸 五靈脂俱用酒炒

台烏藥略三

水煎濃汁頓服中病即止

頭溫足冷下體冷過膝。四肢身體冷如冰。第九十三

麻症屬陽身宜溫，身不溫燙有火逆，首尾不溫非美候。變症一

見謁闈君。

頭溫腳冷症候逆。初出見之且莫急。正出正收脚仍冷。縱有神方也無益。

遍身發熱麻之常苦。不發熱苦難當。收後下體冷過膝。此為腎敗治無方。

四肢身體冷如雪。初熱見之毒難出。正收收後違斯症。脾胃敗壞死可決。

痘症頭溫足冷為順。如麻見頭溫足冷之症則為逆候。然而

痺症有下身冷者亦有順逆但有先後之分耳何則麻之為
症上膈主之必從頭上熱至脚其初熱時上身壯熱下身及
脚冷冷必須壯熱至足痺方得出故初發熱之時下身及脚
冷冷此為順候若出後及正收之時則上身下體俱以不冷
為佳此時下身冷者則為逆候至於痺收之後則宜遍體溫
涼如常倘有痺收之後雖遍體溫涼如常獨下體厥冷過膝
上止者此為腎敗不治之症若初出之時腰以下不熱毒不
能透而反漸收者亦為逆候急當溫養脾腎或有得生者溫
脾如白芍藥炙甘草之類果仁白朮等味在所宜禁養膏如
熟地黃當歸之屬杜仲枸杞等味又在所必忌只可用

湯二條。去藜冬玄參薄荷荆芥川芎。水火甘草以補其脾。
養其腎耳。夫麻乃肺胃火熱所發。本屬於陽。故四肢身體常
宜溫暖。若四肢身體皮冷如冰者。則是太虛症矣。若初出正
出之時。四肢身體冷如冰者。則毒不得透。而麻必漸收。若正
收及收後。肢體冷如冰者。此乃脾胃倒壞。氣血大虛。毒必不
盡。定不治矣。

瘡疾第十九

麻疹寒熱似瘧症。柴芩湯兒加減進收。後患瘧用鱉甲神而明之。醫中聖。

麻症初熱已出之時。有寒熱似瘧者。此時切不可專以瘡疾施治。宜以葛根陳邪湯。見三十條加薄荷葉主之。至出盡之時。如有寒熱似瘧者。以柴芩湯去人參半夏。加桂白朮。加貝母。骨皮治之。如麻後竟成瘧疾者。治法以清涼健脾開胃為主。宜以靜遠主人鱉甲飲主之。渴者加熟石膏少許。不渴者方中之麥冬知母。須除去之。夫瘧多因脾虛生痰而作。若出麻之後。果是瘡疾。并無餘毒。則柴芩湯中之人參半夏。又何妨。

施用。但肉桂白朮不可輕使耳。又何必拘泥麻初嘗法。麻後餘邪等症之不宜用。燥悍之藥耶。如小柴胡湯。見二十正所宜用。所謂神而明之。存乎其人者。此也。

柴苓湯

柴胡 半夏 人參 黃芩 荷葉 粉葛 雙歸 白朮 肉桂 姜棗引

靜遠主人鱗甲飲

九肋鱗甲飲

新瓦上燒以醋淬數次至黑色。山布兩三片研為末。再用醋拌炙干二錢。

麥冬

蜜出仁五錢。炒各半錢。

白茯苓

錢二錢。橘紅

子一錢

知母

一錢

干葛

各一錢。五分。

柴胡

錢一錢。貝母

淡豆豉

錢一錢。二分。

麻利

良草分
葉水煎服

沉睡昏睡似寐非寐煩躁不眠第九十五

沉睡昏睡似寐同。却有分別在其中。更有煩躁不眠者。臨症无
訛是良工。

沉睡者謂沉沉熟睡。精神意志清白者是也。夫火原屬火侯。
火症得安靜熟睡。本為上吉。然驚分首尾而治。正熱出現之
時。其人精神困倦。沉睡少醒者。則為逆候。何則。蓋緣正氣虧
損邪火內鬱。而未能發揚於外。乃正氣不勝所致。後必變大
熱煩躁者有之。宜以養陰湯。見條十去熟地黃川芎白芍。加
生地黃主之。若再收及收後能食而安。熟沉睡者。蓋脾羸血
俱虛火毒退去而得安寧。比為順候。治法當以補脾養血為

要以四物湯見卷二十加薏苡仁。白苓主之。又有一等。名曰昏睡昏睡者。謂昏昏而睡。不知起止。雖睡多久。醒來不知人事。指其夾車合谷二穴。而不知痛者是也。又有一等似寐非寐者。此兩症無問正出收後。見之良非吉兆。多難治療。當察其兼見何症。而施治之。夫沉睡昏睡兩症。雖相彷彿。而實不同。昏沉二字。醫家最當詳辨。庶幾臨症無訛。又有寐瘡。挾熱作麻不出。煩燥不眠者。法當解毒清涼。以白虎解毒湯。見二十大條

加連翹牛蒡子。以清解之。熱除瘡出。而煩躁自寧。可以安寢矣。若收後煩擾而反不得寐者。是餘火復燃。急須滋陰養血。以六味地黃湯見卷八十一。合四物湯見卷二十。加生東仁二三錢。

與服而陽自欽而得麻矣。

中惡第九十六

麻疹收完幸平復。動止如常飲食足。心腹絞痛忽然亡。此是氣虛中惡毒。

麻疹收完之後動止飲食如常。忽然心腹絞痛而死者。此是元氣虛弱。兼之乘以疫癘之氣。正不能勝邪。邪伏於中外。若無病。內已虧損。一中即死。謂之中惡。

發搐第六十七

疫熱聚於心胞絡。喉中吟吟聲驚惕。未透之時。反為吉慎。勿妄投金石藥。

麻毒流連爲壯熱。煩燥不寧時。搐掣。脊與腰背。清心肝。神爽身涼生可決。

發熱無休。神漸昏忽。然瘧癇似堪驚。莫將風癇同調治。小便須多患安寧。

痳之發搐。不同常論。乃疫熱聚於心胞絡中所致。若見於發熱初出未透之時。俱為無害而反吉。治法宜以疏散之劑。少加清涼之藥治之。以清熱透表。方用五味子去生甘草、杏仁、加

桔梗霜淡竹葉治之若收後而發搐者則爲難治。清嘯消痰
清上焦之火。兼利小便只宜用輕清之劑調之不可誤用鎮
驚金石之藥。以加味導赤散見四十去薄荷石膏加貝母桔
梗霜主之。如癥壅甚者以桔梗仁一味煎湯與服以湧吐之。
如痳後渾身壯熱不除未至羸瘦但多搘掣煩燥不寧者此
乃熱在心肝二經然不可與急驚同治以當歸養血湯去川
芎甘草加僵蠅黃連地骨皮與黃連安神丸相間而服或以
安神丸去冰片甘草用導赤散見二十去甘草加人參麥冬
煎汁送下治之小便清長者可治小便短少者不可治宜以
抱龍丸與服若搐而喉中無痰鳴或自吃指者是非麻之發

搐乃正虛不能主持之候也必死不治。

當歸養血湯

當歸 川芎 生地黃 麥冬 木通 牡丹皮
淡竹葉 磬心引

黃連安神丸

黃連

當歸

龍胆草

硃砂各二錢

金鵝粉

石菖蒲

姜湯泡去
毛蒸

白茯神

各一錢

爲末滾水和作餅薄熱以猪脂心血同搗爲丸以硃砂爲衣
黍米大燈心湯下十九丸

安神丸

黃連

當歸身

麥冬

白茯苓

甘草歸正

硃砂

冰片

二分並

為末滾水和丸蒸熟以續精心血同搗合丸秦米大燈心湯
下十九

抱龍丸

治瘡瘍發

琥珀

天竺黃

白檀香

人參各一兩

白茯苓一兩

甘草

去節三兩

只壳炒

只實

麵炒各一兩

辰砂五錢

金箔一百

山藥

去黑皮炒熟一片

牛胆南星

一兩

為末每藥一兩取新汲井水一兩同入乳鉢內搗勻為丸如
阜子大勿見日陰乾晒則燥烈每用一丸薄荷葉煎湯化下

譺語第九十八

手厥陰經心胞絡熱邪壅滯譺妄作。正收收後兼涼血發熱正出用疏托。

譺語妄言。其症皆由熱邪熾盛，火毒壅滯於心胞絡而作。若

初發然而煩躁狂言或瘡癰而不出者。以宣毒發表湯。見第二條。

去升麻桔梗甘草煎汁調辰砂滑石末治之。有荆防敗毒散去

柴胡川芎羌活人參甘草加木通桑皮骨皮治之者並桂記疏用。若發熱未出正出之際而

譺語者俱為火邪內伏不得透表而致藥宜疏托佐以清涼

分治之品以葛根解肌湯。見第二條。赤芍甘草加麥冬赤茯苓

石膏知母只壳治之甚則加蜜酒炒麻黃以發越之使麻得

以盡出肌膚而譖語自此若麻已出之後狂言亂語者。以淡竹葉燈心煎湯調辰砂滑石末治之。正斂及斂後譖語者藥宜清涼解毒佐以分利涼血之劑。以白虎解毒湯。見二十一條去六味天花粉加牛蒡子連翹木通赤芩以清解涼血而分利之。有
竹葉石膏湯去人參半夏甘桔粳米加生地黃治之者實為無濟使火退毒消而譖語自止矣。慎勿遲延以致不救如熱輕餘毒未除者必先見諸氣色宜預防之始終以消毒飲。見二十條除甘草加連翹只壳木通赤芩以分利之。有用葛根湯加減黃連解毒古方治之者并註記驗用若麻收後餘熱內攻。得衣摸床譖語妄言神昏志喪者死症也。

虛羸第九十九

麻毒流連。熱不除。渾身似火。毛髮枯。眩羸漸匕成疳瘡。得遇良工。病可甦。

麻疹收後。身有微熱者。此虛熱也。不須施治。待氣血和暢。自然退去。若麻疹既收。其毒不解。邪大陽鬱。渾身發熱。晝夜不退。精神倦怠。飲食減少。或咳嗽不止。或便泄不已。或身熱不除。形體羸瘦。毛髮枯豎。皆真元虛損所致。若不及時調理。恐成痼疾之患。倘不早治。以致睡則楊睛。口鼻氣冷。手足厥逆。微匕瘻瘍。變為慢風。不救者多矣。並宜以雙和湯去川芎。以和之。有嗽加橘紅。貝母咳加麥冬。百合有漏加土炒白术與。

炒扁豆加食難孕化加砂仁麥芽。如氣血俱虛以雙和湯分
四君子湯見七十隨症調治之。切禁用寒涼傷脾胃之藥。
專力資培緩圖平復可也。愚按虛羸之候雖係真元虛損故
不宜用寒涼傷犯脾胃之藥亦不宜湊用大補之劑但當清
其餘熱滋其陰血和其脾胃平其肝氣殺其疳蟲使營衛和
暢脾胃健運自然日漸平復神全體肥若以雙和散而治虛
羸竟用荳桂是猶抱薪救火非惟無益而又害之矣曷若以
柴胡四物湯見三十一去川芎加薏苡仁與清熱除疳丸去川芎
加薏苡仁相間而服實為妥當若麻後元氣不復而羸瘦身
無潮熱者乃脾胃虛弱所致調理脾胃平其肝木必漸康強

以白芍湯主之或以八珍湯去白朮人參加欠實米薏苡仁治之慎勿輕用人參白朮恐開其餘邪致難攻理如麻收之後失於調理以致體瘦氣弱。且又泄濁將成疳積者宜以奇效神應肥兒丸或健脾肥兒丸治之如麻後眼青體弱精神不如平日又有嘔吐氣急者以橘子四君湯加姜汁炒芥子尖杏仁治之氣急甚者加蘇子桔梗仁治之若熱太甚或日久不減而漸羸瘦者總宜清熱平肝以柴胡參門冬散見十五加酒炒黃連黃芩骨皮治之甚則以古方黃連解毒湯見三十五合人參白虎湯見六十四條與柴胡參門冬散混三條相間而服以治之。

青秋除疳丸

黃連
當歸各二錢
龍胆草
川芎各一錢
青皮
陳皮
薑薑蝦
乾鱗頭蠍名蛤蟆卵頭
火炙酒淨
均子肉趁粉包煨去壳
黑皮每錢半
為末神麪糊合丸米飲下

白芍湯

白芍藥
炙甘草此二味爲君
麥冬此六味爲臣
蓮肉
山藥
扁豆
龍眼肉
合三四劑水煎服

八珍湯

當歸
川芎
熟地黃
白芍藥
人參
白朮
白茯苓

甘草

姜棗引

奇效神應肥兒丸

治肌瘦面黃或面青面白泄瀉少食肚腹

脹大青筋滿腹或傷飲食常有吐瀉屎如米泔及一切疳症

原枝人參三錢

如力微者用一錢或加乳汁蒸熟

直參一兩代之

大川黃連酒炒二錢

臭蕪荑炒鹽去皮取淨者五錢

均子肉麵粉包蠚去壳并去內黑皮四十五錢

夜明砂木齒去土砂壳取淨砂醋炒乾一兩

漂白术陳壁土炒五錢不宜白术者以是葛仁炒代之。

吳神曲炒五錢

穀麥芽炒五錢

天靈子 郎五穀豆肉湯浸熟炒一兩

淮山藥炒三錢

化青皮 酒炒三錢

胡黃連 酒炒三錢

山楂肉去子鈞酒洗三錢

乾蛤蟆火炙暗消輕切三隻○切片燒熟

花槟榔 三錢

飯等分。如製萬病丸。每吞五粒。以米飲調下。一三錢。

健脾肥兒丸

人參

陳皮

甘草各五錢。黃芪蜜燉瘦扁豆炒

山藥炒

白术

泔水漂土炒各分

白芩炒各一兩

神曲炒

查肉去子各二兩

百合

當歸

去尾八分

黃連酒炒

白芍酒炒

地骨皮去骨酒洗各六錢

陳皮

去白五錢

為末蜜丸彈子大老米米化下

一九

雙和湯

熟地黃

白芍酒炒各一錢

黃芪蜜和

當歸各七分

川芎

炙甘草

各四分

上肉桂三分有熱者去之

生姜一片紅棗一枚青核為引水煎服

妊娠出麻第一百

妊娠麻症若相當。潮熱蒸蒸胎易傷。子去母應無害事。症輕子活兩無殃。

大熱蒸上血海。乾毒火內攻胎難安。急宜清熱養營血。治不依法生禍端。

古云胎遇熱則墮。麻乃火僕。內必有熱。最易墮胎。孕婦出麻。此症極險。當於初熱未出之時。須察其熱之輕重。正出之際。須驗其麻色之紅淡。法宜疏解。佐以清涼滋血安胎之藥。不可犯動胎氣。初熱時。宜用參蘿飲。去人參半夏木香陳皮。加條實子芩。大腹皮以發之。或以四物湯。配和。加子芩荆芥。

桑葉斷艾。立冬過以固物湯。硯朱二十粒。白果錢半子。芩斬艾
金壳砂仁各二錢。生之。或以安胎散。罩胎散。生之。始終以安
胎清熱為主。則胎不動。而麻易出。此理誠當。愚按孕婦出麻
初熱之時。而用固物湯。加白术。艾葉。砂仁。與夫安胎散。罩胎
散方中之人參。白术。川芎。砂仁者。附白芍等味。恐燥悍之藥。
觸動毒火。而熱轉甚。酸收之味。欲固毒火。又只內攻。麻難得
出。症必增危。非但墮胎。且難保妊娠無虞。即如參蘿飲。雖曰
除去人參。半夏。木香。陳皮。而要如桔梗。甘草。亦不宜遽用。莫
若以宣毒發表湯。見第去升麻。吉更甘草。只壳木通。加當歸
條實子。芩生地黃。元參酒炒。黃連主之。使麻毒透出。內熱自

退而胎自安矣。麻出之後。則宜以四物湯見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物見二十條加條子芩黃連牛蒡子之類主之。於

參蘿飲

人參三分。橘葉一錢。桔梗一錢。葛根一錢。前胡各四分。木香一分。五
陳皮一錢。茯苓各五分。只壳三分。半夏一錢。甘草各二分。
生薑引水煎服。

安胎散

人參 白朮 桔芩 甘草 川芎 吉歸身 白芍藥
大腹片 陳皮 連壳砂仁 楊葉 香附米 嫩實子茶
早米引水煎服 初發熱加升麻葛根連翹

麻木多加酒炒黃連牛蒡子山楂肉
口渴加麥冬知母天花粉

若係痘症痘不起發加牛蒡子倍用白芍

罩胎散

白朮 當歸 白芷 白芍 白朮 柴胡 川芎 阿膠
陳皮 砂仁 甘草 粳米引水煎服

一書加乾柿蒂七個苧麻根七寸甜瓜蒂一個將藥入銀器
內放水二鍾以薄荷葉蓋定煎至七分去渣仍將薄荷葉蓋
之溫服按苧麻根薄荷葉并綠茶酒同煎服之最長湯內宜
加入

安胎飲 孕婦出麻宜用

條實子 杞流冰糖 白朮 薑絲丹 人參各一
川芎 陳皮 薑葉 大腹皮加厚朴水煎服 連壳砂仁姜
皮各八分 茯苓一撮引
甘草各五分 軟米一撮引

婦人出麻適值經行及經水非正期而來。第一百零一
女入麻症最難醫。陰質微寒血多虧。待得疹子將發日又甚天
癸正行期。

發熱經行非其時。大都地黃丹等急須停。血停為癰。若待中
虛悔却遲。

正理論云。嬰兒女子益以津甚。以女子陰質血常不足也。麻
症血一不足。多生變症。故女子十四已後有出麻者。常恐天
癸正行。血走氣虛而成伏陷也。宜以養陰揚正。見三十去白芍
川芎。熟地黃加生地黃生之。若女子出麻於發熱之時。經水
忽來。却非經水正臨之期。此乃毒火內蘊。擾亂血海。致血妄

行故經水不依時下也宜以涼血飲子見四十去赤芍木通或涼血地黃湯見四十去甘草或元參地黃湯見五十毫升麻白芍甘草俱加荆芥連翹牛蒡子主之或以古方黃連解毒湯見三十加生地黃當歸炒荆芥連翹牛蒡子治之總以涼血萬症此得經上方妙。如服藥不止人則中虛氣弱麻必隱伏。

產後出麻出癩胎墮第一百零二

產後如逢出麻亦此時物。子免服。桂枝大補氣功最效。莫犯寒涼生氣傷。

嬰兒尚在母腹中。未行麻疹正。水銀加黃柏固墮治法。莫與產後同。

婦人血常不足。產後則血更虛。如產後又值出麻。須當養血。而畧兼解毒之品。以四物湯。五味子。少加荆芥。牛蒡子主之。不可妄用寒涼。恐傷半發之氣。有用十全大補陽主之者。但方內白芍。肉桂。須宜酌用。若欲用之。當俱以酒炒用。以逐瘀生新。白朮須以芡實米易之。若係孕婦出麻。熱甚胎墮。不拘

已現麻未現麻則竟以回物湯現二十加生蒲黃炒薦黃牛
蒡子黃連黃芩連翹炒荆芥主之。以去其毒汚。生其新血解
其毒而清其熱。自後奇效又不可拘崖後之例。宜用補氣血
也。

十全大補湯

人參 白朮 白朮 甘草 川芎 當歸 熟地黃
白芍 黃芩各一 肉桂三分 姜三片 紅棗一枚 引水煎

產婦癆後無乳第一百零三

產婦癆後乳汁乾涸火燭難熬津泉惟有養血為急務莫施峻
劑塞乳源

乳汁乃津液化成婦人產後去血過多兼之麻火燭煉血更
枯而津又涸故乳汁乾竭宜養血以滋生化之源切不可妄
用峻補之藥塞其暢泉之源也宜以四物湯加生地十加花木
通生之

麻後遍身浮腫第一百零四

遍身浮腫因何作。只因麻後氣血弱。嬰兒閨秀從無此。老公婦婦人此候多。

麻後遍身浮腫。童孩罕有此候。惟老人婦人多有之。蓋老人氣血本虛。兼之麻火耗血。以致出麻之後。遍身浮腫。宜以四物湯。見二十條十合四君子湯。見七十條去白朮。加薏苡仁。甜葛根治之。若女人麻後遍身浮腫。必係初熱正出已出之間。適遇經行。陰血重耗。故麻後遍身浮腫。如無餘熱。便開等候。則當以養榮湯。或四物湯。見二十條或四君子湯。見七十條俱多加甜葛根。以治之。

養榮湯 治脾肺氣虛營血不足驚悸健忘寢汗發熱食少體
味身倦肌瘦

人參 白朮 土炒黃芩蜜炒炙甘草 陳皮去白桂心
當歸各一錢熟地黃 五味子橘皮此除 白茯苓各六分
遠志肉五分白芍藥 姜棗引水煎服

餘邪為殃第一百零五

麻後餘邪最作殃。幾經懸候甚郎當。時行腐氣相傳染。疫鬼勾魂赴北切。

麻疹出盡得安寧。邪未盡時症未平。拂上頰熱邪尚熾。頻上脣吐毒猶蒸。

麻疹於欲出未出之時。宜早發散以解其毒。則無餘邪之為後災也。若不知解毒於初。使麻疹出以致毒停蓄於中。未有不為殃者。或為壯熱。日久枯瘦。或為驚癇。或為泄瀉。或為咳嗽。或血喘急。或嘔濃膿而成肺癟。或作瘡瘍而死。此雖一時癘氣之染。彼此相傳所致。而未有不由於人事之未盡者也。葉

斯道者。但見先出疹者。有為餘邪之發死而不治。則復之初發者。卽早為之預解。使無餘邪為害。而不至於夭札。方稱良工。但凡麻疹。只要出得盡。則毒便解。而正氣和平矣。若麻正收之際。而猶拂々煩熱不寧。如蛇在灰。如蛆在廐之狀。或嘔吐。或注漏者。此乃毒邪壅遏。尚未盡出故也。煩熱者。以古方黃連解毒湯。王陳三十加參冬生地黃地骨皮牛蒡子赤芍茶治之。嘔泄者。以柴胡橘皮湯去人參半夏。加枇杷葉木通治之。倘果麻未出盡。以苧麻蘸酒。或蘸胡荽酒。薰之。待麻出盡。則煩熱自除。嘔漏自止矣。如麻收後。只發熱而無他症者。以加減清肺湯。加黃連治之。如麻後有餘毒未盡。而發壯熱者。

外古方黃連鮮毒湯。見三十條加生地黃鮮地骨皮木通只主之。如麻後身熱不除者。以紫胡四物湯。見三十九條去人參白芍川芎。加酒炒黃連。或生地骨皮湯。見三十一條加黃連治之。如麻後餘毒未清。餘熱未盡者。以十仙湯加骨皮。或連翹清毒飲去赤芍桔梗甘草。加黃連黃芩生地黃治之。如麻後餘毒未清。留滯肺經。致吐濃黃膿者。乃成肺癰之候。以桑連散治之。如不愈。以百部湯治之。倘不全愈。以花藥石丸治之。並以山萸為末。用豬肺切薄片蒸熟。蘸白芨末食之。若用此數方。如不愈。則成肺癰。宜以紫苑湯治之。

紫胡橘皮湯

柴胡 橘皮 黃芩 白朮 茯苓 人參 半夏 甘草

竹茹一圓 生姜一片 引水煎服

減瘡肌湯

紫胡 黃芩 生地黃 當歸 地骨皮 茯苓 知母

淡竹葉六片 引水煎服

仙湯

柴手 萸根 元參 黃連 黃芩 枳子 赤決明

只壳 生地黃 陳皮 生姜引水煎服

連翹清毒飲

連翹 防風 荆芥 牛蒡子 石膏 赤芍 桔梗

甘草 水煎服

桑連散

桑白皮蜜 苦參各五錢
黃連 天花粉各二錢
為末白湯送下三四茶匙

百部湯

地骨皮 天冬 天冬 茄母 元參 人蔘仁 百部根
百合 地柏根 水煎服

花藥石丸

地骨皮 百部 百合 天冬 天冬各五錢
葛根仁 花藥石各一兩
寒水石 胡黃連各三錢
真熊胆三錢

為末黃豆粉合丸白湯下

紫苑湯

人參三錢桔梗 白芩各一兩知母 貝母各一錢五分
阿膠 紫苑 黃草各五分 水煎服

不食吃食大旱食食不厭第一百零六

數日不食有何妨。麻色淡潤保無殃。吐出自汗相兼見。果係脾熱用瀉黃。

胃火蒸。口食頻。通利小水便安寧。嘗食大旱生奇症。咬指嘶聲好怕人。

癆於初熱未出之際。多有不食者。乃胃經火邪熾甚。故飽而不索食也。但得麻色淡紅潤澤。雖數日不進飲食。亦無妨害。不必強與之食。蓋熱毒未解。內蘊實熱。自必不食。若見初熱未出及正出之時。以白虎解毒湯。見二十去天花粉黃連山枝仁參冬加荊芥葛根牛蒡子連翹主之。使麻透。蓋內熱清

散。自能食也。出盡而不食者。宜清解胃火。以石斛。情胃散。見十九去赤芍。甘草。量加健運之味治之。麻收之後。如仍不食者。以四物湯見二十加神曲。山楂。麥芽。或更加砂仁。以三劑與服。則自能食。但方內有熟地黃。胃虛弱者。宜少用之。如元氣委頓者。急須培補。防有虛羸之患。若麻收後。胃虛而不納。五穀者。當以理脾養胃為主。宜以六仙散見七治之。若麻後身熱不除。煩躁不食者。此屬膈熱。以河間涼膈散見二十去芒硝。天黃。加丑牛以治之。如麻後身大熱。口渴不食。唇烈眼腫。閉大便秘。小便不出者。以河間涼膈散見二十通利三焦。而愈。若麻後臉青脣紫。赤身熱不食。乃毒火大甚。或得

或渴或咳嗽俱宜以古方黃連解毒湯見三十_五倍用枝仁加薄荷葉地骨皮以二劑與服卽愈。若麻收後而不思飲食鼻乾無涕者以清肺消毒湯除桔梗甘草加桑白皮貝母主之。若因先服涼藥過多有傷脾胃身熱虛煩不食者以四君子湯見七十去白朮加薏苡仁連翹牛蒡子解毒之味治之。但方中之人參必要察人之虛實而施須其臉不紅口不渴唇不赤方可。用之否則不宜。若麻不食而兼吐衄則為胃敗不治之症。若麻後不食而吐衄又兼自汗者真是虛症最為難治。用藥不當變症多端不可。麻初常法當用辛溫解散之劑。如果係牌熱則以渴黃散酌量加減而治之。凡出麻之後。

胃氣未平。飲食不可。審進宜以清粥緩緩調和。使胃氣舒暢。漸進飲食。自無後患。服後若喫食太早。咬指甲。撕口唇。拔眼毛。看手咬人等症。宜以鮮毒化滯湯去甘草桔梗。加青皮治之。又有麻收之後。貪食不厭者。乃胃火太盛所致。宜以大連翹飲見十去赤芍。甘草。紫胡。加地骨皮。黃連。石膏。知母。生地黃治之。

六仙散

馬錢花燒灰。蓮肉。薏苡仁各二錢。藕節一兩。欽石斛

陳早米炒各五錢。為末。米湯送下三錢。

清肺消毒湯

防風 只壳各五分 連翹 前胡 黃芩

桔梗各一錢

荆芥 甘草各四分

水煎作十餘次服

鳴黃散

防風 四錢 枝仁炒 麝香葉七分 石膏五錢 甘草二錢

為末 白湯送下 或用蜜酒拌畧炒仍以白湯送下

鮮毒化滯湯

防風 荆芥 只壳炒 神曲炒 莪冬去心炒 各五分 連翹

黃芩酒炒 前胡各七分 桔梗七分 薑肉 甘草各二分

桔梗一錢

水煎作十餘次服

療後生瘡麻後遍身瘡癩第一百零七

浴早水氣泊膝裏。乾疥濕瘡由斯起。莫道小疾難為患。只愁終身瘡不已。

不知避忌見風早。遍身癢癩如蟻登。此症不因浴早致。消風疎解痒如掃。

瘡癩之生。多見於痳收之後。皆緣生水澡浴太早。水氣流泊肌膝而發。是以痳後澡洗必須過一月之後者。慮其生瘡也。如遇此症。即以防風荆芥艾葉煎湯洗之。或用苦參四兩。石膏蒲二兩。煎水。臨洗時。加入猪胆汁二三個。於水內洗之。或縛牆楓艾葉。楓樹葉。柑子葉。紅浮萍。煎水。洗之。勿用生水洗。

亦不用治瘡方藥薰洗。恐致閑毒反裏。變生他患。為害非小。然不早治。必致每歲對出麻之月而發。雖云小疾。亦須慎之。如麻後生瘡不已。此乃餘熱未盡所致。宜以連翹生地黃湯。或生地化毒煎。及胡麻丸。加何首烏。刺蒺藜。白芷。薄荷之類。煎服治之。或用苦參湯治之。如麻後餘毒未清。變生癰疽瘡瘍者。以解毒湯加防風荆芥牛蒡子治之。或用陳氏苦參丸。荆防敗毒散。見第二條去人參。加連翹金銀花治之。若瘡如癩者。以胡麻散主之。如膿水淋漓。以羌活當歸散主之。若麻收之後。遇身癬痒者。又非浴早之比。乃見風太早所至。以消風散疏解之。其症即愈。如皮膚癢痒不能忍者。以二味消風散治。

之

連翹生地黃湯 治麻毒未盡生瘡不已

連翹 生地黃 金銀花 花參 黃連 劍脊鏡 木通
胡麻仁 甘草 水煎服

生地化毒湯

生地黃 金銀花 白蒺藜 炒苦刺連翹 元參 胡麻仁
白附子 鷄豆水 何首烏 鷄豆水 威靈仙 黃連 木通
薄荷葉 荆芥穗 甘草梢 乾紅浮萍為引水煎服

胡麻丸 治風熱癰瘍及疹後瘡瘍生瘡日久不愈

胡麻仁 四倍防風 威靈仙 苦參 各二 石菖蒲 獨活

白附子鷄血藤
甘草五分
熟地米酒合共白湯下

苦參湯

苦參 大附子去壳刺赤 防風 白芷 何首烏
葛根水
獨活 白附子鷄血藤
豆本 藏青仙 胡麻仁 北金竭
桂枝米
姜參
葛根片 蜜蠻藥刺牛蒡子
葛根 善刺李子無獨活
本方有甘草

鮮毒湯 治一切熱毒腫或風熱癰瘍

黃連 全銀花 連翹 水煎服

陳氏苦

遍身癩痒癬疥瘡瘍

苦參 元參 黃連 大黃 獨活 只壳 防風各

兩

黃芩 枝仁 白菊花各一兩

為末。每丸桐子大。食後或茶或酒服下。三四十九日三服。

胡麻散 治風熱癰瘍。瘻瘍。瘻瘍治癰。

胡麻仁一兩。黃芩 制木 何首烏各入錢。防風、威靈仙

石菖蒲

牛蒡子炒

白菊花

葛根子

白芍藥各六分

為末。食後用荷葉煎湯下。或以水服十粒可。

羌活當歸散 治癰瘍。瘻瘍。瘻瘍治癰。

羌活 蘭草 川芎 升麻 防風 肉桂 制木 連翹

牛蒡子 黃連 芫荽 黃芩 藥杞子

以酒總拌。晒乾。酒煎服。或以水煎用。酒對服。

消風散

治風熱或發過自涼薄小兒痘瘡餘熱癩癧癩

川芎
羌活
防風
荆芥穗
葛根
人參
赤朮
僵蚕各一錢
陳皮
厚朴姜汁炒炭甘草半錢
生蠅頭一錢

一方無藿香荷薄荷
水煎服
如久病頭風目翳日三服
此方妙用全在厚朴人參當如肌表之疾無不由胃而發故
用厚朴清其內卽以人參助諸風藥消解風熱於外則能
活防風制朴始方始得力耳

一味消風散
治皮膚癢痒不忍

薄荷葉
北蟬脫去頭足
葛末食遠酒十

見毒醫毒勿泥麻法第一百零八

風寒暈脭失禁忌。現點卽收不透肌毒歸於內。肚角腫見毒且將毒來醫。

痺有五六七日。稍受風寒。末忌暈脭。數四肢面部。累有痺疼。影點點現而卽收不見。不能透發於肌表。以至毒歸於裏。忽然肚角紅腫。似毒非毒。初用玉枢丹與服。令渴數次。繼用活命飲服之。後以人參黃芪白朮蟬蛻木通當歸之類。託出火毒。起頂出膿。用外科敷藥。與膏藥治之。自愈。此見毒醫毒之法。不可拘泥。痺喜清涼。而竟不敢用補也。

上樞丹又名太乙
紫金丹解諸毒。治諸瘡。通治百病。有起死回生之

功

山芙蓉洗去皮毛淨 五倍子打破洗淨焙乾各二錢

上麝香

雄黃淨皮毛

明珠砂

明雄黃各三錢

紅牙大戟

綿大戟紅柴胡切不可用
去蘆根洗淨一兩五錢

千金子去壳油取淨

為細末秤過等分配合以糯米粉攪糊和丸或作錠子聽用
活命飲又名活命丹 治麻出卽收忽爾作毒毒將出及毒出

後並宜

當歸 獨活 杜仲 泰艽 細辛

秦艽

白茯苓

桑寄生

上肉桂 熟地黃 北防風 川芎

黃芪

甘草

加人參 水煎服

附錄進賢舒馳遠先生麻疹論一篇并案五條

安成阜山劉齊珍輯刊

麻疹論

經云痘癩于陰而成于陽。麻癩于陽而成于陰。此陰陽互根之妙也。麻乃先天真陽中之胎毒。然必得陰與之交感而後能生其化。故曰成于陰也。方其初發熱三日必周身癩已。微似有汗而苗乃見。汗者陰之液。發熱而癩已者。陰陽交感施化之驗也。苟非有癩已之汗。則榮衛乾枯。腠理閉固。其苗何由而得出。出耶。及其齊苗。勝個顆粒紅活鮮明。是乃榮血附隨其氣。毓成佳碩。而精華發見於外也。其後以漸回竭。竭後之暴博。缺漏甚微。由

感而化陰得之而為癰。速者陰血之所屬也。不欲其速。收其餘毒復侵入內必有後患。是功成于此。豈非成于陰乎。所謂麻粟陽而成于陰如此。然必内外無邪方能成功。邪則傷正。有害於麻法當分經辨証。依法定方。使邪去而正無害。則榮衛和順。陰陽交會無所往而無不得之矣。凡瘡症。重在養榮。麻症只要齊苗。苗齊劫局八九。其後不過調理而已。形色喜鮮明而嫌暗滯。不妨其多。總要出得透。七則內無留毒。其症常兼咳嗽。及咽喉痛。用潤治法。以甘草桔梗為主。相症加減。若紅腫惡寒。口渴尿赤。宜加黃芩生地牛蒡子。外用斬艾蛇床子研末。新火到盛燃。吸烟取出痰涎。因痛漸愈。若不恐熱。舌胎白滑。宜加半

夏南星。外用蕲艾半夏兩星研末。吸烟出涎。若聲音重濁。更加阿膠。正竹雞子白之類。若不紅僵。舌胎滑而冷。不渴惡寒。喜熱。宜用半夏南星附子肉桂之類。外用油紙大紙燃照其後頸。或用生附子研末吹之。自愈。凡此不應。但引其端。而未詳其法。非累也。用治不在此經。愈在本氣相隔之處。

附案

余醫老叟者二十有七。夏月出疹。頭身微熱。面赤煩渴。咽喉痛甚。時醫無用藥。第牛子甘桔姜茶。轉加作泄。大泄數次。疹頓沉沒。咽喉轉閉。口不能言。人事恍惚。暈眩欲絕。時久有在坐。予謂天育曰。此証全是一圓。於某在經。若用痧家通脊藥。必不可

往天有曰。何以言之。予曰。若用實有火苗。當紫赤。何得復紅。且咽喉雖痛。而不赤腫。又無頭渴惡熱等症。明明肺臟虛寒。陰火上炎也。且陽和布令。百體順昌。麻疹屬陽。必先陽始得。山透見點之時。如初生初吐過陰極肅殺之氣。權殘所生。靡明可遺。今值此陰邪橫發。壞脾陽而疹不沈。誤者或希冀。惟是陰進附子乾姜半夏甘草白朮茯苓肉桂黃芪溫補兼行。以驅陰回陽。俾穀劣悉返冲和。乃得功收再造。危乎微乎。

從姪經千年三十出疹。初熱時心中煩燥。腹內疼熱。甚為剝床。彼因問三豆湯可服乎。余曰可。急煎服。于是心腹煩熱乃解。苟不出現。人事暈眩。咳逆喘促。鼻唇扇動。詳察其証。知其為熱毒。

壅塞于肺。上壅則津液不行。机竅不開。苗故不見。因用黃芩以清裏熱。阿膠。麥冬。以潤肺燥。桔梗。開提肺氣。紫葛。夢薄。清解外熱。甘草。酸中。杏仁。定喘。服二劑。苗雖出透。而色皆紫黑。人亨更覺沈重。飲食一點不能下。余情謂其家曰。麻書有云。淡紅者生。紫黑者死。其家駭怖無似。余復安之曰。豈真死症耶。但其症極險耳。此為內熱甚而血結也。其証舌乾口臭。惡熱喜冷。聲音响亮。仍用黃芩。麥冬。阿膠。以清內熱而潤肺燥。加以丹皮。鴉血中之熱。合紅花之活血者。以散血結。時退牛蒡解其外毒。黃連。甘草。解其內毒。連進三劑。人事漸安。飲食漸可。紫黑漸退而麻疹塌矣。然有陰邪內盛者。苟亦紫黑。法宜驅陰回陽。其証舌潤不

渴聲低忽短促寒寒熱與此不同

前月其弟字志干者年二十一歲。塗出甚難信任內惑所薦之醫不知解托。概用寒涼逼鬱肺氣而不能出透。至九日而死。經于謂其弟不自謹慎。起居失節。飲食失調。以至此耳。傷哉。其弟為庸醫所殺。不歸罪於醫。而反躬自責。足徵心地博良。皇天豈無默庇。所以自出瘳疹。其症雖險。而終無害也。竊謂賞善自應罰惡殺命之醫。寧不速誅之耶。抑何日得蒙上天併顯誅其薦醫之人。方快吾心焉耳。坊云賢不薦醫。仁為賢人所不薦。獨愚人可得而薦乎。于是余又痛恨夫薦醫殺人者。

自醫天瑞之子。大熱大渴舌乾口苦。咽喉腫痒。氣喘腹痛。下痢。

紅白小便赤熱。茜草色紫而暗綠。此為火邪克斥三焦。與為熱壅。
傷津。心煥解肺而喘。上攻而為喉痽。下迫而便紅白。精津血脈
受其煎熬。故齒色不紅活。口苦者。少陽之裏熱也。方用柴胡黃
芩清解少陽。大黃通潤三焦。實然絕仁引三焦之火。星曲下行。
生地紫草以解血分之熱。杏仁定喘。桔梗開提。甘草和中。服一
劑。諸証悉發。惟腹痛未減。小便如故。是夜用神砂六一散二錢。
桔梗煎湯化服。使桔梗通天氣于地道。則氣不滯而壅自疏。六
一散。開支河以潤小腸之熱。一服而小便通。腹痛即愈。次日苔
轉紅活。諸証俱已。于是方中減去柴胡黃芩大黃桔梗。更加當
歸茯苓散劑。而全愈矣。

昔醫國先之孫。孫色後紅頰燥口渴唇爛而膚清淡成瘡飲食不思小便短大便閉子細察之此証內真寒而外假熱其人惡寒身僵軟麻乃少陰証也內有真寒舌胎滑而冷口雖渴而喜熱飲且不能多飲小便短大便閉者以清涎上湧津液逆而不降也。謂証皆非真熱乃假寒也方用附子白朮茯苓半夏吳萸服一劑。苔色略轉人事飲食亦漸就康再投一劑口唇全愈。清涎亦不吐矣。大便初硬後溏旋即又行轉紅白痴。吾知其裏邪從下行矣。不胃氣有權機腐當去之微也。但小便仍短方中重用肉桂末藥內化服三四劑諸証皆愈而成功矣。

附錄胥山王琦先生醫林指月書內論瘡一篇附證一則

安成阜山劉齊珍輯刊

瘡論

瘡猶錯也。皮膚甲錯之謂也。俗名曰瘡。實係疹也。紅點隱匕。謂之隱疹。匕之根源。乃毫毛之內。皮腠之間。因于寒。致血凝滯。其凝滯之血。散發于皮膚之外。則發而為疹。蓋人身通體毫毛之氣肺所主也。毫毛之內。腠理之外。則秉胞中之血。熱肉充膚。淡滲皮毛。肝所主也。皮膚寒而血凝滯。始為凝滯。繼缺流通。則發熱咳嗽。散而為疹。匕之發也。有稀少。有稠密。極稀少者。不過數點。以及數十點。極稠密者。則遍身頭面。無有空隙。醫者不知其

故見有數點。卽行攻發。若皮膚肌腠之間。果有凝滯。則發熱咳嗽。自當湧出。其不能出者。非肌表不和。卽氣虛不振。治之之法。當以紅花歸芍。荆柴羌丹之劑。和其肌表。或以桂枝茯苓湯。芍芩甘之剤。助其氣虛。若槩以蕷麻前杏芩連石膏之剤。投之其氣虛不出者。此為虛其原本。匕自稀少者。此為無故受賊。惟疹不能出。其經脈表裏受虧。致身大熱。而喘急生。愈熱愈表。愈喘愈熱。輕者重。匕者死矣。蓋痘之發也。見有一二點。其勢必不出。疹之發也。見有一二點。可出可不出。若肌表果有凝滯之疹。則身熱咳嗽。其勢自出。若無疹。則止此數點。不能再增。善治者。明乎此理。不行攻發。但調其經絡。和其榮衛。虛者補之。寒者溫之。

之則熱退身安而愈。無奈蒙昧不明，當疹毒盛行之時，見有數點，即行政發轉攻轉劇，愈發愈危。必致真藏虛敗而死，真可痛耳。夫痘毒起于腎，不從經脈而出，固為腎經痘。雖有良醫不能統治。若疹則其根源在于肌腠皮膚。七廢之血根于胞中血海。膚腠寒而胞血稽遲，則有疹毒之證。得其源而活法以治，或聽其自然而不加妄治，百無一死也。

附證

己巳春長男甫六歲，次男甫三歲。于元旦次日俱發熱見疹。余初不知疹之根源，以為嬰兒生下時口含惡血，開聲喫下。其後發為疹毒。治疹自當攻發，即用清涼透降之劑服之。次朝客增

十餘點。究不暢達。心甚惶惑。長男七月而生。先天怯薄。問其胸
膈寬否。何如。答曰。能甚。又問口味燥苦何如。答曰。淡甚。因知其
虛。即投葳朮。杏甘桂枝紅花一二劑。次朝疹發。偏身熱稍退而
神情猶煩躁。夜發熱。頻咳嗽。至一月方安。蓋因見點之初。遇服
表利。虛其經脈故也。次男尚幼。未省人事。不能致問。上冬患肺
風。痰喘。證諸藥。不效。服麻杏桂枝石膏湯一劑。而痊。謂其羸質
堅強。不與長男同。其疹不透。必寒凝毒甚。因與桂麻前杏黃芩
石膏藥。紅點不增。人與紫蘋葱薑芫荽等。煮之。熨之。疹總不出。
乃與同道諸公商之。俱云。舍透發並無別法。至五日而口吐蛔
蟲。見醫曰。此熱極蟲生。余有牛黃散可與服之。牛黃散印大黃。

末也。一服痰喘止。而神氣稍平。自是此兒遂無言矣。計無可施。復針百會穴。開其瘡門。服西黃分許及諸單方。觀其形證。實不能生。友人張衛生來望。因曰。此大虛大寒證也。今既無言。又不能食。恐無濟矣。然心猶不忍。勉授參附。含藥而亡。因自嘆曰。此庸醫現身食報。天理當然。自身行醫。何尤乎人。因悔昔日所見之。皆非益信。治病求本之不謀。次日有同居甥汪姓者。伊子出痘。已經三日。見余際悲傷。不邀診視。自用前杏林黃石膏藥一二劑。疹出廿餘點。不能再增。心胸煩悶。不得已而告。余乞余診視。余曰。若再攻發。即如吾子矣。急與藥。水草附桂茶。紅花等。服一剂。而熱退身安。余自此始悟疹之根。雖凡治疹。但調其氣血。

和其經絡寒涼。攻發槩置之不用。所以屢效而屢效也。次年春友人吳題仙之子。甫一歲出痘。延兒醫馬雲。則兄診治之。攻發不透。神情恍惚。嘵嘵不寧。只延余診視。余住吳宅。聖寃先至。余視之知其虛也。因告生人曰。若但發瘡。口斷不出。必至身命不保。主人曰。為之奈何。余曰。惟有溫補藥一劑。益其藏府。安其腸胃。助其氣血。方可。聖兄曰。吾治四朝。不能透發。悉聽尊裁。余即與芪木姜桂歸芍芩甘銀花紅花諸味一劑而安。次日仍用原方加人參一錢。此後並不服藥。連服獨參湯數日霍然矣。又有夏姓耀如之子出瘡。其顏色紫黯。神氣不寧。余曰。此證大凶。治須得法。連看二次。皆用溫散藥。次早其家人來告曰。口吐銅錢。

另有藥否。余曰昨藥二劑。俱服否耶。曰尚存一劑。因與附子八分。令入藥內。煎服。自此遂無音耗。越三載。至其家。見其子長大。余固問曰。昔年出瘡。吐衄。何由得愈。其家答曰。服先生之藥後。因無力相延。仗天覆庇。得以漸愈。余默嘆曰。因死吾子。得生他人。人治瘡之法可無憾矣。余固附載斯冊。雖不能見信於兒醫。而正道闡明。實有裨於兒科治瘡之根源。而為有子出瘡者所當致慎也夫。

跋

自來可法而可傳者類皆身心性命之編此活人一冊所由壽世也第有傳書而遞續傳書者不得其人勢必簡斷篇殘甚至以贗亂真而不可救斯即善藏如楊玠善閱如王充其如無善本何湘西李星懷堂好善士林也余擁皋比十稔竊嘗窺其居恆范堯夫之憐貧賣萬鈞之濟

急蓋駸駸乎其力效之今又不惜工資續梓是
書以傳世更復遙遙相望於同志蓋本平昔憐
濟之善心充之以利人身心性命於無量而又
逆知人之好善誰不如我是誠心前賢之心以
心後賢之心者所繫豈淺鮮哉余亦不禁心心
相印因誌數語以殿其編云

鴻甯張壽基敬軒氏謹跋