

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋竇大師瘡瘍經驗全書卷之六

宋燕山竇漢卿輯

明三衢大酉堂續梓

目錄 凡二十症

鶴膝風圖說方三 膝腿毒圖說方二 人面瘡圖說

肘疽骨槽疽圖說

脚手發背圖說方三

骨瘰疽圖說

脚拐毒圖說

骨疽瘡圖說

跟疽圖說方一

鞋帶瘡圖說方二

血風瘡圖說方三

風疔瘡圖說方一

腎氣遊風圖說方二

粟外癩瘡圖說

方五

飛遊毒圖說

方二

紅絲瘡圖說

方一

楊梅瘡圖說

方十八

癩瘡圖說

方十二

雀子斑圖說

方二

諸瘤圖說

方七

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之六

鶴膝風
圖論方



鶴膝風痺風鼓椎風之類也氣血相並而行週于一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作矣多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受邪鬱為瘀滯不得運行所以作痛夜則痛甚行于陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕而積熱得發其血自行與氣相和其病乃止或因澁藥取効性急作勞常享厚味感冒風雨膝腫則痛甚皆瘀血流于經隧行久不治悉成偏枯以致膝腫筋縮大痛兩足無力脚弱漸細筋骨枯槁拘挛不能屈

作治宜祛風順氣補血壯筋養陰除濕則氣血通暢口
然愈矣

大防風湯

人參一錢五分 羌活

獨活

甘草

牛膝各一錢

白芍

熟地

白朮

防風三錢

黃芪

杜仲

川芎名二錢

蒼朮一錢五分

附子二錢

水二鍾姜五片棗肉二枚煎服飲好酒以助藥勢

追風除濕圍藥

多年陳小粉

四兩炒焦色

乾姜

一兩

官桂

一兩

五倍

一兩

白芷

一兩

龜板

醋炙一兩

當歸

一兩

防風

一兩

白芨

三兩

烏藥

一兩

乳香

二兩

右為細末用老姜汁曬醋各半葱汁一分蜜少許火上熬熱調藥乘通手搽四向空中出毒時用餘汁熱潤之以助藥力

四妙丸

蒼朮

二兩

白芍

龜板

好酒炙

酥各二


兩五錢

黃柏

五錢蓋酒拌炒

右為細末酒糊丸如桐子大每服六七十丸當歸湯下酒亦可嚴寒加附子三錢

膝眼毒



此毒受在腎經膀胱不流氣血凝滯而濕熱攻于膝眼

結成毒也。圖藥用鶴膝風藥敷之。煎劑用木香流氣飲。

當歸 蒼朮 白芍 白朮 白芷 川芎 木香

牛膝 木瓜 烏藥 澤瀉 薄荷 紅花 五加皮

茯苓 葳靈仙 水二鍾 姜七片 葱白二根 煎服

次服大防風湯 方在前

又方治膝腫 歸須 赤芍 菴仁 蒼朮各二錢 黃芩

連翹 羌活各五分 木通 紅花 甘草各三分 黃柏各一分 金銀花

一人痰濕流注勝膝紅腫如腫毒相似 膠浮滑用前藥

十二味加南星牛膝龍胆草

人面瘡



此症生于兩膝之上形如人面口眼俱全患人飽則不
動飢則口眼俱動俗呼為冤業瘡膝蓋之間然膝者筋
之府屈伸不能而行則俛附筋將僣矣此係皮肉堅硬
之所且生疽毒則裏先潰後爛皮膚攻作故成此形宜
作善事解之須要真誠懺悔然后方可用藥初用沅氣
飲久不愈者服苦參丸補腎水再用猪蹄藥湯洗之以
生肌定痛散搽之后用膏藥貼上

沅氣飲 苦參丸 方具瘰疽圖后

又方搽藥貝母末用竹筒吹入瘡口內數日成痂而愈

腕疽

骨槽疽



疔疽腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知其因成膿
在內一時不能出皮膚須用內托發出方可用針刺破
骨槽疽生于膝蓋上并脚踏上腕其痛時如刀割其痒
似虫鑽急用艾灸瘡上三五壯便貼乳香萬應膏更服
黃凡丸

治法同附骨疽

脚手發背



此症因心經有熱行履高低傷于足跌血聚成疽治法
同於漏濕毒流注

加味流氣飲治足趾

川芎 麻黃 甘草 肉桂

乾姜 半夏 茯苓 枳殼 白芷 厚朴 芍藥

陳皮 蒼朮 姜三片水煎服

木瓜 栝柳散治足上

栝柳 木瓜 紫蘇 陳皮

甘草 木香 當歸 赤芍 再服蠟凡丸

羌活散治手上 羌活 獨活 前胡 荆芥 甘草

烏藥 桔梗 薄桂 升麻 當歸 威靈仙

骨痠疽



此症生于手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可
忍漸長大如楊梅之狀血不出亦不生膿毒從經絡流
于遍身有此疾者宜常謹防不可視為輕疾昔日山東
唐世民感此醫者云此疽生為奇相恐是惡毒世民笑
而言曰吾乃識字人天賜與吾為筆架後及一月遍身
攻串其疽只口內出臭黃血水三五碗出水不至十日
其亡矣後待洗浴停屍衆人持起遍體俱爛皮肉盡落
今有此疾各宜仔細推情施治之宜用治疔之法加減
行之

脚拐毒



此毒受在腎通于陽明筋聚之處疼痛傷心成毒也當
用藤眼毒眼疽毒及鶴膝風藥治之

骨疽瘡



且骨疽瘡之發皆由血凝氣滯徹骨酸疼或房事過勞或乘虛入水感風合寒或風毒邪熱侵乎榮衛或憂鬱傷于心肝胆腎經或飲醇醪燒酒煎炒炙燻等物或遠行又傷于酒色自然腫痛日久成膿初起宜灸百壯以骨熱為度久宜用銀火針破之血膿元氣盛易愈白膿氣弱難愈治法以獨活寄生湯兼服十全大補湯倍加茅山蒼朮新昌白朮及肉桂乾姜人參黃芪當歸為先鋒之要劑繼以霹靂靈應散治之無不愈者肉桂乾姜白芷防風蒼朮烏藥龜板酥炙五倍多年陳小粉炒黑

各等分為末射香少許和勻老姜汁五合醋三合葱半
觔和蜜一兩同搗取汁火上熬滾乘熱調藥搽患處曰
向空中出毒氣時用餘汁煎熱潤之以助藥力少勞戒
氣絕慾除想十句方愈若病人不遵從醫師之訓任一
已見恣情傲物憂慮萬端不能制六氣七情之私雖天
醫院靈官亦不能治而况中醫乎噫恬澹虛無病安從
來心有佛齋諸病生為實此之謂也凡患病者宜自修
省恐懼洒落坦夷指日可愈何須多服藥餌耗傷元氣
并免饋送于良醫不亦善乎 治法與附骨疽治之同

聚疽 一名牛齒蚕 一名土栗



此毒生于脚眼之上因行動高下脚傷故生此道形如

鞋帶磨受在寒濕足陽明為毒氣血相聚而成也當用
定痛流氣飲治之

棋柳散

紫蘇 枳殼 厚朴 甘草 芍藥 陳皮 青皮
腹皮 香附 棋柳 防風 姜三片 莢一枚 煎服
脚心毒受在腎心經在脚心是為濕毒也乃各脚心癢
當服定痛流氣飲并棋柳丸治之

定痛流氣飲

人參 桔梗 芍藥 枳殼 烏藥
當歸 川芎 茯苓 白芷 甘草 乳香 黃芪

血風瘡



此瘡因婦人經脈不調或一月兩次或過月不來以此

血氣漬入足陽明經故生此瘡宜用木香沉氣飲五積散

隔紙膏

黃栢

蜜炙

飛丹

各二錢

輕粉

一錢

面粉

一錢

桐油調作隔紙膏貼之

又方黃栢

蜜炙

黃丹

蜜陀僧

蘆薈

各一錢

船底灰

二錢

輕粉

樟冰

孩兒茶

五倍

各一錢

右為細末

清油調搽痛加乳香臭加射香浸淫加青黛

又方輕粉黃連黃栢飛丹五倍枯礬各等分

風疔瘡



主相學辨選六卷

十四

且風疔者絡連脾胃絡足陽明經寒濕相傳風毒交接
容于谷道之間注于承山之側初生癬疥破有黃水浸
淫成瘡攻于遍体或麻木而破裂治法同前其中加減
之法難以指明宜推類消息之

如聖膏 治一切風疔疥癬痒痛終年不効

麻油 八兩

巴豆仁

錢當歸

五錢

輕粉

二錢

黃蠟 三兩

右為細末先將清油鍋內熬次入巴豆當歸末后下
輕粉黃蠟搽患上

治法與脚拐毒方同

管氣遊風



腎氣遊走毒在脚肚受在膀胱經冷氣傷腎之實後
膀胱此乃風毒也當用紫蘇流氣飲
紫蘇流氣飲

紫蘇 桔梗 厚朴 甘草 芍藥 白芷 陳皮

檳榔 香附 大腹皮

姜三棗一煎服

檳榔丸

檳榔_{二兩} 枳殼_{二兩} 大黃_{四兩} 木瓜_{一兩} 木香_{一兩} 為末煉蜜丸

如桐子大每三十丸空心任意送下 用鉄箍散_之

裏外癩瘡



三里之傍陰交之側生之者因腎經寒氣攻下下焦內
因風邪之所攻外有冷氣之所搏或因僂推而致生此
瘡漸然潰爛膿水不乾蓋因濕熱風毒相搏而致然也
治方于後

紫蘇流氣飲 三香和氣飲

又方

輕粉 黃丹 黃連 當歸 白芷 生地

爲末
乾搗

又方

飛丹 黃蠟 各等分 用火熬作隔紙膏貼之

又方

伏龍肝

即竈中紅土

輕粉一錢 黃丹

煨過水飛

沒藥二錢

血竭二錢 滑石

二分 孩兒茶一錢

絨灰一錢

鳳凰窠灰

一錢即鷄胎子內白嫩皮

右為細末乾摻

肉深加天靈蓋

臭加射香

隔紙膏方

自然銅

五分好醋煨七次

乳香

沒藥

血竭

各一錢

黃蠟五錢

銅青五錢

細芽茶

八錢各另研為末


黃栢末

四兩

先用生桐油四兩煎滾取出先加栢末后

加茶末待略溫再加細藥次加射香五分

飛遊毒



此毒因榮衛受其肌熱故生此疽赤腫走注不定用溫水洗患處用三稜針刺毒上二三十針或磁鋒砭之亦妙用拔毒散付之

拔毒散

乳香 黃柏 黃連 雄黃 末之鷄子清調付之

解毒十宣湯

豬苓 澤瀉 當歸 生地 白芍 防風 荊芥
木通 甘草 黃芩 枳殼 小柴 天花粉
白朮煎乳母及子同服尤妙

紅絲瘡



夫紅絲者心腸積毒氣血相凝滯于經絡之間發于肌

膚之上紅絲貫穿或如一紅線或疼或痒皆由風熱相乘而生如箭之速若行至心間即死急當頭以磁鋒刺破擠出毒血其紅絲之中再刺之方絕其根急用當歸連翹解毒之劑治之須戒酒數日

清心解毒飲

| | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|----|----|
| 當歸 | 生地 | 赤芍 | 川芎 | 升麻 | 乾葛 | 連翹 |
| 山梔 | 蟬脫 | 黃芩 | 防風 | 桔梗 | 羌活 | 木通 |
| 青皮 | 枳殼 | 玄參 | 天花粉 | | | |

楊梅瘡一名廣東瘡一名微瘡 儼音梅



此瘡皆臟腑之積毒脾家之濕熱其起也有三因男子與生疔瘡婦人交感薰其毒氣而生或體虛氣弱偶遇生瘡之人穢氣入于腸胃而生或先患瘡之人在于容厠去後其毒氣尚浮于客厠之中不知偶犯其毒氣薰入孔中漸至臟腑或在頭頂中或在肋下或糞門邊先起有雄有雌雄者大如白果遍身生五六十或百枚分槩不成片雌者小如豆瓣遍身連片膿汁淋漓不能累人嬰兒患此者皆父母胎中之毒也宜用汗藥宜用服藥宜用搽藥不可服丸劑恐內感輕粉易愈故也但輕

粉乃水銀昇也腐腸爛骨害不旋踵

汗法

用槐花半升揀去石灰枝梗鍋內炒焦下酒三升煎
滾瀝去渣乘熱飲之以衣覆身出汗為妙

又汗藥

升麻 白芷 甘草 蒼朮 當歸 穿山甲

赤芍 羌活 獨活 防風 荆芥 大柴胡

麻黃 連翹 木通 薄桂 桔梗 金銀花

水酒各一鍾煎八分乘熱服之以衣覆身出汗為妙

煎藥方

防風 一錢

木瓜 二錢

白蘚皮

一錢五分 連翹

黃芩

金銀花

各一錢

皂夾子

大 薏苡仁

炒 當歸

川芎

白芍

熟地

各八分

升麻

甘草

各三分

人參

一錢

白朮

一錢

顛頂加藁本

冷飯糰四兩水六碗煎至四碗瀝去渣每藥一劑用

汁二碗煎至八分瘡在上食遠瘡在下食前瘡在遍

身不拘時服忌茄子糟物及牛肉茶葉此藥服四十

劑方無后患

薰洗方 夏天一日一洗冬天兩日一洗

防風 芍藥 山柰 苦參 薄荷 金銀藤

蒼朮 黃柏 地榆 黃芩 連翹 蘄艾

骨皮 花粉 蒼草各三錢 加鉛一 紫蘇一把

水二斗煎至數沸去渣傾在浴盆內將板一片放在盆上坐之上下週圍以竹圈或蘆席遮護之無風處拭乾滋水然後搽點藥

點藥

珍珠一錢 杏仁五錢 去皮另研 輕粉五錢 射香二分

右四味和勻每用雄猪胆汁調勻搽入肌肉不見藥
為効如有脂水出再搥再搽

又方

鴨嘴胆礬為末水調塗之亦可

又方

水銀

輕粉和研杏仁

風子肉

孩兒茶搗

右各等分和勻在頭面者用鵝胆在身者用猪胆在

脚用狗胆汁調搽

服藥久不愈下行藥

白殭蚕

三錢

全蝎

七枚

枝酒

先煎

上

當歸

白芷

白芷

穿山甲

炮各二錢

大黃

四錢

末之

五更

空心

察

湯調

下作丸

酒亦可

或用行利數次用薄荷補之明日

或再隔一日如前服則濕熱蟲毒自消矣

輕粉毒方

此毒之發皆由起瘡之初求速愈而服輕

粉故生此毒也發于四肢者易治發于頭面者難愈

人參

一錢

當歸

二錢

杜仲

一錢

五分

新器

茯苓

一兩

酒

牛膝

三錢

赤芍

一錢

黃柏

五分

知母

俱用

鹽酒炒

獨

防風

甘草

白蒺藜

五加皮

各二兩

白朮

五桂堂精選

六卷

三三

三三

三三

三三

陳皮 羌活 麻黃 白芷 各一两五錢

冷飯糰四兩煎服二法同前

年久輕粉毒

上茯苓

五當歸 四兩 鉛 一斤

川椒 八兩 大酒二十

觔文武火煮焚三枝官香為度埋土中三日出火毒飲之

輕粉毒膏

輕粉 三錢

蘆甘石

一兩 火煨過

牡蠣

一兩 鹽泥裹入

真桑豆粉

二兩 焙乾

右為末同生桐油調勻入磁盆中以艾火薰熟作
紙膏貼之兩日一換

梅瘡破碎搽藥

五倍

一兩去中間白花
粗米炒斷烟為度

垂屑為

鷄內金

七錢生用

黃栢

一兩去粗皮
褐色

猪胆汁潤炙

血丹

少許

冰片

二分

大紅絨灰

二錢

天靈蓋

煨存性二錢

右各研細末和勻搽之

梅瘡搽藥家貧不能辦藥者

大黃

一兩

信

三錢

俱為末和勻外用麵糰包前藥炭

火煨熟內藥如糕樣再用火炙乾研細末先用防風
荊芥湯或茶清洗過然後摻之黃水出即愈

斷根丸

龜板

重便浸七日酥潤炙黃研末

槐花淨樺皮煨

各等分為末蜜丸酒下一方加水香

又日夜痛不能行動

紫花地丁草

蜂房煨乳香

沒藥

升麻

各三錢

為末每用五錢酒調下

輕粉毒爛深不長肉

乳香

三錢

血竭

五分

孩兒茶

錢一天 靈蓋

煨二錢

末之加水片二分乾摻

廣瘡輕物煮酒方

車前草

一京生用法
去泥

蕪黃蛇

一條去頭尾
生地四兩

白蠟

二兩

婦尾

二兩

藥本

四兩

川芎

二兩

牛膝

四兩

白芷稍

二兩

羌活

五錢

白朮

四兩

甘草節

一斤或半斤

石南藤

二斤

微香長沙

一分半

防風

八兩

薏苡仁

四

兩

槐花

四兩

鬱金

四兩

小紅棗

四十九個

冷飯團

一斤

江西白色者好

用好葱三十根好大酒十五斤將藥切片各稱准酒
放瓶內將藥入瓶內白綿紙數層又放竹葉縛緊瓶

口不冷出氣重湯煮之放大米在瓶口上米熟方好
取瓶埋地下火毒酒冷了取酒面上白蠟用鉛一
斤打成餅將前酒內藥渣取出晒乾共為一處為末
糊丸如桐子大每服六七十丸酒送下

廣瘡膏

松香

一斤四兩熬去渣

杏仁

四百九十粒去皮尖

乳香

一兩

沒藥

一兩

銅綠

二兩

黃蠟

一兩

蓖麻子


四百九十粒
去皮淨肉

射香

三錢以上俱另所

將各藥為一處放相內搗及千餘下相頭上抹油不
沾相頭不許鷄犬見之不綠矣膏用紅絹攤之絕妙

癩瘡



夫癬之生也由于脾經濕熱及肺氣風毒所致或坐卧當風酷暑漬水以致皮膚不仁遂成頑癬或如雲或如銅錢或如荷葉或長或歪其形不一發于上者屬陽易治發于下部腠間脉腿屬陰難愈年久者癬內濕熱所化有疥虫極痒其名有六焉

一曰乾癬搔則出白骨索然彫枯如蟹爪路之形

二曰濕癬搔則脂水浸淫如虫在內極痒遇熱湯浴之其痒不可當

三曰風癬搔則痺頑不仁全不知痛痒皮膚如木

四曰牛癬其狀如牛領之皮堅而厚竹片刮之亦有膿
水出

五曰狗癬時作微痒白點相連

六曰刀癬輪廓皆無如雲岩之氣運行無定

治法當清心火散肺風之藥服之

踈風滌火湯

半夏

菜油并炒

升麻

甘草

薄荷

石昌蒲

生地

當歸

防風

荆芥

苦參

天花粉

白朮

白芍

桔梗

白芷

連翹

白蒺藜

川桂皮四兩白芨四兩剪草四兩俱為末加巴豆肉十
四粒木鱉肉四枚剉碎川椒末一兩河水調勻入竹
確中用銀簪攪千餘下埋飯內煮一滾每用少許搽
之先以穿山甲刮損方可搽藥
疥瘡及白疱瘡

用小麥一升鍋內炒焦下水銀一兩攪和如星取出
為末用菜油調搽

又方

雄黃一錢 硫黃二錢 棋榔一錢 枯凡五錢

為絕細末香油調搽

又方

枯凡

苦參

白芷

花椒

蛇床

子

風子肉

各一兩

輕粉

五錢

右為末相油為丸搽入肌肉

又方

防風

荆芥

白芷

五倍

枯凡

樟米

硫黃

輕粉

檳榔

右為末菜油調搽

清肌湯

半夏

葛蒲

苦參

胡麻

防風

何首烏

蒼朮 當歸 生地 乾姜 防風 煨靈仙

紅花 水煎服

清心瀉火丸 蒼耳草葉 二兩 當歸 天麻 各一兩

苦參 兩 薄荷 葉 荊芥 各 兩 防風 黃連 蜚脫 各一兩

右為末酒糊丸每七十九丸白湯送下

又方 何首烏艾各等分煎湯洗之

合掌散

檳榔 五錢 硫黃 五錢 面粉 五分 各為細末和勻每用

少許香油調夜卧時塗外腎囊不可乾手但揩擦三日即愈

雀子班



雀子班者出于肺经或母受胎之际不守禁忌因夫醉

酒當風行房感集邪氣光肺為五藏之蓋故肺風發外
而成雀子班也宜用驅風換肌膏治之

肥皂 二觔 甘松 二兩 三柰 二兩 牙皂 二兩 輕粉 五錢

白芷 二兩 薄荷 一兩 天花粉 一兩 栢末 一兩 細辛 一兩

乾葛 一兩 草果 一兩 防風 一兩 獨活 一兩


右為末成丸每朝洗面用之再用玉面菴花粉

玉面菴花粉

杏仁 三錢研如泥 輕粉 一錢 面粉 三錢 白芷末 錢 射香 二分

冰片 用鷄子白調勻每少許如婦人搽面法

諸瘤



此癭瘤受症陽在六腑流在經絡風寒濕熱傷于心肝脾腎之經血聚不散日漸增長或有破者可將梅花散敷之已結聚者先用點藥付于癭瘤中心待七日後方可取去惡物後用膏藥貼之內服秘方流氣飲治之不可輕易此乃宿瘤之疾

粉瘤紅玉膏

石灰一塊如錢大糯米十四粒同醮水化開一夜加辰砂

梅花散

寒水石 龍骨 血竭 黃丹

右為細末乾摻

癰瘡方

草烏 八兩 川烏 四兩 乾柴葉 朽木 各三兩 柴灰 二兩

槓灰 石灰未化者一觔打末

右朽木等四味燒存性同二灰研勻以水十碗淋汁如法熬膏用之

消癰方

蕎麥 燒灰 料菜 燒灰 風化石灰 一碗 同和一處

三碗熬成膏后用木鱉一二枚巴豆五六十粒二件去殼去油胡椒四十九粒各研細爛再和研細入灰汁內再熬成膏入罐內蠟紙封之如用時不分大小用藥點于瘤上其藥自至根再上候茶褐色須臾間其瘤皆黑色不須再搽二三日其瘤乾枯自有瘡口用紫金散敷之

紫金散

黃丹

一錢五分

輕粉

二錢五分

為末乾摻瘡口

藥線繫瘤法

先用莞花根洗淨帶濕不犯鉄器搗取汁用生絲線一條浸汁中一宿以線繫瘤上一夜即落不過二次將龍骨細茶呵子末三味付瘡口如無根以莞花煎濃汁浸之亦妙下部痔亦可用

痰瘤煎藥

陳皮 半夏 茯苓 甘草 升麻 鼠粘子

連翹 柴胡 昆布 黃芩 桔梗

時以自溺搽瘤上甚妙

校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第六畢