

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

朱實大師瘡瘍經驗全書附世傳秘方九卷

宋燕山實漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

目錄

瘡瘍總論

灸瘡瘍法

圍法貼紙妙訣

開刀手法

消毒潰堅湯

參芪內托散

參芪歸朮膏

內疎黃連湯

內托復煎散

內疏黃連湯

十六味流氣飲

千金托裏散

護心散

清心內固金粉散

忍冬酒

三才三才三才

蠟丸丸

神功活命湯

發背初起

又方

發背發不起

神效托裏散

木香散

猪蹄湯

透膿散

牛膠飲

竹葉黃芪湯

麥冬散

當歸黃芪湯

犀角散

桑枝散

五味子湯

蜜花散

梔子湯

加味四七湯

柿蒂湯

健脾散

加味四君子湯

加味治中湯

三和湯

大麥門冬湯

黃芪六一湯

六神散
托裏溫中湯

黃連清涼飲子

癰疽疔腫湯

替針透膿散

復元通氣散

酒製大黃散

消毒飲

丁附五香湯

托裏溫經湯

內托榮衛湯

安神散

柞木飲

青金膏

乳香萹芩散

梅瘡風癬經年

十全大補湯

金箍散 又方

療癰痰核藥

紫莖散

消毒散

奪命散

刻效散

拔丁圍藥

刮毒丹

千金烏龍膏

妙貼止疼散

隔皮取膿散

水龍收毒法

海浮散

又方

烏獲追膿散

追毒錠子

真君妙貼散

驪龍散

一艾二黃散

發背初起爛開

平肌追膿散

洪寶丹

痘毒四箍散

痘毒摻藥

痘毒圍藥

紅玉散

粗料煎油

煉松香法

製黃丹法

長肉紫金膏

千槓膏

交頭膏

乳香長肉膏

太乙膏

麒麟竭膏

第九卷目錄 畢

第九卷附世傳秘方 瘡瘍總論

虞麟

人以五臟六腑為根本五臟不和則九竅不通六腑不和則留結為瘡故癰者六腑不和之所生疽者五臟不和之所致六腑主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮厚而腫堅皆由六氣七情而成也然瘡瘍皆火之屬須分內外而治其本經曰膏梁之變足生大疔其源在裏發於裏也受持諸虛言內結而發諸虛未到從何道出皆自從虛而出也如太陽經虛從背出少陽經虛從髻出陽明經虛從髭出督脉經虛從腦

出經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脈其源在表盛則
內行若脉沉實當先踈內預絕其源脉浮大者當先托
其裏恐邪氣傷內又有內外之中邪氣至盛退入經絡
乃生癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫治法大
要托裏踈通榮衛三法托裏治其外之用踈通治其內
之行榮衛治其中內之外者脉沉實發熱煩躁外無脊
赤痛深在內邪氣沉裏故先踈通臟腑故先托裏防其
內然內外之中者外無脊惡之氣內亦臟腑宜通知其
在經當知榮衛周禮有腫瘍潰瘍今之癰疽是也內外

俱虛宜大補氣血為主後行五香散者當防虛實之失
其瘡之發先發紅腫為氣血鬱積蒸肉化為膿其痛發
在始作之時膿潰之後腫退肌寬痛硬漸減若發痛者
虛也宜補之有穢氣觸者宜和解之風寒逼者宜溫散
之以手掩腫上熱則有膿不熱則無膿况癰疽有表裏
虛實用藥有補瀉溫涼稟受之厚薄形志之苦樂隨年
歲時令而加減則病易療若內悞用寒涼之藥而外教
貼冷藥然欲望其消散是借寇兵也其害不淺大凡陽
滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱澁陽滯以寒

治之陰滯以熱治之細詳其意陽滯陰作作熱治寒治
求之寒熱固可作陰陽論於陰於陽分明是氣是血也
氣為陽行脉外血為陰行脉內相並分派週流循環一
身無停止謂之一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定
息共得六寸一身通行八十一丈得熱則行速而太過
得寒則行遲而不及五味之厚七情之偏過氣為滯津
液稠厚積而久也為飲為痰滲入脉內血為所亂因而
凝濁運行泛溢或為沸騰此陰滯於陽也正血滯於氣
也凡血病今人或藥以助邪病上生病血之病日增溢

出脉外隧道溢塞升降有妨運化失令此陽滯於陰也
正氣滯於血也病有寒熱則稟受之素偏虛邪之離合
豈可以陽為熱陰為寒也浮洪弦數氣病之脉也烏可
遽作熱論沉細弱澁血病之脉也烏可遽作寒論此萬
病之根本豈止瘰疽而已大凡腫瘍時作毒氣上攻治
之潰陽後當作陰虛補之若老年潰後發嘔不食者效
用人參黃芪白朮膏大補取效佐藥隨時症加減劉守
真謂諸患瘡瘍而嘔者此濕氣侵於胃也藥中宜倍白
朮王海藏謂吐者有物無穀乃血病也有食入則吐有

食已則吐嘔者有物有聲氣血俱病也張仲景云嘔多雖有陽明証勿下之噦者無物有聲乃氣病也謂之逆者吃逆也火自下而上衝胃口作聲者病後胃虛所致陰火虛也病至此當作危矣但理無定在病有萬變為醫須隨時取中見可而進經曰知其要者一言而終不知其要流散無窮何謂情因是也何謂要治法是也治法惟東垣丹溪能轄其奧悉詳載於外科新錄五善七惡具焉蓋煩燥時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便淋瀝一惡也膿血大洩腫焮尤盛膿色敗臭痛不可近二

惡也喘粗氣短恍惚嗜暗三惡也不能下食服藥而嘔
食不知味口惡也目視不正黑睛小赤瞳神
上視五惡也肩項不便四肢沉重六惡也聲嘶色脫唇
鼻赤青頭目四肢浮腫七惡也動息自寧飲食知味一
善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神
彩精明語聲清朗四善也體氣和平五善也然有症合
七惡而皮緊急如善者有症合五善而皮后虛如惡者
此不可不察又曰飲食如常實熱而大小便混內外看
相應肌肉好惡分明善也發渴而喘睛明睛角面鼻大

小便滑目中不了肉黑而陷面青唇黯已潰肉青痰吐
嘔逆惡也凡同志之士乞再推明改削毋隱毋吝

灸瘡瘍法

夢麟

凡人患瘡瘍之症不拘何處其色鮮紅者為陽淡紅者為陰自有寒熱之分用手按患處熱如火烘者是頭聚或用濕綿紙帖患上先乾者為頭聚即用筆点記切蒜片如錢厚放患處置艾壯於上以火燃之若蒜片枯焦再易之待將畢三五壯着帛肉上灸為佳至少者以二十一壯為期頭頂上五壯七壯為期艾炷止可如豆大但面心為陽中之陽禁灸其陽症不可灸者何恐火氣內侵勢益昌大以火濟火故戒之惟陰症可灸鬱氣濕

熱積毒借火以援之然以火濟水自有相生之妙臨灸
畢用口吹火至滅其火功借氣得以入內其症易散設
或灸不能即散者灸遲故也雖不能全散大能解毒易
潰膿易斂瘡口功難盡迷性臟毒坐馬瘡以蚯蚓泥作
餅代蒜片文灸之以熱為度反易之如前共十四壯為期
若附骨疽癰毒入骨髓擗天氣精明和煖尻神不犯吉
日午時灸至申時止徐問病者骨中熱否若果骨中熱
方効若灸不拘壯數忽然爆起者是病根脫矣即止之
凡灸須飲善食并飲好酒以通經絡以和氣血再令
善笑談者以亂其痛亦妙方也休虛者禁灸

大抵病有淺深効有遲速亦有陰虛陽實呼吸轉移醫者須要胆大心小胆欲大者有決斷之才識見之明當刺則刺當攻則攻不宜攻刺者止之則能知標本心欲小者有救急之義無苟取之心富者辭之傷廉貧者取之傷惠須見利思義斯稱醫哉近有利己害人之徒妬賢嫉能驚嚇病家深圖厚賂初無定論巧言矜能謗毀前醫毫無識症立方之見起死回生之功徒貪財排訕耳竟亦何益其心不仁莫甚于此亦有病家輒聽其言不分賢愚自取其禍與前醫何干實庸工之悞也戒之

慎之亦有庸醫妄投藥劑輕用針刀火灸勢愈重殊廢
將調反怨後醫之不能捷功噫病不可急治者而治之
徒傷命耳廣於治病者豈能遂病家之心乎亦有富家
不念貧醫恃豪傲慢前恭後踞良醫斷不肯屈志自壞
自耳又有輕命重財不顧珍寶之藥待全愈伸謝豈誠
語哉又有愈後伸謝痛財以致醫者不能救本良可嘆
也須當各盡其道方無愧於心若遇極貧患病之人普
施藥劑再助柴米救其一命則世業益隆子孫豈無賢
能者興乎予因貧困不能普施極貧醫藥特書此

圍法貼紙妙訣

凡用圍藥勿加功夫撓千餘下其菜自稠輕手圍之留孔必須如鷺子形狀須用薄紙貼之務要扯碎貼上免崩裂疼痛之苦待圍藥畧乾再用調藥餘汁潤之以助藥力况藥乾不能入肌肉借濕以通竅耳宜深詳之

開刀手法 千金不傳

凡瘡瘍之起疼痛固屬於心火久而陽氣昇上蒸肉化為膿若不三思原其膿之有無遽爾開刀則鮮血突出膿何從來致患者煎寒發熱日夜疼痛無法可止或患

症富家多請醫者詢治內相妒忌惟以開刀為首功多
獲厚謝全不顧患者噫若用此心以仁術為盜徒矣子
孫豈能世其業哉先將指頭按患上隨手而起四畔悉
軟視其頭聚擇尻袖不犯吉日將刀頭向上開之方不
致傷新肉取出刀再蘸綿紙條潤油度之使膿水齊會
半日扯出則膿水易乾外貼呼膿膏四圍再用搜膿散
敷之

已上三法誓不輕傳者予慕軒岐得天地之心而壽醫
仲景得軒岐之心而廣法豈可擅利於一已而害衆生

乎道見同道之交往往不善於圖藥惟賴利口聳人故意不待症熟輒肆開刀或同業妬忌以先開刀為首功多致患者不起衰哉此業也能生人能殺人况醫司人命故君子不可不慎也必須先去貪嗔之心次敦真實之念富不過求極貧不取稍有餘資再助以糶米之費免其日給之憂所謂作善降祥冥冥之中神明鑒察自已雖貧此心豁豁天道昭昭孝子順孫森出斯業未得相承不亦善乎司馬溫公曰積金與子孫子孫未必能守不若積陰德於冥冥之中為長久計大哉斯言也

魏莫及近觀貪利之徒驚嚇病家集利致富身沒之後
天道禍淫所得隨所失子孫喪亡世業即斬不亦報乎
昔張彥明為醫視人之疾舉切吾身推誠拯救未嘗以
財為較一日城中火炎週圍殆盡烟焰中獨存其居以
此見天道有陰扶顛助之靈又有陸汝脩醫病至夜深
而回路遇鬼卒百人其中有長夫者一神黃袍披身汝
脩見之五首投地汗如雨下驚懼不勝神曰毋恐吾乃
瘟神也汝有恒心不以富貴貧賤二其念今加瘟氣滿
人間用藥治之以參蘇飲為要日後汝當壽顯歸家焚

香告天曰貧富皆人用藥一心神今顯應民得全生三日之內蒲城皆疫乃馬頭瘟也衆名醫不能治汝修日制衣藥餌及千服裹之先與貧者服之頓愈芳名遍傳求之如市家業富饒六子五婿悉果貴顯李者能以張陸二公之心為心何患道之不行子孫不顯者哉此麟日切於身心者也焉敢少忽遂并梓行

諸瘰癧發背總方秘傳試驗

消毒潰堅湯

治八法瘰癧腫癰癧惡節乳癧腦疽等症

羌活 黃連 酒炒 黃柏 酒炒各錢 生地 酒洗

桔梗 五分 黃芪 二錢 人參 五分 甘草 五分

連翹 五分 防已 酒洗五分 陳皮 澤瀉 炒

山梔仁 姜汁拌炒 五味 碎 麥門冬 枳殼 炒

豬苓 各五分

參芪內托散

三才圖會卷之三

三

人參

黃芪

炒

當歸

酒洗

白朮

炒

荷紅

甘草

升麻

川芎

生地

酒洗

羌活

厚朴

姜汁拌炒

腫瘍加連翹羌活

潰瘍加芍藥甘草

酒毒加酒

炒連

氣加香附

痰加瓜蒌仁

發熱加小柴胡

酒炒黃芩

渴加天花粉

惡心加半夏生薑

解

毒加金銀花甘草節

在太陽上加羌活

陽明經

上加鼠粘子白芷升麻

少陽經上加柴胡

參芪歸朮膏

衰老氣虛宜服

人參

黃芪

白朮土拌炒

當歸

各二錢

胃不和加陳皮二錢水四碗煮稠膏以牛膝二錢煎湯入竹瀝勻之加姜汁

內疎黃連湯

嘔啞心逆發熱而煩昧沉而實腫硬麻木而皮肉不變色根係深大病源在內臟腑秘結當急疏利

黃連

芍藥

當歸

山梔

檳榔

木香

薄荷

連翹

茯苓

黃芩

桔梗

甘草

各錢

右除朮香檳榔為末外餘剉每一兩水煎八分入檳香
二末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利為
度

內托復煎散

腫掀於外根盤不深形症在表其浮痛在皮肉邪氣盛
而必侵於內須急服內托以救其裏也

黃芪

防風

地骨皮

芍藥

黃芩

酒炒

白朮

人參

茯苓

甘草

羌活

各等分

先用茅山蒼朮一觔剉片以水五升煎二升入煎藥十
二味再煎至三四鍾瀝汁作四五服終日用之能除濕
散鬱熱使胃氣和平若大便閉煩熱燥少服內疏黃連
湯如微利煩熱已退却服復煎散半料使榮衛俱行邪
氣不能內侵也

內疏黃連湯

瘰癧服 解毒補養氣血托裏排膿自無疼痛

黃芪

人參

白朮

當歸

川芎

芍藥

草節

黃連

連翹

白芷

羌活

陳皮

獨活

金銀花

防風

各等分

竹瀝

照器入

痰中有血加童便藕節汁

秘傳十六味流氣飲

未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏內補散

人參

當歸

官桂

五分

川芎

防風

白芷

桔梗

黃芪

灸草

厚朴

木香

白芍藥

大腹皮

烏藥

枳壳

蘇葉

各一錢

不退熱加茯苓白木地黃不進飲食加香附砂仁

疼痛加乳香沒藥水不乾加知母貝母瘡不穿

加皂角刺大便閉加大黃枳壳咳嗽加陳皮枳

壳半夏杏仁薑小便閉加麥門冬車前子木通滑

石燈草擦癰加菴活夏枯草連翹青皮柴胡黃芩

右為末每六錢酒調下不飲酒者木香湯代之米飲亦

可詳其所用之藥皆發散風毒調理氣血排膿止痛長

肉生肌等藥氣不和加氣藥為主血不和加血藥為主

輕重量人氣稟用之服藥後飲酒以助藥力

千金托裏散 一切腫毒

人參

官桂

甘草

川芎

白芷

芍藥

各錢

木香

沒藥

三分

乳香

二分

當歸

五分

連翹

一錢

防風

厚朴

各錢

生薑

五片

臨服加酒一盃

護心散

又名乳粉托裏散

癰疽初發便服毒氣不攻惡心煩悶吃嘔喘嗽以至瀉

泄急服之

真乾菜荳粉 二兩

乳香 五錢研

和勻甘草湯調下此藥不時呷之使藥味長流竇漏則
則毒氣不能攻心

清心內固金粉散

辰砂 人參 冬蠶 白茯苓 三錢

菜荳粉 四兩

雄黃 一分 甘草 二分 朴硝 五錢

白荳蔻 五錢

冰片 射香 各分 皂角 一分

右各另研每二錢蜜調以下

忍冬酒

九初起時便當服此不問發於何處

忍冬藤五兩 甘草 二兩

水五碗煎至一碗再加無灰酒煎服

蠟丸丸

一切症服此能衛護內膜驅解諸毒自然消解及惡毒瘡腫遍身等惡症

通明丸二兩為末 黃蜡

七錢

貴人加木香
富人加沉香

平人加紫蘇葉
俱為末

溶蠟下蜜一匙少溫入丸衆手拌勻丸如桐子大每服五十九溫湯下日三服未破內消已破易合蠟性實大

腸凡性解諸毒故用之也

神功活命湯

一切惡瘡癰疽發背便毒等症

皂角刺

二系酒炒

甘草節

六分

川山甲

六分

金銀花

三系

貝母

七分

防風

六分

赤芍藥

二分

歸尾

一系

沒藥

六分

白芷

五分

乳香

一系

陳皮

六分

天花粉

一系

老酒煎如欲瀉加大黃

熱加黃芩

梳

在背俞皂角刺為君

在腹募白芷為君

曾次加瓜蒌仁

在四肢金銀花為君

煎時須用大瓦罐以紙密封瓶口勿令泄氣服時須隨
瘡上下以分飢飽能飲酒者服藥後飲酒幾盃此藥並
無酒氣不傷臟腑氣血忌酸薄酒并鐵器服藥後身宜
側睡自有回生之妙如毒潰不宜服也

發背初起

川山甲四片 牛皮膠四兩新瓦上燒灰

右二味為末用酒二碗調和從容服忌水無大患不能
飲酒者酒丸清飲湯下

又方

凡人中熱毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背熱四肢麻木
蒼有紅暈在背後即取槐子一大把揀淨鐵鍋內炒褐
色好大酒一碗煎滾去槐子熱服待汗出即愈未退再
服

發背發不起

川山甲 蛤粉炒 煨末五錢酒下

神効托裏散

癰疽發背腰乳腸癰腫毒骨痛增寒壯熱狀若傷風

黃芪 黃芪 金銀花 當歸 粉草 炙

酒煎服

木香散 又名化堅湯

瘡難消又不能作膿痛不止及小兒痘後生瘡米湯下

此骨皮五錢 木香 五錢 穿山甲 五錢 射香 五分

每二錢酒下

猪蹄湯

一切發背等症用此洗之能消毒氣去惡肉凡瘡有口急用之

香白芷 黃芩 赤芍藥

露蜂房內有小蜂

當歸

羌活

生草

地骨皮

先將雄猪前蹄一隻白水四碗煮熟去蹄取汁澄去面上油膩取清汁加前藥煎三四滾取汁將敗筆或軟絹蘸藥湯徐徐洗之須要避風并人口中氣

透膿散

不用開刀服之一日夜自透出一頭

蛾口蚤

用出了蛾者

右將一枚燒作灰用酒調服切不可用兩枚三枚若服一枚只一頭多服多頭

牛膠飲

惡症患險屢服之使毒氣不攻於內不傳惡症

牛步膠淨洗四兩

好酒一碗入膠內重湯溶透撈勻加酒隨意飲盡以醉
為度不能飲酒者酒煎沸湯下蓋牛膠補肺氣實大腸
壯胃止瀉

竹葉黃芪湯

諸症大渴

淡竹葉二兩

生地八兩

黃芪

當歸

川芎

人參

甘草

黃芩

麥門冬

芍藥

石膏

各三兩

右作十服水煎

麥冬散

體熱煩渴不止

黃芪

黃芩

麥冬

各二兩

升麻

赤茯苓

赤芍藥

玄參

當歸

甘草

知母

天花粉

各兩

生地

三兩

右剉每約八九錢水煎熱甚加淡竹葉灯心

另方去玄參當歸加人參惠肉

當歸黃芪湯

症已行臟腑而痛不可忍

當歸

川芎

生地

芍藥

黃芪

地骨皮

水煎發熱加黃芩 煩燥不能卧加山梔 嘔逆乃濕
氣侵胃倍加白朮

犀角散

發背不曾服粉乳托裏散以致熱毒衝於心經故咽喉
口舌生瘡甚至黑燥先服犀角散以解其毒免有此症

犀角

玄參

黃芪

升麻

不通

麥門冬

赤芍藥

生甘草

當歸

大黃

酒煨

每五錢水煎服

桑枝散

舌上焦硬甚堅大燥厚如雞內金狀非渴症乃腎水枯
竭心火炎上平常人見之不宜有此必危難療

花葉枝嫩者并

切碎炒香水三升煎二升一日服盡為

妙若桑枝瀝治渴尤妙

五味子湯

治前症

五味子

黃芪

人參

麥門冬 冬前麥

粉草 兩

水煎日夜不時服之

蜜花散

治渴

金銀花

洗淨以瓦罐內煎無灰酒浸酒乾夜時取出乾末之共研

蜜花渴時蜜湯下渴止為度此散腸厚者宜服恐作瀉故也慎之慎之

梔子湯

大發熱不已

甘草

柴胡 一兩

漏芦

連翹

山梔

各錢

黃芩

防風

人參

各錢

茯苓

黃芪

二錢分

每一兩水煎

加味四七湯

喘嗽多痰

紫蘇葉

白茯苓

三味各錢

半夏

姜汁浸炒桑皮

三錢

木香

二錢

枳實

厚朴

各錢

甘草

二錢

分四服姜七片煎

柿蒂湯

發喊連聲不絕神思疲倦至七八聲相連收氣不回者

難治

丁香

柿蒂

山梔

人參

茯苓

陳皮

半夏

良薑

甘草

竹茹

黃連

薑七片煎

虛人加知母黃柏

發喊者怒氣滿胸常

欬叫此肝經之症正難療者

健脾散

潰後痞滿不食

蓮肉

砂仁

四錢

香附

藿香

茯苓

三錢

陳皮

山藥

蒼朮

各錢

木香 一系 灸草 一系 生姜 東子 去核

右剉分作六服服之

加味四君子湯 嘔吐心悶

人參 一系五分 灸草 五分 白朮 一系五分 茯苓

白朮 厚朴 各分 陳皮 一系 砂仁 一系

姜三朮二去核煎服

加味治中湯 潰後泄瀉不止

青皮 一系 呵子 一系 乾姜 一系 白朮 一系

茯苓 各系 人參 砂仁 各系 半夏 一系

甘草 二斤

右作六服姜五片煎

三和湯 潰後手足浮腫

羌活

紫蘼

木瓜

沉香

各兩

木香

白朮

檳榔

各兩

川芎

三兩

甘草

陳皮

各兩

大腹皮

二兩

每用水煎服

六麥門冬湯

潰後小便淋瀝不通

麥門冬 二斤

人參

四兩

甘草

一斤

澤瀉

五兩

天門冬二斤 木通三斤 滑石二斤

右作四次水煎服

黃芪六一湯一 潰後虛汗如雨不止

黃芪六兩 粉草一兩

水煎服

六神散

諸瘡血出過多而心煩不安不得睡卧此忘心也

生地 熟地 各五分 當歸 黃芪

人參 各五分 川芎 各三分 水煎服

托裏溫中湯

一人年六十七歲五月左臂膊上至肩下至手指色不
交皮膚涼六脉沉細而微脉症俱寒醫曰此附骨瘧也
開已不遲燔針破之膿清稀次日肘下再開加吃逆與
丁香柿蒂湯二服稍緩次日吃逆尤甚自痢臍腹冷痛
腹滿飲食減少時發昏曠于左乳下黑處灸十四壯用
托裏溫中湯內有姜附丁沉或曰瘡瘍屬火當盛暑姜
附可乎予曰經云脉細皮寒瀉痢前後飲食不進此為
五虛况吃逆胃中虛冷之極諸瘡痛痒屬火是言其常

以証內外相反當捨時從証非大方辛熱劑急治不能
救遂按之諸症悉去飲食進瘡勢溫膿色正又與五香
湯數服月餘而安

丁香

沉香

益智

茴香

陳皮

參高

乾薑

羌活

三系

香附

四系

木香

三系五分

灸草

三系

附子

一系

右十味作一服姜五片煎至一盞無時溫服內經曰寒
滲於內治以辛熱佐以苦溫故用乾薑附子大辛熱溫
中外發陽氣自裏之表為君羌活苦辛溫透關節灸其

草甘溫補脾胃行經絡通血脉為臣益智丁香沉香大
辛熱以散胃寒嘔逆不下食為佐內攻聚而為滿木香
茴香陳皮苦辛去痞散滿為使已上方夏月脉症俱寒
用之甚宜

黃連清涼飲子

一人年六十歲冬至后發背疽五七日腫勢約七寸開
遲故不變症果生瘡重如石熱如火痛倍常六脉
沉數按之有力此膏梁積熱之夾邪氣酷熱寒藥治之
時冬月嚴寒復有用寒遠寒之狀乃思內經有假者反

之遣其時從其症可也

黃連

當歸

灸草

大黃

酒煎

赤芍藥

右五味各等分每服一兩五錢水煎服之利下其痛減
七八明日再進前症悉除已上邪氣酷熱脉實用力者
宜用

瘰癧疔腫發渴惡心育滿

茯苓

甘草

陳皮

半夏

連翹

黃連

炒

鼠粘子

天花粉

羌活

香附

砂仁

枳殼

薑汁竹瀝和服

替針透膜散

服此頭即透出

此方有在前

復元通氣散

諸氣溢閉耳聾耳痛腹癢便毒無頭腫毒婦人乳癰

青皮

陳皮

各兩

甘草

三兩
半蜜煎

穿山甲

瓜蒌仁

金銀花

連翹

各兩

末之每二錢酒下無頭津液調塗此方活血止痛消腫

酒製大黃散

婦人七十形實性急好酒生腦疽五日脉緊急而澁急
用大黃酒浸紙裹煨切細拌炒為末再以酒拌炒熟用
人參加薑煎調服一錢兩時刻再進一服睡少頃有汗
竟來病已去矣

消毒飲

年七十生項疽脉實而稍大因憂悶生熱所致作太陽
經滌之

歸頭

熟地

酒洗

黃芩

酒炒

黃連

酒洗

黃栢 凜

黃芪

羌活

桔梗

人參

生地

陳皮

防已

防風

澤瀉

甘草

連翹

水二鍾煎服

丁附五香湯

一人年七十冬至後生腦疽腫痛面大醫士候瘡熟針
出膿因怒笞侍妾瘡輒內陷凹一韭葉許面色青黃不
澤四肢逆冷汗出身涼嘔吐脉極沉細而遲蓋衰老履
寒時病苦楚飲食淡薄瘦瘁加怒精神損耗故此有寒

變也病與時同乃製五香湯一劑加丁香附子五錢瘡後大發隨症調治而安內經言凡治病察其下謂察時下之宜也

托裏溫經湯

寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中聚為赤腫痛不可忍惡寒發熱四肢疼痛

麻黃

四兩

防風

升麻

葛根

各錢

白芷

當歸

蒼朮

各錢

人參

白芍藥

各錢

甘草

二錢

柴胡

一錢

陳皮

八分

右十二味每一兩水二碗先煎麻黃湯去沫方下餘藥
煎至八分溫服卧煖處綿衣覆之得汗而散內經云冬
月閉藏用藥多而少鍼石宜以苦溫之劑溫經散寒為
要而腠理當以苦散之但辛發散之用麻黃苦溫發之
為君防風辛溫散之升麻苦平葛根甘平解肌出汗專
治陽明經邪為臣血留不行則痛以白芷辛溫當歸身
和血散滯溫熱腫則蒼朮苦甘溫行經壯力能泄膚腠
間濕熱人參甘草甘溫白芍酸寒調中益氣使托裏為
佐以衣覆首厚被蓋身卧煖處使經絡血溫腠理開寒

邪散陽氣升汗出腫減八九第二服去麻黃防風連翹
翹粘子腫痛悉去內經云汗之則瘡已信然

內托榮衛湯

黃芪

各系

防風

連翹

柴胡

各系

羌活

甘草

黃芩

人參

蒼朮

各系

當歸

各五分

桂枝

八分

紅花

二系

右十二味剉分二服水酒各二盞煎八分溫服內經曰
天空西北左寒而右涼地不滿東南右溫而左濕東南
方陽也陽精降於下故右熱而左濕西北方陰也陰精

奉于上故左寒而右涼適寒涼者脹之而濕熱者瘡下
之則脹已汗之則瘡已夫東南二方在人則丙小腸熱
甲胆風皆俱下性炎上其瘡外有六經形症內無便溺
阻隔飲食如故小便自調知不在裏非疽也瘡癰小為
癰大為瘡其邪受風濕地氣自外而入來侵內經曰榮氣
不足逆於肉理乃生癰腫諸瘡痛痒皆屬心火以瘡自
外而入是丙小腸左近入胆作痛而非痒此二方皆主
血為病必痛以元氣不足榮氣逆行其初出未有傳變
在於肌肉之上皮膚之間只於風熱六經所行經絡地

分出也宜瀉風濕熱腎者只知陰覆其陽則宜汗以宜
汗者乃濕熱鬱手足少陽致血脈凝逆赤衛不能週身
元氣消弱也其風濕熱滯於下故而赤腫微黯風水惟
上衝顏色多怒其瘡色腫微煎瘡熱高超結硬作痛其
脈止在左手右屬表左寸外洪緩而陰是容邪在血脈
之上皮膚之間宜急發汗通榮衛則邪去矣以內托榮
衛湯發之

癩疽夜臥不睡名安神散

辰砂

乳香

麝香

人參

酸棗仁

各錢五分

末之棗肉丸人參湯下

柞木飲

發背癰疽未成者已成者並收奇功

乾柞木葉罌萱草根五錢 甘草節 金銀花

乾荷葉蒂 地榆 各兩

石為末每五錢水二鍾煎八分作二次早晚各進一服

相再煎

青金膏 走馬牙疳蝕損腐爛

乳香

信

輕粉

各錢

青黛 二錢

右為末油調新筆付紙上陰乾每用少許放患上以白
紙封之

乳香華搥散

牙疼槽風

天麻

防風

草烏

華搥

細辛

乳香

川芎

朋砂

射香

薄荷

右為末每次口噙溫水嗽之鼻內吹之

毒瘡久發風癬成瘡經年不痊

防風

五錢

大黃

二兩

共炒連

五錢

黃芩

五錢

連翹 五兩

梔子 五兩

蛇床子 二兩

枸杞子 五錢

白蒺藜 五錢炒

僵蚕 三錢炒

生勝子 三兩炒

胡麻仁 五兩

蔓荊子 五兩

蛇退 一錢

蜂窠 五兩炙

龍骨 五錢

天花粉 五錢

甘草 一兩

葳靈仙 五錢

右為末米糊為丸每日三服忌酒肉鹽味廿七日

十全大補湯

一切症潰後多服生肌長肉益氣滋血

人參

當歸

川芎

白芍藥

白朮

黃芪

茯苓

甘草

生地

熟地

防風

陳皮

乾山藥

知母

黃栢

澤瀉

升麻

金銀花

秋冬天加厚朴蒼木肉桂

春夏天加麥門冬青皮

黃芩山梔仁黃連

金籬散

黃栢

去蘊斤

川白朮四斤

芙蓉葉一斤

紫花地丁一斤

天花粉半斤

白歛

半斤

右為極細末隨瘡癰癧疽發背每用葱一把搗碎加蜂

蜜少許再搗取汁調勻搽患處四向空中出毒乾再用
餘汁潤之以助藥力蓋葱性能開腠理善走諸經發散
風邪蜜乃百花之精潤肌竅解百毒與葱相反助諸藥
方如葱汁不便夏月用蜜水冬月用蜜湯

又方

白芨

四兩

雄黃

二兩

榆皮

二兩

黃栢

二兩

射香

一錢

右為末猪腦研爛調勻搽四向空中出毒乾再易之

源應瘰核圍藥

昆布

一兩 去老 碎 藥

射香

五分

冰片

三分

南星

五錢

末之用好醋薑汁蜜少許調勻捺四向空一孔乾再用
餘汁潤之 一方加田螺殼煨存性三錢白芨末二錢
五倍末二錢

紫芷散

治腎癰

紫蘇葉

白芷

官桂

草烏

白芨

黃栢

各錢

為末暗醋薑汁葱汁蜜少許和勻火上熬滾調藥待濕

調勻搽四向空中出毒乾再潤之冬天加燒酒夏天宜
用好苦茶洗之

消腫散

白芨

白欵

牙皂

殭蚕

赤豆

五倍

雄黃

麝

南星

半夏

大黃

黃柏

草烏

白芷

貝母

山茨菇

芙蓉葉各藥

天花粉

牡蠣

各藥

末之姜汁醃青調敷

奪命散

烏梅

老茄子經霜者

芙蓉葉

青地松

葳靈仙

過山龍

馬鞭草

蒼茸草

益母草

但等藥

生甘草

草烏

赤小豆

除甘草等三味餘剉細入瓶內鹽泥固濟火煨存性為末丁瘡飛鹽醋調照疔瘡背瘡加日螺殼灰皂角灰加黑背蜒蚰搗爛調鎖口丁瘡搽藥在瘡口內陽症紅腫猪胆汁蜜調小兒丹毒加青靛花胆汁調便毒猪腦調

刻效散

癸背

黃瓜萎 一錢

白礬 一錢

連皮子煨過為末醋調敷乳汁尤妙

拔丁圍藥

蒼耳子搗爛加霜梅肉和勻貼瘡上葉梗煨灰亦可

刮毒丹

黃柏

天花粉

南星

芍藥

薑黃

蟬退

大黃

右為末水與酸醋俱不拘

千金烏龍膏

治一切下部濕毒附骨腿癰筋絡無名異症

多年陳小粉半斤炒黑

白芷

五錢

肉桂

五錢

五倍

炒

乾姜

炒

桔梗

龜板

煨

白芍藥

白飲

歲靈仙

蒼朮

炒

烏藥

全無不取

飛鹽

蛤粉各五

白芨

六兩

右為末姜汁葱汁醋蜜少許火上熬熱調勻搽四向空中出毒乾再潤餘汁以助藥力

妙貼止疼散

上部一切腫毒

白芨

一兩

乳香

五錢

桔梗

五錢

紫花地丁

三錢

白蘇 豕

末之鷄子清如前調敷并潤之

隔皮取膿散

馬蹄

細末兩

蕎麥麪

白鹽

豕

草烏

四錢

五倍

一兩

末之水調作餅煨火炙黃去火毒研細醋調成膏攤貼其腫漸退

水龍收毒法

單治背瘡初起紅色者

背上用稠泥成圈中間放水下馬蝗數條待蝗呼毒血

一日三易其瘡即愈 謂之蜚針

海浮散

瘡有惡肉不去

乳香

沒藥

各半研細末 搽上惡肉自消

又方

地榆研細末 加雄黃末 如前搽之

烏獲追膿散

黃芪

芍藥

白芷

天花粉

蛤粉

白芨

右為末蜜水調勻捺四向

追毒錠子

治蝨弩肉堅不痛者

續隨子

其遂

大戟

五倍

各兩

射香

山茨菇

末之糯米粥杵成錠子紐弩肉根下弩肉即脫

真君妙貼散

明淨硫黃三兩

蕎麥粉二兩

右為極細末井水和捏小餅晒乾或焙乾收之如遇惡瘡再研細井水調敷痛處痛者不痛不痛者即痛而

驪龍散

發背癰疽破與不破二者之間功能捷矣

珍珠

一分

牛糞

西上月生用餘月發存性

鐵繡

一兩

右研細末以猪腦加醋調敷瘡口三五次乾再易之

艾二黃散

奪旗斬符之劑

發背黑不痛即為陰也。用艾葉一筋硫黃雄黃末各五錢以水同煮艾半日搗極爛候溫敷上再煮再易十餘遍能知痛者可生全無痛者出紫血而死

發背初起爛開不住

合圍攻勝之劑

白鹽梅皂角二味燒存性研末不發熱者米醋調塗四圍連換即不走開

平肌追膿散

瘡頭冷者用妙

乾薑碾末鷄子清調祿四向如潰爛用猪蹄湯洗淨瘡口拭乾摻之竟熱如烘平肌易愈 猪蹄湯法在前

洪寶丹

發背黑色四圍爛開用此把住好肉

天花粉三兩

薑黃

白芷

香

赤芍藥二兩

末之若病勢大熱可用熱茶清調敷如病少溫則用酒

調散箍其膿加姜汁四分茶清六分

痘毒四箍散

黃柏

川烏

赤苴

各兩

石精黃各一兩

俱各細末和勻水調冬天用蜜湯

痘毒摻藥

并附

防風

五兩

當歸

五兩

乳香

一兩

珍珠

一兩

沒藥

一兩

血竭

一兩

辰砂

一兩

胎牛蹄

二兩或四兩

人參

一兩

右為末乾摻

又痘毒圍藥

白芨

四兩

雄黃

五分

黃柏

一兩

天花粉

一兩

文蛤

二兩

紫花地丁

二兩

右為末生豈漿調勻搽四向空中出毒氣時用餘漿潤之
以助藥力

生肌長肉紅玉散

寒水石

火煨過去灰碾如塵四兩

血竭

二兩

乳香

七分

沒藥

五分

孩兒茶

昇藥

二分

右為細末如塵每用一七搽瘡口左

邊明日搽右邊輪流搽之其肉漸平

太師公親製金絲萬應膏

此膏治癰疽發背諸腫毒疔疔膿生肌長肉收斂瘡口并治閃腰撲損墜高落馬筋疼骨痛皮肉青腫並治之此膏天下魁首其妙無窮寶之寶之

粗料煎油

大黃 一斤

貝母

半斤

草烏

二兩

地骨皮

黃芩

黃柏

黃連

天花粉

小蘗

大蘗

赤蘗

白蘗

馬鞭草

威靈仙

白芨

赤芍藥

肉桂

各系

玄參

細辛

三系

當歸

川芎

白芍藥

劉寄奴

牡丹皮

蘇木

紅花

蜂房

血餘

馬尾草

良姜

續斷

桑寄生

木鼈

無名異

柗仁

連翹

金銀花

烏梢蛇

金毛狗脊

象皮

羌活

獨活

仙靈皮

青皮

五加皮

各系

地龍

三系

白芷

防風

黃芪

姜黃

蛇脫

十系

川山甲

蝦蟆

血見愁

殭蚕

半夏

龜板

烏藥

皂角刺

天麻子

地榆

艾

苦參

南星

牙皂

甘松

三柰

藜蘆

骨碎補

全蝎

麻黃

蜈蚣

甘茶

蟬脫

五倍子

青風藤

何首烏

白蘚皮

木通

百合

各兩

已上用真麻油二十斤春浸十日夏浸五日秋浸十五日冬浸一月文武火煎熬旋加桑柳槐枝各二斤鳳仙

梗稀蕪草益母草芊芊活見腫消等草各少許新鮮者
有水氣緩緩下之若驟下則油泛上發浮慎之慎之待
藥焦黑瀉淨查入油磁瓶中此藥必用絲綿襯麻布瀉
方精製再入鍋內慢火煎油滴水不散為度春夏明淨
松香一斤下油二兩柳枝撓勻俟畧溫旋下乳香血竭
沒藥各一两射香一錢春初天氣尚寒每斤再加油半
兩秋初亦如之冬月嚴寒松香一斤下油四兩細藥同
前撓至不粘手為度傾入水中多令人蘸水煉如黃金
色再入水中浸三日出火毒任用

煉松香法

松香不拘入淨鍋中煎熬柳棍撓之俟其烊化將粗柴
灑淨查俟冷結成塊取出任用其砂石木屑俱在柴中
矣麟之製法果確也

已前煎過油內加天鵝油每藥油一斤加鵝油一兩使
諸藥味透入骨髓凡煎膏藥須隨四時以意消息

製黃丹法

黃丹先炒黑色傾入缸內用滾湯泡之再浸涼水滿缸
時時撓之浸一宿水飛再番一器內澄其細者斷其雜

砂之類將細好者晒乾方研極細如塵水氣盡方可用
長肉紫金膏

前油一斤飛丹淨七兩柳枝撓之不粘手看四時軟硬
為度油多加丹丹勿加油以意消息其法全在時宜徐
徐下細藥

沒藥

乳香

血竭

赤石脂各兩

珍珠一系

射香一系

輕粉一系

沉香末五系

黃占一系

白占一兩

孩兒茶五系

雞內金三系
焙

天靈蓋煨在
瓦下

鳳凰窠

煨及一系
鳳凰窠即初出小雞壳內嫩白軟皮也

俟湯方下射香一錢冰片七分埋土中七日出火毒
任用

不問瘰癧惡瘡等症杖瘡磕損並治之并服

風痠者痛處貼之

赤眼頭疼貼太陽穴

疔腮等症貼腫處

頭目昏疼兩耳虛鳴貼項窩

腰脇痛貼患上時尉穴之

小腸氣貼腎俞穴并臍中

婦人血閉并小腸痛貼小腹下

乳癭瓜萎湯下之五十九

婦人血崩蓮蓬灰艾醋湯下三十九仍貼臍下

年久脚氣不愈加蟾蜍貼膝三里痛處

年久腫瘡用葱鹽湯洗淨貼患上

急心疼紅豈湯下良薑湯亦可

風犬咬傷冷水下四十九

喘急痰盛貼肺俞穴

便毒瓜萎湯下

如腹內積聚癥瘕用楸柳湯下五十九外加蟾酥射香貼之

腸瀉內瘧石膏湯下四十九

偶食自死物香油下五十九

自要水吃用土珠黃泥水飲救十九即可

或餘毒未盡發為毒瘡甘草湯下五十九仍外貼之

千鎰膏

貼瘰癧

天麻子

肉兩

杏仁

各七錢

雄黃

五錢

乳香

七錢

沒藥

七錢

輕粉

三錢

白芨

二兩

俱另為末

松香

一斤另末

麻油打成膏忌鷄犬婦人孝服百厭必須擇上吉日在

淨室鎚之方可應驗勉之勉之

咬頭膏

麻油

半斤

益母草

兩

乱髮

錢

天麻子

半斤粒

白芷

江子肉

錢

全蝎

七枚

班猫

廿一

柃柳槐

枝各錢

官桂

錢

文武火熬藥黑瀝淨後入

黃丹

四兩

乳香

錢

沒藥

錢

射香

粉霜

信

銅青

雄黃

各錢

柳枝攪成膏為度

乳香長肉膏

用前金絲膏藥油內每觔加象皮一兩鳳仙槓五錢再煎去杏天鷲油五錢另加黃白占二錢血竭乳香沒藥各三錢射香一錢前法同前不載
太乙膏

玄參

白芷

當歸

赤芍藥

肉桂

去皮

大黃

生地黃各兩

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色灑去粗入黃丹一斤青柳枝不住手撓候滴水成珠不黏手為度傾入磁器中以磚蓋口掘窰子埋陰樹

下以土覆三日出火毒攤貼

麒麟竭膏

當歸

木鱉子仁

知母

五倍子

細辛

白芷

各兩

槐條

柳條各二十七根
長一尺許

右件除槐柳條外並切碎同作一處

好血竭三錢

真輕粉三錢

滴乳香五錢

沒藥五錢

好雄黃四錢

當門子三錢

右件各研細和作一處

松香

揀淨者為末十兩

瀝青

為末二兩

右件二味作一處

真香油三兩同前八味入鍋於文武火上三上三落不住手用槐條二莖挽令焦色即用綿濾去滓再將油入鍋先入松香瀝青末不住手挽如欲滾沸溢出即取下火撓約一茶頃滴少許入水以手圓之不軟不硬即取下火將次六味徐徐而下急撓令極勻凝則再上火勿令再沸遂傾入大盆水中半刻後手扯之漸漸軟和揉翻復如金絲之狀再入水浸之有暇再揉扯春夏頻換水如急用亦浸一兩宿如浸久日愈妙每用大竹管隨意

大小高一二寸填藥令滿而平兩面按油紙在上於紫
火上急手揭下一面再上紙復烘次一面仍揭下厚則
再用紙過為二箇如欲展火卽印四五箇於大紙上奏
成一片貼用治一切癰疽并發毒瘡各依常法烘開候
冷貼之生者即用之就散熟者卽穿逐敗生肌首尾皆
可一切疔腫結核並貼患處一切臍瘡先用姜汁白丸
入湯用鷺翎洗淨以牛蒡子葉或金剛藤葉貼瘡半日
取盡惡水然後貼上膏藥克日安痊除小兒妳癖外一
切乾濕白禿頭瘡剃去髮用香油攤薄煎餅一箇裹着

頭上一飯頃卽用大膏藥去餅滿頭貼之一二次換藥
即效一切癢股黃濕痒痛等症並洗淨挹乾貼患處一
切打撲傷損胛胸氣刺等病並貼患處頭疼貼兩太陽
赤眼貼眼胞魚尾際暴傷風冷嗽貼脊心牙疼刮藥塞
牙縫面腫者更貼面小兒疳痢等症用濕手圓如菜豛
大米飲送下三二十圓一切風寒濕痺臂病貼臂腿痛
貼腿且如腿痛貼痛處半日許未效卽以熱湯露脚指
在外從痛處淋洗至下仍以舊布帛蘸湯連布放於膏
藥蒸之令熱又用磁瓦刮脚甲指令其透快不可太甚

則其痛漸移下骨節間然後如法貼之逐節可去上面
一箇俟其痛趕至脚腕又貼脚心仍剪去脚指甲自然
痊可常有婦人因濕氣腿腫至腰膝大着連將油紙滿
膝貼之用前法趕下又貼脚心數日間脚心膏藥下發
一泡出黃膠水數日至老不發貼臂痛亦如此法大抵
膏藥大如患處方能敵病小而不着肉安可望效也貼
痛處好肉上即用帶熱貼貼瘡即不可熱貼也隨意舉
用無不作效

重校宋寶太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷第九畢