

新刊秘授外科百效全書

列傳外科百法全書卷之二

豫章歸醫巢居中應圓父頓著

乳頭

廻腹即



乳頭

乳癰之症有孕曰內次養子者口外吹酒婦人飲食厚味忿怒憂
鬱以致胃火上蒸乳房化多癰腫肝經氣滯乳頭壅塞不通致
令結核不散痛不可忍

大丸乳土難竟硬腫作瘡宜以葱頭搗之其法用個潤口瓶以炭火入瓶內上以熟灰填滿瓶口用葱頭及葱白搗損令遍裹瓶口用手帕裹瓶倒掛將瓶口向肺處任意轉上裹之切莫亂施針刀以傷其房縫或初起隔蒜艾灸猶可

粗傳內吹初起單方鹿角磨酒多服外吹初起單方用百齒霜

那爲丸雄黃衣服七九出汗就急不出汗再服七九神効

翼動傳秘方治乳瘻用漏芦川山甲金銀花白芷稍連翹貝母末京赤芍甘草節各等分白水煎數沸方人大茴煎一二沸取起

頓服被蓋出汗次日膿血盡從大便出不除內服應自內

龜慈園製治乳瘻乳癰神力○外用銀礬散敷內即服防風連翹姜桑陳皮青皮貝母漏芦烏藥薄荷細花羌活升草煎湯○如不消再用土烏藥一枚水洗三次吳茱萸研服防手瘡歸白芷陳皮青皮貝母姜桑蒲公乳香沒藥大參黃芪肉桂

惟內吹者不可用桂恐挂動胎也如潰爛外用化房丹擦後用
白珠砂散或生蠅散搗之如有孔久不合口用黃藥陳皮各等
分將絲絛拌麻油蘸藥末透入如冰薄久不出膜化房丹擦
極久內服任補外腫堅硬手不可近謂之兒癟未消者宜服瓜萎
湯將過兩乳間出黑頭瘡頭不作黑眼者宜服內托升麻湯已
潰者宜服方括散內七宣散及繫疽內補中益氣湯之類

○瓜萎湯 瓜萎三錢當歸一錢甘草一錢五分乳香一錢半
○內托升麻湯升麻一錢葛根一錢連翹一錢黃芪一錢當歸一錢半
肉桂一錢黃柏一錢半草薢一錢半水煎八酒調服

又有鬱怒傷肝脾結核如篤養子大不痛不痒五七年後外腫紫
黑內漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用痰核內十六味流
氣飲及單青皮湯兼服加虛者只用潰肝解鬱湯更加清心淨
養庶可苟延歲月以後必于乳下演一穴出膿

○清肝解毒湯

當歸

川芎

白芍

熟黃

柴胡

白朮

人參

陳皮

炒梔

茯苓

牡丹皮

貝母

水煎服

婦人乳頭裂治宜秋後茄花陰乾清油調敷或秋後茄子裂開者

陰乾燒灰存性爲末水調敷

乳勞癰腫兒心者用猪兒腹下毛乾鍋內煅存性爲末干掺或入

輕粉少許清油調擦

乳中癰瘡起痛用川黃連大黃各二兩水煎服

乳癬先以粉草磨水擦後以油醬擦効

乳後乳如石硬不散用陳皮一斤去白皮水

大半下伴斤生姜

共爲丸青黛爲衣每齋薑膏收水送丁三十九或酒吞

乳中苔花石榴殼此症者少不治者多亦宜生肌之藥內吃外

敷而不生肌必效

方子乳癥治婦人

微寒益怒火房熱過度以致肝虛血燥腎虛

精法不得上行痰瘀凝滯亦能結核大槩男子兩乳腫者用瘀
核內十六味流氣飲左乳者足三陰虛鬱怒所致用瘀內八
物湯加山枝牡丹皮或前清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒黑
如飲食少進作嘔胸脇作痛眩昏頭痛引滯者宜大頭腫內六君
子湯加芍歸柴胡山梔

如潰爛作痛者宜用瘀癰內八物勿加萸肉桂腎虛再加葛根
如因勞怒則痛併發寒熱者宜用瘀癰內補中益氣湯加炒黑山
梔子不可輕用清熱敗毒之劑

圖直瘻癰



口每穴內隱七痛七爲疽肉上微起者爲癰假如中府隱痛者癰也余各穴倣此宜溫氣飲或托裏散加當歸山楂黃芩杏仁

井



腫



肺痿肺癰

是疽經年久咳熱甚葉焦而爲痿猶草木亢甚則枝葉落也火燥甚則腐脹爲膿血成癰病因汗吐下後亡津或督脈火炎或厚味煑蒸而成其候惡風咳嗽鼻塞流涕項強不能轉側皮膚不潤淨胸膈腹滿呼吸不利吐痰血腥穢若覺辨真假將黃豆根研水服之得者真服不得者不是肺癰也

肺痿脉数而寒咳多寒熱自汗宜知母

秋苓湯去門冬

○知母

知母

秋苓

黃芩

五味

半夏

柴胡

白朮

人參

桔梗

薜荔

川芎

阿膠

甘草

欒

如咯

血將變癰者

紫苑散金銀花

○紫苑散

紫苑

知母

貝母

人參

秋苓

桔梗

五味

口人

參平肺散

生薑煎服

火盛首人參平肺散等丸含化

口人

參平肺散

桑皮

倍下人參

知母

地骨皮

五味子

青皮

橘皮

秋苓

黃芩

麥門冬

各等分

爲末布子大

喘急面浮鼻塞胸脹及喘不眠者

宜用

桂附三兩爲末大枣三十

以水三升煮取二升再去滓煎至七合

服盡三日一劑

或半以葶苈子炒爲末水煎服是

細降火藥爲主也

但傳肺癰之症始則易治膿成難愈肺癰繫

而數已成膿也男子以氣爲主十救一二女子

以血爲主十全

中華書局影印

卷之三

十一

中華書局影印

十一

中華書局影印

六七火丸初起口燥咽乾胸膈隱痛咳嗽痰血氣息腥臭治宜

桔梗渺三叶草根一門冬去兩煎服或加味敗毒散調之

加味敗毒散

薄荷

瓜萎

白芷

烏梅

生黃

黃芩

蹄尾

半下

桑白皮

茅根

竹心

如有膿腫氣上衝嘔而嗽及吐膿者俱宜消膿飲或用生膿黃芩
地黃天門冬生姜當水瓶上蒸熟細七頃服若收口以槿木皮

白欵煎服

○消膿飲

貝母

知母

生姜

阿膠

桑皮

防風

天門

冬

桔梗

薄荷

蘇子

白欵

南星

半下

川芎

射干

杏仁

甘草

白芷

烏仗

姜附

如咽痛者射干桔梗湯便秘者前太乙膏易九白湯下

又有胸膈間開一竅口中所咳痰血與痰相應而出者宜大補氣
血匕多者梅豆湯冷熱不調者前雲母膏爲丸并桔湯下

梅豆湯 黑豆

烏梅一錢以仁水煎服

以阿膠醣黃人肉

腎水不足虛火上炎咳嗽膿血喘而短氣發熱作渴小便不調

加山藥助山藥熱

治宜參芪補肺湯加皮硝少食加升麻桔梗去山藥助山藥熱

加皮硝助山藥熱

參芪補肺湯 人參 黃芪

白朮 茯苓 陳皮 單歸

山藥 紫珠 半夏 草薢

五味地黃分錢五枚丹皮姜加

一柴面赤當補脾胃面白當補肺益補肝以生肺金補肝以生脊
也如陰火發熱面赤咳嗽膿血痰如糯米粥脉浮大者火克金
也不治如脉浮症可治以其有本脉也

心癱

心癱之症生兩乳中間狀如豆大三四日起不早治八千腹十日

死又云外發可治內發難治

如病此症小便澀者宜用黃連草桔梗白朮天花粉瞿麥淮
水通或清心散如大便秘者用前方括歌內固清心散或黃芩黃

連封草桔梗白芷生地天花粉大黃

○清心散

遠志

赤芍

赤芍

生地

麥冬

知母

甘草

生姜

枣子

同煎服

如生干胸乳上些有几孔者亦名蜂巢癰發乃心火劫盛治宜急以疏導心火之藥稍遲則熱躁難治

如心頭有孔當出氣水謂之心漏治宜鹿茸去鉗附子炮去鹽花共爲末每內二兩搗爲丸空心酒下

予治一人病井疽已潰內瘻耗裏清心之劑外用敷洗燙割生肌飲口如法治之一月全愈

腸癰

腸癰之症蓋由腸肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥倘誤投熱劑則虛熱愈盛易傷骨膜填之

初起宜乳瘻內服姜湯或臍疽內柴胡清升湯治之唯遺後方

一 敢清熱托表兼滋腎水

胃癰

胃癰之症多因飲食七情火鬱被外感寒氣所觸使屬扶陽之氣
填塞胃脘內中清氣下降成胃胀沉淪惟寒氣所隔故人迎緊盛
有此二味者胃癰症也

外症寒熱如泄冒濁則肺金失養故身皮錯縱或咳或嘔或噉腐
血俱宜大射干湯主之

○大射干湯 射干 赤芍 赤芍 白朮 枣子 升麻 附
水煎入蜜生地黃汁同服

加痰壅者其結湯如大便不利者前太乙膏爲丸服
如小便不利者及腹滿不食者三七湯

○三七湯 冬瓜仁 葡萄仁 桃仁 牡丹皮 白水煎服
如積出食少者宜補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可

專治其瘡

陽癰

腸癰之症濕熱鬱積成癰小腹疼痛小便澀似淋大便澀也若腹脹大轉側間有水殼或遠游生苔出膿大便要下膿血者不恰此症脉遲緊若未有曠也用大黃湯下之或用射香乳香丁香沉香木香連翹大黃通草獨活扁竹其草下之亦可不發下以散如秦艽邊走

○大黃湯

大黃

芒硝

牡丹皮

瓜姜

如秦艽邊走

丸七

若脉芤滿者

宜用當歸

川芎

白芍

玄胡索

丸七

仁 紅花 本香

如脉洪數者已有膿也宜前胃癰內三仁湯或乳癰內瓜萎湯如脉數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急虛陰冷凝痰成癰宜牡丹或十宣散之類

○牡丹散

人參

黃芪

天麻

白芍

丸七

川芎

木香

宜當歸

薏苡仁

桃仁各二錢桂

草梢四五錢水煎服

如小腹疼痛小便不利此腹癰也亦宜牡丹散治之
如令熱相併或痛甚或大便從小便出者但宜前
炙母膏多丸生

膠煎酒下利去瘀則愈

如下腹過多者宜肺癰內梅豆湯加甘草桔梗和之蠶丸九妙
如虛冗導治腸癰小腹痛一更帖確若用當歸附子合蛇退
一條水煎服四五貼○如腸中病不可忍者用改善附子赤芍
槐仁苦硝大黃水煎服六七貼○如腸癰成腹者用牛膝紅血
竭五味大黃牙硝牽牛七分子故此共爲末溫酒調服以利爲度
若腹止後用紫石內補中益氣湯或赤連內八物湯以固本元
愈後却宜靜養勿動勿舉舉及破驚恐必腸斷而死又云癰生
小腸分尤可治癰生大腸分近肛門者惟治肛門破者即死

腹癰

腹癰之症生丁肚腹皮裏膜外全閉脉洪散而腹痛甚者真也乃
脅深七情火鬱以致皮膚氣滯而成小兒多因驚積氣滯而成食
積痛氣相類不可誤治

此症慢腫互硬肉色不變未有膿也宜

人參

白朮

黃芩

川芎

白芷

齒歸

枳壳

甘草

或前方

括膿內托裏散

如欬腫痛甚者邪氣甚也先用驅疽內活命散隔布条以殺其毒

後用托裏散以補其氣

如腫起而軟色不赤者膿成也宜方括歟內托裏消毒散若膿成

而不外潰者氣血虛也卧針刺之

又云此症不問初起已膿未潰卽宜壯胃元氣而佐以行經活血

若誤用丸散及利下涼藥則腫不能潰也不能欬決惟治之若

曾經誤下及服降火破氣消瘀之藥大創參芪姜附或瘰疬均

八物湯加桂枝急救之

臍癰

人臍腫紅痛久服流氣散針開口瘻出四五箇月不且後用蒜
盛艾灸內服五晉連膏全愈

口五香連膏湯

丁香 南赤香 沉香 乳香 密陀 茱母

連膏

人參各一錢羌活二分駁骨半分

如臍上生瘡出水不干用枯瓦白龍骨粉敷之臍上如神
小兒臍癰以紅錦燒成黃牛糞燒灰子細研等分溫則擦之
則香油調擦

小兒臍水不干用鳳凰衣燒灰存性擦之

兆角癰用臘瓶內干金托裏散神効

背

腰



部

脚肚發

此名脾肚發生在右下脊上脾肚之間乃因飲食風毒或處一尺深一寸鑿漬在骨不穿膜不死急治脾胃中之毒內服方括內飲懷心散外用敷藥毒去心大要服藥截住如通脊皆腫者不治

石牌蓮蓬瘻



此名右脾蓮蓬瘻分如蓮蓬內有子孔失治恐其毒入心大要用方拈內托毒散加黃芩白芷柏芽益散之不令攻心漸消可治通背腫亦危

左脾發又 四左時發




此名左脾發生于左脾之間初起灯心點破內服後疔瘡均退
疔瘡汗之即愈

脊中蜂窠發



○此名脊中蜂窠發生在正當脊心形如蜂窠但有孔在上者酒
是反病不直治亦以前方括內托裏散加花生飴定痛妨毒
攻心八腹推療

右搭肩串發



○此名右搭肩發生在右搭肩骨上以動之處可治若串左肩難
治宜服前万括內托裏散加升麻桔梗外用玉紅散或綿絮燒
灰雞黃皮焙干爲末摻之于各麻油調搽

左搭肩灸



○此名左搭肩發生在左搭肩骨上以動之處可治若串右肩治此確矣

對心器



○此名對心器生在對心處是症極重乃因心火盛而熱氣會生

子此其毒尤盛走暴急用疏導心火之藥解之然後用生肌散

龜背瘡



○山 合龜背發生于背上頭尾俱尖四邊散大如龜之形乃因飲食以致而氣食相閉合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而潤之以托裏補藥治之

走流注瘡



○此名故走

此生發火名瓜藤發乃毒氣乘風熱而走急宜疎風

定熱治之

氣自息若流注于手腳腿者必死無疑治宜寸勁

味流氣飲多服瀆體針破單用化毒丹夕癲

發特

蓋背山膀胱

百脉所主然五臟所係於背或醇酒厚味或勞怒房

勞以致水結

火痰凝氣滯或被外邪與毒相搏隨處發生

祖傳云真指

在極處多小口如沙眼樣若無者乃陽毒也又云背

發黑膿對

心者死不對心但平冷不痛不紅黑陷者救急以生

姜附毒上

又灸變紅方可外治又云背發之症光痒後痛最難

惡症始起

知豆者便是宜灸之初灸不痛灸之極痛則止初灸

痛灸之不

相則止使毒氣隨火而散或稍大不可灸者用針刺

破火筒及

之五次去惡血又有甚插而大已成不可破者急

以斷法斷

用白霜梅皂角二味燒灰存性爲末不發熱者米

汗藥

回閨則外即不先開如發者用茶調全後以鼻

水洗淨醋炒拂氣薰三次汙肉去盡方用黃柏草烏

川山甲炒

水

鴨子清調敷或用白芨白欽荆芥赤芍黃柏大

黃當歸白

芷南星赤豆草烏寒水石服商陸始華分爲末地黃

汁調塗番

片後用片腦龍骨乳香沒藥兒茶血竭輕粉爲末撒

或炒雄黃

冰硝白凡砂爲末盛之內服前方括內十宣散

張指揮傳治初起背癰陽毒陰消方用官桂法後連喬太極乳香

沒藥

川山甲炒

水黑牽牛批大黃鉢姜止酒服白芷

粉草筋紅當

歸附水

川山甲炒水共爲末每酒調三錢服

應圓製追毒

導腹散治背發已成未成服之無不應効

先服人參

當歸黃芪白芍川芎防風官桂桔梗白芷瓜萎仁金

銀花甘草

大棗一貼用生頭酒煎熱服出汗爲度

後服

白芷紅川

山甲炒蘇叶石乳香等分沒藥紫蘇白姜玉竹炒蘇叶

甘草絲大黃酒皂角刺各一錢上八味熟姜煎服加
研爲極細末用當歸四錢剉碎將牛酒半水三錢同煎調前藥
末空心酒口盡服如當歸酒不足加好酒調服以利腰血三五
次爲度利後用粥補即止服熟後忌用油膩生冷及炒熱毒及
諸凡藥物且慎弗行動勞碌觀爲常疾須靜坐六七日此方百
發百中無不應驗

如盧兒博治背癰已潰未潰得効良方

外用厚朴仁陳皮白芷草節桑木根蘇桑黃芩
細共爲細末清油調塗內服乳香沒藥赤芍各二錢每
川山甲炒皂莢當歸各二錢防半夏白芷紅退紅大黃五
天花粉金銀花甘草節水煎生酒服如已潰者用
黃連散竹筒吸毒上其膿出後用黃連散水洗之後屏化毒
生肌散口如法

醫俞發



○此名腎俞發乃溫熱色勞所致急宜用藥解附腎少陰經用生
脈來攻之治法詳後

不腎俞雙發



○此名腎下双俞發亦由溫熱房勞鬱怒過度故兩腎俞俱生涉

治詳後

腎俞發

腎俞發症原因受濕并怒氣飲熱酒傷工，肾內流毒在腎俞生疽。若下腎俞發更甚，更加房勞鬱怒過度所致也。又有腎愈一發脾腎上一發肩腹上又生一發，小名隻發。但此三症陽疾于外者易治。

陰癰瘍發傷腎腹及膿稀者死。

此症核起於腫發熱疼痛色赤，循渴脉細，數有力先宜服腦疽內活命飲，後用方括內托裏消毒散。

如腹腫不熱，微痛，色黯，作渴，脉數無力，宜虛也，宜方括內托裏散，如發熱，陰虛者，宜四物湯，加入參白芍。

惡寒熱，四肢甚大者，陽氣虛也，宜單人參湯或八物湯加芪桂，如初起食少者，邪盛脾虧急，用補中益氣湯救之。

祖傳治瘧俞總方

內服用方括內托散

散加車前木通淡竹葉

牽牛何首烏脚連復用內消散及生

定痛散敷之及膏藥貼

更以痰核內十六味流氣飲加減服


大火燎腫氣血勝毒者易治慢腫服托毒不應者乃毒勝氣血死

在旬口或已發出而不腐潰者急吊打裏散兼補脾胃不應者一

死在二旬若已潰而色不紅活者用托裏散加人參黃芪肉桂及補脾之藥如不能生肌癟口踏蠶上八面不歛乃脾崩也腰

○臂腿部

腎癰



便毒



醫癰

腎癰之症乃陰虛血熱所致當知醫居小腹之後部位僻奧雖曰多血既氣既罕到血亦罕來尤忌此誠不可慮

此症初起未成瘍者隔蒜灸之再用葱薑久法

如欲作膿者內托羌活湯如痛甚者前上分括內活命飲

○內括羌活湯 酒黃柏 黃芪 防風 當歸 稗子 半生半酒煎
甘草 芫朮 陳皮 肉桂 半生半酒煎
如腫硬痛者宜方括內托裏消毒散或杠臂裏散

如脾虛不能消散或食小不作膿者或右臂腿者宜大頭風內

六君子湯加苦歸黃芪

如脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者宜補中益氣湯或八物湯加芪桂漬後亦宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒燥暴乃可萬全如內傷房室兩臂腫硬二伍臾不通者宜八物加芪桂車全牛爻故芷小茴之難

曾一人近肛門處作一毒如碗大名曰疎毒已作成膿用艾依灸一二十壯次日將麵粉作一圓籠上又將槐樹皮爲一圓片蓋廻粉圈上將大艾為置槐皮上鳴灸出黃水爲度其槐皮要將粗皮在下嫩皮在上如此治之即愈

臂疽瘡

即臂疽

一方用硫黃末鋪帛上捲筒爲條將麻油浸透倒提點灼滴出來油候冷頻搽

一方用核桃肉七箇大楓子肉一个硫黃酒水銀分共爲調劑

便癰

便癰俗云便毒實血病也生于腰脅小腹之間近陰土廻乃厥陰肝經及衝任督三脉隨道精氣出入之路也或入房忍精或思色不遂或泄敗精凝滯於腫痛在腰腹之間

江氏傳

先用蘇葉

陳皮

香附

麻黃

平葛

升麻

赤芍

蔻活

一貼煎服

後以川山甲

牡白姜

桂

皂角

炙五灵脂

炒大

黃共爲細末

酒調下

通三次而安或去五脂加白芷貝母亦妙體虛者用人參仁炒熟再八大黃仁同炒署熟取服

初起及久欬成漏者俱宜飴丸九神妙

應員制

治便毒用

姜虫

橘柳

牽牛

貝母

白芷梢

大黃川山甲豬仁同煎炮皮硝三分磨大黃四分空心服通四五次以粥止之外用倍子白瓦醋調敷如要腫破用烏豆去皮

生搗爛鴨清調敷過

一夜即破出膿

瘡氣

是症凡便毒下些近陰下廁治宜大黃伍川山甲牡黃柏

黃芩

姜黃

白芷

絡

三白水煎生酒服被蓋出汗爲度或

黑牽牛

大黃

五分

牛蒡子

日母各三分

羌活

獨活

洛

承氣

大黃

五分

牛蒡子

日母各三分

羌活

獨活

洛

驕馬

是症即便毒左右兩邊俱發或先有丘瘡而發或卒然起

核疼

痛而發治法同便毒疽潰後亦如總要敷洗化毒生肌陰

路岐

俗名痕瘡些小膀瘡此症小兒患之多因食積痰滯

祖傳用

牽牛雄黃川練子化粉枳壳貝母甘草等分爲末南酒調

服三五劑出膿即消

如痛不可忍者用細辛黃連川山甲乳香沒藥連翹母尾大黃棗

子銀花牡硝車前子防風

核桃去油酒煎五更服

如腫不消用佗生黃連黃柏輕粉爲末參之鹽湯洗之內以赤

蠅頭膏爲末參之鹽湯洗之外以赤蠅頭膏爲末參之鹽湯洗之外以赤

燭燭鍼熱酒服之汗出爲度淳用數瘡

湯林

治宜山姑貝母川山甲大黃芒硝梅榔我木煎服或大黃
川山半姜虫黃共牡礪酒水各半同煎空心服

題

懸糰之症乃足三陰虧損生谷道則陰囊之間初發其痒狀如松子或如連子日久如挑李如以赤腫若破則大小便從此中而出不可救也乾則滴盡血而死重則內潰而亡

此症初犯濕熱壅滯作痛焮腫者治宜膾疽內活命散去大黃如蒼朮等如不成膿不潰者八物湯或腫脹已成者急針之膾疽鍼如血虛首尾歸芍芍藥入參白朮氣虛者參不參等歸芍草如脾虛者補中益氣湯如久成漏者八物湯加芪桂或蠟丸丸此病當服國老膏雖惡亦輕雖潰亦淺若誤用涼寒必不可救國老膏粉草帶節再用山澗水一石硫浸三時令透以慢火炙

王文忠醫案之三
千仍投水浸透再炙至水干爲度洒三盞煎至八分并酒空心服三日一服

谷道中生瘻治宜水中何葉卷筒綿裹納下部日三次即愈
肛門爛出水作痛或痒或出血用石硫黃五分冰片一克爲末捲但先每用銀花散艾花散槐花水洗
肛門腫痛熱毒用挾痰莉槐角黃連各乙兩陳冬瓜皮二兩右爲末空心酒調服

毒瘡

辨瘡不論男婦小兒俱有何也經曰富因酒色財氣病緣負重擔輕婦人因經後受冷月後傷風小兒多母腹受熱利後積血於臟腑虛而血脉未貫風濕犯而食毒皆因七情鬪結衆怒交戰於下墮蘊聚肛門宿滯不散而繒突爲此症也然症分二十四原有徵誌云痔漏分二八憑君行酒有穿腸井漏尾酒色兩頭

糊丸如梧子大每五十空心服酒下服二二次爲止

如小便不通用葱一握煎湯洗小腹則通

如大小便不通用澤瀉木朱苓 赤苓 白朮各七錢

皮 枳壳 車全 木通各一小錢五分甘草三分燈心煎全

如血不止用烏梅一个艾葉五分井花水煎服或五倍子

荳茶二兩煎水洗肛其血自止

如痛甚者用前服水片乳香沒藥爲末水調搽

如肛不收者用帽皮一個碓內燒焦黃存性磁石五錢碎肉桂三錢

鹽弔候三爲末米飲調服炙熱鞋底托上

如大腸結硬下墜多血痛不能忍用歸尾澤瀉生地黃只壳大茴

郁李仁蒼朮蕎朮皂角仁研成膏麻子仁一錢半水煎空心服

祖傳細方 不問男婦遠年近日二十四種痔漏不用刀針神妙

○枯痔藥 白芷吳茱白朮紅根二味八錢杓內先用白朮末

又放研正軸又放白凡蓋而將慢火燒至烟淨出火毒八後
藥兒茶紅血竭蛇含石步驚石芫花分研砂五雄黃礫砂
絡一乳香沒藥各五分上青油輕粉研若其石紫蘇右十二味
共同一處爲極細末合五分之一用液津調開搘作薄毒餅子
如此大藥餅又放些簪脚大用陰干曬用大凡醫痔之法首用
喚時散當先喚出痔來辨好下手上枯痔藥

○喚痔散單用生胡椒長爲極細末空心用生酒一瓶隨量大小
送下待半上午其痔即番出來方用津液調前枯痔藥如稀
糊樣週圍擦上枯痔藥道中納一藥餅痔孔內插上簪脚樣
約挺子一枚後用白帛封固但上藥之後疼痛唯禁則不必
憂心晝云若藥不聯弦廢疾不瘳故曰惡病還用惡医也但
是上藥之後血即隨手而止疾則刻日而安每三洗三換新
藥若是大便堅硬須用大黃酒蒸透熱爲極細末每日加

調股一錢以稀糞爲度間服鷄皮散

鷄皮散

治二十四種痔瘡出血裏急疼痛

槐花炒

艾葉炒枳壳

地榆

當歸

川芎

黃芪

白芍

白凡草四象

鷄皮炙

活頭髮

三不皂角

皮黃

猪後

蹄筋甲冬十枚

右爲乘燒藥爲丸如桔子大每服五十九

煎米湯下換藥敷至六七日看痔瘡變黑色堅硬乾枯不痛
方用浸洗之藥拔去病根若是痔瘡木曾乾枯过脚汤要止

藥凡朝以乾枯堅硬爲度

○浸

洗貼落痔根方

用生艾葉

白藜芻

素灌草冬青葉

左壅滯
綿花子及各樣疎風散血之藥煎出水來將痔瘡
瘻洗待藥水溫之時坐在腳盆之內日日洗浸五七次待
其痔瘡浸洗至五七日之內其痔根自然脫下以落盡爲度
總不用浸洗待落下痔根隨用生肌散攏在痔瘡之內每月

又用新鮮之藥頻洗次上生肌散首尾前後半月之內可以除根脫躰而復舊也

○生肌散

嫩老鼠子一个

干存

雄黃一錢

乳香一錢

沒藥一錢

茶荈輕粉一錢

甘石以銀制雄黃一錢

破繩綱巾一錢

血竭一錢

孩兒骨一錢

陀生秋子一錢

黃柏末和大黃末各半錢

右爲細末一

日一次洗換新藥自狀生肌平復矣

安氣神效

漏症

凡漏久則宿膿腐肉停蓄其間穿口必透風冷外侵消也。膀胱流出如虹突之有漏孔九品。肝主狼漏。胃主鼠漏。大腸主蠻漏。脾滯。臟主轉筋漏。原因氣血壅滯。染觸而動含蓄之毒而名其因治。叫一也在痔則有穿腸穿石等陰者又有無孔肛門左右別生竅流。出膿血名爲草漏。然在皮膚者易急藏腑摸者難治。如漏症初起淡紅微腫不核宜涼血清熱燥濕用加味槐角丸。

即加硝白粉如黑死疔虫惡臭宜收妥殺虫溫商用前膏藥

可無王丹或方活內

蠅丸

○加味槐角丸 槐角

生地 肥二萬膠

川芎 肥五當歸

黃

芩

黃芪

黃連

紫苑

防風

只壳

地榆

升麻

連翹 脓一白芷五

共爲末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十漸

至七八十溫酒送下

又有初起因風冷者久則盡而拔濕熱者丹溪用參朮黃芪芎歸
爲君佐以蝦皮蛇退牛角腮烽房之類服之外用津唾調附子
未作餅如錢厚放瘡上漏大炷大艾漏小炷小艾灸令微熱不
可令痛乾則易新餅再炙如倦暫止次日又炙宜至肉平爲度
外用寒母膏貼之畏火者內生肌丸最妙甚凡燒梅芝味苦分
祖傳治漏症 用人言半明凡兩乳香 沉鬱朱砂各五錢
含石脂兩錢先將人言爲末入沙鍋內火煅待烟起將明丸

益人言上脣有烟起處以凡未填之漏以用凡未蓋另度候凡乾白色待冷去上面凡未取人言爲未八前藥其爲細未將一半麵糊作針一半綿皮作條蘸麵糊拖藥末甚乾用真綿繩凡遇漏先將藥針入漏內漏深入深漏淺入法待三日毒盡却用帛條八痛處漏深八深漏淺入淺日漸抽出其帛條即生肉凡遇穿腸漏用好細絲線八蜈蚣含石醋內煮過要從夏天月內收取鄭珠過網繩一相共合經線穿人漏孔內穿法先將野燈心草破開些穿入透出却將藥線入于野燈心破開處透出如無野燈心草將嫩布線而掛繫銀絲上穿入却將長線入糞門內接出去銀線却將絲線八一根于布線內抽過絲線再將原絲線頭八第二根布線內抽過絲線來却不見來去兩轉收緊繩一匝待明日解開糞又收緊繩仍繩一匝莫令寬日日如此線落後以生肌合口

○煮線法 荊芥根大戟根金頃玉梅花五味龍鷄糞共八水內
煮汁去滓將後嫩絲線入汁內煮一二沸即取線風乾聽用
如痔漏不脫綿者用百草霜草烏尖各一兩末井花水調筆點綿
如脫線不生肉用枯凡五倍子爲末摻之即生

如穿線不收口用牽樹皮爲極細末生肌甚快涼藥煮過芦母石
次之如痔漏痛不可忍用黃連黃柏薑金砂砂米乳香沒藥自
其等分爲末水調作錠子陰干挿八孔中

如痔漏血不止用陳棕箬葉枳殼炒灰歸尾炒鱈甲炙烽房猪
左縣蹄蠅頭黃柏槐角共爲末水糊爲丸梧子大每水湯打丸
如原有痔漏肛門別生三塊作膠就在瘻孔出者乃食積注下也
宜使魏散

○連翹散 黃連 魏山楂 神曲 桃仁 魏角 連翹
皂角等分爲末以少許置掌上時上舐之津吞下

子尊治一人肛門外陡生一毒其勢如核久而破出膿甚臭遂將
指肉湯鴨毛刷洗以貝母末搗即安後復成一孔出水子以爲
漏用白雷丸引藥皮硝硝將公猪大腸一頭線扎薦皮硝築八
層雷九築八層如此築几層向頭麻扎將瓦盆腸火焙乾
用如吃下取出雷丸同石乳香紅真沒藥五苦秋粉硝刺蝟皮
一焙切共爲細末酒調服

龜息圓製透漏丹 治漏如神

蓼牙末

五黃蜂窠

姜桑

細去頭退結梗廣木香出孔香

沒藥血竭絡三兩八味爲末次用黃蠅八兩鋼錠等化黎白色
離火入前藥未搗勻成汁研八水中取之爲丸此一科藥分作
百丸臨睡時服一丸早晨空心一丸復白湯下又服後方枯丸
一鹿角末一芝麻兩顆蜜丸如倍子大溫酒下三十塞安去瘻
角加蓼牙而黃蠅爲丸常服斷根

加虛兄傳加味蠟丸

姜

治腸癰痔漏癧斑等症日夜疼痛

水不乾用黃蠟面白丸和

研末辰砂

雄黃

陀僧絲一右各

爲末先將黃蠟入銅鑊內

熔化再入蜂蜜五

采同鑊隨入四味

木末藥燒勻待冷爲丸如梧

蹇大每服二十或酒或白湯送下

在上飯後服病在下空心服

張仲

瘡難發之症屬肝腎經都繞而腫掀熱如小兒因啼叫怒氣積

聚或虫咬風吹治者每宜詳

因而施治之

腎裏初紅腫小便澀滯者用

正散主之

○八正散 車前 翠麥 番薯 清石 山楂仁 大黃 水

通
甘草

如瘡腫腫脹二便不利者用白芷

白朮 桑白皮炒木通絡

水末每姜湯下五錢小兒服

分

如全因入房裏腫大如斗許 小腹服闊便發熱曰乾癥藥命在
一友掌宜督氣丸料加車前二牛膝煎香瀉膏丸後仍腹痛者宜
補陰托裏再候膿而針之

若膿厥而便閉者換毒藥瀉也以方括內托裏治毒散或又不愈

若燒毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者用臍疽內活命散

○清肝益榮湯

當歸

川芎

白芍

柴胡

炒枝

炒草頭

茯苓

木瓜

胆草

熟地

如膿潰皮脫幸九懸掛或內見筋一條不消陰囊悉腐玉墜下而

貼膿者亦腐如半邊筆管只宜方括內托裏散加故芷黃芩五
味丸系或兼服補中益氣湯倍參芪歸木大補氣血脾胃外塗
白蠅骨藥牽引日可愈雖曾裹九府藥亦一無妨以白脂膏貼

如脅囊下有五六孔出膿者以當歸

川芎

白芍

熟地

生

地白苓

巴戟

川續

三兩桂

大附子

鹽炮

銀鏈胞

魂

四益智仁

防風

金銀

花

皂角茨或加升麻土茯苓每貼

用猪肫子油四兩或肉同炒空心酒下丸燭出膜用少寒肉
配青鹽伍牛黃分射香蘇膠寒肉爲丸服外用化毒丹
七日狀後以生鳳散擦之

陰囊玉茎癩爛甚者用防風肉 白蒺藜白附子桔梗爲末以猪

腰一个用刀破開將末藥調濕水包浸溫裏以有殺火烟熟空
心服下不効再服屢試有驗 陰囊氣瘡用蒼朮紫蘇煎水洗
裏瘡抓破流水用黃連細茶 獐耳瘡衣爲末木油調搽或著水抹
皮蒺藜厚朴草三味煎湯擦洗

督囊生瘡作癩或癩後流水作癩治宜用川椒蛇沫細茶槐柳條
茹根煎水燭洗七後用朴硝搽之

陰囊兩傍生瘡濕瘡甚者用桂研黃丹硝二味爲末搽一
紫礦楓即陽物紅紫瘡不可當若用山楂柏柴莫及观音茶葉二

味酒吃其澤用火上略 洪熱藥上冷了又燒熱藥上不鍼
子居南京見一人陽物生白芽一二根如菉豆芽脚樣其痛如
針刺難忍用艾置芽下貼內處一灸即倒痛上全愈如神

小兒外腎腫大陽物透明用末津液調敷外腎即消狀者
如牛清調敷痛處

左顧右矚三咬乾地龍一咬癒

亦兒內怒氣積聚陰腫用桃仁大半炒熟剝去皮去核

加牛膝半錢刺去頭去官桂

牡丹

皮 大黃各三錢水蜜丸如菜豆大每用青木香葱白鹽少許
煎水送下五七丸 小兒寒熱腫痛用蚯蚓糞并草汁調空心
小兒外腎俄赤腫痛不日退皮如赤壳愈而復作用老松皮燒灰
入膩粉香油調搽

小兒坐地爲風吹或重吹而腫外用蟬退錢煎水洗再溫再洗內
用米芩澤瀉枝芩白芷共半錢心煎服
小兒陰伏生瘡用黃丹黃連青黛等分白末泥鰣烈肝油調搽

大人小兒陰伏痛不可忍單用金砂酒調服神妙

小兒大人陰囊併玉蓮紅腫大疼用

鹽炒

桑令病人坐定將桑

巾兜炒鹽包阴囊玉蓮即消

卷

凡陰頭玉莖腫痛有生瘡乃督任衝三脉之屬督脈屬陽任脈屬陰
衝脈屬厥陰太陽賁主氣陰脉主血皆由氣血大熱有毒有暑
故生此疾也玉莖紅腫痛爛流濃出汙日久不乾甘草水煩洗

後用羊角燒灰存性爲末每老酒調服三錢

玉莖挺長腫硬皮塌脹股難行兩脇走氣逆以柴胡人參黃芩黃
連黃柏煎服其腫漸收散中有核未消以青皮爲君少佐威蕤
未服之外以絲瓜子五倍子末敷之

陰頭出膿莖下搘之痛用柴胡赤芍升麻米芩澤瀉木通車前草
志山楂瞿麥牛蒡生姜灯心酒煎服

王莖腫痛出膜日確行步夜卧掣痛先服靈羅內八正散如故後

服導水丸加桃仁芒硝三五枚腫消痛減即安

玉莖腫爛流水先將芭蕉葉艾葉白凡川椒煎水先燒後洗再用海螵蛸二錢輕粉二分桔壳一分水片一厘共爲末搽

如因熱毒陰頭結毒或龜衣磨破用鹽上節霜刮下一處即愈

或白螺蠅一箇灌粉八分火通再入片三厘爲末搗之如神如由腎虛風濕相搏邪氣成之癰癧成瘻浸淫汁出狀如疥癬名溫陰瘡宜黃柏蘇絲刮下未同蛤粉等分搽之

如因久贍房室思色動慾以故敗精流入茎內初發如粟赤腫膿一爛作白瘻庠肪名蛇精瘡先宜用地骨皮蛇床子煎水擦洗洗後用黃連炭冬花等分爲末拌調敷

如因婦人子宮有敗精帶瀉或月水未淨與之交合後又未洗男子腎虛邪氣滯氣遂令陰莖連累九腫痛小便如淋名陰虛瘡

治宜外用鳳凰衣蠟

黃連等分輕粉片臘紗爲末乾摻或鴨子

清調敷內用歸尾赤芍生地防風黃連黃柏知母澤瀉小茴耳

草煎服

如陰毛間生虫作痒者搗姚仁泥金之

萃中痒出自津多因脾土軟弱不能運主金水以致肝經血虛火

燥宜用薯蕷內補中益氣湯

與清心蓮子飲同服

清心蓮子飲

苦芩

車前

茯苓

麥門冬

地骨皮

黃芪

玉蕊痛不可忍用石乳

甘一錢

慈汁調擦

下疳癰腫因所欲不遂

交接不潔以致布溼侵潰成瘡毒七日

久不愈或成僵腐或

瘍爛陽物

多致危篤故俗云疳瘡缺乏經

周居白先生傳一方用

細茶濃煎入蘆少許洗匕後

糊敷之

如虛冗傳用杏仁五個

大汗淋粉分水克

共研口涎作餅貼或用

麻梗燒水洗匕後用

年久白螺蛳

一粒冰片分爲末

鴈圓製治痔漏神方的

用防風

荆芥

連翹

獨活

黃連

黃芩

知母

黃柏

蒼朮

赤芍

木通

胆草

柴胡

甘草

桔梗

空心服

十余貼

外用文蛤仁

分牛黃

水片各

分珍珠紅蔻粉一錢

共研爲細末

于瓶中

如男婦

脾虛

旋用五倍子

性存輕粉

三分水片

爲末

瓶中

若女人先用五倍子

共研爲細末

于瓶中

門端坐于磁石上

火燒至水

爲度又將此藥水

傾出燒

熱易末

如肚脹

不退用益光散

加防風荆芥

何首烏

煎水薰洗

祖傳治痔瘡甚者

內以真荆子

晒乳香爲末

桑豆粉爲丸

每白

水送下

一日二服

外以坤草

防風

皮硝

用公豬肉

湯洗一日

二次後以白螺

蠣壳紅

公雞內金

三箇

研乳香

沒藥

象牙末

珍珠

龍骨

猪大骨

一雄黃

黃連絲

共爲細末

塊燭

是症腫爛

如蠟燭

鴉形

初起若腫

爛不消宜用

地赤根

收水

燒洗或用松葉

樟葉

蘆薈

桐葉俱取表

煎水

燙洗

外用退子虧燒灰在酒穴共爲末搗或薑鹽布虎灰搗患處
內服苦酒解毒湯

應風

製治頭瘡發爛去一邊極甚者內以姜取酒煮熟蟬退

任

牙皂十粒銀花碎杏仁四粒不土茯苓仁牙皂子仁十粒清酒

肉

一斤俱分作四大貼煎眼肉與皂子仁皆要吃下用外用上好

瘻

黑麻水久浸酒消鹽茶洗凹形乳香後乘熱敷

頭

輕粉海螵蛸白芷各一水片海巴子一爲末搗如

水

不乾者用海螵蛸指甲扶落成粉米泔浸一宿火培乾每二

水八

輕粉一分爲極細末搗之

又方不問年深日久出汁流膿日夜疼痛不止或病去一边或病
去一截服之神効但用蠅油一條去八熱酒內自狀成水服之
一日一次不過三服即乾水止痛佳妙

婦陰瘡

偏人陰中生疾多因七情驚火傷損肝經濕熱下注也
如陰火發出一條尺許如蛇痛突出水帛痛者糊髮疽內補中益氣湯晚服龍膽鴻肝湯外塗黃膏

如陰中突出如崩加雞冠四關腫痛者乃憂鬱脾虛下陷先以補中益氣湯加山楂茯苓車前青皮以清肝火兼升脾氣慳益更以癰瘤內歸皮湯加山梔茯苓川芎調理外亦塗黃膏
陰中生細虫瘡不可忍食人膿膿即死令人發熱七與勞症相似先以蛇床子煎湯洗後用梓樹皮焙乾爲末入枯凡四分之一射香少許敷之

又方治陰痒搗爛桃仁納人或雞肝煮搗盛熱人陰中或用大黃微炒黃芩黃芪各一錢赤芍玄參丹參小柴胡蛇床子各五分爲末空心溫酒調二錢服
陰火或癰或疽用艾叶皮硝煎水燼內服龜癰內八正散次用

當歸川芎芍藥地黃荆芥蒺藜煎服

陰門濕痒先用芍花根蔓枯草煎水燙洗次日用雞子一隻錢半

熱炭在陰門上遍一夜取出虫物復用芍花煎水洗効

陰部湿疮用艾蛤粉

白凡銅青洛一輕粉行乳香紅爲末搽

陰內腫痛二便時皆痛

大便有血以芙蓉葉燒置桶內坐漚內

散朱苓澤瀉白朮茯苓黃連苦柏黃芩芍藥

方手金銀花木通之類

陰內腫痛小便欲去不去或痒相兼用

茹苓湯加木通車前牛蒡

枝子七八貼煎服

陰腫如石硬痛不可忍二便不利欲死者

川枳壳陳皮芍藥四炒令

香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處緩

止熨之冷則又

換直至喉中竟枳壳氣則痛止腫消便利矣

如時常陰痛者用四物湯加稿本防牛

蚌殼風用防風歸尾全蝎茱萸芍藥連甘草服

五力全書卷之三

月合六百

五六貼每二貼煎洗

茄病內用酸車前白馬骨研

茄根研花絲一猪精肉醃金收服

外用地茄根本通瞿參石斛收置桶中

桶一孔半燥待溫洗

婦人陰痔用草烏七粒

研末盛入米醋煎熟揩

婦人陰冷用吳萸入牛胆內令滿陰乾每取二十粒

研末

中即熱

婦人陰痔用草烏七粒

研末盛入米醋煎熟揩

婦人陰冷用吳萸入牛胆內令滿陰乾每取二十粒

研末

中即熱

如陰燥甚用柴胡歸尾澤瀉本通胆草生地車前水煎服每食

辰之陰內生瘡或出衄生用黃芩川芎當歸黃連大黃川椒細辛

煎水熏洗婦人交接出血乃房室有傷所虛不藏血宜瘡疽內

補中益氣煎服外用燒艾葉有人陰中或用亂髮青皮燒灰敷

之若出血過多見雜症者調補肝脾自愈

附骨疽多病虛間

附骨疽症內痛如錐外肉不紅腫突多因冷露所侵或風熱發火所致也如此症初起古方用青皮甘草節煎服或隔蒜加冰火性

发丸灸患處仍以敷

愈法熨之若膿已成即用火針使毒不得

內潰帶生用亦無妨

且不痛又易敷口

祖傳用

奪命散

人參

白芍

香附

當歸

川芎

黃芩

乳香

沒藥

洛七益母草

珍珠砂

松榔

水

擣麵糊

做餅

中央穿眼

繩

繩

繩

繩

繩

繩

乾香

爐灰爲衣好熱

酒

調服久不治用螺旋

製

入藥內同前

服攻之或用黃芩連

根韭菜生姜搗爛敷患處或將艾火炙服

煎葉雞魚膾腹深針

出膾出膿如不愈用吳茱萸紅散燒方

人出

綏道迺寒氣伏于骨髓

其腫與皮肉相似疼痛堅硬如石二者

物

起便有溫熱托裏補

虛次乃隨證調治

如外感因露卧風冷寒

蒸襲深者初起痛不能轉寒熱無汗努久

寒鬱便祕者漏苔飲主之

漏苔飲子

黃芩

白芍

麻黃

枳實

升麻

芍藥

桔梗

硝分

大黃

承鉢草

三分煎服

如不敢下者湏分經內托汗散但在况醫者用臀疽內類托羌活
湯在腿內近膝股漫腫木硬者內托芪柴湯在腿外者內托酒
煎湯在左腿外側漫腫長濶行步作痛以手按至骨大痛者宜
腦疽內黃連消毒散通用鵝膝癩類換殊散

內托芪柴湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

羌活

肉桂

升麻

生地

工瓜萎

黃芩

柴胡

當歸

黃連

肉桂

內托酒煎湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

羌活

肉桂

白芷

大力兒

黃柏

甘草

半水牛酒煎

內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾樞環跳穴左右積聚
瘀血轉成宜青草苔柏湯微汗服此下愈恐疽將成者急掘地
坑用火燒紅沃以小便令患者赤麻坐其上以被席圍抱下截
使熱氣燼透膝理開氣血暢而愈

鵝鷄生冷飲食寒涼藥物丘疑于內飲食如常宜臍疽發

如食少脉倦者用大頭風類六君子湯加當歸重香

如因勞役傷食右腿偏腫者用髮疽內加中益氣湯
八物湯加柴胡牡丹皮山枝

內傷勞瘵而腿腫痛寒熱食少此溫痰下注也亦宜髮疽類補中

益氣湯加牛蒡芥子芍藥

兩腿膿血滯甚用苦參皮硝稀五炒水洗尤數次後用烟猪肉油擦

擦極効

腿土一切寒熱瘡用鵝子糞燬過爲末散參加燥痛加黃丹少許
桐油調敷

孫子兵法全書卷之四

手足

手背



手疣

附肩疽

如亥名手背發此症屬肝胆小腸經也于手背及指間或如黃豆大或如聚粟或如熱棗拔之則綠長三四寸要知不赤黑者可其狀黑者死凡人病手發如風熱血燥筋急者宜耳牽內加味追葛根湯加葛根如因怒火而疾者川芎頭內柴胡清肝湯前服

如十者屬枯筋等宜腎氣丸之類忌寒涼降火之藥及艾灸等症告犯之則輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死悔之追悔莫及

江氏治手皆發

用葵核內十六味流氣飲解毒生肌之藥

甲疽

疽之症乃毒氣攻于手足指努肉癢上指甲疼痛出血脛中有血或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛

右症俱用綠瓦五兩置鐵板上以炭火烘之吹令火熾其瓦即溶流出黑汁者是疽候流汁盡去火待冷取爲末色似黃丹收之先以鹽湯洗拭後用綠凡爲君入射杳少許敷之重者用綠瓦五錢蘆薈一錢射杳二字爲末以絹袋盛集納所患指于袋中線上定以瘡爲度

指

指頭先腫爛楚掣痛肢冷以不伸邊結膜甚者爪甲俱黑治宜先用芷硝煎湯淋洗狀似用烏梅核中仁為末米醋調

管入治瘻之自然或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之

癰膿子曰治宜天南星五倍子白芨草烏大黃酒麴酒糟搗爛
文力初起用野茅笪塊放燶或酒糟半盞曲果四個紅豆子炒熟
醋半盞其搗爛罨之

天蛇頭

蛇頭瘡生手指上或足指上瘡傍一塊開口腫痛是也治宜用雞
蛋一個要搗碎一宿如指頭大將人言雄黃粉五八子蛋內裝
後以患指入于其中浸一宿次早更以蠍蛇燒烟燭病指一二
次即消

如痛甚流血不止用雄黃蜈蚣全蝎爲末擦瘡頭上如以麻油抹
昂上扎之

文方

山砒霜醋放燶或先將麻油煎雞蛋搗手指一夜次日擦

猪胆

一箇將雄黃末三錢人言末三錢射 分八服內消

住一日疼痛甚一日後去草胆即好

頭臭癩久不愈用杏霜爲末麻油調搽
我掌風癩治用川烏草烏何首烏天花粉赤芍藥荆芥薑花鹽
牛肉地丁各一兩艾葉四兩煎水廻洗

一方用杏仁去皮尖輕粉等分爲末猪胆汁調搽患處炭火上走
三三次將麥粒大的艾在扣扣蓋處灸三壯水滯不發
始多年不愈者先用磁鋒磨瓦次以草房子一兩枯瓦二錢爲末
桐油調搽火烘極熱再以枣肉三兩木銀五錢枯瓦三錢搗爛
如泥每曰搽手千餘下次以肥皂酒揩洗净十次神効更效
宮或內閣一火斷根神妙

又方黃蘿晒乾并麻子研火上燄之二炷香爲度

手癩瘡發如豆梅痒澀如豆汗爛如浸淫瘡之狀治宜以
祐丸輕粉黃柏苗連爲末麻油調搽

紅絲瘡

紅絲瘡乃因喜怒不當血氣逆行而生于手足間有黃膿其中紫黑色即有一條紅絲逆通血上而生若至心腹則使人昏迷不救或有生出三條紅絲者治宜急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血以薑藥貼或麝香草根敷之立愈

手足腫毒

治宜芙蓉葉草烏絲三天南星五味大黃七柏絲五

酒麴三箇及頭酒糟酒勗醋調敷上

雞子癰

手足不能屈伸不能挾物者是也治宜乾姜肉桂各二

五加皮海桐皮各一

川烏頭炮八牡丹皮川芎赤芍各五

右爲細末每用酒一盞將古錢一枚八清油浸研貼入此錢同煎如

婦人病

此症用艾火在陰戶火處離一分灸一丸即好

牛勒瘋

是疽手旁紅腫痛不能屈伸有似牛勒樣

治宜用四五枚布針裹鹽老皮藥針之即安若潰而膿出仍服

子宜散之類外瘧洗化毒生肌

腋隻 是症受寒瘀所發脾下核腫如雞子大

治宜防半當歸入參小芪土烏藥大茯子沉木香川芎桔梗枳壳粉草乳香沒藥白芷羌活白芍蘇葉姜煎服如有潮加連

薑無潮加官桂或用腦疽內子金托裏散洗妙

狐

久脚膜耳內多湿

治宜蜜化僧打硝砂研五祐白丸紅辰砂純銀

青白附子硝一粒爲細末用皂刺煎液汁調末搽兩腋下夜薛時先用皂刺煎水洗淨然後拔盡至一七又將大甘草一兩煎濃汁服之外用甘遂末細研油調搽腋下一日夜拔出身內臭物再將枯九一兩蛤粉研粹腦和爲末搽之少許去病根一方黑鉛二錢溶化八水銀二錢搗勻白凡土研銅青紅共爲末先將黃荆子洗患處後擦七次又一方用佗僧一兩射脊半分枯九一錢輕粉一分繩圭五分共爲末用口涎塗擦三日一次

火方每次用嫩黃荆表七個擦上後以小便洗七後用嫩松枝擦
爛投腋下每日換以小便頻洗至一七日又用田螺蛳一個米
泔洗去泥水方入射八厘朋砂一分人言三厘子內用碗盛之
至晚放在左上連露三四晚用螺蛳水手蘸擦四五日即効
肩疽 痒而出水負擔者多生用石灰二兩火炒赤價子浪頭擦
一兩遂入水粉二錢攪勻以雞毛刷上數次即愈

一 頸背繫



膝瘻



鶴膝瘻

鶴膝瘻症乃足三陰屬損風邪乘之以致內熱炒食肌瘦肢冷
痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然

初起宜用葱髮法以治冷之寒熱者五積交加散加烏藥姜桂
如已潰者洗活寄生散膿滿肺肉不生者用慈瘻八物湯
膝瘻單方 用左繩絲三十餘斤銅內煮成膏以酒調開入

初博治筋腰腫腫或兩足痿弱痛軟或沉重末痺不能步
動併用後病此症者先服換藥散二貼治以大防風湯少加

換蘇散

吳茱萸

蘇葉歸尾草

陳皮各

錢姜葱白飴

大防風湯

當歸

川芎

白芍

淮地黃

人參

黃芪

白水

羌活

防風

牛膝

杜仲

桂圓肉

耳合藤

用梔子節

暗枳節

用梔子節

枳根

海桐皮

川

青藤

厚桂

黃芩

石南藤

杜仲

牛膝

南星

陳皮

半夏

枳壳

細辛

石南藤

藜蘆

木瓜

白芍

換藥

防風

換藥

乳香

換藥

生姜

換藥

生薑

換藥

附子

換藥

土草節

換藥

葛根

換藥

草烏切碎

換藥

陳皮

換藥

茶泡過

換藥

過膝癆

換藥

天過膝癆瘡石脚先病愈而左脚復疾或左脚先病愈而右脚復

病是也治宜以

大参

黄芩

半夏

苦参

朱荟

當归

桑寄生

茵陳

陳皮

防风

白芷

知母

羌活

蒼朮

独活

升麻

白芷

甘草

生姜

酒煎服

如虛兒傳治肺頭腫痛用朱苓

薏苡仁各

兩

右南藤

獨活

杜仲各二兩

木瓜一兩

附子末

甘草

七錢爲末

每空心酒調下三錢

婦人月經不調發熱口渴兩膝腫痛者用

朱苓

白芷

川芎

白芍

白芷

當歸

施圓翼治癰發脚痛不能動者用當歸

白芷

川芎

白芍

白芷

當歸

原柏

枸杞

杜仲

故芷

木瓜

半夏

防風

防已

羌活

独活

薯蕷

乳香

沒藥

桂草

薏苡仁

土烏藥

土茯苓

姜生

虎胫骨

洛陽

獨活

南木香

生熟同

性酒

即藥服

每早用雞子不

外用午陽

止

生姜

乳香 檀香

葛根

二棱各一錢

漏元子

藁本 紫苑

并腫處

桂圓

是症兩脚痛如擂鼓然亦宜以地龍

防風

羌活

當歸

牛久

川烏

阜鳥

白芍

防風

當歸

牛久

川烏

阜鳥

白芍

羌活

虎胫骨

紫金

赤芍

灵脂

乳香

没藥

白芷

山甲

虎胫骨

紫金

皮

柏子仁

當歸補

共爲細末酒煎糊爲丸益心末

酒煎糊爲丸

心末

虎胫骨

紫金

入面瘡

是瘡以人面眼口鼻全多生膝上亦有晝患者乃冤業所致也須
用心悔過作善禳保內服痰核散十六味疏丸散外用貝母爲末
敷之或裹生肌定痛末藥乃聚眉閉口仍用生肌藥饼

續錄

腎藏風瘡

是瘡初起兩足時熱脚根作痛多于內腔或腰上痒極抓破成瘡
如癬癩痒滴膿水久則能漸延開失治延及兩股遍身者有之
如內虛肺熱發汗口渴咽乾吐痰臥夜腹脚倦怠治宜以腎囊類

督氣丸爲主佐以四生散

四生散 獨活 黃芪 白附子 生角礬 共爲末薦荷頭
又有遍身生瘡膿水淋漓兩腿尤甚不瘥徐庠經年不愈乃督脈
火也宜用瘡類八味丸主之

四生散 獨活 黃芪 白附子 白角礬 共爲末薄荷
又有遍身生癰膿水淋源兩腿尤甚不瘥作痒輕年不愈乃督
也宜用癰類八味丸主之

外膜瘡初起用獨脚烏丸或銀葉二七、生地、槐柴根、紫草根等。

茶葉並指頭者每曰一撮搣茶洗石分或用標荷龍骨乳

卷之三

卷之三

卷之三

血山五分一鉢鮮緋

內
河
輕
紗
五

卷之三

卷之三

卷之三

卷之二

水經 卷之三

卷之三

卷之二

腰包錄

先將各

白蠍溶化去渣將七味

鳳鉗內發

數次

撓起碩六

以碗內候

冷將輕粉在內調和

卷之八

卷之三

萬葉集

但羽山子一集

卷一百一

應貴敷治臙瘡神方

用黃蠟細末開化入黃丹輕粉攏勿

作隔宿膏貼絹片緊

扎三日一換每先以鹽茶洗之如貼膏

白將愈則以黃丹輕粉爲極細末一撮即乾水結盐神妙

又臙瘡作痛者宜用諸般神膏類金華陽金膏或四應膏神妙

瘡作痛者宜用五油隔

筋膏

頭癩久不收口或爛瘡吳瑞法當貼隔紙白玉膏內服蠟丸丸之

類且翹足端坐勿多行復庶可全

裙襦瘡

裙襦瘡生于脚胫或因打撲而成其瘡口狹皮肉極薄皮薄如竹膜極疼痛終日黃水流延蔓而生根者數十年不愈又易染人患者須忌房室則易忽初起用塘內久浸過茶葉貼數次不効可用黃蠟二錢麻油一兩半火熬後入飛過黃丹二兩細火熬成膏隨瘡口大小塗膏如銅錢厚貼之或用四應膏亦妙

婦人裙福瘡用紅花桔子枯九五倍共爲末

向前瘡治宜黃連互參牡蛎入研爲末井水調敷或用松香黃

蠟溶化爲膏貼以霜巾繫扎擦茶洗一日一換七日全愈

脚肚上瘡初如粟粒大抓搔不已成片黃水流岀痒不可忍先

用青衆煎湯淋洗後用百藥煎爲水津唾調敷自外而入

脚癰腫痛作痒孤被汗流或村搘成瘻治宜猪屎火取枳榔各五

片腦分花椒龍骨分毫不有膿水加輕粉紙溫則塗乾則麻油糊

脚跟瘡

脚跟瘡源過督脈發源腎經過肺內因欲食起居虧損足三陰所

致或被犬兔所咬而成也

是症慢腫少食者宜養血類補中益氣湯咳嗽者宜寒痰

類八物湯加桔梗或人味丸外治視病而施者久不痏口酒燭

繫蠅瘡初起者宜用石蠅蠅打蠅捲或用小田蠅燒灰一兩水

黃一兩硫黃末五錢

葵花調煎藥作臍貼

膏貼或以萬應膏久貼後撒生肌散內

服痰核內十六味流

氣飲加咸煎服

蛇歸骨腫痛不可忍者

外用生姜葱白醋搗爛敷患處內以當歸

川芎上烏藥本瓜楂

即海桐皮藜茲獨活中桂枝尤威靈仙黃

柏生姜蒜葉煎服

螺癩因跌破成毒紅痛

眼爛用細茶嚼爛併荊芥麻川芎爛罨如

此二次內白將麻茶

白芷霜煎水洗或麻油茶百草油謂爲本桐

踝上尤一孔約深半寸

至下牛白瘡痛異者此溫物性成瘻也用

人中白或人中黃矣

出水滴入瘻口

脚癩

脚癩之症生足掌或指

瓣間色赤腫痛膜稠者為足三陰濕熱下

注易治微肿脹消者

極足三明虧損難治若黑暗不腫痛不潰

虛煩熱作渴小便淋

澀者陰敗未傳惡澁不治

治以瀉熱下注者先

用隔茅炙法及膈疽類方命飲以解鎮虛

一次用養疽類補中益

氣湯加小茴芷以補精氣如三昧虛者

初起用方括內托裏

消毒散或托裏散加牛夕換柳杜仲滑後

用鵝脣風內大防風

湯或疽癰類八物加芪桂附陽虛心熱者用

當歸川芎白芍大黃

知母黃柏之類

脚背發

是症又名脫疽方原因

少房室損傷脾腎或先溺後是或先

經者色赤作痛自潰

加先用隔蒜灸內服膈疽類活命飲或

敗毒散加銀花白芷

黃芩止用托裏散扶氣者用麥核內

上大味流氣飲下虛

尤用八味丸或八物湯加芪桂

重者色黯不痛先用

隔蒜灸更服補藥固內則惡肉不致上長

庶可保矣矣

有外塗生肌涼藥內服祛竹兼犯房室則患處不潰不痛色
上延亦多致腹重者不用利刀解去其筋則筋骨出而毒得泄
安甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名
異物一沸八花椒一勺看瘡大小蒙花在內同煎浸一此後半
以此藥貼瘡上即安

山椒甲

天麻甲之症多因亂衆研損爪甲鑿入四邊腫欣黃水流由浸染
相染五指溫爛漸匕引上脚疾清潔圓起如湯潑火燒日夜倍
增不能行動治宜以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手
剪去肉中瓜甲外用蛇退一條燒灰并黃阿錢爲末乾參乾者
香諷敷與川直條參治

甲生肉刺是症手足甲忽狀長剝生肉刺如錐痛不可忍治宜
用穿渠多吹自愈

脚打成泡 治宜以升水調生麴糊貼過夜即干不可穿破或用
水浸過新松樹嫩皮貼

脚指疔瘡濕 治宜以枯凡三錢黃丹五分爲末摻之或鵝掌
黃戊燒灰珍之口一入病梅瘡後脚指疔生瘡濕爛臭繖子用
象皮袋盛稀丸胆丸步过注黃丹爲木髓數次而愈

經拴痔成瘻血出不止 治宜以多年糞柿霜燒灰敷之
指上及指縫中沙瘡爛者 治宜先以鹽茶洗匕後用燕窠泥加
炒和黃柏爲末香油調敷痛者加乳香

脚上松皮糊方 治宜用黃柏黃芩黃丹船一大黃細防風一滑
石頭樟脑布几松香水粉磁黃柏四兩冰木油珠油誠鐵溶
脚瘡似松皮爛單痛不痒流水不乾用山上經過久霜露牛糞燒
灰麻油調貼

脚癰化痛

治宜以乳香没藥輕粉

硝二錢茶五片蜜拌水銀

共爲末用蠅狂同清油少許溶化調搽如瘡口大紅痛先宜用

一臭桐枝水洗後搗前藥

兩脚生瘡甚者

治宜用姨辛油一斤以川黃連配同炒酒空心

服外貼五油膏或先以楊豐電金良花嫩楓葉苦參煎水洗後

用黃連一錢黃柏半錢黃丹大黃礬硝各半錢共爲末搗

脚上癰瘍癧毒

治宜以防半

當歸

白芷

黃芪

獨活

一芥水

牛夕

防已

川烏

草烏

威靈仙

石南藤

五加皮

何首烏

一齒木香

研大甘草

姜桂酒

脚瘡有孔出水

治宜用只母一條

白朮

發雄黃紅共爲末

每以苦茶先洗

遠年爛腳

合宜用老松樹皮炭燜牛皮燒鳳凰窠燒黃竹箬灰

硫黃蛇

脚烏柏根蛇床子雄黃各爲末木油調塗或

濕敷

馬膏白玉膏

又方用桃葉麵包七次應用白果藥

鑑和

脚因不破碎成瘡毒

治宜用青龍藥瓦燒乾爲細末桐油調

脚瘡毒

是症人脚走長路被石子脚底墾腫不能行走痛不忍

沿宜用舊草鞋浸尿桶內一夕或半日外用新磚燒紅夥浸草鞋放磚上以腳脚踏定火逼尿氣八裏即消如走長路脚腫痛者用此方亦妙

遠行脚上打損用雜草燒燙綉和飯粘研成膏貼之用帛封上若

打泡用油線穿過兩頭剪斷亦用繖綉飯粘貼之

遠行脚心腫痛用蚯蚓敷腫處高閣起脚一夕即愈

脚癰俗云雞眼睛男婦俱有之但用福州城水浸蜈蚣末調搽

眼上即時自落

脚得汗用白丸子葛根湯頻洗

○遍身部

遍身癰注



治宜宣透行血用爪姜根酒煎入乳香没藥五灵脂皂刺茅分
以下其毒次用清心行血之剂如保蛇毒五足蜈蚣妙雄黃
白芷次之或飴丸九令酒入射齊逆下外用荆芥白芷川椒蓼
白煎湯入鹽俟湯溫自手臂上盪下一日三次其瘡疽毒氣走
腫所至處宜繫繫之自手發者毒走至心自足發者毒走至臂
不救各有小紅筋尋其筋之住處灸三炷即瘻徑云在指則截
在肉則剖恐毒氣入心人瞑令人煩燥喎喎昏悶或瘡出清水
機汗者督經也死人至速此瘻極虛引風癰疽開一寸則一

引風非必風人于其中風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流宣
南星半夏白芷稍最能去風可以頻敷其諸癥理推_{居經血道}皮行之

癰發

凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭無面者
裏開瘡低貼肥肉走注卒生於手足或掌心或腰腿疼痛不能
縮之處初起渾身壯熱手足不遂增寒頭痛廬渴多汗脹逆四肢
沉重較之甚發煩渴爲甚或腫毒已平數月後復於抽處大發但
作肉色微帶淡紅不能收大要發養內氣以防骨鴻如瘡出米
泔升者必死治與瘡疽類推

癰毒

瘡毒之癰多內因飲食熱勞外感寒氣暑氣而成治亦宜靜因
而施瘡毒內治治宜以當歸尾赤芍梢白芷梢一防半吋
石乳膏 青沒藥 川山甲粉蜜連膏西煎服加酒 每服半錢

升麻或以黃柏一錢五倍子壯其爲未酣調敷

酒油

流者行也注者生也或結塊或漫腫皆因素有痰火或外感風寒和氣流行至其淡注之處而發或內陽搏怒以致成小聚或內陽房室陰陽氣凝聚逆於肉理而成或內陽勞役飲食搏動而發或跌撲明挫不時遊血凝而成或庭後惡露水盡後被感傷寒注多生四肢或胸腹腰脅關節之處

初起宜用葱髮法穿者用麻核內十六味流氣飲膿者大頭風內六君子湯加芩歸或蒸疽內補中益氣湯加木香枳壳選用令其自消自消若消久不斂者繩有表邪只此裏參主以赤瓈內八味丸八物湯加芪桂或腦瘻散托裏益氣湯更佐以豆鉢祛風寒邪補接湯 賴成以火針破之內有膿管以赤瓈入應圓製消流法初起者但毒在上以升麻爲主毒在下以羌活牛

川木瓜爲主佐以土赤芍川黃連白芷稍何首烏藤根壳小茴香土烏菜當歸尾川獨活大粉草牛水牛酒煎以拔根泡服
瘧症又名蛇瘧

是瘧病瘧地面多有之先作點而後露肉四畔若牛痘黑硬小者如粟如豆劇者如梅如李發斑處或臂或脛或口齒或肚脇多見手足指間赤黑毒白色變不常根深八肌走腎遊脈毒血流注貫串筋絡爛肉見骨出血甚多令人串痛狂言癲瘍八十心即死突出來於外腎亦死原因風寒惡風人於脉理或烟瘧地面瘡突瘧後及感觸蛇毒所致二十已後四十以前皆積瘧之毒入胃壅聚而成四十以後六十以前乃血閉不導熱橫而得之

如瘧毒生手脚腿肚上俱有者宜荆芥牛夕 蒼耳仁 川芎
一梗川厚朴 桂白芷 尖換柳 官桂 蒼朮 廉楓 蜂 陳葛
南木香 大甘草 酒煎服七八貼而愈

如暑日男婦小兒

類生瘡

治宜用香茹

扁豆

白芷梢

厚朴

黃連

羌活

防風

連翹煎

肥四貼

或外

用木槿花

如癰毒痛腫不用刀針只以新搗生的卵壳燒灰存性

敷

如癰毒膜欲出不出

宜以敷五味根老鴉膏二味放水研口

出服

如癰毒膜不乾

宜用雞糞打爛同蜂蜜調四錢敷

出膿

如癰毒膜

不乾

宜用雞糞打爛同蜂蜜調四錢敷

如癰毒外治總方用芙蓉葉白馬屎白芷山梔細葉松木皮共爲末

如癰

用陳年古谷存性爲極細末有水乾撒無水麻油調

敷

過五六次即愈

一方

用毓魚牙齒

燒灰

蒜油

調搽

火燒過爲末

麻油

調搽

又一方

用節過石灰

赤

與枯凡及糯米飯

搗爛搽上

如多年不愈者用猪

頭上毛

搗

存性

鼠屎一粒

輕粉少許共爲末

酒調敷

卷之三

即痴痴

父名大痴

是近受天地間肅殺風氣酷烈暴憤最易可畏。因風毒或汙山
布衣入水或酒後當風二因濕毒或坐卧湿地或臍內第三因傳
染未必皆由外也。內傷飲食尤毒過其人寒大熱勞力以
致人動血熱更加如其冷溫而發初起以上臍游行自首
紫雲女疾風邪或發於胞元有流膜上先見者深分皮肉上則以
小先見者而後發以下流必多上下俱見者深分皮肉上則以
下指之風從下而上者欲逆風但從上而下以順氣者可治頭
發者欲愈治失其法以致皮死麻木不仁肢死血潰成膿肉死割
切不痛筋死手足絞橫口死鼻梁崩塌與夫肩落眼昏唇翻散空
落則鈎傷眼目或腐爛玉茎拳七肢体病至于此大而確解之
瘻圓裝治大瘻風初生先用烏藥葉搗爛炒熟遍身久熨又用苦
辣根杉木根茶葉

減一半只服後藥

防牛肉

荆芥梗

淨連翹

白蘂莉

金銀花

海桐皮

白鮮皮

何首烏

百瀆藤

夏荊子

威灵仙

皂角刺

石菖蒲

上牛久

宣木瓜

薏苡仁

大楓子

川續斷

上苦參

胡麻仁

當歸尾

白芷梢

川黃連

赤芍酒

川独活

比柴胡

人甘草

湯加天花粉

甘草少下

余均合

不記肱

葵蕎麥

桑葉茶

酒同放多服

切忌鹽

餅名毒物若有瘡口用

荳赤荷葉

同芻末

塗上自愈

如虛兄傳治

屬風症

眉毛脫落易禿

倒場遍身生癩者

不宜

聖化丹

防手

荆芥

羌活

獨活

鴨脚

苦參

祛牙臭

去皮

當歸

驅蛇退

蟬退

荷首烏

去頭

根

各

薑耳草

各五錢右細末

搗爛如泥

同藥和

可將陳米飯

打糊爲丸如梧

棗大每服四匙

至五十九加病人身上骨腫有上痒不止或是風氣攻手足拘牽先服此藥一料蔥青茶送下日進四服或婦人齒脫麻痺手若刺痛腿膝生瘡先服奪命一料後服此聖化丹服藥後十日瓦鋒面上放血次干脾上放血後干腿腳上放血而遇天氣清明五六日放一次量病輕重不可亂放血若婦人多破血癰祖傳用歌別子炒泡草烏炒老公蟲炒川烏泡細草青木香夫黃肉桂硝一宮歸酒研麩黃瓦蟬蛇一條頭青竹蛇一隻共爲細末酒打糊爲丸如桐寇大每服五十九白湯送下

王氏傳用川芎

王地當歸

赤芍白芷

羌活

姜參

蒺藜

蟬退

天麻

黃柏

烏藥

荆芥

防風

雄黃

葫蘆子

炒威天仙

川山甲

石菖蒲

金銀花

五靈脂

蛤粉

錢川烏

四面皂角

川牛膝

草烏

全蝎

大楓子

桑螵蛸

絡一白花

黏酒

川芎

細末

老米打糊

九加鴉

蠅頭粉

蜜

身

吳氏換胚散

治癰癩

年深不愈以致眉髮脫落鼻梁崩損重者

方可服之

烏梢蛇

酒白花蛇地龍各一錢

天麻

細辛各一錢

芷

蔓荆

苦參

甘菊花

荆芥

威靈仙

朱賊

紫參

沙參

川芎

赤芍藥

胡麻

石瓜

木通

天門冬

薯朮

木別

定風草

何首烏

紫苑

石菖蒲

草烏各一錢

而共各製過爲末每以五錢

溫酒調服

梅瘡

楊梅瘡之症由肝腎脾內風濕熱之毒間有天行濕毒傳染但形如楊梅嫩紅溫爛庠庠痛屬心多生乳頭形如散針黃豆者屬脾多生滿面謂之大風豆形如綿花屬肺多生毛髮形如紫葡萄拔之繁癟者屬用腎多叢生腋脅及筋骨之處如發髮鬚額日暮寂寥逆者屬陽明及少陽太陽加發于足脰陰莖腸肋者屬肝腎經緩陰大抵上先見者不分受病上體必多下先見者血分受病下體

必多上下俱見者氣血俱病。

初起即服方拈內防風通聖散一貼去麻黃用硝黃以

去內毒待胃氣稍定再以一貼去硝黃用

麻黃發汗以去外毒已後用薏苡仁

歸尾小草牙皂

牛蒡

木通

荆芥銀花

牛蒡

蘇皮

羌活

獨活

木瓜

防風甘草各二錢

上茯苓一斤分作六大貼酒水全煎服外用

輕粉豆餳油番炮置

銀硃一錢油搗色墨鑊粉伍匁研銀小鍋

內煨至黃色胆丸生

分杏仁二十箇

去皮火煅搗去油其爲末

或麻油或猪油煎搽

癰癧製治梅瘡神効用

紅花防風天花粉金銀花每貼土茯苓

四兩全煎空心服外用

杏仁牛蒡各一錢輕粉爲末豬胆

汁調搽如生在玉莖

上爛而痛者仍先服下藥二貼後服川草

薢薢金銀花錢山慈姑

錢紅花紫草各一錢烏梅四箇共分

四貼每貼用

灯心

全

服外用杏仁去皮

龍牙脚龍骨

沙

粉鰥一水虎駝共爲末濕則撓乾則用猪脚上火筒骨髓調搘
如瘡似靴釘及掩蓋厚者用人言錢爲末以小紅棗去核搗爛
包入言八炭火內煅過爲末儲胆調搽

如虛兄傳水火丹

牙消

青儿

白几

准盐鰥一水銀五錢

硃砂硼砂各半米片

研加泥不見水銀星爲度用砂舖沙

窩一箇燒紅八前藥

溶化起泡望閒待冷用粗大碗一箇將砂

窩裏干碗內以火候作條塞四圍用瓦打破取三角曰圈排佈

周密以炭火四圍堆過砂鍋又用腳盆注水將大碗置盆內水
淺大碗半寸許即發火扇紅俟盆內水熱住火候砂窩冷取起

砂窩起大碗上丹砂收貯每用三分搗碎爲九七粒每日一丸

姜湯送下外仍用此藥濃細茶調搽治梅瘡神妙

如梅瘡爛成窟者用兒茶小兒骨芙蓉葉各五分赤石脂三分

硃砂分輕粉乳香

沒藥各二錢

蜈蚣半錢

共爲細末

但

先宜苦参

荆芥

花椒

煎水洗

如生梅瘡服藥百餘劑还有二三枚不愈者用好膏藥一兩燙傷
入銅青胆瓦兒茶朱砂各一錢爲細末燒勻抹厚皮捲貼之
如病梅瘡服生茯苓大便緊閉者用川椒真公猪大腸內線扎兩
頭收熱去椒服湯腸

如梅瘡絰作筋骨疼

痛用川芎 常歸

熟黃

白芷

木通

牛膝

芍藥

白朮

皂角

厚桂

枳榔

歸土

茯苓

上午服

三碗下午服

三碗服至二十日自愈

但瘡愈時若体厚是者

用防風通聖散加減調理若体薄虛者用

當帰

白茯苓

芍藥

荆芥

蕤皮

乾姜

葛根各八

白芷

肉桂

木通

木瓜

黃芪

白朮

桔梗

厚朴

牛膝

麻黃

皂角仁

歸土五

粉草鉢

姜赤芍

服以

此調理斷根

梅毒

楊梅毒症乃因失治久則風毒深

八經絡或淡人而成頑癬或角

血虛敗而成瘍或誤服輕粉水銀不遵禁戒而成風堆腫爛泡

膿出汁謂之惡病至於此亦有傳傷眼鼻膚爛玉茎

專楊柳結毒用當歸牛膝

一正右心地黃

牙皂角防手一荆芥倍一金銀

一正右沉香桂七味土茯苓五

右切片分作十八貼服三貼又

服加後遠服九貼服二貼間三

日每貼用水四碗煎二碗分作四處服之但先宜花椒葱芥苦

參煎水洗之藥完全愈妙不可口

如庸兄傳五宝散治梅毒如神用珍珠琥珀冰片

四鍾乳粉

一粒朱砂七分先將土茯苓酒力研成極細又炒過飛麪一匙

再炒調前末藥附瘡在下空心服瘡在上飯後服外用五倍皮

硝煎水洗七後搗解敷生肌之藥貼太乙膏

應國製治梅毒風漏筋骨疼痛遠年不愈用冷飯圓紅白蘇丸

防風荆芥

五加皮 咸靈仙

木瓜梢 打白芷

當歸 川

芩 白芍 生地

柏子仁 地骨皮

桑葉 牛皮膚

甘草 莪

連

白茯苓 桂花

砂硝 杜仲

乳母 皂角

服每日一服如初服三五貼其瘡腫凹陷是托出其瘡輕者十

貼重者二十貼仍以藥渣貼

熱水洗切忌房事生於豕搏

物

黃氏傳秘治癩頭胸觸成大孔用青魚一尾五月五日午時破之連服三五次即愈
夫腹尿將者簽草子放滿腹外以水數升同入鍋煮熟去皮食

之連服三五次即愈

鄭臯傳拈痛散 治青年近日生過綿花楊梅等瘡結毒五年大

牛爛見骨者泡去瘀行步艰难用

防風 荆芥 連翹

兒角

麻萸

生地

熟地

牙硝

共易細末用土茯苓二兩半每日服二貼服至七日見效

況氏傳梅毒治方用白砒研水銀子老姜反側老鴉蕊研山藥
研斷三味共研取汁先搗爛
砒同水銀入汁內用瓦罐張指
鐵灯盏蓋口用鐵線繩繫將泥盒裝文武火昇以一炷香盡爲
度后用原藥篩九白砒半分之
七分辰砂三分雄黃四分百
草霜紅薑黃各藥共易末陳登爲丸微成十四箇每服二丸
白湯送下神妙無比

應圓弟傳治老年梅毒風症神方

生地黃

當歸

白芍

威天仙

石南藤

山果

耳枸杞

仙活

羌活

水通各五

荆芥

白芷梢

蕙以仁

芙蓉各七

黃茂

胡麻七

宜木瓜

連翹

大黃以仁

土牛夕各一

升

金銀花

土五加皮

防風各一

麻萸六

升

白芷皮

小芳

共草根

龜條

白芷根

各一

升

牙皂五

升

共爲粗末
每日用藥末五錢及土茯苓

用大確炭服

傷癰外治用生白果肉杏仁食鹽
龍骨全蝎輕粉人言雄黃巴豆爲末擦
如楊柳風毒及誤服輕粉以孩兒
傷骨者宜仙遺根湯 摧爛剔破頻察或乳香沒藥
安筋肉疼痛不能動轉或瘻肌

○仙遺根湯 土茯苓二兩木瓜

防風

木通

薏苡仁、白

痺皮各五分金銀花大分皂子四分共合一大劑煎服七半月
有熱如氣虛者加參芪血虛者加芎歸熟地牛膝肺熱去土茯
苓倍加薏苡仁金銀花

如病楊柳後腫塊成癰宜仙遺根湯

○仙遺根丸 茯苓一斤防風

木通

薏苡仁

防已

白茯

芩、金银花

木槿皮

鮮皮

皂角

白芥子

白芷

身爲走盜丸或浸酒服切忌生冷

雞熟炒菜酒湯

蜜

蜜

蜜

附

蜜

蜜

蜜

蜜

王氏傳一掃光專治梅瘡風癬男婦疥癩神方

白砒一

朱硫黃西錢俱研末用生豬膏拌勻

將扇捲定以

油灯上燃着取油調後

預藥末輕粉一錢水銀一錢班貓乳頭

藜芦一

大根一錢磨末水銀白附一錢

即內搽上即愈

藜芦一

大根一錢磨末水銀白附一錢

即內搽上即愈

天疱

天疱瘡症內多白水按之不

如魚泡乃出風溫熱毒所致少

兒亦多患之

治宜以防風通聖散加減服外以馬錢子白及青木香研末擦或

蚯蚓糞略炒爲末香油調搽或白果搗爛搽神妙

百效全書卷之四終

十九

新刻秘授外科百効全書卷之五

豫章儒医龔君中應圓父著

疔瘡

夫疔瘡者皆由臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血氣凝滯注於毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或痛或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花蓋疔腫初發執突起如疔蓋故謂之疔七瘡者蓄毒氣突出寸許痛痒異常二日間害人甚速內經以曰疔發於右鼻亦疔發於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前青疔發於耳下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已狀或肩或腰或足癰無定處如在手頭面脣節間最急其餘尤可緩也近世多見因食瘧牛疫馬之肉而成此症其形有十三腫皆以形而名之耳一曰麻子疔始未極痒忌麻子油犯之多不救二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火

疔六曰爛疔七曰三十六疔八曰蛇眼疔九曰益膚疔十曰水洗疔十一曰刀癰疔十二浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六疔最爲可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生二後日生三乃至十數尤爲可治若滿三十六則不可治矣又有所謂紅絲疔魚賸疔之類其名甚多其紅絲疔者或生手足間有紅絲一條急宜用針刺斷不狀其絲入心必難治矣魚賸者狀如魚膽也

凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘下令去惡血乃以藥敷之仍服蟾酥丸之類發汗諸疔名目雖多其治法畧同如身冷自汗嘔逆燥喘狂渴妄語直視者皆可治矣

君傳飛龍奪命丹

治疗瘡發腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒

惡瘡服之便有頭不痛服之便痛已成者服之立愈此乃惡瘡中至宝危者服之立安一雄黃一朱砂一鐵輕粉五血竭乳香一錢冰片一錢醋一錢銅綠半錢冰胆几錢寒水石二錢射香五分

后篇伍蠅蛤一條去頭足 蜈牛二十

右爲末先將蝸牛連殼研如泥和爲丸如棗豆大如丸不就入酒打麯爲丸之每服二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐于男左手名手心將藥裹在葱白內用無灰熱酒三四盃送下干避風處以衣蓋裸之約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗爲度如重者無汗再進二丸汗出即効如疔瘡走黃過心者并出冷汗者准治病人不能嚼葱研爛裹之瘻在下食前服瘡在上食後服忌冷水王瓜茄子油膩難消不可食一切外治輕者單蟾酥爲末以白麯和黃丹搜作丸如米大用針挑破錢頭以一粒納入神効重者參金丹危篤者用挺疔鏡子賽金丹明凡硇溶化入金丹研銀釵捲之慢火熬令紫色先以針週迴挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔即潰而不潰入信一錢雄黃硇砂各五分貼之治一十三種瘡如神

○提疔針子 用雄黃朱砂 膏三青藍砒霜白芷者輕粉班旨各

分五蟾酥射香附一革麻

其个右爲末用黃蠟溶化和丸梧

寃大搯作簇子將針刺破疔頭放一箇于疔上又刺凹邊令血

出水粉膏貼之

凡暴死者多是疔毒急用灯焰遍身若有小瘡宜急炙之并服前
飛龍奪命丹亦有服醒者如偏僻之處藥難導達惟炙有回生
之功若專疎利表散者危

多骨疽

六多骨疽症由瘡久潰氣血不能營廬處久則腐爛骨脫出肉外
治首補脾胃壯元氣以痊癥類八物湯加芪桂外以附子餅炙
或葱鬚法祛散寒邪補接榮氣則骨白脫瘻自軟若有氣弱損
其骨漸腫甚再歲月潰爛出骨亦當用葱鬚法若投以免去剽
真氣益虛邪氣益甚鮮不有懼

翻花瘡

翻花瘡症因瘻將發原氣虛弱肝火血燥生風翻一肉突如菌大
小長短不一

治宜內服產癥類八物湯倍參芪歸朮出血乃肝不能藏脾不能
約宜桑皮類補中益氣湯加五味麥門冬有怒火者宜耳類
八味逍遙散若用風藥速其亡也汗多必肽發瘡危哉

外治宜枳芦一味爲末猪油調塗週日一易須候元氣漸復驟毒
將盡塗之則努肉白八不狀雖人復出若悞用針刀火炙其勢
益甚或出血如注寒熱脹生毒瘡急補脾胃爲要若似蛇形長
數寸者用雄黃末敷之

蠍瘡

天蠍瘡之症生手足間相對如新榮莫庠痛折裂搔則黃汁淋漓
有孔如蠍久而生虫

治宜杏仁乳香硝三硫黃輕粉各一錢爲末用麻油三錢入黃蠟五錢溶化八分末煎搗成膏去火毒微加暖用

父方用燕窩取抱子處土爲末乾摻每先用白芷大腹皮湯洗淨
狀後敷藥

走皮風

夫走皮風症面忽爛紅而出水延至胸手俱生紅點如豆疹

治宜先以老鼠茨根刮皮收酒服以消其紅如面上爛處只將
生地黃汁搗毛刷上再內多服防風荆芥連翹蒺藜黃柏玄參
午勞子金銀花歸尾赤芍白芷粉草

走皮瘡瘍

夫走皮瘡瘍之症生滿頸項發如豆癰痒而多汗延蔓兩耳外附

溫蠟治宜先以桑寄生桑根皮各一錢白芷黃連各少許煎

湯以鶴鱗洗候惡血出盡拭乾次用皂莢麻竹薄俱燒灰存性

一 黃柏黃連樟莫白芷各等分爲末麻油調擦忌醋

侵淫瘡

夫侵淫瘡症初生甚小先痒後痛汙出侵淫濕爛肌肉延至遍身
其從口發出流散四肢者輕從門股發生然後入口者重
治宜每先以苦參大腹皮銀粉湯洗次用苦練根膾乾燒存性爲
末者點調敷溫則乾癥

月蝕瘡

夫月蝕瘡症滿月盛衰生耳鼻面間及下部諸竅宜枯凡輕粉摻
白蛇纏

是症有頭尾狀似蛇形或前胸生至後背兒也

初起宜隔蒜熬七寸上炙之仍用雄黃爲末酒調服之再以雄
黃爲末醋調敷或內服三黃丸外用蜈蚣燒灰麻油調搽
蛇皮瘡 治宜以橘香二兩白桐子六箇搗爛搽甚妙

五濟

六、五濟者乾疥癬痒皮枯屑起溫疥腫腫作痛久則水流如黑豆
汁砂疥如砂子細筒或痒或痛孤之有心熱赤虫疥痒不知痛延
便易於傳染膿窠疥苔紫褐色厚微痛皆由五臟結毒而發屬
足三陰者尤多但瘡有遍躰難分經絡必憑外症以斷虛實如膿
膿作痛便秘硬發块者爲風毒濕熱如慢腫痛痒肺熱或時寒熱
體倦少食便順利者爲血虛風熱

沿此五濟更宜分上下肥瘦如上身多兼風熱下身多兼風濕
肥人多風濕瘦人多血塊薄弱虛損腎精火炎緩有便秘發熱
作渴等症只宜滋陰降火密加秦艽耳連翹之類決不可耗
而風藥涼血傷胃而壞臟腑內服通用方括內散血陳風湯或
一連歸湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲混合乎
胃叢外治搽藥通用合掌或擣鬼膏使異散洗藥荆芥煎加薑

參等分煎湯痒加蛇床到椒漿如黃酒

丹子散至來傳治遍身癩疥紅牛膝死者

威灵仙 茄子 何首烏

荆芥

苦參

右各等分爲餳

未每二錢食前酒調服日進三服忌發風物

洗疥藥

蕎朮

皮硝

花椒

苦參

水煎頻洗

燒疥藥

艾葉

堆黃

人言妙

核桃壳爲末捲作筒燒烟煙之

一掃散

治各色疥瘡神効

大楓子肉

枯几

蒺藜

花椒

大倍子

鐵硫黃

雄黃

青凡

水銀

蛤

一人言

研共爲細末

水油調

搽

便易散

風

見裏治乾疥

諸瘻甚神

更不廢本以便

裹真

花椒

大倍子

鐵硫黃

雄黃

香附

伴枳榔

蛇床

白凡

共爲細末

枝桃油

或木油

調

合掌散

加虎傳治乾疥

諸瘻黃柏

坐板葉瘡俱効

樟腦

銀水銀

蛇床

白芷

花椒

大倍子

白凡

大楓子

一子

共爲細末油核桃肉爲丸置手掌磨掠鼻嗅之

麝風膏

治瘡癬風癩諸湿痒疥及婦人陰鈍瘡火丹諸般惡瘡

神效

蛇床子五錢大楓子十四

杏仁仁柏子四

樟腦六二川椒

輕粉

水銀鐵三

雄黃一錢

硫磺五分

共爲末水油三兩研爲丸

彈子大

硃砂石取時每用少許溫

瘡遍掠

五癬

五癬之症乃血分熱燥以致風毒惱於皮膚發則肌肉急疹或圖或問或如苦梅走散風癬即乾癬搔之則有白屑濕癬如虫行搔之則有汙出而癬全狀不知痒癬牛癩加牛頭上皮厚目堅馬癩破痒白點相連治宜通用前方括內防風通聖散去硝黃加浮萍皂刺水煎服久年不愈休惑若兼吞頭癩尤体虛者不可妄用風藥有虫者間服前方括內琥珀丸白癩癬併梅毒宜驗磨丸浮萍茶木荳耳

一若參半

兩

黃芩五錢附生

醉酒糊爲丸白湯送下

立庵湯

蔓京

防半

荆芥

苦參

薯耳

黃荊子

夢子

胡麻仁

甘枸杞

余良石

白芷梢

蕎朮

連

土茯苓

羌活

獨活

三兩同煎早空心服

外治乾癬 用生姜一兩切片內夾鹽及硫梅火帛包定燒灰爲
末再入人言末竹擦甚効古方用狼毒草烏柏二錢班蝥七枚
生爲末津垂調搽

癬 用枯九黃連各五胡粉黃丹水銀鉛二兩爲末猪脂油配夾
研令水銀星散盡磁器收貯搽之或用必効散川木槿皮兩
錢牛不耕即木別五錢各雄黃蛭白砒一錢右俱切成片另將
雄砒研細共合一處以井水一碗河水一碗浸晒三日露三夜
將藥水用鵝翎掃癬上百癩百中

生癬 用牙硝胆丸白狀銅壳紫銀花乳香沒藥銅青爲末生桐

油調擦或用烏梅剝破蘸蜂蜜復入輕粉擦之古方用舊皮鞋底燒灰存性人輕粉少許爲末麻油調敷

馬癩 併疣頭用羊舌頭根將竹杆挖起搗爛加明丸散又搗以好醋調勻將夏布兜擰干用濕敷內必効散亦妙

綿花癩 用繩陀僧末擦用水龍骨燒烟燻更以桐葉煎湯洗之
我掌風癩 有虫吃開用黃丹輕粉各三錢猪臘頭燒油調藥
通用洗藥 用紫蘇樟脑薑耳浮萍煎湯洗之或用胃氣散洗
如左手兩股間溫癩長四五寸每時極痒定極痛乃以利針
二癩時在癩上刺百餘下其血出盡溫湯洗之如此三四次方除
益濕溼于內其血不可不針後服浮萍散出汙

浮萍散 治諸風疥癩癩

浮萍硼當歸 川芎 赤芍 楠木梗 麻黃 甘草等
右剉二劑葱白二根豆豉五六十個至八分熱服此

○兒諸瘡癰 宜用蛇床莉藜剪草無夷仁能牙草陳
分爲末先用甜藤煮葉煎水洗後用黃蠍煎南油調
未更名夢

癥瘕

白痴瘋 治宜內用嚼魚散或金櫻丸外治三黃散

●鬱魚散 露蜂房不將生地炭滿諸孔服火燒存性去鹽後用
胆丸天花粉蟬退各等分但爲細末均分用帛包三分將活
魚一对同酒煮熟無風處細嚼連刺飲酒後弃自上而下
口金櫻丸德堂傳何首烏半胡麻仁一蔓荆子一牛蒡子酒炒白
蒺藜兩錢耳子一蛇床子酒炒兒參子酒研肉從容紅牛夕頭
正脊北冰酒製金櫻子酒炒苦參打右爲末麵糊爲丸如梧桐
子大每至七十九溫酒送下

三黃散

雄黃五硫黃鐵黃丹

天南星鱗二密陀坐

桔凡

● 跛二石瘡末先以姜汁擦患處姜薰乘未擦後瘡黑次日再

據黑散則無恙矣

此亦癰風

治宜用官粉五錢硫黃三錢爲末雞子清調搽服藥

諸瘡

血風瘡症乃三陰經風熱鬱火血燥所致毒痒不常抓破成瘻水淋瀝內斑膿熱益甚惡寒少食體倦所以不敢忌用風藥治宜通用內服犀尾川芎淮生地赤芍浮萍等分或方桔內活血頭風湯甚者紫雲風丸外治用簡易散大馬齒苔或五味肉腫風膏

紫雲風丸

五加皮仁何首烏酒姜蟲配苦參當歸葛根全蠍

正歸牛蒡

羌活獨活細辛

防已

生地黃

白芷

黃連

赤芍

蟬退

防風

荆芥

蒼朮

砂一爲末蜜丸

平水溫酒水飲在下

通身散

煅石膏

酒一

硫黃五錢

共爲細末

猪油調塗

馬齒莧

馬齒莧

黃丹

黃柏

枯丸

兒茶

輕粉

桐油 藥推油香上葱根煎水洗

如因飲酒後遍身癰而風瘡抓至出血又痛者用蟬退薄荷等分
爲末每二錢水酒調服即愈

黃疸藥

治宜內服防風

荆芥

蒺藜

連翹

桔梗

金銀

花黃芩

黃連

苦參

帰尾

甘草

川枯子

外川槐

花煎濃水洗洗後用

梔榔疎黃磨槽油擦或用枯丸神曲川椒

種黃水銀各一錢爲末香油調擦

加遍身四肢俱生黃泡瘡有膿汁而痛者宜用防風 白芷 木
瓜 七厘 阜刺 何首烏 威靈仙 金銀花 當歸身
甘草 連翹 黃芪 輕者八貼重者一二二十貼外用硫黃一
錢

明丸五半生半枯羌活土分零川椒半錢與黃一錢
子一錢大黃研末但存性爲末木油調擦或用簡易散俱妙

諸毒瘡痛不可忍宜用

白芷

當帰

乳香

沒藥

川山甲

金銀花

各等分爲末每服一錢姜湯送下

撲虫血風瘡

痛不可忍或有時痒而難當者用胡麻油白凡二

牙硝

鐵大榧子一粒床子硝硫黃鐵人言此爲末或水調或油調或酒

遍身作痒抓即出水作爛如癬先宜用

薯花根名制雄黃共

爲末

燒艾葉捲筒燒上後內服防半夏利燭尾干葛苦參研

麻仁

何首烏甘草四五財

毒瘡水不乾者用黃丹輕粉化僧寺分撒或用猪胆

膏撒後遍身生瘡內宜用黃連核子大黃猪油四兩安酒一服外

凡人共燥遍身生瘡甚者乃血虛也

宜用當帰附猪油附生酒十

餘斤封固火煨一二時候油化退火氣每日隨量敷之

口難治部

湯火傷

遇湯火所傷先以鹽末和米醋調和瘡上次以醋泥塗之更
醋塗不絕暫救痛苦一面急搘生地黃醋調敷瘡上直候痛止通
厚至數不妨慎勿以冷水冷物冷泥熨之使熱不能出爛人筋骨

又方用陳掌土真豆粉硝麻油升水名牛調敷或用舊杉木屎
桶板燒灰研井木以包頭內蓋患處以水刷上立効或用水銀
二分津制死用鮮豬油二兩取油去渣同木銀連挽勻放木中
退冷入冰斤半分輕粉乳香兒茶硼砂各五分爲末擦

李氏以清烟膏用雞子清磨京墨塗患處上用三層濕帛蓋則不
起泡冷如冰効

錦卿傳湯火神丹用真鉛粉鴨蛋白調擦外用鐵兒肚下中
毛細七剪鋪上即愈

予曾治一人因炒補黃被火傷遍身外用陳杜黃金烏柏嫩反百
草霜爲細末撲麻油抹內用解毒湯頻服七日全愈

治之火咒云。七龍樹王如來授吾行持北方壬癸焚火大法。
應此王如來。告是北方壬癸水敗斬天下火星辰千里火星神必
降急止如祥令呪畢。即握真武訣。呪之即用少許水洗雖火燒
手足成瘡。可療矣。

杖瘡

杖瘡之症宜先破瘀止痛後宜定心補益如杖瘡忽乾毒攻腹內
恍惚煩悶嘔吐者難治。

一杖畢即飲童便和酒不可吃茶免血攻心外即用熱豆腐鋪
在杖頭其氣如茶其腐即紫復再易熱豆腐鋪之以紫肉散盡
紅淡爲度或用蜜陞僧濃研醋加麻油雞毛刷乾則又刷神妙
或用菉豆切微炒雜子清調刷。或水粉一兩赤石脂水銀一
爲末麻油調成膏。拿棉拂貼繫縛如肉暗用此膏填滿尤妙
○又洗打傷皮不破肉損者用蘿蔔揩爛捲之

內用只壳

杏仁

大黃

歸尾

黃芩

桔梗

柴

防木通

草前

甘草

忌葷

三四日

體薄者去大黃若體

薄者瘦者

寒熱心少食宜

喘尾桃仁

赤芍烏藥香附

蘇木肉桂

柴胡

活水酒煎氣鬱加木香

心腹脹痛加童便心下張滿

氣不逆陽

加香立宜

枳榔

如極甚者外貼膏粉分用白凡一兩

秋冬用白凡四兩

公羊油半斤

水一盞同

火取油與蠟成膏俟溫入虎腦麝腦各五財仁砌

砂一兩

水銀鉢輕粉蜜全銀箔各一百同燒匀或搽或貼

內脈孔

香當歸

白木白芷

沒藥羌活

甘草

爲未酒調服隨以熱酒盡量而飲虛者漸後宜

補氣血脾胃

雲林傳退血

止痛散一治

後腫癰瘍

血不散氣血以心或曾寒

壯熱

扁尾赤芍

生地白芷

防風荆芥

羌活

連翹

黃芩黃連

黃柏大黃

枝子薄荷

枳壳

桔梗

苦

換

知母

石羔

車前

甘草

水煎服

刺文庵傳金箔散

治杖打極重痛不可忍昏悶欲死者

白蠟

生研兩

乳香

鉅沒藥

紅金箔

銀箔

右爲末

每一錢

驥

右爲末

每

林侍

即傳敷

杖散

專治杖紫腫陽成坑

日久不愈

神妙

用太桐子葉取茂盛者不拘多少以米醋煮至爛熟陰乾臨時

隨大小剪貼

如虛見傳補氣生血湯

治杖後浩爛久不愈者

人參

白朮

桔梗

茯苓

當歸

芍藥

熟黃

陳皮

香附

貝母

甘草

○往來寒熱加柴胡地骨皮○口乾加玉

味子麥門冬

膿清加黃芪○膿多加川芎○肌肉逢生

內府秘傳二黃膏

專治杖瘡打成坑肉皆朽腐者

神妙

黃柏

枝子

連翹

黃連

大黃

苦參

荆芥

薄荷

牛蒡

比刺

威靈仙

蔓京子

右爲散各等分將搗細

慢入於毛渣黑去渣不用將油熬定後人黃

一兩

白蠍子

溶傾入磁器內後乘熱入細茶在內龍骨燶

血竭

兒茶

輕粉 乳香 没藥

白芷

大黃

雄黃

樟腦

冰銀

水銀

銀朱

射脊

各等分

入內攏勻收貯取用

鬼代丹

乳香

沒藥

自然銅火候 挑木別子夫兒無名指

地骨能紳社名右爲末

蜜丸如彈子大每服一丸溫酒下任

打着不痛

斧杖散

外方用白燒酒細此切爛淡酒浮入碗內服之打着不痛

折傷

大打跌損傷者此血氣在身不能流行因此或成瘀片或血死不
消者或昏悶不醒人事或寒熱往來或日輕夜重變作多端致令
血氣不調作梗故也醫者不審原因妄投藥剤枉死者多矣誠可
惜之當時當下貴得其宜或受傷至半月終死者死血已固不能

通水道既表後再不可復表。仍看仔細輕重吃藥。化藥後受傷處
源湧青腫轉紅色者此血活。若愈如傷重復渠將愈內急法後服
金不痊。散浸酒服盡之後庶得全愈。如病人攻重牙關緊急者
死。者宜擊開牙關將返魂奪命丹隨用正藥方內加羌活防手邪
芥胡黃連丸既已人藥不死。一不納者不治。切忌當風處及地下
坐卧。井忌一切冷水。冷茶冷酒之類。油膩毒食之物。如遇傷寒者
先令人解開病人衣服遍身煖見者形色何如。又要去魚肉骨上
下看有脉調和否。如絕脉不至者死。沉細者生。山根好除藥內尚
有子可治。如腎子在小腹內。夫即將莫医。又用神妙佛手散。如病
久口凶入藥不進。可將太鰯魚者熬取膽子和眼睛研下。藥末入
煎略醒可放。再用鳳仙子匙沉香研水吞下。○從吻食官既斷
更治。用桑白皮取絲縫密。却將雞糞破開去食。取膜七寸。患處塗
膏。塗後服藥可愈。○從物氣管斷即不治。項門流

或發

未

破者可治

食飽受傷

必三日不死者可治

預門既發

脣

火者不治

腦後受傷者不治

若心胸喚驚青色未發者

心癮心發陽可治

心胸緊病紅旣裹心乃心口受傷不治

手

乳受傷可治

婦人兩乳室受傷不治

正懷受傷重自死

者立死不治

小用受傷上重吐聲者不治

氣出不收眼閉不

第

小暖受傷木傷壯者可治

孕婦小腹受傷犯胎不治

子受傷入小腹者立死不治

腎子受傷戊破者腎子未上小腹

可治

如眼未直須糞何害

脉太面緩酒四至不治

口如蟲

口

腥風不治

顙門出髓即死

兩眼有傷可治正心口青腫一

七內即死

兩乳有傷宜當急救兩肺有傷可治夾脊斷者不治

小腸有傷不分陰陽佳醫

項門有傷難治

兩臂有傷怕血水

五臟兩腿有傷湏肤無事

後必有損方具于後

○這塊拿命丹

專治跌撲打傷牙關緊閉心癟痛悶不醒人事

將筋竿開灌入碗即愈

銀絲草

一兩卽山楂核者

上藥

長而毛雞子一個搗不糊者不二味

共研爛如泥熱酒刺起布

滌過調小兒骨末

一服即愈神妙後

服腋義散

○腋義散專治跌撲打傷遍身疼痛不能牽止者

三棱

研赤芍

西香蘇玄胡子數黃柏一株酒入麝

青皮

鈎活鉗防風

大腹皮鉗大黃芒硝蜜黃連三錢

桔梗

荆芥北柴胡

鉗陳皮數紫蘇炒牛蒡子里馬

兩頭

只用右側製法

如每分姜五片葱白五根桑白皮半水

牛蒡

便前空心挑服

十分汗大除此葱白只用一根如要和

用大黃

芒硝有痰用半夏如孕婦受傷除三棱

枳壳尤如血出甚亦除之及葱白加當歸蒲黃用冰煎服偏心受傷者加紅

花二分煎

頤門受傷三棱忽白如出血多就用止血金等丹

如手傷斷用手推正

用火心火桑白皮厚殼停當

如手傷斷用手推正

用火心火桑白皮厚殼停當

皮抑定進接骨回生丹再用小裹脚緊七孔定杉皮乃無毒
不愈但攻下之藥亥加乳香沒藥扁重加麝香二錢赤芍
胡索乳香沒藥或有咳乃肺氣旺加乾葛杏仁勿用半夏知
貝母如重傷心痛加石菖蒲如原處痛今結痞痒加乾葛赤
芍甘草桔梗防丰荆芥連翹每用原湯子煎帶熱服隨癆加
○通經活血止痛散 專治跌撲打傷敗血沖心胸膈痛者補効
三棱 荩朮 赤芍 黃柏 黃連 青皮 紫蘇 野馬
香附 北胡 乳香 初起不下此藥十分重者方下內加
紅花蘇木石菖蒲

○仙傳火龍行氣法 生姜醜食鹽四麻油醜瑞香葉面大黃面
頭酒糟醜京芥面澤蘭面生地面牙硝面共一處研爛以麻
油炒熟帶熱熨上七八次冷了又炒熱頻七熨止自狀安愈
後進千金不壅散及佛手散神効

○千金不奪散

防風

京芥

生地

勾藤

角回

木瓜

苦芍 紫金皮

五加皮

白芷

楨榔

木香

羌活

独活 翩尾

天台烏

威靈仙

杜仲

芍藥

牛夕

乳香 没藥

故芷

五靈脂

石南藤

自狀銅人熱者

加黃連赤芍爲散

各等分每用頭酒一埕用絹袋兜宜浸五

七日取出隨量不拘時常熱服忌紅酒鹽酸油膩等物如孕

婦服除牛膝赤芍加翩身比茲服此藥七日見功不問諸虛

百損遍身疼痛無不全

効此方珍之

七日取出隨量不拘時常熱服忌紅酒鹽酸油膩等物如孕

婦服除牛膝赤芍加翩身比茲服此藥七日見功不問諸虛

百損遍身疼痛無不全

効此方珍之

神妙佛手散

專治筋骨斷折金鎗重傷將死者繼用此藥大

有奇功子孫宜珍宝之

鹿茸 當歸

從容

禹餘根

鬼繩子

熟地

白芍

川芎 乾姜

琥珀

此芝

蕤盆子

桑螵蛸

牡蠣

白朮 紫石英

五味子

酸棗仁

右爲散依製法各

量

分姜三片蜜二枚煎慎勿輕用

同

春再造散一專治手足及筋骨斷折者神妙無比

銅錢

五文
大板木
香錢

自狀銅
醋漬射香

分爲細末

每服

錢

灰酒送下令病人口先嚼丁香一粒乳香一粒方進此藥神
効傷在上食上服傷在下空心服如即日未安次日再服此
方如未斷折骨者慎勿輕用此方專能接骨別無奇妙

同

生續命丹

專治筋骨斷折損傷疼痛不止者神妙

川烏泡

兩
草烏

泡五味脂

木別子

骨碎補

威靈仙

金毛狗

自然銅

紅鸞地龍去土

烏藥

青皮

陳皮

同香附

半
牛乳

香竭紅丸子

玉米

射香半分

牽牛殼禹餘

糧

醃濟石爲末

酒調服一錢神効後服再生活血止痛散

同

再生活血止痛散

治症如前

大黃鐵柴胡鐵當歸桃仁

仁紅花伍天花粉

錢川山甲

甘草鐵牛水半酒煎空心帶熱

○茲榮雙解散—專治打傷之後，榮衛虛弱，外受風寒，內傷瘀滯。

設藥、當歸、白芷、石連肉、玄胡子、川烏、白附、白附

醋味
味未水空地川芎
各一兩右爲細末每錢空心吃老酒

萬金不換乳香麝香散
專治遠年近日諸般傷損遍身疼痛

神功者勃乳香沒藥連血竭五南木香欽沉香當歸川

芎
白芷略
甘草
五天粉
木瓜
肉桂
七独活
羌活

路去西香 苗香 鑄五草烏丸皮勝右爲細末每服四錢
酒 沖下

再生再造散 專治男婦號打損傷遍身疼痛昏悶將危者

川芎、當歸、羌活、獨活、木瓜、角回、穿山甲

小商五肉桂甘草入川烏頭川烏頭骨五自然銅五桂枝加芍藥

鉢燶金銀器加沉香木香傷頭加肉桂前胡天麻肉從容夜半
半

臣等恐加雄朋舌誣恍失主加入參謀金莊銀莊遠處
石各表製法子切戒增抄用之頃之重申

石翁與洪子所未嘗擅用半酒半童便無服神妙

傷骨碎接骨奇方

用石膏白芷絲

草烏生蠍各生爲末

酒調服仁一覺身麻揣正斷骨端坐隨用糯米粥調牡蛎末塗
傷處或用活生雞打爛貼外用杉木皮夾定繩縛母令移動即
服乳香沒藥白芍川芎當歸川椒粉五白肽銅火煅過研共爲
末用黃蠅二兩溶開入前末于內攪勻作丸如彈子大以好酒
煎開熱服隨痛處側卧少時數進幾次大效如鼠破傷風腫宜
用南星防風爲末溫酒調人姜汁一匙服仍用酒餅敷貼患處

金瘡

人騎馬跌仆被所佩鎖匙傷破陰囊二九脫落得筋膜懸繁未
斷痛苦無任諸醫措手或以線縫其囊外加敷貼生肌痛不三五
日線爛而復脫矣予思常泊刀傷出血但敷壁錢而効敏蓋此亦
傷破之類也是以令人慢匕托上多取壁錢敷貼其傷破之處日
漸安其囊如故

應貞製金鎗神方

用女

帶血勒馬片燒灰搗

或松香白凡等

分爲末搗

或牛夏

白蠅

四錢爲末搗

或生好石灰篩

過將韭菜汁

依成清餅貼子陳壁土俟乾爲末搗

或礦石灰

大黃切碎同炒七次以桃紅色爲度研末搗

金鎗丹周梅江傳住痛止血生血

嫩老鼠

赤毛者
小狗

多炒韭菜

板與老鼠

一般多石槽

掘爛人嫩石灰

未干內摻乾作餅爲度

陰乾用時以刀刮

藥末敷傷處

在包裹

立愈

金鎗迎刀散

專治金鎗傷重出血不止者

神効

白芍

一兩甘草

水龍骨

右爲末

銅內文武火炒

赤旋入大黃

未

三兩鳳凰退

可以焦爲度

後用嫩

蓬葉韭菜葉

取自肚汁調

前藥陰乾後入杉漆

一兩血竭

一兩片脣

三分牛胆南星

一兩

野羊五錢遇傷處

搽上一字立愈

全書卷之五終

刻秘授外科百効全書卷之六

豫章儒醫龔居中應圓父著

破傷風

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而不能爲害也若夫破傷風症乃因爭擊破皮肉柱匕視爲尋常不察風邪乘虛而客襲之漸而變爲惡候及諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾火灸其湯人之毒氣亦與破傷風邪無異其爲症也皆能傳播經絡燒燎毒氣是以寒熱間作甚則口噤口和身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫

法當同傷寒虛治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表者汗之在裏者下之在半表半裏之間者宜和解之又不可過其法也

口如聖散

川烏

草烏各三錢

苦木

細辛

川芎

白芷

首効全書卷之六

傷寒風類

十一

防風各一錢共爲末每服五七分酒調服忌油膾葷腥類
如願猶峻加兩頭尖紅娘子各一錢口中風身體麻木或走瘡
酒調下○風旋頭暉酒調下○頭風茶調下○偏頭風口噙水
擣鼻○傷風熱亦調下出汗○風牙虫痛頻擦患處流涎○金
瘡血不止乾摻之○惡瘡久不愈口噙水洗綿拭乾摻之○大
咬蛇傷蠍螫口噙鹽水洗之仍摻上○癰疽痔瘻魚睛紅絲發
皆膿疽等瘡發時新汲水調金帛封再用酒膏服○湯火傷皮
新汲水調雞翎刷上○杖瘡破血乾敷之○瘻癥口噙水洗擦
之○乾濕疥癬香油調擦

定風散

治破傷風及金刃傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛

生肌

天南星爲防風備此之不形防風之計

右爲細未破傷風以桑枝擦口後以溫酒調一錢服○如牙腫
緊急角弓反張用藥二錢童便調下○打傷欲死粗心頤脉

以重便漁下一錢并進二服口癩狗咬破先噙將水洗淨用

我就貼藥更不再發無礙大有功效

口一字散 治破防風搗楊角弓反張 蜈蚣去蟄身全蝎炒

頭右爲細末如發時用一字擦牙縫內或吹鼻孔

口羌活防風湯 治破傷風初傳在表

當歸 川芎 白芍 防風 羌活 稗本

甘草炙

鰥石

剝一劑水煎服

口若大便閉加大黃

口水

調膏

治初破傷風熱紅腫風邪欲將傳播經絡而未入深

者用杏仁

去皮細研

飛白麵各等分

口和匀用新汲水調如膏付瘡處腫消熱退

汪班

宜用密陀僧

一兩硫黃

一錢礞硝

二錢川椒

七个共爲細

末將絹巾兜住俟洗澡後即篩于上二七兒粒或用雄黃研真

金蜈蚣垂白附子密陀僧各五分射香二分右爲末蘸生姜于

一患處搽之五日除根決効

去而臂刺字宜用川山甲一片以糯米蒸如泥照依有掌處搽

帖包一夜次早不見

取瘡神方

用雪白礦灰全煎銀爐內常在坐孔窩處久熱七天

益調借彼銀氣以去黑也二味各等分隨意研用

水調成劑候

成砂窟樣上一个下一个如盒子樣中入雪白糯米敷十粒上
下益定莫令走氣腰間再用原石灰及爐灰剩者封固放地下
過一宿取起鑿開取出裡面糯米脆用臨用時用布針搘破出
血將製過糯米如糊樣點在瘡上即時紅腫過一晚即去矣過
三五日即合肉色

又方 用橘子心火燒成珠以針搘破瘡入內即去或用巴豆

油點瘡上光妙

夏暑心神盪燥熱過濾瀆成瘡遍身或出膿血赤爛如火

宜南星

半夏

黃連

黃柏

一五告子

黃丹

洛玉

未乾

掺如痒枯丸雄黃常服

黃連阿膠凡以清其心

熱

汗浸漬成瘡痒癰不止

治宜黃芪

當歸

防風

京芥穗

地骨皮

木通各二兩

共爲末每藥一兩水三碗煎五六

分濾去渣稍熱淋洗患處拭乾避風少時立効輕者只用蠟塞

水和蛤粉敷之

疥瘻瘖

因汗出見濕而生輕者狀如散粟青蒿煎湯洗之或更

葉亦好重者熱汗浸漬匝七成瘡葉豆滑石鱗五爲末絲蘸

之摩破成瘡加黃柏蜜葉各五錢片膚少許

冬月下虛身觸寒熱血澀生瘡硬滯不知痛痒

治宜內服升麻

和氣飲去大黃外用木香

換郎 研黃 吳萸 姜黃

香爲末麻油調搽

凍瘻 是症先痒後痛狀後腫破出血黃水六止治宜用

雄黃雞膽一枚搗爛黃蠅各等分清油減半同于慢火上熬成膏去渣塗之外不愈者亦効 又方附子爲末麵調塗之或自及不拘多少爲末調敷

寒楚手足折裂作痛 治宜清油五錢慢火熬沸入茴蠅一塊再煎溶入鉛粉五倍子末各少許紫褐色爲度先以熱水泡手足火上烘乾後用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落或桐油膏塗之亦妙

又方 每遇寒凍之時將石榴子內取汁塗其耳面手足自狀潤澤如女子所取石榴子汁調粉擦面更加艷色

手足皺 治宜先以百沸湯泡洗皮軟拭乾狀後用樟油二兩黃蠅一兩其粉勻敷之或用五倍子爲末牛骨髓調磁罐收貯埋地中七日取出煩較中即愈或桐油調蜜化僧塗之力效

疣瘡 是痘如兔鱉癰于日瘡一樣多生手足又名海氣瘡

治宜以艾丸炙初起的則餘者皆落神妙

聚瘡

是症因見生瘻中毒而痒而腫連眼微亦痒處搔之隨起

瘡症重者遍身如豆如杏膿麻作痛

治宜生蠅取黃隨瘻大小搗敷之或臘茶爲末麻油調擦或柳葉煎湯洗之或磨鐵槽中泥塗之

竹木刺入肉不出

治宜霜梅陳燥肉佈乾井分搗爛罨或牛夕

根嚼爛塗之或頭垢或蜻蜓

虫搗爛敷如出後內爛以象牙為
未應之

針刺折在肉內瓜蒂搗爛敷一日換三次自出或用土內新南星

一個野芋三個雄磁石一錢同搗爛罨傷處自出神妙

針灸致傷經絡出膿不止

治宜猪骨燒灰存性象牙珍珠血竭

各等分爲末將蠅作一條將一頭蘿蔔末入窟內剪斷外截

灸火瘻水出不止

治宜炒熟速一兩石乳五錢爲末撒

火瘻瀉血

用薺貼過好膏藥燒灰敷

李先保

南京金文斗秘授黑髮烏髮益腎延年強健久服奇方

黑豆五升揀去偏破用一大砂窩將烏骨老鷄一隻母的煮湯
二大碗無灰老酒二大碗何首烏兩新者用竹刀切碎陳者用
木搗打碎陳米糲早連草糲桑椹兩生地黃糲歸身糲故芷糲
俱爲咬咀拌豆以酒湯爲水砂窩大依一料砂窩小作二料用
文火煮豆以乾爲度去藥存豆取出掠去潮氣以磁罐盛之空
心用淡鹽湯食豆一小合以其曾用雞湯煮過早晚宜慎于蓋
藏以防蜈蚣也食完再製但自此後永不可食薑苔服至半載髮
鬚從內黑出自目明如少且又能廢戰極妙

廳員製烏鬚神方 用麻油烟燭核桃浦兩射香分爲末大小竹
筒盛埋冬青樹下七日化成水將水擦髮上即黑

景前家兄傳烏鬚方 用五倍子打碎去灰用銅鍋炒成豆豉選
黑髮將青皮一六片濃茶打濕先放地土將倍子包裹入

餅要看火色莫炒過了秤過一錢紅銅末上好醋炒七次以爲度
細末三分沒石子二分明丸一分食盐二分上下分俱炒極細末用極濃好細茶調煎如倘面樣方好毋用板此
以皮帶包過一夕後用核桃油染之

春方名遍官看鴉片二錢蝶酥一錢丁香一錢陳砂五錢射牛分
右爲末以律調三厘塗玉莖如晚行事必娶未時調塗至曉
臨行事時切要溫水洗去久戰不泄妙不可言

長思丹

公士狗

辨正脉天龍

地龍

人龍

辨正脉朝腦安金頭蝶蠍

其爲末將蝶酥和丸如

粟豆大每用一丸施于玉莖上自狀堅大

令美女長思

黑髮香頭油

用何首烏

墨斗草

白芷

桑根

側柏葉

紅豆

細辛

甘松

三

奈排草

生地黃

桑根

側柏葉

核桃肉

香油久浸

極妙或芭蕉葉同膠

東蒼油擦

蠶髮脫落不生 用黑附子 茄京子 柏子仁 鹿角粉
麝和搗研乾置瓦合內封固一月取出塗在脫處如因癩落者
先用生姜擦三次后用牛皮末麻油調搽

急救諸方

救縊死 自旦至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人
將繩寬解不可割斷極須搜定其心却撫正唉喫放倒同
令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成
手及搘伸其手足摩捋之少活即以粥飲與之此法救人無不
又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛射香雞
黃芩分吹入鼻中痰出即醒

溺死 先以刀挖開口放筋一根唧住便可出水然後解去其
八脈以艾灸脐中令而人以草管吹其耳即活或以生人到缺
隙人即食并走吐水即活外用綿裹皂末納喉過中水出

活內以鳴血灌之

吸凍死 其症四肢強直口噤豎有微動者且慢向火急用布
盛熱灰放在心頭冷即換熱待眼開即用溫酒或米飲灌之及
月溝水凍死亦宜

裹挾暑死 宜用溫湯常摩洗其心腹間如路途急切用路上
土置腹臍間令人便尿于臍中即活不可用冷水冷之即死疔
暑極腹痛卒沒死者即移陰處地上掘水孔將人屎撒在內撓
起泥水塗臍

救墮死 墮下瘀血衝心欲絕者用豆蔻濃烈湯服若復竚無能
不能言取藥不及急拔開口以熱小便灌之
接命方 或打死或吊死或喫風不醒人事或傷寒重結枳用葛
靈仙一味研水瀝去渣服半盞即吐出痰就活

人遇事急智盡術窮或爲人所隔如白服毒或悞中其毒其脉洪大者生微細者死又曰洪大而遲者生微細而數者死

天凡山信毒若干飲食中得者易治酒中得者難治若在胸腹作楚可吐急用胆丸研水灌之即吐若在腹中可下後用黃丹一帖草青黛林硝菜豆粉爲末以小鹽將水調下腹痛皆

黃丹豆粉井花水調下

解信石毒 治宜錫灰爲末冷水調服一二碗或羊血陰乾水調服三五錢此方亦医水粉山礮或猪母尿灌或胆丸爲末涼水調七厘一服若吐出原藥水信石即愈不吐再服七厘但好從忌鹽酒及熟物此方治山礮水粉

解山礮毒 治宜燕口青娥葉葉一大握以手搗爛將甘草爲末和爲丸茶豆煎湯吞下仍用下截根研冷水吃即吐如不退又用木槿根皮研冷水吃即泄又方臭猪柴根南桐葉每林說此

解水粉毒

治宜肥皂去子搗爛蒸豆粉爲丸如梧子大浸水下

六七箇

吐即愈

或甘草菜豆粉各生明几升爲末每水送下

分

又方

用黃連

研細末再用

臘月黑牛胆仁將口瘡

在碗內將黃連末拌勻後八胆內綿綃

一日遇痘急取胆內藥一錢井水調下兼救懸梁赴水氣未絕者

口透風處陰乾不可見

解川烏附子毒

心煩躁悶甚則頭暈七脉遍身皆黑勢危必死煎

茶豆或黑豆

冷飲或防半甘草煎湯冷服一切藥毒板孔化熱

緊巴豆毒

令人大瀉或吐煩渴發急用黃連黃柏煎湯冷服

更以冷水浸手足掌忌食熟湯熟性藥物或黃連

大豆躉蒲等解諸草毒

治誤食毒草并百物毒救人以必死板藍根四兩煮

衆青蓬生甘草各一兩爲末蒸餅九梧子大另用青蓬

煮精神恍惚心即是誤中諸毒急取十五九嚼爛新汲水

如牛夏毒以生姜解之

解豆腐毒 過食令人生瘡癰氣過精神白濁用生蘿蔔煎湯服或
于煎湯亦可

解諸菌毒 据新地取真黃土以冷水於內搗之令濁澄少頃取
飲之可解亦治楓木菌食之令人死不_此又用生芫花爲末
每一錢新汲水下以利爲度菌之毒者蓋因此虫毒氣蒸所致
解諸蕈毒 用南桐葉砌水吃甘草研水吃靈芝蕈研水吃生
搗汁一碗吃或綠瓜葉汁服或菜葉搗水服

解鼠糞毒 用大黑豆煮汁服之如欲拭其驗先刈用莽草葉以
汁澆其根從敗爛不復生發矣

解狗鳥糞毒 即孔雀毛并胆也用干葛爲末水調服 食鴨肉中
每以糯米泔溫服即消

二六畜肉毒 用犀角麩漿汁一碗服之 如食牛馬肉生瘡癰

柏根一兩黃豆

合葱頭一兩生酒三碗煎服汗出即愈

食自死六畜毒

柏末一二錢服不解再服

解河豚魚毒

一時困怠殺人急用清油吐出或服槐花末龍腦

末皆可至宝丹尤妙諸魚毒棗榔解之如服河豚子作粥用密

內糞水灌之或芦根水尤妙

解鱈鱉蟹蠅蟆毒

用生豆豉一合新汲水半碗浸汁頻服即愈此

三物令小便閉脣下肢痛有致死者

解珀樹毒

其症吐逆不止急用菉豆或烏豆或糯米煎湯服一

方用澤蘭葉搗汁服或乾者爲末白湯下

解中金蠶蠶毒

絳竟中毒宜先吮白朮味甘而不滯次嚼黑豆

不惺者是也用石櫛根皮煎濃汁飲之即吐出活虫無不愈者

解石蟹中毒

紫蘇濃煮汁飲三盃

解中諸物毒

白朮細茶等分爲末每三錢新汲水調服得吐即

勿不吐再服或萬病解勇丹丸下之

誤吞諸物

誤吞銅欽碗瓦

萬病解毒丸九十九大黃大戟連翹寒水石粉各一白五

脊白芷黃芩茯苓石膏滑石天花粉各三錢

甘草薄荷子葛根白芷豆蔻各一錢

白芍葛根爲丸彈子大每服

一丸薄荷磨下治一切中毒能化銅鐵碗瓦同嚼化爲粉碎

此其驗也抑論中毒之症辨其一被害何物之中皆其遠近久

則不救治法上宜吐之以鴟鴞探吐急以桐油灌吐之下以解

毒丸散藥利之中毒手足面青遇時者不救緊急只以玄明粉

煎耳草利之亦可

誤吞鐵針

用蚕豆煮熟同韭菜汁吞下針與菜從大便而出也

用熟艾煮汁濃飲便解

若銅錢

不能化者用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用芒硝

研爛服之其銅自化或用堅炭爲末米飲調服于大便中渴如烏欬狀或桑柴炭火細研米飲調下二錢

誤吞金銀等物 餡塘加一片漸口食盡遂出或用石灰一杏核

硫黃一皂角子大同研末酒調服

誤吞禾芒刺喉喉治宜魏口涎灌之

誤吞蜈蚣一用生猪血令病人吃湏臾生清油灌口中惡心其噏

蛇衆在血中吐出繼以雄黃末水調服一人醉酒用地蜈蚣末

喚用生雄雞血調冷水灌入立時吐出

誤吞水蛭入服經久必生小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目

黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死

魚三四箇將豬脂溶挽勻用巴豆十枚研爛入泥內爲丸藥

大用田中冷水吞下十九小兒三五丸湏臾大小水腫一時皆

下邦以四物湯加黃芪煎服主血補脾

誤吞田螺
覩喫不下死在頸更用鴟乙隻以水灌入口冲牙齦
將鴟倒懸令吐出涎水與患人服之其螺即化

骨哽

神仙爲骨丹行過庵傳其骨自隨藥帶下或出如神

朱砂一錢丁香一錢血竭一錢磁石五錢龍骨五錢各共爲末

朱砂爲衣每服一丸香油煎好醋吞下如要吐用矮荷煎好醋

吃後用濃茶任服如無矮荷桐油代之

又方用

入指甲燒

存性吹入喉中立効。一方用硼砂一塊噙之骨自下一方用

金鳳花子研爛噙下無子用根亦可

沿雞魚等骨挿入喉中仙方

用斬蛇剝腳鋤嶽頭

頭指頭削些

下來

臨時搗爛爲丸如黃豆大每丸七粒水送服
下一丸不不再服一丸以下爲度甚重者不過十九

諸骨哽神符

但已下字禁俱不用句

純 魂 魂 魂 魂

魂 魂 魂

魂 魂 魂

魂

魂 魂 魂

此碗化爲東洋火湯咽喉化爲萬丈龍端洞
天子君急也如律令勅吸東方生炁三口吹入碗中每行
一法面朝東用淨水大半碗放桌上左手执拳在胸前右手拉
一法于碗上書前符字燒假如通骨鍼就書上驅字除
一切書可書下八符餘皆倣此

蟲獸傷

凡春夏初交大多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者
是癩狗若被所傷不可視爲泛常乃九死一生之患急用針刺去
血以小便洗刮令淨以核桃殼牛蒡以人糞填滿掩其瘻孔着火
于殼上炙之殼焦糞乾則易之炙至百壯次日又灸白壯炙至三
五百壯爲佳炙後用生南星防風等分爲末再以口噙茶水洗
傷處用綢拭乾捲之更不作膿其內須服後藥以徹其毒可也

只就咬處牙跡上灸之一日灸三壯灸至三百二十日乃止

百病源散 治癩狗咬

班貓七箇去頭翅足爲末溫酒調服于小便通內見衣珠化盡
形爲効如無再湊七次無狗形亦不再發後用益元散一兩
前服解之忌飲酒食猪肉雞魚油膶百日終身忌食大肉凡
此患依前針洗艾炙更服此藥無不愈者

扶危散

周易陽治癩狗咬

盤蔡

七日內用百斤白芷切頭翅足令細末十雄黃各射齊

水研取滑石共爲末能飲酒者時酒調服不飲酒者水
飲下或從大小便出或吐出毒即愈以傷處去三寸灸之三壯
永不再發

建貞樂癩狗咬傷神妙

用糯米一勺瓊貓七箇炒出

去班猶只用毒爲末以香油几點同調冷水吃以利出毒爲難
不利再服若毒入腹中作痛以黃連煎湯雄黃爲末調服
如虛兄傳常大傷方 每宜水洗去血用刀刮着瓶上錫按口止

或菖汗滴咬處或馬全子磨乳刷神妙

治狗咬神法

用磁墨濃磨筆蘸書

吾勑令一星火虎從此遇

九字念三遍寫三遍于咬處即愈

治蛇咬

宜急用麻繩或頭髮繫七續在上面莫令毒氣旁上則

勉強飽食隨用雞蛋破些白放咬處引出毒氣其蛋白墮黑若
再不愈又換心至蛋白不黑方止又用土烏藥葉生搗酒溫擦
醉服又用嫩葵葉搗爛酒炊吃以醉爲度其濟以貼患處若數
一二口毒傳經絡用蕲艾鋪咬處灸之俟其痛止再無後患

同生酒

周備江傳

治毒蛇所傷致死

扛板歸

不拘多少其草四五月生至九月根葉皆落其子實黑味甘而藥性

燭用典生酒調服隨量飲之用清貼患處立愈治蛇咬

涌上方

治蛇咬

美仍火

絲瓜根洗淨搗研生酒吃一醉立愈又方用半邊蓮研酒服

一進門

論

云本師在前祖師在後三元將軍不離

左右五昌將軍不離前後又化爲西天羅漢健春頭領足頭

一進門

論

云本師在前祖師在後三元將軍不離

二下頭開一十八重地獄一禁蛇頭二禁蛇嘴遂將金鎖缺搭

一鎖南生金鎖七鎖蛇頭銅鎖七蛇腰带下腰云即立西

東

井水一盆架上倒放于口深鉤蛇咬口邊併指了遂念起眼咒

西天羅漢獅子在眼前一閑獅子在前二閑獅子在後三閑獅子在西傍着生你氣不行我氣先行傳授法度師爺莫誤弟子

誤了弟子由尙可誤了後代無人傳透書無訣有力削去毒水
口論金劍銀劍蛇毒盡不見金削銀削蛇毒逐永滅

鴻臚

痛不可忍宜用

曰凡牛裏各等分爲末醋調塗之

毒蛇咬前後治蝎螯端午已製忌婦人雞大

鴉頭

治蝎螯

牛裏各等分

射香少許

雄黃

蟾酥

胆珀

牛裏各等分

射香少許

右爲末用猫兒草搗汁和爲瓦用口

咂痛處令淨用九藥搗

周東泉傳治蝎螯

肥杏仁七粒白

蚯口嚼爲泥半驗

上敲三下念

咒云蝎七

蟹七不向梁上走却來這裏

敲七次

節呪畢吹氣

一口吹于杖頭復吸其氣吹于挑杖手心如

此三次即已遇有蝎螯以手摩之即不痛

可用一年

次年除夜又加

一次即

已遇有蝎螯以手摩之即不痛

可用一年

次年除夜又加

一次即

已遇有蝎螯以手摩之即不痛

可用一年

次年除夜又加

治虎咬

先以清油一

碗次用油

洗痛處或

白丸爲末

細傷處痛

止立効或用砂糖水

調塗併服一二碗或

三角絳紅肉消忍各

藤嫩

搗葉搗掌葉嫩松毛

匕狗脊臭桐葉

棘刺葉嫩水煙後洗

治馬咬及踏傷人用艾炙合井腫處或用人屎或馬屎燒灰爲

末皆可敷之

治鼠咬

貓毛燒灰人射

沙子津液調敷

或猶糞項咬

血

或猶糞項咬

治蜈蚣咬

用雞屎塗之

一方用蜘蛛吸去其毒待蜘蛛醉

死忌用以蜘蛛枝冷水中免傷其命或野雞葉久擦或野芋葉

擦或野雞蘇葉擦或雄黃酒吞內服外敷

或猶蜘蛛咬

治蜘蛛咬

用醋磨炷鐵汁或桑白皮汁塗之亦治蠍蛇咬或

油燃灯吹滅以余烟搣之或山豆根和醋塗之

或猶虎咬

毒人必死用桑柴燒灰以水煎三四沸瀝瀆汁調白

丸末塗傷處兼蛇咬口

治黃蜂螫

用熱油洗之潤油抹之亦可或用頭垢聚或用鹽擦

或醋磨雄黃塗之

治八脚虫傷

其虫隱于壁間以呆射人遍身生瘡加湯火燒燙

或醋磨雄黃塗之

治雞骨燒灰

爲末雜子清調城敷

或醋磨雄黃塗之

治溪毒

兼避射工夏月出行取知母爲末自噙口欲人水先勸

或醋磨雄黃塗之

許教上流亦取服之 一方用筭耳子鷄汁服之

治蛇蠍毒 用雞屎塗之 又方急煎鹽湯洗浸肺處即消或蛇脫四箇煎水洗再用斧利鉗過爲末口涎調敷

人咬傷 用皂核或鹽單燒灰爲末用香油調塗

夏月諸般損傷蛇蠍極盛臭惡難當 外用塞水石末敷納蛇脫青藥
洛五分蛇退一兩燒存性 草陰細辛一兩共爲末每黃酒送下三錢皆
水化而出蠍亦不近其效如神

藏身仙法 水一碟將自己生年月用劍筆招寫入水碗內口念言不
言月不言此是玉皇真口訣後書三字號蓋水碗上 霽 霽 霽
寫七遍用金脚決蓋上此水碗置家靜處 八病門時口暗念吾
一身不是非九身吾是北方鎮天真武披髮伏劍脚踏龜蛇黑雲騎七

茲吾身神不見吾身鬼不見吾形若見吾形宝刀才斬不許停急如祖師律令勑念完將祖師馘放下或將與阿那一塊藏身中或用雄黃塞鼻中亦可