

外證醫案彙編

外證醫案彙編卷三

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯

會稽孫思恭順齋甫校刊

外部

○流痰

宜興張高年營血不足寒痰滯絡右臂漫腫無頭皮色不變此屬流痰。和營化痰法。

歸身

羌活

橘紅

瓜蒌

土貝

白芥子

薑夏

獨活

鈎藤

桑枝

覆方 流痰根盤漸收痰亦稍減肋痛依然乃高年血竭不能營

卷之三  
十一  
養經絡所致再擬和血消痰順氣之法

歸身 半夏 川斛

枸杞

旋覆花

鈎藤 桔紅 新絳

青葱

天花粉

平望翁 氣阻流痰。由肝肺兩絡受傷。以致胸肋刺痛。不時氣逆。

治宜理肺和肝。佐以化痰。冀其鬆機。以免潰毒之慮。

春柴胡

青皮

旋覆花

枳殼

桑葉

半夏曲

烏藥

廣木香

蘇梗

通草

鮮佛手

無錫時 勤勞不節。兼受六淫之氣。血脈凝滯。成為流痰。脈芤滯。  
背脅癰瘡。皆屬逆欹。勿輕視之。

附子

兔絲

石斛

廣皮

紅花

丹參

杜仲

木瓜

覆方 痘情前述。今不贅語。今脈形皆見虛象。轉旋維艱矣。再擬

生脈散意以圖吉人天相。

北沙參

川石斛

橘白

稽豆皮

穀芽

五味子

麥冬

甯波韓 陰虛內熱而患虛損流痰。脊椎六七節骨形突出已現。  
瘡勞之象收功難許。

人參

白芍

北沙參

黃耆

鱉甲

料豆

川石斛

浮小麥

流痰

濮院朱

手腕流痰。

黨參

丹參

川貝

川斛

棗仁

茯神

橘紅

黃蓍

浮淮陳小麥

楊州王

腰痛已久。按之有塊。防成虛損流痰。

虎骨

杜仲

當歸

黨參

兔絲子

續斷

製首烏

懷牛膝

枸杞子

胡桃肉

青浦龐

病後營虛。客邪乘入。肩背漫腫。作痛。此屬流痰。一經潰

破。非計月可愈也。

雲茯苓

金釵石斛

洋參

黑料豆

木瓜

鱉甲

橘紅

沉香

大豆黃卷

松江任 勞傷筋骨。痠痛不已。延久必損。流瘻頑證。

鹿角霜 木瓜 繢斷 廣橘紅 杜仲

原紅花 茯苓

滸關范 寒熱傷營。脈來弦滑。誠恐流瘻復起。有根之病。一時難效。

茅术 廣皮 草薢 茯神木 秦艽

葛根 苦參 絲瓜絡

乍浦王 重感時邪。致發貼骨流瘻。但年小症重。恐難勝任。法當

溫通氣血為主。

枸杞子 廣木香 廣皮 蘇梗 丹參

半夏麩 鈎藤

金華周 流痰腫堅且硬。日漸長大。皮色不變。起有兩月有餘。此係本原不足。風火挾痰互結而成。治之最難消散。

鱉甲

夏枯草

昆布

茅茹

青蒿

萊菔子

海浮石

象貝

七保梅 三陰虛弱氣機有阻。以致左腿漫腫。形如覆碗。成為虛損流痰。延綿半載。肌肉消瘦。筋骨突出。已入瘡癆之候。姑擬毓陰。聊作保持之計。

北沙參

鱉甲

黃耆

黨參

女貞子

牡蠣

火橘葉

沙蒺藜

陽春孫 内股流痰

柴胡 青支 土貝 粉甘草 半夏麵

廣皮 連翹 忍冬藤

黃浦宣 流痰

鹿角霜 廣皮 土貝 連翹 青皮

當歸鬚 生牡蠣

湘潭王 先斷脊梁後發流痰。勢必潰腐。乃素係本原虧怯。痰凝氣滯而成。診得脈來細數。胃氣呆鈍。漸入瘡癆之例矣。難治之證。莫斯為甚。

黨參 茯神 焦神曲 鱉甲 川貝母

白术

料豆

川石斛

扁豆

大豆黃卷

吳江唐

流痰由肝鬱所致。木腫堅硬。遲延失治。且多反覆。一經

潰破。非計月所可愈也。

黃耆

廣皮

川石斛

杜仲

黨參

川貝

甘草

川續斷

蝦牡蠣

柳橋陳

勞傷氣血。致患流痰。正虛邪實。以消為難。

黨參

黃耆

杜鵑芽

川石斛

棗仁

茯神

宣木瓜

青蘿香

覆方

脈數身微熱。胃氣困憊。急須扶正。冀其潰後。胃氣甦復。再無變證。方有回生之路。

黃耆

黨參

料豆

五味子

炙鱉甲

棗仁

白芍

川石斛

蘭溪朱寒熱胸悶飲食漸減。左肩漫腫作痛。防生流痰。

半夏曲

枳殼

木瓜

石斛

鈎藤

沉香

茯神

絲瓜絡

川貝

震澤范流痰已成破之難愈。

建曲

蘇子

沉香

枳實

砂仁

柴胡

橘皮

烏藥

川石斛

宛平郝氣血有虧。濕痰滯絡。左腿漫腫作痛。皮色不變。此為流痰。宜補元滲濕。佐以消痰。

黨參 炙黃耆 陳皮

半夏 木瓜

丹參 青木香 土貝

川石斛

覆方 痛緩腫減。頗有消兆。

黃耆 黨參 赤苓 冬术 陳皮

土貝 青木香 川石斛

青浦顧 流痰發於腰下。此屬氣阻。法宜通導。

老蘇梗 查炭 陳皮 鈎藤 沉香

瓜蔓皮 橘葉 青皮 大麥芽

杭州金 先已脊斷。繼發流痰。內蒙郁郁。聽其自破。係先後天不足所發。刻論證參脈。見象極虛。縱乞靈藥石。誠恐無補。

北沙參 川石斛 廣皮

鱉甲 川貝母

淮山藥 白芍 木香

扁豆

東山席 環跳漫腫。隱痛遷延已久。此三陰虛。濁痰凝滯。釀成虛損流痰。不可使潰。潰則難痊。

洋參 石斛 地骨皮

秦艽 川貝母

料豆 藜仁 菓殼

金澤凌 虛損流痰。破經旬日。膿流脈數。鬱熱蒸蒸。盜汗淋淋。胃陽困頓。亢陽無制。又值酷暑之令。久病之軀。支持不易。且擬和胃涵陰。以博轉機。

人參 川石斛 黃耆皮 橘白 菓芽

料豆

五味子

小麥

大豆黃卷

覆方 胃氣稍甦。盜汗略減。身熱得涼。甚屬佳兆。惟脈來仍數。膿色原清。肢節痠軟。伸縮不如。未免津液消耗。當仍陰陽並顧。再候轉機為妙。

人參

黃耆

製首烏

鱉甲

銀柴胡

棗仁

甘草

川石斛

稽豆皮

上虞郭 痘瘍潰久。脂水淋漓。津液日耗。診得左脈。闢弦而細。兩尺無神。甚屬虛象。姑擬補元。徐圖收效。

製首烏

川貝

北沙參

珍珠粉

料豆

女貞子

茯神

丹參

黃柏坂子 骨蒸鼻熱而患流瘻已屬虛損之候一經潰破便難  
調治。

北沙參

川斛

鱉甲

青蒿梗

銀柴胡

橘白

川貝

稽豆皮

朱家角范

流瘻潰破在通宜補托兼施。

熟地

黨參

川續斷

白芍

歸身

棗仁

黃耆

左牡蠣

興化沈

背部漫腫色白頭發不一症屬流瘻脈來細軟盜汗不止正虛邪實急須補托潰後如無變遷徐圖收功。

鹿角尖

棗仁

川斛

黨參

枸杞

五味子 橘白 大麥芽 炙黃耆

青浦方 流痰。繞臂漫腫。潰頭不一。形脈皆虛。緩好調治。還須靜養。收效之期。以待來年。

黃耆 木仁 赤苓 裸芽 車前子

橘白 白朮 川斛

湖州凌 三陰虛熱。腹痛。背脊漸高。恐發流痰。以平托治之。令其消散。

生白芍 蕃芽 查核 料豆 生鱉甲

川石斛 麥芽 蔴梗 青蒿梗

青浦柳 素喜膏粱厚味。熱聚於中。濕困於脾。痺阻經絡。始起左

肩臂痛。繼則下引腿足。疲楚且難屈伸。昨因刺鍼後。痛勢稍緩。頃診脈象。右手細軟。左手弦細。兼數。似屬氣血兩虧。痛久必成流痰。擬養血和絡。佐以清熱之法。

枳椇仁

茯神

木瓜

青木香

桑椹子

丹參

廣皮

煨葛根

陳墓嵇。稚年弱質。左膝腫痛。步履艱難。有流痰之慮。宗大筋軟短小筋弛長之法。為治。

北沙參

秦艽

丹參

菟絲子

廣皮

懷牛膝

鈎藤

杜仲

左牡蠣

茯神木

太倉朱。流痰發於背脊。及環跳兩處。勢在作膿。法擬補托。

黨參

棗仁

川斛

牡蠣

淮小麥

黃耆

白芍

鱉甲

料豆

青浦舒 短足流痰。

宣木瓜

鈎藤

川石斛

白蔻殼 蘇子

藿梗

橘白

覆方 媽木香 丹參 木瓜

半夏曲

穀芽 杜仲

川續斷

長安馬 流痰。脈弦濶。營陰虧損。議以和營化痰。

菟絲子

桑椹子

鈎藤

川石斛

生白芍

附洗藥方

全當歸

五茄皮

川芎

紅花

木瓜

艾絳

草薢

獨活

桑枝

青木香

蘇州孟 寒熱久延膝。眼腫痛。膝為筋之府。能屈而能伸。係血虛不能榮養筋絡。經脈空虛。寒濕著於肉裏。防發流痰。先擬疎解。嗣商和益營衛。

羚羊角

川石斛

新會皮

青蒿梗

茯神木

忍冬藤

大豆黃卷

青浦曹 期門穴。漫腫作痛。脈象滑。乃肝膽蘊熱。濁痰凝滯而成。難以消散。

天竺黃

川貝

鉤藤

絲瓜絡

陳皮

枳椇子

茯神

覆方 蘇子 天竺黃 茯苓

真橘葉

川貝

新會皮 川石斛 緣瓜絡 黨參

虎邱頑 三陰虧損虛熱不已。脊梁漸曲如弓。環跳形腫如椀。皮色不變。已成流痰虛證。但期無潰為吉。潰則元氣愈虛。便難收效矣。

製首烏 蟲甲 鈎藤 桑椹子 川石斛  
茯神 川貝 料豆皮

覆方 流痰高腫。緣正虛邪實。勢必潰破。破後損怯堪虞。議毓陰補托法。

金石斛

黃耆

洋參

扁豆

川貝

五味子 桂神 桂仁 牡蠣

沈 年歲壯盛。脫有氣疲。噦噫震動。氣降乃平。流痰未愈。墨丸腫硬。今入夜將寐。少腹氣衝至心。竟夕但寤不寐。頭眩目花。耳內風雷。四肢麻痺。肌腠如刺如蟲行。此屬操持怒勞。內傷乎肝。致少陽上乘為癥。厥陰下結為疝。衝脈不靜。脈中氣逆混淆。氣燥熱化。風陽交動。營波日耗。變亂種種。總是肝風之害。非攻消溫補能治。惟以靜養。勿加怒勞。半年可望有成。

阿膠 細生地 天冬 茯神 陳小麥

南棗肉

萬 診脈數。左略大。右腰牽絆。足痠。五更盜汗。即醒。有夢情慾。則

遺。自病半年。脊椎六七節。骨形突出。自述書齋坐臥受濕。若六淫致病。新邪自解。驗色脈推病。是先天稟賦原怯。未經充旺。肝血腎精受戕。致奇經八脈中。乏運用之力。乃筋骨間痛。內應精血之損傷也。

人參一錢。鹿茸二錢。炒杞子三錢。當歸一錢。舶茴香炒黑一錢。

紫衣胡桃肉兩枚。生雄羊肉腎兩枚。

流痰者。方書皆云流注。流者流行。注者住也。人之氣血與天地合同。周流不息。循環無端。內經云。天宿失度。日月薄蝕。地經失紀。水道流溢。經路不通。丘穀不殖。民不往來。菴聚居邑。則別離處氣血。猶然氣滯血壅。則生癰腫。以癰疽概而言也。氣血注而。

為癰發無定處隨在可生八九四五二三塊不等無穴可以立名故曰流注先哲已有深意焉吾中皆曰流痰更有精義人之津液灌溉肌肉經絡筋骨之間如天地之水無微不到遇隙即入遇壅即歸一有壅滯阻而不行經脈濁而不通衛氣歸之不得復反肌肉脈絡骨節骨空等處一有空隙之處津液乘虛滲入如水之遇隙而入遇壅而歸也如海道迴薄之處蓄則凝結為痰氣漸阻血漸淤流痰成矣痰阻於皮裏膜外氣多肉少之處無血肉化膿有形可憑即成痰塊痰胞痰核痰癰等症痰凝於肌肉筋骨骨空之處無形可徵有血肉可以成膿即為流痰附骨陰痰等症況流痰一症脾虛濕痰凝滯最多或病後餘

毒稽留肌肉之內或慾後寒氣襲於經絡之中或因氣阻或因  
血凝若正氣盛陽氣宣通隨阻隨散正氣虛經脈澀滯隨注隨  
壅屢發屢止或潰或愈雖云外證俱從內生為內科者不得不  
究心焉立方無一定章程何也天有寒暑地有燥濕人有虛實  
病有新久部位有上下之分經絡有藏府之別年有長幼強弱  
症有陰陽淺深今數百方中採擇安善臨正之方四十九首用  
藥總總不同寒者溫之熱者清之虛者補之堅者軟之結者散  
之損者益之氣滯理之血瘀行之痰凝消之臨時施治隨證變  
通如作文之平淡奇濶諸法悉備潛心契默滿紙玲瓏開圓活  
靈動之法門化拘滯偏執之津梁也實之高明勿以平淡而忽

續金匱要

背部

○發背

東山王 心火妄動。疽發於背。所慮瘡不起發。形勢平塌。法當外疏通使。毒氣分洩。庶不內陷。

黨參

茯苓

甘草

赤芍

地丁草

黃耆

杜仲

銀花

角鍼

連翹

同里朱 年逾六旬。背疽大逾徑尺。殊屬駭人耳目。幸脈數有力。  
腐亦易脫。確為順候。調補得宜。指日可愈。

黃耆

茯苓

遠志炭

黨參

甘草

川斛

首烏

川貝母

穀芽

銀花

金澤衛 背部平塌堅硬不化是屬陰候法擬助陽補托以冀回  
陽續絕

黨參 柏杞 遠志炭 石決明

黃耆 陳皮 甘草節 阜角針

常熟秦 發背如盆氣分大虧所以膿不甚多脈來細軟高年得  
此決非輕候

黨參 冬木 黃耆 官桂 阜角針

熱地 荀苓 甘草 箍尖 淡芩容

萬敷尤 累年忽發背疽但腫不紅此血氣衰弱之徵非速愈之  
症也姑擬補托以進之再察端倪

當參

茯苓

當歸

銀花

青蒿梗

黃耆

玉竹

甘草

角針

六一散

上海疔 脘疽經旬尚未化腐成膿不甚焮腫應傳陰分治宜開洩回陽以冀腫高毒化為轉機

羌活

廣皮

厚模

遠志炭

防風

青皮

藿香

扁豆葉

接服方

熟地

沉香

廣皮

白蔻殼

蒼薑

艾絨

紅花

藿梗

橫溼嚴 勞力之體風餐露宿歷中六淫之氣發疽於背平塌不起寒熱胸悶此乃邪毒內閉法擬祛邪化毒可望旦夕取效

青蒿梗

遠志肉

黃耆

廣皮

白蔻殼

六一散

紅花

甘草

銀花

阜角鍼

天花粉

木瀆翁 肝氣內鬱不舒。鬱火內熾。致發背疽。肉色紫暗。不榮堅硬。漫腫。不痛無膿。破流血水。形如割絲。兼發餘癰。不一。此乃肝陽受傷。其矣。治之棘手。殊費調停。

澄香

青皮

遠志肉

石決明

廣皮

甘草

銀花

青蘿梗

半夏麪

朱藥方

硃砂

珠子

牛黃

川貝

菜豆粉

丹陽潘

胸悶不舒。脾不健運。乃生背疽。根脚散漫。外皮雖腐。內

堅不瀆膜。血腥穢不營納少。口燥此屬脾土因敗。脾主肌肉。生化之源。姑擬培養脾胃以食進。腫滿為泰兆。

人参 灵芝 金石斛 茯苓

黃耆 甘草 川貝母 廣皮 筍尖

青浦易 年逾七旬。元氣已弱。背疽隱陷不起。殊為可慮。

製附片 黨參 茯神 角鍼 黃耆

鹿角霜 柏子仁 廣皮 半夏節 遠志炭

平望呂 背疽伏隱。神怯脈軟。溺痛淋瀝。乃陰虧陽微。溫邪與敗精俱陷也。法擬滋腎丸意治之。未許必竟中機。

肉桂 熟地 琥珀 淡旋容 甘草梢

黃柏

黨參

茯神

升麻炭 草薢

○蜂窩發狀如蜂房

附註

八坼鄭 痘發於背上至肩脊下連腰脇腫若瓜形頭如蜂房者十餘處按脈洪大尚於證合可為順兆擬托理消毒主之

細生地

甘草

銀花

角鍼

赤芍

生黃耆

連翹

丹皮

土貝

筍尖

崑山鴻 背疽形如覆盆始以忽視遂致燎原莫遏脈來細軟無力膿腐難脫界限未分蜂窩未透胃氣頗鈍此藏陰衝府陽易困矣勉擬助陽化毒納食胃甦為轉機

黨參

廣皮

紅花

枸杞

鹿角尖

黃者

川貝

半夏

筍尖

遠志炭

覆方 界限未半。蜂窩已現。膿腐略脫。按脈雖細有力。似有翳光。但胃氣未甦。疽色深滯。乃毒邪深固。驟難載之使出。所謂力在波中。收帆未定也。仍議溫托。以望納穀有加。方是佳音。

鹿角尖

生黃耆

炙黃耆

蘇子

茯神

潞黨參

棗仁

半夏

廣皮

砂仁

鮮殼子

露代水煎藥

再覆方 腫收毒化。腐脫新生。飲食較前增納。是為順候矣。

人參

黃耆

茯神

銀花

半夏

甘草

蘇子

枳椇

砂仁

花粉

蓮子發

即太陰症。肺經積熱為多。生肩脾內以其形而言也。  
脉註

嘉善何  
搭手痘瘻。沖突高腫。上至肩項。下連腰脇。腐脫成片。膜流作孔。形如蓮子。瘻雖半背。尚屬順候。擬清化中寓以補法。

黨參

甘草

穀芽

陳皮

花粉

黃耆

銀花

土貝

赤芍

白朮

○對心發  
生於背。徑對前心者是也。  
脉註

青浦楮  
對心發背。其勢極重。所幸藜藿素居。可卜慶生有兆。

黨參

紅花

白蔻殼

陳皮

遠志

羌活

青皮

石決明

角鍼

藿梗

搭手

即偏發背。脉註

周莊戚 年逾六旬。自搭手疽。不能高發。頭雖腐而膿未成洩。神識昏瀆。有內陷之兆。姑擬清理托毒。以參消息。

羌活 新會皮 藜梗 筍尖 石決明

甘草 遠志炭 青皮 蔴殼

復方 瘡形得起。神識得清。是乃佳兆。惟皮色不變。版滯不潤。膿毒未見蒸化。邪毒留戀於內。必須溫補化毒。方有鬆機。

黃耆 首烏 砂仁 遠志 鹿角片

甘草 杞子 桂枝 白芍 新會皮

再復方 新肌已露。腐亦盡脫。元氣已虧。宜慎調理。

黨參 黃耆 归身 五味子

茯神

白芍

砂仁

製首烏

○腎俞發

即腰痙又名連腎發 脾註

方基東

腎俞發由腎精虧損而成。其紅活高腫，猶為順候。

養榮湯主之。

黃耆

茯苓

白芍

白朮

陳皮

北五味

遠志炭

○下背疽

即對脾發 脾註

青浦唐

下背疽平塌不起。法宜溫化以望轉機。

沉香

陳皮

黃耆

泡薑

蔻殼

枸杞

紅花

甘草

遠志炭

丹毒發 此症多服丹藥膏藥方所敷。時計

周莊錢 背疽半腐半斂根脚紅暈防發丹毒切勿輕視

黃耆 桑仁 陳皮 川石斛 砂仁

茯苓 甘草 荷梗 淮山藥

南翔張 搭手腐未盡脫毒尚未清誤投溫補以致寒熱昏憤幸  
起丹毒不致內陷擬清解營分。

忍冬花 赤芩 白芍 花粉 連翹

粉丹皮 犀角 小梔 紫花地丁 生地黃

肩井發 即上搭手處註

楓涇池 肩井及外股兩處發疽頭雖腐而毒未洩是以紅痛不

減。又見紅癩。腹痛後重。胃減。脈軟。此皆暑濕之邪。內干脾胃。外留經絡所致。擬清暑和中。并兼托毒。

黃耆

赤苓

米仁

藿香

遠志炭

陳皮

甘草

六一散

背中屬督脈。兩傍屬足太陽脈。督脈從尾骨後上行脊中。直上額頂。足太陽脈從目內眞上額交頸。至耳上角。後行下項。循肩膊內分二道。一道從肩胛下斜脊傍開三寸。一道從腰下貫臂入腋中。一道從肩胛下斜脊傍開三寸。下過髀樞。循髀外合膕中。至足小指外側而終。五藏六府之俞。皆在脊之兩傍。足太陽之部位。發背生於正者易治。生於偏者難治。正者督脈為十二經之

統脈自下而上主一身之陽屬陽證者多氣血上衝易起易發  
偏者屬足太陽脈為六經之首領北方寒水之位自上而下氣  
血下流屬陰證者多易陷易壞又兼藏府之俞皆在其間背疽  
者皆由內而外發五藏根本皆繫於背唐太宗有免鞭背之刑  
背上受傷關係藏府肺俞在第三椎生於上者則傷肺心俞在  
第五椎肝俞在第七椎膽俞在第八椎生於中者則傷心於肝  
脾俞在第九椎腎俞在十二椎生於下者則傷脾於腎汪省之  
曰背疽令患者兩手上下左右摸之搭著者以搭手治摸不著  
者正真發背余以兩手摸之滿背皆搭著豈滿背俱是搭手而  
無發背耶發背者背疽之總名也搭手對心對臍腎俞蓮子峰

窩椒眼者背疽之別名也。臨證之時先驗其偏正上下左右部位即知屬於何藏。再思其發於何因。或陰虛火盛。或醕酒厚味。或怒鬱房勞。或丹石熱毒。或風寒滯絡。再辨其證之陰陽虛實。紅活黯滯。高突陷塌。再診脈之虛實。人之肥瘠。胃氣強弱。神識清爽。煩悶昏憮。天時寒暑。內外並參。細心玩索。隨證立方。循理用藥。臨時施治。辨症明了。如能絲絲入扣。巧自生矣。今輯二十七方。管窺之論。存待高明之士。更從而正之。鄙人之願者矣。

余曉

鴻註

余習業費蘭泉師處。談及孟河巨富巢姓。年近耳順。素喜醕酒。厚味。身胖肉厚。正值酷暑。而發背疽。長尺餘。闊七八寸。延費士

源前，吾師之祖也。服藥治內延沙達周先生治外治之而月  
曬潰腐脫瘍治漸平，新肌如蓮子色嫩紅如珊瑚。胃氣甚強，惟  
瘡口不能收束。士源前輩服藥數十劑皆和胃利濕清暑，極平  
淡之方。沙曰：瘡口不收，非用大補難已。生肌奏效，費若之仍以  
芩木炭米藿梗荷梗二陳等類沙急曰：若不用補，豈能速效？曾  
笑曰：患者早食蓮子紅棗一椀，午飯海參煨肉一椀，正在濕感  
之時，利濕清暑，和胃尚且不及，倘服參耆溫補，碍氣氣血壅塞。  
助火內熿，瘡色泛紫，胃氣一敗，神識昏憊，變症眉睫，禍且不測  
矣。况二人兼治一症，功過半分，幸勿憂也。先生治外雖精內科，  
未能講究。沙乃佩服，共服藥百餘劑，未服一劑，溫補而瘡益河

文言卷之三  
沙達周先生癘科名重一時，尚未講究內科。今時之癘科，未知考究內科何如耳。所以人以胃氣為本，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，五味調和，補益精氣，不可不知。余聽鴻誌

孟河巢沛三先生橫橋看一開肉鋪者，身上流痰十餘塊，潰後口裂黑色，根盤肉硬，不知痛癢，無膿流水，肌肉皆削，胃氣索然。患者曰：我戒口多時，胃氣日敗，不知能稍食葷腥。沛三先生曰：患食胃氣尚旺，肉鴨稍可食之。患者曰：若能閑葷，死亦瞑目。看其病情，多服寒涼凝結氣血所致，投以金匱腎氣湯，月餘，肌肉轉紅，漸軟作癢，至兩月後，先生再至橫橋，見一人體肥貌豐，叩謝送脊銀廿枚，曰：再造之恩，終身不忘。先生覲面不識，問其

原委。從開葷之後。胃日健旺。一方服六十餘劑。瘡平肌復。所以外症以胃氣為本。胃以喜為補。若各物禁之。寒涼尅伐戕亂。或溫補壅塞助火。聖人云。盡信書。不若無書。臨症變通。方為上工。余壬午秋。主琴川有張姓。身上數十孔。大如錢。色黯肉僵。流水無腥穢味。不知痛癢。肌肉瘦削。人皆謂楊梅瘡。余曰。寒涼凝結。出前醫之方。復苦參、黃柏、木通、翹柏苓、連土茯苓等類。因戒口極盡。使其開葷。從先生金匱腎氣法。十餘劑後。服溫通氣血之品。廿餘劑而瘡後。遇數症應手。皆食先生之德。故記於此。聊志感仰之意。余聽鴻誌。

蘇州一小兒。甫九齡。頗聰慧。而患流注。肩背腰脇十餘處。百端

醫治無效。余視之曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸。未破者消已。破者收口。更服補氣血之藥而愈。蓋流注一症。由風寒入膜所致。膜在皮中。旁通四達。初無定處。以所隨處作患。此真絡脈之病。故古人製大活絡丹。以治之。其餘煎丸。皆非正治。所謂一病有一病之法。藥不對證。總難取效也。徐洞溪

本邑劉近曾夫人。患虛痰流注。色曉脈虛。發無定處。病極險危。非旦夕可奏功。余辭不能治。郡中一醫。以百金包好。因留在家治之。聞余有不能治之說。笑曰。我醫好後。更請徐君質之。當無言可對耳。月餘。劉君之兄元谷。招余診視。近曾出曰。流注之疾雖向愈。而未收口。託在相好。肯一觀否。余因視之。肩後瘡孔大

如錢內膜乾空。與皮不連。氣促脈微。診畢而出。近曾求方。余笑  
不答。書危在頃刻四字。劉不信。少頃。內呼劉夫子入。已氣絕矣。  
羣執包好之醫。欲加以無禮。余曉之曰。此病本不治。非藥誤也。  
但不知生死為無目耳。乃釋之。蓋流注之證。其類不同。大段皆  
津液枯而痰流膜內之症。當內外交治。而祛邪補虛。亦另有切  
病方藥。蠻補無益也。徐洄漢

嘉善張卓年。未弱冠。患流注五年。自脇及腰腿。連生七八孔。寒  
熱不食。僅存人形。歷年共服人參二三千金。萬無生理。父母先  
亡。只有慈母。其伯悉收其田產文契。專待其斃而取之。其從兄  
汪千。造余家哀懸。余頗憐之。破格往視。半身幾成枯骨。此乃虛

疾流注。醫者不能治其經絡之疾。徒費重資。而一無中病者。則藥之誤。而非病之真無治也。余用大活絡丹為主。而外敷拔管生肌之藥。醫者聞之。大笑曰。活絡丹。半暴之藥。豈可入口。蓋彼惟知俗本所載。烏頭。蚯蚓。之活絡丹。而不知古方。五十餘味之大活絡丹也。蓋流注之疾。全在於絡。故非活絡丹不效。以後。膿稀肉長。管退筋舒。漸能起立。不二年。而肌豐肉肥。強健反逾於常。嗚呼。不知對病。徒事蠻補。舉世盡然。枉死者不知其幾也。徐涇

涇

王孟英曰。大活絡丹。治虛痰流注。深為合法。而外科不知也。若實痰。控延丹最妙。

聖濟方五十味大活絡丹

如無聖濟方徐泗漢醫書六種錄存  
查之附註

洞庭吳姓從徐州經紀返棹。背起粟粒深紫色而痛應心周圍軟肉皆不仁。知非輕證。未至家而就余治。余辭不能再三懇求。姑用圍藥束之。稍定病者曰。我尚未到家當歸處分家事。求借一塵。如果不治死無餘憾。歸二日而復來。其瘡不甚大。頂微高而堅黑。當用刀挑破方可上藥。以洋刀點之。洋刀堅利非凡。竟不能入。用力挑之。刀頭折。乃用金錢四面刺之。以洩毒氣。內托外敷。其方屢變。然■脰從四旁出頑蓋自落約深半寸。脊骨隱露其尖。腐去急以生肌散填補之。內服峻補之劑。兩月而內滿皮完此九死一生之證。不早為外束內托則焦骨攻藏無生理。

周莊陸姓。疽發背。周徑尺餘。一背盡腫。頭以百計。毒氣內攻。沉悶昏迷。醫者以平塌無頭用桂附托之。余曰。此瘡止宜收小。若欲加高。則根盤如此之大。而更加高。則背駄榜榜矣。此乃火毒用熱藥必死。乃以東根盤提毒之藥敷之。一夕瘡頭俱平。皮膚亦潤。止有大頭如杯高起於大椎骨之下。大三寸許。尚不思飲食。惟求食西瓜。醫嚇以入口即死。余縱其所食。一日之內。連喫兩個。明日知飢。欲求飲食。肉四兩。飯半碗。明日更加。始終用托毒清火之藥。而膜成口欬。余囑曰。此疽初起。盈背。背中脂膜皆空。非填補裏膜。必有他變。有庸醫獻媚曰。病已全愈。為此說者。

國厚謝耳。我力能保之。病家利其省費。從之。至來年三月。忽舊  
疮中。一細眼流血不止。放血斗餘。兩日而卒。蓋其前一背盡腫。  
其中之脂膜俱化成膿。從大口出盡。庸醫安知治法。貪利誤人。  
富貴之家。往往最信此等人。可不察耶。徐洞溪

郡中唐廷發偶過余寓。時方暑。謂背上昨晚起一小癰。搔之甚  
癢。先生肯一看否。余視之。駭曰。此對心發也。唐不甚信。曰。姑與  
我藥。余曰。君未信余言。一服藥而毒大發。反疑我誤君矣。含笑  
而去。明日已大如酒盃。而痛甚。乃求醫治。余曰。此非朝夕換方  
不可。我不能久留郡寓。奈何。因就醫余家。旦暮易法。其中變遷  
不一。卒至收口。其收口前十日。忽頭痛身熱。神昏譫語。瘡口黑

胸六脈參差。余適出門兩日歸而大駭。疑為瘡證變重。幾無可藥。細詢其僕。乃貪涼當風而臥。瘡口對風。膏藥又落。風貫瘡中。即所謂破傷風也。乃從外感治法。隨用風藥得汗而解。身涼神清。瘡口復起。仍前法治而痊。若不審其故。又不明破傷風治法。則必無效。惟有相視莫解而已。徐泗溪

余幼時在孟河見吾師曹秋霞先生。三弟名煥美。風寒虛痰入絡。肢腿隱痛。彼因自開藥肆。妄自立方。以參、耆、鹿膠、杞仲、附桂、熟地溫補之品。服三四劑。痛甚。服至十餘劑。四肢癱瘓。不能動。肌肉如死。不知痛癢。二便遺之滿床。後延馬培之先生。及其大少君逸亭兄。診視曰。風寒虛痰阻絡。被膩補碍。塞氣機。營衛不

通已成壞疽。不治之病後延之而敗。逢骨節大肉處。色晦白。內  
潰流粘水。肉如爛瓜而斃。所以藥誤比病死更速。更慘。余因流  
注發背為外科大症。錄醫案數首。以廣見聞。然溫補寒涼。細心  
斟酌。倘一誤投。追悔莫及矣。金匱要略

肩臂部

肩疽

丹徒黃 肩挑傷絡瘀凝為毒與風濕治法不同。

柴胡

連翹

廣皮

青皮

歸鬚

半夏  
牽牛

土貝

甘草

木瓜

丹參

桔梗

肩疽生於足少陽膽經。負重氣血凝結而成。先生用藥從少陽進步。所謂引經之藥也。聽註

○樂疽

休甯倪 脓上堅腫痛引乳絡由包絡血熱氣鬱而成名為樂疽。月餘不潰頗屬頑證。

黨參

遠志肉 川貝

黃耆

川石斛

蒿草

夏枯草 丹參

白芍

荷葉蒂

○魚肚發

青浦顏 脣後垂肉。皴腫赤色。名魚肚發。擬行瘀化毒。

柴胡

桃仁

厚樸

杏仁

青皮

桔梗

廣皮

江枳殼

魚肚發生於心經之青靈穴。曉龍

○石榴疽

太倉邱 少陽相火與外風相搏。肘尖患瘍。名曰。石榴疽。以菊花

清燥湯主之。

生地

當歸

甘菊

麥冬

黃芩

川芎

白芍

知母

甘草

柴胡

升麻

土貝

地骨皮

犀角尖

肩臂瘡疽甚多。有羣書可考。縱不出癰疽治法。如治內症。傷寒不出六經。溫熱須辨三焦。外症亦然。今採四方。一經之症。皆有引經之藥。隨證加之。徒使發散耗裏。誠恐無益。余曉鴻註

長興周某之子。臂生疽。經年膿水不乾。變為多骨。所食米粒漸有從疽中出者。奄奄待斃。余為內托外敷。所服末藥。從瘡口出。繼而膿漸減少。所出碎骨。皆膿結成。出盡之後。肌肉日長。口收。瘡結而愈。徐泗溪

乳脣腋肋部

○乳癰

光福徐 右乳紅腫作痛。脈數有力。此乳癰欲作膿也。凝神效瓜  
薑散。

全瓜薑 連翹 漏蘆 橘核 土貝  
蒲公英 甘草 銀花 角鍼

太倉楊 乳房結核。由氣血相搏。因而成癖。以調和氣血。佐以清  
解為主。

當歸 川貝 陳皮 川芎 山慈姑  
白芍 蘇子 青皮 甘草 山楂核

周莊錢 乳房紅腫。勢難全散。投以疎解半托半化。

蒲公英

川芎

銀花

土貝

角鍼

青皮

甘草

橘葉

金澤宋

乳房作痛。惡寒發渴。此屬厥陰氣阻。

柴胡

赤芍

丹皮

蔓仁

黃芩

連翹

枳殼

橘葉

蒲公英

陳墓李

乳傍木腫。已經半月。症屬外吹。以橘葉散治之。

柴胡

山梔

橘葉

陳皮

連翹

青皮

川芎

甘草

黃芩

蘆根

青浦朱

乳癰雙發。寒熱疼痛。但此毒令。以解毒利濕為主。

葛根

陳皮

厚樸

瓜萎

枳殼

青皮

滑石

麥芽

扁豆皮

黎里施 乳塊雖鬆。姑置弗治。泛泛欲嘔。飲食漸減。是脾被肝戕。且以養胃和肝為主。

半夏

白芍

茯苓

陳皮

伏龍肝

益智

金石斛

蔻果

炒竹茹

南翔周 肝胃不和。乳汁壅滯。結為乳癰。晝夜脹痛。正在蒸腺之候。擬與清肝行乳。以冀膿洩痛減。

柴胡

新會皮

漏蘆

青皮

山楂核

瓜萎

蒲公英

麥芽

連翹

嘉定張 乳癬。潰傳囊絡穿頭不一。是肝胃之大。治宜清涼通乳。指日可愈。

羚羊角 連翹 夏枯草 土貝

瓜蒌仁 銀花 大麥芽 甘草

崇明蔣 乳漏經年。膿水不絕。經囊潰絡。脹形細濶。係產後血虛。理宜補托。漏可愈矣。

洋參 石斛 丹參 川芎 茄蔚子

黃耆 歸身 白芍 川貝

金澤許 乳中結核兩月。木腫不痛。名為乳癬。幸有哺乳。囊絡疎通。法以化堅行瘀。核自消矣。

葛根

羌蔚子

青皮

夏枯草

麥芽

連翹

瓜萎仁

陳皮

山楂核

川貝

覆方 前方已適。仍以此法繼進。

黨參

瓜萎

川石斛

川芎

川貝

黃耆

青皮

夏枯穗

橘白

香附

上海金乳裂愈而復發，發而仍愈。小兒吮乳痛如鐵刺。乃肝胃受熱之故。雖為小恙，治之非易。

生地

川芎

花粉

橘葉

羚羊角

當歸

白芍

白芷

鴟臼

蒲公英

泗涇吳 右乳疼痛經旬，陽明氣阻，脈來弦急，欲作癰矣。擬托裏

托毒。

煨葛根

川芎

鮮蓮房

王不留行

忍冬花

瓜蔓

蒲公英

角鉢

紫明葉

乳癰清後。膿出未盡。寒熱微作。屬陰虛生內熱。擬八珍湯主之。

黨參

歸身

白朮

甘草

銀柴胡

生地

白芍

茯苓

川芎

新會皮

蘆墟沈毓麟七月。乳上患癰。名曰內吹。破潰一月。膿水淋漓。四圍餘腫未退。傳囊又發。治宜安胎化毒。

生地

瓜蔞

淡芩

甘草

銀花

荷葉 橘皮 川石斛

鴨村顧 懷姪六月右乳焮腫作痛。名為內吹。宜安胎化毒。

柴胡 土貝 橘皮 蒲公英 甘草

黃芩 川芎 生地 製香附

湖州錢 乳癧。是肝脾二經氣凝血滯結為癧毒。皮色不變。漫腫無頭。宜和肝脾為主。

製香附 石斛 查核 丹參 廣皮

炙橘葉 川貝 白芍 竹茹

七堡陶 乳癧。已久延不已。防其變漏。

黃耆 川芎 蒲公英 白芍 鮮荷葉

花粉 廣皮 薤草根

感澤周 乳癰作痛。肝火鬱也。

瓜蔓皮 橘核 夏枯草 川貝 枳殼

蒲公英 連翹 川棟皮 山梔 竹葉

震澤沈 肝氣抑鬱。宿患乳核。宜平肝解鬱。

川棟子 薄荷梗 香附汁 丹皮

瓜蔓實 青橘葉 夏枯穗 山梔

某 情懷悒鬱。肝氣不舒。患乳生癰。膿潰。血液大耗。氣上逆。咳嗽。左脇內痛。不能轉側。蓋肝絡少血。內養左右。升降不利。清潤。治嗽無益。

炒桃仁 當歸 茼神

丹皮

柏子仁 阿膠

某咯血後。左乳傍脹。嗳氣始寬。是左升太過。右降無權。肝絡阻塞。氣為之婢也。

旋覆花 枇杷葉 新絳

牡蠣

熟地炭 青葱管 阿膠

沈氏肝氣鬱遏宿痞乳癰

川棟子 黑山梔 薄荷梗 香附汁

夏枯草 瓜蔞實 青橘葉 丹皮

劉氏乳房。為少陽脈絡經行之所。此經氣血背劣。由情懷失暢。而

氣血鬱滯。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。竟成沉痼。疾非癰  
膿之症。以脈不浮數。無寒熱辨之。

柴胡

夏枯草

歸身

白芍

川貝

茯苓

甘草

某氏乳房結核。是少陽之結。此經終氣血皆薄。攻之非易。恐產育  
有年。釀為瘍症耳。

青蒿

丹皮

香附

橘葉

青菊葉

澤蘭

鬱金

當歸鬚

○乳巖

瀾河馮 左乳結核。積久方痛。肝鬱成巖。宜襟懷寬解。庶可帶病

延年姑擬益氣養榮湯以觀機宜。

人參 茯苓 陳皮 川貝

當歸

川芎 黃耆 熟地 白芍

桔梗

於术 甘草 製香附

臧澤許 乳中結核多年不疼不癢。日漸高腫。脈來細濶。左關弦甚。此乃肝脾氣鬱而成。難以消散。且以擬歸脾湯常服。庶不致潰。

黨參 冬术 賦身 陳皮 遠志

黃耆 苗草 川貝 甘草 茯苓

嘉定林 乳瘍之中。巖為難治。

黨參

白芍

茅茹

川貝

歸身

天葵

蘇子

蔓仁

夏枯草

楓涇許。乳巰之症。皆由情志不遂。肝脾積鬱而成。現在潰爛失血如塗。治之頗屬掣肘。倘能怡養性情。即延年上策。乞靈藥石。誠恐無補。

清阿膠

合歡花

棗仁

黃絹父

金石斛

北沙參

茯神

白芍

滌闢孫。乳房為少陽行經之地。氣血皆少。加以情懷失暢。氣血  
痺鬱。有形而痛。治當在絡。脈濶。無寒熱非癰腫之候。恐年齒日  
加必成巖症。

柴胡

佩蘭

川貝

夏枯草

當歸

茯苓

甘草

白芍

吳江徐 乳巖潰腐。勉擬補益。聊作支持之計。

黨參

黃耆

川貝

遠志

川鬱金

白芍

當歸

冬术

茯苓

甘草

常熟張 三陰瘧後。兩乳堅腫。此由肝脾氣鬱。防成巖症。

柴胡

威靈仙

歸身

川石斛

白芍

製首烏

牡蠣

木樨葉

無錫秦 乳巖多由肝脾氣鬱所致。不疼不癢。似乎小恙然非輕淺之症。宜情懷寬解。庶幾免潰爛之虞。

黨參　棗仁　丹參

茜草

清阿膠

黃蓍

川貝

續斷

白芍

荆溪俞　乳巖四十載。潰爛如爐。穢水淋漓。甚則出血。證屬棘手。  
殊難圖治。且以止血。

黃絹灰

地榆灰

陳櫻灰

絲綿灰

藕節灰

蒲黃灰

艾葉灰

馬尾灰

血餘灰

蓮房灰

各藥醋炙為末。糯米湯下。

崑山王　年已五旬。乳巖經久。不能全消。宜滌慮除煩。勝於苦口  
藥石。

金香附

川貝

山楂核

廣皮

白芍

山茨姑

當歸

蝦杜鵑

南潯宋 肝胃不和。乳中結核。始以澹然漸致狂獫。書云。巖無愈理。況素有氣惱。肝陽尤盛。宜屏閑家務。希圖漸消。

梨香附

陳皮

黨參

白芍

山茨姑

川石斛

當歸

川貝

黎里陳 乳房結核。在少陽之絡。此經氣血皆薄。攻之非易。恐遷延歲月。釀為巖證耳。

川芎金

香附

丹皮

澤蘭

鮮菊葉

青橘葉

當歸

青蒿

蒺藜

鮮竹茹

震澤沈。乳房結核如拳。青筋暴露。脈來細濶。此因氣血不和。鬱結成巖。證屬頑硬。無求速愈。擬煎劑。以和營衛之並連。進丸劑。以攻結核之堅頑。庶幾得中病機。

生洋參 茯苓 川芎 冬术 白芍

炙橘葉 歸身 甘草 生地 杜鵑

附丸方 製香附 神曲 茯苓 甘草 川芎

白术 黑山梔 厚樸 橘紅 薑肉

乳症。時云肝脾鬱結。則為癧核。胃氣壅滯。則為癰疽。乳頭屬肝。乳房屬胃。男子乳房屬腎。此乃先哲大概言也。大匠誨人與規矩而已。況乳瘍。證名甚多。有羣書可考。然治法之巧。在臨證施。

治之人余細思之。胸中所過經絡甚多。其症之始各有其源。若不知經絡。病因虛實。如治傷寒不辨六經。茫無頭緒。聊將經絡病因錄之。幸乞高明指正。內經曰。脾之大絡名曰大包。出淵湧下三寸。布胸脇。胃之大絡名曰虛里。貫膈絡肺。出左乳下。其動應衣。脾胃之大絡皆布於胸中。足太陰脾脈絡胃。上膈。足陽明胃脈貫乳中。下膈屬胃。絡脾。脾胃二經之脈皆過其間。足厥陰肝脈。上貫膈。布脇肋。足少陽膽脈合缺盆。下胸中。絡肝。循脇裏。手厥陰心包之脈起於胸中。循胸出脇。下腋。手太陰肺脈循胃口。上膈。橫出腋下。經云。衝脈任脈皆起於胞中。任脈循腹裏。上闢元至胸中。衝脈俠臍上行。至胸中而散。乳房之部位屬脾胃。

乳之經絡屬肝膽。胸中空曠之地而行氣血。心主一身之血。肺主一身之氣。心肺皆在胸中。穀入於胃。以傳於肺。五藏六府皆以受氣。清者為營。濁者為衛。營氣行於經隧之內。衛氣行於皮膚肉分之間。乳汁生於脾胃之穀氣。故其味甘。疎洩主於肝膽。木氣肝主疎洩是也。乳汁厚薄主於衝任之盛衰。衝任為氣血之海上。行則為乳。下行則為經。婦人哺乳則經止。男子之乳房屬腎。何也。男以氣為主。女以血為先。足少陰腎之脈絡膀胱。其直者從腎上貫肝膈入肺中。水中一點真陽。直透三陰之上。水不涵木。氣不舒。真陽不能上達。乳中結構氣鬱無血液化膿。比女之更甚。雖云肝病。其本在腎。鄙見治乳症不出一氣字。定

之矣。脾胃土氣壅則為痞，肝膽木氣鬱則為癥。正氣虛則為病，氣虛不攝為漏，氣散不收為脫，痰氣凝結為癰，為核為瘤。氣阻絡脈，乳汁不行或氣滯血少，澀而不行。若治乳從一氣字著筆，無論虛實新久，溫涼攻補，各方之中，換理氣疏絡之品，使其乳絡疏通，氣為血之帥，氣行則血行，陰生陽長，氣旺流通，血亦隨之而生。自然壅者易通，鬱者易達，結者易散，堅者易軟。再辨陰陽虛實，譬如內吹外吹，乳癰乳疽屬陽者多，乳巖乳懸、乳瘡、乳勞等屬虛者多。乳核、乳癖等堅硬屬氣鬱者多，何經之病參入引經之藥。今採四十方，皆內科手筆，平淡中自有神奇，當細心參而玩之。採以犀書，加以巧思，臨症操縱有權，治法自然可得。

余曉鴻註

徐洄溪先生治東洞庭劉某夫人患乳癰。醫者不能消散。成功之後。又用刀向乳頭上寸餘出毒瘡口。向上膿反下注。乳囊皆腐。寒熱不食。將成乳勞。內外二科聚議無定。羣以為不治矣。延余診之。曰。此非惡證。治不如法耳。尚可愈也。但須百日耳。其家戚族。皆少年喜事。聞余言。欲塞羣醫之口。向病家曰。我輩公懇先生。留山中百日。必求收功而後已。如欲歸家。備快船以迎送。余初不允。繼勉承之。多方治之。至九十日。而未見功。病者柔弱畏痛。既不敢於乳下別出一頭。而膿水從上注下。頗難出盡。故有傅囊之患。忽生一法。用藥袋一個。於乳頭之下。用帛束縛之。

使膿不能下注外以熱茶壺熨之使藥氣乘熱入內又服生肌托膿之丸散於是膿復上泛厚而且多七日而膿盡生肌果百日而癒後以此法治他證無不神效可知醫之為術全賴心思轉變刻舟求劍終無一驗也

徐洄溪

余幼時在太平洲治施姓先有寒熱後右耳後紅腫如核桃延外科某治之謂耳後發將耳後用刀挑穿十餘日膿不能出因其瘡口向上膿從下注漸漸灌注於頸至肩如負一囊肌肉日削胃氣日敗後到吾師藥肆中賣藥余見憫之間其情形曰外科某要包醫索五十金因催佃長工每月七百文亦則能待斂而已言之淚下余愈極曰富貴之人輕醫亦不可貧窶之人索

重謝亦可惡。余雖未習外科，與你治之。按其瘡軟如綿，郁郁皆膿。內中涸涸有聲。若再遷延，內傷裏膜。即用釘書鐵鑽，用紙捲緊，露鋒六分。燈盞火燒紅，在項後近肩井處，另燙一孔，使其濃可下出。當時插入紙捻，吞蠍藥丸，用圓藥將醋調束其根服。提膿內托之藥，明日將紙捻拔出。膿出流之滿背，有碗許。惜其新開之孔太小，出之不盡。再用舊絮捲好，臥後墊於項下。將枕頭抽去，上下兩孔膿漸出。內有腐肉，塞口不能出。用銀匠之鐵鉗挾之，不能出。再從新孔之傍離三分，分開一孔，藥線穿過繫之。潰開，將腐肉取盡，再將生肌之藥用紙條插之，圍以敷藥，吞琥珀散。凡服補托之劑，而月而痊，固一時之憲。數十日不愈，率

而藜藿之軀能受此痛楚。若柔肌嫩肉，斷難收功。余二十二歲  
之事。今十有九年。未敢與人治一癆症。知癆科不易為也。

余臨  
鴻臚

○腸癰

東山沈 腸癰。由鬱怒而成。七情為病。難以調治。不可以外證。忽  
之。議與柴胡清肝湯。

柴胡 川芎 當歸 白芍 川鬱金

山梔 陳皮 甘草

德清韓 咳嗇久延。左偏脇肋高腫。色紫作痛。係欬傷肝肺。而絡  
遂發瘡癰。此症最忌內瀉。穿膜難以圖治。切勿輕視。

枇杷葉 杏仁 川貝 蘇子 天竺黃

瓜蔓仁 桔梗

桑葉 蘆根

東瓜仁

霍方 脾瘻破後。旦夕流膿無息。抑且腥穢。此元氣衰也。如以欬  
嗰不減。胃氣困頓甚。非佳兆。當另圖謀。

黨參

白石英

生穀芽 桑葉

五味子

黃耆

陳淮麥

北沙參 橘白

蘇州張 悒次作痛。須防成瘻。擬運行之法。

澄香

絲瓜絡

陳皮

青皮

蕷仁

半夏曲

川鬱金

歸鬚

南澤下 氣逆脇肋作痛。治從氣分絡分。

枳杷葉

新絳

澄香

青皮

通草

炙橘葉 蘿梗 陳皮

吳右脇有形高突。按之無痛。此屬瘕痞。非若氣聚痰凝。難以推求。然病久僅阻在脈。須佐針刺宣通。正在伏天宜商。

真合粉 白芥子 半夏 麝金

瓜蔞皮 黑梔皮 橘紅 薑皮

王騎射馳驅寒暑勞形。皆令陽氣受傷。三年來右胸脇形高微突。初病脹痛無形。久則形堅以硬。是初為氣結在經。久則血傷入絡。系於臟腑外廓。猶堪勉強支持。但氣鈍血滯。日漸瘀痺。而延癰瘕。怒勞努力。氣血交亂。病必旋發。故寒溫消赴。理氣逐血。總之未能講究絡病工夫。故仲景於勞傷血痺諸法。其通絡方

法。每取蟲蟻迅速飛走諸靈。俾飛者升。走者降。血無凝阻。氣可宣通。與攻積除堅。徒入臟腑者有間。錄法備末議。

蟻蟎蟲

蠆蟲

當歸鬚 生牡蠣

煨木香

川芎

生香附 夏枯草

用大酒麴末二兩。加水稀糊丸。無灰酒送下三錢。

此從仲景大黃蟎蟲丸。鱉甲煎丸化出。輕者金匱旋覆花湯。加味亦妙。能靜註。

葛 酒客。大便久滯。腸上曾發癰瘍。春夏脇下有形。腹形滿脹。此久蘊濕熱。癰瘍。自利未能洩邪。腸胃氣壅。利頻不爽。法當分消。以去濕熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用丹溪小溫中丸。早進二

錢五分。晚進二錢五分。三兩

○腋癰

香山鍾 腋癰漫腫無頭。疼痛寒熱。皮色不變。係肝脾二經氣凝血滯而成。投以柴胡清肝湯。

柴胡

連翹

防風

當歸

山梔

川芎

黃芩

甘草

瓜蔞仁

奉賢程 有時臭効。此熱在營分也。加以兩腋腫痛。皮紅高起。內已釀膿。但虛體未便鍼刀。待其緩破。俾一擁而出。易於收功。

稽豆皮

鱉甲

川貝

川石斛

地骨皮 牡蠣 陳皮

○ 肋癰

太倉朱 左肋硬腫。痛引右肋。綿延兩月。脹勢將成。近加喊啞。飲食少納。此痛傷胃氣。以培中土為先。外湯在次。

黨參

瓜蒌仁

甘草

川鬱金

茯苓

黃耆

半夏曲

陳皮

焦白朮

竹茹

藜里陳 肋癰屬厥陰經。故小便近陰囊處抽掣引痛。皆屬肝絡也。理宜和肝化瘀為治。

柴胡

蘇梗

桃仁

元胡索

製香附

青皮

茯苓

歸鬚

甘草節

腋。脇。肋。皆在身之側。手厥陰。胞絡之脈。過腋。足少陽。膽。足厥陰。肝。足太陰。脾。足陽明。胃。四經之脈。皆行於脇肋之間。骨疎肉薄之處。與裏膜最近。腋。脇。肋。生瘧。皆由肝。脾。鬱積。氣滯血壅。或肝膽火毒。鬱怒而成。每生於體虛之人。先哲云。始終最忌寒涼。或云始終當禁溫熱。鄙意思之。各有其取。身之側者。軀殼經絡之病也。寒涼溫熱。直入中宮。與經絡不得相開。脾為至陰濕土之藏。寒涼易於敗脾戕胃。而伐生生之氣。脾胃一敗。嘔嘔泄瀉。變症百出。肝為風木。膽為相火。風性喜窓。火性善熾。誤投溫熱。不異抱薪救火。風火相搏。易羸易潰。倘裏膜一穿。立見其危。古人治法。壯胃氣者。藉穀氣而生氣。血即內托之法也。疏絡者。使其

血氣流通即外消之法也。今採十一方。皆疎肝理氣清熱消瘀。和胃化痰等法。不犯溫熱寒涼之弊。再兼蟲蟻之搜求絡中之凝滯。小溫中之利濕分消。皆出神入化之思。臨症潛心體認。治法自有進階矣。余聽鴻註。

壬午。余至琴川。有一興福賣糕糬者。脊骨生瘻。瘍科謂外肺瘻。開刀出毒四十餘日。瘍口不斂。時流稀膜。家竈聽其不治。余診之。脈來虛弦。兼數。咳嗆白痰。咳則稀膿流出。漸成瘡勞。幸裏膜未穿。與服蠟藜丸。先護裏膜。進以金匱旋覆花千金葦薑法。旋覆新絳、枇杷葉、生冬西瓜子、苡米淮山藥、石斛、生扁豆、茯苓、川貝、鮮荷梗、橘葉、鮮百合、毛慈之類。肺胃並治。服三十劑。咳減納。

增膿出漸少而厚先以提膿未藥提之再以生肌等藥填之兩  
月餘而愈所以緩治平淡久則自然有功再服毛燕月餘咳止  
瘡口平復如此症或醫藥寒涼溫補亂投或病家性急不信服  
藥每棄而不治者多矣

余馳鵠

腹部

小腹癰

許聖關王 小腹漫腫堅硬皮色不變此腹癰也係七情鬱結脾虛氣滯而成。擬和氣養營湯主之。

黨參

陳皮

白术

黃耆

茯苓

當歸

熟地

沈香

甘草

丹皮

丹陽田 小腹癰

官桂

艾絨

山楂核

炮薑

木香

神鈞

丹皮

薤白頭

枳殼

南潯董 小腹隱痛木腫不散脈來細數便祕食少殊屬虛候須

得膜洩方保無虞。

黃耆 杏仁 生大黃 青皮

桃仁

角鍼 芒硝 大腹皮 茴米

少腹癰一症在臍下關元丹田等穴陳遠公云此處必無陽症因其屬陰部位也一用陽藥立可成功心法曰小腹癰由七情火鬱而生又不能用熱藥不若見證治證為要如漫腫堅硬皮色泛紅有熱為陽七情鬱火所結當以清化無熱不紅者屬陰寒凝結血阻氣滯而成當以溫通若膏粱煎燉或喜服丹砂鬱熱內壅苦鹹速下亦不可少余採三方虛者補之秘者下之寒者溫之先生用藥變化已見大概矣然腹部癰疽各症當用臍

鈎直針易穿裏膜耶

聽鴻註

○腹皮癰

嘉定姚咳嗽血色瘀濁不鮮。此肺經伏熱。加以臍旁皮裏膜外隱痛不止。日久腫發於外。結成腹皮癰。脈來沉數而細。擬清解肺胃。佐以雙解貴金丸。下之以參消息。

蘇子

紫苑

茜草

桑葉

杏仁

桔梗

冬瓜仁

茅根

附雙解貴金丸 生軍五錢白芷二錢五分研末為丸葱酒送下

服之藥前

○臍癰

蘇州呂 手少陰火毒移於小腸以致神闢腫痛高突若鈴皮色  
不變並無寒熱外用膈蒜灸內服清涼之劑以望消散。

黃連

連翹

山梔

黃芩

枳榔

木香

甘草

赤芍

銀花

○脾漏

盛澤楊 脾癰破後時流穢水面色㿠白脈更無力瘡怯之漸也。  
擬固本育陰為主。

生熟地

天冬

茯苓

山藥

黃耆

骨碎補

女貞子

麥冬

丹皮

澤瀉

此脾漏傷陰腎火外越

○臍中出水

吳江朱 脾中不痛不腫搔癢則黃津流出此屬腸胃濕熱宜黃連平胃散主之

黃連

蒼朮

甘草

黃芩

厚樸

陳皮

米仁

赤苓

少腹脾部五方如腹皮癰兼肺熱丸煎並行丸藥過胃至下焦而化下其已壅之瘀而不傷胃湯劑輕浮治上不犯下焦內中一味桔梗更有深意

脾癰心為火藏小腸火府火鬱於內寒氣凝於外芩連苦先入心洩熱加以行滯理氣解毒再以隔蒜外灸通陽治法極密脾漏傷陰固本育陰之六味滋腎水則火焰自熄矣脾中搔癢出

水之黃連平胃散之除濕化熱雖遵古法施治若不平時用功  
豈能到此。腹部之癟用藥須保脾胃行經活血之品倘誤用  
寒涼剋伐脾胃一敗腫陷難潰潰後難收裏膜一穿多致不救。

余曉鴻註

前後陰部

○前陰

某酒客淋濁必係濕熱之邪著於氣分故五苓八正俱用通利病數年不愈必由情欲致傷敗精血阻於內竅溺與精異路同門並中因敗精腐阻居多必通敗精一定之理

杜牛膝

一兩五錢

搗汁沖入麝香三分

虎杖散

某寒入厥陰之脈結為氣疝痛則脹升氣消絕無踪跡疝氣下元已虧不可破氣攻疝尿管痛或漏阻溫養下元佐以通竅

鹿茸

麝香

薤菜子

蛇床子

茴香

歸身

覆盆子

青鹽

某脈象和緩。小便時。莖中痛。連及上。若溺長。則不病也。此係陰中有火。宜以養榮合導赤。用東垣法。

熟地 黃耆 白芍 於术 賦身 陳皮

炙草 茯苓 生草梢 木通 淡竹葉

常熟沈 莖頭紅腫。溺管澁痛。小溲點滴難出。係腎水不足。陰中伏熱。故暑天則發。秋冬則瘥。是內陰不勝外也。擬知柏八味滋水洩熱。

生地 丹皮 黃柏 知母 譚瀉 濱山藥

茯苓 麥冬 荷梗 菜豆皮

高脈數汗出。身熱吐血。五日胸腕不舒。舌色白。此陰虛本質。暑

熱內侵營絡漸有時瘡之狀。小溲莖中作痛。宜通腑經為宜。

鮮生地

連翹

滑石

竹葉

鬱金汁

甘草梢

福山楂 莖頭腐爛作痛。小溲渾濁。漏管溢痛。舌白口穢。脾經濕

熱下注。擬利濕清熱。

白术

黃柏

苡米

猪苓

赤苓

忍冬藤

滑石

通草

甘草梢

鮮荷梗

子癰

某 痘本肝腎為病。又挾濕熱下注。以致舉丸腫癰。昔予和分導  
濕熱。且溪利氣辛芳。以二者兼治之。

草薢

白蘚皮

茯苓

米仁

通草

生草梢

○囊癰

陳脈沉弦舌灰邊白腰跨氣痛腎囊畢丸腫大此濕熱為病亂  
喫發散消導濕邪下墜魚疝治當分消

草薢

黃柏

山梔

茯苓

丹皮

防己

猪苓

澤瀉

湯一囊腫腹脹此屬瘡蠱

茯苓皮

海金沙

白通草

大腹皮

厚樸

廣皮

猪苓

澤瀉

江 昨進分消方。熱勢畧減。小溲畧通。所有濕熱穢濁。混處三焦。非臆說矣。其陰莖囊腫。是濕熱甚。而下墜入腑。與方書莖腫。欬症有間。議河間法。

飛滑石 石膏

杏仁

厚樸

猪苓

寒水石

澤鴻

絲瓜葉

又 川連

淡黃芩

生白芍

枳實

六一散

廣皮白

生穀芽

內經曰。足三陰之脈逆行。皆從足走腹。濕氣自下先受。內經曰。一三焦者。決瀆之官。水道出焉。上焦如露。中焦如漬。下焦如瀆。者。蓄洩之謂也。下焦者。別迴腸。注於膀胱而滲入焉。下焦不治。

水蓄膀胱。腎為水之藏。膀胱為水之府。莖為洩水之路。精之道也。脾為濕土。脾虛濕積。水蓄不能洩。肝主疏洩。莖為筋之宗。壅不能洩。腎為胃之關門。濁陰閉而不能洩。所以莖頭漏管。腎囊之症。先以利濕為先。譬如脾藏濕熱者。五苓散等。取木以健脾洩之。肝藏濕熱。龍膽瀉肝等苦。而洩之。腎經之濕。以通關滋腎知柏地黃等。兼養陰而洩之。以下病囊癰濕熱病也。先通水道。使其壅塞。濕熱腐精敗血滌而清之。不致為患。倘堵塞性難於成功。如囊癰下刀。燙火鍼。囊腫成膿皮厚。須先按定頭在

何處用墨畫線將鍼用紙捲好露鋒幾許將澤丸推開臥鍼刺之可不損。畢丸裏膜易於收功屢治皆驗。余馳鴻註

○肛漏

王氏凡女科書首篇必論調經既嫁必究孕育結稿十載未能得胎病在至陰之藏延及奇經八脈述經遲晨泄心若搖漾得食姑緩肛瘻久漏都屬下損。

人參 紫石英 當歸 茯苓

鹿茸 補骨脂 藉艾湯泛丸

徐虛損四年肛瘻成漏食物已減什三形瘦色黃當以甘溫培中固下斷斷不可清熱理嗽。

人參

茯苓

山藥

炙草

芡實

蓮肉

陳春病至夏日漸形色消奪。天地大氣發泄。真氣先傷。不主內守。為損怯之症。不加靜養。損不肯復。故治嗽治熱無效。交節病加。尤屬虛象。脈左數甚。肝有漏瘍。最難調治。

熟地

炒山藥

茯苓

建蓮

豬骨髓

曹肌肉蒼赤。脈小數疾。童年真陰未充。囊下肛前已有漏。危陽升失潛。巔窓如蒙。常與壯水制火。猶慮變幻損怯。

六味去萸肉。加生白芍。黃柏知母。人中白蜜丸。

王少年陰火直升直降。上則失血。咳逆。下墜。肛瘍延漏。皆虛勞見端。食減至半。胃關最要。非可見熱投涼。以血嗽泥治。肺與大腸為表

東肺移熱於下則成肛漏  
培土生金把握中宮之法

熟地炭 建蓮

霍石斛 茯神

炒山藥 茅實

鄭虛損四五。年。肛漏未愈。其咳嗽失血。正如經旨。精不主上奉。  
陽氣獨升降。奈何見血投涼。治嗽理肺。病加反覆。胃困減食。夫  
精生於穀。中土運納。則二氣常存。久病以寢食為要。不必汲汲  
論病。

生黃耆 賴子肉 黃精 白芨 沔仁

南棗 淡水煎膏不用蜜收畧飪用五錢參湯送

楊驚惶忿怒。都主肝陽上冒。血沸氣滯瘀濁。宜宣通以就下。因

誤投止塞。宿瘀不清。新血又瘀。絡中而月屢屢反覆。究竟肝膽氣血皆鬱。仍宜調達宣暢。漏陽在肝。得體中稍健設法。

旋覆花

新絳

青葱管

炒桃仁

柏子仁

肛漏者。皆屬肝脾腎三陰。氣血不足。何以肛漏在三陰者。足三陰任督之脈。皆走前後二陰之間。肺與大腸為表裏。肛者。肺之使。大腸之門戶也。始因酗酒辛辣。醉飽入房。疾奔久坐。筋脈橫絕。臟腑受傷。經云。陷脈為瘻。氣虛濕陷為瘻。痔破久漏。氣血皆虛。肺主一身之氣。賴無形約束。有形三陰漸虛。肺亦隨之而弱。肺實則溫。溫則內氣充。而有所蓄。肺虛則寒。寒則內氣餓。而不能收蓄。有形滋膏。肺為五藏之首。佈精諸藏。諸藏一虛。肺反受

諸藏之廟何也。脾虛土不生金子不能受母之益。腎虛水不養  
金子反盜虛母氣。金堪伐木。肝陰不足。木大反來刑金肺之一  
藏。受諸藏之創。氣虛不能收束。肛漏滋水淋漓。若不杜漸防微。  
如一蟻潰堤。滄海漏危。難實。脾氣不固。則泄瀉。肺氣不固。則遺  
精。肝火刑金。吐痰倉咳。久積成勞。如針之空。竟可傷身。所以治  
漏之法。如堤之漏。如屋之漏。不補其漏。安能免乎。治漏者。先固  
氣血為先。氣旺內充。而能收斂。使其不漏。可無害矣。津液日增。  
虛損可復。若專顧其瘡。插紅升白降。或線穿翦割。使其小而致  
大。大而致漻。虛弱柔嫩之軀。痛苦萬狀。愴地呼天。莫之能救。將  
內之新肉。做成腐膿敗血。再服苦寒戕胃。利溫傷津。致成內熱。

肌削喘促腹膨泄瀉而死者誰誤之也嗚呼病者為一線之兆  
願受剛割之刑醫者竟將號痛極慘之瘞而神其伎名重者此  
比皆然致人於死地庸庸者無須言矣今存六方奇脈久漏空  
虛者以有情之品填之久漏胃弱以甘溫之品固之陰虛陽亢  
滋陰藥中佐苦以堅之土不生金者甘溫培中兼酸以收之各  
方之中蓮子芡實訶子中白固攝真元者皆補漏之法也質之  
諸賢不以鄙言為迂談耳余聽鳴註達機故人於死地苟宜在而抑  
其枝之不

○痔瘡

曾五二脈弦動眩暈耳聾行走氣促無力肛痔下垂此未老欲衰腎  
陰弱收納無權肝陽熾虛風蒙竅乃上實下虛之象質厚填陰

甘味熄動節勞戒飲可免仆中。

虎潤去鎖陽知母加大肉旋蓉煉蜜丸

某二六冬季咳嗽吐痰漸至臥則氣衝喘急起坐今三載矣經以肺腎為俯仰之藏是肺主出氣腎主納氣老年患此按脈左弦右沉為腎氣不收主治不必因痔患而畏辛熱

腎氣丸去牛膝肉桂加沉香蜜丸

徐一失血能食痰嗽色蒼脈數可與甘涼養胃中之陰胃和金生

痔血便燥柔藥最宜

生扁豆 生地 天冬 麥冬 銀花

柿餅灰 側柏葉

祝<sub>五</sub><sub>四</sub>中年已後瘦人陰虧有熱飲酒濕熱下墜精濁痔血皆熱走入陰則陰不固攝前方宗丹溪補陰丸取其介類潛陽苦味堅陰若用固澑必致病加。

水製熟地  
鹹秋石  
天冬  
茯苓

龜版膠  
黃柏  
知母  
豬骨髓搗丸

徐 五旬又四勞心陽動陰液日損壯年已有痔瘻腸中久有濕熱酒性辛溫亦助濕熱濕熱下注為癥為淋故初病投八正五苓疏氣中之壅也半年不痊氣病漸入於血絡考古方惟虎杖

散最宜。

虎杖散

即土牛膝麝香

江

脾宜升則健。胃宜降則和。益太陰濕土。得陽始運。陽明燥土。得陰始安。以脾喜剛。燥胃喜柔潤。仲景急下存陰。治在胃也。東垣大升陽氣。治在脾也。今能食不運。醫家悉指脾弱。是病。但診脈。較諸冬春盛大兼弦。據經論病。獨大獨小。斯為病脈。脾臟屬陰。胃腑屬陽。脈見弦大。非臟陰見病。久病少食。猶勉強支撑。兼以大便窒塞。泄氣不爽。坐談片刻。哎氣頻頻。平素痔瘡。腸紅未向安。適此脈症。全是胃氣不降。腸中不通。腑失傳導。變化之司。古人九竅不和。諸屬胃病。六腑為病。以通為補。經年調攝。不越參术桂附。而毫之應效。不必再服湯藥。議仿丹溪小溫中丸。服至七日。俾三陰三陽一周。再議治之義。

小溫中丸二兩一錢 每日三錢清晨開水服

某能食腸血脈細色瘦肛漏下墜議酸苦熄風堅陰。

萸肉炭 黃柏炭 地榆炭 禹糧石

五味炭 赤石脂

某 凡有痔疾最多下血。今因嗔怒先腹滿隨瀉血向來糞前近日便後是木鬱於土中氣滿為膨氣走為瀉議理中湯泄木佐之。

人參 附子 炮薑 芽朮 厚樸

地榆 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

某 三內熱，腸紅發痔，當清血分之熱。

生地

炒丹皮

酒炒黃芩

黑山梔

元參

柿餅灰

炒黑槐花

銀花

支<sub>五</sub>痔血久下，肌肉瘦黃，乃血脫氣餒。漸加浮腫喘促，再延腹脹，便不可為。此症臟陰有寒，腑陽有熱，詳於金匱穀疸篇中，極難調治。

人參

焦木

茯苓

廣皮

炒兔絲子

木瓜

益智

徐<sub>六</sub>冬月嘔吐之後，漸漸顛頂作痛。下焦久有積疝，痔瘡厥陰陽明偏熱，凡陽氣過動，變化火風，迅速自為升降，致有此患。

連翹心

元參心

桑葉

丹皮

荷葉汁

黑槐皮

戴九疇瘡下血濕熱居多今色衰微顯是虛寒無速效法則當補脾胃因瘡瘍猶痛腫勢尚存佐以淡滲通腑

生於术 生兔絲粉 生象牙末 生白蠟

某 診脈右弦左濡久痔注血致納食不易運化此脾胃先傷胃陽繼困府氣不能宣暢大便不爽溫補未能通調府氣疎滯更損脾胃生陽東垣每以治土必先達木不宜過投燥劑仿古治中湯法佐以疏肝解鬱

人參

青皮

黑槐米

查肉

茯苓

木瓜

陳皮

益智仁

葉 敗寒汗大出下有痔漏。左眼眶疼痛。此陰傷火鬱不可作時  
邪泛治。

六味去萸肉加芍蔓荆子丹皮重用

痔漏者名異類同始則為痔久則成漏先哲或云當大補氣血  
或云足三陰不足風熱濕熱下注先祛風熱濕熱余以醫本不  
能拘執成法若拘於翻反被其困如作文千萬題目洞悉題情  
見題作文不解思索醫家亦然能洞悉病源見病治病心手相  
應此皆平昔工夫書亦不可少也今採之方先賢治病節節玲  
瓏如未老欲衰之虎潛法甘味熄風腎氣不納之腎氣法溫納  
下焦肺胃陰虛之三才法甘涼養陰中年陰虧大補陰之苦味

堅陰如濕熱入於血絡之虎杖散。濕熱阻於腸胃之小溫中丸。  
久痔下血之禹糧石脂堵塞陽明佐酸苦熄風木赴中土便血  
腹膨理中湯佐以升清泄木內熱腸紅清血分之熱藏寒府熱  
之利濕溫中肝胃偏熱之清肝化熱痔血日久用象牙白蠟填  
塞肛中之漏脾傷胃困用治中湯之扶土疎肝方雖十二無一  
雷同若非平日考覈羣書豈能到此足啟後人心智較動輒苦  
寒傷腸線繫剪割拔藥者不啻如宵壤之殊矣願為瘍科者平  
昔專心內科捨末求本而蒼生之幸也余聽鴻註

內經曰因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸辟為痔風熱不散穀  
氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者而變成瘻

也。五臟切宜保養。勿令受邪。所痔漏者。當調飲食。寡慾節勞。皆可帶病延年。如插爛藥。刀割。煎煎。線繫。余見已多收功者鮮少。余三十歲時。肛側外如李。潰膿後。深寸餘。插藥條。逐日有膿中。按有孔如豆大而深。余即以海浮散膏藥貼之。內服調和氣血。之藥。一月痊愈如故。後逢房室勞碌。即脹流水。余即寡慾節勞。今已十五六年。未發。若使外治。穿肛潰腫。亦未可知。聽志

股腿脛足部

環跳

廉

二三

診脈論體。從遺精漏陽，而環跳穴痛，遂不堪行走。臟陰傷及腑陽，陽氣日加窒塞，經脈不同舒展，食入壅脫，欲吐。大便旬日不通，痞阻日甚，而為瘓症。內經論治瘓，獨取陽明，無非流通胃氣，蓋胃脈主平，約束筋骨，利機闢竅也。議用加味溫膽湯。

又大便旬日不通，用更衣丸取意，小腸火腑非苦不通，非下不奪也。

塗

六二

痛起肩胛，漸入環跳，脾膝是為絡虛。

黃耆

五錢

於术

三錢

當歸

三錢

茯苓

二錢

防已八分防風根五分羌活五分

又照前方去防風羌活加杞子沙苑

何七腰痛環跳穴痛痺。

桂枝木 沙苑 小茴 茴芩 炒杞子

桑寄生

胡氏懷妊六月陽明司胎門動絡脈環跳痛連腰膂最防胎氣

歸身 桂枝木 炒杞子 炙草 羊脛骨

茯苓

莊二督虛背疼脊高突

毛鹿角切三錢鹿角霜一分杞子三錢歸身一錢

生杜仲一錢

五分

沙苑一錢

五分

茯苓一錢

三分

青鹽八分

某 尾閭骨痛以異類有情者補之

猪尾骨 蝦身 木瓜 新絳

環跳穴痛。瘍科皆云附骨陰火。又云附骨癰疽。實係足三陰經少陽氣宣通體虛之人。寒濕所襲。流注骨骱之間。氣滯血阻所致。日久不治。寒鬱化熱為曖。先宜溫通氣血。無不效驗。或夾風或夾痰。奉入祛風消痰下焦溫則寒凝自散。余治亦不少。未見有釀成內潰者。至於脊痛。尻痛。皆腎督脈不足以異類有情之品補之。若兼症前溫膽湯。更衣丸。皆治法之變化也。此皆內症錄入瘍科者。恐瘍科一見。即謂陰瘻。或以大劑陽和湯。溫熱

助火或發表攻裏。戕賊正氣。火熾亂刺。致成勞怯者亦多。若能  
內外兩科水乳交融。深思好學。筆無滯機。即內科之明哲。瘍科  
之上工也。余聽鴻註

○膝脛足脚氣

蔣七歲足膝脛疼久不止。內熱。

生虎骨 炒牛膝 草薢 金毛狗脊

仙靈脾 當歸

又 照前方加生鹿角黃柏

汪二脈濇。腰髀環跳。恚痛煩勞。即發下焦空虛。脈絡不宣。所謂絡虛則痛是也。

歸身

桂枝木

草薢

木防己 牛膝

沙苑

生杜仲

小茴

曹九溫鬱少腹痛引腰右脚痠

木防己

飛滑石

茯苓皮

厚樸

晚蚕沙

草果

草薢

某診脈右部虛軟無力左足內踝腫漸大此足三陰經脈所行之處藏真虧損何疑議用峻補方

六味丸加

河車

杜仲

牛筋

鹿筋

菟絲子

川續斷

麥冬

黃柏

用黃牛骨髓羊骨髓

豬脊髓精羊肉煎湯入淡菜同熬膏丸

○足指

某遺由精鍼淋由漏鍼異出同門最宜分別久遺不愈是精鍼不攝為虛但點滴痛癢少腹堅滿此屬淋閉乃氣墜不通未可便認為虛况夏秋足指先腐下焦蘊有濕熱氣不流行膀胱撐滿遂致堅滿耳五苓散主治

五苓散

某嘔逆吐涎衝氣攻心足大冊指硬強而痛

淡吳萸 熟附子 獨活 北細辛

當歸 漢防已

○脚氣

某氏脚氣古稱南地多因濕熱醫用苦辛宣通開氣滲濕久進病未祛除而血液反耗心熱氣沖目黃嘔涎煩躁頭痛昏厥四肢筋縱掣痙大便堅滯顯然肝血衰涸內風掀越此風乃陽氣之化非外來八風同例而治分經辨治病在肝藏擾動胃絡由氣分濕熱延中血中枯燥靜攝小安焦煩必甚蓋內傷情懷草木難解斯為沈痼

石決明 稷豆皮 天冬 生地 阿膠

茺蔚子

丸方 生地 白芍 天冬 生地 阿膠

阿膠 麥冬 知母 稷豆皮 芫蔚子

桂圓肉

某脚氣行痺。左右更代而痛。宜溫通方。

桂枝

獨活

秦艽

貝齒

茯苓

防風

附子

木瓜

草薢

朱仁

晚蚕沙

海桐皮

倪姪濕熱。腳氣上攻心胸。腕中滿脹。嘔逆。乃濕上甚為熱化。與苦辛先治在上之滿脹。用瀉心法。

川連

黃芩

枳實

半夏

薑汁

杏仁

吾吳地偏東南。水多土少。濕盛土虛。濕邪為害最多。內經云。中於濕者。下先受之。焦如瀉水。濕易積足。三陰之脈從足走腹。

足三陽之脈從頭走下濕之有餘從陽化者為濕熱濕之且陰虛者凝濁從陰化者為寒濕外來之濕夾風者利濕中兼祛風之品脾肝腎三陰不足血燥亦可主風溫補肝腎亦佐祛風足少陽足厥陰脈皆在足故易於生風也脚氣亦有寒熱虛實皆要認清不可混淆倘補泄一誤立見衝心悶絕都有羣書可考鄙亦不瑣言矣

余聽鴻註

余於壬午至琴川治大市橋吳姓成衣匠二十五歲而色青黃腰重足腫至股軟而無力兩人夜之而行病起一年有餘服藥將及二百劑罔效按脈濡滯氣促余曰此症却未見過想其情即黃帝云緩風濕痺金匱云著痺濕著而不去腰中如帶五千

錢千金所云脚弱病也。俗名濕脚氣。甚則止衝心腹亦能致命。  
濕脚氣誤投補劑。氣閉死者最多。即進活人榦榔飲一劑。服後  
徧體汗出。直至足心。而刺腫勢皆退。覆用本事杉木散。三劑。霍  
然藥不值百文。愈此大症。古人立方。決不欺後學。用之的當。如  
鼓應桴。今將二方錄後。高明鑒政。

活人榦榔飲 榆榔末一錢。橘葉四錢。杉木片一兩。陳酒三兩。  
童便二兩。河水兩大碗煎之一大碗。濾清調榆榔末飲盡。剗覆  
以被汗出為度。

本事杉木散加味方

杉木片四錢 大腹皮一錢 橘葉二錢 橘皮二錢

換榔 二錢

防已 二錢

附子 四分

陳酒 二兩

童便 二兩