

秘傳眼科龍木醫書總論

龍木集序

漢以上有說無方由漢以下
方與說始備說不乖理方不
違義斯其為良醫矣古之醫
有俞跗渤海秦越人其為術
不止湯熨鍼石能視見人五

臍癥結割皮解肌滯院腸胃
神秘精妙咸可謂凌世法漢
倉公得黃帝扁鵲脈書其言
人生死不壅毫髮司馬遷備
載之後世多不曉然其意則
微矣醫之攻疾猶將之制敵

善將者不擇人而戰善醫者
不擇病而治余觀韜鈴諸書
陰陽變化縱橫間諜天地人
事之紀莫不詳究下至雲鳥
龍蛇八陣六花之奇進退倚
伏戰守攻圍之具條貫靡遺

真可為用兵之權輿矣然敵
之來虛實堅瑕其機難測而
其為變若窮勝敗死生在料
量呼吸之頃不可嘗試而冒
為之者則決策幾奇運用之
妙存乎其人醫之為道亦若

是而已目者肝之外候五臟
六腑之精氣上注於目故火
乘肺白輪赤火乘脾肉輪赤
火乘肝腎黑神翳心君火動
則各有所乘五臟之虛實六
氣之乖和皆焦於目醫者視

形色察脉理系度量立規矩
知其有餘不足與法之順逆
然後可以為施治之則此龍
木集之所由作也立論精微
布法該核深有得于俞扁倉
公神髓理由說闡方以義裁

不啻如孫吳之法嚴整踈遠
可以待勝乎敵而生死起廢
應手可得者惟在人善用之
耳

毅所侍御黃公患其集未廣
布命梓之以傳其仁溥矣公

觀風海表荒陬僻邑感所憂
卹其民之欺蔽於豪強網絡
於誅求靡爛於箠楚敲朴之
下蓋蔽而不獲伸者不有妨
人之苦於懵瞶者乎殆有甚
者又不有精神內竭目系上

強懼旦夕隕棄而不克救者
乎其未經歷與所未廉得者
困苦憔悴之狀不亦有如是
之亟且急者乎公見之必盡
憫之不欲其夭廢而安全之
者其亦有所處矣生人之心

一也起廢疾則思廣其方理
天下則務平其政公佐

天子出治調燮之任亦盡是心
而已常郡侯浹桂朱公袵以
公命屬文於余余不佞不能
為文惟推公之心以為侯告

侯曰然遂書之

萬曆乙亥歲春三月吉日

賜進士出身奉政大夫廣東按察司僉事前

南京兵部車駕司郎中王問

摺

三十七雞冠現肉外障

三十八臉生風粟外障

三十九胞肉漆凝外障

四十漏睛膿出外障

四十一蟹眼疼翳外障

四十二突起眼高外障

四十三風牽喎偏外障

四十四倒睛拳毛外障

四十五風牽臉出外障

四十六神崇疼痛外障

四十七旋螺災出外障

四十八鴝眼凝睛外障

四十九轉轉關外障

五十偶被物撞破外障

卷之五

前症
後方

總論哥方

五十一撞刺生翳外障

五十二血灌瞳人外障

五十三暎目風塵外障

五十四天水行後赤眼外障

五十五暴赤眼後急生翳外障

五十六胎風赤爛外障

五十七風赤瘡痰外障

五十八中風淚出外障

五十九暴赤客熱外障

六十硬睛疼外障

六十一眼疼如針刺外障

六十二眼痒極難忍外障

卷之六

前症
後方

總論哥方

六十三眼坐起生花外障

六十四瞳人乾缺外障

六十五眼黃膜上冲外障

六十六眼赤膜下垂外障

六十七眼小眦赤脉外障

六十八小兒通睛外障

六十九小兒斑渣入眼外障

七十小兒臉中生翳外障

七十一小兒疳眼外障

七十二小兒青盲外障

卷之七

諸家秘要名方

一巢氏論

凡一件

二三因方

十三件

三本事方

六件

四百一選方

五件

五和劑方

十四件

卷之八

針灸經

凡二十一條

一偃伏頭部中行

凡十一穴

二頭部偃伏第二行

左右凡十四穴

三頭部偃伏第三行

左右凡十二穴

四側頭部

左右十二穴

五正面部中行

凡一穴

六面部第二行

左右凡六穴

七面部第三行

八面部第四行

九面側部

左右凡二穴

十背膂部中行

凡二穴

十一背膂部第二行

左右凡十一穴

十二背膂部第三行

凡二穴

十三手太陰肺經

左右四穴

十四手陽明太陽經

左右凡四穴

十五手少陰心經

左右四穴

十六手太陽少陽經

左右凡十四穴

十七手少陽三焦經

左右凡十六穴

十八足少陽膽經

左右凡四十九穴

十九足太陽膀胱經

左右凡八十九穴

二十推人神所在法

二十一推逐日人神所在法

卷之九

諸方辨論藥性

凡一條

一玉石部二十五種

二草部六十九種

卷之十

諸方辨論藥性凡四條

三木部二十九種

四人部二種

五獸部十四種

六禽部二種

七蟲魚部十七種

八果部一種

九米穀部二種

十菜部七種

卷之首

龍木論計三十七頁

秘傳眼科龍不醫書總論卷之一

一審的詩發揮

詳夫自古名人無不與學而就功推窮事理盡因事以言文須在理通方當行用者或言詞無據即不足與討論臣從功歲業此道留心亦迺數世相傳豈敢妄違先哲每逢同道皆言眼淚有七十二般及問其數名迹難言一半今則謹按諸家眼論夙夜搜求敬推眼疾之名果有七十二種據其疾狀患者頗多論錄爲歌以貽後代又自古諸家之眼各有條章病散一一不同數目皆書不盡或有畫作圖形或有壽生

藥性雖則救人爲切詳之理未周全遂乃按其古今
綴爲詞頌名號審的詞矣庶使口念其言眼看疾狀
認識既不差錯治療又有所憑將用救人未無傷橫
近見庸醫之輩學不從師自出己意亂行鍼藥或虛
則反瀉實則反補或醫嫩便鍼瘡痕割烙或卽不看
血忌觸犯人神或卽悞鍼大深損其榮衛因茲疼痛
傾致損傷鍼刀傷觸五輪湯藥垂於臟腑亦由病家
無憑任信庸醫遂使可瘥之眸永沉昏暗之證豈爲
人子曷不慙傷故書苦口之辭發揮歌訣義理也

二眼論叙

夫眼者五臟之精明一身之至寶如天之有日月其可不保護哉然骨之精為瞳子屬腎筋之精為黑眼屬肝血之精為絡果屬心氣之精為白眼屬肺肉之精為約束屬脾契筋骨氣之精與脉並為之絲絲上屬於腦後出於頂中故六淫外傷五臟內鬱飲食房勞遠視悲泣抄寫雕鏤刺繡博奕不避煙塵刺血發汗皆能病目故方內有五輪八廓內外障等各各不同尤當分其所因及臟腑陰陽不可混濫如 決其面者為兌皆屬少陽近鼻上於外皆屬太陽下為內皆屬陽明赤脉上下者太陽病從下上者陽明病從

外走內者少陽病此三陽病不可混也青色赤病在心色白病在肺色青病在肝色黑病在腎色黃病在脾色不可名者病在胃中此五臟三陽病不可混也
砂叙三因于後

三三因證治

病者喜怒不節憂思兼並致臟氣不平鬱而生涎隨氣上厥達腦之虛浸淫眼系陰注于目輕則昏濇重則障翳眵淚努肉白膜遮睛皆內所因或數冒風寒不避暑濕邪中于項乘虛循系以入於腦故生外翳
翳論中所謂青風綠風紫風黑風赤風白風白翳重

腎等隨八風所中發生諸淫乃外所因或嗜欲不節
飲食無時生食五辛熱啖炙烤馳騁田獵冒涉烟塵
勞動外疇乃喪明之本所謂恣一時之遊佚爲百歲
之固愆皆不內外因治之各有方

四五輪歌

眼中赤翳血輪心

眼中白睛有小赤
脈是血輪主屬心

黑睛屬腎水輪深

黑睛屬腎
房水輪

白睛屬肺氣輪應

白睛應氣
爲輪屬肝

肝應風輪位亦沉

肝主風輪
在內無形

總管肉輪脾臟應

肉輪屬脾
腎

兩臉脾應病亦侵

脾兩臉屬

瞳人屬膽爲淮海

光明瑩淨直千金

一臆不和攻入眼

鍼醫宜蚤莫沉吟

愚痴初患不將治

物間針藥却生疑

求神拜鬼閑燒灸

痛極狂心枉補神

風熱漸深牢固後

昏沉翳膜始求醫

假使得痊兼復休

服藥名醫日月遲

五輪詞內障眼根源歌

不疼不痒漸昏濛

薄霧輕烟漸漸濃

或見蠅飛花亂出

或如懸螭在虛空

此般樣狀因何得

肝臟停留熱及風

大叫大啼驚與怒

腦脂流入黑眼中

初時一眼先昏暗

次第相傳與一同

苦口何須陳逆耳

只言肝氣不相通

此時服藥期銷定

將息多乖及沒功

日久既應全黑暗

特名內障障雙瞳

名字隨形分十六

龍師聖者會推窮

靈藥這回難得効

金鍼一撥日當空

強修將息依言說

六鍼內障眼法歌

內障尤來十六般

學醫人子審酒看

分明一一知形狀

不針方可得安然

若將鍼法同圖醫

誤損神光取瘥難

冷熱先明虛與實

調和四體持安然

不然氣悶違將息

嘔逆勞神弱却翻

咳嗽震頭皆未得

多驚先服鎮驚丸

若求涼藥銀膏等

用意臨時候看

老醫細鍼麓薄嫩

鍼形不可一般般

病虛新產懷娘月

下手應知將息難

不雨不風兼告口

清齋三日在針前

安心定意行醫道

念佛親如莫維時

患者向明盤膝坐

提師腰帶在心安

鍼者但行賢哲行

測隱之情實善緣

有血莫針須住手

裏月如舊時開看

忽然驚振醫重十

服藥三旬見朗然

七日解封錐見物

花生水動莫他言

還睛丸散堅心服

百日分明復舊根

七鍼內障眼後法歌

內障金針針了時

醫師言語要深知

綿包黑豆如毬子

眼上安排綿係之

頭安枕上瀆要穩

作上

仰臥三朝莫厭遲

封後忽然微有疼

腦風牽動莫他疑

或鍼或烙依經法

痛極仍將火熨之

擬吐白梅含咽汁

吐來仰臥却從伊

起則恐因遭努力

雖然希有也須知

七朝豉粥溫溫食

震着牙關事不宜

大小便時須緩緩

無今白起與扶持

高聲叫喚言多後

驚動晴輪見雪飛

如此志心三十日

漸漸出外認親知

狂心莫憶陰陽事

夫婦分牀百日期

一月不須臨面洗

針痕溫着痛凝上

五辛酒面周年斷

服藥平除病本基

八小兒歌

小兒不與大人同

醫療之源別有宗

神氣未全難保惜

披鎌灸烙哭傷瞳

等閑痛藥勿令點

啼叫勞他病轉濃

更若手揉難禁詞

因茲睛破未天終

欲求穩便全雙目

苦藥煎淋洗避風

服藥 肝瀆見効

免教昏暗一生中

九合藥禱式

凡眼病多因五臟壅熱上冲使然故湯飲之劑不可見火蓋藥性得火則熱投之臟腑恰如揚湯止沸非謂無益又且害之須是淨洗向日如遇陰雨亦當風乾若食前補實等藥或炮或灸一依方法今具於左

烏頭附子生用皮尖熱則用灰火炮裂去皮尖牡蠣生用則去泥熱用鹽泥固濟炭火燒通赤取淨須左顧者諸角先鎊治爲細末然後入藥和合寶石亦歲

大黃古方亦用濕紙裝煨或甌上蒸近世生

用當量虛實以生熟用之

天麥二門冬牡丹巴戟天遠志地骨皮皆去
心茯苓去皮芍藥去心補藥用白者芎藭用
赤者當歸去蘆淨洗入補藥則用水洗烈日
曬乾入湯飲酒浸十宿羌活黃連藜蘆去根
蘆淨洗

礬石須於新瓦上或銅器中熬令沸汁盡卽
止石南別取葉嫩莖去大枝

兔絲子酒浸曝乾火焙亦得用紙條子同礬
卽爲末又用鹽拌礬則易碎但只酒浸爛而

月天膏卷一
一
煖爲膏却焙再煖念老鷹聲不輒則易碎

杏仁麤人蒸去皮尖

柴胡膏本前胡去苗洗淨

桂心陳皮去皮

枳殼去穰麩炒

諸花去萼及梗洗淨

香附子麩炒春去毛

白僵蠶直者去絲

諸炒

防風去又股者

蝟蟲去足翅毒微炒

荆芥白芷白芨白欬不見火

蟬脫洗去土曬乾

微炒

細辛去葉洗淨

乳香尋常用指甲瓜燈心草樛米之類同研

及水浸乳鉢研之皆費力惟紙裹放壁隙中
良久碎卽粉碎麝香須着少水研之自然碎
極細不必羅也

煉蜜法稱蜜十兩水十兩同煎去沫淨合水
盡取出稀稱得淨蜜十兩則是水耗而蜜在
庶不焦損又每蜜一觔祇煉得十二兩半或
一分是實數若火少火多並用不得

凡膏中用蠟皆烱攪調以和藥

凡膏中用脂皆先煉去草方可用

凡膏中用雄黃硃砂輩皆別搗細研飛過

如麪絨膏畢乃投膏中以物疾攪勿使凝
強不調

凡膏中用水銀須於凝膏中研令消散胡粉
亦然若水銀誤傾在地不可收宜以雉尾
收之川椒亦嘉

凡藥中用蜜先稱藥末兩數若干次稱煉了
蜜與藥等分方可搜搜畢更於石臼中搗
百數杵視其色理合同爲嘉九藥末須用
蜜絹作羅底割散藥用竹篩篩過方得藥
汁清利

十煎藥訣

大凡煎藥退執藥須要清利不可用火太猛
火勢蒸炎水易乾須是火勢得中扇之
恐灰土泥飛入藥中服之反爲害也要當
家人監視不可專付婢僕也

十一服藥須知

凡服藥率多涼劑必於食後服之或者徒泥
其說往往食未下咽藥卽入口是致食氣
與藥氣冲搏釀積於脾胃之上不爲藥無
其効且使脾家受冷旋至虛弱酒當食欺

片時候胸膈稍寬然後隨意服之尤貴冷
熱得所大熱則井肝肺所宜大冷則脾腎
停積不化宜自斟酌耳

十二點眼藥訣

凡點眼之藥多用腦麝之類通入關竅毛孔
易至引惹風邪點眼之時宜向密室端坐
然後用銅筋點少許藥放入眼內點畢以
兩手對按魚尾二穴次合眼良久候血脉
稍定漸漸放開若是夜臥用藥則又不拘
此法也或向當風去處或是點罷即開則

風邪乘入血脉滯邪散及勢命切切浪雷
意

秘傳眼科龍木總論卷之一 中

第一圓翳內障

凡眼初患之時眼前多見蠅飛花發垂蟻游
烟輕霧漸漸加重不痛不痒漸漸失明眼與
不患眼相似且不辨人物惟覩三光患者不
覺先從一眼先患向後相牽俱損此是腦脂
流下肝風上冲玉翳青白瞳人端正陽看則
小陰看則大其眼須針然後服藥治用防風
散羚羊飲子

詩曰

醫中再好是團圓

一點油如水上盤

陽裏看時應自小

陰中見則又還寬

金針一撥雲飛去

朗日舒光五月天

不是醫人誇巧妙

萬兩黃金永不傳

第二水輪內障

此眼初患之時頭旋額角偏痛眼臉骨疼痛眼
內赤澁有花或黑或白或紅皆因肝臟積熱肺
受風勞或心煩或嘔血大腸秘瀉夜見燈花如
醉飛初患之時宜令針治諸穴脉忌腎脉出血
過多恐加昏暗宜服還清丸

詩曰

冰翳猶如水煉堅

陰中陽裏一般般

傍觀瞳子透表白

針下分明豈誣言

來往用針三五撥

志心服藥必能全

若遇庸醫強撥下

瞳人清淨不能觀

第三滑翳內障

此眼初患之時不痒不痛先從一眼先患後乃相牽俱損端然漸漸失明皆因腦脂流下肝風冲上瞳人內有翳如水銀珠子不辨人物宜令金針撥之將息後服補肝腸及石明丸卽瘥

詩曰

滑翳看時心且專

微含黃色白翻翻

纔開還大速還小

有似水銀珠子旋

針撥雖然隨手落

擬抽針出却歸源

縮針穿破青涎散

五月金烏照遠天

第四潛翳內障

此眼初患之時朦朧如輕烟溼霧漸漸失明還
從一眼先患後乃相牽俱瞶不觀人物猶辨

光翳如凝脂色暗人端正狀宜令針金針針之

然後復原情後七寶丸立効

詩曰

瀟瀟張開隨臉遲

陰陽大小亦微微

傍觀瞳子凝脂色

先哲畱言不要疑

此障撥時依本法

用針三五不遲遲

勞封七日圖瘡痂

將息應當莫自欺

第五散翳內障

此眼初患之時不痒不痛漸漸失明還從一眼
先患惟瞳人裏有障翳乍青乍白不辨人物猶
見三光此眼宜令金針撥之然後宜服還睛散
補肝湯主之効

詩曰

散翳又何爲所狀

形同酥點爛容儀

隨針針了和涎散

未得分明自得知

封裏安存須善巧

莫令患者致狐疑

慇懃遣眼還睛散

再覩三光百日期

忌慎一如傳戒行

不須恣意縱貪知

深言向說何爲切

記取冥冥黑暗時

第六浮翳內障

此眼初患之時都無痒痛還從一眼先患後乃相牽俱換皆因腦中熱風冲入眼內腦脂流下

凝結作翳如銀針之色雖不見人物尤見三光
宜用金針撥之然後且決明散墜翳丸神効

詩曰

浮翳正觀如透外

乍看色白似銀燈

陰寬陽小隨開合

此則深知是本形

辨認既能無錯謬

金針撥出近烏睛

但依教法施心力

免觸凝脂破不明

第七深翳內障

此眼初患之時肝臟勞熱還從一眼先患或見
黑花後卽相牽俱損腦中熱氣流下要辨三光

宜令金針撥之然後服羚羊角飲子空清丸卽
瘥

詩曰

一般四障又名沉

隱隱裁形黑木深

向日細看方得見

自古相傳不是今

此障撥時瀆遠完

觀君莫要短頭針

墜醫強過五十息

只求牢固莫他心

第八橫醫內障

一名橫開醫內障

此眼初患之時還從一眼先患皆是五臟虛勞
風毒冲上腦脂流下今眼決明丸辨三光宜用

金針撥之宜服選睛丸上寶散卽痊

詩曰

雖然希有橫關騎

學者韜鈴要得知

細觀橫心如劔脊

上頤下畔白微微

開時先向中心撥

隨手還當若霧披

政往修來何所作

一生龍樹願依歸

第九 偃月鬚內障

此眼初患之時惟有頭旋額角骨痛亦因肝腎
俱勞腦風積熱致使生翳如偃月之狀宜用金
針撥之然後宜服通明散墜翳丸立効

詩曰

腦中一種腦脂疑

何得偏癱偃月名

一半厚而一半薄

醫公不了卽疑生

欲知巧妙行醫法

厚處先宜撥便開

丸散還睛宜遣服

堅牢百歲得安寧

第十棗花翳內障

此眼初患之時微有頭旋眼澁漸漸昏暗時時
疼痛腦熱有花黃黑不定此狀宜令針治諸穴
疎然後宜服還睛散陸翳丸立効

詩曰

翳中何名是棗花

週廻鋸齒沒諸他

撥時從上輕輕撥

狀似流星與落霞

細意辨看瞳子內

莫留斷脚作欄遮

依然不斷還晴藥

百歲光陰覩物華

第十一白翳黃心內障

此眼初患之時肝臟勞熱先從一眼先患以後
相牽俱損初覺即須急療先須憑服湯藥丸散
得息謹獲即宜針刺諸穴脉後更用金針輕撥
然後服障翳散即効

詩曰

可憐白鬢更黃心

患者商量誤且針

來往用針三五撥

不隨針落藥能沉

還睛方術須通秘

百日如風捲霧除

期約叮嚀須向說

試看奇効直千金

第十二黑冰凝醫內障

一作黑花

此眼初患之時不痛不痒微有頭旋眼澁見花
黃黑不定瞳人微大翳或青白宜用金針撥之
然後宜服蘆薈丸通明散立効

詩曰

黑翳冰結微青色

可憐內障無真容

陰陽開處雖開裹

始覺風疔在膽中

須用金針三五撥

藥憑蘆薈作神功

期程百日叮嚀說

玉兔中秋斃眼空

第十三胎驛內障

此眼初患之時皆因乳母多有喫食乖違將息失度愛食濕麪五辛諸毒丹藥積熱在腹後此令胎中患眼生後五六歲以來不言不笑都無盼視父母始覺急須服藥調理不宜點諸毒藥燒炙頭面枉害形容直至年長十五以來方始辨眼內翳狀如青白色蓋定瞳人九辨三光可

令金針撥之小兒內障多有不堪療者宜仔細
看之方可醫療宜服護睛丸即不損眼也

詩曰

內障因何及小兒

胎中受熱腦脂垂

初生不覺三年內

流盼還應眼轉遲

四五歲時言近看

瞳人結白始如迷

若能信受醫家語

更讀前賢後首詩

又詩曰

小兒內障未容醫

將息難爲定不疑

父母解留年十八

金針一撥若雲飛

痴心炙烙燒頭面

舌舐揩摩黑水齡

年幾得醫先損了

不堪針撥只堪悲

第十四豆風變內障

此眼初患之時頭旋偏痛亦是臟腑虛勞肝風
爲本或一眼先患或內嘔吐雙暗毒風入眼兼
腦熱相侵致令眼目失明初覺卽須急療宜服
除風湯通明補腎丸立効

詩曰

烏綠青風及黑黃

堪嗟宿世有灾殃

瞳人顏色如明月

問觀三光不見光

後有腦脂留結白

真如內障色如霜

醫人不識將針撥

醫落非明目却傷

終

秘傳眼科龍木總論卷之一下

一圓翳內障

防風散

菟蔚子

防風

桔梗

五味子

知母各二兩

黑參

川大黃

細辛

芒硝

車前子

黃芩各一兩

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分去粗溫

服食後

羚羊角飲子

羚羊角三兩

知母

細辛

車前子

人參

黃芩

各二兩

防風

二兩半

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分夜塗後
去相溫食之

二冰翳內障

還睛丸

防風

菟蔚子

車前子

知母

各二兩

人參

以下各一兩

桔梗

黃芩

乾地黃

細辛

五味子

各二兩

黑參

半兩

右搗羅爲末煉蜜爲丸桐子大空心茶下十九

三滑翳內障

補肝湯

人參

茯苓

黑參

黃芩

各一兩

防風

知母

桔梗

芫薺子

各一兩

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去

粗溫服

石決明圓

石決明

車前子

防風

知母

各一兩

芫薺子

五味子

細辛

人參

茯苓

茯苓

大黃

各一兩

右搗羅爲末煉蜜爲丸如桐子大食前茶湯送下

一十九

四瀆翳內障

還睛散

桔梗

五味子

芫薺子

黑參

黃芩

各一兩

防風

知母

各二兩

車前子

細茶

各二兩半

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去

粗濕服

七寶圓

龍腦

一分

人參

一兩

珍珠

五錢

石决明

二兩另搗

琥珀

青魚膽

熊膽

各二兩

菟藟子

二兩

右搗羅爲末煉蜜爲丸如桐子大食前茶下十九

五散翳內障

還睛散

人參

茯苓

細辛

五味子

桔梗

各一兩

車前子

防風

各二兩

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分夜食後

去粗溫服

新肝湯

細辛

防風

菴蔚子

各一兩

五味子

桔梗

果參

各一兩半

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分空心去

祖溫服

六浮翳內障

決明散

石決明

人參

茯苓

大黃

車前子

細辛

防風

菴蔚子

桔梗

一兩半

右爲末每食後米飲湯調下一錢

陸翳圓

石決明

細辛

各一兩

知母

乾地黄

防風

各一兩

兔肝

一具

五味子

人參

各二兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十丸

七沉翳內障

羚羊角飲子

羚羊角

防風

羌蔚子

各二兩

車前子

黑參

黃芩

各一兩

大黃

半兩

右爲末以水一盞散煎錢煎至五分空心去粗濕

服

空青圓

空青 一銖

五味子

車前子

細辛 各一兩

防風

生地黄

知母 各二兩

石決明 一兩

另搗
細研

右為末煉蜜為丸如桐子大空心茶下十丸

八橫罌內障

作橫開散切

還睛丸

人參

黑參

石決明

車前子

五味子

黃芩 各一兩

防風

細辛

乾地黄

各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十五丸

七寶丸

羚羊角

犀角

各一兩胡黃連

石決明

車前子

甘草

各半兩丹砂

一分另研

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

九偃月內障

通明散

人參

防風

黃芩

各一兩細辛

茯苓

半兩

薺蔚子

二兩

右爲末水一盞散一錢煎至五分夜食後去相溫服

蓬露圓

青羊膽

青魚膽

鯉魚膽

各七個

熊膽一分

牛膽五錢

麝少許

石決明

一兩

右爲米粳糊爲丸如桐子大空心茶下十九

十棗花翳內障

還睛散

人參

茯苓

車前子

黑參

防風

葶藶子

知母

各二兩

黃芩

兩半去皮

右爲末以水一盞散一錢煎至五分去粗溫服

墜翳圓

方與墜月翳墜翳丸

十一白翳黃心內障

墜翳散

石決明

芫菊子

防風

各二車前子

甘菊花

人參

各二兩

右爲末食後米飲湯調下一錢

十二黑水凝翳內障

一作黑花

盧春圓

蘆薈

甘草

各一分

人參

牛膽

各半

栝子仁

細辛

各一兩

羚羊角

一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

通明散

栝子仁

車前子

桔梗

各二兩

芫蔚子

黑參

茯苓

人參

各一兩

防風

半兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服

十三胎患內障

護睛圓

水香

大黃

黃芩

黑參各

射干

細辛各半兩

右爲水燒膏爲丸如桐子大空心茶下十九

十四五風癱內障

除風湯

羚羊角

車前子

各二兩

芍藥

人參

茯苓

大黃

黃芩

芒硝各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至四分食後去粗溫

服

通明補丸

前子

石與明

結纒

芍藥

各一

細辛 二兩

大黃

一分

蔚子

乾地黃

各一

兩右爲末，煉蜜爲丸，如梧子大，空心茶下十丸。

秘傳眼科龍木總論卷之二前

第十五雷頭風變內障

此眼初患之時頭面多受冷熱毒風冲上頭旋
尤如熱病相似俗於雷頭風或嘔吐或惡心年
多冲入眼內致令失明或從一眼先患瞳人或
大或小不定後乃相損眼前昏黑不辨三光初
覺有患宜服瀉肝湯磁石丸立効

詩曰

俗號雷頭熱毒風

年多冲入眼睛中

瞳人微大或微小

坐對三光黑不紅

腦熱流脂來結白

醫師不了便針通

雖然翳障依前暗

目愧庸醫不用功

第十六驚振內障

此眼初患之時忽因五臟虛勞受疾亦由肝氣
不足熱毒沖入腦中或因打築腦中惡血流下
漸入眼內後經三二年間變成白翳一如內障
形狀不宜針撥先患之眼更一隻牽損之眼却
待翳成依法針之立効然後服鎖肝丸還睛散
卽瘥

忽然撞振不全傷

疼痛微微日子長

變卽腦脂爲白色

一如肉障觀三光

不須錯誤將針揆

却恐爲災難可當

在後若牽非損者

醫元如法如開張

第十七綠風內障

此眼初患之時頭旋額角偏痛連眼脰骨及鼻
頰骨痛眼內痛澁見花或因嘔吐惡心或因嘔
逆後便令一眼先患然後相牽俱損目前花生
或紅或黑爲肝肺受勞致令然也宜服羚羊角
飲子還睛丸兼針諸穴眉骨血脈令住却疾勢

也

詩曰

初患頭旋偏頭痛

額角相牽是綠風

眼睜連鼻時時痛

悶澁生花黑白紅

肝臟誰知先患左

肺家右眼作先鋒

續後相牽多總患

緣他脉帶氣相通

風勞入肺肝家壅

客熱潛流到腎宮

秘澁大腸由自可

每覺心煩土築胸

必是有時加嘔逆

風痰積聚在心中

羚羊湯藥須當服

還睛丸散立成功

頰針眉骨兼諸穴

能行病本或行蹤

忌針腎脉宜出血

恐因此後轉昏朦

瞳子開張三確絕

妙藥能醫更設逢

第十八烏風內障

此眼初患之時不疼不痒漸漸昏沉如不患眼人相似先從一眼起復乃相牽俱損瞳子端然不開不大微小不覩三光此是臟氣不和光明倒退眼帶障閉經三五年內昏氣結成翳如青白色不辨人物已後相牽俱損瞳人微小針之無効惟宜服藥補治五臟令奪病勢宜服決明

九補肝湯立効

詩曰

都無痛痒不頭疼

漸漸昏朦似物瞞

沒翳恰如渾不患

烏風根本更何言

有花臟腑虛勞事

無卽肝家壅氣噴

兩種旣知虛與實

分明用藥補和宣

覺時先服涼藥飲

空腹宜吞磁石丸

食後補肝宜蚤治

瞳人未卜卽能痊

陽衰年老還相似

醫者搜尋細意看

若絕三光應不救

瞳人乾定是爲難

第十九黑風內障

此眼初患之初頭旋額角偏痛連眼臉骨及鼻
頰骨時時亦痛兼眼內痛澁有黑花來往先從
一眼先患以後相牽俱損亦因腎臟虛勞房室
不節因爲黑風內障不宜針撥宜服藥將息針
治諸穴脉宜服羚羊角飲子補腎丸立効

詩曰

黑暗形侯綠風同

臟腑推尋別有蹤

黑卽腎家來作禍

綠風本是肺相攻

欲知何藥能爲療

也夏羚羊瘧病宗

將息一針除赤眼

流卽輕輕兼眼中

切忌房勞與嗔怒

恣意之流切莫從

瞳子開張三曜絕

名醫拱手謾相逢

第二十青風內障

此眼初患之時微有痛澁頭旋腦痛或眼先見
有花無花瞳人不開不大漸漸昏暗或因勞倦
漸加昏重且令將息便須服藥恐久結為內障
不宜針撥皆因五臟虛勞所作致令然也宜服
羚羊角湯還睛散卽瘥

詩曰

曾無痒痛本源形

一眼先昏後得名

瞳子端然如不患

青風便是此源因

初時微有頭旋悶

或見花生又不生

忽因勞倦加昏暗

知者還應自失驚

服藥更須將息到

莫遣風芳更發萌

須服羚羊湯與散

還睛墜翳自相應

頭摩膏藥頻頻上

免使雙眸失却明

患者無知違此法

他時還道是前生

第二十一 肝虛雀目內障

此眼初患之時爰多痒或澁發歇時時暗也後

極重之時惟昏黃不見惟視直下之物宜服洗
肝湯瀉肺湯即瘥

詩曰

雀目雖輕不可欺

小兒患者作疳翳

大人肝臟虛勞專

更被風來助本基

花發眼前隨自見

不憂後患即無知

年深自目亡雙目

欲觀三光後世稀

第二十二高風雀目內障

此眼初患之時肝有積熱冲腎臟虛勞亦兼患
後風冲肝氣不足以患此疾與前狀不同見物

有別惟見頂上之物然後爲青盲宜服補肝散
還睛丸卽瘥

詩曰

雀目前篇已十根

此篇何要再三論

直言病狀同中異

爲是高風要別陳

一種黃昏無所見

若觀夫象總能分

年多瞳子如金色

欲識高風久是真

兩目初醫何藥妙

卓肝入口火燃薪

風勞更要除根本

未保千秋與萬春

第二十三肝目暗風內障

此眼初患之時眼朦昏暗並無赤痛內無翳膜
此是腎臟虛勞肝氣不足眼前多主花數般形
狀或黑或白或黃或青如此患者切忌房室如
夜看細書亦恐失明也見一物面形難辨後亦
變為青盲急宜補治五臟可得疾退宜服補肝
散山藥丸立效

詩曰

朦朧遠視不分明
下冷肝虛元氣乏
暫時辭却陰陽事

赤痛前無淨黑睛
眼前花見數般形
晝晝裁縫且慢停

不是醫家穿鑿說

古來聖者說章程

有時一物觀爲二

心緒多饒妄與驚

急服車前丸及散

免教又後變青盲

秘傳眼科龍木總論卷之二前

秘傳眼科龍木總論卷之二

十五雷頭風變內障

瀉肝湯

防風

芫蔚子

各二兩

五味子

細辛

黃芩

大黃

苦硝各一兩

車前子

一兩半

桔梗

一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗濕

服

磁石丸

磁石

燒赤醋三遍

五味子

牡丹皮

乾姜

黑參

各一兩

附子炮半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大食前茶下十九

十六驚振肉障

鎮肝丸

石決明

一兩

細辛

乾山藥

芫薺子

人參

車前子

栝子仁

茯苓各一兩

防風

兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大食後茶下十九

還睛散

人參

車前子

桔梗各一兩

芫薺子

芫蕘

各一兩

防風

細辛

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食前去粗溫服

十七綠風內障

羚羊角子飲

羚羊角

防風

知母

人參

茯苓

黑參

桔梗

各二兩

結辛

三兩

黃芩

車前子

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服

還睛丸

芫蔚子

防風

各二人參

決明子

車前子

芫蔚子

細辛

各一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

十八烏風內障

決明圓

石決明

防風

人參

車前子

細辛

茯苓

芫蔚子

乾山藥

桔梗

各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大食前茶下十九

補肝湯

芍藥

細辛

桔梗

車前子

人參

茯苓

菘活

防風

各二兩

右爲末以水一盞散

錢煎至五分食前去粗

溫服

十九黑風內障

羚羊角飲子

羚羊角

菘活

黑參

細辛

桔梗

黃芩

柴胡

車前子

黃蘗子

各一兩半

防風

一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大食後茶下十九

二十青風內障

羚羊角湯

羚羊角

人參

黑參

地骨皮

羌活

各兩

車前子

兩半

右爲末以水一盞散

錢煎至五分食遠服

還睛散

人參

車前子

地骨皮

茯苓

細辛

防風

羌活

各等分

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去濕

服

二十一肝虛雀目內障

洗肝散

大黃

車前子 黑參

黃芩

細辛

芫蔚子 各二兩

右搗羅爲末以水一盞散五分入黑豆三七粒煎至五分黑豆空心下一服臨臥一服

瀉肝湯

黃芩

防風

各二兩

芍藥

桔梗

芒硝

大黃

各二兩

右搗羅爲末以水一盞散半錢煎至五分食前去

祖溫服

二十二雀目內障

補肝散

人參

茯苓

車前子

川大黃

黃芩

各一兩

五味子

防風

各二兩

黑參

各二兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分去祖溫服

還睛丸

人參

細辛

茯苓

木香

知母

石決明

石決明

羌蔚子

各

兩右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

二十三肝風目暗內障

補肝散

羚羊角

防風各二兩

羌活

人參

茯苓

細辛

黃芩各三兩半

右爲末食後米飲湯調下一錢

山藥圓

乾山藥

乾地黃

人參

防風

澤瀉各一兩

茯苓

爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九